

中医方剂大辞典

第三册



主编单位 南京中医学院

主编 彭怀仁

人民卫生出版社



中医方剂大辞典

第 三 册

主编单位 南京中医学院

主 编 彭 怀 仁

人 民 卫 生 出 版 社

(京)新登字 081 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中医方剂大辞典 第三册/彭怀仁主编. -北京: 人民卫生出版社, 1994. 10
ISBN 7-117-02056-3

I. 中… II. 彭… III. 方剂学-词典 IV. R289-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 00070 号

中医方剂大辞典

第三册

主编单位 南京中医学院

彭怀仁 主编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里 10 号)

人民卫生出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 92 $\frac{3}{4}$ 印张 4插页 2104千字

1994年11月第1版 1994年11月第1版第1次印刷

印数: 00 001—2 000

ISBN7-117-02056-3/R·2057 定价: 117.60元

[科技新书目 325—193]

《中医方剂大辞典》顾问委员会名单

（以姓氏笔划为序）

万友生 王绵之 白永波 **吴考槃**
何 任 张瑞祥 欧阳琦 周仲瑛
施奠邦 钱伯文 徐国仟 董建华

编 写 单 位

主编单位：南京中医学院

协编单位：山东中医学院

上海中医学院

江西中医学院

湖南中医学院

江西省中医药研究所

湖南省中医药研究院

《中医方剂大辞典》第三分册

编委会及编写人员名单

（以姓氏笔划为序）

主 编：彭怀仁

副 主 编：万少菊 王旭东 田代华 史欣德 史慕山 孙世发

孙光荣 李 飞 沙凤桐 张民庆 张浩良 陈 伟

陈子德 赵国平 洪广祥 傅瑞卿

常务编委：王旭东 史欣德 史慕山 成德水 孙世发 李 飞

张民庆 赵国平 彭怀仁

编 委：万少菊 王旭东 石历闻 田代华 史欣德 史慕山

成德水 朱华德 孙世发 孙光荣 孙美珍 杨 进

李 飞 吴永贵 吴跃进 沙凤桐 张民庆 张浩良

陈 伟 陈子德 陈涤平 陈德兴 赵文业 赵国平

柳长华 洪广祥 顾保群 郭君双 郭国华 彭怀仁

傅幼荣 傅瑞卿 谢文光 虞胜清 路振平 蔡铁如

谭兴贵

撰 稿 人：万少菊 王龙章 王旭东 毛 平 石历闻 田代华

史欣德 史慕山 包明蕙 匡弈璜 朱华德 华浩明

刘 涛 刘更生 刘学华 汤希孟 阳 立 孙世发

孙光荣 孙迎节 孙美珍 杨 进 杨 虎 杨俊杰

李 飞 李春英 吴永贵 吴承艳 吴跃进 肖德发

何清湖 辛增平 宋经中 张 昱 张为群 张民庆

张炳填 张浩良 陈 伟 陈卫星 陈涤平 陈家玉

陈德兴 赵文业 赵国平 柳长华 姜静娴 洪广祥

顾保群 徐春波 郭君双 郭国华 郭建生 郭瑞华

彭怀仁 韩育明 蒋玉珍 程淑娟 傅幼荣 傅瑞卿

谢凤英 谢文光 虞胜清 路振平 蔡铁如 廖云龙

谭兴贵 樊巧玲 薛建国 魏飞跃

前 言

中医方剂，是历代医家临床经验的结晶，是运用中医辨证论治理论指导临床防病治病的主要手段。纵观周、秦以来，新方创制不断增加，载方文献汗牛充栋，组方理论渐趋完善，为炎黄子孙的健康和中华民族的繁衍昌盛，作出了巨大的贡献。在方书的编撰方面，唐以前的方书多出私人之手。如被尊为“方书之祖”的《伤寒论》与《金匱要略》；集简、便、验方而成书的《肘后方》；采集群经，删繁就简的《千金要方》、《千金翼方》；上自神农，下迄唐世，无不采摭的《外台秘要》等，均为私人所编著。由于医药学之发展，与民族之强弱、国家之兴衰有着密切的关系，故自宋代以后，方书之编撰受到了官方的关注，如宋·王怀隐主编的《太平圣惠方》、陈承等主编的《太平惠民和剂局方》、赵佶主编的《圣济总录》、明·朱橚主编的《普济方》、清·吴谦主编的《医宗金鉴》、陈梦雷主编的《古今图书集成·医部全录》等，均为国家级的载方名著，其中《太平惠民和剂局方》是我国官方颁布的第一部成药制剂规范，而《普济方》收载明初以前之方剂达 61739 首之多，《四库全书提要》称为“集方书之大全者”。由于历代王朝关心医药，重视方书，亦促进了民间医药之发展。据不完全统计，自宋至清末的一千余年间民间名医所著的各种方书多达 1400 余种。民国迄今，医药科学突飞猛进，中医方剂学亦随着时代的步伐而不断前进。尤其是在中华人民共和国成立以后，党和政府重视中医中药，中医的古籍与新著不断出版，方剂的实验研究相继开展，中医方剂学已成为全国各中医院校主要课程之一。《中华人民共和国药典》收录的名方验方和复方新制剂，对于中医方剂的推广运用，起到了积极的作用。

在制方理论方面，在宋以前多有方而无论，制方之义不明，后人难以掌握，用之稍有不当，不免影响疗效。金·成无己著《伤寒明理论》，对《伤寒论》中 20 首方剂分析主治之证情，阐述配伍之奥义，开创了方论之先河。自此以后，有自创新方，自释方义者，如金·李杲《脾胃论》、《兰室秘藏》，元·罗谦甫《卫生宝鉴》等；有为前人成方撰写方义者，如明·许宏《金镜内台方议》、洪九有《摄生秘剖》；清·罗美《古今名医方论》、汪昂《医方集解》、吴仪洛《成方切用》、王晋三《古方选注》、张秉成《成方便读》等。尤其值得一提的是，清·吴谦《医宗金鉴·删补名医方论》，是我国第一部由官方修订刊行的方论专著。目前全国各中医院校教材《方剂学》，《中国医学百科全书·方剂学》等著作中的古今名方验方，均由当代名医撰写了方论，对研究方剂配伍原理及临床运用有一定参考价值。

在我国对外文化交往中，中医方书是其内容之一。在日本，成书于公元 984 年的《医心方》，收载了我国唐以前方书中的方剂。在朝鲜，成书于公元 1445 年的《医方类聚》、成书于公元 1610 年的《东医宝鉴》，均引载了我国明代以前方书中的方剂，足见中医方剂在我近邻各国中有着深远的影响。

据近 2000 种中医药文献的不完全统计，中医各科有名称和无名称的方剂已达 13 万首以上，虽然历经王怀隐、赵佶、朱橚等整理，但存在的问题仍然很多。例如古籍所载之方，均据

病证分类，方随病证而列，多无方名目录，欲检一方，殊非易事；同一方剂的出处，众说纷纭，令人莫衷一是，无所适从；同一方剂的名称，因载方文献或版本不同而命名各异，孰先孰后，仓卒难别；有相当一部分方剂的内容，由于辗转传抄刻印，脱、衍、倒、讹比比皆是，以讹传讹，影响疗效；有些常用的名方与验方的不同功效、主治、方论、临证验案、实验研究等资料，分散于各种文献中，汇集不易，难窥全豹；诸如此类，不胜枚举。综上所述，对中医方剂进行一次划时代的、全面的、系统的整理，是一项具有历史意义而又刻不容缓的工作。

《中医方剂大辞典》，对我国上自秦、汉，下迄现代（1966年）的所有有方名的方剂进行了一次系统的整理，力求使上述各种问题得到合理的解决。以方剂检索而言，本书汇集古今有方名的医方，按照辞书形式编纂，既有目录，又有索引，从而解决检方的难题。以方源而言，本书参考古今各种中医药文献，对每一首方剂的方源进行认真的考证，而注明其原始出处，这对研究方剂的历史，澄清方剂的源流，是十分必要的。以一方多名而言，凡属同方异名，经过反复考证，依据载方文献成书年代之先后，确定正名与异名，并将二者相互挂钩，查正名即可知道异名，查异名即可知道正名，这对了解一方多名和准确地统计方数，有着极大的裨益。以方剂的质量而言，本书尽可能地进行仔细的校勘，使脱者补之，衍者删之，倒、讹者正之，使方剂的内容经过这次整理而准确无误。以方剂容纳的资料而言，本书对所有方剂分散在各种文献中的不同主治、方论、验案以及现代实验研究资料分别设项进行整理筛选，汇集于各方之下，为读者全面了解方剂提供了极大的便利。

早在1958年，南京中医学院即开始组织人力，筹备编撰本书，并得到当时的中华人民共和国卫生部的大力支持。到1961年底，已从1700余种中医药文献中，收集了大量的方剂、并进行了初步的筛选整理，此后因故而停顿。1983年原中医古籍办公室又将编撰本书的任务下达给南京中医学院，1985年本书的筹备工作开始恢复，1986年成立课题协作组。1988年国家中医药管理局成立以后，又将本书列为局级课题。在编撰过程中，得到了有关各级主管部门的热情关怀，在此表示衷心的感谢！

我们的主观愿望，是将本书编撰成载方最多、资料最全、考证最精的划时代的方剂大典。但由于本书所收资料涉及文献甚多，考证难度极大，撰审任务非常艰巨，加之我们的水平不够和种种客观条件所限制，错误缺点在所难免，敬请读者指正，以便再版时修改。

编者

凡 例

一、本辞典共收载上自秦、汉，下迄 1986 年底 1800 余种中医药及有关文献中有方名的方剂 9 万余首。其中以 1911 年以前的方剂为收集重点，1911 年以后的方剂则择优选录。

二、本辞典以方剂名称作为辞目。辞目又分为正辞目与副辞目。同一方剂而有不同名称者，以最早出现的方名为正辞目，其余为副辞目。但在有些文献中，先见的方名仅有主治，而无组成、用法，后见的方名有组成、用法、主治者，则以后见的方名作正辞目，先见的方名作副辞目。

三、正、副辞目按方名首字笔划、笔顺排列；方名首字相同的辞目，先按方名字数归类，字数少者排前，多者排后；方名首字、字数均同者，再按第二字之笔划、笔顺排列，依次类推；同名方则按各方方源的成书年代或创方者生卒年代先后排列。

四、凡经增补的文献，因其原著的方剂与增补的方剂年代不同，故均区别开来确定年代，并尽可能在出处中注明。

五、凡正辞目方名有误者，根据始载书的不同版本及有关转载书径予订正，并在备考中加以说明。副辞目方名有误者，径删不录。

六、正辞目内设方源、异名、组成、用法、功用、主治、宜忌、加减、方论选录、临证举例、现代研究、备考等十二项。

1、方源：叙述正辞目的原始出处。如始载书存在者，注始载书的书名和卷次；始载书已佚者，注现存最早转载书引始载书。若系转引的人名，经追考创方者的著作中有此方者，改从原著收录；原著已佚或创方人无著作传世者，乃转载书引某某人方。始载书无方名，后世文献补立方名者，注“方出始载书卷 X，名见转载书卷 X”。

2、异名：收录各方异名的名称及其出处。如一方有多种异名者，则按所载异名的文献年代先后排列。若仅有始载书的异名者，不注出处。

3、组成：收录始载书中各方的具体成分，包括药物名称、炮制、用量等内容。方中药物计量单位，1979 年前的方剂概用旧制，1979 年后新创方均用公制。方中诸药原无用量者，不予增补；后世转载文献已补用量者，则收录于“备考”中。如组成中个别药物无用量，则在备考项说明：“方中某药用量原缺。”如上述某药原无用量，转载书中有用量者，则根据转载文献补入，亦在备考项说明。

4、用法：收录方剂的制剂、剂型、服用方法与用量等内容。如原书无用法，转载文献已补用法者，则收录于备考项。

5、功用、主治、宜忌：分别设项收录、叙述各方的功效、主治病证、组方用方的注意事项。凡收录两种以内不同文献的引文资料，均直接摘收引文；凡收录三种以上不同文献的资料，先由编者根据引文内容归纳成主文，然后下列引文。

宜忌项归纳主文，须有三种以上关于疾病、体质、妊娠宜忌和毒副反应的文献资料。若

关于药物配伍宜忌、炮制与煎煮药物器皿宜忌、服药时的饮食宜忌等，均只用引文，不写主文。

6、加减：仅收录始载书的资料。如加减药物占原方用药比例过多者不录；现代方剂加减不严谨者不录；后世转载书的加减一概不录。

7、方论选录：择用古今名医对各方组成结构、配伍原理、综合功效、辨证运用、方名释义、类方比较等论述，而有独到见解者。原文精简者，录其全文；文字冗长者，择要摘录。

8、临证举例：选录古今医家运用各方治疗疾病的实际案例。文字简短者全文照录，文字较长者择要摘录。

9、现代研究：收摘用现代方法与手段对方剂进行实验研究和剂型改革的资料，包括复方药理作用和主要成分的研究，将传统的成方剂型改造成现代剂型等内容，均以摘要或综述方式撰写。对实验资料，摘录其实验结果，不详述实验方法与操作步骤；对剂型改革，不详述制剂的工艺流程。

10、备考：凡古今医方中的资料，有不宜收入前述各项而确具参考价值又必须收录者，均在本项叙述。有些方剂经编者研究考证，有必要加以说明者，均在本项说明之。

11、自功用以下各项，其内容出处与方源项一致者，所录引文不注出处；如上述各项收录有方源以外其它文献引文者，均分别注明出处。凡两条以上引文均根据文献年代排列，并编有顺序号。

以上十二项，以方源、组成、功用或主治为必备项，其余各项有资料则设，无资料则从缺。

七、引文筛选与整理：所有引文资料，均经过编者去同存异，精心筛选。相同的引文，一般从最早的文献中收录；若后世文献论述精辟者，择用后世文献的资料。凡引文中的封建迷信内容一概不录。引文文义不顺或重复者，在不违背原意的前提下，由编者作适当的加工整理。

八、副辞目：凡属副辞目，仅写副辞目的名称与出处，及与相关正辞目的关系。并在相关正辞目的有关项目中与之挂钩呼应；如写作“为某某方之异名”的副辞目，在正辞目异名项挂钩；写作“即某某方加（减）某某药”的副辞目，在正辞目加减项挂钩；其余副辞目，均在正辞目的备考项挂钩。

九、出处标注：正辞目除方源、异名二项标明书名和卷次外，其余诸项均只注书名，不注卷次。副辞目的出处亦标明书名和卷次。

期刊注法统一采用：刊年；（卷）期；起页。

十、药名统一：凡首字不同的中药异名仍保持原貌，如“瓜蒌”不改“栝楼”，“薯蓣”不改“山药”，“玄胡索”、“元胡索”不改“延胡索”。首字相同的中药异名，第二字以下诸字与《中药大辞典》的正名系同音字者，一律改用《中药大辞典》的正名，如“黄芪”改“黄耆”，“芒硝”改“芒消”，“白藓皮”改“白鲜皮”；若非同音字者，仍保留此异名。凡辞目中含有药名者，处理方法同此。

十一、书名统一：为了压缩篇幅，我们根据历代文献的引用情况，对某些常用方书的书名进行了简化。如《备急千金要方》简称《千金》，《太平圣惠方》简称《圣惠》。未经简化者仍用全称。一书多名者，选用一种常用名，如《人己良方》又名《寿世良方》，则统一用《人己良方》。

十二、文字统一：本辞典所用简化字，以中国文字改革委员会《简化字总表》（1964年第二版）为主要依据。根据中医药学名词术语的要求，少数繁体字如癥瘕之“癥”，橘皮之“橘”等，仍予保留。

十三、文献版本：凡一书有多种版本者，选用善本、足本；无善本者，选用最佳的通行本；其它不同的版本作为校勘、补充。若同一方剂在不同的版本中方名有差异者，以善本、最佳通行本或较早版本之方名作正辞目，其它版本的方名作副辞目。

十四、本辞典分11册出版。1~10册为正编，书前均设该册“方名目录”，按方名笔划顺序编排。第11册为附编，设有全书方名总目录、病证名称索引、参考书目索引、古今度量衡对照表等，以利读者检索。

目 录

五 画

【一】

打

18769 打虫丸 1

18770 打脓散 1

18771 打老儿丸 1

18772 打老儿丸 1

18773 打虫化积丸 1

18774 打伤八味散 2

扑

18775 扑粉 2

18776 扑肌散 2

18777 扑汗方 2

18778 扑汗方 2

18779 扑汗方 2

18780 扑汗方 2

18781 扑汗方 2

18782 扑身止汗散 2

艾

18783 艾汤 2

18784 艾汤 3

18785 艾汤 3

18786 艾汤 3

18787 艾叶丸 3

18788 艾叶丸 3

18789 艾叶丸 3

18790 艾叶丸 3

18791 艾叶丸 3

18792 艾叶丸 3

18793 艾叶丸 4

18794 艾叶汤 4

18795 艾叶汤 4

18796 艾叶汤 4

18797 艾叶汤 4

18798 艾叶汤 4

18799 艾叶汤 4

18800 艾叶汤 4

18801 艾叶汤 4

18802 艾叶汤 5

18803 艾叶汤 5

18804 艾叶汤 5

18805 艾叶汤 5

18806 艾叶汤 5

18807 艾叶汤 5

18808 艾叶汤 5

18809 艾叶汤 5

18810 艾叶汤 5

18811 艾叶汤 5

18812 艾叶饮 5

18813 艾叶饮 6

18814 艾叶饮 6

18815 艾叶酒 6

18816 艾叶散 6

18817 艾叶散 6

18818 艾叶散 6

18819 艾叶散 6

18820 艾叶散 6

18821 艾叶散 6

18822 艾叶散 7

18823 艾叶散 7

18824 艾叶散 7

18825 艾叶散 7

18826 艾叶散 7

18827 艾叶散 7

18828 艾叶散 7

18829 艾叶散 7

18830 艾叶散 8

18831 艾叶散 8

18832 艾汁方 8

18833 艾灰散 8

18834 艾曲散 8

18835 艾麦丸 8

18836 艾肠泥 8

18837 艾附丸 8

18838 艾附丸 8

18839 艾附丸 8

18840 艾附丸 8

18841 艾附丸 9

18842 艾附丸 9

18843 艾附丸 9

18844 艾附丸 9

18845 艾附汤 9

18846 艾柏饮 9

18847 艾茸丸 9

18848 艾茸丸 9

18849 艾茺丸 10

18850 艾香散 10

18851 艾姜丸 10

18852 艾姜汤 10

18853 艾胶汤 10

18854 艾胶汤 10

18855 艾胶散 10

18856 艾烟丸 10

18857 艾梅饮 10

18858 艾馄饨 10

18859 艾硫丸 10

18860 艾蒿酒 11

18861 艾煎丸 11

18862 艾煎丸 11

18863 艾煎丸 11

18864 艾煎丸 11

18865 艾煎丸	11	18902 平气丸	16	18945 平阳汤	21
18866 艾煎丸	11	18903 平气丸	16	18946 平呃散	21
18867 艾煎丸	12	18904 平气丸	16	18947 平肝汤	21
18868 艾煎丸	12	18905 平气汤	16	18948 平肝汤	21
18869 艾煎丸	12	18906 平气汤	17	18949 平肝饮	22
18870 艾煎丸	12	18907 平气饮	17	18950 平肝散	22
18871 艾煎丸	12	18908 平气饮	17	18951 平肝散	22
18872 艾煎丸	13	18909 平气散	17	18952 平肝散	22
18873 艾煎丸	13	18910 平气散	17	18953 平肝散	22
18874 艾煎丸	13	18911 平气散	17	18954 平肝散	22
18875 艾煎丸	13	18912 平气散	17	18955 平沙丸	22
18876 艾煎方	13	18913 平火汤	17	18956 平补丸	22
18877 艾煎散	13	18914 平火散	18	18957 平补汤	22
18878 艾煎膏	13	18915 平水丸	18	18958 平补汤	23
18879 艾醋汤	13	18916 平邪汤	18	18959 平补散	23
18880 艾叶洗剂	14	18917 平肉散	18	18960 平陈汤	23
18881 艾叶煎丸	14	18918 平血饮	18	18961 平肾散	23
18882 艾叶煎丸	14	18919 平血饮	18	18962 平和汤	23
18883 艾叶敷方	14	18920 平血饮	18	18963 平肺丸	23
18884 艾叶涂方	14	18921 平血饮	18	18964 平肺汤	23
18885 艾灰饼子	14	18922 平肌散	18	18965 平肺汤	23
18886 艾茸敷法	14	18923 平肌散	18	18966 平肺汤	24
18887 艾蒿酩酒	14	18924 平肌散	19	18967 平肺汤	24
18888 艾叶地黄汤	14	18925 平肌散	19	18968 平肺汤	24
18889 艾叶回阳散	14	18926 平肌散	19	18969 平肺汤	24
18890 艾附女珍丸	14	18927 平安丸	19	18970 平肺汤	24
18891 艾附四神丸	15	18928 平安丸	19	18971 平肺汤	24
18892 艾附暖宫丸	15	18929 平安丹	19	18972 平肺汤	24
18893 艾附暖宫丸	15	18930 平安丹	19	18973 平肺汤	24
18894 艾附暖宫丸	15	18931 平安饮	19	18974 平肺汤	24
18895 艾附暖宫丸	15	18932 平安饼	20	18975 平肺汤	24
18896 艾煎茯苓散	15	18933 平安散	20	18976 平肺饮	25
芫		18934 平安散	20	18977 平肺饮	25
18897 芫黄散	16	18935 平安散	20	18978 平肺散	25
节		18936 平安散	20	18979 平肺散	25
18898 节金饮子	16	18937 平安散	20	18980 平肺散	25
18899 节斋化痰丸	16	18938 平安散	20	18981 平肺散	25
平		18939 平安散	20	18982 平肺散	25
18900 平木汤	16	18940 平安散	20	18983 平肺散	25
18901 平中饮	16	18941 平安散	20	18984 平泻汤	25
		18942 平安散	21	18985 平治汤	25
		18943 平阳汤	21	18986 平胃丸	25
		18944 平阳汤	21	18987 平胃丸	26

18988 平胃丸	26	19031 平疳散	31	19074 平补正心丹	36
18989 平胃丸	26	19032 平崇散	31	19075 平补仙术丸	36
18990 平胃丸	26	19033 平惊丸	31	19076 平补地榆汤	36
18991 平胃丸	26	19034 平胃丹	31	19077 平补苁蓉煎	37
18992 平胃丸	26	19035 平胃散	32	19078 平补固胎汤	37
18993 平胃丸	26	19036 平喘丸	32	19079 平补固真丹	37
18994 平胃丸	27	19037 平喘片	32	19080 平补枳术丸	37
18995 平胃丸	27	19038 平喘宁	32	19081 平补理癆煎	37
18996 平胃丸	27	19039 平喘汤	32	19082 平补草薢丸	37
18997 平胃丸	27	19040 平痢散	32	19083 平补虚弱汤	37
18998 平胃丹	27	19041 平解汤	32	19084 平补鹿茸丸	38
18999 平胃汤	27	19042 平瘀散	33	19085 平补镇心丸	38
19000 平胃汤	27	19043 平嗽丸	33	19086 平补镇心丹	38
19001 平胃汤	27	19044 平蛔丸	33	19087 平补镇心丹	38
19002 平胃汤	28	19045 平肝饮子	33	19088 平补镇心丹	38
19003 平胃散	28	19046 平和饮子	33	19089 平补镇心丹	38
19004 平胃散	28	19047 平胡饮子	33	19090 平肺宁嗽饮	39
19005 平胃散	29	19048 平胃煮散	33	19091 平肺宁嗽散	39
19006 平胃散	29	19049 平喘仙丹	33	19092 平肺绿云散	39
19007 平胃散	29	19050 平肌追脓散	34	19093 平疟养脾丸	39
19008 平胃散	29	19051 平安如意丹	34	19094 平疟养脾丸	39
19009 平胃散	29	19052 平阳清里汤	34	19095 平疟第一方	39
19010 平胃散	29	19053 平时擦牙散	34	19096 平疟第二方	39
19011 平胃散	29	19054 平肝上清丸	34	19097 平疟第三方	39
19012 平胃散	29	19055 平肝止血汤	34	19098 平胃二陈汤	40
19013 平胃散	29	19056 平肝止血散	34	19099 平胃二陈汤	40
19014 平胃散	29	19057 平肝止痢汤	34	19100 平胃五苓散	40
19015 平胃散	30	19058 平肝补脾汤	34	19101 平胃分消饮	40
19016 平胃散	30	19059 平肝泻火汤	34	19102 平胃六一散	40
19017 平胃散	30	19060 平肝顺气丸	35	19103 平胃正气丸	40
19018 平胃散	30	19061 平肝养肺汤	35	19104 平胃四苓散	40
19019 平胃散	30	19062 平肝消毒饮	35	19105 平胃生化汤	40
19020 平胃散	30	19063 平肝消痼汤	35	19106 平胃生漆丸	40
19021 平胃散	30	19064 平肝流气饮	35	19107 平胃加消汤	40
19022 平胃散	30	19065 平肝救血汤	35	19108 平胃发表汤	40
19023 平胃散	30	19066 平肝清火汤	35	19109 平胃地榆汤	41
19024 平胃膏	30	19067 平肝清胃丸	35	19110 平胃地榆汤	41
19025 平顺散	30	19068 平肝清脑汤	36	19111 平胃快斑汤	41
19026 平疮散	30	19069 平肝舒络丹	36	19112 平胃快斑散	41
19027 平怒汤	31	19070 平肝舒筋汤	36	19113 平胃败毒散	41
19028 平怒散	31	19071 平肝潜阳汤	36	19114 平胃枳术丸	41
19029 平热汤	31	19072 平肝潜阳汤	36	19115 平胃香连丸	41
19030 平脏丸	31	19073 平补心脾汤	36	19116 平胃保和汤	41

19117 平胃保和汤	41	19156 灭瘢膏	45	19195 正气汤	51
19118 平胃保和散	41	19157 灭瘢救苦散	46	19196 正气汤	51
19119 平胃前胡汤	41			19197 正气汤	51
19120 平胃调中散	42	丙		19198 正气汤	51
19121 平胃敛阴汤	42	19158 丙丁丸	46	19199 正气汤	51
19122 平胃渗湿汤	42	19159 丙丁散	46	19200 正气饮	51
19123 平胃滋肾汤	42	19160 丙丁膏	46	19201 正气散	51
19124 平胃蒜肚丸	42	19161 丙字化毒丸	46	19202 正气散	51
19125 平顺清解饮	42	19162 丙种宝月丹	46	19203 正气散	52
19126 平险如意散	42			19204 正气散	52
19127 平惊通圣散	42	正		19205 正气散	52
19128 平喘固本汤	42	19163 正一丹	46	19206 正气散	52
19129 平喘祛寒散	43	19164 正元丹	46	19207 正气散	52
19130 平安如意灵丹	43	19165 正元丹	47	19208 正气散	52
19131 平肌贴療膏青	43	19166 正元丹	47	19209 正气散	52
19132 平补干地黄丸	43	19167 正元丹	47	19210 正气散	53
19133 平补枸杞子丸	43	19168 正元丹	47	19211 正气散	53
19134 平肝开郁止血汤	43	19169 正元丹	47	19212 正气散	53
19135 平肝顺气保中丸	43	19170 正元汤	47	19213 正气散	53
19136 平肝清热代茶饮	43	19171 正元汤	47	19214 正气散	53
19137 平补熟干地黄丸	43	19172 正元汤	47	19215 正气散	53
19138 平胃加桂枝生姜		19173 正元汤	47	19216 正气散	53
汤	43	19174 正元饮	47	19217 正气散	53
19139 平胃煮散加青橘皮		19175 正元饮	48	19218 正气散	53
方	44	19176 正元散	48	19219 正气散	53
灭		19177 正元散	48	19220 正心丸	53
19140 灭火汤	44	19178 正元散	48	19221 正心汤	54
19141 灭邪汤	44	19179 正元散	48	19222 正心汤	54
19142 灭虫汤	44	19180 正元散	48	19223 正心汤	54
19143 灭毒丹	44	19181 正中丸	49	19224 正本丸	54
19144 灭疥膏	44	19182 正气丸	49	19225 正舌汤	54
19145 灭痕散	45	19183 正气丸	49	19226 正舌散	54
19146 灭痕膏	45	19184 正气丸	49	19227 正舌散	54
19147 灭痕膏	45	19185 正气丸	49	19228 正舌散	54
19148 灭痕膏	45	19186 正气丸	49	19229 正舌膏	54
19149 灭瘢丹	45	19187 正气丸	49	19230 正阳丸	54
19150 灭瘢散	45	19188 正气丹	50	19231 正阳丸	55
19151 灭瘢散	45	19189 正气丹	50	19232 正阳丸	55
19152 灭瘢散	45	19190 正气丹	50	19233 正阳丸	55
19153 灭瘢散	45	19191 正气汤	50	19234 正阳丹	55
19154 灭瘢膏	45	19192 正气汤	50	19235 正阳丹	55
19155 灭瘢膏	45	19193 正气汤	50	19236 正阳丹	55
		19194 正气汤	50	19237 正阳丹	55

19238 正阳丹	55	19281 正气人参膏	60	19322 玉龙丹	66
19239 正阳丹	55	19282 正气三和散	60	19323 玉龙丹	66
19240 正阳丹	55	19283 正气天香汤	61	19324 玉龙汤	66
19241 正阳丹	55	19284 正气天香散	61	19325 玉龙散	66
19242 正阳汤	56	19285 正气天香散	61	19326 玉龙散	66
19243 正阳汤	56	19286 正气太平丸	61	19327 玉龙散	66
19244 正阳散	56	19287 正气回生汤	61	19328 玉龙膏	66
19245 正阳散	56	19288 正气快斑汤	61	19329 玉龙膏	66
19246 正阳散	56	19289 正气补虚汤	62	19330 玉龙膏	66
19247 正阳散	56	19290 正气和解汤	62	19331 玉龙膏	67
19248 正金丹	56	19291 正气活命散	62	19332 玉龙膏	67
19249 正治汤	56	19292 正气宽中散	62	19333 玉龙膏	67
19250 正诚丹	56	19293 正气调胃散	62	19334 玉龙膏	67
19251 正经汤	57	19294 正气趋痛散	62	19335 玉龙膏	67
19252 正经汤	57	19295 正气温中汤	62	19336 玉龙膏	67
19253 正胃汤	57	19296 正阳茴香丸	62	19337 玉仙散	67
19254 正胃汤	57	19297 正诚露珠丹	62	19338 玉仙散	68
19255 正胃散	57	19298 正经四物汤	63	19339 玉仙散	68
19256 正胃散	57	19299 正经养血汤	63	19340 玉兰丸	68
19257 正胃散	57	19300 正骨顺气汤	63	19341 玉芝丸	68
19258 正骨散	57	19301 正骨紫金丸	63	19342 玉芝丹	68
19259 正骨散	57	19302 正骨紫金丹	63	19343 玉芝饮	69
19260 正骨散	58	19303 正料生肌散	63	19344 玉芝散	69
19261 正真丹	58	19304 正料治中汤	63	19345 玉芝散	69
19262 正真汤	58	19305 正料消风散	63	19346 玉灰散	69
19263 正笑丹	58	19306 正元华澄茄汤	63	19347 玉贞散	69
19264 正容汤	58			19348 玉尘散	69
19265 正容散	58			19349 玉尘散	69
19266 正容膏	58			19350 玉尘散	69
19267 正腕散	58			19351 玉竹汤	69
19268 正液丹	58			19352 玉竹粥	69
19269 正脾丸	59			19353 玉竹膏	70
19270 正脾散	59			19354 玉华丸	70
19271 正脾散	59			19355 玉华丹	70
19272 正禅方	59			19356 玉华丹	70
19273 正颜丹	59			19357 玉华散	70
19274 正翻散	59			19358 玉华煎	70
19275 正元煮散	59			19359 玉合丹	70
19276 正气煮散	59			19360 玉肌丹	71
19277 正凤髓丹	60			19361 玉肌散	71
19278 正骨浸药	60			19362 玉肌散	71
19279 正柴胡饮	60			19363 玉池汤	71
19280 正铁箍散	60			19364 玉池散	71

玉

19307 玉饮	63	19322 玉龙丹	66
19308 玉女英	63	19323 玉龙丹	66
19309 玉女英	64	19324 玉龙汤	66
19310 玉女砂	64	19325 玉龙散	66
19311 玉女粉	64	19326 玉龙散	66
19312 玉女散	64	19327 玉龙散	66
19313 玉女散	64	19328 玉龙膏	66
19314 玉女煎	64	19329 玉龙膏	66
19315 玉井散	65	19330 玉龙膏	66
19316 玉仁膏	65	19331 玉龙膏	67
19317 玉正散	65	19332 玉龙膏	67
19318 玉龙丸	65	19333 玉龙膏	67
19319 玉龙丸	65	19334 玉龙膏	67
19320 玉龙丸	65	19335 玉龙膏	67
19321 玉龙丸	66	19336 玉龙膏	67

19365 玉池散	71	19408 玉珍散	76	19451 玉真散	81
19366 玉池散	71	19409 玉珍散	76	19452 玉壶丸	81
19367 玉池散	71	19410 玉柱杖	76	19453 玉壶丸	81
19368 玉池散	71	19411 玉柱散	76	19454 玉壶丸	81
19369 玉关丸	72	19412 玉柱膏	76	19455 玉壶丸	82
19370 玉关丸	72	19413 玉树油	76	19456 玉壶丸	82
19371 玉关丸	72	19414 玉药丹	77	19457 玉壶丸	82
19372 玉红散	72	19415 玉带膏	77	19458 玉壶丸	82
19373 玉红散	72	19416 玉带膏	77	19459 玉壶丸	82
19374 玉红散	72	19417 玉带膏	77	19460 玉壶丸	82
19375 玉红膏	72	19418 玉钥匙	77	19461 玉壶丸	83
19376 玉红膏	72	19419 玉钥匙	77	19462 玉壶丸	83
19377 玉红膏	72	19420 玉钥匙	77	19463 玉壶丸	83
19378 玉红膏	72	19421 玉泉丸	77	19464 玉壶丹	83
19379 玉红膏	73	19422 玉泉丸	77	19465 玉壶丹	83
19380 玉杖丸	73	19423 玉泉散	78	19466 玉壶丹	83
19381 玉连丸	73	19424 玉泉散	78	19467 玉壶丹	83
19382 玉连环	73	19425 玉泉散	78	19468 玉壶冰	83
19383 玉肠散	73	19426 玉泉散	78	19469 玉壶饮	83
19384 玉灵丹	73	19427 玉泉煎	78	19470 玉壶散	83
19385 玉灵膏	74	19428 玉饼子	78	19471 玉振丸	83
19386 玉灵膏	74	19429 玉饼子	78	19472 玉脂散	84
19387 玉阿散	74	19430 玉饼子	78	19473 玉脂膏	84
19388 玉环丸	74	19431 玉饼子	78	19474 玉烛汤	84
19389 玉环丹	74	19432 玉饼子	78	19475 玉烛汤	84
19390 玉环煎	74	19433 玉饼子	78	19476 玉烛散	84
19391 玉枝散	74	19434 玉津丸	79	19477 玉烛散	84
19392 玉枢丹	74	19435 玉屏散	79	19478 玉烛散	85
19393 玉枢丹	74	19436 玉珠丸	79	19479 玉烛散	85
19394 玉枢丹	74	19437 玉珠散	79	19480 玉烛散	85
19395 玉枢丹	74	19438 玉真丸	79	19481 玉浮丸	85
19396 玉枢丹	75	19439 玉真丸	79	19482 玉浮丸	85
19397 玉枢丹	75	19440 玉真丸	79	19483 玉粉丸	85
19398 玉枢丹	75	19441 玉真丹	80	19484 玉粉丸	85
19399 玉枢丹	75	19442 玉真丹	80	19485 玉粉丸	86
19400 玉矾汤	75	19443 玉真丹	80	19486 玉粉丸	86
19401 玉抱肚	75	19444 玉真汤	80	19487 玉粉丸	86
19402 玉抱肚	75	19445 玉真散	80	19488 玉粉丸	86
19403 玉抱肚	75	19446 玉真散	80	19489 玉粉丸	86
19404 玉乳丹	76	19447 玉真散	80	19490 玉粉丸	86
19405 玉乳散	76	19448 玉真散	80	19491 玉粉丹	86
19406 玉命丹	76	19449 玉真散	80	19492 玉粉丹	86
19407 玉兔散	76	19450 玉真散	81	19493 玉粉丹	86

19494 玉粉丹	86	19537 玉屑丸	91	19580 玉液散	96
19495 玉粉丹	87	19538 玉屑丸	91	19581 玉液散	97
19496 玉粉丹	87	19539 玉屑饭	91	19582 玉液煎	97
19497 玉粉散	87	19540 玉屑散	91	19583 玉液膏	97
19498 玉粉散	87	19541 玉屑散	91	19584 玉液膏	97
19499 玉粉散	87	19542 玉屑散	92	19585 玉液膏	97
19500 玉粉散	87	19543 玉屑散	92	19586 玉散子	97
19501 玉粉散	87	19544 玉屑散	92	19587 玉锁丸	97
19502 玉粉散	87	19545 玉屑散	92	19588 玉锁丹	97
19503 玉粉散	87	19546 玉屑膏	92	19589 玉锁丹	97
19504 玉粉散	88	19547 玉屑膏	92	19590 玉锁丹	98
19505 玉粉散	88	19548 玉屑膏	92	19591 玉锁丹	98
19506 玉粉散	88	19549 玉屑膏	92	19592 玉锁匙	98
19507 玉粉散	88	19550 玉绣球	92	19593 玉锁匙	98
19508 玉粉散	88	19551 玉绣球	92	19594 玉锁匙	98
19509 玉粉散	88	19552 玉黄膏	92	19595 玉锁匙	98
19510 玉粉散	88	19553 玉雪丹	93	19596 玉锁匙	98
19511 玉粉散	88	19554 玉雪散	93	19597 玉锁匙	98
19512 玉粉散	88	19555 玉匿丸	93	19598 玉锁散	98
19513 玉粉膏	88	19556 玉堂丸	93	19599 玉筵散	98
19514 玉粉錠	88	19557 玉匙散	94	19600 玉错散	98
19515 玉容丸	88	19558 玉盘散	94	19601 玉胤散	99
19516 玉容丸	89	19559 玉盘散	94	19602 玉蟬散	99
19517 玉容丸	89	19560 玉液丸	94	19603 玉簪消	99
19518 玉容粉	89	19561 玉液丸	94	19604 玉簪散	99
19519 玉容粉	89	19562 玉液丸	94	19605 玉簪煎	99
19520 玉容散	89	19563 玉液丸	94	19606 玉蕊丸	99
19521 玉容散	89	19564 玉液丸	94	19607 玉蕊丸	99
19522 玉容散	89	19565 玉液丸	94	19608 玉蕊丸	99
19523 玉容散	89	19566 玉液丹	94	19609 玉蕊丸	100
19524 玉容散	89	19567 玉液丹	95	19610 玉蕊丹	100
19525 玉容散	89	19568 玉液丹	95	19611 玉蕊散	100
19526 玉容散	90	19569 玉液丹	95	19612 玉颜膏	100
19527 玉容散	90	19570 玉液汤	95	19613 玉糊膏	100
19528 玉容散	90	19571 玉液汤	95	19614 玉燕膏	100
19529 玉容散	90	19572 玉液汤	95	19615 玉霜丸	100
19530 玉容散	90	19573 玉液汤	95	19616 玉霜丸	100
19531 玉容膏	90	19574 玉液汤	96	19617 玉霜丸	101
19532 玉容膏	90	19575 玉液饮	96	19618 玉霜丸	101
19533 玉容膏	91	19576 玉液散	96	19619 玉霜丸	101
19534 玉浆散	91	19577 玉液散	96	19620 玉霜丹	101
19535 玉浆散	91	19578 玉液散	96	19621 玉霜散	101
19536 玉浆散	91	19579 玉液散	96	19622 玉霜膏	101

19623 玉螺丸	101	19666 玉桂杖丸	107	19709 玉露养肺丸	114
19624 玉蟾散	101	19667 玉粉錠儿	107	19710 玉露养肺丸	115
19625 玉裸肚	102	19668 玉容肥皂	107	19711 玉露通真丸	115
19626 玉露丸	102	19669 玉容肥皂	107	19712 玉髓定喘丸	115
19627 玉露丸	102	19670 玉容香粉	107	19713 玉竹麦门冬汤	115
19628 玉露丸	102	19671 玉屑面脂	107	19714 玉女长春不老丹	115
19629 玉露汤	102	19672 玉屑面膏	107	19715 玉女煎去牛膝熟地	
19630 玉露饮	102	19673 玉绣球丹	108	加细生地玄参方	115
19631 玉露饮	102	19674 玉液金丹	108		
19632 玉露饮	102	19675 玉液金丹	109		
19633 玉露饮	102	19676 玉液金丹	109		
19634 玉露饮	102	19677 玉楂冲剂	109		
19635 玉露饮	102	19678 玉女飞花散	109		
19636 玉露酒	102	19679 玉开金钥匙	109		
19637 玉露散	103	19680 玉石清胃汤	110		
19638 玉露散	103	19681 玉龙软金丹	110		
19639 玉露散	103	19682 玉芝徐老丸	110		
19640 玉露散	103	19683 玉肌还少散	110		
19641 玉露散	103	19684 玉红夹纸膏	110		
19642 玉露散	103	19685 玉环来笑丹	110		
19643 玉露散	103	19686 玉枢正气丹	111		
19644 玉露散	103	19687 玉面桃花粉	111		
19645 玉露散	103	19688 玉钥启荣丸	111		
19646 玉露散	104	19689 玉容西施散	111		
19647 玉露散	104	19690 玉容西施膏	111		
19648 玉露膏	104	19691 玉容肥皂丸	111		
19649 玉露膏	104	19692 玉屑无忧散	111		
19650 玉露霜	104	19693 玉屑无忧散	111		
19651 玉髓丹	104	19694 玉屑妙灵散	112		
19652 玉髓膏	104	19695 玉屑妙灵散	112		
19653 玉竹饮子	104	19696 玉屑润金丸	112		
19654 玉华白丹	104	19697 玉雪救苦丹	112		
19655 玉华白丹	105	19698 玉匙开关散	113		
19656 玉米粉粥	105	19699 玉液上清丸	113		
19657 玉柱杖丸	105	19700 玉液化痰丸	113		
19658 玉柱杖散	105	19701 玉液至宝丹	113		
19659 玉柱杖散	105	19702 玉液春膏饮	113		
19660 玉柱杖散	105	19703 玉锁九真丹	114		
19661 玉带仙膏	105	19704 玉锁固真丹	114		
19662 玉钥匙散	105	19705 玉蕊托里散	114		
19663 玉屏风散	106	19706 玉翳泻肝散	114		
19664 玉屏风散	107	19707 玉蟾生肌散	114		
19665 玉屏风散	107	19708 玉蟾利风丹	114		
				古	
				19716 古瓦汤	116
				19717 古瓦汤	116
				19718 古月粉	116
				19719 古圣散	116
				19720 古拜散	116
				19721 古墨霜	116
				19722 古钱接骨方	116
				19723 古庵心肾丸	116
				19724 古卿古散	117
				去	
				19725 去风丹	117
				19726 去风散	117
				19727 去斗丸	117
				19728 去水膏	117
				19729 去血汤	117
				19730 去杖汤	117
				19731 去来汤	117
				19732 去妒丸	118
				19733 去苦散	118
				19734 去毒丸	118
				19735 去毒丸	118
				19736 去毒丹	118
				19737 去毒散	118
				19738 去毒散	118
				19739 去毒散	118
				19740 去烂丹	119
				19741 去恶散	119
				19742 去热散	119
				19743 去铃丸	119
				19744 去铃丸	119
				19745 去斑膏	119
				19746 去解丹	119

19747 去瘀饮	119
19748 去膜丹	119
19749 去腐丹	120
19750 去腐丹	120
19751 去腐散	120
19752 去腐散	120
19753 去腐散	120
19754 去薪汤	120
19755 去翳散	120
19756 去翳散	120
19757 去翳散	120
19758 去翳散	120
19759 去三虫丸	120
19760 去三虫方	120
19761 去老膜丹	121
19762 去星翳丸	121
19763 去腐灵药	121
19764 去翳膜丸	121
19765 去翳膜丹	121
19766 去术平胃散	122
19767 去邪如扫汤	122
19768 去刺全目丹	122
19769 去毒化虫汤	122
19770 去毒玫瑰丸	122
19771 去桂五苓散	122
19772 去恶平胃散	122
19773 去恶清心汤	122
19774 去恶清肺汤	122
19775 去积阿胶丸	122
19776 去湿化痰汤	122
19777 去湿生肌散	122
19778 去湿健脾汤	123
19779 去湿清热散	123
19780 去湿散邪汤	123
19781 去腐万金丹	123
19782 去腐白玉膏	123
19783 去腐定痛生肌散	123

未

19784 未药	124
19785 未央丸	124
19786 未沅麻散	124

术

19787 术汤	124
19788 术酒	124
19789 术酒	124
19790 术酒	124
19791 术散	124
19792 术酥	124
19793 术煎	125
19794 术膏	125
19795 术曲丸	125
19796 术米汤	125
19797 术苓汤	125
19798 术连丸	125
19799 术连丸	125
19800 术附丸	125
19801 术附丸	125
19802 术附丸	126
19803 术附汤	126
19804 术附汤	126
19805 术附汤	126
19806 术附汤	126
19807 术附汤	126
19808 术附汤	127
19809 术附汤	127
19810 术附汤	127
19811 术附汤	127
19812 术附汤	127
19813 术附汤	127
19814 术附汤	127
19815 术附汤	127
19816 术附汤	127
19817 术附汤	128
19818 术附汤	128
19819 术附汤	128
19820 术附汤	128
19821 术附汤	128
19822 术附膏	128
19823 术苓汤	128
19824 术苓汤	128
19825 术苓汤	128
19826 术苓汤	128
19827 术苓汤	128

19828 术苓汤	129
19829 术苓散	129
19830 术砂散	129
19831 术香散	129
19832 术桂汤	129
19833 术桂汤	129
19834 术桂汤	129
19835 术桂散	129
19836 术败汤	129
19837 术膏酒	129
19838 术薏面	130
19839 术薏散	130
19840 术汤浴方	130
19841 术归桂草汤	130
19842 术附防风汤	130
19843 术附姜苓汤	130
19844 术附理中丸	130
19845 术苓加桂汤	130
19846 术苓加桂汤	131
19847 术苓固脾饮	131
19848 术苓调中汤	131
19849 术苓调脾散	131
19850 术香启中汤	131
19851 术桂干姜汤	131
19852 术桂防稀汤	131
19853 术桂豆苓汤	131
19854 术桂草玄丹	131
19855 术桂加泽泻汤	131
19856 术茯车前子汤	132

本

19857 本药	132
19858 本未丸	132

世

19859 世宝丸	132
19860 世传地黄丸	133
19861 世传苍术散	133
19862 世传茯苓丸	133
19863 世传通关散	133
19864 世秘资生丹	133
19865 世传方地黄丸	133
19866 世传白花蛇酒	133

19867	世传密陀僧散	133	19908	甘草丸	138	19951	甘草汤	143
	甘		19909	甘草丸	138	19952	甘草汤	143
	甘		19910	甘草丸	138	19953	甘草汤	143
19868	甘醴	134	19911	甘草丸	138	19954	甘草汤	144
19869	甘石散	134	19912	甘草水	138	19955	甘草汤	144
19870	甘石散	134	19913	甘草汤	138	19956	甘草汤	144
19871	甘石散	134	19914	甘草汤	139	19957	甘草汤	144
19872	甘石膏	134	19915	甘草汤	139	19958	甘草汤	144
19873	甘白丹	134	19916	甘草汤	139	19959	甘草汤	144
19874	甘瓜散	134	19917	甘草汤	139	19960	甘草汤	144
19875	甘芎散	134	19918	甘草汤	139	19961	甘草汤	144
19876	甘竹汤	134	19919	甘草汤	139	19962	甘草汤	144
19877	甘麦散	134	19920	甘草汤	139	19963	甘草汤	144
19878	甘豆汤	134	19921	甘草汤	139	19964	甘草汤	145
19879	甘豆汤	135	19922	甘草汤	140	19965	甘草汤	145
19880	甘豆汤	135	19923	甘草汤	140	19966	甘草汤	145
19881	甘豆汤	135	19924	甘草汤	140	19967	甘草汤	145
19882	甘豆汤	135	19925	甘草汤	140	19968	甘草汤	145
19883	甘豆散	135	19926	甘草汤	140	19969	甘草汤	145
19884	甘连汤	135	19927	甘草汤	141	19970	甘草汤	145
19885	甘连汤	135	19928	甘草汤	141	19971	甘草汤	145
19886	甘连散	135	19929	甘草汤	141	19972	甘草汤	145
19887	甘松丸	135	19930	甘草汤	141	19973	甘草汤	145
19888	甘松汤	135	19931	甘草汤	141	19974	甘草汤	145
19889	甘松散	135	19932	甘草汤	141	19975	甘草汤	145
19890	甘松粥	136	19933	甘草汤	141	19976	甘草汤	145
19891	甘松膏	136	19934	甘草汤	141	19977	甘草汤	145
19892	甘矾散	136	19935	甘草汤	141	19978	甘草汤	145
19893	甘乳散	136	19936	甘草汤	141	19979	甘草汤	145
19894	甘乳膏	136	19937	甘草汤	141	19980	甘草饮	145
19895	甘泽饮	136	19938	甘草汤	142	19981	甘草饮	146
19896	甘草丸	136	19939	甘草汤	142	19982	甘草饮	146
19897	甘草丸	136	19940	甘草汤	142	19983	甘草饮	146
19898	甘草丸	136	19941	甘草汤	142	19984	甘草饮	146
19899	甘草丸	136	19942	甘草汤	142	19985	甘草饮	146
19900	甘草丸	137	19943	甘草汤	142	19986	甘草饮	146
19901	甘草丸	137	19944	甘草汤	142	19987	甘草饮	146
19902	甘草丸	137	19945	甘草汤	142	19988	甘草饮	146
19903	甘草丸	137	19946	甘草汤	143	19989	甘草饮	146
19904	甘草丸	137	19947	甘草汤	143	19990	甘草饮	147
19905	甘草丸	137	19948	甘草汤	143	19991	甘草饮	147
19906	甘草丸	137	19949	甘草汤	143	19992	甘草法	147
19907	甘草丸	137	19950	甘草汤	143	19993	甘草油	147

19994 甘草酒	147	20037 甘胆丸	151	20080 甘菊汤	155
19995 甘草酒	147	20038 甘胆汤	151	20081 甘菊汤	155
19996 甘草散	147	20039 甘蚕豆	151	20082 甘菊散	155
19997 甘草散	147	20040 甘桂汤	152	20083 甘菊散	155
19998 甘草散	147	20041 甘桂汤	152	20084 甘菊散	155
19999 甘草散	147	20042 甘桔汤	152	20085 甘菊散	156
20000 甘草散	148	20043 甘桔汤	152	20086 甘菊膏	156
20001 甘草散	148	20044 甘桔汤	152	20087 甘黄饮	156
20002 甘草散	148	20045 甘桔汤	152	20088 甘甜丸	156
20003 甘草散	148	20046 甘桔汤	152	20089 甘葱煎	156
20004 甘草散	148	20047 甘桔汤	152	20090 甘葶散	156
20005 甘草散	148	20048 甘桔汤	152	20091 甘湿散	156
20006 甘草散	148	20049 甘桔汤	152	20092 甘遂丸	156
20007 甘草散	148	20050 甘桔汤	152	20093 甘遂丸	157
20008 甘草散	148	20051 甘桔汤	152	20094 甘遂丸	157
20009 甘草散	149	20052 甘桔汤	153	20095 甘遂丸	157
20010 甘草散	149	20053 甘桔汤	153	20096 甘遂丸	157
20011 甘草散	149	20054 甘桔汤	153	20097 甘遂丸	157
20012 甘草散	149	20055 甘桔汤	153	20098 甘遂丸	157
20013 甘草散	149	20056 甘桔汤	153	20099 甘遂丸	157
20014 甘草散	149	20057 甘桔汤	153	20100 甘遂丸	158
20015 甘草散	149	20058 甘桔汤	153	20101 甘遂丸	158
20016 甘草散	149	20059 甘桔汤	153	20102 甘遂丸	158
20017 甘草散	149	20060 甘桔汤	153	20103 甘遂丸	158
20018 甘草散	150	20061 甘桔汤	153	20104 甘遂丸	158
20019 甘草散	150	20062 甘桔汤	154	20105 甘遂丸	158
20020 甘草散	150	20063 甘桔汤	154	20106 甘遂丸	158
20021 甘草散	150	20064 甘桔汤	154	20107 甘遂丸	158
20022 甘草散	150	20065 甘桔汤	154	20108 甘遂方	158
20023 甘草散	150	20066 甘桔汤	154	20109 甘遂汤	158
20024 甘草散	150	20067 甘桔汤	154	20110 甘遂汤	158
20025 甘草散	150	20068 甘桔汤	154	20111 甘遂汤	158
20026 甘草煎	150	20069 甘桔散	154	20112 甘遂汤	159
20027 甘草膏	150	20070 甘遂散	154	20113 甘遂饼	159
20028 甘草膏	150	20071 甘粉散	154	20114 甘遂散	159
20029 甘草膏	150	20072 甘理散	154	20115 甘遂散	159
20030 甘草膏	151	20073 甘菊丸	154	20116 甘遂散	159
20031 甘草膏	151	20074 甘菊丸	155	20117 甘遂散	159
20032 甘草膏	151	20075 甘菊汤	155	20118 甘遂散	159
20033 甘草膏	151	20076 甘菊汤	155	20119 甘遂散	160
20034 甘草蜜	151	20077 甘菊汤	155	20120 甘遂散	160
20035 甘枳汤	151	20078 甘菊汤	155	20121 甘遂散	160
20036 甘柏散	151	20079 甘菊汤	155	20122 甘遂散	160

20123 甘遂散	160	20166 甘露散	165	20209 甘菊花散	170
20124 甘遂散	160	20167 甘露散	165	20210 甘菊花散	170
20125 甘遂散	160	20168 甘露散	165	20211 甘菊花散	170
20126 甘遂散	160	20169 甘露散	165	20212 甘菊花散	170
20127 甘遂散	160	20170 甘露散	165	20213 甘菊花散	170
20128 甘遂散	160	20171 甘露散	165	20214 甘菊花散	170
20129 甘遂汤	160	20172 甘露散	165	20215 甘菊花散	170
20130 甘硼水	161	20173 甘露散	165	20216 甘露饮子	170
20131 甘蔗粥	161	20174 甘露散	165	20217 甘露饮子	172
20132 甘薯梗	161	20175 甘露膏	166	20218 甘露神膏	172
20133 甘鳖散	161	20176 甘露膏	166	20219 甘风丹荆汤	172
20134 甘露丸	161	20177 甘氏乌膏	166	20220 甘芍附子汤	172
20135 甘露丸	162	20178 甘竹沥汤	166	20221 甘麦大枣汤	172
20136 甘露丸	162	20179 甘竹茹汤	166	20222 甘豆竹叶汤	172
20137 甘露丸	162	20180 甘竹茹汤	166	20223 甘连大黄丸	172
20138 甘露丸	162	20181 甘李根汤	166	20224 甘羌附麻饮	172
20139 甘露丹	162	20182 甘李根散	166	20225 甘草干姜汤	172
20140 甘露汤	162	20183 甘松香丸	167	20226 甘草干姜汤	173
20141 甘露汤	162	20184 甘松香散	167	20227 甘草干姜汤	174
20142 甘露汤	162	20185 甘乳药捻	167	20228 甘草大豆汤	174
20143 甘露汤	163	20186 甘草豆方	167	20229 甘草大枣汤	174
20144 甘露汤	163	20187 甘草饮子	167	20230 甘草乌梅丸	174
20145 甘露饮	163	20188 甘草饮子	167	20231 甘草石膏汤	174
20146 甘露饮	163	20189 甘草敷方	167	20232 甘草归地汤	174
20147 甘露饮	163	20190 甘草摩膏	167	20233 甘草归蜡膏	174
20148 甘露饮	163	20191 甘菊花丸	167	20234 甘草芍药汤	174
20149 甘露饮	163	20192 甘菊花丸	168	20235 甘草芍药汤	174
20150 甘露饮	163	20193 甘菊花丸	168	20236 甘草芍药汤	174
20151 甘露饮	163	20194 甘菊花丸	168	20237 甘草芍药汤	174
20152 甘露饮	163	20195 甘菊花汤	168	20238 甘草防风汤	175
20153 甘露饮	163	20196 甘菊花汤	168	20239 甘草附子汤	175
20154 甘露饮	163	20197 甘菊花汤	168	20240 甘草附子汤	176
20155 甘露饮	163	20198 甘菊花汤	168	20241 甘草附子汤	176
20156 甘露饮	164	20199 甘菊花散	168	20242 甘草青盐丸	176
20157 甘露饮	164	20200 甘菊花散	169	20243 甘草泻心汤	176
20158 甘露饮	164	20201 甘菊花散	169	20244 甘草泻心汤	177
20159 甘露饮	164	20202 甘菊花散	169	20245 甘草泻心汤	178
20160 甘露饮	164	20203 甘菊花散	169	20246 甘草茵陈汤	178
20161 甘露饮	164	20204 甘菊花散	169	20247 甘草茱萸丸	178
20162 甘露茶	164	20205 甘菊花散	169	20248 甘草炮姜汤	178
20163 甘露酒	164	20206 甘菊花散	170	20249 甘草桔梗汤	178
20164 甘露散	164	20207 甘菊花散	170	20250 甘草涂敷方	178
20165 甘露散	165	20208 甘菊花散	170	20251 甘草粉蜜汤	178

20252	甘草黄芩汤	179	20295	甘遂牵牛子丸	185	20327	石三	191
20253	甘草莒实汤	179	20296	甘草干姜人参汤	...	185	20328	石五	191
20254	甘草麻桂汤	179	20297	甘草小麦大枣汤	...	185	20329	石六	191
20255	甘草麻黄汤	179	20298	甘草知母鳖甲丸	...	186	20330	石四	191
20256	甘草黑豆汤	180	20299	甘草桔梗升麻汤	...	186	20331	石散	191
20257	甘草滑石散	180	20300	甘草桔梗射干汤	...	186	20332	石干散	191
20258	甘草鼠粘汤	180	20301	甘桔加阿胶紫菀汤	186	20333	石干散	191
20259	甘姜苓术汤	180					20334	石干散	191
20260	甘桔元射汤	180	20302	甘草干姜茯苓白术汤	186	20335	石子汤	192
20261	甘桔牛蒡汤	180					20336	石子汤	192
20262	甘桔牛蒡汤	180					20337	石韦丸	192
20263	甘桔升麻汤	180					20338	石韦丸	192
20264	甘桔化毒汤	180					20339	石韦丸	192
20265	甘桔化毒汤	180	20303	东山丸	187	20340	石韦丸	192
20266	甘桔玄参汤	180	20304	东风散	187	20341	石韦汤	192
20267	甘桔防风汤	180	20305	东风散	188	20342	石韦汤	192
20268	甘桔防风汤	180	20306	东瓜汤	188	20343	石韦汤	193
20269	甘桔泻肺汤	180	20307	东邻饮	188	20344	石韦汤	193
20270	甘桔柴芩汤	181	20308	东矾散	188	20345	石韦汤	193
20271	甘桔射干汤	181	20309	东封丹	188	20346	石韦汤	193
20272	甘桔消痰饮	181	20310	东流饮	188	20347	石韦汤	193
20273	甘桔清金散	181	20311	东膏散	188	20348	石韦汤	193
20274	甘桔散瘀汤	181	20312	东瓜皮散	188	20349	石韦汤	193
20275	甘桔黑豆汤	181	20313	东华玉髓	188	20350	石韦汤	193
20276	甘家松脂膏	181	20314	东方一号膏	188	20351	石韦汤	194
20277	甘菊花饮子	181	20315	东方甲乙丹	189	20352	石韦汤	194
20278	甘菊荆芥汤	181	20316	东华解毒膏	189	20353	石韦汤	194
20279	甘寒补气汤	182	20317	东实西虚泻南补北汤	189	20354	石韦汤	194
20280	甘遂半夏汤	182					20355	石韦汤	194
20281	甘遂破结散	183					20356	石韦汤	194
20282	甘遂通结汤	183					20357	石韦汤	194
20283	甘遂麻黄散	183					20358	石韦汤	194
20284	甘遂槟榔散	183					20359	石韦饮	194
20285	甘露内消丸	183					20360	石韦饮	194
20286	甘露回天汤	183					20361	石韦散	194
20287	甘露回天饮	183					20362	石韦散	194
20288	甘露消毒丸	183					20363	石韦散	195
20289	甘露消毒丹	183					20364	石韦散	195
20290	甘露解毒汤	184					20365	石韦散	195
20291	甘露解毒汤	184					20366	石韦散	195
20292	甘草梢黑豆汤	184					20367	石韦散	195
20293	甘桔加梔子汤	185					20368	石韦散	195
20294	甘菊花荆芥汤	185					20369	石韦散	195

20370 石韦散	196	20413 石杏膏	200	20456 石胆散	205
20371 石韦散	196	20414 石连散	200	20457 石胆散	205
20372 石韦散	196	20415 石辛散	200	20458 石胆散	206
20373 石韦散	196	20416 石英酒	200	20459 石胆散	206
20374 石韦散	196	20417 石英粉	200	20460 石胆散	206
20375 石韦散	196	20418 石英散	200	20461 石胆散	206
20376 石韦散	196	20419 石英煎	200	20462 石胆散	206
20377 石韦散	196	20420 石茎散	201	20463 石胆散	206
20378 石韦散	196	20421 石刻方	201	20464 石胆散	206
20379 石韦散	197	20422 石珍散	201	20465 石胆散	206
20380 石韦散	197	20423 石珍散	201	20466 石胆散	206
20381 石韦散	197	20424 石珍散	201	20467 石胆散	206
20382 石韦散	197	20425 石珍散	201	20468 石胆散	206
20383 石韦散	197	20426 石柏散	201	20469 石胆散	207
20384 石韦散	197	20427 石南丸	201	20470 石胆散	207
20385 石韦散	197	20428 石南丸	202	20471 石胆散	207
20386 石韦散	197	20429 石南丸	202	20472 石胆散	207
20387 石韦散	197	20430 石南丸	202	20473 石胆散	207
20388 石贝丸	197	20431 石南丸	202	20474 石胆煎	207
20389 石击散	197	20432 石南丸	202	20475 石胆膏	207
20390 石龙丹	198	20433 石南汤	202	20476 石胆膏	207
20391 石灰方	198	20434 石南汤	203	20477 石亭丸	207
20392 石灰汤	198	20435 石南汤	203	20478 石室丹	207
20393 石灰酒	198	20436 石南酒	203	20479 石室丹	207
20394 石灰酒	198	20437 石南酒	203	20480 石蚕散	207
20395 石灰散	198	20438 石南散	203	20481 石莲丸	208
20396 石灰散	198	20439 石南散	203	20482 石莲丸	208
20397 石灰散	198	20440 石南散	203	20483 石莲汤	208
20398 石灰散	199	20441 石南散	204	20484 石莲汤	208
20399 石灰散	199	20442 石南散	204	20485 石莲散	208
20400 石灰散	199	20443 石南散	204	20486 石莲散	208
20401 石灰散	199	20444 石草散	204	20487 石莲散	208
20402 石灰散	199	20445 石点膏	204	20488 石莲散	208
20403 石灰散	199	20446 石炭散	204	20489 石莲散	209
20404 石灰散	199	20447 石钟鸣	204	20490 石莲散	209
20405 石灰散	199	20448 石胆丸	204	20491 石莲散	209
20406 石灰散	199	20449 石胆丸	205	20492 石莲散	209
20407 石灰散	199	20450 石胆丸	205	20493 石盐膏	209
20408 石灰散	199	20451 石胆丸	205	20494 石夏丸	209
20409 石灰煎	200	20452 石胆丸	205	20495 石脂丸	209
20410 石灰膏	200	20453 石胆丸	205	20496 石脂丸	209
20411 石灰膏	200	20454 石胆丸	205	20497 石脂散	209
20412 石花汤	200	20455 石胆水	205	20498 石脂散	209

20499 石脂散	209	20542 石斛散	216	20585 石膏丸	222
20500 石脂膏	210	20543 石斛散	216	20586 石膏丸	222
20501 石粉散	210	20544 石斛散	216	20587 石膏丸	222
20502 石粉散	210	20545 石斛散	217	20588 石膏丸	222
20503 石黄散	210	20546 石斛散	217	20589 石膏丸	222
20504 石黄散	210	20547 石斛散	217	20590 石膏丸	222
20505 石斛丸	210	20548 石斛散	217	20591 石膏丸	223
20506 石斛丸	210	20549 石斛散	217	20592 石膏丸	223
20507 石斛丸	210	20550 石斛散	217	20593 石膏丸	223
20508 石斛丸	211	20551 石斛散	218	20594 石膏丸	223
20509 石斛丸	211	20552 石斛散	218	20595 石膏汤	223
20510 石斛丸	211	20553 石斛散	218	20596 石膏汤	223
20511 石斛丸	211	20554 石斛散	218	20597 石膏汤	224
20512 石斛丸	211	20555 石斛散	218	20598 石膏汤	224
20513 石斛丸	211	20556 石斛散	218	20599 石膏汤	224
20514 石斛丸	212	20557 石斛散	219	20600 石膏汤	224
20515 石斛丸	212	20558 石斛散	219	20601 石膏汤	224
20516 石斛丸	212	20559 石斛散	219	20602 石膏汤	224
20517 石斛丸	212	20560 石斛散	219	20603 石膏汤	224
20518 石斛丸	212	20561 石斛散	219	20604 石膏汤	224
20519 石斛丸	212	20562 石斛露	219	20605 石膏汤	225
20520 石斛丸	213	20563 石淋散	219	20606 石膏汤	225
20521 石斛丸	213	20564 石绿散	219	20607 石膏汤	225
20522 石斛丸	213	20565 石葛汤	220	20608 石膏汤	225
20523 石斛丸	213	20566 石粟膏	220	20609 石膏汤	225
20524 石斛丸	214	20567 石榴丸	220	20610 石膏汤	225
20525 石斛丸	214	20568 石榴汁	220	20611 石膏汤	225
20526 石斛丸	214	20569 石榴汤	220	20612 石膏汤	225
20527 石斛丸	214	20570 石榴汤	220	20613 石膏汤	226
20528 石斛丸	214	20571 石榴汤	220	20614 石膏汤	226
20529 石斛丸	214	20572 石榴浆	220	20615 石膏汤	226
20530 石斛丸	214	20573 石榴散	220	20616 石膏汤	226
20531 石斛汤	214	20574 石榴散	221	20617 石膏汤	226
20532 石斛汤	214	20575 石榴散	221	20618 石膏汤	226
20533 石斛汤	215	20576 石榴散	221	20619 石膏汤	226
20534 石斛汤	215	20577 石榴煎	221	20620 石膏汤	226
20535 石斛饮	215	20578 石碱丸	221	20621 石膏汤	226
20536 石斛酒	215	20579 石碱丸	221	20622 石膏汤	227
20537 石斛酒	215	20580 石碱丸	221	20623 石膏汤	227
20538 石斛酒	215	20581 石碱膏	221	20624 石膏汤	227
20539 石斛酒	216	20582 石膈散	221	20625 石膏汤	227
20540 石斛酒	216	20583 石膏丸	222	20626 石膏汤	227
20541 石斛酒	216	20584 石膏丸	222	20627 石膏汤	227

20628 石膏汤	227	20671 石膏散	232	20714 石膏散	237
20629 石膏汤	227	20672 石膏散	232	20715 石膏散	237
20630 石膏汤	227	20673 石膏散	233	20716 石膏散	237
20631 石膏汤	228	20674 石膏散	233	20717 石膏散	237
20632 石膏汤	228	20675 石膏散	233	20718 石膏散	237
20633 石膏汤	228	20676 石膏散	233	20719 石膏粥	237
20634 石膏汤	228	20677 石膏散	233	20720 石膏粥	238
20635 石膏汤	228	20678 石膏散	233	20721 石膏煎	238
20636 石膏汤	228	20679 石膏散	233	20722 石膏煎	238
20637 石膏汤	228	20680 石膏散	233	20723 石膏煎	238
20638 石膏汤	228	20681 石膏散	234	20724 石燕丸	238
20639 石膏汤	228	20682 石膏散	234	20725 石燕丸	238
20640 石膏汤	229	20683 石膏散	234	20726 石燕丸	238
20641 石膏汤	229	20684 石膏散	234	20727 石燕丹	238
20642 石膏汤	229	20685 石膏散	234	20728 石燕丹	238
20643 石膏汤	229	20686 石膏散	234	20729 石燕丹	239
20644 石膏饮	229	20687 石膏散	234	20730 石燕酒	239
20645 石膏茶	229	20688 石膏散	235	20731 石燕散	239
20646 石膏茶	229	20689 石膏散	235	20732 石燕散	239
20647 石膏散	229	20690 石膏散	235	20733 石燕散	239
20648 石膏散	229	20691 石膏散	235	20734 石燕散	239
20649 石膏散	230	20692 石膏散	235	20735 石燕散	239
20650 石膏散	230	20693 石膏散	235	20736 石霜膏	239
20651 石膏散	230	20694 石膏散	235	20737 石黛散	239
20652 石膏散	230	20695 石膏散	235	20738 石蟹丸	240
20653 石膏散	230	20696 石膏散	235	20739 石蟹散	240
20654 石膏散	230	20697 石膏散	235	20740 石髓丸	240
20655 石膏散	230	20698 石膏散	236	20741 石韦饮子	240
20656 石膏散	230	20699 石膏散	236	20742 石中黄丸	240
20657 石膏散	231	20700 石膏散	236	20743 石中黄散	240
20658 石膏散	231	20701 石膏散	236	20744 石中黄散	240
20659 石膏散	231	20702 石膏散	236	20745 石长生丸	240
20660 石膏散	231	20703 石膏散	236	20746 石龙芮丸	241
20661 石膏散	231	20704 石膏散	236	20747 石龙芮汤	241
20662 石膏散	231	20705 石膏散	236	20748 石竹花汤	241
20663 石膏散	231	20706 石膏散	236	20749 石决明丸	241
20664 石膏散	231	20707 石膏散	236	20750 石决明丸	241
20665 石膏散	232	20708 石膏散	237	20751 石决明丸	241
20666 石膏散	232	20709 石膏散	237	20752 石决明丸	241
20667 石膏散	232	20710 石膏散	237	20753 石决明丸	241
20668 石膏散	232	20711 石膏散	237	20754 石决明丸	242
20669 石膏散	232	20712 石膏散	237	20755 石决明丸	242
20670 石膏散	232	20713 石膏散	237	20756 石决明丸	242

20757 石决明丸	242	20800 石菖蒲散	246	20843 石燕子散	251
20758 石决明丸	242	20801 石菖蒲散	247	20844 石燕子散	251
20759 石决明丸	242	20802 石菖蒲散	247	20845 石燕子散	251
20760 石决明汤	242	20803 石菖蒲散	247	20846 石燕子煎	252
20761 石决明散	242	20804 石菖蒲散	247	20847 石子莽范汤	252
20762 石决明散	243	20805 石斛浸酒	247	20848 石韦瞿麦散	252
20763 石决明散	243	20806 石斛浸酒	247	20849 石中黄子散	252
20764 石决明散	243	20807 石斛浸酒	247	20850 石母降炎汤	252
20765 石决明散	243	20808 石斛浸酒	248	20851 石连光明散	252
20766 石决明散	243	20809 石斛浸酒	248	20852 石青解毒丸	252
20767 石决明散	243	20810 石斛浸酒	248	20853 石英水煮粥	252
20768 石决明散	243	20811 石斛浸酒	248	20854 石刻安肾丸	252
20769 石决明散	243	20812 石硫黄丸	248	20855 石刻安肾丸	253
20770 石决明散	243	20813 石硫黄汤	248	20856 石刻安肾丸	253
20771 石决明散	243	20814 石硫黄散	248	20857 石南根饮子	253
20772 石英水粥	244	20815 石硫黄膏	248	20858 石首鱼脑汤	253
20773 石南叶散	244	20816 石硫黄膏	248	20859 石室神效膏	253
20774 石南芽茶	244	20817 石榴皮汤	248	20860 石脂泽兰散	253
20775 石南煎丸	244	20818 石榴皮汤	249	20861 石脂神砂丹	253
20776 石钟乳丸	244	20819 石榴皮汤	249	20862 石斛万病散	253
20777 石钟乳丸	244	20820 石榴皮汤	249	20863 石斛万病散	253
20778 石钟乳丸	244	20821 石榴皮散	249	20864 石斛牛膝汤	254
20779 石钟乳汤	244	20822 石榴皮散	249	20865 石斛玄参汤	254
20780 石钟乳汤	244	20823 石榴皮散	249	20866 石斛地黄煎	254
20781 石胆矾丸	244	20824 石榴皮散	249	20867 石斛防风汤	254
20782 石胆敷方	245	20825 石榴皮散	249	20868 石斛苁蓉散	254
20783 石亭脂丸	245	20826 石榴皮煎	249	20869 石斛青蒿汤	254
20784 石亭脂丸	245	20827 石榴花散	249	20870 石斛明目丸	254
20785 石亭脂散	245	20828 石榴枝汤	249	20871 石斛夜光丸	255
20786 石亭脂散	245	20829 石榴根汤	250	20872 石斛夜光丸	255
20787 石室秘丹	245	20830 石榴根汤	250	20873 石斛泽兰丸	255
20788 石莲子汤	245	20831 石榴根汤	250	20874 石斛黄耆丸	255
20789 石莲子散	245	20832 石榴根散	250	20875 石斛清胃散	255
20790 石脂博托	245	20833 石榴根散	250	20876 石膏二川汤	255
20791 石菖蒲丸	245	20834 石榴浸酒	250	20877 石膏二母汤	255
20792 石菖蒲丸	246	20835 石膏饮子	250	20878 石膏大青汤	255
20793 石菖蒲丸	246	20836 石膏饮子	250	20879 石膏川芎汤	255
20794 石菖蒲丸	246	20837 石膏饮子	251	20880 石膏升麻散	255
20795 石菖蒲丸	246	20838 石膏煮散	251	20881 石膏化痰汤	256
20796 石菖蒲丸	246	20839 石膏蜜煎	251	20882 石膏六合汤	256
20797 石菖蒲汤	246	20840 石燕子丸	251	20883 石膏甘草散	256
20798 石菖蒲酒	246	20841 石燕子丸	251	20884 石膏白及膏	256
20799 石菖蒲散	246	20842 石燕子丸	251	20885 石膏芍药汤	256

20886	石膏竹叶汤	256
20887	石膏竹茹汤	256
20888	石膏牡蛎丸	256
20889	石膏杏仁汤	256
20890	石膏羌活散	256
20891	石膏建中汤	257
20892	石膏知母汤	257
20893	石膏泻白散	257
20894	石膏泻白散	257
20895	石膏桔矾膏	257
20896	石膏茵陈散	257
20897	石膏独活汤	257
20898	石膏神术汤	257
20899	石膏栝楼汤	257
20900	石膏柴胡汤	257
20901	石膏理中汤	257
20902	石膏黄芩汤	257
20903	石膏黄芩散	257
20904	石膏菊花散	258
20905	石膏崇命汤	258
20906	石膏麻桂汤	258
20907	石膏清燥汤	258
20908	石膏葱白汤	258
20909	石膏解毒汤	258
20910	石膏梗米汤	258
20911	石膏熟艾汤	258
20912	石髓平湖散	258
20913	石英磁石浸酒	259
20914	石室紫药神丸	259
20915	石斛生地黄煎	259
20916	石斛麦门冬散	259
20917	石膏鼠粘子散	259
20918	石蜜煎点眼方	259
20919	石旻山人甘露饭	259
20920	石膏人参解肌汤	260
20921	石膏知母化斑散	260
20922	石膏知母竹叶汤	260

右

20923	右归丸	260
20924	右归丸	261
20925	右归饮	261
20926	右归饮	262

20927	右归饮	262
20928	右军方	263
20929	右归饮加减汤	263

左

20930	左龙丸	263
20931	左龙丸	263
20932	左归丸	263
20933	左归饮	264
20934	左归饮	265
20935	左关煎	265
20936	左金丸	265
20937	左金汤	266
20938	左金汤	266
20939	左经丸	266
20940	左经丸	266
20941	左经汤	266
20942	左经汤	266
20943	左盘龙丸	266
20944	左金地骨饮	266
20945	左金加陈米汤	267

龙

20946	龙砂	267
20947	龙胶	267
20948	龙马丹	267
20949	龙牙散	267
20950	龙车散	267
20951	龙化丹	267
20952	龙爪散	267
20953	龙凤丸	268
20954	龙凤丹	268
20955	龙凤膏	268
20956	龙凤膏	268
20957	龙火汤	268
20958	龙石散	268
20959	龙石散	268
20960	龙石散	268
20961	龙石散	268
20962	龙生丸	269
20963	龙朱散	269
20964	龙朱散	269
20965	龙华散	269

20966	龙衣粉	269
20967	龙衣散	269
20968	龙连膏	269
20969	龙肝散	269
20970	龙肝散	269
20971	龙肝散	269
20972	龙肝膏	270
20973	龙角丸	270
20974	龙角丸	270
20975	龙角散	270
20976	龙角散	270
20977	龙沙丸	270
20978	龙齿丸	271
20979	龙齿丸	271
20980	龙齿丸	271
20981	龙齿丸	271
20982	龙齿丸	271
20983	龙齿丸	271
20984	龙齿丸	271
20985	龙齿丸	272
20986	龙齿丸	272
20987	龙齿丸	272
20988	龙齿丸	272
20989	龙齿丸	272
20990	龙齿丸	272
20991	龙齿丹	272
20992	龙齿丹	273
20993	龙齿汤	273
20994	龙齿汤	273
20995	龙齿汤	273
20996	龙齿汤	273
20997	龙齿汤	273
20998	龙齿汤	273
20999	龙齿汤	273
21000	龙齿汤	274
21001	龙齿饮	274
21002	龙齿饮	274
21003	龙齿饮	274
21004	龙齿散	274
21005	龙齿散	274
21006	龙齿散	274
21007	龙齿散	274
21008	龙齿散	275

21009 龙齿散	275	21052 龙虎丹	281	21095 龙骨丸	286
21010 龙齿散	275	21053 龙虎丹	281	21096 龙骨丸	287
21011 龙齿散	275	21054 龙虎丹	281	21097 龙骨丸	287
21012 龙齿散	275	21055 龙虎汤	281	21098 龙骨丸	287
21013 龙齿散	275	21056 龙虎汤	282	21099 龙骨丸	287
21014 龙齿散	275	21057 龙虎饮	282	21100 龙骨丸	287
21015 龙齿散	275	21058 龙虎散	282	21101 龙骨丸	287
21016 龙齿散	276	21059 龙虎散	282	21102 龙骨汤	287
21017 龙齿散	276	21060 龙虎膏	282	21103 龙骨汤	287
21018 龙齿散	276	21061 龙虎膏	282	21104 龙骨汤	288
21019 龙齿散	276	21062 龙乳膏	282	21105 龙骨汤	288
21020 龙齿散	276	21063 龙肤散	283	21106 龙骨汤	288
21021 龙齿散	276	21064 龙实散	283	21107 龙骨汤	288
21022 龙齿散	276	21065 龙参丸	283	21108 龙骨汤	288
21023 龙齿散	276	21066 龙荟丸	283	21109 龙骨汤	288
21024 龙齿散	277	21067 龙荟丸	283	21110 龙骨汤	288
21025 龙齿散	277	21068 龙荟丸	283	21111 龙骨汤	288
21026 龙齿散	277	21069 龙荟锭	283	21112 龙骨汤	288
21027 龙齿散	277	21070 龙砂汤	283	21113 龙骨汤	289
21028 龙齿散	277	21071 龙星丹	283	21114 龙骨汤	289
21029 龙齿散	277	21072 龙骨丸	283	21115 龙骨汤	289
21030 龙齿散	277	21073 龙骨丸	283	21116 龙骨汤	289
21031 龙齿散	277	21074 龙骨丸	284	21117 龙骨汤	289
21032 龙齿散	278	21075 龙骨丸	284	21118 龙骨汤	289
21033 龙齿散	278	21076 龙骨丸	284	21119 龙骨汤	289
21034 龙齿散	278	21077 龙骨丸	284	21120 龙骨汤	289
21035 龙齿散	278	21078 龙骨丸	284	21121 龙骨汤	290
21036 龙齿散	278	21079 龙骨丸	284	21122 龙骨汤	290
21037 龙虎丸	278	21080 龙骨丸	284	21123 龙骨饮	290
21038 龙虎丸	278	21081 龙骨丸	284	21124 龙骨饮	290
21039 龙虎丸	278	21082 龙骨丸	285	21125 龙骨散	290
21040 龙虎丸	279	21083 龙骨丸	285	21126 龙骨散	290
21041 龙虎丸	279	21084 龙骨丸	285	21127 龙骨散	290
21042 龙虎丹	279	21085 龙骨丸	285	21128 龙骨散	291
21043 龙虎丹	279	21086 龙骨丸	285	21129 龙骨散	291
21044 龙虎丹	280	21087 龙骨丸	285	21130 龙骨散	291
21045 龙虎丹	280	21088 龙骨丸	286	21131 龙骨散	291
21046 龙虎丹	280	21089 龙骨丸	286	21132 龙骨散	291
21047 龙虎丹	280	21090 龙骨丸	286	21133 龙骨散	291
21048 龙虎丹	280	21091 龙骨丸	286	21134 龙骨散	292
21049 龙虎丹	280	21092 龙骨丸	286	21135 龙骨散	292
21050 龙虎丹	281	21093 龙骨丸	286	21136 龙骨散	292
21051 龙虎丹	281	21094 龙骨丸	286	21137 龙骨散	292

21138 龙骨散	292	21181 龙骨散	297	21224 龙胆丸	301
21139 龙骨散	292	21182 龙骨散	297	21225 龙胆丸	301
21140 龙骨散	292	21183 龙骨散	297	21226 龙胆丸	301
21141 龙骨散	292	21184 龙骨散	297	21227 龙胆丸	301
21142 龙骨散	292	21185 龙骨散	297	21228 龙胆丸	302
21143 龙骨散	293	21186 龙骨散	297	21229 龙胆丸	302
21144 龙骨散	293	21187 龙骨散	297	21230 龙胆丸	302
21145 龙骨散	293	21188 龙骨散	297	21231 龙胆丸	302
21146 龙骨散	293	21189 龙骨散	297	21232 龙胆丸	302
21147 龙骨散	293	21190 龙骨散	298	21233 龙胆丸	302
21148 龙骨散	293	21191 龙骨散	298	21234 龙胆丸	302
21149 龙骨散	293	21192 龙骨散	298	21235 龙胆丸	302
21150 龙骨散	293	21193 龙骨散	298	21236 龙胆丸	302
21151 龙骨散	293	21194 龙骨散	298	21237 龙胆丸	303
21152 龙骨散	294	21195 龙骨散	298	21238 龙胆丸	303
21153 龙骨散	294	21196 龙骨散	298	21239 龙胆丸	303
21154 龙骨散	294	21197 龙骨散	298	21240 龙胆丸	303
21155 龙骨散	294	21198 龙骨散	298	21241 龙胆丸	303
21156 龙骨散	294	21199 龙骨散	298	21242 龙胆丸	303
21157 龙骨散	294	21200 龙骨散	298	21243 龙胆丸	303
21158 龙骨散	294	21201 龙骨散	299	21244 龙胆丸	304
21159 龙骨散	294	21202 龙骨散	299	21245 龙胆丸	304
21160 龙骨散	295	21203 龙骨散	299	21246 龙胆丸	304
21161 龙骨散	295	21204 龙骨散	299	21247 龙胆丸	304
21162 龙骨散	295	21205 龙骨散	299	21248 龙胆丸	304
21163 龙骨散	295	21206 龙骨散	299	21249 龙胆丸	304
21164 龙骨散	295	21207 龙骨散	299	21250 龙胆丸	304
21165 龙骨散	295	21208 龙骨散	299	21251 龙胆丸	304
21166 龙骨散	295	21209 龙骨散	299	21252 龙胆丸	304
21167 龙骨散	295	21210 龙骨膏	299	21253 龙胆丸	305
21168 龙骨散	295	21211 龙骨膏	299	21254 龙胆丸	305
21169 龙骨散	295	21212 龙香丸	300	21255 龙胆丸	305
21170 龙骨散	296	21213 龙香丸	300	21256 龙胆丸	305
21171 龙骨散	296	21214 龙香散	300	21257 龙胆水	305
21172 龙骨散	296	21215 龙香散	300	21258 龙胆汤	305
21173 龙骨散	296	21216 龙香散	300	21259 龙胆汤	306
21174 龙骨散	296	21217 龙泉散	300	21260 龙胆汤	306
21175 龙骨散	296	21218 龙泉散	300	21261 龙胆汤	306
21176 龙骨散	296	21219 龙须汤	300	21262 龙胆汤	306
21177 龙骨散	296	21220 龙须散	300	21263 龙胆汤	306
21178 龙骨散	296	21221 龙胆丸	301	21264 龙胆汤	306
21179 龙骨散	297	21222 龙胆丸	301	21265 龙胆汤	306
21180 龙骨散	297	21223 龙胆丸	301	21266 龙胆汤	306

21267 龙胆汤	306	21310 龙涎汤	311	21353 龙脑丸	316
21268 龙胆汤	306	21311 龙涎散	311	21354 龙脑丸	317
21269 龙胆汤	306	21312 龙涎膏	311	21355 龙脑丸	317
21270 龙胆汤	307	21313 龙宫汤	311	21356 龙脑丸	318
21271 龙胆汤	307	21314 龙珠丸	311	21357 龙脑丸	318
21272 龙胆汤	307	21315 龙珠丹	311	21358 龙脑丸	318
21273 龙胆汤	307	21316 龙珠丹	311	21359 龙脑丸	318
21274 龙胆汤	307	21317 龙珠散	311	21360 龙脑汤	318
21275 龙胆汤	307	21318 龙珠散	311	21361 龙脑饮	318
21276 龙胆汤	307	21319 龙珠膏	312	21362 龙脑饮	318
21277 龙胆汤	307	21320 龙珠膏	312	21363 龙脑粉	318
21278 龙胆汤	307	21321 龙盐膏	312	21364 龙脑散	318
21279 龙胆汤	307	21322 龙射丸	312	21365 龙脑散	319
21280 龙胆饮	307	21323 龙脂丸	312	21366 龙脑散	319
21281 龙胆饮	307	21324 龙脑丸	312	21367 龙脑散	319
21282 龙胆饮	308	21325 龙脑丸	312	21368 龙脑散	319
21283 龙胆饮	308	21326 龙脑丸	313	21369 龙脑散	319
21284 龙胆饮	308	21327 龙脑丸	313	21370 龙脑散	319
21285 龙胆饮	308	21328 龙脑丸	313	21371 龙脑散	319
21286 龙胆散	308	21329 龙脑丸	313	21372 龙脑散	320
21287 龙胆散	308	21330 龙脑丸	313	21373 龙脑散	320
21288 龙胆散	308	21331 龙脑丸	314	21374 龙脑散	320
21289 龙胆散	308	21332 龙脑丸	314	21375 龙脑散	320
21290 龙胆散	308	21333 龙脑丸	314	21376 龙脑散	320
21291 龙胆散	308	21334 龙脑丸	314	21377 龙脑散	320
21292 龙胆散	309	21335 龙脑丸	314	21378 龙脑散	320
21293 龙胆散	309	21336 龙脑丸	314	21379 龙脑散	321
21294 龙胆散	309	21337 龙脑丸	314	21380 龙脑散	321
21295 龙胆散	309	21338 龙脑丸	315	21381 龙脑散	321
21296 龙胆散	309	21339 龙脑丸	315	21382 龙脑散	321
21297 龙胆散	309	21340 龙脑丸	315	21383 龙脑散	321
21298 龙胆散	309	21341 龙脑丸	315	21384 龙脑散	321
21299 龙胆散	309	21342 龙脑丸	315	21385 龙脑散	321
21300 龙胆散	309	21343 龙脑丸	315	21386 龙脑散	321
21301 龙胆煎	310	21344 龙脑丸	315	21387 龙脑散	321
21302 龙胆煎	310	21345 龙脑丸	315	21388 龙脑散	322
21303 龙胆煎	310	21346 龙脑丸	316	21389 龙脑散	322
21304 龙胆煎	310	21347 龙脑丸	316	21390 龙脑散	322
21305 龙胆膏	310	21348 龙脑丸	316	21391 龙脑散	322
21306 龙胆膏	310	21349 龙脑丸	316	21392 龙脑散	322
21307 龙胆膏	310	21350 龙脑丸	316	21393 龙脑散	322
21308 龙胆膏	310	21351 龙脑丸	316	21394 龙脑散	322
21309 龙涎丸	311	21352 龙脑丸	316	21395 龙脑散	322

21396 龙脑散	322	21439 龙眼膏	326	21482 龙胆草散	331
21397 龙脑散	322	21440 龙蛎丸	326	21483 龙胆草散	331
21398 龙脑散	323	21441 龙蛇丸	326	21484 龙胆草散	331
21399 龙脑煎	323	21442 龙蛇散	327	21485 龙胆草散	331
21400 龙脑煎	323	21443 龙蛇散	327	21486 龙胆草散	331
21401 龙脑煎	323	21444 龙衍膏	327	21487 龙胆煮散	331
21402 龙脑煎	323	21445 龙旋散	327	21488 龙脑双丸	331
21403 龙脑煎	323	21446 龙液膏	327	21489 龙脑饮子	331
21404 龙脑煎	323	21447 龙葱散	327	21490 龙脑饮子	332
21405 龙脑煎	323	21448 龙葵散	327	21491 龙脑膏子	332
21406 龙脑膏	323	21449 龙葵散	327	21492 龙脑膏子	332
21407 龙脑膏	324	21450 龙葵膏	327	21493 龙眼肉粥	332
21408 龙脑膏	324	21451 龙蛤散	328	21494 龙葵根散	332
21409 龙脑膏	324	21452 龙游串	328	21495 龙蛻饼子	332
21410 龙脑膏	324	21453 龙翔饮	328	21496 龙马自来丹	332
21411 龙脑膏	324	21454 龙犀丸	328	21497 龙牙清魂散	332
21412 龙脑膏	324	21455 龙礞丹	328	21498 龙火拔毒散	332
21413 龙脑膏	324	21456 龙礞散	328	21499 龙芽一醉饮	332
21414 龙脑膏	324	21457 龙睛丹	328	21500 龙牡复脉汤	333
21415 龙脑膏	325	21458 龙蛻散	328	21501 龙牡菟丝丸	333
21416 龙脑膏	325	21459 龙睛饮	328	21502 龙肝风髓丸	333
21417 龙脑膏	325	21460 龙蟠饮	328	21503 龙齿牛膝散	333
21418 龙脑膏	325	21461 龙鬃丸	328	21504 龙齿壮胆汤	333
21419 龙脑膏	325	21462 龙鳞丸	329	21505 龙齿安神丹	333
21420 龙脑膏	325	21463 龙鳞散	329	21506 龙齿补心汤	334
21421 龙脑膏	325	21464 龙磨丹	329	21507 龙齿补心汤	334
21422 龙脑膏	325	21465 龙磨散	329	21508 龙齿清魂散	334
21423 龙脑膏	325	21466 龙磨散	329	21509 龙齿清魂散	334
21424 龙脑膏	325	21467 龙花蕊散	329	21510 龙齿琥珀散	334
21425 龙脑膏	326	21468 龙花蕊散	329	21511 龙齿犀角汤	334
21426 龙脑膏	326	21469 龙花蕊散	329	21512 龙齿镇心丹	334
21427 龙脑膏	326	21470 龙尾神针	329	21513 龙虎二仙丹	335
21428 龙脑膏	326	21471 龙骨皮丸	330	21514 龙虎二仙汤	335
21429 龙脑膏	326	21472 龙骨饮子	330	21515 龙虎二汁饮	335
21430 龙脑膏	326	21473 龙骨饼子	330	21516 龙虎卫生膏	335
21431 龙脑膏	326	21474 龙骨粉膏	330	21517 龙虎小还丹	335
21432 龙烟汤	326	21475 龙胆饮子	330	21518 龙虎太一丹	335
21433 龙消散	326	21476 龙胆饮子	330	21519 龙虎止疳散	335
21434 龙粉丸	326	21477 龙胆草丸	330	21520 龙虎化毒丹	335
21435 龙粉散	326	21478 龙胆草汤	330	21521 龙虎双降散	336
21436 龙黄散	326	21479 龙胆草汤	330	21522 龙虎交加散	336
21437 龙眼汤	326	21480 龙胆草汤	331	21523 龙虎如意丹	336
21438 龙眼酒	326	21481 龙胆草饮	331	21524 龙虎寿生丹	336

21525 龙虎济阴丹	336	21568 龙胆泻肝汤	343	21611 龙蛇换骨丹	349
21526 龙虎救生丹	337	21569 龙胆泻肝汤	343	21612 龙鲤宣痹丸	349
21527 龙虎续断丸	337	21570 龙胆泻肝汤	343	21613 龙麝青金丸	349
21528 龙骨远志丸	337	21571 龙胆泻肝汤	343	21614 龙麝追毒丹	350
21529 龙骨牡蛎汤	337	21572 龙胆泻肝汤	343	21615 龙麝追毒散	350
21530 龙骨阿胶散	337	21573 龙胆泻毒汤	344	21616 龙麝追毒散	350
21531 龙骨厚朴汤	337	21574 龙胆草擦剂	344	21617 龙麝紫芝煎	350
21532 龙骨韭子汤	337	21575 龙胆茯神丸	344	21618 龙麝紫芝煎	350
21533 龙骨海蛤散	337	21576 龙胆清肝汤	344	21619 龙麝蛭蝎丸	350
21534 龙骨黄连丸	337	21577 龙胆清肝饮	344	21620 龙麝聚圣丹	351
21535 龙骨黄连汤	337	21578 龙胆清肝散	344	21621 龙胆羚羊角汤	351
21536 龙骨救逆汤	338	21579 龙宫救苦丹	344	21622 龙脑麝香锭子	351
21537 龙骨续断丸	338	21580 龙莲芡实丸	344		
21538 龙香犀角丸	338	21581 龙蚝理痰汤	344	戊	
21539 龙胆四物汤	338	21582 龙射破棺散	345	21623 戊己丸	351
21540 龙胆安神丸	338	21583 龙脑川芎丸	345	21624 戊己丸	351
21541 龙胆芦荟丸	338	21584 龙脑川芎丸	345	21625 戊己丸	351
21542 龙胆苦参丸	338	21585 龙脑天麻煎	345	21626 戊己丸	351
21543 龙胆泻火汤	338	21586 龙脑牛黄丸	345	21627 戊己丸	352
21544 龙胆泻肝丸	339	21587 龙脑丹砂丸	345	21628 戊己汤	352
21545 龙胆泻肝丸	339	21588 龙脑水银丸	346	21629 戊己汤	352
21546 龙胆泻肝丸	339	21589 龙脑玉壶丸	346	21630 戊己散	352
21547 龙胆泻肝汤	339	21590 龙脑甘露丸	346	21631 戊戌丸	352
21548 龙胆泻肝汤	340	21591 龙脑地黄膏	346	21632 戊戌酒	352
21549 龙胆泻肝汤	341	21592 龙脑芎辛丸	346	21633 戊子化毒丸	352
21550 龙胆泻肝汤	341	21593 龙脑芎犀丸	346		
21551 龙胆泻肝汤	341	21594 龙脑安神丸	347	可	
21552 龙胆泻肝汤	341	21595 龙脑安神丸	347	21634 可保立苏汤	352
21553 龙胆泻肝汤	341	21596 龙脑鸡苏丸	347		
21554 龙胆泻肝汤	342	21597 龙脑鸡苏丸	347	【1】	
21555 龙胆泻肝汤	342	21598 龙脑鸡苏丸	348	归	
21556 龙胆泻肝汤	342	21599 龙脑青金丸	348	21635 归元汤	353
21557 龙胆泻肝汤	342	21600 龙脑青金散	348	21636 归元散	353
21558 龙胆泻肝汤	342	21601 龙脑青稍丸	348	21637 归牛散	353
21559 龙胆泻肝汤	342	21602 龙脑金水膏	348	21638 归气汤	353
21560 龙胆泻肝汤	342	21603 龙脑破毒散	348	21639 归气汤	353
21561 龙胆泻肝汤	342	21604 龙脑破毒散	349	21640 归气饮	353
21562 龙胆泻肝汤	342	21605 龙脑润肌散	349	21641 归气散	353
21563 龙胆泻肝汤	342	21606 龙脑黄连膏	349	21642 归艾丸	353
21564 龙胆泻肝汤	343	21607 龙脑黄连膏	349	21643 归艾饮	354
21565 龙胆泻肝汤	343	21608 龙脑清膈汤	349	21644 归术汤	354
21566 龙胆泻肝汤	343	21609 龙脑礞砂散	349	21645 归术散	354
21567 龙胆泻肝汤	343	21610 龙蛭救逆汤	349	21646 归龙酒	354

21647 归芍汤	354	21690 归命膏	359	21733 归葛饮	364
21648 归芍汤	354	21691 归沫汤	359	21734 归葛煎	364
21649 归芍汤	354	21692 归宗汤	359	21735 归葵汤	364
21650 归芍汤	354	21693 归承汤	359	21736 归脾丸	364
21651 归芍汤	354	21694 归参丸	359	21737 归脾丸	364
21652 归芍饮	355	21695 归参丸	359	21738 归脾汤	364
21653 归芍饮	355	21696 归参汤	359	21739 归脾汤	364
21654 归芍饮	355	21697 归参汤	359	21740 归脾汤	367
21655 归芍散	355	21698 归荆汤	359	21741 归脾汤	367
21656 归芍煎	355	21699 归荆散	360	21742 归脾汤	367
21657 归芍丸	355	21700 归茸丸	360	21743 归脾汤	367
21658 归芍汤	355	21701 归茸丸	360	21744 归脾汤	367
21659 归芍汤	355	21702 归茸丸	360	21745 归脾饮	367
21660 归血散	355	21703 归茸丸	360	21746 归脾散	367
21661 归花汤	355	21704 归茸汤	360	21747 归魂丸	367
21662 归杞汤	356	21705 归茸酒	360	21748 归魂丸	367
21663 归连丸	356	21706 归茸散	360	21749 归魂饮	368
21664 归连丸	356	21707 归须汤	360	21750 归魂散	368
21665 归连汤	356	21708 归姜汤	360	21751 归魂散	368
21666 归连汤	356	21709 归神丸	360	21752 归魂散	368
21667 归连汤	356	21710 归神丹	361	21753 归魂散	368
21668 归连散	356	21711 归神丹	361	21754 归榆汤	368
21669 归肠汤	356	21712 归神丹	361	21755 归睛散	368
21670 归肠散	356	21713 归神丹	361	21756 归源汤	369
21671 归灵汤	357	21714 归神汤	362	21757 归源汤	369
21672 归灵散	357	21715 归神汤	362	21758 归竭丸	369
21673 归尾丸	357	21716 归真散	362	21759 归漆丸	369
21674 归附丸	357	21717 归香汤	362	21760 归醴饮	369
21675 归附丸	357	21718 归香汤	362	21761 归姜枣汤	369
21676 归附丸	357	21719 归香汤	362	21762 归气定喘汤	369
21677 归附丸	357	21720 归香汤	362	21763 归气救产汤	369
21678 归附汤	357	21721 归香汤	362	21764 归术降胞汤	369
21679 归表汤	357	21722 归香汤	362	21765 归术保产汤	369
21680 归苓散	357	21723 归香汤	362	21766 归术破瘕汤	370
21681 归苓散	358	21724 归香饮	362	21767 归术破瘕汤	370
21682 归肾丸	358	21725 归原散	363	21768 归母苦参丸	370
21683 归命丸	358	21726 归柴饮	363	21769 归地阿胶汤	370
21684 归命丸	358	21727 归圆酒	363	21770 归地参术汤	370
21685 归命丹	358	21728 归圆酒	363	21771 归地养荣汤	370
21686 归命丹	358	21729 归胶饮	363	21772 归地养营汤	370
21687 归命丹	358	21730 归梢汤	363	21773 归地滋阴汤	370
21688 归命丹	358	21731 归黄散	363	21774 归地滋阴汤	370
21689 归命散	358	21732 归黄膏	363	21775 归芍二陈汤	371

21776 归芍二黄汤 371
 21777 归芍大黄汤 371
 21778 归芍天地煎 371
 21779 归芍六君丸 371
 21780 归芍六君汤 371
 21781 归芍六味丸 371
 21782 归芍甘麦汤 371
 21783 归芍地黄汤 371
 21784 归芍地黄汤 371
 21785 归芍异功汤 371
 21786 归芍异功散 371
 21787 归芍红花散 372
 21788 归芍连壳饮 372
 21789 归芍利导汤 372
 21790 归芍香连丸 372
 21791 归芍活血散 372
 21792 归芍柴胡汤 372
 21793 归芍柴胡汤 372
 21794 归芍柴胡汤 372
 21795 归芍润燥汤 372
 21796 归芍调血汤 372
 21797 归芍理中丸 372
 21798 归芍葛芩汤 373
 21799 归血凉荣汤 373
 21800 归麦榆草汤 373
 21801 归芍参附汤 373
 21802 归连石斛汤 373
 21803 归身生地汤 373
 21804 归灵内托散 373
 21805 归尾牛膝汤 373
 21806 归尾泽兰汤 373
 21807 归附地黄丸 373
 21808 归经两安汤 374
 21809 归经佛手散 374
 21810 归荆安枕汤 374
 21811 归养心肾丸 374
 21812 归养心脾汤 374
 21813 归姜羊肉汤 374
 21814 归活温经汤 374
 21815 归神定志丸 375
 21816 归桂化逆汤 375
 21817 归香止血汤 375
 21818 归圆杞菊酒 375

21819 归凉节命饮 375
 21820 归凉节命散 375
 21821 归凉接命散 375
 21822 归脾养荣汤 375
 21823 归脾养荣汤 375
 21824 归掌地黄丸 375
 21825 归芍六君子丸 376
 21826 归芍六君子汤 376
 21827 归来轩毡道人风
 药 376

北

21828 北艾汤 376
 21829 北枣丹 376
 21830 北枣散 376
 21831 北亭丸 376
 21832 北亭丸 377
 21833 北亭丸 377
 21834 北亭散 377
 21835 北庭丸 377
 21836 北庭丹 377
 21837 北梗散 377
 21838 北地太守酒 377
 21839 北味吴萸汤 378
 21840 北京盐水锭 378
 21841 北平太守八味散 ... 378

叶

21842 叶灵神丹 378
 21843 叶氏痢症丸 378

叭

21844 叭啞杏仁粉 378
 21845 叭啞润嗽膏 379

卢

21846 卢同散 379
 21847 卢氏元菟丹 379
 21848 卢氏感应丸 379
 21849 卢氏异方感应丸 ... 379
 21850 卢祖师解毒辟瘟
 丹 379

占

21851 占斯散 379
 21852 占斯散 379
 21853 占斯散 379

只

21854 只金丹 380

出

21855 出毛丸 380
 21856 出虫丸 380
 21857 出虫膏 380
 21858 出声散 380
 21859 出虫芦荟散 380
 21860 出声消肺散 380
 21861 出牙齿乌头散 380

田

21862 田父丸 380
 21863 田父丸 381
 21864 田季散 381
 21865 田姜散 381
 21866 田螺水 381
 21867 田螺饮 381
 21868 田螺散 381
 21869 田螺膏 381
 21870 田螺膏 382
 21871 田螺捻子 382
 21872 田单火牛汤 382
 21873 田螺解胀敷脐方 ... 382
 21874 田螺解胀敷脐方 ... 382

申

21875 申药 382

甲

21876 甲乙饼 382
 21877 甲牛酒 382
 21878 甲灰丸 382
 21879 甲字丸 382
 21880 甲香散 383
 21881 甲胶煎 383

21882	甲亢2号	383
21883	甲煎口脂	383
21884	甲煎唇脂	383
21885	甲乙化土汤	384
21886	甲乙归藏汤	384
21887	甲字化毒丸	384
21888	甲字提毒药捻	384

电

21889	电制膏	384
-------	-----	-----

四

21890	四七汤	384
21891	四七汤	384
21892	四七汤	384
21893	四七汤	385
21894	四七汤	385
21895	四七汤	385
21896	四七汤	385
21897	四七饮	385
21898	四川丸	385
21899	四川散	385
21900	四五汤	385
21901	四牙散	385
21902	四仁汤	385
21903	四仁膏	385
21904	四分散	385
21905	四片金	386
21906	四斤丸	386
21907	四斤丸	386
21908	四斤丸	386
21909	四斤丸	386
21910	四斤丸	387
21911	四斤丸	387
21912	四斤丸	387
21913	四乌汤	387
21914	四乌汤	387
21915	四乌汤	387
21916	四六丹	387
21917	四六汤	387
21918	四方散	388
21919	四平散	388
21920	四正丸	388

21921	四正汤	388
21922	四正散	388
21923	四石丸	388
21924	四石汤	388
21925	四龙丹	388
21926	四仙丸	388
21927	四仙丹	389
21928	四仙丹	389
21929	四仙丹	389
21930	四仙丹	389
21931	四仙汤	389
21932	四仙汤	389
21933	四仙饮	389
21934	四仙散	389
21935	四仙散	389
21936	四仙散	389
21937	四生丸	390
21938	四生丸	390
21939	四生丸	390
21940	四生丸	390
21941	四生丸	390
21942	四生丸	390
21943	四生丸	390
21944	四生丸	390
21945	四生丸	390
21946	四生丸	391
21947	四生丸	391
21948	四生饮	391
21949	四生饮	391
21950	四生散	391
21951	四生散	391
21952	四生散	391
21953	四生散	391
21954	四白丸	392
21955	四白丹	392
21956	四白头	392
21957	四白汤	392
21958	四白汤	392
21959	四白散	392
21960	四白散	392
21961	四白散	393
21962	四白散	393
21963	四白散	393

21964	四汁饮	393
21965	四汁饮	393
21966	四汁饮	393
21967	四汁饮	393
21968	四汁散	393
21969	四汁煎	393
21970	四汁膏	393
21971	四汁膏	394
21972	四汁膏	394
21973	四玄散	394
21974	四加丸	394
21975	四圣丸	394
21976	四圣丸	394
21977	四圣丸	394
21978	四圣丸	394
21979	四圣丸	395
21980	四圣丸	395
21981	四圣丸	395
21982	四圣丸	395
21983	四圣丸	395
21984	四圣丸	395
21985	四圣丸	395
21986	四圣丸	395
21987	四圣丹	395
21988	四圣丹	396
21989	四圣丹	396
21990	四圣丹	396
21991	四圣丹	396
21992	四圣丹	396
21993	四圣丹	396
21994	四圣丹	396
21995	四圣丹	396
21996	四圣汤	396
21997	四圣汤	396
21998	四圣汤	396
21999	四圣汤	397
22000	四圣汤	397
22001	四圣汤	397
22002	四圣串	397
22003	四圣饮	397
22004	四圣饮	397
22005	四圣散	397
22006	四圣散	397

22007 四圣散	397	22050 四圣膏	401	22093 四陈散	406
22008 四圣散	397	22051 四圣膏	402	22094 四妙丸	406
22009 四圣散	397	22052 四圣膏	402	22095 四妙丸	406
22010 四圣散	397	22053 四圣膏	402	22096 四妙丸	407
22011 四圣散	398	22054 四圣膏	402	22097 四妙丸	407
22012 四圣散	398	22055 四圣膏	402	22098 四妙丸	407
22013 四圣散	398	22056 四圣膏	402	22099 四妙丹	407
22014 四圣散	398	22057 四圣膏	402	22100 四妙汤	407
22015 四圣散	398	22058 四皮汤	402	22101 四妙汤	407
22016 四圣散	398	22059 四皮汤	402	22102 四妙散	407
22017 四圣散	398	22060 四皮饮	402	22103 四妙散	407
22018 四圣散	398	22061 四灰散	402	22104 四妙散	407
22019 四圣散	398	22062 四灰散	402	22105 四妙散	407
22020 四圣散	399	22063 四虫丹	402	22106 四妙散	407
22021 四圣散	399	22064 四血散	403	22107 四妙散	407
22022 四圣散	399	22065 四合汤	403	22108 四妙散	407
22023 四圣散	399	22066 四合汤	403	22109 四妙煎	408
22024 四圣散	399	22067 四合饮	403	22110 四妙膏	408
22025 四圣散	399	22068 四色丸	403	22111 四苓丸	408
22026 四圣散	399	22069 四色散	403	22112 四苓汤	408
22027 四圣散	399	22070 四米汤	403	22113 四苓汤	408
22028 四圣散	399	22071 四阴煎	403	22114 四苓汤	408
22029 四圣散	400	22072 四红丸	404	22115 四苓汤	408
22030 四圣散	400	22073 四红丸	404	22116 四苓散	408
22031 四圣散	400	22074 四红丹	404	22117 四苓散	409
22032 四圣散	400	22075 四红丹	404	22118 四苓散	409
22033 四圣散	400	22076 四红丹	404	22119 四苓散	409
22034 四圣散	400	22077 四时散	404	22120 四奇汤	409
22035 四圣散	400	22078 四应膏	404	22121 四齿散	409
22036 四圣散	400	22079 四疔散	405	22122 四虎饮	409
22037 四圣散	400	22080 四补丸	405	22123 四虎散	409
22038 四圣散	400	22081 四补丹	405	22124 四虎散	409
22039 四圣散	400	22082 四灵丸	405	22125 四虎散	410
22040 四圣散	401	22083 四灵丸	405	22126 四贤串	410
22041 四圣散	401	22084 四灵丹	405	22127 四贤散	410
22042 四圣散	401	22085 四灵丹	405	22128 四明丸	410
22043 四圣散	401	22086 四灵丹	406	22129 四明饮	410
22044 四圣散	401	22087 四灵散	406	22130 四味丸	410
22045 四圣散	401	22088 四灵散	406	22131 四味丸	410
22046 四圣散	401	22089 四灵散	406	22132 四味丸	410
22047 四圣散	401	22090 四君丸	406	22133 四味丸	410
22048 四圣膏	401	22091 四君汤	406	22134 四味汤	411
22049 四圣膏	401	22092 四陈汤	406	22135 四味汤	411

22136 四味汤	411	22179 四疳散	418	22222 四顺散	422
22137 四味汤	411	22180 四炒丸	418	22223 四顺散	422
22138 四味散	411	22181 四炒丸	418	22224 四顺散	422
22139 四味散	412	22182 四炒丸	418	22225 四顺散	422
22140 四味散	412	22183 四炒丹	418	22226 四顺散	422
22141 四味散	412	22184 四治汤	418	22227 四顺散	422
22142 四季丹	412	22185 四宝丸	418	22228 四顺散	422
22143 四物丸	412	22186 四宝丹	418	22229 四顺散	422
22144 四物丸	412	22187 四宝丹	419	22230 四顺散	422
22145 四物丸	412	22188 四宝丹	419	22231 四顺煎	422
22146 四物方	412	22189 四宝丹	419	22232 四胆丸	422
22147 四物汤	412	22190 四宝丹	419	22233 四胆丸	423
22148 四物汤	412	22191 四宝丹	419	22234 四胜丸	423
22149 四物汤	413	22192 四宝汤	419	22235 四胜饮	423
22150 四物汤	415	22193 四宝顶	419	22236 四胜散	423
22151 四物汤	415	22194 四参汤	419	22237 四逆汤	423
22152 四物汤	415	22195 四珍丸	419	22238 四逆汤	426
22153 四物汤	415	22196 四珍丹	419	22239 四逆汤	426
22154 四物汤	415	22197 四珍膏	419	22240 四逆汤	426
22155 四物汤	415	22198 四柱丸	419	22241 四逆汤	427
22156 四物汤	415	22199 四柱饮	420	22242 四逆散	427
22157 四物汤	416	22200 四柱散	420	22243 四逆散	430
22158 四物汤	416	22201 四柱散	420	22244 四逆散	430
22159 四物汤	416	22202 四草饮	420	22245 四神丸	430
22160 四物汤	416	22203 四骨散	420	22246 四神丸	430
22161 四物汤	416	22204 四香汤	420	22247 四神丸	430
22162 四物汤	416	22205 四香饮	420	22248 四神丸	430
22163 四物汤	416	22206 四香散	420	22249 四神丸	431
22164 四物汤	416	22207 四香散	420	22250 四神丸	431
22165 四物汤	416	22208 四香散	421	22251 四神丸	431
22166 四物饮	416	22209 四顺丸	421	22252 四神丸	431
22167 四物散	417	22210 四顺汤	421	22253 四神丸	431
22168 四和汤	417	22211 四顺汤	421	22254 四神丸	431
22169 四和汤	417	22212 四顺汤	421	22255 四神丸	431
22170 四和膏	417	22213 四顺汤	421	22256 四神丸	431
22171 四制丸	417	22214 四顺汤	421	22257 四神丸	431
22172 四制丸	417	22215 四顺汤	421	22258 四神丸	433
22173 四制丸	417	22216 四顺饮	421	22259 四神丸	433
22174 四金丸	417	22217 四顺饮	421	22260 四神丸	433
22175 四金丸	417	22218 四顺饮	421	22261 四神丸	434
22176 四金丹	417	22219 四顺饮	421	22262 四神丸	434
22177 四金散	418	22220 四顺饮	422	22263 四神丸	434
22178 四金刚	418	22221 四顺饮	422	22264 四神丹	434

22265 四神丹	434	22308 四神煎	439	22351 四兽饮	443
22266 四神丹	434	22509 四神煎	439	22352 四续丸	443
22267 四神丹	434	22310 四神煎	439	22353 四维散	444
22268 四神丹	434	22311 四神膏	439	22354 四雄丸	444
22269 四神丹	434	22312 四神膏	439	22355 四等丸	444
22270 四神丹	435	22313 四退散	439	22356 四等散	444
22271 四神丹	435	22314 四根散	439	22357 四皓饮	444
22272 四神汤	435	22315 四真丸	440	22358 四羹散	444
22273 四神汤	435	22316 四倍丸	440	22359 四温丹	444
22274 四神汤	435	22317 四倍丸	440	22360 四温汤	444
22275 四神汤	435	22318 四倍丸	440	22361 四温散	444
22276 四神汤	435	22319 四倍丸	440	22362 四蒸丸	445
22277 四神汤	435	22320 四倍丸	440	22363 四蛻丹	445
22278 四神汤	436	22321 四倍汤	440	22364 四蛻散	445
22279 四神汤	436	22322 四倍散	440	22365 四满丸	445
22280 四神汤	436	22323 四效散	440	22366 四满丸	445
22281 四神汤	436	22324 四症丸	440	22367 四雍散	445
22282 四神饮	436	22325 四消丸	441	22368 四精丸	445
22283 四神散	436	22326 四消丸	441	22369 四精丸	445
22284 四神散	436	22327 四消丸	441	22370 四精膏	445
22285 四神散	436	22328 四润煎	441	22371 四精膏	445
22286 四神散	437	22329 四调膏	441	22372 四精膏	446
22287 四神散	437	22330 四扇散	441	22373 四精膏	446
22288 四神散	437	22331 四通汤	441	22374 四磨汤	446
22289 四神散	437	22332 四钱丸	441	22375 四磨汤	447
22290 四神散	437	22333 四钱丸	441	22376 四磨汤	447
22291 四神散	437	22334 四黄汤	441	22377 四磨汤	447
22292 四神散	437	22335 四黄散	442	22378 四磨饮	447
22293 四神散	437	22336 四黄散	442	22379 四磨饮	447
22294 四神散	437	22337 四黄散	442	22380 四霜丸	447
22295 四神散	438	22338 四黄散	442	22381 四魔丹	447
22296 四神散	438	22339 四黄散	442	22382 四魔粉	447
22297 四神散	438	22340 四黄散	442	22383 四七气汤	448
22298 四神散	438	22341 四黄散	442	22384 四七气汤	448
22299 四神散	438	22342 四黄散	442	22385 四七气汤	448
22300 四神散	438	22343 四黄散	442	22386 四圣金丹	448
22301 四神散	438	22344 四黄散	442	22387 四时药茶	448
22302 四神散	438	22345 四黄散	442	22388 四君子丸	448
22303 四神散	438	22346 四黄煎	443	22389 四君子丸	448
22304 四神散	439	22347 四黄膏	443	22390 四君子丸	448
22305 四神散	439	22348 四虚丹	443	22391 四君子汤	448
22306 四神散	439	22349 四脱丹	443	22392 四君子汤	448
22307 四神散	439	22350 四兽汤	443	22393 四君子汤	449

22394 四君子汤	449	22437 四圣紫金丹	453	22480 四味承气汤	459
22395 四君子汤	449	22438 四圣解毒汤	454	22481 四味枳实散	459
22396 四君子汤	449	22439 四色断痛丸	454	22482 四味茴香散	459
22397 四君子汤	449	22440 四时贴护方	454	22483 四味茺莲丸	459
22398 四味紫丸	449	22441 四灵无价散	454	22484 四味茺莲丸	459
22399 四金匱丸	449	22442 四君归芍汤	454	22485 四味茯苓汤	459
22400 四宝花散	449	22443 四君加味汤	454	22486 四味香连丸	459
22401 四面楚歌	449	22444 四君加味汤	454	22487 四味香薷饮	459
22402 四顺饮子	450	22445 四君芎归汤	454	22488 四味换肠丸	459
22403 四顺饮子	450	22446 四君防风汤	454	22489 四味消毒饮	460
22404 四将军汤	450	22447 四君快斑汤	454	22490 四味理中丸	460
22405 四将军饮	450	22448 四妙勇安汤	454	22491 四味黄连丸	460
22406 四将军散	450	22449 四妙健脾散	456	22492 四味黄连丸	460
22407 四柴胡饮	450	22450 四苓五皮汤	456	22493 四味黄芩汤	460
22408 四症神方	450	22451 四苓五皮饮	456	22494 四味排脓散	460
22409 四磨饮子	450	22452 四苓五皮散	456	22495 四味鹿茸丸	460
22410 四二五合方	450	22453 四苓六一散	456	22496 四味散惊丸	460
22411 四七益气汤	451	22454 四苓解毒汤	456	22497 四味葵根汤	460
22412 四七调气汤	451	22455 四苓新加汤	456	22498 四味舒筋汤	460
22413 四子明目散	451	22456 四奇种子丸	456	22499 四味舒筋汤	460
22414 四子调中汤	451	22457 四奇毓麟丸	456	22500 四味梁米汤	460
22415 四五培元粉	451	22458 四味人参汤	457	22501 四味截疟汤	460
22416 四牙无价散	451	22459 四味大黄汤	457	22502 四味藿叶汤	460
22417 四六神遗散	451	22460 四味升葛汤	457	22503 四味藿香汤	461
22418 四号否象方	451	22461 四味乌沉汤	457	22504 四物一黄散	461
22419 四仙求志膏	452	22462 四味白术汤	457	22505 四物二连汤	461
22420 四生化痰丸	452	22463 四味半夏丸	457	22506 四物二陈汤	461
22421 四生地黄汤	452	22464 四味地黄丸	457	22507 四物二陈汤	461
22422 四白天麻散	452	22465 四味地榆散	457	22508 四物二妙丸	461
22423 四白烧肝散	452	22466 四味芍药散	457	22509 四物三补丸	461
22424 四主二佐丸	452	22467 四味当归汤	458	22510 四物三黄汤	461
22425 四加生化汤	452	22468 四味当归汤	458	22511 四物干姜汤	461
22426 四圣不老丹	452	22469 四味回阳饮	458	22512 四物大黄汤	461
22427 四圣化毒汤	452	22470 四味回阳饮	458	22513 四物五子丸	461
22428 四圣快斑汤	453	22471 四味防风散	458	22514 四物五子丸	461
22429 四圣快斑散	453	22472 四味如圣汤	458	22515 四物五苓散	462
22430 四圣珍珠散	453	22473 四味异功散	458	22516 四物止经汤	462
22431 四圣挑疔丹	453	22474 四味连香丸	458	22517 四物止痛汤	462
22432 四圣挑疔散	453	22475 四味补心丸	458	22518 四物内托饮	462
22433 四圣保命丹	453	22476 四味阿胶丸	458	22519 四物化郁汤	462
22434 四圣保命丹	453	22477 四味阿魏丸	459	22520 四物化毒汤	462
22435 四圣旋丁散	453	22478 四味拔毒散	459	22521 四物羌活汤	462
22436 四圣朝元丹	453	22479 四味肥儿丸	459	22522 四物甘草汤	462

22523 四物龙胆汤	462	22566 四物茶调散	467	22609 四制白术丸	471
22524 四物白通汤	462	22567 四物钩藤汤	467	22610 四制白术散	472
22525 四物瓜蒌汤	463	22568 四物香附丸	467	22611 四制白术散	472
22526 四物玄明饮	463	22569 四物香薷饮	467	22612 四制白术散	472
22527 四物玄胡汤	463	22570 四物保元汤	467	22613 四制仙术散	472
22528 四物玄胡汤	463	22571 四物绛覆汤	467	22614 四制苍术丸	472
22529 四物加曲汤	463	22572 四物桂枝汤	467	22615 四制苍术丸	472
22530 四物加味汤	463	22573 四物桔梗汤	468	22616 四制苍柏丸	472
22531 四物加味汤	463	22574 四物桃仁汤	468	22617 四制良姜丸	472
22532 四物加桂汤	463	22575 四物逍遥散	468	22618 四制抱龙丸	472
22533 四物加桂汤	463	22576 四物胶薄贴	468	22619 四制枳壳丸	473
22534 四物加减汤	464	22577 四物益母丸	468	22620 四制柏术丸	473
22535 四物地榆汤	464	22578 四物益母丸	468	22621 四制茺萸丸	473
22536 四物当归汤	464	22579 四物益母丸	468	22622 四制香附丸	473
22537 四物当归汤	464	22580 四物益母膏	468	22623 四制香附丸	473
22538 四物安神汤	464	22581 四物凉膈散	468	22624 四制香附丸	473
22539 四物安神汤	464	22582 四物消风汤	468	22625 四制香附丸	473
22540 四物导赤散	464	22583 四物消风饮	468	22626 四制香附丸	473
22541 四物导痰汤	464	22584 四物消风饮	469	22627 四制香附丸	473
22542 四物红花汤	464	22585 四物消风散	469	22628 四制香附丸	474
22543 四物芩连汤	464	22586 四物消风散	469	22629 四制香附丸	474
22544 四物坎离丸	464	22587 四物润导汤	469	22630 四制香附丸	474
22545 四物连附汤	465	22588 四物调经汤	469	22631 四制香附丸	474
22546 四物快斑汤	465	22589 四物调经散	469	22632 四制香附丸	474
22547 四物补心汤	465	22590 四物排风散	469	22633 四制益母丸	474
22548 四物补心汤	465	22591 四物麻仁丸	469	22634 四制益母丸	474
22549 四物补血汤	465	22592 四物麻仁丸	469	22635 四制益母丸	474
22550 四物补肝汤	465	22593 四物麻仁汤	470	22636 四制益母丸	475
22551 四物补肝散	465	22594 四物鹿胶汤	470	22637 四制黄芩丸	475
22552 四物补经汤	465	22595 四物清肺汤	470	22638 四制黄柏丸	475
22553 四物补经汤	466	22596 四物葵花汤	470	22639 四制黄柏丸	475
22554 四物补经汤	466	22597 四物款冬丸	470	22640 四制楝实丸	475
22555 四物阿胶汤	466	22598 四物滋阴汤	470	22641 四制醋附丸	475
22556 四物附子汤	466	22599 四物解肌汤	470	22642 四制鯨鲤丸	476
22557 四物驱风汤	466	22600 四物解毒汤	470	22643 四季三黄丸	476
22558 四物青黛汤	466	22601 四物解毒汤	470	22644 四季侧柏散	476
22559 四物苦楝汤	466	22602 四物解毒汤	470	22645 四炒川楝丸	476
22560 四物苦楝汤	466	22603 四物梁米汤	470	22646 四炒固真丹	476
22561 四物鸢头散	466	22604 四物澄波散	471	22647 四炒枳壳丸	476
22562 四物知柏汤	467	22605 四和丁香散	471	22648 四炒枳壳丸	476
22563 四物和真汤	467	22606 四制川楝丸	471	22649 四炒健脾散	476
22564 四物泻火汤	467	22607 四制化痰丸	471	22650 四炒楝实丸	476
22565 四物柏皮汤	467	22608 四制乌附丸	471	22651 四治黄连丸	476

22652 四宝大神丹 477	22695 四味万两金丹 481	22738 四君子加远志汤 ... 486
22653 四草定痛汤 477	22696 四味石钟乳散 481	22739 四苓散加木瓜汤 ... 486
22654 四炭阿胶汤 477	22697 四味肉苁蓉丸 481	22740 四味升麻葛根汤 ... 486
22655 四香三米饮 477	22698 四味鼠粘子汤 481	22741 四味调经止痛散 ... 486
22656 四顺附子汤 477	22699 四制川楝子丸 482	22742 四味紫苏和胎饮 ... 486
22657 四顺制蛔汤 477	22700 四物龙胆草汤 482	22743 四物人参知母汤 ... 486
22658 四顺凉肝散 478	22701 四物加二活汤 482	22744 四物三黄泻心汤 ... 486
22659 四顺理中丸 478	22702 四物加人参汤 482	22745 四物加黑小豆汤 ... 486
22660 四顺理中丸 478	22703 四物加大黄汤 482	22746 四物合小乌沉汤 ... 486
22661 四顺理中汤 478	22704 四物加地榆汤 482	22747 四物合小柴胡汤 ... 487
22662 四顺理中汤 478	22705 四物加竹沥汤 482	22748 四物汤倍芍归汤 ... 487
22663 四顺清凉饮 478	22706 四物加芩术汤 482	22749 四物苍术各半汤 ... 487
22664 四顺清凉饮 478	22707 四物加芩连汤 482	22750 四物理中各半汤 ... 487
22665 四顺清凉饮 478	22708 四物加芩连汤 483	22751 四物黄柏知母汤 ... 487
22666 四顺清凉饮 478	22709 四物加泽兰汤 483	22752 四制茱萸香连丹 ... 487
22667 四顺清凉饮 478	22710 四物加参术汤 483	22753 四制茱萸香壳丹 ... 487
22668 四顺清凉散 478	22711 四物加荆防汤 483	22754 四季三黄泻心丸 ... 487
22669 四顺清凉膏 478	22712 四物加柴胡汤 483	22755 四季加减百解散 ... 487
22670 四将军饮子 478	22713 四物加通草汤 483	22756 四季理脾肥儿丸 ... 488
22671 四逆双解散 478	22714 四物加黄芩汤 483	22757 四逆加吴茱萸汤 ... 488
22672 四逆承气汤 479	22715 四物加葵花汤 483	22758 四逆加猪胆汁汤 ... 488
22673 四逆茱萸汤 479	22716 四物加黑姜汤 483	22759 四逆汤加生姜方 ... 488
22674 四逆茱萸汤 479	22717 四物合二陈汤 483	22760 四十八候贴项药
22675 四逆黄姜汤 479	22718 四物合匀气散 484	方 488
22676 四逆理中汤 479	22719 四物合导赤散 484	22761 四乌鲂骨一藟茹
22677 四神附子丹 479	22720 四物黄连薄贴 484	丸 488
22678 四神附子煎 479	22721 四顺清凉饮子 484	22762 四时加减柴胡饮
22679 四神治病丸 479	22722 四顺清凉饮子 484	子 489
22680 四神消积丸 479	22723 四逆加人参汤 484	22763 四君合四神加减
22681 四配清中饮 479	22724 四逆加茯苓散 485	方 489
22682 四海舒郁丸 479	22725 四逆加猪胆汤 485	22764 四苓加厚朴秦皮
22683 四黄夺命丹 480	22726 四十一号离象方 ... 485	汤 489
22684 四黄涤痰丸 480	22727 四十二号旅象方 ... 485	22765 四物加元胡干姜
22685 四蒸木瓜丸 480	22728 四十七号讼象方 ... 485	汤 489
22686 四壁樞朱砂 480	22729 四十八号同人方 ... 485	22766 四物加天麻钩藤
22687 四十号蛊象方 481	22730 四十八候三黄散 ... 485	汤 490
22688 四加减正气散 481	22731 四十九号坤象方 ... 485	22767 四物加生姜葱白
22689 四君子加味汤 481	22732 四十三号鼎象方 ... 485	汤 490
22690 四君子快斑汤 481	22733 四十五号蒙象方 ... 485	22768 四物加远志石斛
22691 四君加姜附汤 481	22734 四十六号涣象方 ... 485	汤 490
22692 四苓合芩芍汤 481	22735 四十四号未济方 ... 486	22769 四物加芩连知柏
22693 四味土木香散 481	22736 四时加减柴胡汤 ... 486	汤 490
22694 四味大黄饮子 481	22737 四君子加竹沥汤 ... 486	22770 四物加芩连姜夏

汤	490	22792 四物加六君山楂神		22820 代针散	495
22771 四物加香附黄连		曲汤	492	22821 代针散	495
汤	490	22793 四物加苦楝附子柏		22822 代针散	495
22772 四物加香薷厚朴		皮汤	492	22823 代针膏	495
汤	490	22794 四物汤加熟地黄当		22824 代针膏	495
22773 四物加桃仁红花		归汤	492	22825 代谷丸	495
汤	490	22795 四逆散加五味子干		22826 代灸散	496
22774 四物加柴胡丹皮		姜汤	492	22827 代灸散	496
汤	490	22796 四君子加白芍药高		22828 代灸膏	496
22775 四物加黄芩白术		良姜汤	492	22829 代灸膏	496
汤	490	22797 四物汤加黄芩黄柏		22830 代灸膏	496
22776 四物加黄芩泽泻		槐花方	492	22831 代参膏	496
汤	490	22798 四物加桃仁红花竹		22832 代参膏	496
22777 四物加黄芩黄连		沥姜汁方	493	22833 代参膏	496
汤	490	22799 四物汤加桃仁红花		22834 代参膏	496
22778 四物加黄芩芍药		竹沥姜汁方	493	22835 代茶汤	496
汤	491			22836 代茶饮	497
22779 四物加熟地当归		史		22837 代指膏	497
汤	491	22800 史国公酒	493	22838 代匙散	497
22780 四物合黄连解毒		22801 史国公药酒	493	22839 代痛散	497
汤	491	22802 史国公药酒丸	493	22840 代痛散	497
22781 四乌贼一蓬茹二妙		22803 史国公浸酒良方 ...	493	22841 代赭丸	497
丸	491	22804 史国公万病无忧药		22842 代赭丸	497
22782 四君子加竹沥姜汁		酒	493	22843 代赭丸	497
方	491	22805 史国公百病无忧药		22844 代赭丸	497
22783 四君子加姜汁竹沥		酒	494	22845 代赭丸	498
方	491			22846 代赭丸	498
22784 四君子加姜附厚朴		【ノ】		22847 代赭丸	498
汤	491	代		22848 代赭丸	498
22785 四物汤加芩连姜夏		22806 代刀丸	494	22849 代赭丸	498
方	491	22807 代刀散	494	22850 代赭丸	498
22786 四物柴胡苦楝附子		22808 代刀散	494	22851 代赭丸	499
汤	491	22809 代刀散	494	22852 代赭丸	499
22787 四逆加吴茱萸生姜		22810 代刀散	494	22853 代赭丸	499
汤	491	22811 代刀散	494	22854 代赭丸	499
22788 四逆散加五味干姜		22812 代杖丹	494	22855 代赭丸	499
汤	491	22813 代杖汤	494	22856 代赭丸	499
22789 四君子加芍药高良		22814 代杖汤	494	22857 代赭散	499
姜汤	491	22815 代杖散	494	22858 代赭散	499
22790 四君子汤加竹沥姜		22816 代针散	495	22859 代赭膏	499
汁方	491	22817 代针散	495	22860 代五宝散	500
22791 四苓加木瓜厚朴草		22818 代针散	495	22861 代抵当丸	500
果汤	492	22819 代针散	495	22862 代抵当丸	500

22863 代抵当丸	500	22904 仙方膏	505	22947 仙炉脂	510
22864 代抵当汤	500	22905 仙正散	505	22948 仙药散	510
22865 代抵当汤	500	22906 仙术丸	505	22949 仙砂散	510
22866 代抵当汤	500	22907 仙术丸	505	22950 仙胜散	510
22867 代茶新饮	501	22908 仙术丸	505	22951 仙退散	511
22868 代赭石丸	501	22909 仙术汤	506	22952 仙桃丸	511
22869 代赭石丸	501	22910 仙术汤	506	22953 仙桃散	511
22870 代赭石汤	501	22911 仙术饮	506	22954 仙家酒	511
22871 代赭石散	501	22912 仙术散	506	22955 仙梅丸	511
22872 代赭石散	501	22913 仙术散	506	22956 仙菊饮	511
22873 代赭石散	501	22914 仙术散	506	22957 仙雪丸	511
22874 代天宣化丸	501	22915 仙圣散	506	22958 仙授散	511
22875 代天宣化丸	502	22916 仙传方	506	22959 仙鸾方	511
22876 代天宣化丸	502	22917 仙传膏	506	22960 仙掌丸	511
22877 代天宣化丸	502	22918 仙传膏	507	22961 仙鲜散	512
22878 代天宣化丹	502	22919 仙传膏	507	22962 仙螺胶	512
22879 代天宣化丹	502	22920 仙花散	507	22963 仙螺膏	512
22880 代针透脓散	502	22921 仙花膏	507	22964 仙藤散	512
22881 代灸脐脐膏	502	22922 仙饭丸	507	22965 仙露汤	512
22882 代灸涂脐膏	502	22923 仙灵丸	507	22966 仙露汤	512
22883 代抵当汤丸	502	22924 仙灵丸	507	22967 仙露饮	512
22884 代赭扶脾汤	502	22925 仙灵丹	507	22968 仙露梅	512
22885 代赭旋覆汤	502	22926 仙灵酒	507	22969 仙人杖散	513
22886 代赭旋覆汤	502	22927 仙灵酒	507	22970 仙人肢丸	513
22887 代劳鬼哭饮子	503	22928 仙灵散	508	22971 仙术芍散	513
22888 代赭石挨擦丸	503	22929 仙灵散	508	22972 仙传齿药	513
22889 代赭旋覆花汤	503	22930 仙灵散	508	22973 仙传药纸	513
仙		22931 仙灵膏	508	22974 仙传药酒	513
22890 仙枣	503	22932 仙茅丸	508	22975 仙灵脾丸	513
22891 仙酒	503	22933 仙茅丸	508	22976 仙灵脾丸	514
22892 仙酒	503	22934 仙茅丸	508	22977 仙灵脾丸	514
22893 仙酒	503	22935 仙茅丸	509	22978 仙灵脾丸	514
22894 仙膏	503	22936 仙茅丸	509	22979 仙灵脾丸	514
22895 仙人饭	504	22937 仙茅丸	509	22980 仙灵脾酒	514
22896 仙人饮	504	22938 仙茅丸	509	22981 仙灵脾酒	514
22897 仙人散	504	22939 仙茅丸	509	22982 仙灵脾散	514
22898 仙人散	504	22940 仙茅丸	509	22983 仙灵脾散	514
22899 仙人粥	504	22941 仙茅酒	509	22984 仙灵脾散	515
22900 仙人粮	504	22942 仙茅酒	509	22985 仙灵脾散	515
22901 仙子散	504	22943 仙茅酒	510	22986 仙灵脾散	515
22902 仙乌豆	504	22944 仙茅散	510	22987 仙灵脾散	515
22903 仙丹膏	505	22945 仙拈散	510	22988 仙灵脾散	515
		22946 仙乳丸	510	22989 仙灵脾散	515

22990 仙灵脾散	515	23033 仙传万灵膏	522	23076 仙传火龙行气散 ...	528
22991 仙灵脾散	516	23034 仙传化毒汤	522	23077 仙传甘露回生丹 ...	528
22992 仙灵脾散	516	23035 仙传化毒汤	522	23078 仙传四急保生丹 ...	528
22993 仙灵脾散	516	23036 仙传化痞丸	522	23079 仙传史国公浸酒 ...	529
22994 仙灵脾煎	516	23037 仙传化痞锭	522	23080 仙传珊瑚紫金膏 ...	529
22995 仙灵脾煎	516	23038 仙传午时茶	522	23081 仙传保产无忧散 ...	529
22996 仙黄石膏	516	23039 仙传玉露丸	523	23082 仙传保产回生丹 ...	529
22997 仙遗粮丸	516	23040 仙传生牙丹	523	23083 仙传神秘药肚子 ...	529
22998 仙遗粮汤	517	23041 仙传夺命膏	523	23084 仙传神效点眼方 ...	529
22999 仙遗粮汤	517	23042 仙传至宝丹	523	23085 仙传神效梅花丸 ...	530
23000 仙遗粮汤	517	23043 仙传延寿丹	523	23086 仙传救急惊神方 ...	530
23001 仙遗粮汤	517	23044 仙传草还丹	524	23087 仙授立刻回生丹 ...	530
23002 仙遗粮散	517	23045 仙传砂雪丸	524	23088 仙授外伤见血主	
23003 仙鹤草膏	517	23046 仙传保命丹	524	方	531
23004 仙人玉壶丸	517	23047 仙传急惊散	524	23089 仙方解毒生肌定痛	
23005 仙人杖浸酒	517	23048 仙传神效方	524	散	531
23006 仙人炼蜂雪	517	23049 仙传桑叶水	524	23090 仙传通津救命至灵	
23007 仙人掌草方	518	23050 仙传黄金丹	524	丹	532
23008 仙方三补丸	518	23051 仙传救苦丹	524	23091 仙传通津救命至灵	
23009 仙方万安散	518	23052 仙传救苦汤	524	汤	532
23010 仙方万金丸	518	23053 仙传救命丹	524	23092 仙传秋石配合十精	
23011 仙方内消丸	518	23054 仙传惊风丸	524	五子丸	532
23012 仙方化痰丹	519	23055 仙传斑龙丸	525		
23013 仙方牛黄丸	519	23056 仙传斑龙丸	525		
23014 仙方地黄散	519	23057 仙传紫金膏	525		
23015 仙方夺命丹	519	23058 仙传黑虎丹	525		
23016 仙方羊肉丹	519	23059 仙传蟠桃丸	525		
23017 仙方沉麝丸	519	23060 仙灵脾浸酒	525		
23018 仙方固真丹	520	23061 仙灵脾浸酒	526		
23019 仙方刷牙药	520	23062 仙灵脾浸酒	526		
23020 仙方香壳丸	520	23063 仙灵脾浸酒	526		
23021 仙方香棱丸	520	23064 仙灵脾煎丸	526		
23022 仙方活命饮	520	23065 仙茅大益丸	526		
23023 仙方脑麝丸	520	23066 仙授灵宝膏	526		
23024 仙方救命汤	520	23067 仙鸾催生方	526		
23025 仙方椒苓丸	520	23068 仙露还魂饮	527		
23026 仙方隔纸膏	520	23069 仙方如圣饼子	527		
23027 仙方鯪鲤散	521	23070 仙传一块气丸	527		
23028 仙方凝灵膏	521	23071 仙传百草霜丸	527		
23029 仙术木瓜丸	521	23072 仙传种子药酒	527		
23030 仙术茯苓丸	521	23073 仙授神效药纸	527		
23031 仙术通神散	521	23074 仙方点白还黑丹 ...	527		
23032 仙传三妙膏	521	23075 仙传火龙行气法 ...	528		
				外	
				23093 外正膏	532
				23094 外伤散	532
				23095 外贡丹	532
				23096 外护丹	532
				23097 外灸方	533
				23098 外灸膏	533
				23099 外应散	533
				23100 外表汤	533
				23101 外贴散	533
				23102 外食散	533
				23103 外消散	533
				23104 外消膏	533
				23105 外涂膏	533
				23106 外痹汤	534
				23107 外敷膏	534
				23108 外科膏子	534
				23109 外鹿髓丸	534
				23110 外敷神膏	534
				23111 外敷麻药	534

23112 外用消毒药	534	23147 冬瓜羹	538	23190 冬葵子散	542
23113 外台走马汤	534	23148 冬阴散	538	23191 冬葵子散	542
23114 外台茯苓饮	534	23149 冬花烟	538	23192 冬葵子散	543
23115 外证败毒散	534	23150 冬花散	538	23193 冬葵子散	543
23116 外治异功散	534	23151 冬青方	538	23194 冬葵子散	543
23117 外贴异功散	535	23152 冬青汁	538	23195 冬葵子散	543
23118 外科黄连膏	535	23153 冬青汤	539	23196 冬葵子散	543
23119 外科磁砂膏	535	23154 冬青汤	539	23197 冬葵子散	543
23120 外科清心汤	535	23155 冬青散	539	23198 冬葵子散	543
23121 外科蟾酥锭	535	23156 冬菜散	539	23199 冬葵子散	543
23122 外染乌云膏	535	23157 冬除散	539	23200 冬葵子散	543
23123 外浴忍冬汤	535	23158 冬葵汤	539	23201 冬葵子散	543
23124 外痔神消散	535	23159 冬葵散	539	23202 冬葵根汁	544
23125 外感祛邪汤	535	23160 冬葵散	539	23203 冬葵根汤	544
23126 外障皂角丸	536	23161 冬葵散	539	23204 冬葵根汤	544
23127 外敷生肌散	536	23162 冬瓜子汤	539	23205 冬瓜子仁散	544
23128 外敷朴消散	536	23163 冬瓜子散	539	23206 冬瓜洗面药	544
23129 外敷接骨散	536	23164 冬瓜子散	540	23207 冬地三黄汤	544
23130 外接回生神膏	536	23165 冬瓜仁丸	540	23208 冬地百部饮	544
23131 外科至宝千槌膏	536	23166 冬瓜饮子	540	23209 冬虫夏草酒	544
卯		23167 冬瓜饮子	540	23210 冬青槐角丸	544
23132 卯药	536	23168 冬瓜拔刀	540	23211 冬味地黄丸	545
23133 卯戌丸	536	23169 冬青叶煎	540	23212 冬味地黄汤	545
令		23170 冬青补汁	540	23213 冬茯苓贝汤	545
23134 令行吴宫散	536	23171 冬青糖浆	540	23214 冬疫五仙膏	545
孕		23172 冬茄冲剂	540	23215 冬葵草薤散	545
23135 孕妇金花丸	537	23173 冬麻子粥	541	23216 冬季补肾肾沥汤	545
冬		23174 冬麻子粥	541	务	
23136 冬瓜丸	537	23175 冬麻子粥	541	23217 务成子萤火丸	545
23137 冬瓜汤	537	23176 冬麻子粥	541	失	
23138 冬瓜汤	537	23177 冬麻子粥	541	23218 失心丸	545
23139 冬瓜汤	537	23178 冬葵子汤	541	23219 失心方	545
23140 冬瓜汤	537	23179 冬葵子汤	541	23220 失肚丸	545
23141 冬瓜饮	537	23180 冬葵子汤	541	23221 失笑丸	546
23142 冬瓜饮	537	23181 冬葵子汤	541	23222 失笑丸	546
23143 冬瓜饮	538	23182 冬葵子汤	542	23223 失笑丸	546
23144 冬瓜粥	538	23183 冬葵子汤	542	23224 失笑散	546
23145 冬瓜粥	538	23184 冬葵子汤	542	23225 失笑散	547
23146 冬瓜羹	538	23185 冬葵子汤	542	23226 失笑散	547
		23186 冬葵子汤	542	23227 失笑散	547
		23187 冬葵子汤	542	23228 失笑散	547
		23188 冬葵子汤	542		
		23189 冬葵子汤	542		

23229 失笑散	547	23270 生发膏	553	23313 生肌散	558
23230 失笑散	547	23271 生发膏	553	23314 生肌散	558
23231 失笑散	547	23272 生发膏	553	23315 生肌散	558
23232 失笑散	547	23273 生发膏	554	23316 生肌散	558
23233 失笑散	547	23274 生发膏	554	23317 生肌散	558
23234 失笑散	548	23275 生发膏	554	23318 生肌散	558
23235 失笑散	548	23276 生发膏	554	23319 生肌散	559
23236 失笑散	548	23277 生发膏	554	23320 生肌散	559
23237 失笑膏	548	23278 生发膏	554	23321 生肌散	559
23238 失痛散	548	23279 生发膏	554	23322 生肌散	559
23239 失血奇效丸	548	23280 生地汤	555	23323 生肌散	559
生		23281 生地汤	555	23324 生肌散	559
23240 生丸	548	23282 生地汤	555	23325 生肌散	559
23241 生人汤	548	23283 生地饮	555	23326 生肌散	560
23242 生儿丹	549	23284 生地酒	555	23327 生肌散	560
23243 生力散	549	23285 生地散	555	23328 生肌散	560
23244 生化汤	549	23286 生地粥	555	23329 生肌散	560
23245 生化汤	551	23287 生地膏	555	23330 生肌散	560
23246 生化汤	551	23288 生肉方	555	23331 生肌散	560
23247 生化汤	551	23289 生肉膏	555	23332 生肌散	560
23248 生化汤	551	23290 生肉膏	555	23333 生肌散	560
23249 生化汤	551	23291 生肉膏	556	23334 生肌散	560
23250 生化膏	551	23292 生肉膏	556	23335 生肌散	561
23251 生气汤	551	23293 生肉膏	556	23336 生肌散	561
23252 生气汤	551	23294 生肉膏	556	23337 生肌散	561
23253 生气汤	552	23295 生肉膏	556	23338 生肌散	561
23254 生气汤	552	23296 生肉膏	556	23339 生肌散	561
23255 生气散	552	23297 生肉膏	556	23340 生肌散	561
23256 生气散	552	23298 生朱丹	556	23341 生肌散	561
23257 生节散	552	23299 生朱膏	557	23342 生肌散	561
23258 生生丹	552	23300 生血丹	557	23343 生肌散	562
23259 生生汤	552	23301 生血汤	557	23344 生肌散	562
23260 生生膏	552	23302 生血汤	557	23345 生肌散	562
23261 生白丸	552	23303 生肌丸	557	23346 生肌散	562
23262 生瓜散	553	23304 生肌方	557	23347 生肌散	562
23263 生汁汤	553	23305 生肌方	557	23348 生肌散	562
23264 生圣散	553	23306 生肌药	557	23349 生肌散	562
23265 生发方	553	23307 生肌药	557	23350 生肌散	562
23266 生发方	553	23308 生肌药	557	23351 生肌散	562
23267 生发水	553	23309 生肌药	558	23352 生肌散	562
23268 生发酊	553	23310 生肌药	558	23353 生肌散	563
23269 生发药	553	23311 生肌药	558	23354 生肌散	563
		23312 生肌饼	558	23355 生肌散	563

23356 生肌散	563	23399 生肌散	568	23442 生阳丹	574
23357 生肌散	563	23400 生肌散	568	23443 生阳汤	574
23358 生肌散	564	23401 生肌散	568	23444 生肝饮	574
23359 生肌散	564	23402 生肌散	568	23445 生附汤	574
23360 生肌散	564	23403 生肌散	568	23446 生附汤	574
23361 生肌散	564	23404 生肌散	568	23447 生附汤	574
23362 生肌散	564	23405 生肌散	568	23448 生附散	574
23363 生肌散	564	23406 生肌散	569	23449 生附散	574
23364 生肌散	564	23407 生肌散	569	23450 生枣汤	574
23365 生肌散	564	23408 生肌散	569	23451 生势丹	574
23366 生肌散	565	23409 生肌散	569	23452 生明丸	575
23367 生肌散	565	23410 生肌散	569	23453 生明散	575
23368 生肌散	565	23411 生肌散	569	23454 生乳丸	575
23369 生肌散	565	23412 生肌散	569	23455 生乳丹	575
23370 生肌散	565	23413 生肌散	570	23456 生乳灵	575
23371 生肌散	565	23414 生肌散	570	23457 生金丸	575
23372 生肌散	565	23415 生肌散	570	23458 生金汤	575
23373 生肌散	565	23416 生肌膏	571	23459 生金散	575
23374 生肌散	565	23417 生肌膏	571	23460 生金散	575
23375 生肌散	565	23418 生肌膏	571	23461 生肤散	576
23376 生肌散	566	23419 生肌膏	571	23462 生肥散	576
23377 生肌散	566	23420 生肌膏	571	23463 生鱼汤	576
23378 生肌散	566	23421 生肌膏	571	23464 生鱼薄	576
23379 生肌散	566	23422 生肌膏	571	23465 生油方	576
23380 生肌散	566	23423 生肌膏	571	23466 生油方	576
23381 生肌散	566	23424 生肌膏	572	23467 生油汤	576
23382 生肌散	566	23425 生肌膏	572	23468 生油剂	576
23383 生肌散	566	23426 生肌膏	572	23469 生茶散	576
23384 生肌散	566	23427 生肌膏	572	23470 生韭饮	576
23385 生肌散	567	23428 生肌膏	572	23471 生韭饮	576
23386 生肌散	567	23429 生肌膏	572	23472 生胃丸	577
23387 生肌散	567	23430 生肌膏	572	23473 生胃丸	577
23388 生肌散	567	23431 生肌膏	572	23474 生胃丹	577
23389 生肌散	567	23432 生肌膏	573	23475 生胃丹	577
23390 生肌散	567	23433 生肌膏	573	23476 生胃丹	577
23391 生肌散	567	23434 生肌膏	573	23477 生胃散	577
23392 生肌散	567	23435 生肌膏	573	23478 生香散	577
23393 生肌散	567	23436 生肌膏	573	23479 生香膏	578
23394 生肌散	567	23437 生肌膏	573	23480 生香膏	578
23395 生肌散	567	23438 生肌膏	573	23481 生脉汤	578
23396 生肌散	568	23439 生肌膏	573	23482 生脉饮	578
23397 生肌散	568	23440 生肌膏	573	23483 生脉散	578
23398 生肌散	568	23441 生军散	574	23484 生脉散	581

23485 生脉散	581	23528 生姜饮	585	23571 生犀丸	589
23486 生脉散	581	23529 生姜饮	585	23572 生犀丸	590
23487 生脉散	581	23530 生姜饮	585	23573 生犀丸	590
23488 生津丸	581	23531 生姜饮	585	23574 生犀丸	590
23489 生津丸	581	23532 生姜酒	585	23575 生犀丸	590
23490 生津方	581	23533 生姜酒	586	23576 生犀丸	590
23491 生津汤	581	23534 生姜酒	586	23577 生犀丸	590
23492 生津汤	582	23535 生姜散	586	23578 生犀汤	591
23493 生津汤	582	23536 生姜散	586	23579 生犀汤	591
23494 生津饮	582	23537 生姜散	586	23580 生犀饮	591
23495 生津饮	582	23538 生姜散	586	23581 生犀饮	591
23496 生津饮	582	23539 生姜散	586	23582 生犀饮	591
23497 生津散	582	23540 生姜粥	586	23583 生犀饮	591
23498 生津散	582	23541 生姜粥	586	23584 生犀饮	591
23499 生姜丸	582	23542 生姜粥	586	23585 生犀饮	591
23500 生姜丸	582	23543 生姜煎	587	23586 生犀散	591
23501 生姜丸	583	23544 生姜煎	587	23587 生犀散	592
23502 生姜丸	583	23545 生姜煎	587	23588 生犀散	592
23503 生姜丸	583	23546 生姜煎	587	23589 生犀散	592
23504 生姜丸	583	23547 生姜煎	587	23590 生犀散	592
23505 生姜丹	583	23548 生姜煎	587	23591 生犀散	592
23506 生姜汤	583	23549 生姜煎	587	23592 生犀散	592
23507 生姜汤	583	23550 生姜膏	587	23593 生犀散	593
23508 生姜汤	583	23551 生眉散	587	23594 生犀散	593
23509 生姜汤	583	23552 生眉散	587	23595 生犀散	593
23510 生姜汤	584	23553 生眉膏	587	23596 生犀散	593
23511 生姜汤	584	23554 生珠散	587	23597 生犀散	593
23512 生姜汤	584	23555 生珠膏	587	23598 生犀散	593
23513 生姜汤	584	23556 生铁酒	588	23599 生犀散	594
23514 生姜汤	584	23557 生黄散	588	23600 生犀散	594
23515 生姜汤	584	23558 生黄膏	588	23601 生鲈泥	594
23516 生姜汤	584	23559 生银丸	588	23602 生新汤	594
23517 生姜汤	584	23560 生银丸	588	23603 生漆丸	594
23518 生姜汤	584	23561 生银丸	588	23604 生漆汤	594
23519 生姜汤	585	23562 生银汤	588	23605 生漆膏	594
23520 生姜汤	585	23563 生银散	588	23606 生煎汤	594
23521 生姜汤	585	23564 生液丹	588	23607 生熟水	595
23522 生姜汤	585	23565 生葛散	589	23608 生熟汤	595
23523 生姜汤	585	23566 生硫饮	589	23609 生熟饮	595
23524 生姜汤	585	23567 生筋散	589	23610 生熟饮	595
23525 生姜饮	585	23568 生滑汤	589	23611 生熟饮	595
23526 生姜饮	585	23569 生犀丸	589	23612 生熟散	595
23527 生姜饮	585	23570 生犀丸	589	23613 生摩膏	595

23614 生薑散	595	23657 生地黄酒	601	23700 生地黄酒	606
23615 生髓丹	595	23658 生地黄酒	601	23701 生地黄散	606
23616 生木瓜丸	595	23659 生地黄酒	601	23702 生地黄散	606
23617 生木瓜汤	596	23660 生地黄酒	601	23703 生地黄散	606
23618 生牛膝酒	596	23661 生地黄酒	601	23704 生地黄散	606
23619 生甘草膏	596	23662 生地黄酒	601	23705 生地黄散	606
23620 生石斛酒	596	23663 生地黄酒	602	23706 生地黄散	606
23621 生四物汤	596	23664 生地黄酒	602	23707 生地黄散	606
23622 生四物汤	596	23665 生地黄酒	602	23708 生地黄散	607
23623 生四物汤	596	23666 生地黄酒	602	23709 生地黄散	607
23624 生半夏丸	596	23667 生地黄酒	602	23710 生地黄散	607
23625 生半夏汤	597	23668 生地黄酒	602	23711 生地黄散	607
23626 生发软膏	597	23669 生地黄酒	602	23712 生地黄散	607
23627 生发须膏	597	23670 生地黄酒	602	23713 生地黄散	607
23628 生地制散	597	23671 生地黄酒	603	23714 生地黄散	607
23629 生地黄丸	597	23672 生地黄酒	603	23715 生地黄散	608
23630 生地黄丸	597	23673 生地黄酒	603	23716 生地黄散	608
23631 生地黄丸	598	23674 生地黄酒	603	23717 生地黄散	608
23632 生地黄丸	598	23675 生地黄酒	603	23718 生地黄散	608
23633 生地黄丸	598	23676 生地黄酒	603	23719 生地黄散	608
23634 生地黄丸	598	23677 生地黄酒	603	23720 生地黄散	608
23635 生地黄丸	598	23678 生地黄酒	603	23721 生地黄散	608
23636 生地黄丸	598	23679 生地黄酒	603	23722 生地黄散	608
23637 生地黄酒	598	23680 生地黄酒	603	23723 生地黄散	608
23638 生地黄酒	598	23681 生地黄酒	603	23724 生地黄散	608
23639 生地黄酒	598	23682 生地黄酒	603	23725 生地黄散	608
23640 生地黄酒	598	23683 生地黄酒	604	23726 生地黄粥	608
23641 生地黄酒	599	23684 生地黄酒	604	23727 生地黄粥	608
23642 生地黄酒	599	23685 生地黄酒	604	23728 生地黄粥	608
23643 生地黄酒	599	23686 生地黄饮	604	23729 生地黄粥	608
23644 生地黄酒	599	23687 生地黄饮	604	23730 生地黄粥	608
23645 生地黄酒	599	23688 生地黄饮	604	23731 生地黄粥	609
23646 生地黄酒	599	23689 生地黄饮	604	23732 生地黄煎	609
23647 生地黄酒	600	23690 生地黄饮	604	23733 生地黄煎	609
23648 生地黄酒	600	23691 生地黄饮	605	23734 生地黄煎	609
23649 生地黄酒	600	23692 生地黄饮	605	23735 生地黄煎	609
23650 生地黄酒	600	23693 生地黄饮	605	23736 生地黄煎	609
23651 生地黄酒	600	23694 生地黄饮	605	23737 生地黄煎	609
23652 生地黄酒	601	23695 生地黄饮	605	23738 生地黄煎	610
23653 生地黄酒	601	23696 生地黄饮	605	23739 生地黄煎	610
23654 生地黄酒	601	23697 生地黄饮	605	23740 生地黄煎	610
23655 生地黄酒	601	23698 生地黄饮	605	23741 生地黄煎	610
23656 生地黄酒	601	23699 生地黄鸡	605	23742 生地黄煎	610

23743 生地黄煎	610	23786 生姜汁酒	615	23829 生干地黄丸	620
23744 生地黄煎	610	23787 生姜汁煎	615	23830 生干地黄丸	620
23745 生地黄煎	611	23788 生姜汁煎	615	23831 生干地黄丸	620
23746 生地黄煎	611	23789 生姜枣汤	615	23832 生干地黄丸	620
23747 生地黄煎	611	23790 生姜拔刀	615	23833 生干地黄丸	620
23748 生地黄煎	611	23791 生姜浴汤	615	23834 生干地黄丸	620
23749 生地黄煎	611	23792 生姜煎丸	616	23835 生干地黄丸	620
23750 生地黄煎	611	23793 生姜煎丸	616	23836 生干地黄汤	620
23751 生地黄煎	611	23794 生姜醋浆	616	23837 生干地黄酒	621
23752 生地黄煎	612	23795 生眉毛方	616	23838 生干地黄散	621
23753 生地黄煎	612	23796 生铁落汤	616	23839 生干地黄散	621
23754 生地黄煎	612	23797 生铁落饮	616	23840 生干地黄散	621
23755 生地黄煎	612	23798 生铁落饮	616	23841 生干地黄散	621
23756 生地黄煎	612	23799 生铁落饮	616	23842 生干地黄散	621
23757 生地黄膏	612	23800 生铁落饮	616	23843 生干地黄散	621
23758 生地黄膏	612	23801 生菖蒲酒	617	23844 生干地黄散	621
23759 生地黄膏	612	23802 生萝卜粥	617	23845 生干地黄散	622
23760 生地黄膏	612	23803 生庵金汁	617	23846 生干地黄散	622
23761 生地黄膏	612	23804 生葛汁饮	617	23847 生干地黄散	622
23762 生地黄膏	613	23805 生葛饮子	617	23848 生干地黄散	622
23763 生地黄膏	613	23806 生葛根汤	617	23849 生干地黄散	622
23764 生地黄膏	613	23807 生硫黄丸	617	23850 生干地黄散	622
23765 生地黄膏	613	23808 生犀饮子	617	23851 生干地黄散	622
23766 生地黄膏	613	23809 生犀角丸	617	23852 生干地黄散	623
23767 生地黄膏	613	23810 生犀角丸	618	23853 生干地黄散	623
23768 生地黄膏	613	23811 生犀角丸	618	23854 生干地黄散	623
23769 生地黄膏	613	23812 生犀角散	618	23855 生干地黄散	623
23770 生舌仙丹	613	23813 生犀角散	618	23856 生干地黄散	623
23771 生肌白膏	613	23814 生犀角散	618	23857 生干地黄散	623
23772 生肌肉散	614	23815 生蒲黄汤	618	23858 生干地黄散	623
23773 生肌药丁	614	23816 生嘉禾散	618	23859 生干地黄散	623
23774 生肌神散	614	23817 生蜜粉方	618	23860 生干地黄散	624
23775 生苈根散	614	23818 生蜜涂方	618	23861 生干地黄散	624
23776 生芦根汤	614	23819 生鲤鱼汤	618	23862 生干地黄散	624
23777 生芦根饮	614	23820 生熟地汤	619	23863 生干地黄散	624
23778 生芦根粥	614	23821 生熟饮子	619	23864 生干地黄散	624
23779 生附子汤	614	23822 生熟饮子	619	23865 生干地黄散	624
23780 生附子散	614	23823 生熟饮子	619	23866 生干地黄散	624
23781 生鸡子酒	615	23824 生薯药酒	619	23867 生干地黄散	625
23782 生枣仁汤	615	23825 生薯药酒	619	23868 生干地黄散	625
23783 生虎骨丸	615	23826 生薯药羹	619	23869 生干地黄散	625
23784 生乳糖浆	615	23827 生藕汁饮	619	23870 生干地黄散	625
23785 生南星汤	615	23828 生藕汁饮	619	23871 生干地黄散	625

23872 生车前草饮	625	23915 生地黄连汤	630	23958 生肌五宝丹	634
23873 生化六和汤	625	23916 生地黄饮子	630	23959 生肌太乙膏	634
23874 生化夺命汤	625	23917 生地黄饮子	630	23960 生肌长肉膏	635
23875 生化安神汤	625	23918 生地黄饮子	630	23961 生肌长肉膏	635
23876 生化补元汤	626	23919 生地黄饮子	630	23962 生肌长肉膏	635
23877 生化消食汤	626	23920 生地黄饮子	630	23963 生肌凤雏膏	635
23878 生化益气汤	626	23921 生地黄饮子	630	23964 生肌玉红丹	635
23879 生化通经汤	626	23922 生地黄饮子	630	23965 生肌玉红膏	635
23880 生气养胃丸	626	23923 生地黄饮子	630	23966 生肌地栗粉	635
23881 生气救脱汤	626	23924 生地黄饮子	630	23967 生肌收口膏	636
23882 生发一号丸	626	23925 生地黄饮子	631	23968 生肌红玉丹	636
23883 生发二号丸	627	23926 生地黄饮子	631	23969 生肌完肤散	636
23884 生发泽兰膏	627	23927 生地黄饮子	631	23970 生肌青龙散	636
23885 生发墙衣散	627	23928 生地黄饮子	631	23971 生肌拔毒散	636
23886 生地八味汤	627	23929 生地黄饮子	631	23972 生肌定痛散	636
23887 生地八物汤	627	23930 生地黄饮子	631	23973 生肌定痛散	636
23888 生地车前散	627	23931 生地黄饮子	631	23974 生肌定痛散	636
23889 生地化毒汤	627	23932 生地黄饮子	632	23975 生肌珍珠散	636
23890 生地升麻汤	627	23933 生地黄煎丸	632	23976 生肌护肤膏	637
23891 生地丹皮汤	627	23934 生地黄煎丸	632	23977 生肌神秘散	637
23892 生地丹参汤	627	23935 生地黄煎丸	632	23978 生肌桃红散	637
23893 生地四物汤	627	23936 生地清肺饮	632	23979 生肌桃花散	637
23894 生地四物汤	627	23937 生地清肺饮	632	23980 生肌桃花散	637
23895 生地冬苓汤	628	23938 生地榆根汤	632	23981 生肌梅花散	637
23896 生地玄参汤	628	23939 生肉地黄膏	632	23982 生肌蛇衔膏	637
23897 生地玄参汤	628	23940 生肉芎藭散	632	23983 生阴开结汤	637
23898 生地芍药汤	628	23941 生肉神异膏	632	23984 生阴止泻丹	637
23899 生地芍药汤	628	23942 生肉黄香膏	633	23985 生阴止泻汤	637
23900 生地麦冬饮	628	23943 生肉黄香膏	633	23986 生阴壮髓丹	638
23901 生地芩连汤	628	23944 生血止崩汤	633	23987 生麦门冬汤	638
23902 生地芩连汤	628	23945 生血补气汤	633	23988 生麦门冬汤	638
23903 生地芩连汤	628	23946 生血补髓汤	633	23989 生麦门冬汤	638
23904 生地芩连汤	628	23947 生血补髓汤	633	23990 生麦门冬煎	638
23905 生地芩连汤	628	23948 生血起废汤	633	23991 生麦门冬煎	638
23906 生地连翘散	629	23949 生血润肤汤	633	23992 生麦益阴煎	638
23907 生地败毒散	629	23950 生血润肤饮	633	23993 生秃乌云油	638
23908 生地梔子汤	629	23951 生血润燥饮	634	23994 生附四君汤	638
23909 生地骨皮汤	629	23952 生血润燥汤	634	23995 生附白术汤	638
23910 生地养阴汤	629	23953 生肌丁香膏	634	23996 生附除湿汤	638
23911 生地益阴汤	629	23954 生肌七宝丹	634	23997 生鸡桃花散	639
23912 生地黄汁汤	629	23955 生肌八宝丹	634	23998 生金牛黄汤	639
23913 生地黄汁散	629	23956 生肌八宝丹	634	23999 生金滋水饮	639
23914 生地黄连汤	630	23957 生肌干脐散	634	24000 生枸杞子酒	639

24001 生胃进食汤	639	24044 生姜泻心汤	645	24087 生熟地黄丸	649
24002 生脉六均汤	639	24045 生姜枳壳汤	645	24088 生熟地黄丸	649
24003 生脉地黄汤	639	24046 生姜枳实汤	645	24089 生熟地黄丸	649
24004 生脉补中汤	639	24047 生姜香薷汤	645	24090 生熟地黄丸	650
24005 生脉补精汤	639	24048 生姜益元煎	645	24091 生熟地黄丸	650
24006 生脉建中汤	640	24049 生姜理中汤	646	24092 生熟地黄丸	650
24007 生脉保元汤	640	24050 生姜橘皮丸	646	24093 生熟地黄丸	650
24008 生脉健脾汤	640	24051 生姜橘皮丸	646	24094 生熟地黄丸	650
24009 生津止渴丸	640	24052 生姜橘皮汤	646	24095 生熟地黄汤	650
24010 生津止嗽膏	640	24053 生香灵仙汤	646	24096 生熟地黄汤	651
24011 生津去燥汤	640	24054 生料五苓散	646	24097 生熟地黄汤	651
24012 生津甘露汤	640	24055 生料五积散	646	24098 生熟地黄汤	651
24013 生津甘露饮	641	24056 生料五积散	646	24099 生熟地黄汤	651
24014 生津甘露饮	641	24057 生料平胃散	646	24100 生熟地黄汤	651
24015 生津甘露饮	641	24058 生料平胃散	646	24101 生熟地黄汤	651
24016 生津四物汤	641	24059 生料正元饮	646	24102 生熟地黄散	651
24017 生津四物汤	641	24060 生料四物汤	646	24103 生熟地黄散	651
24018 生津代茶饮	641	24061 生料鸡苏散	646	24104 生熟附子汤	651
24019 生津地黄汤	641	24062 生料固本丸	646	24105 生熟解毒丸	651
24020 生津麦冬汤	641	24063 生料健脾丸	646	24106 生熟罂粟丸	652
24021 生津利水饮	641	24064 生料调气散	647	24107 生蟹足敷方	652
24022 生津补血汤	641	24065 生料鹿茸丸	647	24108 生髓育麟丹	652
24023 生津和胃方	641	24066 生料鹿茸丸	647	24109 生干地黄浸酒	652
24024 生津养血汤	642	24067 生益母草饮	647	24110 生牛膝漱口煎	652
24025 生津起痿汤	642	24068 生商陆汁方	647	24111 生地黄七味汤	652
24026 生津润肺丸	642	24069 生液寄生散	647	24112 生地黄汁饮子	652
24027 生津益液汤	642	24070 生葛汁饮子	647	24113 生地黄涂敷方	653
24028 生津葛根汤	642	24071 生脾助阳汤	647	24114 生地黄黄连汤	653
24029 生姜五苓汤	642	24072 生犀天麻丸	647	24115 生肌麒麟散	653
24030 生姜平胃散	642	24073 生犀天麻丸	647	24116 生芦根五味饮	653
24031 生姜甘草汤	642	24074 生犀牛黄丸	648	24117 生附四君子汤	653
24032 生姜甘桔汤	643	24075 生犀升麻汤	648	24118 生附四君子汤	653
24033 生姜生附汤	643	24076 生犀半夏丸	648	24119 生津甘露饮子	653
24034 生姜白糖汤	643	24077 生犀地黄汤	648	24120 生津地黄饮子	654
24035 生姜半夏汤	643	24078 生犀角饮子	648	24121 生姜小便饮子	654
24036 生姜半夏汤	643	24079 生犀鸡苏丸	648	24122 生姜五味子汤	654
24037 生姜半夏汤	644	24080 生犀复明散	648	24123 生姜汁半夏汤	654
24038 生姜竹茹汤	644	24081 生犀香薷丸	648	24124 生姜汁灌耳方	654
24039 生姜竹茹汤	644	24082 生犀葡萄酒	649	24125 生葛根三味汤	654
24040 生姜附子汤	644	24083 生精种子丸	649	24126 生精种子奇方	654
24041 生姜和中汤	644	24084 生熟二地汤	649	24127 生发神效黑豆膏	654
24042 生姜泄肠汤	644	24085 生熟三黄汤	649	24128 生地黄煎破血丸	654
24043 生姜泻心汤	644	24086 生熟地黄丸	649	24129 生血地黄百花丸	655

24130	生肌乌贼鱼骨散	… 655	24171	白丸子	… 661	24214	白云丹	… 665
24131	生芦根八味饮子	… 655	24172	白丸子	… 662	24215	白云散	… 665
24132	生脉散加香薷方	… 655	24173	白丸子	… 662	24216	白云散	… 665
24133	生脉散合柑桔汤	… 655	24174	白丸子	… 662	24217	白云散	… 665
24134	生津止渴益水饮	… 655	24175	白丸子	… 662	24218	白王丹	… 666
24135	生津凉血葛根汤	… 655	24176	白丸子	… 662	24219	白牙药	… 666
24136	生姜半夏泻心汤	… 656	24177	白丸子	… 662	24220	白牙药	… 666
24137	生姜温中下气汤	… 656	24178	白丸子	… 662	24221	白牙散	… 666
24138	生料木香匀气散	… 656	24179	白丸子	… 662	24222	白牙散	… 666
24139	生萝摩汁涂敷方	… 656	24180	白丸子	… 662	24223	白牙散	… 666
	白		24181	白丸子	… 662	24224	白牙散	… 666
			24182	白丸子	… 662	24225	白牙散	… 666
24140	白丸	… 656	24183	白丸子	… 662	24226	白牙散	… 666
24141	白丸	… 656	24184	白丸散	… 663	24227	白牙散	… 666
24142	白丸	… 656	24185	白及丸	… 663	24228	白凤丸	… 667
24143	白丹	… 657	24186	白及汤	… 663	24229	白凤丸	… 667
24144	白丹	… 657	24187	白及肺	… 663	24230	白凤丸	… 667
24145	白丹	… 657	24188	白及散	… 663	24231	白凤丹	… 667
24146	白丹	… 657	24189	白及散	… 663	24232	白凤丹	… 667
24147	白丹	… 657	24190	白及散	… 663	24233	白凤饮	… 668
24148	白药	… 657	24191	白及散	… 663	24234	白凤散	… 668
24149	白散	… 657	24192	白及散	… 663	24235	白凤膏	… 668
24150	白散	… 659	24193	白及散	… 663	24236	白凤膏	… 668
24151	白膏	… 659	24194	白及散	… 663	24237	白丑散	… 669
24152	白膏	… 659	24195	白及散	… 664	24238	白玉丸	… 669
24153	白膏	… 659	24196	白及散	… 664	24239	白玉丸	… 669
24154	白膏	… 659	24197	白及散	… 664	24240	白玉丸	… 669
24155	白膏	… 659	24198	白及散	… 664	24241	白玉丸	… 669
24156	白膏	… 660	24199	白及散	… 664	24242	白玉丸	… 669
24157	白膏	… 660	24200	白及散	… 664	24243	白玉丹	… 669
24158	白膏	… 660	24201	白及散	… 664	24244	白玉丹	… 669
24159	白膏	… 660	24202	白及散	… 664	24245	白玉丹	… 670
24160	白膏	… 660	24203	白及锭	… 664	24246	白玉丹	… 670
24161	白膏	… 660	24204	白及膏	… 664	24247	白玉丹	… 670
24162	白丁散	… 660	24205	白及膏	… 664	24248	白玉汤	… 670
24163	白丸子	… 660	24206	白及膏	… 664	24249	白玉顶	… 670
24164	白丸子	… 660	24207	白及膏	… 664	24250	白玉饼	… 670
24165	白丸子	… 660	24208	白及膏	… 665	24251	白玉散	… 670
24166	白丸子	… 661	24209	白及膏	… 665	24252	白玉散	… 670
24167	白丸子	… 661	24210	白马饮	… 665	24253	白玉散	… 670
24168	白丸子	… 661	24211	白马饮	… 665	24254	白玉散	… 670
24169	白丸子	… 661	24212	白云丸	… 665	24255	白玉散	… 671
24170	白丸子	… 661	24213	白云丹	… 665	24256	白玉散	… 671

24257 白玉散	671	24300 白术丸	677	24343 白术丸	683
24258 白玉錠	671	24301 白术丸	677	24344 白术丸	683
24259 白玉膏	671	24302 白术丸	677	24345 白术丸	683
24260 白玉膏	671	24303 白术丸	678	24346 白术丸	683
24261 白玉膏	672	24304 白术丸	678	24347 白术丸	683
24262 白玉膏	672	24305 白术丸	678	24348 白术丸	683
24263 白玉膏	672	24306 白术丸	678	24349 白术丸	683
24264 白玉膏	672	24307 白术丸	678	24350 白术丸	683
24265 白玉膏	672	24308 白术丸	678	24351 白术丸	684
24266 白玉膏	672	24309 白术丸	679	24352 白术丸	684
24267 白玉膏	672	24310 白术丸	679	24353 白术丸	684
24268 白玉膏	673	24311 白术丸	679	24354 白术丸	684
24269 白玉膏	673	24312 白术丸	679	24355 白术丸	684
24270 白玉膏	673	24313 白术丸	679	24356 白术丸	684
24271 白玉膏	673	24314 白术丸	679	24357 白术丸	684
24272 白玉膏	673	24315 白术丸	679	24358 白术丸	684
24273 白玉膏	673	24316 白术丸	680	24359 白术丸	684
24274 白玉膏	673	24317 白术丸	680	24360 白术丸	685
24275 白玉膏	673	24318 白术丸	680	24361 白术丸	685
24276 白玉膏	673	24319 白术丸	680	24362 白术丸	685
24277 白玉膏	674	24320 白术丸	680	24363 白术丸	685
24278 白玉膏	674	24321 白术丸	680	24364 白术汤	685
24279 白玉膏	674	24322 白术丸	680	24365 白术汤	685
24280 白玉膏	674	24323 白术丸	680	24366 白术汤	685
24281 白玉膏	674	24324 白术丸	681	24367 白术汤	685
24282 白玉膏	674	24325 白术丸	681	24368 白术汤	686
24283 白玉膏	674	24326 白术丸	681	24369 白术汤	686
24284 白玉霜	674	24327 白术丸	681	24370 白术汤	686
24285 白玉露	674	24328 白术丸	681	24371 白术汤	686
24286 白朮子	675	24329 白术丸	681	24372 白术汤	686
24287 白朮药	675	24330 白术丸	681	24373 白术汤	686
24288 白朮丸	675	24331 白术丸	681	24374 白术汤	686
24289 白朮丸	675	24332 白术丸	682	24375 白术汤	687
24290 白朮丸	675	24333 白术丸	682	24376 白术汤	687
24291 白朮丸	676	24334 白术丸	682	24377 白术汤	687
24292 白朮丸	676	24335 白术丸	682	24378 白术汤	687
24293 白朮丸	676	24336 白术丸	682	24379 白术汤	687
24294 白朮丸	676	24337 白术丸	682	24380 白术汤	687
24295 白朮丸	676	24338 白术丸	682	24381 白术汤	687
24296 白朮丸	675	24339 白术丸	682	24382 白术汤	687
24297 白朮丸	677	24340 白术丸	682	24383 白术汤	687
24298 白朮丸	677	24341 白术丸	683	24384 白术汤	688
24299 白朮丸	677	24342 白术丸	683	24385 白术汤	688

24386 白术汤	688	24429 白术汤	696	24472 白术酒	700
24387 白术汤	688	24430 白术汤	696	24473 白术散	700
24388 白术汤	688	24431 白术汤	696	24474 白术散	700
24389 白术汤	688	24432 白术汤	696	24475 白术散	700
24390 白术汤	688	24433 白术汤	696	24476 白术散	701
24391 白术汤	688	24434 白术汤	696	24477 白术散	701
24392 白术汤	689	24435 白术汤	696	24478 白术散	701
24393 白术汤	689	24436 白术汤	696	24479 白术散	701
24394 白术汤	691	24437 白术汤	696	24480 白术散	701
24395 白术汤	692	24438 白术汤	696	24481 白术散	701
24396 白术汤	692	24439 白术汤	696	24482 白术散	701
24397 白术汤	692	24440 白术汤	697	24483 白术散	702
24398 白术汤	692	24441 白术汤	697	24484 白术散	702
24399 白术汤	692	24442 白术汤	697	24485 白术散	702
24400 白术汤	692	24443 白术汤	697	24486 白术散	702
24401 白术汤	692	24444 白术汤	697	24487 白术散	702
24402 白术汤	692	24445 白术汤	697	24488 白术散	702
24403 白术汤	692	24446 白术汤	697	24489 白术散	703
24404 白术汤	692	24447 白术汤	697	24490 白术散	703
24405 白术汤	693	24448 白术汤	697	24491 白术散	703
24406 白术汤	693	24449 白术汤	697	24492 白术散	703
24407 白术汤	693	24450 白术汤	697	24493 白术散	703
24408 白术汤	693	24451 白术汤	697	24494 白术散	703
24409 白术汤	693	24452 白术汤	697	24495 白术散	703
24410 白术汤	693	24453 白术汤	697	24496 白术散	704
24411 白术汤	693	24454 白术汤	698	24497 白术散	704
24412 白术汤	693	24455 白术汤	698	24498 白术散	704
24413 白术汤	693	24456 白术汤	698	24499 白术散	704
24414 白术汤	694	24457 白术汤	698	24500 白术散	704
24415 白术汤	694	24458 白术汤	698	24501 白术散	704
24416 白术汤	694	24459 白术饮	698	24502 白术散	704
24417 白术汤	694	24460 白术饮	698	24503 白术散	705
24418 白术汤	694	24461 白术饮	698	24504 白术散	705
24419 白术汤	694	24462 白术饮	698	24505 白术散	705
24420 白术汤	694	24463 白术饮	698	24506 白术散	705
24421 白术汤	694	24464 白术饮	699	24507 白术散	705
24422 白术汤	695	24465 白术饮	699	24508 白术散	705
24423 白术汤	695	24466 白术酒	699	24509 白术散	706
24424 白术汤	695	24467 白术酒	699	24510 白术散	706
24425 白术汤	695	24468 白术酒	699	24511 白术散	706
24426 白术汤	695	24469 白术酒	699	24512 白术散	706
24427 白术汤	695	24470 白术酒	699	24513 白术散	706
24428 白术汤	696	24471 白术酒	699	24514 白术散	706

24515	白术散	706	24558	白术散	713	24601	白术散	720
24516	白术散	707	24559	白术散	713	24602	白术散	720
24517	白术散	707	24560	白术散	713	24603	白术散	721
24518	白术散	707	24561	白术散	713	24604	白术散	721
24519	白术散	707	24562	白术散	713	24605	白术散	721
24520	白术散	707	24563	白术散	714	24606	白术散	721
24521	白术散	707	24564	白术散	714	24607	白术散	721
24522	白术散	707	24565	白术散	714	24608	白术散	721
24523	白术散	708	24566	白术散	714	24609	白术散	722
24524	白术散	708	24567	白术散	714	24610	白术散	722
24525	白术散	708	24568	白术散	714	24611	白术散	722
24526	白术散	708	24569	白术散	714	24612	白术散	722
24527	白术散	708	24570	白术散	714	24613	白术散	722
24528	白术散	708	24571	白术散	715	24614	白术散	722
24529	白术散	708	24572	白术散	715	24615	白术散	722
24530	白术散	709	24573	白术散	715	24616	白术散	722
24531	白术散	709	24574	白术散	715	24617	白术散	722
24532	白术散	709	24575	白术散	715	24618	白术散	723
24533	白术散	709	24576	白术散	715	24619	白术散	723
24534	白术散	709	24577	白术散	716	24620	白术散	723
24535	白术散	709	24578	白术散	716	24621	白术散	723
24536	白术散	709	24579	白术散	716	24622	白术散	723
24537	白术散	710	24580	白术散	716	24623	白术散	723
24538	白术散	710	24581	白术散	716	24624	白术散	723
24539	白术散	710	24582	白术散	716	24625	白术散	723
24540	白术散	710	24583	白术散	716	24626	白术散	723
24541	白术散	710	24584	白术散	716	24627	白术散	723
24542	白术散	710	24585	白术散	717	24628	白术散	723
24543	白术散	710	24586	白术散	717	24629	白术散	724
24544	白术散	711	24587	白术散	717	24630	白术散	724
24545	白术散	711	24588	白术散	717	24631	白术散	724
24546	白术散	711	24589	白术散	717	24632	白术散	724
24547	白术散	711	24590	白术散	718	24633	白术散	724
24548	白术散	711	24591	白术散	718	24634	白术散	724
24549	白术散	711	24592	白术散	718	24635	白术散	724
24550	白术散	712	24593	白术散	718	24636	白术散	724
24551	白术散	712	24594	白术散	718	24637	白术散	724
24552	白术散	712	24595	白术散	719	24638	白术散	724
24553	白术散	712	24596	白术散	719	24639	白术散	724
24554	白术散	712	24597	白术散	719	24640	白术散	724
24555	白术散	712	24598	白术散	720	24641	白术散	724
24556	白术散	712	24599	白术散	720	24642	白术散	724
24557	白术散	713	24600	白术散	720	24643	白术散	725

24644 白术散	725	24687 白龙散	730	24730 白豆散	734
24645 白术散	725	24688 白龙散	730	24731 白芷丸	734
24646 白术散	725	24689 白龙散	730	24732 白芷丸	734
24647 白术散	725	24690 白龙散	730	24733 白芷丸	734
24648 白术散	725	24691 白龙散	730	24734 白芷丸	734
24649 白术散	725	24692 白龙散	730	24735 白芷丸	734
24650 白术煎	725	24693 白龙散	730	24736 白芷丸	735
24651 白术煎	725	24694 白龙散	730	24737 白芷丸	735
24652 白术膏	725	24695 白龙散	730	24738 白芷丸	735
24653 白术膏	725	24696 白龙散	731	24739 白芷汤	735
24654 白术膏	726	24697 白龙散	731	24740 白芷汤	735
24655 白术膏	726	24698 白龙散	731	24741 白芷汤	735
24656 白术膏	726	24699 白龙散	731	24742 白芷汤	736
24657 白术膏	726	24700 白龙膏	731	24743 白芷汤	736
24658 白术膏	726	24701 白龙膏	731	24744 白芷散	736
24659 白石方	726	24702 白龙膏	731	24745 白芷散	736
24660 白龙丸	726	24703 白龙膏	731	24746 白芷散	736
24661 白龙丸	727	24704 白龙膏	731	24747 白芷散	736
24662 白龙丸	727	24705 白龙膏	732	24748 白芷散	736
24663 白龙丸	727	24706 白龙膏	732	24749 白芷散	736
24664 白龙丸	727	24707 白龙膏	732	24750 白芷散	736
24665 白龙丸	727	24708 白归汤	732	24751 白芷散	736
24666 白龙丸	727	24709 白瓜丸	732	24752 白芷散	736
24667 白龙丸	728	24710 白头兵	732	24753 白芷散	737
24668 白龙丸	728	24711 白圣散	732	24754 白芷散	737
24669 白龙丸	728	24712 白圣散	732	24755 白芷散	737
24670 白龙丸	728	24713 白皮散	732	24756 白芷散	737
24671 白龙丸	728	24714 白芍汤	732	24757 白芷散	737
24672 白龙丸	728	24715 白芍汤	733	24758 白芷散	737
24673 白龙丸	728	24716 白芍汤	733	24759 白芷散	737
24674 白龙丸	728	24717 白灰散	733	24760 白芷散	737
24675 白龙丸	728	24718 白灰散	733	24761 白芷散	737
24676 白龙丸	728	24719 白灰散	733	24762 白芷散	737
24677 白龙丹	729	24720 白吊药	733	24763 白芷散	738
24678 白龙丹	729	24721 白华散	733	24764 白芷散	738
24679 白龙丹	729	24722 白衣丸	733	24765 白芷散	738
24680 白龙丹	729	24723 白灯散	733	24766 白芷散	738
24681 白龙丹	729	24724 白米饮	733	24767 白芷散	738
24682 白龙丹	729	24725 白米粉	734	24768 白芷散	738
24683 白龙汤	729	24726 白杨汤	734	24769 白芷散	738
24684 白龙散	729	24727 白杨醋	734	24770 白芷散	738
24685 白龙散	730	24728 白豆顶	734	24771 白芷散	738
24686 白龙散	730	24729 白豆散	734	24772 白芷散	738

24773 白芷散	738	24816 白灵药	743	24859 白矾丸	748
24774 白芷散	739	24817 白附丸	743	24860 白矾丸	748
24775 白芷散	739	24818 白附丸	743	24861 白矾汤	748
24776 白芷散	739	24819 白附丸	743	24862 白矾汤	748
24777 白芷散	739	24820 白附丸	743	24863 白矾汤	748
24778 白芷散	739	24821 白附丸	744	24864 白矾酊	748
24779 白芷散	739	24822 白附丹	744	24865 白矾散	748
24780 白芷散	739	24823 白附汤	744	24866 白矾散	748
24781 白芷散	739	24824 白附饮	744	24867 白矾散	749
24782 白芷散	739	24825 白附饮	744	24868 白矾散	749
24783 白芷散	739	24826 白附散	744	24869 白矾散	749
24784 白芷散	739	24827 白附散	744	24870 白矾散	749
24785 白芷膏	739	24828 白附散	744	24871 白矾散	749
24786 白芷膏	740	24829 白鸡汤	744	24872 白矾散	749
24787 白芷膏	740	24830 白驳片	744	24873 白矾散	749
24788 白芷膏	740	24831 白英丸	745	24874 白矾散	749
24789 白芷膏	740	24832 白英丹	745	24875 白矾散	749
24790 白芷膏	740	24833 白英散	745	24876 白矾散	749
24791 白芷膏	740	24834 白苓汤	745	24877 白矾散	750
24792 白芷膏	740	24835 白茅汤	745	24878 白矾散	750
24793 白芷膏	740	24836 白茅汤	745	24879 白矾散	750
24794 白芷膏	741	24837 白茅汤	745	24880 白矾散	750
24795 白芷膏	741	24838 白茅散	745	24881 白矾散	750
24796 白花饮	741	24839 白茅煎	745	24882 白矾散	750
24797 白花散	741	24840 白矾丸	745	24883 白矾散	750
24798 白花散	741	24841 白矾丸	746	24884 白矾散	750
24799 白花散	741	24842 白矾丸	746	24885 白矾散	751
24800 白花膏	741	24843 白矾丸	746	24886 白矾散	751
24801 白花膏	741	24844 白矾丸	746	24887 白矾散	751
24802 白芥丸	741	24845 白矾丸	746	24888 白矾散	751
24803 白芥丸	741	24846 白矾丸	746	24889 白矾散	751
24804 白杏膏	742	24847 白矾丸	746	24890 白矾散	751
24805 白连散	742	24848 白矾丸	747	24891 白矾散	751
24806 白吹药	742	24849 白矾丸	747	24892 白矾散	751
24807 白围药	742	24850 白矾丸	747	24893 白矾散	751
24808 白疔散	742	24851 白矾丸	747	24894 白矾散	751
24809 白疔丸	742	24852 白矾丸	747	24895 白矾散	752
24810 白沙丹	742	24853 白矾丸	747	24896 白矾散	752
24811 白灵丹	742	24854 白矾丸	747	24897 白矾散	752
24812 白灵丹	742	24855 白矾丸	747	24898 白矾散	752
24813 白灵药	743	24856 白矾丸	747	24899 白矾散	752
24814 白灵药	743	24857 白矾丸	747	24900 白矾散	752
24815 白灵药	743	24858 白矾丸	747	24901 白矾散	752

24902 白矾散	752	24945 白金散	758	24988 白带散	765
24903 白矾散	752	24946 白金散	758	24989 白垩丸	765
24904 白矾散	752	24947 白金散	759	24990 白垩丸	766
24905 白矾散	752	24948 白金散	759	24991 白垩丸	766
24906 白矾散	752	24949 白金散	759	24992 白垩丸	766
24907 白矾散	752	24950 白金散	759	24993 白垩丸	766
24908 白矾散	753	24951 白金散	759	24994 白垩丸	766
24909 白矾煎	753	24952 白金膏	759	24995 白垩丸	766
24910 白矾煎	753	24953 白鱼酒	759	24996 白垩丹	767
24911 白矾煎	753	24954 白鱼膏	759	24997 白垩散	767
24912 白矾膏	753	24955 白鱼膏	759	24998 白砂丹	767
24913 白矾膏	753	24956 白兔丸	759	24999 白砂丹	767
24914 白虎丸	753	24957 白油膏	760	25000 白面丸	767
24915 白虎丸	753	24958 白沸汤	760	25001 白面饼	767
24916 白虎丸	753	24959 白泽丸	760	25002 白骨膏	767
24917 白虎丸	754	24960 白降丹	760	25003 白香丸	767
24918 白虎丹	754	24961 白降丹	760	25004 白香散	767
24919 白虎丹	754	24962 白降丹	761	25005 白香散	767
24920 白虎丹	754	24963 白降丹	761	25006 白麝丹	768
24921 白虎丹	754	24964 白玉膏	762	25007 白饼子	768
24922 白虎汤	754	24965 白垢散	762	25008 白饼子	768
24923 白虎汤	756	24966 白柘汤	762	25009 白饼子	768
24924 白虎汤	756	24967 白柏丸	762	25010 白前丸	768
24925 白虎汤	756	24968 白柿粥	762	25011 白前汤	768
24926 白虎汤	756	24969 白草散	762	25012 白前汤	769
24927 白虎汤	756	24970 白药丸	762	25013 白前汤	769
24928 白虎汤	756	24971 白药末	762	25014 白前汤	769
24929 白虎汤	756	24972 白药酒	763	25015 白前汤	769
24930 白虎散	756	24973 白药散	763	25016 白前汤	769
24931 白虎散	757	24974 白药散	763	25017 白前汤	769
24932 白虎膏	757	24975 白药散	763	25018 白前汤	770
24933 白果汤	757	24976 白带丸	763	25019 白前汤	770
24934 白果浆	757	24977 白带丸	763	25020 白前汤	770
24935 白乳汤	757	24978 白带丸	763	25021 白前汤	770
24936 白乳散	757	24979 白带丸	763	25022 白前汤	770
24937 白金丸	757	24980 白带丸	764	25023 白前汤	770
24938 白金丹	758	24981 白带丸	764	25024 白前饮	770
24939 白金丹	758	24982 白带丸	764	25025 白前散	770
24940 白金丹	758	24983 白带丸	764	25026 白前散	771
24941 白金汤	758	24984 白带丸	764	25027 白前散	771
24942 白金散	758	24985 白带丸	764	25028 白前散	771
24943 白金散	758	24986 白带片	765	25029 白前散	771
24944 白金散	758	24987 白带丹	765	25030 白前散	771

25031 白姜散	771	25074 白眼药	776	25117 白薇散	781
25032 白姜散	771	25075 白蛇丸	776	25118 白薇散	781
25033 白姜散	771	25076 白蛇汤	776	25119 白薇散	781
25034 白扁饮	771	25077 白蛇散	777	25120 白薇散	781
25035 白神丸	772	25078 白蛇散	777	25121 白薇散	781
25036 白神散	772	25079 白银丹	777	25122 白薇散	781
25037 白蚕丸	772	25080 白银汤	777	25123 白薇散	781
35038 白蚕散	772	25081 白鸽肉	777	25124 白薇散	782
25039 白盐方	772	25082 白鸽煎	777	25125 白薇散	782
25040 白莲散	772	25083 白绿丹	777	25126 白薇散	782
25041 白鸭方	772	25084 白绿散	777	25127 白薇散	782
25042 白胶汤	772	25085 白斑散	777	25128 白薇散	782
25043 白胶汤	772	25086 白散子	777	25129 白薇散	782
25044 白胶散	773	25087 白散子	777	25130 白薇散	782
25045 白胶散	773	25088 白散子	778	25131 白薇散	782
25046 白胶煎	773	25089 白散子	778	25132 白薇膏	782
25047 白酒煎	773	25090 白散子	778	25133 白薇膏	782
25048 白粉散	773	25091 白散子	778	25134 白薇膏	782
25049 白粉霜	773	25092 白散子	778	25135 白薇膏	782
25050 白粉霜	773	25093 白散子	778	25136 白薇膏	783
25051 白屑膏	773	25094 白葱散	778	25137 白薇膏	783
25052 白通汤	773	25095 白雄散	778	25138 白薇膏	783
25053 白通汤	774	25096 白痧药	778	25139 白薇膏	783
25054 白通汤	774	25097 白痧药	779	25140 白薇膏	783
25055 白通汤	774	25098 白痧散	779	25141 白薇膏	783
25056 白梅丸	774	25099 白善方	779	25142 白薇膏	783
25057 白梅丸	774	25100 白善散	779	25143 白薇薄	783
25058 白梅丸	774	25101 白锭子	779	25144 白薇薄	783
25059 白梅汤	774	25102 白薇丸	779	25145 白薏散	784
25060 白梅饮	774	25103 白薇丸	779	25146 白蜡膏	784
25061 白梅散	775	25104 白薇丸	779	25147 白蜡膏	784
25062 白黄散	775	25105 白薇汤	780	25148 白鲜汤	784
25063 白黄散	775	25106 白薇汤	780	25149 白膏子	784
25064 白雪丸	775	25107 白薇汤	780	25150 白膏子	784
25065 白雪丸	775	25108 白薇汤	780	25151 白膏药	784
25066 白雪丸	775	25109 白薇贴	780	25152 白膏药	784
25067 白雪丹	775	25110 白薇贴	780	25153 白膏药	784
25068 白雪丹	775	25111 白薇散	780	25154 白膏药	784
25069 白雪丹	775	25112 白薇散	780	25155 白膏药	784
25070 白雪丹	776	25113 白薇散	780	25156 白膏药	785
25071 白雪汤	776	25114 白薇散	780	25157 白膏药	785
25072 白雪糕	776	25115 白薇散	781	25158 白膏药	785
25073 白雪糕	776	25116 白薇散	781	25159 白膏药	785

25160 白膏药	785	25203 白薇散	791	25246 白术酩酒	797
25161 白蜜汤	785	25204 白薇散	792	25247 白术煎丸	797
25162 白蜜汤	785	25205 白薇散	792	25248 白术酿酒	797
25163 白蜜饮	786	25206 白薇散	792	25249 白术膏酒	797
25164 白蜜酒	786	25207 白薇煎	792	25250 白石英丸	797
25165 白蜜酒	786	25208 白薇膏	792	25251 白石英丸	798
25166 白蜜膏	786	25209 白糖饮	792	25252 白石英丸	798
25167 白敷药	786	25210 白壁膏	793	25253 白石英丸	798
25168 白鹤丹	786	25211 白霜丸	793	25254 白石英丸	798
25169 白鹤散	786	25212 白螺丸	793	25255 白石英汤	798
25170 白薇丸	786	25213 白螺散	793	25256 白石英汤	799
25171 白薇丸	787	25214 白螺散	793	25257 白石英汤	799
25172 白薇丸	787	25215 白癩方	793	25258 白石英酒	799
25173 白薇丸	787	25216 白癩膏	793	25259 白石英酒	799
25174 白薇丸	787	25217 白糯米丸	793	25260 白石英酒	799
25175 白薇丸	787	25218 白丁香丸	793	25261 白石英散	799
25176 白薇丸	788	25219 白丁香丸	794	25262 白石英散	800
25177 白薇丸	788	25220 白丁香丸	794	25263 白石英散	800
25178 白薇丸	788	25221 白丁香散	794	25264 白石英散	800
25179 白薇丸	788	25222 白丁香散	794	25265 白石英散	800
25180 白薇丸	788	25223 白丁香散	794	25266 白石英粥	800
25181 白薇丸	788	25224 白丁香散	794	25267 白石脂丸	800
25182 白薇丸	789	25225 白大通丸	794	25268 白石脂丸	800
25183 白薇丸	789	25226 白丸子散	794	25269 白石脂丸	801
25184 白薇丸	789	25227 白马毛散	794	25270 白石脂丸	801
25185 白薇丸	789	25228 白马茎丸	795	25271 白石脂丸	801
25186 白薇丸	789	25229 白马蹄丸	795	25272 白石脂汤	801
25187 白薇丸	789	25230 白马蹄散	795	25273 白石脂汤	801
25188 白薇丸	789	25231 白马蹄散	795	25274 白石脂散	801
25189 白薇汤	790	25232 白马蹄散	795	25275 白石脂散	801
25190 白薇汤	790	25233 白马蹄散	795	25276 白石脂散	801
25191 白薇汤	790	25234 白牛毛散	796	25277 白石脂散	801
25192 白薇汤	790	25235 白氏眼药	796	25278 白石脂散	801
25193 白薇汤	790	25236 白凤饮子	796	25279 白石脂散	801
25194 白薇汤	790	25237 白平安散	796	25280 白龙骨丸	802
25195 白薇散	790	25238 白平安散	796	25281 白龙骨丸	802
25196 白薇散	791	25239 白玉饼子	796	25282 白龙骨丸	802
25197 白薇散	791	25240 白玉神膏	796	25283 白龙骨丸	802
25198 白薇散	791	25241 白玉膏药	796	25284 白龙骨散	802
25199 白薇散	791	25242 白玉蟾丸	797	25285 白归脾丸	802
25200 白薇散	791	25243 白末眼药	797	25286 白瓜子丸	802
25201 白薇散	791	25244 白术香散	797	25287 白头翁丸	802
25202 白薇散	791	25245 白术浴汤	797	25288 白头翁丸	802

25289 白头翁丸	802	25332 白杨皮汤	808	25375 白花蛇散	815
25290 白头翁丸	803	25333 白杨皮汤	809	25376 白花蛇散	815
25291 白头翁丸	803	25334 白杨皮酒	809	25377 白花蛇散	815
25292 白头翁丸	803	25335 白杨皮散	809	25378 白花蛇散	815
25293 白头翁汤	803	25336 白杨皮散	809	25379 白花蛇散	815
25294 白头翁汤	804	25337 白杨皮散	809	25380 白花蛇散	815
25295 白头翁汤	804	25338 白芨羹散	809	25381 白花蛇煎	815
25296 白头翁汤	804	25339 白芨羹散	809	25382 白花蛇煎	816
25297 白头翁汤	804	25340 白芷洗方	809	25383 白花蛇膏	816
25298 白头翁汤	804	25341 白芷摩膏	810	25384 白花蛇膏	816
25299 白头翁汤	804	25342 白花蛇丸	810	25385 白花蛇膏	816
25300 白头翁汤	805	25343 白花蛇丸	810	25386 白芥子丸	816
25301 白头翁汤	805	25344 白花蛇丸	810	25387 白芥子丸	816
25302 白头翁酒	805	25345 白花蛇丸	810	25388 白芥子丸	816
25303 白头翁酒	805	25346 白花蛇丸	810	25389 白芥子散	816
25304 白头翁酒	805	25347 白花蛇丸	811	25390 白芥子散	817
25305 白头翁散	805	25348 白花蛇丸	811	25391 白豆蔻丸	817
25306 白头翁散	805	25349 白花蛇丸	811	25392 白豆蔻丸	817
25307 白头翁煎	805	25350 白花蛇丸	811	25393 白豆蔻丸	817
25308 白母丁散	806	25351 白花蛇丸	811	25394 白豆蔻丸	817
25309 白芍药丸	806	25352 白花蛇丸	811	25395 白豆蔻丸	817
25310 白芍药丸	806	25353 白花蛇丸	811	25396 白豆蔻丸	817
25311 白芍药汤	806	25354 白花蛇丸	812	25397 白豆蔻丸	818
25312 白芍药汤	806	25355 白花蛇丸	812	25398 白豆蔻丸	818
25313 白芍药汤	806	25356 白花蛇丸	812	25399 白豆蔻丸	818
25314 白芍药散	806	25357 白花蛇酒	812	25400 白豆蔻丸	818
25315 白芍药散	806	25358 白花蛇酒	812	25401 白豆蔻丸	818
25316 白芍药散	806	25359 白花蛇酒	812	25402 白豆蔻丸	818
25317 白芍药散	807	25360 白花蛇酒	813	25403 白豆蔻丸	819
25318 白芍药散	807	25361 白花蛇散	813	25404 白豆蔻丸	819
25319 白芍药散	807	25362 白花蛇散	813	25405 白豆蔻丸	819
25320 白芍药散	807	25363 白花蛇散	813	25406 白豆蔻汤	819
25321 白芍药散	807	25364 白花蛇散	813	25407 白豆蔻汤	819
25322 白朱砂散	807	25365 白花蛇散	814	25408 白豆蔻汤	819
25323 白朱砂散	807	25366 白花蛇散	814	25409 白豆蔻汤	819
25324 白华玉丹	807	25367 白花蛇散	814	25410 白豆蔻汤	819
25325 白羊心汤	807	25368 白花蛇散	814	25411 白豆蔻汤	819
25326 白羊肉汤	808	25369 白花蛇散	814	25412 白豆蔻汤	819
25327 白羊肉汤	808	25370 白花蛇散	814	25413 白豆蔻汤	820
25328 白羊肾丸	808	25371 白花蛇散	815	25414 白豆蔻汤	820
25329 白羊肾羹	808	25372 白花蛇散	815	25415 白豆蔻汤	820
25330 白羊肾羹	808	25373 白花蛇散	815	25416 白豆蔻散	820
25331 白羊鲜汤	808	25374 白花蛇散	815	25417 白豆蔻散	820

25418 白豆蔻散	820	25461 白附子散	826	25504 白茯苓丸	831
25419 白豆蔻散	820	25462 白附子散	826	25505 白茯苓丸	831
25420 白豆蔻散	820	25463 白附子散	826	25506 白茯苓丸	831
25421 白豆蔻散	821	25464 白附子散	826	25507 白茯苓丸	831
25422 白豆蔻散	821	25465 白附子散	826	25508 白茯苓丸	831
25423 白豆蔻散	821	25466 白附子散	827	25509 白茯苓丸	832
25424 白豆蔻散	821	25467 白附子散	827	25510 白茯苓汤	832
25425 白豆蔻散	821	25468 白附子散	827	25511 白茯苓汤	832
25426 白豆蔻散	821	25469 白附子膏	827	25512 白茯苓汤	832
25427 白豆蔻散	822	25470 白附子膏	827	25513 白茯苓汤	832
25428 白豆蔻散	822	25471 白茅根汤	827	25514 白茯苓汤	832
25429 白豆蔻散	822	25472 白茅根汤	827	25515 白茯苓汤	832
25430 白豆蔻散	822	25473 白茅根汤	828	25516 白茯苓汤	832
25431 白豆蔻散	822	25474 白茅根汤	828	25517 白茯苓汤	833
25432 白豆蔻散	822	25475 白茅根汤	828	25518 白茯苓散	833
25433 白豆蔻散	822	25476 白茅根汤	828	25519 白茯苓散	833
25434 白豆蔻散	823	25477 白茅根散	828	25520 白茯苓散	833
25435 白豆蔻散	823	25478 白茅根散	828	25521 白茯苓散	833
25436 白豆蔻散	823	25479 白茅根散	828	25522 白茯苓散	833
25437 白豆蔻散	823	25480 白茅根散	828	25523 白茯苓散	833
25438 白豆蔻散	823	25481 白茅根散	828	25524 白茯苓散	834
25439 白豆蔻散	823	25482 白茅煎酒	828	25525 白茯苓散	834
25440 白豆蔻散	823	25483 白矾灰散	829	25526 白茯苓散	834
25441 白豆蔻散	823	25484 白矾灰散	829	25527 白茯苓散	834
25442 白豆蔻散	824	25485 白矾涂方	829	25528 白茯苓散	834
25443 白沉香散	824	25486 白矾涂方	829	25529 白茯苓散	834
25444 白附子丸	824	25487 白矾煮散	829	25530 白茯苓散	834
25445 白附子丸	824	25488 白虎骨酒	829	25531 白茯苓散	835
25446 白附子丸	824	25489 白果叶散	829	25532 白茯苓散	835
25447 白附子丸	824	25490 白果蛋方	829	25533 白茯苓散	835
25448 白附子丸	824	25491 白物神散	829	25534 白茯苓散	835
25449 白附子丸	824	25492 白狗肺汤	830	25535 白茯苓散	835
25450 白附子丸	825	25493 白鱼灰散	830	25536 白茯苓散	835
25451 白附子丸	825	25494 白定眼药	830	25537 白茯苓散	835
25452 白附子丸	825	25495 白降雪丹	830	25538 白茯苓粥	835
25453 白附子丸	825	25496 白降雪散	830	25539 白茯神散	836
25454 白附子丸	825	25497 白树鸡粥	830	25540 白药子散	836
25455 白附子汤	825	25498 白荆花丸	830	25541 白药子散	836
25456 白附子散	825	25499 白茯苓丸	830	25542 白药子膏	836
25457 白附子散	825	25500 白茯苓丸	830	25543 白牵牛散	836
25458 白附子散	825	25501 白茯苓丸	830	25544 白牵牛散	836
25459 白附子散	826	25502 白茯苓丸	831	25545 白扁豆丸	836
25460 白附子散	826	25503 白茯苓丸	831	25546 白扁豆饮	836

25547 白扁豆散	836	25590 白蒺藜散	842	25633 白鲜皮散	847
25548 白扁豆散	837	25591 白蒺藜散	842	25634 白鲜皮散	847
25549 白扁豆粥	837	25592 白蒺藜散	842	25635 白鲜皮酒	847
25550 白荷花露	837	25593 白蒺藜散	842	25636 白蜜煎丸	847
25551 白蛭壳散	837	25594 白蒺藜散	842	25637 白僵蚕丸	847
25552 白胶香散	837	25595 白蒺藜散	842	25638 白僵蚕丸	847
25553 白胶香散	837	25596 白槟榔散	842	25639 白僵蚕丸	847
25554 白胶香散	837	25597 白薇薄贴	842	25640 白僵蚕丸	848
25555 白胶香膏	837	25598 白雌鸡汤	843	25641 白僵蚕丸	848
25556 白凉散煎	837	25599 白鲜皮丸	843	25642 白僵蚕丸	848
25557 白酒药曲	837	25600 白鲜皮汤	843	25643 白僵蚕丸	848
25558 白粉灵丹	837	25601 白鲜皮汤	843	25644 白僵蚕丸	848
25559 白粉霜丸	838	25602 白鲜皮汤	843	25645 白僵蚕丸	848
25560 白瓷药散	838	25603 白鲜皮汤	843	25646 白僵蚕丸	848
25561 白梅饮子	838	25604 白鲜皮汤	843	25647 白僵蚕丹	849
25562 白菊花酒	838	25605 白鲜皮汤	843	25648 白僵蚕散	849
25563 白菊花散	838	25606 白鲜皮汤	844	25649 白僵蚕散	849
25564 白菊花散	838	25607 白鲜皮汤	844	25650 白僵蚕散	849
25565 白蛇浸酒	838	25608 白鲜皮汤	844	25651 白僵蚕散	849
25566 白银锭子	838	25609 白鲜皮汤	844	25652 白僵蚕散	849
25567 白鹿洞方	838	25610 白鲜皮汤	844	25653 白僵蚕散	849
25568 白清胃散	839	25611 白鲜皮汤	844	25654 白僵蚕散	849
25569 白茛茹散	839	25612 白鲜皮汤	844	25655 白僵蚕散	850
25570 白雄鸡羹	839	25613 白鲜皮汤	844	25656 白僵蚕散	850
25571 白提毒散	839	25614 白鲜皮汤	844	25657 白僵蚕散	850
25572 白鹅膏粥	839	25615 白鲜皮汤	844	25658 白僵蚕散	850
25573 白填鸭散	839	25616 白鲜皮汤	844	25659 白僵蚕散	850
25574 白蓝脂方	839	25617 白鲜皮酊	845	25660 白僵蚕散	850
25575 白蒺藜丸	839	25618 白鲜皮散	845	25661 白僵蚕膏	850
25576 白蒺藜丸	840	25619 白鲜皮散	845	25662 白鲫鱼膏	850
25577 白蒺藜丸	840	25620 白鲜皮散	845	25663 白避瘟散	850
25578 白蒺藜丸	840	25621 白鲜皮散	845	25664 白螺壳丸	851
25579 白蒺藜丸	840	25622 白鲜皮散	845	25665 白筋洗剂	851
25580 白蒺藜丸	840	25623 白鲜皮散	845	25666 白藕汁膏	851
25581 白蒺藜汤	840	25624 白鲜皮散	845	25667 白鹰粪散	851
25582 白蒺藜汤	841	25625 白鲜皮散	846	25668 白麻风酒	851
25583 白蒺藜散	841	25626 白鲜皮散	846	25669 白及枇杷丸	851
25584 白蒺藜散	841	25627 白鲜皮散	846	25670 白及莲须散	851
25585 白蒺藜散	841	25628 白鲜皮散	846	25671 白及雄黄散	851
25586 白蒺藜散	841	25629 白鲜皮散	846	25672 白云平安散	851
25587 白蒺藜散	841	25630 白鲜皮散	846	25673 白云换肺丸	852
25588 白蒺藜散	841	25631 白鲜皮散	846	25674 白艾蒿酿酒	852
25589 白蒺藜散	842	25632 白鲜皮散	847	25675 白玉化痰丸	852

25676 白玉夹纸膏	852	25719 白术和中汤	856	25762 白术橘香散	861
25677 白玉霜药酒	852	25720 白术和胃丸	856	25763 白术藿香汤	861
25678 白玉蟾末药	852	25721 白术泽泻散	856	25764 白术藜藿饮	861
25679 白玉蟾浴汤	852	25722 白术枳壳丸	856	25765 白石英浸酒	861
25680 白玉蟾遗方	852	25723 白术枳实散	856	25766 白龙捧疮膏	862
25681 白玉蟾擦药	852	25724 白术胡椒丸	856	25767 白皮小豆散	862
25682 白术丁香丸	852	25725 白术茯苓丸	857	25768 白芍甘草汤	862
25683 白术丁香散	852	25726 白术茯苓丸	857	25769 白防活命饮	862
25684 白术八味散	853	25727 白术茯苓汤	857	25770 白芷升麻汤	862
25685 白术八宝丹	853	25728 白术茯苓汤	857	25771 白芷升麻汤	862
25686 白术木香散	853	25729 白术茯苓汤	857	25772 白芷升麻汤	862
25687 白术五味汤	853	25730 白术茯苓汤	857	25773 白芷升麻汤	863
25688 白术止痢丸	853	25731 白术茯苓汤	857	25774 白芷升麻散	863
25689 白术升麻汤	853	25732 白术茯苓散	858	25775 白芷石膏汤	863
25690 白术六一汤	853	25733 白术茯苓散	858	25776 白芷立效散	863
25691 白术甘草散	853	25734 白术厚朴汤	858	25777 白芷防风膏	863
25692 白术石斛汤	853	25735 白术厚朴汤	858	25778 白芷护心散	863
25693 白术四逆汤	853	25736 白术厚朴汤	858	25779 白芷胃风汤	863
25694 白术生犀散	853	25737 白术姜黄汤	858	25780 白芷独活汤	863
25695 白术半夏丸	854	25738 白术神曲丸	858	25781 白芷黄连汤	863
25696 白术半夏丸	854	25739 白术神曲丸	858	25782 白芷黄连汤	863
25697 白术半夏汤	854	25740 白术除眩汤	858	25783 白芷暖宫丸	864
25698 白术加减汤	854	25741 白术除湿汤	858	25784 白芷螺蛳丸	864
25699 白术圣散子	854	25742 白术桂枝汤	859	25785 白花蛇浸酒	864
25700 白术芍药汤	854	25743 白术健脾饮	859	25786 白花蛇煮酒	864
25701 白术芍药散	854	25744 白术消肿散	859	25787 白疔一号方	864
25702 白术当归汤	854	25745 白术调元散	859	25788 白疔二号方	864
25703 白术安胃散	854	25746 白术调中丸	859	25789 白沙草灵丹	865
25704 白术防风汤	855	25747 白术调中丸	860	25790 白附香连丸	865
25705 白术防风汤	855	25748 白术调中汤	860	25791 白玫瑰露酒	865
25706 白术苡仁汤	855	25749 白术调中汤	860	25792 白茅根饮子	865
25707 白术助胃丹	855	25750 白术理中汤	860	25793 白茅根饮子	865
25708 白术沉香散	855	25751 白术菊花散	860	25794 白矾半夏散	865
25709 白术陈皮汤	855	25752 白术黄芩汤	860	25795 白虎人参汤	865
25710 白术附子汤	855	25753 白术黄芩散	860	25796 白虎化斑汤	865
25711 白术附子汤	855	25754 白术黄芩汤	860	25797 白虎化斑汤	865
25712 白术附子汤	855	25755 白术黄芩汤	861	25798 白虎加苍汤	865
25713 白术附子汤	855	25756 白术黄芩汤	861	25799 白虎加味汤	865
25714 白术附子汤	855	25757 白术黄芩散	861	25800 白虎加参汤	866
25715 白术妙功丸	855	25758 白术猪肚粥	861	25801 白虎加桂汤	866
25716 白术苦参汤	856	25759 白术麻黄散	861	25802 白虎地黄汤	866
25717 白术和中汤	856	25760 白术舒脾散	861	25803 白虎苍术汤	866
25718 白术和中汤	856	25761 白术截疟饮	861	25804 白虎快斑汤	866

25805 白虎抱龙丸 866	25848 白术半夏天麻汤 ... 872	25878 瓜子散 877
25806 白虎承气汤 866	25849 白术茯苓干姜汤 ... 872	25879 瓜子散 877
25807 白虎续命汤 866	25850 白术茯苓泽泻汤 ... 873	25880 瓜石汤 877
25808 白虎葛根汤 866	25851 白芍黄芩木通汤 ... 873	25881 瓜石汤 877
25809 白虎解毒汤 867	25852 白芷石膏三物汤 ... 873	25882 瓜皮散 877
25810 白虎解毒汤 867	25853 白芷细辛吹鼻散 ... 873	25883 瓜皮散 877
25811 白果定喘汤 867	25854 白虎青龙各半汤 ... 873	25884 瓜皮煎 877
25812 白果定喘汤 867	25855 白虎桂枝柴胡汤 ... 873	25885 瓜竹汤 877
25813 白牵牛子散 867	25856 白虎解毒养阴汤 ... 873	25886 瓜豆散 877
25814 白蚕黄柏散 867	25857 白通加猪胆汁汤 ... 874	25887 瓜连丸 877
25815 白银透罗丹 867	25858 白通加猪胆汁汤 ... 874	25888 瓜连丸 878
25816 白麻蕤皮散 867	25859 白虎加人参竹叶 汤 874	25889 瓜矾散 878
25817 白敬字眼药 867	25860 白虎加元麦青萍 汤 874	25890 瓜砂丹 878
25818 白薇煨药方 867	25861 白虎加元麦紫苏 汤 874	25891 瓜桂散 878
25819 白薇蕤苡汤 867	25862 白虎加青萍地黄 汤 875	25892 瓜莲丸 878
25820 白薇十味丸 868	25863 白虎加犀角升麻 汤 875	25893 瓜盐煎 878
25821 白薇人参丸 868	25864 白虎合黄连解毒 汤 875	25894 瓜蒂丸 878
25822 白薇芍药散 868	25865 白头翁加甘草阿胶 汤 875	25895 瓜蒂丸 878
25823 白螺蛳壳丸 868	25866 白通加人尿猪胆汁 汤 875	25896 瓜蒂汤 878
25824 白牙药升麻散 868	25867 白头翁加甘草阿胶 苓桂汤 875	25897 瓜蒂汤 878
25825 白牙药真珠散 868	25868 白虎加人参以山药 代粳米汤 875	25898 瓜蒂散 879
25826 白玉蟾蜍遗方 868	25869 白虎去石膏加首乌 当归和疟饮 876	25899 瓜蒂散 880
25827 白术五味子汤 868		25900 瓜蒂散 880
25828 白术当归煎丸 868		25901 瓜蒂散 880
25829 白头翁根煎方 868		25902 瓜蒂散 880
25830 白花蛇造酒方 869		25903 瓜蒂散 880
25831 白芥子吹鼻散 869		25904 瓜蒂散 881
25832 白附子化痰丸 869		25905 瓜蒂散 881
25833 白附子香连丸 869		25906 瓜蒂散 881
25834 白附子黄连丸 869		25907 瓜蒂散 881
25835 白虎加人参汤 869		25908 瓜蒂散 881
25836 白虎加元麦汤 870		25909 瓜蒂散 881
25837 白虎加元参汤 870		25910 瓜蒂散 881
25838 白虎加白芷汤 871		25911 瓜蒂散 881
25839 白虎加苍术汤 871		25912 瓜蒂散 881
25840 白虎加苍术汤 871		25913 瓜蒂散 882
25841 白虎加梔子汤 871		25914 瓜蒂散 882
25842 白虎加桂枝汤 871		25915 瓜蒂散 882
25843 白虎加葛根方 872		25916 瓜蒂散 882
25844 白虎合六一散 872		25917 瓜蒂散 882
25845 白虎合解毒汤 872		25918 瓜蒂散 882
25846 白茯苓陈皮丸 872		25919 瓜蒂散 882
25847 白鲜皮七味汤 872		25920 瓜蒂散 882

瓜

25921 瓜蒂散	882	25964 瓜蒌煎	886	26007 瓜蒌枳实汤	890
25922 瓜蒂散	882	25965 瓜蒌煎	886	26008 瓜蒌枳实汤	891
25923 瓜蒂散	882	25966 瓜蒌膏	887	26009 瓜蒌桂枝汤	891
25924 瓜蒂散	883	25967 瓜霜散	887	26010 瓜蒌犀角汤	891
25925 瓜蒂散	883	25968 瓜子仁汁	887	26011 瓜蒌薤白汤	891
25926 瓜蒂散	883	25969 瓜子仁汤	887	26012 瓜蒌瞿麦丸	891
25927 瓜蒂膏	883	25970 瓜子眼药	887	26013 瓜硝拔毒丹	891
25928 瓜蒌丸	883	25971 瓜子眼药	887	26014 瓜霜紫雪丹	891
25929 瓜蒌丸	883	25972 瓜蒌子汤	887	26015 瓜蒌根桂枝汤	891
25930 瓜蒌丸	883	25973 瓜蒌子散	887	26016 瓜蒌半夏白酒汤	891
25931 瓜蒌丸	883	25974 瓜蒌仁汤	887	26017 瓜蒌薤白半夏汤	891
25932 瓜蒌丸	883	25975 瓜蒌仁汤	888	26018 瓜蒌薤白白酒汤	891
25933 瓜蒌丸	883	25976 瓜蒌仁汤	888		
25934 瓜蒌方	884	25977 瓜蒌实丸	888	用	
25935 瓜蒌汤	884	25978 瓜蒌实丸	888	26019 用效润肠丸	891
25936 瓜蒌汤	884	25979 瓜蒌根丸	888		
25937 瓜蒌汤	884	25980 瓜蒌根汤	888	乐	
25938 瓜蒌汤	884	25981 瓜蒌根汤	888	26020 乐令汤	892
25939 瓜蒌汤	884	25982 瓜蒌根汤	888	26021 乐令建中汤	892
25940 瓜蒌汤	884	25983 瓜蒌煎丸	888	26022 乐令黄耆汤	892
25941 瓜蒌汤	884	25984 瓜贝去瘀汤	889	26023 乐令黄耆汤	892
25942 瓜蒌汤	884	25985 瓜贝养荣汤	889	26024 乐令大黄耆汤	892
25943 瓜蒌汤	884	25986 瓜蒂二陈汤	889		
25944 瓜蒌酒	884	25987 瓜蒂三味散	889	【、】	
25945 瓜蒌酒	884	25988 瓜蒂牙消散	889	冯	
25946 瓜蒌酒	885	25989 瓜蒂甘遂丸	889	26025 冯夷琼浆	892
25947 瓜蒌散	885	25990 瓜蒂吹鼻散	889	26026 冯氏秘传膏药	892
25948 瓜蒌散	885	25991 瓜蒂神妙散	889		
25949 瓜蒌散	885	25992 瓜蒌大麦饼	889	汉	
25950 瓜蒌散	885	25993 瓜蒌贝母饮	889	26027 汉椒丸	892
25951 瓜蒌散	885	25994 瓜蒌内托散	889	26028 汉椒散	892
25952 瓜蒌散	885	25995 瓜蒌半夏丸	890	26029 汉防己丸	893
25953 瓜蒌散	885	25996 瓜蒌半夏丸	890	26030 汉防己丸	893
25954 瓜蒌散	885	25997 瓜蒌必效散	890	26031 汉防己丸	893
25955 瓜蒌散	885	25998 瓜蒌托里散	890	26032 汉防己丸	893
25956 瓜蒌散	886	25999 瓜蒌竹茹汤	890	26033 汉防己丸	893
25957 瓜蒌散	886	26000 瓜蒌杏连丸	890	26034 汉防己汤	893
25958 瓜蒌散	886	26001 瓜蒌牡蛎散	890	26035 汉防己汤	893
25959 瓜蒌散	886	26002 瓜蒌青黛丸	890	26036 汉防己汤	893
25960 瓜蒌散	886	26003 瓜蒌乳没散	890	26037 汉防己散	893
25961 瓜蒌散	886	26004 瓜蒌乳香散	890	26038 汉防己散	894
25962 瓜蒌散	886	26005 瓜蒌乳香散	890	26039 汉防己散	894
25963 瓜蒌散	886	26006 瓜蒌枳壳汤	890	26040 汉防己散	894

26041 汉防己散	894	26082 立圣散	900	26125 立应散	904
26042 汉防己散	894	26083 立圣散	900	26126 立应散	904
26043 汉防己散	894	26084 立圣散	900	26127 立应散	904
26044 汉防己散	894	26085 立圣散	900	26128 立应散	904
26045 汉防己散	895	26086 立圣散	900	26129 立应散	904
26046 汉防己散	895	26087 立圣膏	900	26130 立应散	905
26047 汉防己散	895	26088 立圣膏	900	26131 立应散	905
26048 汉防己散	895	26089 立竹汤	900	26132 立应膏	905
26049 汉防己散	895	26090 立行饮	900	26133 立应膏	905
26050 汉防己散	895	26091 立安丸	901	26134 立灵散	905
26051 汉防己散	896	26092 立安丸	901	26135 立金汤	905
26052 汉防己散	896	26093 立安丸	901	26136 立定散	905
26053 汉防己散	896	26094 立安丸	901	26137 立胜散	905
26054 汉防己散	896	26095 立安饮	901	26138 立胜散	905
26055 汉防己散	896	26096 立安散	901	26139 立胜散	905
26056 汉防己散	896	26097 立安散	901	26140 立胜散	906
26057 汉防己散	896	26098 立安散	901	26141 立胜散	906
26058 汉防己散	897	26099 立安散	902	26142 立胜散	906
26059 汉防己散	897	26100 立安散	902	26143 立胜煎	906
26060 汉防己散	897	26101 立极汤	902	26144 立神丹	906
26061 汉防己散	897	26102 立苏散	902	26145 立神丹	906
26062 汉防己散	897	26103 立住散	902	26146 立退丸	906
26063 汉防己散	897	26104 立应丸	902	26147 立效丸	906
26064 汉防己散	897	26105 立应丸	902	26148 立效丸	906
26065 汉防己散	898	26106 立应丸	902	26149 立效丸	906
26066 汉防己散	898	26107 立应汤	902	26150 立效丸	906
26067 汉防己散	898	26108 立应汤	902	26151 立效丸	906
26068 汉防己散	898	26109 立应汤	903	26152 立效丸	907
26069 汉防己散	898	26110 立应散	903	26153 立效丸	907
26070 汉防己膏	898	26111 立应散	903	26154 立效丸	907
26071 汉防己煮散	898	26112 立应散	903	26155 立效丸	907
		26113 立应散	903	26156 立效丹	907
		26114 立应散	903	26157 立效丹	908
		26115 立应散	903	26158 立效丹	908
		26116 立应散	903	26159 立效丹	908
		26117 立应散	903	26160 立效方	908
		26118 立应散	904	26161 立效方	908
		26119 立应散	904	26162 立效方	908
		26120 立应散	904	26163 立效汤	908
		26121 立应散	904	26164 立效汤	908
		26122 立应散	904	26165 立效汤	908
		26123 立应散	904	26166 立效汤	908
		26124 立应散	904	26167 立效汤	908

立

26072 立马乌	898
26073 立马消	899
26074 立马消	899
26075 立止丸	899
26076 立止散	899
26077 立正散	899
26078 立生丹	899
26079 立圣丸	899
26080 立圣丹	900
26081 立圣散	900

26168 立效汤	909	26211 立效散	913	26254 立效散	916
26169 立效饮	909	26212 立效散	913	26255 立效散	916
26170 立效饮	909	26213 立效散	913	26256 立效散	917
26171 立效饮	909	26214 立效散	913	26257 立效散	917
26172 立效饮	909	26215 立效散	913	26258 立效散	917
26173 立效饮	909	26216 立效散	913	26259 立效散	917
26174 立效饮	909	26217 立效散	913	26260 立效散	917
26175 立效散	909	26218 立效散	913	26261 立效散	917
26176 立效散	909	26219 立效散	913	26262 立效散	917
26177 立效散	910	26220 立效散	914	26263 立效散	917
26178 立效散	910	26221 立效散	914	26264 立效散	917
26179 立效散	910	26222 立效散	914	26265 立效散	917
26180 立效散	910	26223 立效散	914	26266 立消丸	917
26181 立效散	910	26224 立效散	914	26267 立消丹	918
26182 立效散	910	26225 立效散	914	26268 立消汤	918
26183 立效散	910	26226 立效散	914	26269 立消汤	918
26184 立效散	910	26227 立效散	914	26270 立消散	918
26185 立效散	910	26228 立效散	914	26271 立消散	918
26186 立效散	910	26229 立效散	914	26272 立消散	918
26187 立效散	910	26230 立效散	914	26273 立消散	918
26188 立效散	910	26231 立效散	914	26274 立消散	918
26189 立效散	910	26232 立效散	914	26275 立消散	918
26190 立效散	911	26233 立效散	915	26276 立消散	918
26191 立效散	911	26234 立效散	915	26277 立消散	918
26192 立效散	911	26235 立效散	915	26278 立消散	918
26193 立效散	911	26236 立效散	915	26279 立消散	918
26194 立效散	911	26237 立效散	915	26280 立消散	919
26195 立效散	911	26238 立效散	915	26281 立消散	919
26196 立效散	911	26239 立效散	915	26282 立消散	919
26197 立效散	911	26240 立效散	915	26283 立消散	919
26198 立效散	911	26241 立效散	915	26284 立消散	919
26199 立效散	911	26242 立效散	915	26285 立消膏	919
26200 立效散	911	26243 立效散	915	26286 立消膏	919
26201 立效散	912	26244 立效散	916	26287 立通丸	919
26202 立效散	912	26245 立效散	916	26288 立通饮	919
26203 立效散	912	26246 立效散	916	26289 立通散	919
26204 立效散	912	26247 立效散	916	26290 立验丸	920
26205 立效散	912	26248 立效散	916	26291 立验散	920
26206 立效散	912	26249 立效散	916	26292 立验膏	920
26207 立效散	912	26250 立效散	916	26293 立患丹	920
26208 立效散	912	26251 立效散	916	26294 立愈丸	920
26209 立效散	913	26252 立效散	916	26295 立愈汤	920
26210 立效散	913	26253 立效散	916	26296 立愈饮	920

26297 立止灵丹	920	26337 玄及膏	926	26380 玄参汤	932
26298 立效饼子	920	26338 玄门丹	926	26381 玄参汤	932
26299 立效神散	921	26339 玄天散	926	26382 玄参汤	932
26300 立马开关饮	921	26340 玄车丹	926	26383 玄参汤	932
26301 立马回疔丹	921	26341 玄归散	926	26384 玄参汤	932
26302 立马回疔丹	921	26342 玄归散	926	26385 玄参汤	932
26303 立止牙疼药	921	26343 玄冬汤	926	26386 玄参汤	932
26304 立止牙痛散	921	26344 玄白丸	926	26387 玄参汤	932
26305 立止水泻方	921	26345 玄白散	927	26388 玄参汤	932
26306 立止头痛散	921	26346 玄玄膏	927	26389 玄参汤	933
26307 立止吐血散	922	26347 玄麦饮	927	26390 玄参汤	933
26308 立止吐血膏	922	26348 玄豆丸	927	26391 玄参汤	933
26309 立止咳血膏	922	26349 玄应丸	928	26392 玄参汤	933
26310 立止咳嗽丸	922	26350 玄灵散	928	26393 玄参汤	933
26311 立止哮喘烟	922	26351 玄灵散	928	26394 玄参汤	933
26312 立生酥葵膏	922	26352 玄附汤	928	26395 玄参汤	933
26313 立圣岗草散	922	26353 玄妙饮	928	26396 玄参汤	933
26314 立圣鹤顶丹	922	26354 玄妙饮	928	26397 玄参汤	933
26315 立应四物汤	923	26355 玄妙散	928	26398 玄参汤	933
26316 立应金丝膏	923	26356 玄青丸	928	26399 玄参汤	934
26317 立应绀珠丹	923	26357 玄青丹	929	26400 玄参饮	934
26318 立命开阳汤	923	26358 玄武丹	929	26401 玄参饮	934
26319 立竿见影方	923	26359 玄武汤	929	26402 玄参饮	934
26320 立除冷哮喘	923	26360 玄武豆	929	26403 玄参饮	934
26321 立候下胎散	924	26361 玄武膏	929	26404 玄参剂	934
26322 立效木香散	924	26362 玄武膏	929	26405 玄参剂	934
26323 立效咽喉散	924	26363 玄直散	929	26406 玄参酒	934
26324 立效济众丹	924	26364 玄英丸	929	26407 玄参散	934
26325 立消神效膏	924	26365 玄英丸	930	26408 玄参散	934
26326 立验大圣散	924	26366 玄英丹	930	26409 玄参散	935
26327 立溃拔毒膏	924	26367 玄英汤	930	26410 玄参散	935
26328 立催芎归汤	924	26368 玄英散	930	26411 玄参散	935
26329 立马回疔夺命散	924	26369 玄明散	930	26412 玄参散	935
26330 立止牙痛即安丹	925	26370 玄参丸	930	26413 玄参散	935
26331 立消斗大疔气方	925	26371 玄参丸	930	26414 玄参散	935
26332 立解咽喉肿塞方	925	26372 玄参丸	931	26415 玄参散	935
26333 立消疔疮外治神效 方	925	26373 玄参丸	931	26416 玄参散	936
		26374 玄参丸	931	26417 玄参散	936
		26375 玄参丸	931	26418 玄参散	936
		26376 玄参丸	931	26419 玄参散	936
		26377 玄参丸	931	26420 玄参散	936
		26378 玄参丸	931	26421 玄参散	936
		26379 玄参丸	931	26422 玄参散	936

玄

26334 玄霜	925
26335 玄霜	926
26336 玄霜	926

26423 玄参散	937	26466 玄椒散	942	26509 玄麦地黄汤	946
26424 玄参散	937	26467 玄犀饮	942	26510 玄麦至神汤	946
26425 玄参散	937	26468 玄精丸	942	26511 玄苓二陈汤	946
26426 玄参散	937	26469 玄精丹	942	26512 玄武天地煎	946
26427 玄参散	937	26470 玄精汤	942	26513 玄明春雪膏	946
26428 玄参散	937	26471 玄蝎散	942	26514 玄参贝母汤	946
26429 玄参散	937	26472 玄霜散	942	26515 玄参化毒汤	946
26430 玄参散	938	26473 玄霜散	942	26516 玄参化毒汤	947
26431 玄参散	938	26474 玄霜膏	942	26517 玄参化毒饮	947
26432 玄参散	938	26475 玄霜膏	943	26518 玄参升麻汤	947
26433 玄参散	938	26476 玄霜膏	943	26519 玄参升麻汤	947
26434 玄参煎	938	26477 玄明粉丸	943	26520 玄参升麻汤	947
26435 玄参煎	938	26478 玄明粉散	943	26521 玄参升麻汤	948
26436 玄参膏	938	26479 玄明粉散	943	26522 玄参升麻汤	948
26437 玄参膏	938	26480 玄明粉散	943	26523 玄参升麻汤	948
26438 玄胡丸	939	26481 玄胡索丸	943	26524 玄参升麻汤	948
26439 玄胡丸	939	26482 玄胡索丸	943	26525 玄参甘草汤	948
26440 玄胡饼	939	26483 玄胡索汤	943	26526 玄参甘草汤	948
26441 玄胡酒	939	26484 玄胡索汤	943	26527 玄参甘桔汤	948
26442 玄胡散	939	26485 玄胡索汤	944	26528 玄参甘桔茶	948
26443 玄胡散	939	26486 玄胡索散	944	26529 玄参地黄汤	948
26444 玄胡散	939	26487 玄胡索散	944	26530 玄参地黄汤	948
26445 玄胡散	939	26488 玄胡索散	944	26531 玄参地黄汤	948
26446 玄胡散	940	26489 玄胡索散	944	26532 玄参泻肝散	949
26447 玄胡散	940	26490 玄胡索散	944	26533 玄参莲枣饮	949
26448 玄胡散	940	26491 玄胡索散	944	26534 玄参救苦膏	949
26449 玄胡散	940	26492 玄胡索散	944	26535 玄参清肺饮	949
26450 玄胡散	940	26493 玄胡索散	944	26536 玄参犀角汤	949
26451 玄胡散	940	26494 玄胡索散	944	26537 玄参解毒汤	949
26452 玄荆汤	940	26495 玄胡索散	944	26538 玄参解毒汤	949
26453 玄剑散	940	26496 玄胡索散	945	26539 玄参解毒汤	949
26454 玄珠膏	940	26497 玄胡索散	945	26540 玄参解毒饮	949
26455 玄素散	940	26498 玄精石方	945	26541 玄参解毒散	949
26456 玄桂丸	940	26499 玄精石散	945	26542 玄参解毒散	949
26457 玄桔汤	940	26500 玄精石散	945	26543 玄胡六合汤	949
26458 玄梅散	941	26501 玄精石散	945	26544 玄胡四物汤	950
26459 玄菟丸	941	26502 玄精石散	945	26545 玄胡当归散	950
26460 玄菟丹	941	26503 玄丹升麻汤	945	26546 玄胡苦楝汤	950
26461 玄菟丹	941	26504 玄丹麦冬汤	945	26547 玄胡琥珀散	950
26462 玄菟散	941	26505 玄石花粉散	945	26548 玄菟固本丸	950
26463 玄菟煎	941	26506 玄石紫粉丹	945	26549 玄黄解热散	950
26464 玄黄丹	941	26507 玄母菊饮汤	946	26550 玄黄辟毒散	950
26465 玄黄散	941	26508 玄牝太极丹	946	26551 玄黄避毒丹	950

26552 玄霜雪梨膏	950
26553 玄霜紫雪膏	951
26554 玄参寒水石散	951
26555 玄参羚羊角汤	951
26556 玄胡索苦楝汤	951

主

26557 主气散	951
26558 主肾丸	951
26559 主胜丸	951
26560 主眼汤	952
26561 主聪汤	952

兰

26562 兰台散	952
26563 兰草汤	952
26564 兰香散	952
26565 兰香散	952
26566 兰香散	952
26567 兰香散	952
26568 兰香散	952
26569 兰覆散	952
26570 兰香饮子	953

宁

26571 宁中膏	953
26572 宁气丸	953
26573 宁气汤	953
26574 宁气汤	953
26575 宁气散	953
26576 宁火丹	953
26577 宁心丸	953
26578 宁心片	954
26579 宁心丹	954
26580 宁心汤	954
26581 宁心汤	954
26582 宁心散	954
26583 宁心膏	954
26584 宁心膏	954
26585 宁生汤	954
26586 宁血汤	954
26587 宁血汤	955
26588 宁志丸	955

26589 宁志丸	955
26590 宁志丸	955
26591 宁志膏	955
26592 宁志膏	956
26593 宁志膏	956
26594 宁志膏	956
26595 宁坤丸	956
26596 宁坤丸	956
26597 宁坤錠	956
26598 宁肺丸	957
26599 宁肺汤	957
26600 宁肺汤	957
26601 宁肺汤	957
26602 宁肺汤	957
26603 宁肺汤	957
26604 宁肺汤	957
26605 宁肺饮	957
26606 宁肺散	957
26607 宁肺散	958
26608 宁肺散	958
26609 宁肺散	958
26610 宁肺散	958
26611 宁肺散	958
26612 宁肺散	958
26613 宁肺膏	958
26614 宁沸汤	958
26615 宁波汤	958
26616 宁萁丸	959
26617 宁萁丸	959
26618 宁胃汤	959
26619 宁胃散	959
26620 宁神丸	959
26621 宁神丸	959
26622 宁神丹	959
26623 宁神丹	959
26624 宁神丹	960
26625 宁神丹	960
26626 宁神丹	960
26627 宁神汤	960
26628 宁神汤	960
26629 宁神汤	960
26630 宁神汤	960
26631 宁神汤	960

26632 宁神汤	961
26633 宁神饮	961
26634 宁神散	961
26635 宁神散	961
26636 宁神散	961
26637 宁神散	961
26638 宁神膏	961
26639 宁神膏	961
26640 宁神膏	961
26641 宁神膏	961
26642 宁眠散	961
26643 宁眠膏	962
26644 宁眠膏	962
26645 宁静汤	962
26646 宁嗽丸	962
26647 宁嗽丸	962
26648 宁嗽丸	962
26649 宁嗽丹	962
26650 宁嗽丹	963
26651 宁嗽汤	963
26652 宁嗽汤	963
26653 宁嗽汤	963
26654 宁嗽汤	963
26655 宁嗽煎	963
26656 宁嗽膏	963
26657 宁嗽膏	963
26658 宁嗽膏	963
26659 宁嗽膏	964
26660 宁嗽糖	964
26661 宁嗽金丹	964
26662 宁心生一散	964
26663 宁心益志丸	964
26664 宁志内托散	964
26665 宁志化痰汤	964
26666 宁坤至宝丹	965
26667 宁坤至宝丹	965
26668 宁坤至宝丹	965
26669 宁坤养血丹	965
26670 宁肺止嗽饮	965
26671 宁肺止嗽散	965
26672 宁肺生化汤	966
26673 宁肺桔梗汤	966
26674 宁肺清金丸	966

26675	宁神内托散	966
26676	宁神化毒汤	966
26677	宁神生化汤	966
26678	宁神生化汤	966
26679	宁神安卧丸	967
26680	宁神导痰汤	967
26681	宁神固精丸	967
26682	宁神定志丸	967
26683	宁嗽太平丸	967
26684	宁嗽化痰丸	967
26685	宁嗽化痰丸	967
26686	宁嗽化痰汤	967
26687	宁嗽百花膏	967
26688	宁嗽抑火汤	967
26689	宁嗽定喘饮	967
26690	宁嗽润肺丸	968
26691	宁嗽琼玉散	968
26692	宁心志济经丹	968
26693	宁和堂暖脐膏	968
26694	宁心定魄茯神汤	968

永

26695	永安汤	968
26696	永寿丹	968
26697	永固孕汤	969
26698	永和公主药澡豆	969

必

26699	必孕汤	969
26700	必圣膏	969
26701	必应汤	969
26702	必应散	969
26703	必应散	969
26704	必应散	969
26705	必应散	969
26706	必胜丸	970
26707	必胜汤	970
26708	必胜汤	970
26709	必胜汤	970
26710	必胜饮	970
26711	必胜饮	970
26712	必胜饮	970
26713	必胜散	970

26714	必胜散	971
26715	必胜散	971
26716	必胜散	971
26717	必胜散	971
26718	必胜散	971
26719	必胜散	971
26720	必胜散	971
26721	必胜散	971
26722	必胜散	971
26723	必胜散	971
26724	必胜散	972
26725	必胜散	972
26726	必胜散	972
26727	必胜膏	972
26728	必胜膏	972
26729	必胜膏	972
26730	必胜膏	972
26731	必胜膏	972
26732	必效丸	972
26733	必效丸	972
26734	必效丸	973
26735	必效丸	973
26736	必效丸	973
26737	必效丸	973
26738	必效丹	973
26739	必效丹	973
26740	必效酒	973
26741	必效散	973
26742	必效散	973
26743	必效散	974
26744	必效散	974
26745	必效散	974
26746	必效散	974
26747	必效散	974
26748	必效散	974
26749	必效散	974
26750	必效散	974
26751	必效散	974
26752	必效散	975
26753	必效散	975
26754	必效散	975
26755	必效散	975
26756	必效散	975

26757	必效散	975
26758	必效散	975
26759	必效散	975
26760	必效散	975
26761	必效散	976
26762	必效散	976
26763	必效散	976
26764	必效散	976
26765	必效煎	976
26766	必效膏	976
26767	必消散	977
26768	必救丹	977
26769	必捷丸	977
26770	必捷散	977
26771	必效饮子	977
26772	必效饮子	977
26773	必用四圣散	977
26774	必用四神散	977
26775	必效四物汤	977

头

26776	头风散	977
26777	头瓶穆	977
26778	头痛丸	978
26779	头瘟汤	978
26780	头风饼子	978
26781	头风痛膏	978
26782	头风摩散	978
26783	头号化毒丹	978
26784	头号虚痰丸	978

半

26785	半丁丸	978
26786	半天丸	979
26787	半贝丸	979
26788	半贝散	979
26789	半仙丸	979
26790	半白散	979
26791	半瓜丸	979
26792	半边散	979
26793	半字散	979
26794	半苏丸	979
26795	半杏丸	980

26796 半两丸	980	26839 半夏丸	985	26882 半夏汤	989
26797 半角丸	980	26840 半夏丸	985	26883 半夏汤	990
26798 半附汤	980	26841 半夏丸	985	26884 半夏汤	990
26799 半苓丸	980	26842 半夏丸	985	26885 半夏汤	990
26800 半苓丸	980	26843 半夏丸	985	26886 半夏汤	990
26801 半苓汤	980	26844 半夏丸	985	26887 半夏汤	990
26802 半金丹	980	26845 半夏丸	985	26888 半夏汤	991
26803 半金散	980	26846 半夏丸	985	26889 半夏汤	991
26804 半金散	980	26847 半夏丸	985	26890 半夏汤	991
26805 半夜散	981	26848 半夏丸	985	26891 半夏汤	991
26806 半星丸	981	26849 半夏丸	986	26892 半夏汤	991
26807 半星丸	981	26850 半夏丸	986	26893 半夏汤	992
26808 半桂汤	981	26851 半夏丸	986	26894 半夏汤	992
26809 半桃丸	981	26852 半夏丸	986	26895 半夏汤	992
26810 半夏丸	981	26853 半夏丸	986	26896 半夏汤	992
26811 半夏丸	981	26854 半夏丸	986	26897 半夏汤	992
26812 半夏丸	981	26855 半夏丸	986	26898 半夏汤	992
26813 半夏丸	981	26856 半夏丸	986	26899 半夏汤	992
26814 半夏丸	982	26857 半夏丸	986	26900 半夏汤	992
26815 半夏丸	982	26858 半夏丸	987	26901 半夏汤	993
26816 半夏丸	982	26859 半夏丸	987	26902 半夏汤	993
26817 半夏丸	982	26860 半夏丸	987	26903 半夏汤	993
26818 半夏丸	982	26861 半夏丸	987	26904 半夏汤	993
26819 半夏丸	982	26862 半夏丸	987	26905 半夏汤	993
26820 半夏丸	982	26863 半夏丸	987	26906 半夏汤	993
26821 半夏丸	982	26864 半夏丸	987	26907 半夏汤	993
26822 半夏丸	982	26865 半夏丸	987	26908 半夏汤	993
26823 半夏丸	983	26866 半夏丸	987	26909 半夏汤	994
26824 半夏丸	983	26867 半夏丸	987	26910 半夏汤	994
26825 半夏丸	983	26868 半夏丸	987	26911 半夏汤	994
26826 半夏丸	983	26869 半夏丸	987	26912 半夏汤	994
26827 半夏丸	983	26870 半夏丸	988	26913 半夏汤	994
26828 半夏丸	983	26871 半夏丸	988	26914 半夏汤	994
26829 半夏丸	983	26872 半夏丸	988	26915 半夏汤	994
26830 半夏丸	983	26873 半夏曲	988	26916 半夏汤	994
26831 半夏丸	983	26874 半夏曲	988	26917 半夏汤	995
26832 半夏丸	984	26875 半夏汤	988	26918 半夏汤	995
26833 半夏丸	984	26876 半夏汤	988	26919 半夏汤	995
26834 半夏丸	984	26877 半夏汤	989	26920 半夏汤	995
26835 半夏丸	984	26878 半夏汤	989	26921 半夏汤	995
26836 半夏丸	984	26879 半夏汤	989	26922 半夏汤	995
26837 半夏丸	984	26880 半夏汤	989	26923 半夏汤	995
26838 半夏丸	984	26881 半夏汤	989	26924 半夏汤	995

26925 半夏汤	996	26968 半夏汤	1001	27011 半夏散	1006
26926 半夏汤	996	26969 半夏汤	1001	27012 半夏散	1006
26927 半夏汤	996	26970 半夏汤	1001	27013 半夏散	1006
26928 半夏汤	996	26971 半夏汤	1001	27014 半夏散	1006
26929 半夏汤	996	26972 半夏汤	1001	27015 半夏散	1006
26930 半夏汤	996	26973 半夏汤	1001	27016 半夏散	1006
26931 半夏汤	996	26974 半夏汤	1001	27017 半夏散	1006
26932 半夏汤	996	26975 半夏汤	1001	27018 半夏散	1007
26933 半夏汤	996	26976 半夏汤	1001	27019 半夏散	1007
26934 半夏汤	996	26977 半夏汤	1002	27020 半夏散	1007
26935 半夏汤	997	26978 半夏汤	1002	27021 半夏散	1007
26936 半夏汤	997	26979 半夏汤	1002	27022 半夏散	1007
26937 半夏汤	997	26980 半夏汤	1002	27023 半夏散	1007
26938 半夏汤	997	26981 半夏汤	1002	27024 半夏散	1007
26939 半夏汤	997	26982 半夏汤	1002	27025 半夏散	1008
26940 半夏汤	997	26983 半夏汤	1002	27026 半夏散	1008
26941 半夏汤	997	26984 半夏汤	1002	27027 半夏散	1008
26942 半夏汤	997	26985 半夏汤	1002	27028 半夏散	1008
26943 半夏汤	998	26986 半夏汤	1002	27029 半夏散	1008
26944 半夏汤	998	26987 半夏汤	1002	27030 半夏散	1008
26945 半夏汤	998	26988 半夏汤	1002	27031 半夏散	1008
26946 半夏汤	998	26989 半夏汤	1002	27032 半夏散	1009
26947 半夏汤	998	26990 半夏饮	1003	27033 半夏散	1009
26948 半夏汤	998	26991 半夏饮	1003	27034 半夏散	1009
26949 半夏汤	998	26992 半夏饮	1003	27035 半夏散	1009
26950 半夏汤	999	26993 半夏饮	1003	27036 半夏散	1009
26951 半夏汤	999	26994 半夏饮	1003	27037 半夏散	1009
26952 半夏汤	999	26995 半夏饮	1003	27038 半夏散	1010
26953 半夏汤	999	26996 半夏饮	1003	27039 半夏散	1010
26954 半夏汤	999	26997 半夏饮	1004	27040 半夏散	1010
26955 半夏汤	999	26998 半夏饮	1004	27041 半夏散	1010
26956 半夏汤	999	26999 半夏酒	1004	27042 半夏散	1010
26957 半夏汤	1000	27000 半夏酒	1004	27043 半夏散	1010
26958 半夏汤	1000	27001 半夏散	1004	27044 半夏散	1010
26959 半夏汤	1000	27002 半夏散	1004	27045 半夏散	1011
26960 半夏汤	1000	27003 半夏散	1004	27046 半夏散	1011
26961 半夏汤	1000	27004 半夏散	1004	27047 半夏散	1011
26962 半夏汤	1000	27005 半夏散	1005	27048 半夏散	1011
26963 半夏汤	1000	27006 半夏散	1005	27049 半夏散	1011
26964 半夏汤	1000	27007 半夏散	1005	27050 半夏散	1011
26965 半夏汤	1000	27008 半夏散	1005	27051 半夏散	1011
26966 半夏汤	1000	27009 半夏散	1005	27052 半夏散	1012
26967 半夏汤	1000	27010 半夏散	1005	27053 半夏散	1012

27054 半夏散	1012	27097 半夏散	1018	27140 半夏干姜汤	1023
27055 半夏散	1012	27098 半夏散	1018	27141 半夏干姜汤	1023
27056 半夏散	1012	27099 半夏散	1018	27142 半夏干姜散	1023
27057 半夏散	1012	27100 半夏散	1018	27143 半夏天麻丸	1023
27058 半夏散	1013	27101 半夏散	1018	27144 半夏天麻汤	1023
27059 半夏散	1013	27102 半夏散	1018	27145 半夏木通汤	1023
27060 半夏散	1013	27103 半夏散	1018	27146 半夏木通汤	1023
27061 半夏散	1013	27104 半夏散	1019	27147 半夏五香丸	1023
27062 半夏散	1013	27105 半夏散	1019	27148 半夏中和汤	1023
27063 半夏散	1013	27106 半夏散	1019	27149 半夏化痰丸	1024
27064 半夏散	1013	27107 半夏散	1019	27150 半夏平胃散	1024
27065 半夏散	1014	27108 半夏散	1019	27151 半夏正气丹	1024
27066 半夏散	1014	27109 半夏散	1019	27152 半夏甘桂汤	1024
27067 半夏散	1014	27110 半夏散	1019	27153 半夏左金汤	1024
27068 半夏散	1014	27111 半夏散	1019	27154 半夏左经汤	1024
27069 半夏散	1014	27112 半夏膏	1019	27155 半夏生姜汤	1024
27070 半夏散	1014	27113 半钱散	1019	27156 半夏生姜汤	1024
27071 半夏散	1014	27114 半消丸	1019	27157 半夏生姜汤	1025
27072 半夏散	1014	27115 半黄丸	1020	27158 半夏白术丸	1025
27073 半夏散	1015	27116 半粟散	1020	27159 半夏白芷散	1025
27074 半夏散	1015	27117 半硫丸	1020	27160 半夏曲芽汤	1025
27075 半夏散	1015	27118 半提丹	1020	27161 半夏曲芽汤	1025
27076 半夏散	1015	27119 半解汤	1020	27162 半夏竹茹汤	1025
27077 半夏散	1015	27120 半豆饮子	1020	27163 半夏苍术汤	1025
27078 半夏散	1015	27121 半枝莲饮	1021	27164 半夏苍术汤	1025
27079 半夏散	1015	27122 半夏汤散	1021	27165 半夏苏子汤	1025
27080 半夏散	1016	27123 半夏饮子	1021	27166 半夏杏仁汤	1025
27081 半夏散	1016	27124 半夏饮子	1021	27167 半夏利膈丸	1025
27082 半夏散	1016	27125 半夏怀托	1021	27168 半夏利膈丸	1025
27083 半夏散	1016	27126 半夏拨刀	1021	27169 半夏利膈丸	1026
27084 半夏散	1016	27127 半夏拨刀	1021	27170 半夏补心汤	1026
27085 半夏散	1016	27128 半夏根散	1021	27171 半夏苦酒汤	1026
27086 半夏散	1016	27129 半夏煮散	1021	27172 半夏芩术汤	1026
27087 半夏散	1017	27130 半夏熨方	1022	27173 半夏肺痿汤	1026
27088 半夏散	1017	27131 半贝姜茶饮	1022	27174 半夏海心汤	1026
27089 半夏散	1017	27132 半术天麻汤	1022	27175 半夏枳术丸	1028
27090 半夏散	1017	27133 半附理中汤	1022	27176 半夏草果散	1028
27091 半夏散	1017	27134 半苓平胃散	1022	27177 半夏茯苓丸	1028
27092 半夏散	1017	27135 半夏二味丸	1022	27178 半夏茯苓汤	1028
27093 半夏散	1017	27136 半夏十味汤	1022	27179 半夏茯苓汤	1028
27094 半夏散	1017	27137 半夏丁香丸	1022	27180 半夏茯苓汤	1028
27095 半夏散	1017	27138 半夏丁香丸	1022	27181 半夏茯苓汤	1029
27096 半夏散	1018	27139 半夏人参汤	1023	27182 半夏茯苓汤	1029

27183	半夏茯苓汤	1029
27184	半夏茯苓汤	1029
27185	半夏茯苓汤	1030
27186	半夏茯苓汤	1030
27187	半夏茯苓汤	1030
27188	半夏茯苓汤	1030
27189	半夏茯苓汤	1030
27190	半夏茯苓神散	1030
27191	半夏茯苓神散	1030
27192	半夏厚朴汤	1030
27193	半夏厚朴汤	1031
27194	半夏厚朴汤	1031
27195	半夏神曲汤	1031
27196	半夏桂甘汤	1032
27197	半夏桂枝汤	1032
27198	半夏桔梗汤	1032
27199	半夏栝楼丸	1032
27200	半夏秫米汤	1032
27201	半夏涤痰汤	1032
27202	半夏通气散	1032
27203	半夏麻黄丸	1032
27204	半夏温肺汤	1032
27205	半夏棋子粥	1033
27206	半夏解毒汤	1033
27207	半夏橘皮汤	1033
27208	半夏橘皮汤	1033
27209	半夏橘皮汤	1033
27210	半夏橘皮汤	1033
27211	半夏橘皮汤	1033
27212	半夏橘皮汤	1033
27213	半夏橘皮饮	1033
27214	半夏礞石丸	1034
27215	半夏藿香丸	1034
27216	半夏藿香汤	1034
27217	半湿半热汤	1034
27218	半湿半热汤	1034
27219	半夏东流水汤	1034
27220	半夏加茯苓汤	1034
27221	半夏茯苓饮子	1034
27222	半夏羚羊角散	1034
27223	半夏半里中和汤	1034
27224	半夏千里流水	

	汤	1034
27225	半夏千里流水汤	1035
27226	半夏天麻白术汤	1035
27227	半夏生姜大黄汤	1035
27228	半夏白术天麻汤	1035
27229	半夏白术天麻汤	1036
27230	半夏白术天麻汤	1036
27231	半夏白术天麻汤	1036
27232	半夏南星白附丸	1036
27233	半夏茯苓天麻汤	1036
27234	半夏茯苓陈皮汤	1036
27235	半夏桂枝甘草汤	1037
27236	半夏黄连解毒汤	1037
27237	半夏茯苓汤加丁香汤	1037
27238	半夏理中续膈破寒汤	1037
27239	半夏泻心汤去干姜甘草加枳实杏仁方	1037
27240	半夏泻心汤去人参甘草干姜大枣加枳实生姜方	1037

闪

27241	闪痛煎	1037
-------	-----	------

【一】

肝

27242	肝张膏	1037
-------	-----	------

加

27243	加干散	1038
27244	加皮酒	1038
27245	加皮露	1038
27246	加吊藤散	1038
27247	加生化肾汤	1038
27248	加连生化汤	1038
27249	加苓调脾散	1038
27250	加味二冬汤	1038
27251	加味二母丸	1039
27252	加味二陈汤	1039
27253	加味二陈汤	1039
27254	加味二陈汤	1039
27255	加味二陈汤	1039
27256	加味二陈汤	1039
27257	加味二陈汤	1039
27258	加味二陈汤	1039
27259	加味二陈汤	1039
27260	加味二陈汤	1039
27261	加味二陈汤	1039
27262	加味二陈汤	1040
27263	加味二陈汤	1040
27264	加味二陈汤	1040
27265	加味二陈汤	1040
27266	加味二陈汤	1040
27267	加味二陈汤	1040
27268	加味二陈汤	1041
27269	加味二陈汤	1041
27270	加味二陈汤	1041
27271	加味二陈汤	1041
27272	加味二陈汤	1041
27273	加味二陈汤	1041
27274	加味二陈汤	1041
27275	加味二陈汤	1041
27276	加味二陈汤	1041
27277	加味二陈汤	1042
27278	加味二陈汤	1042
27279	加味二陈汤	1042
27280	加味二陈汤	1042
27281	加味二陈汤	1042
27282	加味二陈汤	1042
27283	加味二陈汤	1042

27284 加味二陈汤	1042	27327 加味二妙散	1047	27370 加味八珍汤	1052
27285 加味二陈汤	1042	27328 加味二妙散	1047	27371 加味八珍汤	1052
27286 加味二陈汤	1043	27329 加味二妙散	1047	27372 加味八珍汤	1052
27287 加味二陈汤	1043	27330 加味二妙散	1047	27373 加味八珍汤	1052
27288 加味二陈汤	1043	27331 加味二黄散	1047	27374 加味八珍汤	1052
27289 加味二陈汤	1043	27332 加味十全汤	1047	27375 加味八将丹	1052
27290 加味二陈汤	1043	27333 加味十奇散	1047	27376 加味人地汤	1052
27291 加味二陈汤	1043	27334 加味十宣散	1047	27377 加味三才汤	1053
27292 加味二陈汤	1043	27335 加味七子丸	1048	27378 加味三才汤	1053
27293 加味二陈汤	1043	27336 加味七气汤	1048	27379 加味三仙饮	1053
27294 加味二陈汤	1043	27337 加味七气汤	1048	27380 加味三仙饮	1053
27295 加味二陈汤	1043	27338 加味七气汤	1048	27381 加味三仙饮	1053
27296 加味二陈汤	1043	27339 加味七味丸	1048	27382 加味三仙饮	1053
27297 加味二陈汤	1044	27340 加味七神丸	1048	27383 加味三仙饮	1053
27298 加味二陈汤	1044	27341 加味七福饮	1049	27384 加味三仙饮	1053
27299 加味二陈汤	1044	27342 加味八正散	1049	27385 加味三仙饮	1053
27300 加味二陈汤	1044	27343 加味八正散	1049	27386 加味三仙饮	1053
27301 加味二陈汤	1044	27344 加味八正散	1049	27387 加味三仙饮	1053
27302 加味二陈汤	1044	27345 加味八正散	1049	27388 加味三生丸	1054
27303 加味二陈汤	1044	27346 加味八仙汤	1049	27389 加味三生饮	1054
27304 加味二陈汤	1044	27347 加味八仙膏	1049	27390 加味三白丹	1054
27305 加味二陈汤	1044	27348 加味八味丸	1049	27391 加味三白散	1054
27306 加味二陈汤	1044	27349 加味八味丸	1049	27392 加味三白散	1054
27307 加味二陈汤	1045	27350 加味八味丸	1049	27393 加味三圣丸	1054
27308 加味二陈汤	1045	27351 加味八味汤	1050	27394 加味三圣丸	1054
27309 加味二陈汤	1045	27352 加味八物汤	1050	27395 加味三豆饮	1054
27310 加味二陈汤	1045	27353 加味八物汤	1050	27396 加味三花汤	1054
27311 加味二陈汤	1045	27354 加味八物汤	1050	27397 加味三补丸	1054
27312 加味二陈汤	1045	27355 加味八物汤	1050	27398 加味三补丸	1054
27313 加味二陈汤	1045	27356 加味八物汤	1050	27399 加味三补丸	1055
27314 加味二陈汤	1045	27357 加味八物汤	1050	27400 加味三补丸	1055
27315 加味二陈汤	1045	27358 加味八宝丹	1051	27401 加味三妙丸	1055
27316 加味二陈汤	1045	27359 加味八珍丸	1051	27402 加味三妙丸	1055
27317 加味二陈汤	1046	27360 加味八珍汤	1051	27403 加味三苓散	1055
27318 加味二陈汤	1046	27361 加味八珍汤	1051	27404 加味三拗汤	1055
27319 加味二陈汤	1046	27362 加味八珍汤	1051	27405 加味三拗汤	1055
27320 加味二陈汤	1046	27363 加味八珍汤	1051	27406 加味三拗汤	1055
27321 加味二陈汤	1046	27364 加味八珍汤	1051	27407 加味三建汤	1055
27322 加味二妙丸	1046	27365 加味八珍汤	1051	27408 加味三星汤	1055
27323 加味二妙丸	1046	27366 加味八珍汤	1052	27409 加味三星汤	1056
27324 加味二妙丸	1046	27367 加味八珍汤	1052	27410 加味三星汤	1056
27325 加味二妙汤	1046	27368 加味八珍汤	1052	27411 加味三黄丸	1056
27326 加味二妙汤	1046	27369 加味八珍汤	1052	27412 加味三黄丸	1056

27413 加味三黄丸	1056	27456 加味五苓散	1061	27499 加味风流饮	1067
27414 加味三黄汤	1056	27457 加味五宝丹	1061	27500 加味六一散	1067
27415 加味大补汤	1056	27458 加味五积饮	1061	27501 加味六一散	1067
27416 加味大补汤	1056	27459 加味五积散	1061	27502 加味六一散	1067
27417 加味大造丸	1056	27460 加味五积散	1062	27503 加味六一散	1067
27418 加味大造丸	1057	27461 加味五积散	1062	27504 加味六子丸	1067
27419 加味大造丸	1057	27462 加味五积散	1062	27505 加味六皮煎	1067
27420 加味大造汤	1057	27463 加味五积散	1062	27506 加味六合汤	1068
27421 加味上清丸	1057	27464 加味五益膏	1062	27507 加味六君汤	1068
27422 加味小承汤	1057	27465 加味五黄锭	1062	27508 加味六君汤	1068
27423 加味小胃丹	1057	27466 加味五淋散	1062	27509 加味六君汤	1068
27424 加味元冬汤	1057	27467 加味五痹汤	1062	27510 加味六君汤	1068
27425 加味天水散	1057	27468 加味太一膏	1063	27511 加味六君汤	1068
27426 加味天地散	1058	27469 加味太乙膏	1063	27512 加味六郁汤	1068
27427 加味天麻散	1058	27470 加味太乙膏	1063	27513 加味六神汤	1068
27428 加味天麻散	1058	27471 加味太乙膏	1063	27514 加味火枕丸	1068
27429 加味天然散	1058	27472 加味太极丸	1064	27515 加味火轮丸	1069
27430 加味木通汤	1058	27473 加味太极丸	1064	27516 加味火府汤	1069
27431 加味木通汤	1058	27474 加味化肾汤	1064	27517 加味双和汤	1069
27432 加味五仙散	1058	27475 加味化毒丹	1064	27518 加味艾附丸	1069
27433 加味五仙散	1058	27476 加味化毒饮	1064	27519 加味平胃散	1069
27434 加味五皮汤	1058	27477 加味化斑汤	1064	27520 加味平胃散	1069
27435 加味五皮汤	1059	27478 加味化斑汤	1064	27521 加味平胃散	1069
27436 加味五皮汤	1059	27479 加味化痰丸	1065	27522 加味平胃散	1069
27437 加味五皮汤	1059	27480 加味化痰丸	1065	27523 加味平胃散	1069
27438 加味五皮饮	1059	27481 加味牛黄散	1065	27524 加味平胃散	1069
27439 加味五皮散	1059	27482 加味升降散	1065	27525 加味平胃散	1070
27440 加味五苓汤	1059	27483 加味升麻汤	1065	27526 加味平胃散	1070
27441 加味五苓汤	1059	27484 加味升麻汤	1065	27527 加味平胃散	1070
27442 加味五苓散	1059	27485 加味升麻汤	1065	27528 加味平胃散	1070
27443 加味五苓散	1059	27486 加味升麻汤	1065	27529 加味平胃散	1070
27444 加味五苓散	1059	27487 加味升麻汤	1066	27530 加味平胃散	1070
27445 加味五苓散	1060	27488 加味升麻汤	1066	27531 加味平胃散	1070
27446 加味五苓散	1060	27489 加味升葛汤	1066	27532 加味平胃散	1070
27447 加味五苓散	1060	27490 加味乌沉汤	1066	27533 加味平胃散	1070
27448 加味五苓散	1060	27491 加味乌沉汤	1066	27534 加味平胃散	1070
27449 加味五苓散	1060	27492 加味乌金散	1066	27535 加味平胃散	1070
27450 加味五苓散	1060	27493 加味乌荆丸	1066	27536 加味平胃散	1070
27451 加味五苓散	1060	27494 加味乌荆丸	1066	27537 加味平胃散	1070
27452 加味五苓散	1060	27495 加味乌药汤	1066	27538 加味平胃散	1071
27453 加味五苓散	1060	27496 加味乌药汤	1067	27539 加味平胃散	1071
27454 加味五苓散	1061	27497 加味匀气散	1067	27540 加味平胃散	1071
27455 加味五苓散	1061	27498 加味丹梔汤	1067	27541 加味平胃散	1071

27542 加味平胃散	1071	27585 加味甘露饮	1076	27628 加味四七汤	1080
27543 加味平胃散	1071	27586 加味甘露饮	1076	27629 加味四七汤	1080
27544 加味平胃散	1071	27587 加味石膏汤	1076	27630 加味四斤丸	1080
27545 加味平胃散	1071	27588 加味石膏汤	1076	27631 加味四斤丸	1081
27546 加味平胃散	1071	27589 加味右归饮	1076	27632 加味四生饮	1081
27547 加味平胃散	1071	27590 加味左归饮	1076	27633 加味四圣饮	1081
27548 加味平胃散	1071	27591 加味左金丸	1076	27634 加味四圣散	1081
27549 加味平胃散	1072	27592 加味左金丸	1076	27635 加味四圣散	1081
27550 加味平胃散	1072	27593 加味左金丸	1076	27636 加味四圣散	1081
27551 加味平胃散	1072	27594 加味左金汤	1077	27637 加味四圣散	1081
27552 加味玉泉散	1072	27595 加味龙石散	1077	27638 加味四圣膏	1081
27553 加味玉烛散	1072	27596 加味龙石散	1077	27639 加味四君汤	1081
27554 加味玉露散	1072	27597 加味龙虎散	1077	27640 加味四君汤	1082
27555 加味术附汤	1072	27598 加味龙胆汤	1077	27641 加味四君汤	1082
27556 加味术附汤	1073	27599 加味戊己汤	1077	27642 加味四君汤	1082
27557 加味术附汤	1073	27600 加味归芍汤	1077	27643 加味四君汤	1082
27558 加味术苓汤	1073	27601 加味归芍汤	1077	27644 加味四君汤	1082
27559 加味术苓汤	1073	27602 加味归芍饮	1077	27645 加味四君汤	1082
27560 加味术苓汤	1073	27603 加味归宗汤	1077	27646 加味四君汤	1082
27561 加味术苓汤	1073	27604 加味归宗汤	1077	27647 加味四君汤	1082
27562 加味术桂汤	1073	27605 加味归宗汤	1078	27648 加味四苓汤	1082
27563 加味甘桔汤	1073	27606 加味归脾丸	1078	27649 加味四苓汤	1082
27564 加味甘桔汤	1073	27607 加味归脾汤	1078	27650 加味四苓散	1083
27565 加味甘桔汤	1073	27608 加味归脾汤	1078	27651 加味四苓散	1083
27566 加味甘桔汤	1073	27609 加味归脾汤	1078	27652 加味四苓散	1083
27567 加味甘桔汤	1074	27610 加味归脾汤	1078	27653 加味四苓散	1083
27568 加味甘桔汤	1074	27611 加味归脾汤	1079	27654 加味四苓散	1083
27569 加味甘桔汤	1074	27612 加味归脾汤	1079	27655 加味四苓散	1083
27570 加味甘桔汤	1074	27613 加味归脾汤	1079	27656 加味四苓散	1083
27571 加味甘桔汤	1074	27614 加味归脾汤	1079	27657 加味四苓散	1083
27572 加味甘桔汤	1074	27615 加味归脾汤	1079	27658 加味四苓散	1084
27573 加味甘桔汤	1074	27616 加味归脾汤	1079	27659 加味四苓散	1084
27574 加味甘桔汤	1074	27617 加味归脾汤	1079	27660 加味四味汤	1084
27575 加味甘桔汤	1075	27618 加味归脾汤	1079	27661 加味四物汤	1084
27576 加味甘桔汤	1075	27619 加味归脾汤	1079	27662 加味四物汤	1084
27577 加味甘桔汤	1075	27620 加味归脾汤	1079	27663 加味四物汤	1084
27578 加味甘桔汤	1075	27621 加味归脾汤	1079	27664 加味四物汤	1084
27579 加味甘桔汤	1075	27622 加味四七汤	1079	27665 加味四物汤	1084
27580 加味甘桔汤	1075	27623 加味四七汤	1080	27666 加味四物汤	1084
27581 加味甘桔汤	1075	27624 加味四七汤	1080	27667 加味四物汤	1084
27582 加味甘桔汤	1075	27625 加味四七汤	1080	27668 加味四物汤	1084
27583 加味甘桔汤	1075	27626 加味四七汤	1080	27669 加味四物汤	1085
27584 加味甘桔汤	1076	27627 加味四七汤	1080	27670 加味四物汤	1085

27800 加味生化汤 ····· 1098	27843 加味地黄丸 ····· 1103	27886 加味地黄汤 ····· 1108
27801 加味生化汤 ····· 1098	27844 加味地黄丸 ····· 1103	27887 加味地黄汤 ····· 1108
27802 加味生化汤 ····· 1098	27845 加味地黄丸 ····· 1103	27888 加味朴黄丸 ····· 1108
27803 加味生化汤 ····· 1098	27846 加味地黄丸 ····· 1103	27889 加味芍药汤 ····· 1108
27804 加味生化汤 ····· 1099	27847 加味地黄丸 ····· 1103	27890 加味芎归汤 ····· 1108
27805 加味生化汤 ····· 1099	27848 加味地黄丸 ····· 1103	27891 加味芎归汤 ····· 1109
27806 加味生化汤 ····· 1099	27849 加味地黄丸 ····· 1103	27892 加味芎归汤 ····· 1109
27807 加味生化汤 ····· 1099	27850 加味地黄丸 ····· 1104	27893 加味芎归汤 ····· 1109
27808 加味生化汤 ····· 1099	27851 加味地黄丸 ····· 1104	27894 加味芎归汤 ····· 1109
27809 加味生化汤 ····· 1099	27852 加味地黄丸 ····· 1104	27895 加味芎归汤 ····· 1109
27810 加味生化汤 ····· 1099	27853 加味地黄丸 ····· 1104	27896 加味芎归汤 ····· 1109
27811 加味生化汤 ····· 1099	27854 加味地黄丸 ····· 1104	27897 加味芎归汤 ····· 1109
27812 加味生脉散 ····· 1099	27855 加味地黄丸 ····· 1104	27898 加味芎归汤 ····· 1109
27813 加味生脉散 ····· 1099	27856 加味地黄丸 ····· 1104	27899 加味芎归汤 ····· 1109
27814 加味生脉散 ····· 1099	27857 加味地黄丸 ····· 1104	27900 加味芎归汤 ····· 1110
27815 加味生脉散 ····· 1100	27858 加味地黄丸 ····· 1104	27901 加味芎归汤 ····· 1110
27816 加味生脉散 ····· 1100	27859 加味地黄丸 ····· 1105	27902 加味芎归饮 ····· 1110
27817 加味白丸子 ····· 1100	27860 加味地黄丸 ····· 1105	27903 加味芎归饮 ····· 1110
27818 加味白术散 ····· 1100	27861 加味地黄丸 ····· 1105	27904 加味芎苏饮 ····· 1110
27819 加味白术散 ····· 1100	27862 加味地黄丸 ····· 1105	27905 加味芎苏散 ····· 1110
27820 加味白虎汤 ····· 1100	27863 加味地黄丸 ····· 1105	27906 加味芎苏汤 ····· 1110
27821 加味白虎汤 ····· 1100	27864 加味地黄丸 ····· 1105	27907 加味芎苏汤 ····· 1110
27822 加味白虎汤 ····· 1100	27865 加味地黄丸 ····· 1105	27908 加味芎苏汤 ····· 1110
27823 加味白虎汤 ····· 1100	27866 加味地黄丸 ····· 1105	27909 加味达原饮 ····· 1110
27824 加味白虎汤 ····· 1100	27867 加味地黄丸 ····· 1106	27910 加味百合汤 ····· 1111
27825 加味白虎汤 ····· 1100	27868 加味地黄汤 ····· 1106	27911 加味百花丸 ····· 1111
27826 加味白金丸 ····· 1101	27869 加味地黄汤 ····· 1106	27912 加味百花膏 ····· 1111
27827 加味白薏散 ····· 1101	27870 加味地黄汤 ····· 1106	27913 加味百顺丸 ····· 1111
27828 加味白薏散 ····· 1101	27871 加味地黄汤 ····· 1106	27914 加味托里散 ····· 1111
27829 加味白薇丸 ····· 1101	27872 加味地黄汤 ····· 1106	27915 加味托里散 ····· 1111
27830 加味白薇汤 ····· 1101	27873 加味地黄汤 ····· 1107	27916 加味至宝丹 ····· 1111
27831 加味瓜蒂散 ····· 1101	27874 加味地黄汤 ····· 1107	27917 加味贞元饮 ····· 1112
27832 加味宁志丸 ····· 1101	27875 加味地黄汤 ····· 1107	27918 加味当归汤 ····· 1112
27833 加味宁神丸 ····· 1101	27876 加味地黄汤 ····· 1107	27919 加味当归饮 ····· 1112
27834 加味宁神丸 ····· 1101	27877 加味地黄汤 ····· 1107	27920 加味当归散 ····· 1112
27835 加味半硫丸 ····· 1102	27878 加味地黄汤 ····· 1107	27921 加味当归散 ····· 1112
27836 加味圣愈汤 ····· 1102	27879 加味地黄汤 ····· 1107	27922 加味当归散 ····· 1112
27837 加味圣愈汤 ····· 1102	27880 加味地黄汤 ····· 1107	27923 加味当归膏 ····· 1112
27838 加味发表汤 ····· 1102	27881 加味地黄汤 ····· 1107	27924 加味回阳散 ····· 1112
27839 加味地黄丸 ····· 1102	27882 加味地黄汤 ····· 1107	27925 加味竹叶汤 ····· 1112
27840 加味地黄丸 ····· 1102	27883 加味地黄汤 ····· 1108	27926 加味竹叶汤 ····· 1113
27841 加味地黄丸 ····· 1102	27884 加味地黄汤 ····· 1108	27927 加味竹叶汤 ····· 1113
27842 加味地黄丸 ····· 1102	27885 加味地黄汤 ····· 1108	27928 加味竹叶汤 ····· 1113

27929 加味竹沥汤	1113	27972 加味导赤散	1118	28015 加味佛手散	1124
27930 加味竹沥汤	1113	27973 加味导赤散	1118	28016 加味佛手散	1124
27931 加味竹茹汤	1113	27974 加味导赤散	1118	28017 加味佛手散	1124
27932 加味华盖散	1113	27975 加味导赤散	1118	28018 加味佛手散	1124
27933 加味华盖散	1113	27976 加味导赤散	1118	28019 加味佛手散	1125
27934 加味交加散	1113	27977 加味导赤散	1119	28020 加味佛手散	1125
27935 加味交加散	1114	27978 加味导痰汤	1119	28021 加味佛手散	1125
27936 加味冲和汤	1114	27979 加味导痰汤	1119	28022 加味辛夷散	1125
27937 加味冰硼散	1114	27980 加味导痰汤	1119	28023 加味羌活汤	1125
27938 加味冰硼散	1114	27981 加味导痰汤	1119	28024 加味羌活饮	1125
27939 加味汤泡散	1114	27982 加味导痰汤	1119	28025 加味羌活散	1125
27940 加味守效丸	1114	27983 加味导痰汤	1120	28026 加味羌活散	1125
27941 加味守效丸	1114	27984 加味导痰饮	1120	28027 加味羌活散	1125
27942 加味安胎丸	1115	27985 加味阴阳散	1120	28028 加味补中汤	1126
27943 加味安胎饮	1115	27986 加味阴阳散	1120	28029 加味补血汤	1126
27944 加味安胎饮	1115	27987 加味防风汤	1120	28030 加味补血汤	1126
27945 加味安胎饮	1115	27988 加味防风汤	1120	28031 加味补血汤	1126
27946 加味安胎饮	1115	27989 加味如圣汤	1120	28032 加味补血汤	1126
27947 加味安胎饮	1115	27990 加味如圣散	1120	28033 加味补血汤	1126
27948 加味安胎饮	1115	27991 加味如神散	1121	28034 加味补血汤	1126
27949 加味安胎饮	1115	27992 加味妇沉汤	1121	28035 加味补血汤	1126
27950 加味安胎饮	1115	27993 加味观音散	1121	28036 加味补血汤	1126
27951 加味羊肝丸	1115	27994 加味红花散	1121	28037 加味补阴丸	1127
27952 加味羊肝丸	1116	27995 加味红绵散	1121	28038 加味补阴丸	1127
27953 加味羊肝丸	1116	27996 加味麦冬汤	1121	28039 加味补阴丸	1127
27954 加味异功汤	1116	27997 加味寿星丸	1122	28040 加味补阴丸	1127
27955 加味异功散	1116	27998 加味寿胎丸	1122	28041 加味补阴丸	1127
27956 加味异功散	1116	27999 加味坎离丸	1122	28042 加味补阴丸	1128
27957 加味异功散	1116	28000 加味坎离丸	1122	28043 加味补肝散	1128
27958 加味异功散	1116	28001 加味苇茎汤	1122	28044 加味纯阴汤	1128
27959 加味异功散	1116	28002 加味芷贝散	1122	28045 加味青龙汤	1128
27960 加味异功散	1117	28003 加味苍术膏	1123	28046 加味青金丹	1128
27961 加味异功散	1117	28004 加味苍柏汤	1123	28047 加味青娥丸	1128
27962 加味异功散	1117	28005 加味苍柏散	1123	28048 加味青娥丸	1128
27963 加味异功散	1117	28006 加味芦荟丸	1123	28049 加味青娥丸	1128
27964 加味异香散	1117	28007 加味两仪膏	1123	28050 加味青娥丸	1129
27965 加味导气汤	1117	28008 加味扶桑饮	1123	28051 加味枇杷膏	1129
27966 加味导赤汤	1117	28009 加味连壳丸	1124	28052 加味苦参丸	1129
27967 加味导赤饮	1117	28010 加味连草汤	1124	28053 加味苦参丸	1129
27968 加味导赤散	1118	28011 加味连理汤	1124	28054 加味抵当丸	1129
27969 加味导赤散	1118	28012 加味佛手散	1124	28055 加味转舌膏	1129
27970 加味导赤散	1118	28013 加味佛手散	1124	28056 加味虎潜丸	1130
27971 加味导赤散	1118	28014 加味佛手散	1124	28057 加味虎潜丸	1130

28058 加味虎潜丸	1130	28101 加味泽泻汤	1135	28144 加味枳术丸	1140
28059 加味虎潜丸	1130	28102 加味治中汤	1135	28145 加味枳术丸	1140
28060 加味肾气丸	1130	28103 加味治中汤	1135	28146 加味枳术丸	1140
28061 加味肾热汤	1131	28104 加味治中汤	1135	28147 加味枳术丸	1140
28062 加味肾着汤	1131	28105 加味治中汤	1135	28148 加味枳术丸	1140
28063 加味败毒散	1131	28106 加味治中汤	1135	28149 加味枳术汤	1141
28064 加味败毒散	1131	28107 加味宝华散	1136	28150 加味枳术汤	1141
28065 加味败毒散	1131	28108 加味定风珠	1136	28151 加味枳壳汤	1141
28066 加味败毒散	1131	28109 加味定志丸	1136	28152 加味枳壳汤	1141
28067 加味败毒散	1131	28110 加味定志丸	1136	28153 加味胡麻散	1141
28068 加味败毒散	1132	28111 加味定志丸	1136	28154 加味荆芥散	1141
28069 加味败毒散	1132	28112 加味定志丸	1136	28155 加味荆黄汤	1141
28070 加味败毒散	1132	28113 加味定志丸	1136	28156 加味草金丹	1141
28071 加味败毒散	1132	28114 加味定志丸	1136	28157 加味茵陈汤	1142
28072 加味败毒散	1132	28115 加味建中汤	1137	28158 加味茯苓汤	1142
28073 加味败毒散	1132	28116 加味建中汤	1137	28159 加味茯苓汤	1142
28074 加味固本丸	1132	28117 加味建中汤	1137	28160 加味茯苓饮	1142
28075 加味固本胶	1132	28118 加味建中汤	1137	28161 加味茯神散	1142
28076 加味固阴煎	1132	28119 加味建中汤	1137	28162 加味茯苓汤	1142
28077 加味和中饮	1132	28120 加味建中汤	1137	28163 加味茶汤方	1142
28078 加味和中散	1133	28121 加味降气汤	1137	28164 加味茶调散	1142
28079 加味知母散	1133	28122 加味参术汤	1137	28165 加味赴筵散	1143
28080 加味金龙丸	1133	28123 加味参术汤	1137	28166 加味威喜丸	1143
28081 加味金刚丸	1133	28124 加味参麦饮	1137	28167 加味贵金汤	1143
28082 加味金花丸	1133	28125 加味参麦散	1137	28168 加味胃苓丸	1143
28083 加味金花丸	1133	28126 加味参苏饮	1138	28169 加味胃苓丸	1143
28084 加味金锁匙	1133	28127 加味参苏饮	1138	28170 加味胃苓汤	1143
28085 加味肥儿丸	1133	28128 加味参苏饮	1138	28171 加味复元丹	1143
28086 加味肥儿丸	1133	28129 加味参苏饮	1138	28172 加味香归饮	1143
28087 加味泻心汤	1133	28130 加味参苏散	1138	28173 加味香苏饮	1143
28088 加味泻白散	1134	28131 加味参附汤	1138	28174 加味香苏饮	1144
28089 加味泻白散	1134	28132 加味参芪饮	1138	28175 加味香苏散	1144
28090 加味泻白散	1134	28133 加味参耆汤	1139	28176 加味香苏散	1144
28091 加味泻白散	1134	28134 加味参耆汤	1139	28177 加味香苏散	1144
28092 加味泻白散	1134	28135 加味参夏汤	1139	28178 加味香苏散	1144
28093 加味泻白散	1134	28136 加味参橘饮	1139	28179 加味香苏散	1145
28094 加味泻白散	1134	28137 加味参橘饮	1139	28180 加味香苏散	1145
28095 加味泻白散	1134	28138 加味承气汤	1139	28181 加味香苏散	1145
28096 加味泻白散	1134	28139 加味承气汤	1139	28182 加味香苏散	1145
28097 加味泻白散	1134	28140 加味承气汤	1139	28183 加味香连丸	1145
28098 加味泻肝汤	1134	28141 加味春雪膏	1139	28184 加味香连丸	1145
28099 加味泻黄散	1135	28142 加味枳术丸	1140	28185 加味香连丸	1146
28100 加味泽兰汤	1135	28143 加味枳术丸	1140	28186 加味香连丸	1146

28187 加味香连丸	1146	28230 加味养心汤	1151	28273 加味柴胡汤	1155
28188 加味香连丸	1146	28231 加味养心汤	1151	28274 加味柴胡汤	1155
28189 加味香连丸	1146	28232 加味养生方	1151	28275 加味柴胡汤	1155
28190 加味香连丸	1146	28233 加味养血汤	1151	28276 加味柴胡汤	1155
28191 加味香连丸	1146	28234 加味养血汤	1151	28277 加味柴胡饮	1156
28192 加味香连丸	1146	28235 加味养血汤	1151	28278 加味逍遥丸	1156
28193 加味香连汤	1146	28236 加味养荣丸	1151	28279 加味逍遥饮	1156
28194 加味香连散	1147	28237 加味养荣丸	1152	28280 加味逍遥散	1156
28195 加味香附丸	1147	28238 加味养荣丸	1152	28281 加味逍遥散	1156
28196 加味香薷丸	1147	28239 加味养脏汤	1152	28282 加味逍遥散	1157
28197 加味香薷饮	1147	28240 加味宣风散	1152	28283 加味逍遥散	1157
28198 加味香薷饮	1147	28241 加味宣风散	1152	28284 加味逍遥散	1157
28199 加味香薷饮	1147	28242 加味姜附汤	1152	28285 加味逍遥散	1157
28200 加味香薷饮	1147	28243 加味姜附汤	1152	28286 加味逍遥散	1157
28201 加味香薷饮	1147	28244 加味姜附汤	1153	28287 加味逍遥散	1157
28202 加味修肝散	1148	28245 加味祛风散	1153	28288 加味逍遥散	1157
28203 加味修肝散	1148	28246 加味神功丸	1153	28289 加味逍遥散	1157
28204 加味修肝散	1148	28247 加味神术汤	1153	28290 加味逍遥散	1158
28205 加味保元汤	1148	28248 加味神应丸	1153	28291 加味逍遥散	1158
28206 加味保元汤	1148	28249 加味神柞饮	1153	28292 加味逍遥散	1158
28207 加味保元汤	1148	28250 加味神香散	1153	28293 加味逍遥散	1158
28208 加味保元汤	1148	28251 加味除湿丸	1153	28294 加味逍遥散	1158
28209 加味保元汤	1148	28252 加味除湿汤	1153	28295 加味逍遥散	1158
28210 加味保元汤	1148	28253 加味珠黄散	1153	28296 加味逍遥散	1158
28211 加味保元汤	1149	28254 加味桂附汤	1154	28297 加味逍遥散	1159
28212 加味保元汤	1149	28255 加味桂枝汤	1154	28298 加味逍遥散	1159
28213 加味保和丸	1149	28256 加味桂枝汤	1154	28299 加味逍遥散	1159
28214 加味保和丸	1149	28257 加味桔梗汤	1154	28300 加味逍遥散	1159
28215 加味保和丸	1149	28258 加味真武汤	1154	28301 加味逍遥散	1159
28216 加味保和丸	1149	28259 加味莲湖丸	1154	28302 加味逍遥散	1159
28217 加味信枣丹	1149	28260 加味普桂汤	1154	28303 加味逍遥散	1159
28218 加味顺气散	1149	28261 加味柴平汤	1154	28304 加味逍遥散	1159
28219 加味顺气散	1150	28262 加味柴陈汤	1154	28305 加味逍遥散	1159
28220 加味独圣散	1150	28263 加味柴苓汤	1154	28306 加味逍遥散	1159
28221 加味胜金丸	1150	28264 加味柴物汤	1154	28307 加味逍遥散	1160
28222 加味胜湿汤	1150	28265 加味柴物汤	1155	28308 加味逍遥散	1160
28223 加味洞下丸	1150	28266 加味柴胡汤	1155	28309 加味逍遥散	1160
28224 加味活命饮	1150	28267 加味柴胡汤	1155	28310 加味逍遥散	1160
28225 加味活命散	1150	28268 加味柴胡汤	1155	28311 加味逍遥散	1160
28226 加味济川煎	1150	28269 加味柴胡汤	1155	28312 加味逍遥散	1160
28227 加味济生汤	1150	28270 加味柴胡汤	1155	28313 加味逍遥散	1160
28228 加味将军汤	1151	28271 加味柴胡汤	1155	28314 加味逍遥散	1160
28229 加味养元粉	1151	28272 加味柴胡汤	1155	28315 加味逍遥散	1160

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 28316 加味逍遥散 1160 | 28359 加味益母煎 1166 | 28402 加味理中饮 1171 |
| 28317 加味逍遥散 1161 | 28360 加味调中汤 1166 | 28403 加味理建汤 1171 |
| 28318 加味铁落饮 1161 | 28361 加味调中饮 1166 | 28404 加味黄玉膏 1171 |
| 28319 加味铁落饮 1161 | 28362 加味调中饮 1166 | 28405 加味黄芩汤 1171 |
| 28320 加味秘元煎 1161 | 28363 加味调经丸 1166 | 28406 加味黄芩汤 1171 |
| 28321 加味透肌汤 1161 | 28364 加味调经散 1166 | 28407 加味黄芩汤 1171 |
| 28322 加味透肌散 1161 | 28365 加味陷胸丸 1166 | 28408 加味黄芩汤 1171 |
| 28323 加味健脾丸 1161 | 28366 加味陷胸汤 1167 | 28409 加味黄芩汤 1172 |
| 28324 加味健脾丸 1161 | 28367 加味桑菊饮 1167 | 28410 加味黄芩汤 1172 |
| 28325 加味射干汤 1162 | 28368 加味通气汤 1167 | 28411 加味推气散 1172 |
| 28326 加味脏连丸 1162 | 28369 加味通心饮 1167 | 28412 加味控涎丸 1172 |
| 28327 加味脏连丸 1162 | 28370 加味通心散 1167 | 28413 加味控涎丹 1172 |
| 28328 加味脏连丸 1162 | 28371 加味通心散 1167 | 28414 加味救肺饮 1172 |
| 28329 加味凉膈散 1162 | 28372 加味通心散 1167 | 28415 加味救肺散 1172 |
| 28330 加味凉膈散 1162 | 28373 加味通圣散 1167 | 28416 加味铜绿散 1172 |
| 28331 加味凉膈散 1162 | 28374 加味理中丸 1167 | 28417 加味猪苓汤 1172 |
| 28332 加味凉膈散 1162 | 28375 加味理中丸 1168 | 28418 加味脱花煎 1173 |
| 28333 加味凉膈散 1162 | 28376 加味理中汤 1168 | 28419 加味麻仁丸 1173 |
| 28334 加味凉膈散 1163 | 28377 加味理中汤 1168 | 28420 加味麻仁丸 1173 |
| 28335 加味凉膈散 1163 | 28378 加味理中汤 1168 | 28421 加味麻风丸 1173 |
| 28336 加味凉膈散 1163 | 28379 加味理中汤 1168 | 28422 加味麻黄汤 1173 |
| 28337 加味凉膈煎 1163 | 28380 加味理中汤 1168 | 28423 加味麻黄汤 1173 |
| 28338 加味消风散 1163 | 28381 加味理中汤 1168 | 28424 加味麻黄汤 1173 |
| 28339 加味消毒饮 1163 | 28382 加味理中汤 1169 | 28425 加味麻黄汤 1173 |
| 28340 加味消毒饮 1163 | 28383 加味理中汤 1169 | 28426 加味麻黄汤 1173 |
| 28341 加味消毒饮 1164 | 28384 加味理中汤 1169 | 28427 加味麻黄散 1173 |
| 28342 加味消黄散 1164 | 28385 加味理中汤 1169 | 28428 加味清中散 1174 |
| 28343 加味流气饮 1164 | 28386 加味理中汤 1169 | 28429 加味清六丸 1174 |
| 28344 加味润下丸 1164 | 28387 加味理中汤 1169 | 28430 加味清心饮 1174 |
| 28345 加味益元散 1164 | 28388 加味理中汤 1169 | 28431 加味清宁膏 1174 |
| 28346 加味益元散 1164 | 28389 加味理中汤 1169 | 28432 加味清肺饮 1174 |
| 28347 加味益气汤 1164 | 28390 加味理中汤 1169 | 28433 加味清胃汤 1174 |
| 28348 加味益气汤 1164 | 28391 加味理中汤 1169 | 28434 加味清胃汤 1174 |
| 28349 加味益气汤 1164 | 28392 加味理中汤 1170 | 28435 加味清胃汤 1174 |
| 28350 加味益气汤 1164 | 28393 加味理中汤 1170 | 28436 加味清胃汤 1175 |
| 28351 加味益气汤 1165 | 28394 加味理中汤 1170 | 28437 加味清胃汤 1175 |
| 28352 加味益气汤 1165 | 28395 加味理中汤 1170 | 28438 加味清胃汤 1175 |
| 28353 加味益气汤 1165 | 28396 加味理中汤 1170 | 28439 加味清胃汤 1175 |
| 28354 加味益气汤 1165 | 28397 加味理中汤 1170 | 28440 加味清胃散 1175 |
| 28355 加味益心汤 1165 | 28398 加味理中汤 1170 | 28441 加味消胃散 1175 |
| 28356 加味益母丸 1165 | 28399 加味理中汤 1170 | 28442 加味清胃散 1175 |
| 28357 加味益母丸 1166 | 28400 加味理中汤 1171 | 28443 加味清胃散 1175 |
| 28358 加味益母散 1166 | 28401 加味理中汤 1171 | 28444 加味清胃散 1175 |

28445 加味清胃散	1176	28488 加味温胆汤	1181	28531 加味露姜饮	1186
28446 加味清胃散	1176	28489 加味温胆汤	1181	28532 加剂四物汤	1186
28447 加味清胃散	1176	28490 加味温胆汤	1181	28533 加剂除湿汤	1186
28448 加味清室汤	1176	28491 加味温养汤	1182	28534 加宝平安散	1186
28449 加味清宫汤	1176	28492 加味滋阴丸	1182	28535 加参八味丸	1186
28450 加味清凉饮	1176	28493 加味滋阴散	1182	28536 加参平胃散	1187
28451 加味清凉饮	1176	28494 加味滋肾丸	1182	28537 加参生化汤	1187
28452 加味清凉饮	1176	28495 加味滋肾丸	1182	28538 加参生化汤	1187
28453 加味清凉饮	1176	28496 加味滋肾汤	1182	28539 加参生化汤	1187
28454 加味清营汤	1176	28497 加味犀角汤	1182	28540 加参瓜蒂散	1187
28455 加味清喉煎	1176	28498 加味犀角汤	1182	28541 加参宁肺汤	1187
28456 加味清脾饮	1177	28499 加味犀角饮	1182	28542 加桂芎归汤	1187
28457 加味清震汤	1177	28500 加味犀角饮	1183	28543 加料十全汤	1187
28458 加味续命汤	1177	28501 加味槐花散	1183	28544 加料平胃散	1188
28459 加味续命汤	1177	28502 加味槐角丸	1183	28545 加料四物汤	1188
28460 加味绿矾丸	1177	28503 加味槐角丸	1183	28546 加料佛手散	1188
28461 加味琼玉膏	1177	28504 加味蜈蚣散	1183	28547 加料荷叶丸	1188
28462 加味椒红丸	1177	28505 加味解毒丹	1183	28548 加料舒肝丸	1188
28463 加味款冬散	1178	28506 加味解毒汤	1183	28549 加减一阴煎	1189
28464 加味葛根汤	1178	28507 加味解毒汤	1183	28550 加减一阴煎	1189
28465 加味葛根汤	1178	28508 加味解毒汤	1183	28551 加减二陈汤	1189
28466 加味葛根汤	1178	28509 加味解毒汤	1184	28552 加减二陈汤	1189
28467 加味葱豉汤	1178	28510 加味解毒饮	1184	28553 加减二陈汤	1189
28468 加味葱豉汤	1178	28511 加味解毒散	1184	28554 加减二陈汤	1189
28469 加味葱豉汤	1179	28512 加味解毒散	1184	28555 加减二陈汤	1190
28470 加味葵子散	1179	28513 加味解毒散	1184	28556 加减二陈汤	1190
28471 加味越鞠丸	1179	28514 加味解醒汤	1184	28557 加减二陈汤	1190
28472 加味越鞠丸	1179	28515 加味滚痰丸	1184	28558 加减二陈汤	1190
28473 加味越鞠丸	1179	28516 加味磁朱丸	1184	28559 加减二陈汤	1190
28474 加味越鞠丸	1179	28517 加味磁朱丸	1184	28560 加减二陈汤	1190
28475 加味紫金丹	1179	28518 加味磁朱丸	1184	28561 加减二陈汤	1190
28476 加味紫草饮	1179	28519 加味蜡矾丸	1185	28562 加减二陈汤	1191
28477 加味紫菀汤	1179	28520 加味蜡矾丸	1185	28563 加减二陈汤	1191
28478 加味遗粮汤	1180	28521 加味蜡矾丸	1185	28564 加减二陈汤	1191
28479 加味遗粮汤	1180	28522 加味得皮丸	1185	28565 加减二陈汤	1191
28480 加味滞下丸	1180	28523 加味震灵丹	1185	28566 加减十皮饮	1191
28481 加味温风汤	1180	28524 加味僵黄丸	1185	28567 加减十全汤	1191
28482 加味温经汤	1180	28525 加味橘核丸	1185	28568 加减十全汤	1191
28483 加味温胆汤	1180	28526 加味薤苈汤	1185	28569 加减十宝汤	1191
28484 加味温胆汤	1181	28527 加味豁痰汤	1186	28570 加减七气汤	1191
28485 加味温胆汤	1181	28528 加味豁痰汤	1186	28571 加减七气汤	1192
28486 加味温胆汤	1181	28529 加味藿香饮	1186	28572 加减七气汤	1192
28487 加味温胆汤	1181	28530 加味藿香散	1186	28573 加减七气汤	1192

28574 加减七宝饮	1192	28617 加减开邪散	1198	28660 加减六味丸	1203
28575 加减七宝散	1192	28618 加减木香丸	1198	28661 加减六味汤	1204
28576 加减八风散	1192	28619 加减木香散	1198	28662 加减六物丸	1204
28577 加减八正散	1192	28620 加减五皮饮	1198	28663 加减六物汤	1204
28578 加减八正散	1192	28621 加减五皮饮	1198	28664 加减六柱饮	1204
28579 加减八正散	1193	28622 加减五苓汤	1198	28665 加减火府丸	1204
28580 加减八味丸	1193	28623 加减五苓汤	1198	28666 加减双解散	1204
28581 加减八味丸	1194	28624 加减五苓散	1199	28667 加减双解散	1204
28582 加减八味丸	1194	28625 加减五苓散	1199	28668 加减平阳汤	1204
28583 加减八味丸	1194	28626 加减五苓散	1199	28669 加减平胃散	1205
28584 加减八味汤	1194	28627 加减五苓散	1199	28670 加减平胃散	1205
28585 加减八味汤	1194	28628 加减五苓散	1199	28671 加减平胃散	1205
28586 加减八味汤	1194	28629 加减五苓散	1199	28672 加减平胃散	1205
28587 加减八物汤	1195	28630 加减五苓散	1199	28673 加减平胃散	1205
28588 加减八物汤	1195	28631 加减五苓散	1199	28674 加减平胃散	1205
28589 加减八物汤	1195	28632 加减五苓散	1200	28675 加减正元丹	1206
28590 加减八物汤	1195	28633 加减五苓散	1200	28676 加减正气散	1206
28591 加减八物汤	1195	28634 加减五苓散	1200	28677 加减正气散	1206
28592 加减八物汤	1195	28635 加减五拗汤	1200	28678 加减玉女煎	1206
28593 加减八物汤	1195	28636 加减五味汤	1200	28679 加减玉容散	1206
28594 加减八物汤	1195	28637 加减五积散	1200	28680 加减术苓汤	1206
28595 加减八珍丸	1195	28638 加减五积散	1200	28681 加减甘桔汤	1206
28596 加减八珍汤	1196	28639 加减五积散	1201	28682 加减甘桔汤	1206
28597 加减八珍汤	1196	28640 加减五积散	1201	28683 加减甘露饮	1207
28598 加减八珍汤	1196	28641 加减五痹汤	1201	28684 加减甘露饮	1207
28599 加减八珍汤	1196	28642 加减内固丸	1201	28685 加减右归饮	1207
28600 加减八珍汤	1196	28643 加减分消丸	1201	28686 加减右归饮	1207
28601 加减人参丸	1196	28644 加减牛膝汤	1201	28687 加减左归饮	1207
28602 加减三气饮	1196	28645 加减升麻汤	1201	28688 加减左归饮	1207
28603 加减三奇汤	1196	28646 加减升麻汤	1201	28689 加减左归饮	1207
28604 加减三奇汤	1196	28647 加减升麻汤	1201	28690 加减龙荟丸	1207
28605 加减三奇散	1197	28648 加减升葛汤	1202	28691 加减龙荟丸	1208
28606 加减三拗汤	1197	28649 加减乌金散	1202	28692 加减龙胆汤	1208
28607 加减三拗汤	1197	28650 加减乌金散	1202	28693 加减归芍汤	1208
28608 加减三拗汤	1197	28651 加减乌金散	1202	28694 加减归脾汤	1208
28609 加减三黄丸	1197	28652 加减乌药汤	1202	28695 加减归脾汤	1208
28610 加减三黄丸	1197	28653 加减六合汤	1203	28696 加减归脾汤	1208
28611 加减三黄丸	1197	28654 加减六君汤	1203	28697 加减归脾汤	1208
28612 加减三黄丸	1197	28655 加减六君汤	1203	28698 加减归脾汤	1208
28613 加减三黄汤	1197	28656 加减六味丸	1203	28699 加减四七汤	1208
28614 加减三黄汤	1197	28657 加减六味丸	1203	28700 加减四斤丸	1208
28615 加减大安丸	1197	28658 加减六味丸	1203	28701 加减四物汤	1209
28616 加减天麻汤	1198	28659 加减六味丸	1203	28702 加减四物汤	1209

28703 加减四物汤	1209	28746 加减生化汤	1214	28789 加减当归散	1219
28704 加减四物汤	1209	28747 加减生化汤	1214	28790 加减回阳汤	1219
28705 加减四物汤	1209	28748 加减生化汤	1214	28791 加减全虫方	1219
28706 加减四物汤	1210	28749 加减生化汤	1214	28792 加减全虫汤	1219
28707 加减四物汤	1210	28750 加减生化汤	1214	28793 加减冲和汤	1219
28708 加减四物汤	1210	28751 加减生化汤	1214	28794 加减冲和汤	1220
28709 加减四物汤	1210	28752 加减生脉散	1215	28795 加减冲和汤	1220
28710 加减四物汤	1210	28753 加减白术散	1215	28796 加减冲和汤	1220
28711 加减四物汤	1210	28754 加减白术散	1215	28797 加减守效丸	1220
28712 加减四物汤	1210	28755 加减白术散	1215	28798 加减守病丸	1220
28713 加减四物汤	1210	28756 加减白术膏	1215	28799 加减安肾丸	1220
28714 加减四物汤	1210	28757 加减白虎汤	1215	28800 加减安荣散	1220
28715 加减四物汤	1211	28758 加减白虎汤	1215	28801 加减安胃汤	1220
28716 加减四物汤	1211	28759 加减白通汤	1215	28802 加减安胃汤	1220
28717 加减四物汤	1211	28760 加减瓜蒌散	1215	28803 加减安胎饮	1220
28718 加减四物汤	1211	28761 加减瓜蒌散	1216	28804 加减安胎饮	1221
28719 加减四物汤	1211	28762 加减玄武汤	1216	28805 加减安胎饮	1221
28720 加减四物汤	1211	28763 加减圣功散	1216	28806 加减安胎饮	1221
28721 加减四物汤	1211	28764 加减圣神汤	1216	28807 加减安胎饮	1221
28722 加减四物汤	1211	28765 加减圣效散	1216	28808 加减安神丸	1221
28723 加减四物汤	1211	28766 加减圣愈汤	1216	28809 加减安神丸	1221
28724 加减四物汤	1212	28767 加减发郁汤	1216	28810 加减异功散	1221
28725 加减四物汤	1212	28768 加减地仙丹	1216	28811 加减异功散	1221
28726 加减四物汤	1212	28769 加减地芝丸	1217	28812 加减异功散	1221
28727 加减四物汤	1212	28770 加减地黄丸	1217	28813 加减导气丸	1222
28728 加减四物汤	1212	28771 加减地黄丸	1217	28814 加减导气汤	1222
28729 加减四物汤	1212	28772 加减地黄丸	1217	28815 加减导赤散	1222
28730 加减四物汤	1212	28773 加减地黄丸	1217	28816 加减导痰汤	1222
28731 加减四物汤	1212	28774 加减地黄丸	1217	28817 加减导痰汤	1222
28732 加减四物汤	1213	28775 加减地黄丸	1217	28818 加减导痰汤	1222
28733 加减四物汤	1213	28776 加减地黄方	1218	28819 加减阴疽汤	1222
28734 加减四物汤	1213	28777 加减地黄汤	1218	28820 加减防风汤	1223
28735 加减四物汤	1213	28778 加减地黄汤	1218	28821 加减防风汤	1223
28736 加减四物汤	1213	28779 加减地黄汤	1218	28822 加减防风汤	1223
28737 加减四物汤	1213	28780 加减地黄汤	1218	28823 加减观音散	1223
28738 加减四物汤	1213	28781 加减地黄汤	1218	28824 加减观音散	1223
28739 加减四物汤	1213	28782 加减芍药汤	1218	28825 加减红绋散	1223
28740 加减四顺饮	1213	28783 加减芍辛汤	1218	28826 加减寿星汤	1223
28741 加减四逆汤	1213	28784 加减芍活汤	1218	28827 加减寿脾煎	1223
28742 加减仙茅丸	1214	28785 加减托里汤	1218	28828 加减运痰汤	1223
28743 加减生化汤	1214	28786 加减至宝丹	1218	28829 加减攻毒散	1223
28744 加减生化汤	1214	28787 加减当归散	1219	28830 加减苇茎汤	1223
28745 加减生化汤	1214	28788 加减当归散	1219	28831 加减芩芍汤	1224

28832 加减苍莎饮	1224	28875 加减泻白汤	1229	28918 加减胃风汤	1234
28833 加减芦荟丸	1224	28876 加减泻白汤	1229	28919 加减胃苓汤	1234
28834 加减两地汤	1224	28877 加减泻白散	1229	28920 加减胃苓汤	1234
28835 加减连翘饮	1224	28878 加减泻白散	1229	28921 加减胃苓汤	1234
28836 加减利惊丸	1224	28879 加减泻白散	1229	28922 加减胃苓汤	1234
28837 加减辛夷散	1224	28880 加减泻白散	1229	28923 加减胃苓汤	1234
28838 加减羌活汤	1225	28881 加减泻白散	1229	28924 加减胃苓汤	1234
28839 加减羌活汤	1225	28882 加减泻心散	1229	28925 加减胃苓汤	1235
28840 加减羌活汤	1225	28883 加减泻肝汤	1230	28926 加减胃苓汤	1235
28841 加减羌活汤	1225	28884 加减泻青丸	1230	28927 加减思食丸	1235
28842 加减完带汤	1225	28885 加减泻黄散	1230	28928 加减复脉汤	1235
28843 加减补中汤	1225	28886 加减泻黄散	1230	28929 加减复脉汤	1235
28844 加减补中汤	1225	28887 加减定命丹	1230	28930 加减香苏饮	1235
28845 加减补心丹	1225	28888 加减定喘汤	1230	28931 加减香苏散	1235
28846 加减补心汤	1225	28889 加减定喘汤	1231	28932 加减香连汤	1236
28847 加减补阴丸	1226	28890 加减穹合汤	1231	28933 加减香苓散	1236
28848 加减补益汤	1226	28891 加减建中汤	1231	28934 加减香棱丸	1236
28849 加减补筋丸	1226	28892 加减建中汤	1231	28935 加减香薷饮	1237
28850 加减阿胶汤	1226	28893 加减建中汤	1231	28936 加减香薷饮	1237
28851 加减阿胶汤	1226	28894 加减建中汤	1231	28937 加减保阴煎	1237
28852 加减阿胶散	1226	28895 加减参麦汤	1231	28938 加减保和丸	1237
28853 加减鸡苏散	1226	28896 加减参苏饮	1231	28939 加减保和丸	1237
28854 加减青娥丸	1226	28897 加减参苏饮	1231	28940 加减顺气散	1237
28855 加减青蒿丸	1227	28898 加减参苏饮	1231	28941 加减顺气散	1237
28856 加减茅根汤	1227	28899 加减参苏饮	1232	28942 加减追症饮	1238
28857 加减抱龙丸	1227	28900 加减参苏饮	1232	28943 加减胜湿丸	1238
28858 加减拨云散	1227	28901 加减参苏饮	1232	28944 加减洗心散	1238
28859 加减拨云散	1227	28902 加减参苏饮	1232	28945 加减活命饮	1238
28860 加减拨云散	1227	28903 加减参苏饮	1232	28946 加减济心丹	1238
28861 加减拨云散	1227	28904 加减参苏饮	1232	28947 加减养心丸	1239
28862 加减虎骨散	1227	28905 加减参附汤	1232	28948 加减养心汤	1239
28863 加减肾气丸	1227	28906 加减参紫饮	1232	28949 加减养心汤	1239
28864 加减肾气汤	1227	28907 加减驻景丸	1232	28950 加减养荣汤	1239
28865 加减肾气汤	1228	28908 加减枳术汤	1232	28951 加减养荣汤	1239
28866 加减肾沥汤	1228	28909 加减梔子汤	1232	28952 加减养胃汤	1239
28867 加减败毒散	1228	28910 加减茺莢汤	1233	28953 加减养胃汤	1239
28868 加减固本丸	1228	28911 加减茺莢汤	1233	28954 加减养脏汤	1239
28869 加减固本丸	1228	28912 加减茯苓丸	1233	28955 加减养脏汤	1239
28870 加减和胃汤	1228	28913 加减茯苓汤	1233	28956 加减姜黄丸	1240
28871 加减知母汤	1228	28914 加减茯苓汤	1233	28957 加减神功丸	1240
28872 加减肥儿丸	1228	28915 加减茯苓汤	1233	28958 加减神术散	1240
28873 加减肥气丸	1228	28916 加减茹苓汤	1233	28959 加减退赤散	1240
28874 加减泻心汤	1229	28917 加减胃风汤	1234	28960 加减除湿汤	1240

28961 加减珠粉丸	1241	29004 加减凉膈散	1246	29047 加减银翘散	1251
28962 加减秦艽汤	1241	29005 加减凉膈散	1246	29048 加减银翘散	1251
28963 加减秦艽散	1241	29006 加减凉膈散	1246	29049 加减徙薪饮	1252
28964 加减桂枝汤	1241	29007 加减凉膈散	1246	29050 加减麻仁丸	1252
28965 加减桂枝汤	1241	29008 加减凉膈散	1246	29051 加减麻黄汤	1252
28966 加减桂枝汤	1241	29009 加减消毒饮	1247	29052 加减麻黄汤	1252
28967 加减真武汤	1241	29010 加减消毒饮	1247	29053 加减麻黄汤	1252
28968 加减真武汤	1242	29011 加减消毒散	1247	29054 加减麻黄汤	1252
28969 加减真武汤	1242	29012 加减流气饮	1247	29055 加减清心饮	1252
28970 加减莪术散	1242	29013 加减流气饮	1247	29056 加减清肌汤	1252
28971 加减柴芩汤	1242	29014 加减流气饮	1247	29057 加减清肺汤	1252
28972 加减柴芩汤	1242	29015 加减润肠丸	1247	29058 加减清肺饮	1252
28973 加减柴陈汤	1242	29016 加减润燥汤	1247	29059 加减清经散	1253
28974 加减柴芩汤	1242	29017 加减益元汤	1248	29060 加减清胃汤	1253
28975 加减柴芩汤	1243	29018 加减益气汤	1248	29061 加减清胃饮	1253
28976 加减柴物汤	1243	29019 加减益气汤	1248	29062 加减清胃散	1253
28977 加减柴胡汤	1243	29020 加减益黄散	1248	29063 加减清宫汤	1253
28978 加减柴胡汤	1243	29021 加减益黄散	1248	29064 加减清脾汤	1253
28979 加减柴胡汤	1243	29022 加减调中汤	1248	29065 加减清脾饮	1253
28980 加减柴胡汤	1243	29023 加减调中汤	1248	29066 加减清脾饮	1253
28981 加减柴胡汤	1243	29024 加减调中汤	1248	29067 加减清脾饮	1253
28982 加减柴胡汤	1243	29025 加减调中饮	1248	29068 加减渗湿汤	1253
28983 加减柴胡汤	1243	29026 加减通气散	1249	29069 加减断下汤	1254
28984 加减柴胡汤	1243	29027 加减通圣丸	1249	29070 加减续命汤	1254
28985 加减柴葛汤	1244	29028 加减通圣散	1249	29071 加减续命汤	1254
28986 加减逍遥散	1244	29029 加减通圣散	1249	29072 加减续命汤	1254
28987 加减逍遥散	1244	29030 加减通圣散	1249	29073 加减续命汤	1254
28988 加减逍遥散	1244	29031 加减理中丸	1249	29074 加减续命汤	1255
28989 加减逍遥散	1244	29032 加减理中丸	1249	29075 加减续命汤	1255
28990 加减逍遥散	1244	29033 加减理中丸	1250	29076 加减蕤蕤汤	1255
28991 加减逍遥散	1244	29034 加减理中汤	1250	29077 加减葛花汤	1255
28992 加减逍遥散	1244	29035 加减理中汤	1250	29078 加减葛根汤	1255
28993 加减逍遥散	1245	29036 加减理中汤	1250	29079 加减葛根汤	1255
28994 加减逍遥散	1245	29037 加减理中汤	1250	29080 加减葛根汤	1255
28995 加减逍遥散	1245	29038 加减理阴煎	1250	29081 加减葶苈丸	1256
28996 加减逍遥散	1245	29039 加减理阴煎	1250	29082 加减紫金丹	1256
28997 加减逍遥散	1245	29040 加减黄土汤	1250	29083 加减紫菀汤	1256
28998 加减逍遥散	1245	29041 加减黄芩汤	1250	29084 加减黑神散	1256
9 2899 加减逍遥散	1245	29042 加减黄芩汤	1250	29085 加减黑神散	1256
29000 加减逍遥散	1245	29043 加减黄连散	1251	29086 加减黑膏汤	1256
29001 加减息奔丸	1246	29044 加减黄耆汤	1251	29087 加减黑膏汤	1256
29002 加减胶艾汤	1246	29045 加减排风汤	1251	29088 加减集圣丸	1256
29003 加减凉膈散	1246	29046 加减排脓汤	1251	29089 加减痞气丸	1256

29090 加減惺惺散 …… 1257	29133 加味小續命湯 …… 1262	29176 加味四君子湯 …… 1267
29091 加減惺惺散 …… 1257	29134 加味小薊飲子 …… 1262	29177 加味四君子湯 …… 1267
29092 加減惺惺散 …… 1257	29135 加味天仙藤散 …… 1262	29178 加味四君子湯 …… 1267
29093 加減溫經湯 …… 1257	29136 加味六君子湯 …… 1262	29179 加味四君子湯 …… 1267
29094 加減溫胆湯 …… 1257	29137 加味六君子湯 …… 1263	29180 加味四君子湯 …… 1267
29095 加減瑞蓮丸 …… 1257	29138 加味六君子湯 …… 1263	29181 加味四君子湯 …… 1267
29096 加減塌氣湯 …… 1257	29139 加味六君子湯 …… 1263	29182 加味四君子湯 …… 1267
29097 加減槐花散 …… 1258	29140 加味六君子湯 …… 1263	29183 加味四君子湯 …… 1267
29098 加減愈風湯 …… 1258	29141 加味六君子湯 …… 1263	29184 加味四君子湯 …… 1267
29099 加減解毒丸 …… 1258	29142 加味六君子湯 …… 1263	29185 加味四君子湯 …… 1267
29100 加減解毒湯 …… 1258	29143 加味六君子湯 …… 1263	29186 加味四君子湯 …… 1268
29101 加減檳榔湯 …… 1258	29144 加味六君子湯 …… 1263	29187 加味四君子湯 …… 1268
29102 加減檳榔湯 …… 1258	29145 加味六君子湯 …… 1263	29188 加味四君子湯 …… 1268
29103 加減磁石散 …… 1258	29146 加味六君子湯 …… 1263	29189 加味四君子湯 …… 1268
29104 加減鎮心丹 …… 1258	29147 加味六君子湯 …… 1264	29190 加味四君子湯 …… 1268
29105 加減鎮陰煎 …… 1259	29148 加味六君子湯 …… 1264	29191 加味四君子湯 …… 1268
29106 加減鎮陰煎 …… 1259	29149 加味六君子湯 …… 1264	29192 加味四君子湯 …… 1268
29107 加減薏苡湯 …… 1259	29150 加味六君子湯 …… 1264	29193 加味四君子湯 …… 1268
29108 加血竭大紅膏 …… 1259	29151 加味六君子湯 …… 1264	29194 加味四君子湯 …… 1268
29109 加河子四柱散 …… 1259	29152 加味六君子湯 …… 1264	29195 加味四君子湯 …… 1268
29110 加味大建中湯 …… 1259	29153 加味六君子湯 …… 1264	29196 加味四君子湯 …… 1268
29111 加味大承氣湯 …… 1259	29154 加味六君子湯 …… 1264	29197 加味四君子湯 …… 1268
29112 加味大承氣湯 …… 1260	29155 加味六君子湯 …… 1264	29198 加味四君子湯 …… 1268
29113 加味大醒脾散 …… 1260	29156 加味六君子湯 …… 1264	29199 加味四君子湯 …… 1269
29114 加味小青龍湯 …… 1260	29157 加味六君子湯 …… 1265	29200 加味四君子湯 …… 1269
29115 加味小建中湯 …… 1260	29158 加味六君子湯 …… 1265	29201 加味四君子湯 …… 1269
29116 加味小柴胡湯 …… 1260	29159 加味六君子湯 …… 1265	29202 加味四君子湯 …… 1269
29117 加味小柴胡湯 …… 1260	29160 加味玉屏風散 …… 1265	29203 加味四君子湯 …… 1269
29118 加味小柴胡湯 …… 1260	29161 加味玉屏風散 …… 1265	29204 加味四君子湯 …… 1269
29119 加味小柴胡湯 …… 1260	29162 加味玉屏風散 …… 1265	29205 加味四君子湯 …… 1269
29120 加味小柴胡湯 …… 1261	29163 加味玉屏風散 …… 1265	29206 加味四君子湯 …… 1269
29121 加味小柴胡湯 …… 1261	29164 加味歸朮芍散 …… 1265	29207 加味四君子湯 …… 1270
29122 加味小柴胡湯 …… 1261	29165 加味四君子丸 …… 1265	29208 加味四君子湯 …… 1270
29123 加味小柴胡湯 …… 1261	29166 加味四君子湯 …… 1266	29209 加味四君子湯 …… 1270
29124 加味小柴胡湯 …… 1261	29167 加味四君子湯 …… 1266	29210 加味四君子湯 …… 1270
29125 加味小柴胡湯 …… 1261	29168 加味四君子湯 …… 1266	29211 加味四君子湯 …… 1270
29126 加味小柴胡湯 …… 1261	29169 加味四君子湯 …… 1266	29212 加味四君子湯 …… 1270
29127 加味小柴胡湯 …… 1261	29170 加味四君子湯 …… 1266	29213 加味仙遺糧散 …… 1270
29128 加味小柴胡湯 …… 1262	29171 加味四君子湯 …… 1266	29214 加味生鐵落飲 …… 1270
29129 加味小柴胡湯 …… 1262	29172 加味四君子湯 …… 1266	29215 加味白頭翁湯 …… 1271
29130 加味小柴胡湯 …… 1262	29173 加味四君子湯 …… 1266	29216 加味白頭翁湯 …… 1271
29131 加味小柴胡湯 …… 1262	29174 加味四君子湯 …… 1266	29217 加味白頭翁湯 …… 1271
29132 加味小調經散 …… 1262	29175 加味四君子湯 …… 1266	29218 加味地骨皮散 …… 1271

29219 加味地骨皮饮 1271	29262 加减小柴胡汤 1276	29305 加减藤黄饮子 1283
29220 加味当归饮子 1271	29263 加减小柴胡汤 1277	29306 加味二陈和中 汤 1283
29221 加味麦门冬汤 1271	29264 加减小柴胡汤 1277	29307 加味十全大补 汤 1283
29222 加味吴茱萸汤 1271	29265 加减小柴胡汤 1277	29308 加味十全大补 汤 1283
29223 加味青木香丸 1271	29266 加减小柴胡汤 1277	29309 加味十全大补 汤 1283
29224 加味青州白丸 1272	29267 加减小柴胡汤 1277	29310 加味十全大补 汤 1284
29225 加味金沸草散 1272	29268 加减小柴胡汤 1277	29311 加味十全大补 汤 1284
29226 加味金铃子片 1272	29269 加减小柴胡汤 1277	29312 加味十全大补 汤 1284
29227 加味金铃子散 1272	29270 加减小柴胡汤 1278	29313 加味十全大补 汤 1284
29228 加味胡黄连丸 1272	29271 加减小续命汤 1278	29314 加味十全大补 汤 1284
29229 加味香肥皂方 1272	29272 加减小续命汤 1278	29315 加味十全大补 汤 1284
29230 加味消毒饮子 1272	29273 加减小续命汤 1278	29316 加味十全大补 汤 1284
29231 加味羚羊角散 1272	29274 加减小续命汤 1278	29317 加味十全大补 汤 1284
29232 加味羚羊角散 1273	29275 加减小续命汤 1278	29318 加味七粒紫金 丹 1285
29233 加味鼠粘子汤 1273	29276 加减小续命汤 1279	29319 加味八珍猪蹄 汤 1285
29234 加味鼠粘子散 1273	29277 加减小续命汤 1279	29320 加味人参白虎 汤 1285
29235 加脑子收阳粉 1273	29278 加减小续命汤 1279	29321 加味人参白虎 汤 1285
29236 加料五加皮散 1273	29279 加减小续命汤 1279	29322 加味人参麦冬 汤 1285
29237 加减八味九汤 1273	29280 加减小续命汤 1279	29323 加味人参养荣 汤 1285
29238 加减三五七散 1273	29281 加减小续命汤 1279	29324 加味人参养胃 汤 1285
29239 加减小续命汤 1273	29282 加减小续命汤 1279	29325 加味人参养胃 汤 1286
29240 加减小续命汤 1274	29283 加减小续命汤 1280	29326 加味人参款花 膏 1286
29241 加减小续命汤 1274	29284 加减小续命汤 1280	
29242 加减小续命汤 1274	29285 加减小续命汤 1280	
29243 加减小续命汤 1274	29286 加减小续命汤 1280	
29244 加减小续命汤 1274	29287 加减小续命汤 1280	
29245 加减小续命汤 1274	29288 加减小续命汤 1280	
29246 加减小续命汤 1274	29289 加减小续命汤 1281	
29247 加减小续命汤 1275	29290 加减小续命汤 1281	
29248 加减小续命汤 1275	29291 加减小续命汤 1281	
29249 加减小续命汤 1275	29292 加减小续命汤 1281	
29250 加减小续命汤 1275	29293 加减小续命汤 1281	
29251 加减小续命汤 1275	29294 加减小续命汤 1281	
29252 加减小续命汤 1275	29295 加减小续命汤 1281	
29253 加减小续命汤 1275	29296 加减小续命汤 1281	
29254 加减小续命汤 1275	29297 加减小续命汤 1282	
29255 加减小续命汤 1275	29298 加减小续命汤 1282	
29256 加减小续命汤 1276	29299 加减小续命汤 1282	
29257 加减小续命汤 1276	29300 加减小续命汤 1282	
29258 加减小续命汤 1276	29301 加减小续命汤 1282	
29259 加减小续命汤 1276	29302 加减小续命汤 1282	
29260 加减小续命汤 1276	29303 加减小续命汤 1283	
29261 加减小续命汤 1276	29304 加减小续命汤 1283	

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 29327 加味人参紫菀散 1286 | 丸 1289 | 29370 加味生料五积散 1292 |
| 29328 加味三才封髓丹 1286 | 29349 加味六味地黄丸 1289 | 29371 加味白术芍药汤 1292 |
| 29329 加味三仁葱豉汤 1286 | 29350 加味六神通解散 1289 | 29372 加味半夏茯苓汤 1292 |
| 29330 加味千金内托散 1286 | 29351 加味平补枳术丸 1289 | 29373 加味半夏茯苓汤 1292 |
| 29331 加味五子明目丸 1287 | 29352 加味甘麦大枣汤 1289 | 29374 加味托里消毒散 1292 |
| 29332 加味止痛没药散 1287 | 29353 加味甘草泻心汤 1289 | 29375 加味当归六黄汤 1292 |
| 29333 加味内托十宣散 1287 | 29354 加味龙胆泻肝丸 1290 | 29376 加味当归补血汤 1292 |
| 29334 加味化痰消坚汤 1287 | 29355 加味龙胆泻肝汤 1290 | 29377 加味当归补血汤 1292 |
| 29335 加味牛膝逐瘀散 1287 | 29356 加味龙胆泻肝汤 1290 | 29378 加味当归补血汤 1293 |
| 29336 加味升阳除湿汤 1287 | 29357 加味龙胆泻肝汤 1290 | 29379 加味当归补血汤 1293 |
| 29337 加味升阳散火汤 1287 | 29358 加味龙麝紫金饼 1290 | 29380 加味当归建中汤 1293 |
| 29338 加味升麻葛根汤 1287 | 29359 加味归身生地汤 1290 | 29381 加味当归活血汤 1293 |
| 29339 加味升麻葛根汤 1288 | 29360 加味四圣解毒汤 1290 | 29382 加味朱砂安神丸 1293 |
| 29340 加味升麻葛根汤 1288 | 29361 加味四物二陈汤 1290 | 29383 加味行血助浆汤 1293 |
| 29341 加味升麻葛根汤 1288 | 29362 加味四物六君汤 1290 | 29384 加味安神生化汤 1293 |
| 29342 加味升麻葛根汤 1288 | 29363 加味四物安神汤 1291 | 29385 加味阴痛四物汤 1293 |
| 29343 加味乌药顺气散 1288 | 29364 加味四制香附丸 1291 | 29386 加味防己黄耆汤 1293 |
| 29344 加味乌梅四物汤 1288 | 29365 加味四制黄柏丸 1291 | 29387 加味防风通圣散 1293 |
| 29345 加味六一顺气汤 1288 | 29366 加味史国公药酒 1291 | 29388 加味丽泽通气散 1294 |
| 29346 加味六味地黄丸 1288 | 29367 加味生化安神汤 1291 | 29389 加味芩连四物汤 1294 |
| 29347 加味六味地黄丸 1289 | 29368 加味生化理中汤 1291 | 29390 加味连芩升麻汤 1294 |
| 29348 加味六味地黄丸 1289 | 29369 加味生姜理中汤 1292 | 29391 加味连翘升麻 |

汤 1294	29413 加味补中益气汤 1296	汤 1299
29392 加味羌活胜湿汤 1294	29414 加味补中益气汤 1296	29435 加味知柏地黄汤 1299
29393 加味补中安胎饮 1294	29415 加味补中益气汤 1297	29436 加味金匱肾气汤 1299
29394 加味补中益气汤 1294	29416 加味补中益气汤 1297	29437 加味育阴止血汤 1300
29395 加味补中益气汤 1294	29417 加味补养心肾方 1297	29438 加味育阴润燥饮 1300
29396 加味补中益气汤 1294	29418 加味补益败毒散 1297	29439 加味参术附姜汤 1300
29397 加味补中益气汤 1294	29419 加味补益养血汤 1297	29440 加味参术苓附汤 1300
29398 加味补中益气汤 1295	29420 加味附子理中汤 1297	29441 加味参术苓桂汤 1300
29399 加味补中益气汤 1295	29421 加味附子理中汤 1297	29442 加味参归鹿茸汤 1300
29400 加味补中益气汤 1295	29422 加味附桂地黄汤 1298	29443 加味参附正气散 1301
29401 加味补中益气汤 1295	29423 加味附桂地黄汤 1298	29444 加味参苓生化汤 1301
29402 加味补中益气汤 1295	29424 加味青州白丸子 1298	29445 加味参苓白术散 1301
29403 加味补中益气汤 1295	29425 加味松肌透表汤 1298	29446 加味参苓白术散 1301
29404 加味补中益气汤 1295	29426 加味苓桂术甘丸 1298	29447 加味参苓白术散 1301
29405 加味补中益气汤 1295	29427 加味苓桂术甘汤 1298	29448 加味参耆术附汤 1301
29406 加味补中益气汤 1295	29428 加味明目地黄丸 1298	29449 加味枳马二仙丹 1302
29407 加味补中益气汤 1296	29429 加味明目地黄丸 1298	29450 加味枳壳半夏汤 1302
29408 加味补中益气汤 1296	29430 加味明目流气饮 1299	29451 加味枳桔二陈汤 1302
29409 加味补中益气汤 1296	29431 加味固阳散火汤 1299	29452 加味荆防败毒散 1302
29410 加味补中益气汤 1296	29432 加味和中益气汤 1299	29453 加味荆防败毒散 1302
29411 加味补中益气汤 1296	29433 加味和胃止痉汤 1299	29454 加味荆防败毒散 1302
29412 加味补中益气汤 1296	29434 加味知柏地黄汤 1299	29455 加味荆防葛根汤 1302

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 29456 加味荆芥止崩
汤 1303 | 汤 1306 | 29499 加味黄耆建中
汤 1309 |
| 29457 加味茺莢内消
丸 1303 | 29478 加味钱氏白术
散 1306 | 29500 加味银花甘草
汤 1309 |
| 29458 加味茯苓半夏
汤 1303 | 29479 加味钱氏异功
散 1306 | 29501 加味麻杏石甘
汤 1309 |
| 29459 加味胃苓半夏
汤 1303 | 29480 加味健步虎潜
丸 1306 | 29502 加味清地退火
汤 1309 |
| 29460 加味种子四物
汤 1303 | 29481 加味胶艾四物
汤 1306 | 29503 加味清肝开窍
汤 1309 |
| 29461 加味复元通气
散 1303 | 29482 加味凉血利湿
汤 1306 | 29504 加味清肺降火
汤 1309 |
| 29462 加味香砂六君
汤 1303 | 29483 加味凉血退斑
汤 1306 | 29505 加味清毒化斑
汤 1310 |
| 29463 加味香砂生化
汤 1304 | 29484 加味消毒犀角
饮 1306 | 29506 加味清咽利膈
汤 1310 |
| 29464 加味香砂枳术
丸 1304 | 29485 加味调中健脾
汤 1307 | 29507 加味清热消痢
汤 1310 |
| 29465 加味顺气化痰
汤 1304 | 29486 加味调中益气
汤 1307 | 29508 加味清热渗湿
汤 1310 |
| 29466 加味独活寄生
汤 1304 | 29487 加味调中益气
汤 1307 | 29509 加味清暑益气
汤 1310 |
| 29467 加味活血消痢
汤 1304 | 29488 加味调胃承气
汤 1307 | 29510 加味渗湿消痰
饮 1310 |
| 29468 加味济坤大造
丸 1304 | 29489 加味通元二八
丹 1307 | 29511 加味葛花解醒
汤 1310 |
| 29469 加味养血生发
汤 1305 | 29490 加味理中地黄
汤 1307 | 29512 加味葛根苓连
汤 1310 |
| 29470 加味养血凉血
汤 1305 | 29491 加味理中地黄
汤 1308 | 29513 加味葵子茯苓
汤 1310 |
| 29471 加味举轻古拜
散 1305 | 29492 加味黄芩芍药
汤 1308 | 29514 加味葵子茯苓
散 1311 |
| 29472 加味祛邪补气
散 1305 | 29493 加味黄连香薷
饮 1308 | 29515 加味紫苏和胎
饮 1311 |
| 29473 加味桂枝代粥
汤 1305 | 29494 加味黄连香薷
饮 1308 | 29516 加味黑虎保安
丹 1311 |
| 29474 加味桂苓甘露
饮 1305 | 29495 加味黄连解毒
汤 1308 | 29517 加味温阳风心
汤 1311 |
| 29475 加味桃仁承气
汤 1305 | 29496 加味黄连解毒
汤 1308 | 29518 加味温补通阳
方 1311 |
| 29476 加味香桂五物
汤 1306 | 29497 加味黄连解毒
汤 1308 | 29519 加味滋阴大补
丸 1312 |
| 29477 加味柴胡桂枝
汤 1309 | 29498 加味黄耆五物
汤 1309 | 29520 加味滋阴润燥 |

方	1312	29542 加参生化万安	汤	1315	汤	1317
29521 加味普济消毒	饮	29543 加参生化止崩	汤	1315	29564 加减人参黄耆	汤
29522 加味犀角地黄	汤	29544 加参生化理中	汤	1315	29565 加减三花五子	丸
29523 加味犀角地黄	汤	29545 加参安肺生化	汤	1315	29566 加减三黄二香	散
29524 加味犀角地黄	汤	29546 加料神异透骨	膏	1315	29567 加减三黄石膏	汤
29525 加味犀角地黄	汤	29547 加料羚珀明目	丸	1315	29568 加减小造苦参	丸
29526 加味犀角地黄	汤	29548 加减小母宁嗽	汤	1315	29569 加减小黄当归	散
29527 加味犀角地黄	汤	29549 加减小全大补	汤	1316	29570 加减小橘皮煎	丸
29528 加味犀角地黄	汤	29550 加减小全大补	汤	1316	29571 加减小金固胎	饮
29529 加味犀角地黄	汤	29551 加减小全大补	汤	1316	29572 加减小金思食	丸
29530 加味犀角消毒	饮	29552 加减小全大补	汤	1316	29573 加减小茂溃坚	汤
29531 加味犀角白虎	汤	29553 加减小全大补	汤	1316	29574 加减小天王补心	丹
29532 加味疏风祛疹	汤	29554 加减小全大补	汤	1316	29575 加减小开郁二陈	汤
29533 加味疏风凉血	饮	29555 加减小味香薷	汤	1316	29576 加减小木香流气	饮
29534 加味解毒内托	饮	29556 加减小七味白术	散	1316	29577 加减小牙药麝香	散
29535 加味解毒生脉	散	29557 加减小味地黄	丸	1317	29578 加减小太乙金锁	丹
29536 加味解毒散结	汤	29558 加减小味地黄	汤	1317	29579 加减小止痒全虫	方
29537 加味橘皮竹茹	汤	29559 加减小物柴胡	汤	1317	29580 加减小仓下气	汤
29538 加味藿香正气	散	29560 加减小珍化毒	丹	1317	29581 加减小牛黄清心	丸
29539 加味藿香正气	散	29561 加减小人参泻心	汤	1317	29582 加减小升麻葛根	汤
29540 加味藿香正气	散	29562 加减小人参养营	汤	1317	29583 加减小升麻葛根	汤
29541 加味蠲饮六神	汤	29563 加减小人参养营			29584 加减小升麻葛根	汤

29585 加减升麻葛根 汤 1320	散 1323	29628 加减扶元和中 膏 1326
29586 加减升麻解毒 汤 1320	29607 加减托里消毒 散 1324	29629 加减扶元益阴 膏 1327
29587 加减乌药顺气 丸 1321	29608 加减托里消毒 散 1324	29630 加减辛苕导痰 汤 1327
29588 加减乌药顺气 饮 1321	29609 加减托里消毒 散 1324	29631 加减羌活五积 散 1327
29589 加减丹栀逍遥 散 1321	29610 加减当归六黄 汤 1324	29632 加减羌活胜湿 汤 1327
29590 加减丹溪安胎 饮 1321	29611 加减当归六黄 汤 1324	29633 加减羌活桂枝 汤 1327
29591 加减六味地黄 丸 1321	29612 加减当归龙荟 丸 1324	29634 加减补天大造 丸 1327
29592 加减六味地黄 丸 1321	29613 加减当归龙荟 丸 1324	29635 加减补中和疟 饮 1327
29593 加减六味地黄 丸 1321	29614 加减当归龙荟 丸 1324	29636 加减补中益气 汤 1327
29594 加减平疔养脾 丸 1321	29615 加减当归龙荟 丸 1325	29637 加减补中益气 汤 1328
29595 加减古方五汁 饮 1322	29616 加减当归地榆 散 1325	29638 加减补中益气 汤 1328
29596 加减甘露消毒 丹 1322	29617 加减当归补血 汤 1325	29639 加减补中益气 汤 1328
29597 加减龙胆泻肝 汤 1322	29618 加减当归菊连 汤 1325	29640 加减补中益气 汤 1328
29598 加减龙胆泻肝 汤 1322	29619 加减回阳救急 汤 1325	29641 加减补中益气 汤 1328
29599 加减龙胆泻肝 汤 1322	29620 加减竹叶石膏 汤 1325	29642 加减补中益气 汤 1328
29600 加减龙胆泻肝 汤 1322	29621 加减导赤泻白 散 1325	29643 加减补中益气 汤 1328
29601 加减归芍地黄 汤 1323	29622 加减防风通圣 散 1326	29644 加减补中益气 汤 1329
29602 加减四味升麻 汤 1323	29623 加减防风通圣 散 1326	29645 加减补中益气 汤 1329
29603 加减四物天香 汤 1323	29624 加减丽泽通气 汤 1326	29646 加减补中益气 汤 1329
29604 加减生熟二地 汤 1323	29625 加减苏子降气 汤 1326	29647 加减补中益气 汤 1329
29605 加减半夏茯苓 汤 1323	29626 加减苏子降气 汤 1326	29648 加减补中益气 汤 1329
29606 加减芎芷香苏 散 1323	29627 加减苏子桃仁 汤 1326	29649 加减补中益气 汤 1329

汤 1329	29671 加减陈氏木香 散 1332	汤 1335
29650 加减补中益气 汤 1329	29672 加减附子理中 汤 1332	29693 加减香砂养胃 汤 1335
29651 加减补中益气 汤 1330	29673 加减附子理中 汤 1333	29694 加减追疔夺命 汤 1335
29652 加减补中益气 汤 1330	29674 加减附子理中 汤 1333	29695 加减独活寄生 汤 1335
29653 加减补中益气 汤 1330	29675 加减青州白丸 子 1333	29696 加减活血止痛 散 1335
29654 加减补中益气 汤 1330	29676 加减青州白丸 子 1333	29697 加减济生肾气 丸 1336
29655 加减补中益气 汤 1330	29677 加减背蝼鳖甲 汤 1333	29698 加减神仙既济 丸 1336
29656 加减补中益气 汤 1330	29678 加减肾气大补 汤 1333	29699 加减神效活络 丹 1336
29657 加减补中益气 汤 1331	29679 加减金豆解毒 汤 1334	29700 加减除湿胃苓 汤 1336
29658 加减补中益气 汤 1331	29680 加减金匱肾气 丸 1334	29701 加减桂麻各半 汤 1336
29659 加减补中益气 汤 1331	29681 加减金匱肾气 丸 1334	29702 加减桃仁承气 汤 1336
29660 加减补中益气 汤 1331	29682 加减金匱肾气 汤 1334	29703 加减桃仁承气 汤 1337
29661 加减补中益气 汤 1331	29683 加减金锁固精 汤 1334	29704 加减桃仁承气 汤 1337
29662 加减补中益气 汤 1331	29684 加减参苓白术 丸 1334	29705 加减真人活命 饮 1337
29663 加减补中益气 汤 1331	29685 加减参苓白术 散 1334	29706 加减柴胡二陈 汤 1337
29664 加减补中益气 汤 1331	29686 加减参苓白术 散 1334	29707 加减柴胡桂姜 汤 1337
29665 加减补中益气 汤 1331	29687 加减参苓白术 散 1335	29708 加减钱氏白术 散 1337
29666 加减补中益气 汤 1331	29688 加减参苓白术 散 1335	29709 加减健脾阳和 膏 1337
29667 加减补阴益气 汤 1332	29689 加减参苓白术 散 1335	29710 加减射干鼠粘 汤 1337
29668 加减补肝祛疟 汤 1332	29690 加减枳术二陈 汤 1335	29711 加减消风百解 散 1337
29669 加减补肾安胎 饮 1332	29691 加减梔子五物 汤 1335	29712 加减调中益气 汤 1337
29670 加减局方五苓 散 1332	29692 加减胃苓五皮 汤 1335	29713 加减调中益气 汤 1338

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 29714 加减调胃承气汤 1338 | 29736 加减普济消毒饮 1340 | 29757 加减星附六君子汤 1343 |
| 29715 加减黄芩知母汤 1338 | 29737 加减温脾祛疟汤 1341 | 29758 加减香砂六君子汤 1344 |
| 29716 加减黄连阿胶汤 1338 | 29738 加减滋阴清肺汤 1341 | 29759 加味小柴胡合四物汤 1344 |
| 29717 加减黄连解毒丸 1338 | 29739 加减犀角地黄汤 1341 | 29760 加味乌须固齿补肾方 1344 |
| 29718 加减黄连解毒汤 1338 | 29740 加减犀角地黄汤 1341 | 29761 加味平肝解毒退翳丸 1344 |
| 29719 加减黄芩建中汤 1338 | 29741 加减疏风清上散 1341 | 29762 加味四味紫苏和胎饮 1344 |
| 29720 加减黄芩建中汤 1338 | 29742 加减解毒活血汤 1341 | 29763 加味生化补中益气汤 1344 |
| 29721 加减黄芩建中汤 1339 | 29743 加减藿朴夏苓汤 1342 | 29764 加味连翘升麻葛根汤 1344 |
| 29722 加减麻杏石甘汤 1339 | 29744 加减藿香正气丸 1342 | 29765 加味活血透肌解毒汤 1344 |
| 29723 加减清心莲子汤 1339 | 29745 加减藿香正气散 1342 | 29766 加味益气养血救脱汤 1345 |
| 29724 加减清心莲子饮 1339 | 29746 加减藿香正气散 1342 | 29767 加味救肺饮加郁金汤 1345 |
| 29725 加减消毒拔翳汤 1339 | 29747 加味不换金正气散 1342 | 29768 加味清热凉血驱敏汤 1345 |
| 29726 加减消毒活血汤 1339 | 29748 加味四物六君子汤 1342 | 29769 加参宁肺止嗽生化汤 1345 |
| 29727 加减清热导滞汤 1339 | 29749 加味香砂六君子汤 1342 | 29770 加减二十四味流气饮 1345 |
| 29728 加减清热除湿膏 1339 | 29750 加味越婢加半夏汤 1343 | 29771 加减统旨木香顺气散 1345 |
| 29729 加减清膈化痰丸 1339 | 29751 加减二陈合四物汤 1343 | 29772 加减益胃升阳渗湿汤 1345 |
| 29730 加减散花去癩汤 1340 | 29752 加减千金牡丹皮饮 1343 | 29773 加减理脾清热除湿膏 1345 |
| 29731 加减散肿溃坚汤 1340 | 29753 加减不换金正气散 1343 | 29774 加减滋阴益肾暖精丸 1346 |
| 29732 加减葛根麻黄汤 1340 | 29754 加减不换金正气散 1343 | 29775 加减犀角地黄茅花汤 1346 |
| 29733 加减葱白香豉汤 1340 | 29755 加减代赭旋覆花汤 1343 | 29776 加脑子白豆蔻薄荷煎丸 1346 |
| 29734 加减普济消毒饮 1340 | 29756 加减定血黑逍遥散 1343 | 29777 加减小柴胡合龙胆泻肝汤 1346 |
| 29735 加减普济消毒 | | |

对

29778 对丹	1346
29779 对金丸	1346
29780 对金丸	1346
29781 对金饮	1346
29782 对金饮	1346
29783 对金散	1346
29784 对金散	1347
29785 对姜丸	1347
29786 对口仙方	1347
29787 对金饮子	1347
29788 对金饮子	1347
29789 对金饮子	1347
29790 对金饮子	1348
29791 对金饮子	1348
29792 对金饮子	1348
29793 对星香散	1348
29794 对口背痢仙方	1348

弘

29795 弘济膏	1348
-----------	------

奶

29796 奶豆膏	1348
-----------	------

幼

29797 幼婴延龄解毒丹	1348
---------------	------

取

29798 取中汤	1348
-----------	------

台

29799 台苗羹	1348
-----------	------

圣

29800 圣丸	1349
29801 圣汤	1349
29802 圣酒	1349
29803 圣散	1349
29804 圣力丸	1349
29805 圣力丹	1349

29806 圣力散	1349
29807 圣力散	1349
29808 圣丸子	1349
29809 圣丸子	1349
29810 圣化丹	1350
29811 圣功丸	1350
29812 圣功丸	1350
29813 圣功丸	1350
29814 圣功丹	1350
29815 圣功丹	1350
29816 圣功散	1350
29817 圣功散	1350
29818 圣功散	1350
29819 圣功散	1351
29820 圣功散	1351
29821 圣功散	1351
29822 圣术丸	1351
29823 圣术煎	1351
29824 圣石丹	1351
29825 圣石散	1351
29826 圣白丸	1352
29827 圣白散	1352
29828 圣灰散	1352
29829 圣灰散	1352
29830 圣后丹	1352
29831 圣红丸	1352
29832 圣红散	1352
29833 圣麦散	1352
29834 圣应膏	1352
29835 圣灵丸	1352
29836 圣灵丹	1353
29837 圣灵丹	1353
29838 圣灵丹	1353
29839 圣灵丹	1353
29840 圣灵丹	1353
29841 圣灵丹	1353
29842 圣灵丹	1354
29843 圣灵散	1354
29844 圣妙散	1354
29845 圣枣丸	1354
29846 圣枣子	1354
29847 圣枣子	1354
29848 圣枣散	1354

29849 圣明散	1354
29850 圣和丸	1355
29851 圣制汤	1355
29852 圣金丸	1355
29853 圣金丸	1355
29854 圣金丹	1355
29855 圣金丹	1355
29856 圣金散	1355
29857 圣金散	1355
29858 圣金散	1355
29859 圣金散	1356
29860 圣金散	1356
29861 圣泽汤	1356
29862 圣治丸	1356
29863 圣柳散	1356
29864 圣草散	1356
29865 圣药丸	1356
29866 圣星丹	1356
29867 圣饼子	1357
29868 圣饼子	1357
29869 圣饼子	1357
29870 圣饼子	1357
29871 圣饼子	1357
29872 圣饼子	1357
29873 圣饼子	1357
29874 圣饼子	1358
29875 圣饼子	1358
29876 圣饼子	1358
29877 圣饼子	1358
29878 圣饼子	1358
29879 圣饼子	1358
29880 圣饼子	1358
29881 圣饼子	1359
29882 圣饼子	1359
29883 圣饼子	1359
29884 圣饼子	1359
29885 圣饼子	1359
29886 圣饼子	1359
29887 圣饼子	1359
29888 圣济汤	1359
29889 圣神汤	1360
29890 圣神散	1360
29891 圣神散	1360

29892	圣蚕丸	1360
29893	圣核子	1360
29894	圣效丹	1360
29895	圣效方	1360
29896	圣效散	1360
29897	圣效散	1360
29898	圣效散	1361
29899	圣效散	1361
29900	圣效散	1361
29901	圣效散	1361
29902	圣效散	1361
29903	圣烟筒	1361
29904	圣烟筒	1361
29905	圣涂散	1361
29906	圣粉散	1361
29907	圣授丹	1361
29908	圣散子	1361
29909	圣散子	1362
29910	圣散子	1362
29911	圣散子	1362
29912	圣散子	1362
29913	圣散子	1362
29914	圣散子	1362
29915	圣散子	1362
29916	圣散子	1363
29917	圣散子	1363
29918	圣散子	1363
29919	圣散子	1363
29920	圣惠丸	1363
29921	圣惠散	1363
29922	圣脾散	1363
29923	圣愈汤	1363
29924	圣愈汤	1363
29925	圣愈汤	1364
29926	圣愈汤	1364
29927	圣善皮	1364
29928	圣僧丸	1364
29929	圣僧散	1364
29930	圣僧散	1364
29931	圣蟪散	1364
29932	圣化仙丹	1364
29933	圣方痔药	1364
29934	圣功川芎汤	1364

29935	圣佛催生散	1365
29936	圣灵接骨丹	1365
29937	圣灵解毒丸	1365
29938	圣灵解毒丸	1365
29939	圣妙寸金散	1365
29940	圣效透肌散	1365
29941	圣验黑神丸	1365
29942	圣授夺命丹	1366
29943	圣僧慈救膏	1367

丝

29944	丝一	1367
29945	丝二	1367
29946	丝七	1367
29947	丝八	1367
29948	丝三	1367
29949	丝五	1367
29950	丝六	1367
29951	丝四	1367
29952	丝瓜汤	1367
29953	丝瓜汤	1367
29954	丝瓜汤	1367
29955	丝瓜汤	1367
29956	丝瓜汤	1367
29957	丝瓜酒	1367
29958	丝瓜散	1367
29959	丝瓜散	1368
29960	丝瓜散	1368
29961	丝瓜散	1368
29962	丝瓜散	1368
29963	丝瓜散	1368
29964	丝瓜散	1368
29965	丝朱散	1368
29966	丝瓜叶膏	1368
29967	丝瓜化毒汤	1368
29968	丝瓜化毒汤	1368
29969	丝瓜白梅方	1368
29970	丝瓜稀痘方	1369

皮

29971	皮矾散	1369
29972	皮金膏	1369
29973	皮炎膏	1369

29974	皮枯膏	1369
29975	皮脂散	1369
29976	皮脂膏	1369
29977	皮癣水	1369
29978	皮癣汤	1369
29979	皮癣膏	1370
29980	皮湿一膏	1370
29981	皮湿二膏	1370
29982	皮湿一号膏	1370
29983	皮湿二号膏	1370
29984	皮鞋轻粉散	1370

发

29985	发火汤	1370
29986	发机汤	1370
29987	发灰丸	1370
29988	发灰汤	1370
29989	发灰饮	1370
29990	发灰酒	1371
29991	发灰散	1371
29992	发灰散	1371
29993	发灰散	1371
29994	发灰散	1371
29995	发灰散	1371
29996	发灰散	1371
29997	发灰散	1371
29998	发灰散	1371
29999	发灰散	1371
30000	发灰煎	1372
30001	发动汤	1372
30002	发汗散	1372
30003	发汗散	1372
30004	发汗散	1372
30005	发汗散	1372
30006	发声汤	1372
30007	发声散	1372
30008	发声散	1372
30009	发声散	1372
30010	发补丹	1372
30011	发际散	1373
30012	发表丸	1373
30013	发表汤	1373
30014	发表汤	1373

30015 发表汤 1373
 30016 发表散 1373
 30017 发郁汤 1373
 30018 发泡膏 1373
 30019 发毒散 1374
 30020 发背膏 1374
 30021 发背膏 1374
 30022 发背膏 1374
 30023 发疮膏 1374
 30024 发疱膏 1374
 30025 发散汤 1374
 30026 发散煎 1374
 30027 发越汤 1374
 30028 发痘散 1374
 30029 发痛汤 1374
 30030 发瞳丸 1374
 30031 发汗灵方 1375
 30032 发汗歧粥 1375
 30033 发背熏药 1375
 30034 发背膏药 1375
 30035 发汗桂心散 1375
 30036 发汗麻黄汤 1375

30037 发阳通阴汤 1375
 30038 发表攻里散 1376
 30039 发表附子散 1376
 30040 发表消毒汤 1376
 30041 发表清里汤 1376
 30042 发表渗湿汤 1376
 30043 发表雄黄散 1376
 30044 发背对口膏 1376
 30045 发背神验方 1376
 30046 发脑内消散 1376
 30047 发疹紫草散 1377
 30048 发斑紫草散 1377
 30049 发散醒醒散 1377
 30050 发表解表升麻
 汤 1377
 30051 发毒攻里五香连翘
 饮 1377

司

30052 司肾丸 1377
 30053 司命丸 1377

30054 司马灵通膏 1377
 30055 司马温公解毒
 膏 1377

辽

30056 辽东都尉所上
 丸 1377

边

30057 边臣十八味 1378
 30058 边城十二味饮 1378

母

30059 母鸡汤 1378
 30060 母鸡汤 1378
 30061 母鸡散 1378
 30062 母姜酒 1378
 30063 母蛭散 1378
 30064 母丁香丸 1378
 30065 母丁香膏 1379
 30066 母猪蹄汤 1379

检 字

五 画

【一】

打	1
扑	2
艾	2
茺	16
节	16
平	16
灭	44
丙	46
正	46
玉	63
古	116
去	117
未	124
术	124
本	132
世	132
甘	134
东	187
厉	190
布	190
石	191
右	260
左	263
龙	267
戊	351
可	352

【丨】

归	353
---	-----

北	376
叶	378
叭	378
卢	379
占	379
只	380
出	380
田	380
申	382
甲	382
电	384
四	384
史	493

【丿】

代	494
仙	503
外	532
卯	536
令	536
孕	537
冬	537
务	545
失	545
生	548
白	656
瓜	876
用	891
乐	892

【丶】

冯	892
---	-----

汉	892
立	898
玄	925
主	951
兰	952
宁	953
永	968
必	969
头	977
半	978
闪	1037

【ㄣ】

阡	1037
加	1037
对	1346
弘	1348
奶	1348
幼	1348
馭	1348
台	1348
圣	1349
丝	1366
皮	1368
发	1370
司	1377
辽	1377
边	1378
母	1378

五 画

打

18769 打虫丸

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】槟榔一两半 木香一两 芫荽三两 雷丸三两 枳实一两半(炒) 青皮(炒)一两半 泽泻一两半 鹤虱二两 史君三两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，寒湿生虫，开口花椒汤送下；湿热生虫，东向楝根皮汤送下。

【主治】虫厥，脉缓滑者。

18770 打脓散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】木鳖子虚者七个，实者九个 金银花 黄芩 黄连 黄柏 归尾各一钱 大黄一两 甘草节 穿山甲各七分 芒消三钱

【用法】水煎，五更服。大便见脓，小便见血为效。

【主治】诸痈肿，不放脓出。

18771 打老儿丸

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【异名】延寿丹(《医统》卷九十三)、还少丹(《一草亭》)。

【组成】石菖蒲(去须毛，嫩桑枝条拌蒸，晒干，不犯铁器) 干山药(蒸出晒干) 川牛膝(去头，用黄精自然汁浸，漉出，酒浸一宿，若无黄精，酒浸三日，漉出，细锉，焙干) 远志(去心，甘草汤浸一宿) 巴戟(去心，枸杞子汤浸一宿，漉出，酒浸一伏时，菊花同焙令黄，去菊花) 续断(去筋，酒浸一伏时，焙干) 五味子(蜜浸蒸，从巳至申。又以浆水浸一宿，焙干) 楮实子(水浸三日，去浮者，晒干，酒浸一伏时，漉出蒸，从巳至亥，焙干) 杜仲(去皮，酥蜜炒去丝) 山茱萸(取肉，暖火焙干) 茯

神(去皮心，捣细，于水盆内搅，去浮者) 熟地(瓷锅柳木甑蒸之，摊令气歇，拌酒再蒸，晒干，勿犯铜铁器) 小茴香(酒浸一宿，炒) 肉苁蓉(酒浸一宿，刷去沙土浮甲，劈破中心，去白膜) 枸杞子各等分

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下；或白汤送下亦可。

【功用】①《会约》：补精生血，益气力，健筋骨，延寿。②《一草亭》：滋补肾水，温养少火，久服却病延年。

【主治】五劳七伤，体虚羸弱，尿频阳萎，遗精白浊，久无子嗣。

①《万氏家抄方》：五劳七伤，阳事不举，真气衰弱，精神短少，小便无度，眼目昏花，腰膝疼痛，两脚麻冷，不能行走。②《医方集解》：脾肾虚寒，血气羸乏，不思饮食，发热盗汗，遗精白浊，肌体瘦弱，牙齿浮痛。③《会约》：诸虚百损。④《北京市中药成方选集》：气血两亏，肾寒精冷，腰疼腿痠，久无子嗣。

【备考】《一草亭》无五味子，用法以枣肉二百枚捣和，加炼蜜为丸。

18772 打老儿丸

【方源】《良朋汇集》卷二引灵佐官胡方。

【组成】棉花子一斤(炒，去壳) 核桃肉四两(打烂)

【用法】用小米面打糊为丸，重三钱。滚白水化下。

【功用】补益。

18773 打虫化积丸

【方源】《证治汇补》卷二。

【异名】化积丸(《医级》卷八)。

【组成】大黄(为末)五两五钱 槟榔三两 黑丑(头末)三两五钱

【用法】面糊为丸，如梧桐子大。听用。

【主治】癆瘵。

【备考】本方服法，见原书小红丸条。

18774 打伤八味散

【方源】《全国中药成药处方集》(沙市方)。

【组成】生栀子一斤 生南星 生草乌 生川乌 生半夏 红花各四两 桃仁 杏仁 各六两

【用法】上为细末。依伤处之大小，酌量用药之多少。每次约用药末八钱或一两，用生糍粑捣匀，量伤处大小敷之，约敷二十四小时，以皮肤现青色或紫色为度。如伤久者，可敷四十八小时。

【主治】跌扑打伤未破皮者。

【宜忌】已破皮出血者忌敷。

扑

18775 扑粉

【方源】《医方考》卷一。

【组成】龙骨 牡蛎 糯米各等分

【用法】上为末。扑身。

【主治】服发汗药，出汗过多者。

【方论选录】汗多有亡阳之戒，故用龙骨、牡蛎之涩以固脱；入糯米者，取其粘腻云尔，乃卫外之兵也。

18776 扑肌散

【方源】《普济方》卷三五三。

【组成】黑附子二钱半(炮) 牡蛎半两(盐泥煨) 糯米二两(炒)

【用法】上为末。以绢袋盛，身上扑之。

【主治】汗不止。

18777 扑汗方

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】牡蛎粉三份 蛤粉一份

【用法】用纱帛包了，扑汗处，遇干又扑，以频扑为佳。

【主治】诸汗。

18778 扑汗方

【方源】《全幼心鉴》卷四。

【组成】牡蛎 麻黄根 赤石脂 糯米粉 贝母

【用法】上为极细末。绵包药，扑汗。

【主治】小儿汗证。

18779 扑汗方

【方源】《婴童百问》卷九。

【组成】黄连 牡蛎粉 贝母各半两 米粉一升

【用法】上为末。敷于身上。

【主治】表虚自汗。

18780 扑汗方

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十二。

【组成】牡蛎 麻黄根各一两 赤石脂 糯米粉 煨龙骨各五钱

【用法】上为极细末。绵包药，扑于身上。

【主治】小儿盗汗、自汗。

18781 扑汗方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】牡蛎粉一两 枯白矾一两

【用法】上为极细末，过重绢罗为面。煨洗后，用面扑肾囊潮汗处。

【主治】阴囊潮汗。

【方论选录】牡蛎咸涩微寒，临床上常用以收敛固涩，以治遗精、虚汗、带下等症。古方有用牡蛎扑粉止汗法；枯矾外用燥湿止痒，学名硫酸铝钾，火煨之后失去结晶水，故可吸湿，外科常用以治皮炎、湿疹及皮肤糜烂等疾。两药合用，治阴囊潮汗当有效。

18782 扑身止汗散

【方源】方出《千金》卷十，名见《圣惠》卷十四。

【组成】麻黄根 牡蛎 雷丸各三两 干姜 甘草各一两 米粉二升

【用法】上药治下筛。随汗处粉之。

【功用】止汗。

【主治】《圣惠》：伤寒后虚羸，盗汗不止。

艾

18783 艾汤

【方源】《外台》卷三引《阮河南药方》。

【组成】苦酒三升 葶苈子二合(熬，捣) 生艾汁一升(无生艾，熟艾、干艾亦可用；无艾，可用艾根捣取汁)

【用法】上药煎得一升，顿服。若有牛黄，

纳一刀圭尤良。

【主治】天行七八日，热盛不解。

18784 艾汤

【方源】《外台》卷四引《深师方》。

【组成】生艾叶一把 麻黄二两（去节）
大黄六分 大豆一升

【用法】上切。清酒五升，煮取二升，分三次服。

【主治】①《外台》引《深师方》：酒疸。②《普济方》：身目俱黄，心中懊痛。

18785 艾汤

《外台》卷三十三。即《千金》卷二“艾叶汤”。见该条。

18786 艾汤

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【异名】艾叶汤（《普济方》卷三九九）。

【组成】艾叶（炒） 当归各一两 干姜（炮） 木香 诃黎勒皮（炮）各半两

【用法】上为细末，每服一钱，水八分，入粟米少许，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】①《幼幼新书》引张涣方：小儿白痢。②《卫生总微》：虚冷下痢白脓。

18787 艾叶丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【异名】伏龙肝丸（《圣济总录》卷七十五）。

【组成】艾叶一两（微炒） 黄连一两（去须，微炒） 木香一两 地榆一两（锉） 伏龙肝一两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 当归一两（锉，微炒） 赤芍药一两 黄芩一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】赤痢，腹痛不可忍。

18788 艾叶丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】艾叶一两（微炒） 鳖甲一两半（涂醋，炙令黄，去裙襕） 当归一两（锉，微炒） 卷柏一两半 白龙骨二两 附子一两（炮裂，去皮脐） 干姜一两（炮裂，锉） 赤芍药三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】妇人腹腹胀满，脐下疔痛，大便下血不止。

18789 艾叶丸

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】艾叶一两（微炒） 熟干地黄二两 代赭石一两半（细研） 干姜一两（炮裂，锉） 芎藭一两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 牛角觶二两（烧） 牡蛎一两（烧为粉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】产后恶露不绝，腹中疔痛，气息乏力。

18790 艾叶丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】艾叶（炒） 黄连（去须，炒） 木香（一半生，一半炒） 肉豆蔻（去壳）各三分 地榆（锉）一两 阿胶（炙燥） 当归（切，焙）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】赤白痢，血多，痛不可忍。

18791 艾叶丸

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】艾叶（炙） 干姜（生）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 益智（去皮）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，以饭压之。

【主治】妊娠小便利，少腹急痛。

18792 艾叶丸

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】艾叶 赤小豆 当归 阿胶各四分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】失血。

18793 艾叶丸

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】艾叶 赤芍药 干姜 附子各半两 陈皮 当归各一两 川芎三分 吴茱萸甘草各一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，酒或醋汤送下。

【主治】血虚腹胁疼痛。

18794 艾叶汤

【方源】方出《外台》卷三十四引《经心录》，名见《医统》卷八十三引《录验》。

【组成】防风三两 大戟二两 艾五两

【用法】上切。以水一斗，煮取五升，温洗阴中，一日三次。

【主治】①《外台》引《经心录》：妇人阴中肿痛不可近者。②《疡科捷径》：阴疼阴痒。

18795 艾叶汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】艾叶 丹参 当归 麻黄各二两 人参 阿胶各三两 甘草一两 生姜六两 大枣十二枚

【用法】上㕮咀。以酒三升，水一斗，煮减半，去滓纳胶，煎取三升，分三次服。

【主治】妊娠二月，中风寒，有所动摇，心满，脐下悬急，腰背强痛，卒有所下，乍寒乍热。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜。

【备考】本方方名，《外台》引作“艾汤”。

18796 艾叶汤

【方源】方出《千金》卷二，名见《产孕集》卷上。

【组成】艾叶 阿胶 芎藭 当归各三两 甘草一两

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，去滓，纳胶令消，分三服，一日三次。

【主治】妊娠二三月至八九月，胎动不安，腰痛，已有所下。

18797 艾叶汤

【方源】方出《证类本草》卷九引《子母秘录》，名见《圣济总录》卷一五九。

【组成】艾叶半斤

【用法】以酒四升，煮取二升，分温服。

【主治】倒产及子死腹中。

18798 艾叶汤

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】艾叶半两（细锉，炒微黄） 生干地黄半两 阿胶一分（杵碎，炒令黄燥，为末）

【用法】上药和匀，分为二服。每服以水一中盏，煎至五分，去滓，下赤马通汁一合半，搅令匀，不拘时候，放温频服。以愈为度。

【主治】伤寒衄血及吐血，连日不绝，欲死。

18799 艾叶汤

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二〇一。

【组成】艾叶一两 诃黎勒一两（煨，用皮）

【用法】以水二大盏，煎至一盏，去滓，分温三服。如人行五里，温再服。

【主治】霍乱后，洞下不止。

18800 艾叶汤

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】艾叶（炒）半两 白芍药三分 熟干地黄（焙）一两 干姜（炮）半两 阿胶（炙令燥）一两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】坠堕颠扑，内伤脏气，吐唾出血。

18801 艾叶汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】艾叶（炒） 黄芩（去黑心）各半两 黄连（去须） 茯神（去木） 桑耳 代赭 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 白茅根（切） 白芷 阿胶（炒燥）各一两 白术三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜五片，同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠胎漏下血。

18802 艾叶汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】艾叶(炙干)三分 桑上寄生(锉,炒)一两半 人参二两 茯神(去木)三分 阿胶(炙令燥)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盞,加糯米半合,葱白三寸(并须切),同煎至七分,去滓、食前温服。

【主治】妊娠外因惊动,胎内不安,转移不宁。

18803 艾叶汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】生艾叶(捣,绞取汁)一盞 阿胶(炙令燥)半两 蜜一合

【用法】煎取一盞,去滓,分为二服,温温服之。

【主治】妊娠卒下血不止,胎上逼心,手足逆冷欲死。

18804 艾叶汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】艾叶(炒) 芎藭 当归(炙,锉) 干姜(炮) 白术各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盞,煎至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】妊娠胞中虚冷,致胎萎燥不长。

18805 艾叶汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】艾叶(去梗,炙)一分 白芷 阿胶(炙令燥) 白术(锉,炒) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 黄连(去须)各一两 茯神(去木) 地榆皮 赤石脂(研)各一两半 黄芩(去黑心)半两 肉豆蔻(去壳)一枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以水一盞半,加生姜五片,煎至八分,去滓温服。

【主治】妊娠下痢。

18806 艾叶汤

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】艾叶(捣成末)一两 阿胶(炙令燥)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至五分,去滓,空腹服之。未效更服。

【主治】妊娠堕胎后,血出不止,腹痛。

18807 艾叶汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】艾 参 苓 术 草 芎 归 白 芍 熟地 黄耆 阿胶 陈皮 香附 前胡 杜仲 乌梅 生姜

【功用】益精。

【主治】妊娠二月,胎动不安。

18808 艾叶汤

【方源】《普济方》卷二三一。

【组成】伏道艾叶 生姜各等分 杏仁(生,去皮尖) 松节明子木

【用法】上先将明子锉碎,水一盞,煎数沸,次下艾、生姜,煎至七分,去滓,临卧先嚼杏仁烂后,汤送下。

【主治】男女虚劳咳嗽,痰涎不止。

【加减】若便血,去杏仁。

【备考】方中杏仁、松节明子木用量原缺。

18809 艾叶汤

《普济方》卷三四四。为《圣济总录》卷一五五“地黄艾叶汤”之异名。见该条。

18810 艾叶汤

《普济方》卷三九九。为《幼幼新书》卷二十九引张涣方“艾汤”之异名。见该条。

18811 艾叶汤

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】艾叶 苧麻叶 槐叶 柳叶 白及 防风 白芷 升麻各等分

【用法】上晒燥,为粗末,入麝少许,以器贮马桶内,点着,令患者坐马桶上,遮紧勿走烟,熏两个时辰。

【主治】阴匿。

18812 艾叶饮

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】艾叶(焙) 当归(切,焙) 黄连(去须) 龙骨 诃黎勒皮各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服。

【主治】血痢不止，少腹疼痛。

18813 艾叶饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】艾叶(陈者)半两 干姜(炮) 当归(炙，锉)各三分 芎藭一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，加生姜一枣大(拍碎)，同煎至七分，去滓热服，空心、日午、晚各一次。

【主治】妊娠漏胎，淋沥不止。

18814 艾叶饮

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】艾叶 当归(切，焙) 人参 生干地黄(焙) 地榆 干姜(炮) 阿胶(炙令燥)各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】半产后，恶露不断，心闷气短。

18815 艾叶酒

《圣济总录》卷十八。为《圣济总录》卷十八“艾蒿酝酒”之异名。见该条。

18816 艾叶散

【方源】方出《千金》卷十二，名见《圣惠》卷三十七。

【组成】干姜 阿胶 柏叶各二两 艾一把

【用法】上哎咀。以水五升，煮取一升，纳马通汁一升，煮取一升，顿服。

【主治】吐血内崩上气，面色如土。

18817 艾叶散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】艾叶一两(微炒) 黄芩一两 赤芍药一两 地榆半两(锉) 当归一两 半(锉，微炒)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盞，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】久血痢，小腹结痛不可忍。

18818 艾叶散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】艾叶一两(微炒) 白石脂二两 白术三分 龙骨一两 当归一两(锉，微

炒) 干姜三分(炮裂，锉) 附子一两(炮裂，去皮脐) 吴茱萸一两(汤浸七遍，焙干，微炒) 阿胶三分(捣碎，炒令黄燥) 厚朴一两半(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】久冷痢，食不消化，四肢不和，心腹多痛，少思饮食。

18819 艾叶散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】白龙骨一两 艾叶半两(炒令微黄) 黄耆一两半(锉) 地榆一两(锉) 枳实一两(麸炒微黄) 白芍药一两 熟干地黄一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盞，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】五痔下血不止。

18820 艾叶散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】艾叶三分(炒) 白芍药三分 熟干地黄一两 干姜半两(炮裂，锉) 阿胶一两(捣碎，炒令黄燥) 甘草一分(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盞，加竹茹一分，煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】从高坠下，伤于五脏，微者唾血，甚者吐血；及金疮伤经，血出不止。

18821 艾叶散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】艾叶(微炒) 阿魏(捣碎，炒令黄燥) 干姜(炮裂，锉) 当归(锉，微炒) 龙骨 黄耆(锉) 熟干地黄各二两 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盞，加大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妇人月水不断，吃食减少，四肢黄瘦。

18822 艾叶散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】艾叶一两(微炒) 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 龙骨一两 附子三分(炮裂,去皮脐) 芎藭三分 当归三分(锉,微炒) 熟干地黄一两半 赤石脂一两 吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒) 硫黄三分(细研) 缩砂半两(去皮)

【用法】上为细散。每服二钱,食前以粥饮调下。

【主治】①《圣惠》:妇人赤白带下,日夜不止,身体黄瘦,不思饮食。②《圣济总录》:妇人漏下,淋漓不断。

18823 艾叶散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】艾叶三分(微炒) 丹参三分 熟干地黄一两半 黄耆一两半(锉) 芎藭一两 忍冬一两 地榆一两(锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半两,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】妇人崩中五色,及产后余疾。

18824 艾叶散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】艾叶一两(微炒) 赤石脂一两半 白茯苓一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】妊娠胎动下血,心烦闷乱。

18825 艾叶散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】艾叶三分(微炒) 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 芎藭三分 干姜三分(炮裂,锉) 当归一两(锉,微炒) 甘草半两(炙微赤,锉) 桑寄生三分

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,不拘时候稍热服。

【主治】妊娠胎动不安,腹内疝痛。

18826 艾叶散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】艾叶三分(微炒) 地榆一两(锉) 干姜三分(炮裂,锉) 当归一两(微炒) 赤石脂三分

【用法】上为细散。每服二钱,食前以淡竹沥调下。

【主治】堕胎后,恶物下,四体虚,困闷不能自胜。

18827 艾叶散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】艾叶一两(微炒) 黄柏三分(涂蜜微炙,锉) 赤芍药三分 黄连三分(去须,微炒) 地榆三分(锉) 甘草半两(炙微赤,锉) 干姜半两(炮裂,锉) 阿胶三分(捣碎,炒令黄燥)

【用法】上为细散。每服二钱,以粥饮调下,一日三四次。

【主治】产后瘀血痢久不愈,肠胃疼痛,不思饮食,渐加羸瘦。

18828 艾叶散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】艾叶二分(微炒) 当归三分(锉,微炒) 白芍药一两 芎藭半两 熟干地黄一两半 续断一两 牛膝半两(去苗) 桑耳半两 败酱三分

【用法】上为细散。每服二钱,食前以生姜粥饮调下。

【主治】产后恶露不绝,脐腹时痛。

18829 艾叶散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】艾香散(《圣济总录》卷一七八)。

【组成】艾叶半两(微炒) 黄连半两(去须,微炒) 木香半两 当归三分(锉,微炒) 诃黎勒三分(煨,用皮) 干姜一分(炮裂,锉) 龙骨三分

【用法】上为细散。每服半钱,以粥饮调下,一日三四次。

【主治】小儿冷痢，多时不断。

18830 艾叶散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】鹤虱 艾叶 槁藤子 白胶香各等分

【用法】上锉散。用瓦饼子内烧烟，熏患处。

【主治】漏疮。

18831 艾叶散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】艾叶 五倍子 白胶香 苦楝根各等分

【用法】上为细末，作香炷。放在长桶内，坐熏患处。

【主治】漏疮。

18832 艾汁方

【方源】方出《证类本草》卷九引葛氏方，名见《圣济总录》卷九十九。

【组成】生艾（捣，取汁）

【用法】取肥香脯一方寸片，先吃，令虫闻香，然后即饮一升。

【功用】下蛔。

【主治】①《证类本草》引葛氏方：蛔虫，或心如刺，口吐清水。②《圣济总录》：蛲虫攻心如刺。

18833 艾灰散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】艾不拘多少

【用法】烧灰细研。每服二钱匕，新汲水调下。

【主治】吐血。

18834 艾曲散

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】艾曲一升（生） 干姜 细辛 椒目 附子 桂各一两

【用法】上为细末。每服二三钱，温酒调下。

【功用】利小便，消肿。

【主治】痢后或产后虚肿，水肿。

【宜忌】忌猪肉、生葱、生菜。

18835 艾麦丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】艾叶（糯米糊蘸过，大火焙干）麦蘖（炒）各等分

【用法】上为细末，米醋打糯米粉糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心醋汤、温酒或米饮送下。

【主治】虚羸，久不进食，脏腑不固，小便常多。

18836 艾肠泥

【方源】《中国接骨图说》。

【组成】藏瓜姜糟 熟地黄各六十钱 生姜（擦）十二钱 艾十五钱

【用法】置搗盆内，研烂为泥。摊好厚纸上，再以纸覆其上，敷患处，烧铁钎烙纸上。

【主治】打扑筋挛，骨闪挫，及久年打扑痛。

18837 艾附丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】熟艾（揉极细作饼，焙）四两 香附（醋酒同煎，捣）六两

【用法】姜汁和神曲为丸。砂仁汤送下。

【主治】妇人气血两虚，经行后腹痛。

18838 艾附丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】白艾叶 枳壳（去瓢，取净） 肉桂（去粗皮） 附子（炮，去皮脐） 当归（洗，焙） 赤芍药 没药（别研） 木香（炮）各一两 沉香半两

【用法】上为细末，将艾叶并枳壳用米醋于砂锅内煮令枳壳烂，用艾细研为膏，搜药末为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或米饮送下。

【主治】妇人血海虚冷，月水不行，脐腹疼痛，筋脉拘挛，及积年坚瘦积聚，渐成劳疾。

18839 艾附丸

《医方大成》卷九引《澹寮》。为《普济方》卷三二三引《兰室秘藏》“艾煎丸”之异名。见该条。

18840 艾附丸

【方源】《证治要诀类方》卷四。

【组成】艾叶（同香附、醋煮） 香附各一斤 当归 白芍 川芎 熟地各二两 干姜

吴茱萸 木香 白芷各一两 琥珀五钱

【用法】上为末，酒煮曲糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心酒送下。

【主治】妇人血疼。

【加减】寒，加附子。

18841 艾附丸

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】好香附子一斤 陈艾四两 陈醋一大碗

【用法】同煮，待香附子煮透，去艾，将香附子炒干为末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，白汤任下。

【主治】①《摄生众妙方》：妇人无子。②《本草纲目》引《集简方》：男女心气痛，腹痛，少腹痛，血气痛，不可忍者。

18842 艾附丸

【方源】《济阴纲目》卷六。

【组成】当归 芍药 熟地黄 生地黄 香附子 蕲艾各一两 陈皮 藿香 白芷 牡丹皮 藁本各五钱 丁皮 木香各三钱

【用法】上为细末，酒糊为丸。每服三钱，子宫冷，热酒送下；白浊，盐汤送下；产后积血，艾醋煎汤送下。

【功用】暖子宫。

【主治】宫冷不孕，白浊，产后积血。

18843 艾附丸

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】当归 熟地 白芍各二两 川芎一两 人参 石菖蒲(炒) 吴茱萸(开口者，醋炒)各一两 蕲艾四两 肉桂 熟附子各一两 香附四两

【用法】上为末，蕲艾酒煎浓汁，入糯米糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，醇酒送下。

【主治】妇人崩伤淋漓，带下赤白，小腹疼痛。

18844 艾附丸

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地五两 当归三两 白芍一两半(酒炒) 艾叶一两半(醋炒) 丁香一

两 香附二两(酒炒) 木香一两 藿香一两半

【用法】上为末，醋为丸。每服三钱，温酒送下。

【主治】血虚宫冷不孕，脉弦缓涩者。

【方论选录】血亏气乱，子宫寒冷，故天癸来迟，不能孕子焉。熟地补血以滋血室，当归养血以荣经脉，白芍收敛营血，艾叶温暖子宫，香附温中散滞气，藿香开胃醒脾，丁香温中散滞，醋丸以收之，酒下以行之。使子宫温暖，则经血充盈而经气调和，天癸无来迟之患，岂犹有不能孕子之忧哉！

18845 艾附汤

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】大附子二两(炮，去皮脐，切片) 熟白艾一两 川姜七钱(炮，洗)

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞半，煎七分，去滓，食前温服。

【主治】脏寒，大便下血。

18846 艾柏饮

【方源】《验方新编》卷一。

【组成】艾叶 柏子仁(去净油) 山萸肉 丹皮各一钱半 大生地三钱 白莲肉(去心) 真山药各二钱 泽泻一钱 生荷叶一张(干者不效)

【用法】水煎服。

【主治】鼻血不止，无论虚实至重者。

18847 艾茸丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】木瓜二十枚(去皮核，作瓮子) 甘菊花(为末) 青盐(研)各一斤

【用法】将甘菊花并青盐填满木瓜瓮子内，置笼床内蒸，以木瓜烂为度，研成膏，再入新艾茸二斤，搜和为丸，如梧桐子大，晒干。每服三十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】肾脏虚冷，气攻腹胁，胀满疼痛。

18848 艾茸丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】白艾叶(细锉末，醋半盞同煮，醋

尽为度) 当归(去芦,酒浸) 赤芍药 吴茱萸(汤泡七次,炒) 肉桂(去粗皮,不见火) 天雄(炮,去皮脐,锉,再炒) 没药(别研) 苳芩 木香(不见火) 各半两 沉香一分(不见火)

【用法】上为细末,醋面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温酒、盐汤送下。

【主治】妇人下脏久虚,沉寒痼疾。

18849 艾茶丸

【方源】《普济方》卷三三一。

【组成】艾叶一斤 苍术 香附子 吴茱萸 橘皮各四两

【用法】上用米醋五升,慢火煮至醋干为度,晒干为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心、食前淡醋汤送下。

【主治】妇人子宫久冷,赤白带下。

18850 艾香散

《圣济总录》卷一七八。为《圣惠》卷九十三“艾叶散”之异名。见该条。

18851 艾姜丸

【方源】《直指》卷十四。

【组成】干艾叶四两(炒焦存性) 川白姜一分(炮)

【用法】上为末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,食前清水米饮送下。

【主治】①《直指》:湿冷下痢脓血,腹痛;妇人下血。②《永类铃方》:白痢。

18852 艾姜汤

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】艾叶一握 黑豆百粒

【用法】新水一大盏,煎至六分,入生姜汁三大匙,稍热服。

【主治】大便下脓血。

18853 艾胶汤

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】熟艾(炒) 阿胶(炙燥) 葱各一两

【用法】上咬咀,分作三服。每服以水三盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】胎动不安。

18854 艾胶汤

【方源】《验方新编》卷九。

【组成】阿胶(炒) 熟地各一钱 艾叶二钱 川芎八分 大枣三枚

【用法】水煎,空心服。

【主治】妇人逐日经来,几点则止,或五日,或十日又来数点,一月常三四次,面色青黄。

18855 艾胶散

【方源】《普济方》卷一八八。

【组成】干姜三两 艾叶二升 胶如手掌大

【用法】水三升,煮取一升,顿服。

【主治】卒吐血。

18856 艾烟丸

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】黄连(去须)一两半 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒,研)十四粒 胆矾(研)半豆许 铅丹(研)半两 膩粉一分

【用法】上药再同研匀,入粟米粥和,以艾烟熏之,为丸如鸡头子大。每用一丸,以绵裹并花水浸,点眼。

【主治】赤目。

18857 艾梅饮

【方源】《内经拾遗》卷一。

【组成】蕲艾四钱 乌梅一个(上钻一孔)

【用法】以蕲艾包乌梅,用线扎定,水二钟,煎八分,空心温服。

【主治】大便下血。

18858 艾馄饨

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】干姜末 熟艾各等分

【用法】以白面作馄饨,如酸枣大。每服四五十个,煮熟,空心服;腹胀者,炒厚朴煮汁熟,即煮馄饨食之。

【主治】脾虚有寒,泻痢。

18859 艾硫丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】熟艾十两(用糯米一升煎成粥,浇在艾上,用手拌令匀,于日中晒干) 附子(炮,去皮脐)二两 生硫黄(别研极细)二

两 干姜十两(炮)

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸或五十丸，食前温米饮送下。

【功用】去邪养正，补真益脾。

【主治】髓冷血虚，腰疼脚弱，及伤冷心腹疼痛，霍乱吐利，自汗气急，下元久虚，小便频数；妇人冲任不足，月水衍期，腹胁刺痛，崩漏带下，全不思饮食；兼治伤寒阴证，手足厥冷，脉微自汗。

18860 艾蒿酒

【方源】方出《外台》卷八引《肘后方》，名见《圣济总录》卷一二四。

【组成】生艾蒿数升。

【用法】水、酒共一斗，煮取三四升，稍稍饮之。

【主治】食诸肉骨哽。

18861 艾煎丸

【方源】《外台》卷十二引《古今录验》。

【组成】白艾一束 薏苡根一把

【用法】上药合煮，汁成如饴。取半升一服之，使刺吐宿食。

【主治】卒食不消，欲成癥积。

18862 艾煎丸

【方源】方出《千金》卷十，名见《三因》卷十。

【异名】千金丸(《普济方》卷一九六)。

【组成】三月生艾一束(捣取汁，铜器中煎如漆，密封之) 大黄 黄连 凝水石 栝楼根 苦参 亭苈各六铢

【用法】上为末，以艾煎和为丸，如梧桐子大。先食服五丸，可至二十丸，一日二次。

【主治】①《千金》：风疸，小便或黄或白，洒洒寒热，好卧不欲动。②《三因》：举身皆黄，其脉阳浮阴弱

【加减】有热，加苦参；渴，加栝楼；小便涩，加葶苈；小便多，加凝水石；小便白，加黄连；大便难，加大黄，所加并倍之。

18863 艾煎丸

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】熟艾一斤(末) 木香 陈橘皮(汤浸，去白瓢，焙) 厚朴(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 桃仁(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 川椒(去目及闭合者，微炒去汗) 山茱萸 干姜(炮裂，锉) 柏子仁 吴茱萸(汤浸七遍，焙干，微炒) 附子(炮裂，去皮脐) 白术各一两

【用法】上药除熟艾外，余并为末，入桃仁和研令匀，用醖醋五升，熬艾末成膏，入诸药为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】久心痛，积年不愈，及冷气积块，少思饮食。

18864 艾煎丸

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】威灵仙一两 良姜一两 金毛狗脊一两(去黄毛) 熟艾二两(糯米糊和，晒干为末；一法用米醋熬，焙干，亦可末) 赤芍药一两 附子半两

【用法】上为末，以药一半同醋煮面糊和余一半药末为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前空心温酒下。

【主治】妇人经水不止。

18865 艾煎丸

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】艾青五两 干姜二两 附子一两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心醋汤送下。

【功用】常服补血脏，解劳倦，止疼痛，消胀满，厚肌肉。

【主治】冲任久虚，血海冷急，脐腹疼痛，月候不匀，四肢怠堕，百节痠疼，饮食进退，下脏虚鸣，及妊娠不牢，赤白带下，面色萎黄，口淡无味，胸膈满闷。

18866 艾煎丸

【方源】《三因》卷十八。

【组成】食茱萸(汤洗) 当归各七钱半 熟地黄 白芍药各一两半 石菖蒲(炒) 川芎 人参各一两 熟艾四两(用糯米饮调作

饼，焙）

【用法】上为末，酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，酒、饮任下。

【功用】常服补营卫、固经脉。

【主治】①《三因》：崩伤淋沥，小肠满痛。

②《得效》：妇人室女经候不调，脐腹冷痛，腹常胀满，至晚则增。

【备考】《得效》本方用法：用缩砂、香附汤送下。

18867 艾煎丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】艾叶（米醋浸一宿，炒焦） 陈橘皮（去白） 高良姜（锉，炒） 干姜（炒） 赤芍药 白芍药 吴茱萸（汤洗七遍，炒） 蓬莪术（煨，切） 龙骨 牡蛎（煨）各一两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前煎艾叶汤送下。

【主治】妇人血海虚冷，月候过多，崩漏带下，腹胁疔痛。

18868 艾煎丸

【方源】《普济方》卷三四五引《卫生家宝》。

【组成】艾叶（去梗）一斤 干姜半斤 当归四两（洗） 白芍药半斤 熟干地黄四两（洗） 附子二个（炮，去皮尖，切）

【用法】上药各切细，用米醋五升煮干，取出焙干为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食前酒送下。

【主治】妇人产后，血海虚弱，面无颜色，腹痛，身体倦怠。

【宜忌】忌生冷物。

18869 艾煎丸

【方源】《百一》卷十八。

【组成】伏道艾（揉去尘土，择净枝梗，取叶）五两（先用大肥淮枣十二两，砂瓶内水煮烂，去核，同艾叶一处捣烂如泥，捻成薄饼子，猛火焙干，乘热急碾为末） 大汉椒

（去目、枝梗并合口者，取净）五两（以阿胶二两，米醋三升，同椒于砂瓶内煮极干，取出焙燥，碾为细末） 当归（去芦及须，酒洗） 白芍药（真白者） 熟干地黄（净洗，漉去浮者，晒干，酒浸蒸晒，再入酒浸蒸五七次，如糖，煎香美方可用） 川芎 白薇 附子（大者，炮，去皮脐） 卷柏（取青叶） 泽兰（去枝梗，取叶，上八味各焙干）各一两

【用法】上八味同为细末，与前艾叶、椒末拌匀，米醋面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸至百丸、二百丸、空心、食前艾醋汤送下。

【主治】妇人一切虚寒，胎前产后赤白带下，或成血瘕。

【临证举例】产后腹痛，一妇人因产后虚寒，呕恶不食，腹痛如割，时作寒热，复出盗汗，瘦瘠骨立，脐腹之左结成硬块，其大如掌，冰冷，虽盛暑此处独无汗，每块微动则痛不可忍，百药不效。梦中人告以此方，服之数服，恶心、寒热、盗汗辄止，尽一料遂平复，独血块如故。服至五六料，其块自融化如鱼冻而出。

18870 艾煎丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】吴茱萸（汤泡七次，炒） 当归（去芦，酒浸，微炒） 干姜（炮，洗） 厚朴（去粗皮，姜制，炙） 陈橘皮（去白） 茴香（淘去沙，炒） 牡蛎（煨） 官桂（去粗皮）各一两 禹余粮石（煨，米醋淬七次，别研） 艾叶（米泔水浸，炒）各四两 香附子二两（去毛，炒）

【用法】上为细末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心艾醋汤送下。

【主治】妇人虚羸，子宫久冷。

18871 艾煎丸

【方源】《普济方》卷三二三引《兰室秘藏》。

【异名】艾附丸（《医方大成》卷九引《潜

寮)。

【组成】北艾叶 大当归各二两 香附子四两

【用法】上醋煮半日，焙干为末，再用醋煮糊为丸。艾醋汤送下。

【主治】妇人血虚气滞，月经不调，经闭、痛经。

①《普济方》引《兰室秘藏》：妇人诸虚。
②《医方大成》引《澹寮》：妇人经候不调，血气刺痛，腹胁胀满，头晕恶心，崩漏带下，便血癥瘕。③《妇科玉尺》：气滞经不行。

18872 艾煎丸

【方源】《普济方》卷三二八引《经验良方》。

【组成】香附子 艾叶各四两 蔓荆子 神曲 枳壳(去瓢) 当归各二两 茺萸 蓬朮 术各一两

【用法】上用醋一大碗，慢火煮香附、艾叶，以醋尽为度，拣去艾叶，加糯米糊捻作饼子，晒干，同前药为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮、醋汤任下。

【主治】妇人诸疾，腹痛，赤白带下。

18873 艾煎丸

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】好艾叶(醋蒸，焙干) 薄荷 当归 地骨皮 晚蚕沙 糯米 秦艽 黄柏 桔梗 绵黄耆

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服十五丸，食后桑白皮汤送下，或薄荷汤送下。

【功用】去肺与大肠经天廊之邪热。

【主治】眵泪粘浓出而不绝。

18874 艾煎丸

【方源】《眼科龙木集》。

【组成】艾叶(醋炒) 肉苁蓉 川牛膝(酒浸) 甘草 桑叶(向东者用) 山药 牛膝(炒) 当归各等分

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，茶清调下。

【主治】迎风有泪。

18875 艾煎丸

【方源】《邯郸遗稿》卷一。

【组成】吴茺萸(泡淡) 当归 熟地 白芍 石菖蒲 川芎 人参 艾叶 橘红

【用法】上为末，糊为丸服。

【主治】①《邯郸遗稿》：血寒，经水过期而来。②《简明中医妇科学》：经水过期不调，或一二月不至，或三四月不行。

【加减】恶心呕吐，加丁香、半夏、生姜。

18876 艾煎方

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】熟艾二两 好醋二升 熟铜末一分 楸根白皮一两半(无根，叶亦得) 蕤仁 黄连(去须) 石盐各一两

【用法】上药研六味为末，放于醋中，煎取三合，去滓收汁于熟铜器中，入鲤鱼胆、乌鸡胆各一分，和匀，即以槐木去皮，阔三指，长一尺，向日中研药，勿住手，候如伤即住。夜点眼眦头。避风，日中不点，热泪出勿怪。

【主治】眼昏。

18877 艾煎散

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】艾五分 茯神二钱 青桑叶一钱

【主治】心汗，别处无汗，独心孔有汗，思虑多汗亦多。

18878 艾煎膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】艾叶二两 醋一斤

【用法】上将艾叶同醋于银锅内同煎数沸，滤去滓，慢火再熬成膏。每用薄摊在衫纸上，贴患处，一日一二次。

【主治】头面风热，小疮多痒少痛，黄汁出。

18879 艾醋汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】好醋 艾

【用法】好醋炆艾。服半盏后，腹中翻，大痛，是有孕；不为痛，定无。

【功用】验胎。

【主治】过月或月数未足，难明是否有孕者。

18880 艾叶洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】艾叶 62 克 雄黄 6 克 防风 62 克 花椒 6 克

【用法】煎水熏洗。

【主治】慢性湿疹、过敏性皮炎、泛发性神经性皮炎。

18881 艾叶煎丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】艾叶四两（微炒） 白头翁一两

【用法】上为末，用米醋三升，先熬药末一半成膏，后入余药末相和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】冷劳，脐腹疼痛，或时泄痢；兼治妇人劳后带下。

18882 艾叶煎丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】艾叶（炒）四两 当归（切，焙）干姜（炮）各一两

【用法】右为末，用米醋三升，入药末一半，熬成煎，后入余药末相和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温粥饮送下。

【主治】冷劳，心腹疼痛，或时泄痢；兼治妇人下经冷，带下。

18883 艾叶数方

【方源】方出《圣惠》卷五十六，名见《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】艾叶（援令碎）

【用法】着痛上，令厚二寸，以熨斗纳着灰火熨艾上，令热透，如冷即再熨之。

【主治】中恶，遁尸，心腹及身体痛甚不知痛处，手摸按之，即知痛处，短气不语。

18884 艾汁涂方

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】艾一两（锉细）

【用法】以酹醋半升，煎取浓汁，去滓，涂摩癣上，一日三五次。

【主治】一切癣。

18885 艾灰饼子

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】艾叶（烧灰留性） 白龙骨 定粉 各二钱 肉豆蔻一枚（面裹煨熟） 黄丹半钱（火煨飞过）

【用法】上为细末，滴水为丸，每一两作四十丸，捏作饼子。每服一饼子，先取油灯盏，水洗过，乳食前煎油灯盏汤化下。

【主治】小儿吐泻，日夜无度。

18886 艾茸敷法

【方源】《金鉴》卷六十二。

【异名】艾叶回阳散（《古方汇精》卷二）。

【组成】硫黄五钱 雄黄五钱 艾茸一斤

【用法】上以硫、雄二味为末，同艾入水煎半日，水将干，取艾出，捣烂，温敷患处，再煎再易，十余次为度。

【主治】阴疮黑陷而不痛者。

18887 艾蒿酹酒

【方源】《圣济总录》卷十八。

【异名】艾叶酒（《圣济总录》卷十八）。

【组成】白艾蒿十束（每束如升许大，净择水洗，锉细）

【用法】煮取浓汁，拌曲末，一如常酹法，酒熟去糟取清酒。稍稍饮之，令常醺醺然。

【主治】大风癰病，身体面目俱有疮痍，恶汁自出。

18888 艾叶地黄汤

《产孕集》卷上。为《金匱》卷下“芎归胶艾汤”之异名。见该条。

18889 艾叶回阳散

《古方汇精》卷二。为《金鉴》卷六十二“艾茸敷法”之异名。见该条。

18890 艾附女珍丸

【方源】《简明医彙》卷七。

【组成】香附五两（分四份：一童便，一米醋，一人乳，一盐酒浸） 蕲艾（醋煮） 当归各二两 川芎 白芍 熟地黄（酒蒸） 黄芩各一两半 阿胶（酒蒸） 臭椿根皮各一两

【用法】上为末，捣地黄、阿胶和匀，加醋糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心米汤送下。

【主治】妇人气盛血衰，经期不准，或前或后，紫多淡少，赤白带下，崩漏淋漓，面黄肌瘦，四肢无力，倦怠嗜卧，精神短少，目暗耳鸣，头眩懒言，五心烦热，咽干口燥，夜寐不安者。

18891 艾附四神丸

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】破故纸二钱 五味子一钱半 肉豆蔻(面炮)一钱 吴茱萸七分 炒陈艾 厚附片各二钱

【用法】水煎，食远服。

【功用】温中暖脏。

【主治】妊娠虚寒，腰腹疼痛，精神不振，憎寒喜热，少腹冷，小便清长，食少，舌淡苔白，脉沉迟。

【加减】如胸脘不舒，去五味，加广皮。

18892 艾附暖宫丸

【方源】《直指附遗》卷二十六。

【组成】艾叶(大叶者，去枝梗)三两 香附(去毛)六两(俱要合时采者，用醋五升，以瓦罐煮一昼夜，捣烂为饼，慢火焙干) 吴茱萸(去枝梗) 大川芎(雀胎者) 白芍药(用酒炒) 黄耆(取黄色、白色软者)各二两 川椒(酒洗)三两 续断(去芦)一两五钱 生地黄(生用)一两(酒洗，焙干) 官桂五钱

【用法】上为细末，上好米醋打糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食前淡醋汤送下。

【功用】《中药制剂手册》：温暖子宫，调经止痛。

【主治】妇人子宫虚冷，带下白淫，面色萎黄，四肢痠痛，倦怠无力，饮食减少，经脉不调，血无颜色，肚腹时痛，久无子息。

【宜忌】戒恼怒、生冷。

18893 艾附暖宫丸

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】南香附子(去毛净)一斤(分四制：酒、醋、盐汤、童便各浸四两，三日焙干，为细末) 北艾叶(温水洗净、焙干，研烂，筛

去灰，醋浸，炒干) 当归(酒洗) 川芎 白芍(酒洗) 熟地各二两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，淡醋汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》：理气补血，调经种子。

【主治】①《古今医鉴》：妇人百病。②《成方便读》：妇人经水不调，临行作痛，子宫虚冷，不能孕育。

【方论选录】①《医林纂要》：四物以荣肝血，艾、附以暖子宫，醋以敛之，使不妄行。要以温养子珠，而为生物之本。②《成方便读》：凡妇人调经一法，首先理气，以气顺则血亦顺也。夫血气者，喜温而恶寒，寒则难于生育，温则易于成孕。故方中以香附理气分，艾叶暖子宫，合四物而用，宜乎可治以上诸证也。

18894 艾附暖宫丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】南香附米一斤(四两醋浸，四两汤浸，四两童便浸，四两酒浸，各浸一宿，焙干) 北艾叶(焙干，捣烂，去灰，醋浸，炒) 四两 当归 川芎 白芍(酒炒) 熟地黄(姜汁炒)各一两 玄胡索子(炒)二两 甘草(生用)八钱

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心米汤送下；酒亦可。

【主治】妇人子宫虚寒，经水不调，小腹时痛，赤白带下。

18895 艾附暖宫丸

【方源】《女科切要》卷二。

【组成】艾叶 香附(四制) 玄胡 熟地 甘草

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，米汤送下。

【主治】血癖。子宫虚寒，经水不调，小腹时痛，赤白带下。

18896 艾煎茯苓散

【方源】《医方考》卷四。

【组成】艾 茯苓末一钱。

【用法】以艾煎汤，调茯苓末服。

【主治】别处无汗，独心孔一片有汗者。

【方论选录】此是心火自旺，膈有停饮，火热蒸其湿饮，故令此处有汗。茯苓甘而淡，甘能养心，淡能渗湿；艾叶香而涩，香能利气，涩能固津。

芫

18897 芫黄散

《诫书》卷十五。为《圣惠》卷九十一“大芫散”之异名。见该条。

节

18898 节金饮子

《普济方》卷一九七。为《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）“对金饮子”之异名。见该条。

18899 节斋化痰丸

《医学入门》卷七。为《明医杂著》卷一“化痰丸”之异名。见该条。

平

18900 平木汤

【方源】《医编》卷七。

【组成】竹茹 陈皮 苍术 香附 抚芎 神曲 半夏 生姜

【用法】少用吴萸为向导。

【主治】津液随上升之气郁积胃上，湿热不宣，郁极则上涌而致吐酸，甚则牙齿酸涩，不能相对。

18901 平中饮

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】人参一钱 白术一钱五分 丹参二钱 瓦楞子一钱（醋淬，研碎） 桃仁一钱 炮姜八分

【用法】水煎服。

【主治】瘀血在中焦作胀。

【方论选录】《证因方论集要》：桃仁苦甘，

瓦楞咸寒，功专破瘀，丹参去瘀生新，参、术补气，所谓攻补兼行者，炮姜除胃冷而守中。

18902 平气丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】槟榔一枚（锉） 乌梅一两（一半去核，一半和核） 京三棱（炮）半两 青橘皮（去白，焙）一两 缩砂（去皮）半两 巴豆（去皮心，别研）二钱 胡椒半两

【用法】将六味捣罗为末，入巴豆研匀，白面糊为丸，如绿豆大。每服三丸，食后温生姜汤送下。

【主治】脾积痞气，腹胁膨胀，心胸痞闷，不思饮食。

18903 平气丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】巴豆（去壳） 黑牵牛 萝卜子各四两 丁香皮 丁香 胡椒 肉桂（去粗皮） 五灵脂（炒） 青橘皮（去白） 桂花 陈橘皮（去白） 缩砂仁各一两

【用法】上用陈粟米一升，炒巴豆黑色，去巴豆，将粟米与众药捣罗为末，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服十五丸，胸膈噎闷，不思饮食，煎葱白汤送下；中酒、吐酒，细嚼，煨生姜汤送下；气痛，煎石菖蒲汤送下；气胀、面肿，煎大腹皮汤送下；疝气、小肠气，煎茴香汤送下；妇人血气，腹内刺痛，煎当归汤送下，不拘时候。

【主治】胸膈噎闷，不思饮食，伤酒吐逆，气胀腹痛，小肠疝气。

18904 平气丸

【方源】《普济方》卷三十六。

【组成】乌梅一个 巴豆二粒（去油） 丁香三粒 砂仁四粒

【用法】上为末，水泛为丸。每服五七丸，生姜汤送下。

【主治】胃气滞而不转，浊气逆行，胸中痞闷，气不下行，饮食不化，翻胃吐食。

18905 平气汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】甘草(锉) 厚朴(去粗皮)各四两 干姜(刮净、锉)二两 生姜(去皮,切半斤 大枣一百枚

【用法】用水七升,同于银石器中煮,候枣熟,剥去皮核,再煮,候水尽焙干,为粗末。每服三钱匕,水一盞,同煎至七分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】干呕气逆,饮食不下。

18906 平气汤

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】乌药 人参 茯神各一钱 甘草五味子 紫苏子 木香各四分 白芷六分 当归八分 白术 川芎各七分

【用法】上哎咀。加生姜五片、枣子二枚,水煎,食前温服。

【主治】脚气上攻,头目昏眩,脚膝痠疼,行步艰苦,诸气不和,喘满逼促。

18907 平气饮

【方源】《三因》卷十二。

【异名】平气散(《普济方》卷一五七)。

【组成】人参 白术 川芎 当归 五味子 甘草(炙) 木瓜干 紫苏子(炒) 茯神 乌药(去木) 杏仁(去皮尖,麸炒) 桂心 白芷各等分

【用法】上为末。每服二钱,水一盞,加生姜三片,大枣一个,煎至七分,温服。

【主治】一切咳嗽,吐痰涎,恶风,不能食。

18908 平气饮

【方源】《易简》。

【组成】紫苏 桑白皮 麻黄 青皮 五味子 杏仁 甘草各等分

【用法】加生姜七片,乌梅一个,水煎服。

【主治】久年咳嗽,暴嗽,气虚喘急。

18909 平气散

【方源】《幼幼新书》卷十六引《聚宝方》。

【组成】人参 白茯苓 百合 甘草(炙) 白术 桔梗各等分。

【用法】上为末。每服一钱,水八分,加生姜少许,煎五分,温服。

【功用】定喘和气,补虚思食。

【主治】小儿气不和,喘咳上气。

18910 平气散

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【组成】青皮(去白) 鸡心槟榔各三钱 大黄七钱 陈皮(去白)五钱 白牵牛二两(半生半炒,取头末一半)

【用法】上为末。每服三钱,煎生姜汤一盞调下,不拘时候。一服减半,再服喘愈。

【主治】湿热大盛,上攻于肺,腹胀喘满,神气躁乱。

【方论选录】《内经》曰:肺苦气上逆,急食苦以泻之。散用白牵牛苦寒,泻气分湿热,上攻喘满,故以为君;陈皮苦温,体轻浮,理肺气,青皮苦辛平,散肺中滞气,故以为臣;槟榔辛温,性沉重,下痰降气,大黄苦寒,荡涤满实,故以为使也。

【临证举例】喘满 己未岁初秋,越三日,奉召至六盘山。至八月中,霖雨不止,时承上命治不邻吉歹元帅夫人,年踰五旬,身体肥盛,因饮酒吃滯乳过度,遂病腹胀喘满,声闻舍外,不得安卧,大小便涩滞,气口脉大两倍于人迎,关脉沉缓而有力。予思霖雨之湿,饮食之热,湿热大盛,上攻于肺,神气躁乱,故为喘满。邪气盛则实,实者宜下之,故制平气散以下之。

18911 平气散

《普济方》卷一五七。为《三因》卷十二“平气饮”之异名。见该条。

18912 平气散

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】苍术一钱五分 梔子一钱五分 当归一钱 青皮一钱 枳壳一钱 木香一钱(临熟时入木香再煎) 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,水一大碗,煎至七分,通口服。

【主治】心痛。

18913 平火汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】熟地 生地 麦冬 玄参 菖蒲

【主治】小儿耳中干聃，无脓无水，痛如针刺，久则焚槁成聋。

18914 平火散

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】熟地一两 玄参五钱 麦冬三钱 生地三钱 丹皮三钱 山药三钱 金钗石斛三钱 沙参三钱

【用法】水煎服。

【主法】男子精力甚健，入房甚久，泄精之时，如热汤浇入子宫，妇人受之反不生育者。

18915 平水丸

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《家塾方》。

【异名】蕤宾丸（《家塾方》）。

【组成】商陆四两 甘遂一两 芒硝 吴茱萸 芫花各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，一日三次。

【功用】治水肿，利小便。

【主治】实证水肿，大小便秘者。

①《千金》：游客虚热当风，饮冷水，腹肿阴胀满。②《家塾方》：脚气肿满，不大便者。③《奇正方》：水肿，通身洪肿，或脚气脚弱，悸动升逐者。

18916 平邪汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】黄连三分 甘草一钱 苏梗一钱 紫菀一钱 葛根一钱 石膏三钱 麦冬五钱 贝母三钱 茯神三钱

【用法】水煎服。

【功用】泻心火，安胃土。

【主治】春月伤风，阳明之火来刑肺金，身热咳嗽，吐痰恶热，口渴。

18917 平肉散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】铜绿（研细末）30克

【用法】直接撒在疮面。

【功用】平蚀赘肉。

【主治】疮口肉芽过高。

18918 平血饮

《观聚方要补》卷八引《澹寮》。为《局方》卷二“升麻葛根汤”之异名。见该条。

18919 平血饮

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】紫草 犀角消毒饮

【用法】相间煎服。

【主治】风热积毒，或发于头面，手足热者，如胭脂色，其热如火，轻轻着手，痛不可忍。

【加减】壮热烦渴甚者，加黄芩、麦门冬（去心）、朴消各半钱。

18920 平血饮

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】败毒散加紫草 生姜 蝉退（去足翼） 防风（去芦、切细）

【用法】加天花粉少许，煎汤服。

【主治】风热积毒，所致丹毒，或发于头面，手足，热者如胭脂色，其热如火，轻轻着手，痛不可忍。

18921 平血饮

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】天麻 连翘 升麻 枳实 桔梗 防风 白芷 蝉蜕 柴胡 赤芍 黄耆 干葛 薄荷 人参 羌活 当归尾 赤苓 菖蒲 金银花一两

【用法】水煎服。

【主治】痛疽发背，无名肿毒初起。

【加减】潮退，去柴胡。

【备考】方中除银花外，用量原缺。

18922 平肌散

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】黄狗头骨（烧灰） 鯪鲤甲（烧灰）各一钱 乱发指大一团（烧灰）

【用法】上为末。如疮口已干，用自津唾调湿敷之，一日三四次。

【主治】①《圣济总录》：瘰癧已成漏疮，岁久不愈。②《普济方》：痔疮久不合者。

18923 平肌散

【方源】《活法机要》。

【组成】密陀僧 花蕊石(二物同煨赤) 白龙骨各一两 乳香(另研) 轻粉各一钱 黄丹 黄连各二钱半

【用法】上为极细末。和匀干掺。

【主治】①《活法机要》：诸疮久不敛。②《杂病源流犀烛》：痔痢。

18924 平肌散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】老狗头骨 露蜂房 生发(各烧存性) 各一分 新桑白皮半分

【用法】上为细末。加轻粉、麝香少许，津唾调敷，干则掺。

【主治】①《直指》：漏疮久不合。②《东医宝鉴·杂病篇》：附骨疽成漏，久不合。

18925 平肌散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】炉甘石(烧)一两半 龙骨半两

【用法】上为细末。每用干掺患处，上用膏药贴。

【主治】诸疮久不敛。

18926 平肌散

【方源】《医学纲目》卷十八。

【组成】密陀僧(煨) 花蕊石(煨) 白龙骨各一两 乳香(另研) 轻粉各一钱

【用法】上为细末，和匀。干掺。

【主治】诸疮久不敛。

18927 平安丹

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】檀香 落水沉 木香 丁香 白蔻仁 肉蔻仁 红蔻 草蔻 陈皮 炙厚朴 苍术(土炒) 甘草 神曲 炒麦芽 山楂(炒焦)各二两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，重二钱。

【功用】健脾理气，开胃进食。

【方论选录】本方所有药物均治脾胃，四香行气悦脾，四蔻除湿醒脾，平胃散运脾和胃，焦三仙开胃进食，迨脾胃健运，人自安和。

18928 平安丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】公丁香十两 橘皮十两 神曲

(炒)十两 枳实(炒)十两 草果仁十两 木香十两 茯苓十两 山楂十两 延胡(炙)十两 砂仁十两 沉香十两 麦芽(炒)十两 肉果(煨)十两 白术(炒)十两 槟榔十两 青皮(炒)十两 香附(炙)十两 豆蔻仁十两 母丁香十两

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重二钱，蜡皮封固。每服二丸，温开水送下，一日二次。

【功用】①《北京市中药成方选集》：顺气宽胸，暖胃降逆。②《中药制剂手册》：疏肝理气，和胃止痛。

【主治】①《北京市中药成方选集》：气逆不舒，胸满腹胀，胃寒疼痛，嘈杂倒饱。②《中药制剂手册》：肝气犯胃，肝胃不和，胃脘疼痛，吞酸。

18929 平安丹

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】金箔 银箔各三片 朱砂 乳香各半两 麝香一钱 腊月兔脑

【用法】上为细末，研匀，兔脑为丸，如豌豆大。遇难产之人，每用一粒，以乳香送下，则无诸般苦痛，便得分娩。

【功用】催生

【主治】难产。

18930 平安丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】厚朴花六钱 牙皂四钱 藿香叶一两 细辛四钱 茅苍术(炒)一两 槟榔五钱 明雄黄四钱 灯心炭二两 冰片一钱 沉香二钱 麝香二分 牛黄四分

【用法】上为细末，过罗装瓶，重二分五。每服一瓶，温开水送下；外用闻入鼻内少许。

【功用】通关开窍，祛暑辟秽。

【主治】中寒中暑，中风中湿，头晕恶心，胸满腹痛。

18931 平安饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】半夏 贝母 橘红 柴胡各七分

黄芩 草果 白术 枳壳各五分

【用法】加生姜三片，不拘时候热服。

【主治】小儿痰症，来时作呕。

18932 平安饼

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】乌梅肉一钱 轻粉五分

【用法】上同研，不见粉亮为度，如硬用津润之，断不可用水，研之成膏，照患口大小作薄饼几个，以贴毒根。外用膏掩，一日换一次，俟毒根不痛，落下乃止。

【主治】痈疮毒根凸起。

18933 平安散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】厚朴 甘草 川芎 当归 陈皮 前胡 腹皮 乌药 紫苏 桔梗 竹茹 紫菀 马兜铃 桑皮 五味子

【功用】定喘、消肿、安胎。

【主治】妇人受孕后血气虚羸，或风寒伤肺，或怒郁伤肝，或生冷伤胃，而致喘急，两胁刺痛，胸膈胀满者。

18934 平安散

【方源】《医方类聚》卷二二四引《济生》。

【异名】平胃散（《普济方》卷三三八）。

【组成】厚朴（去皮，姜汁制） 生姜各二两 干姜（炮） 陈皮（去白）各一钱 川芎半钱 木香二分 干地黄（洗）一钱半 甘草（炙）四钱

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，入烧盐一捻，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。

【主治】妊娠五脏不利，气血虚羸，因食生冷，或发憎寒，唇青面白，筋脉拘挛，骨节痠痛，皮毛干涩，上气喘急，两胁刺痛胀满，大便不通，呕吐频频。

18935 平安散

【方源】《何氏济生论》卷三。

【异名】千金丹、人马平安散（《兰台轨范》卷四）。

【组成】劈砂一钱 礞砂一钱 雄黄一钱

火消一钱 当门子三分 冰片三分 飞金三十张 西黄一分（一方加明矾一钱 细辛五分 牙皂五分）

【主治】①《何氏济生论》：霍乱。②《兰台轨范》：中噎。

【备考】《兰台轨范》本方用法：上为末。或水服二三分，或嗅少许于鼻内。

18936 平安散

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】熟地 甘草（炙） 陈皮 砂仁 木香 川芎 生姜 煨盐

【主治】妊娠泄泻。气急筋挛骨节痛。

18937 平安散

【方源】《济急丹方》卷上。

【组成】雄黄三钱 朱砂三钱 生消三钱（腊月提透者更妙） 冰片二分 麝香二分 革茛一分 明矾二分

【用法】上为细末，瓷瓶收贮，勿令泄气。

【主治】暑气痧气，或远出山行，及闻秽气，一时昏倒，或天时不正，寒暑不均肚疼。

18938 平安散

《外科传薪集》。为方出《证类本草》卷二十三引《鬼遗》，名见《圣济总录》卷一二九“乌梅散”之异名。见该条。

18939 平安散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】牛黄二分 火消三钱 煨月石三钱 雄黄三钱 原寸香三分 大梅片二分

【主治】火症痰核。

18940 平安散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】牛黄二分 火消三钱 月石三钱 雄黄三钱 朱砂三钱 麝香二分 冰片二分

【用法】上为细末，摊膏用。臀疽，外贴患处；毒蛇、疯狗咬伤，点目内眦。

【功用】攻坚消块。

【主治】臀疽初起，红肿顶破，及毒蛇、疯狗咬伤。

【加减】加硃砂，名硃砂散。

18941 平安散

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】辰砂二两 腰黄 冰片各一钱二分 月石 麝香各六分 牙硝 金泊各二分 蟾酥五分

【用法】上为细末，瓷瓶收贮。用时搐入鼻孔；或置脐眼，以膏盖之。气绝者，先用本方搐入鼻孔，以通其窍，再以不换气散散主之。

【主治】霍乱卒倒，甚则气绝者。

18942 平安散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】绿豆粉十六两 滑石粉四两 白芷粉四两 麝香五分 冰片五分 薄荷油五钱

【用法】上为细末，过罗，混合均匀，装瓶。每瓶重四分。每服四分，温开水送下；鼻闻亦可。

【功用】清凉解热，去暑避瘟。

【主治】夏令受暑，头目昏晕，呕吐恶心。

18943 平阳汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】桂枝二分 麻黄一钱 甘草一钱 青蒿三钱 天花粉一钱

【用法】水煎服。

【主治】素有阳明胃火，冬月伤寒，身热一日，即发谵语。

【方论选录】此方少用桂枝，而多用麻黄者，以寒轻而热重也。用青蒿为君者，青蒿退热而又能散邪，且又能入膀胱而走于胃，即解膀胱之邪，而又解胃中之火，不特不引邪以入阳明，而兼且散邪，以出阳明也。方中又加天花粉者，以谵语必带痰气，天花粉善消膈中之痰，而复无增热之虑，入于青蒿、桂枝、麻黄之内，通上达下，消痰而即消邪也。痰邪两消，又何谵语乎！

18944 平阳汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】干葛二钱 人参三钱 白术五钱 贝母三钱 橘红一钱 石膏三钱 麦冬五钱 柴胡一钱 茯苓五钱

【用法】水煎服。

【主治】阳明胃经之症。发症之时，身先发热，头疼鼻干，渴欲饮水，目眴眴不得眠，甚则烦躁，畏火光，厌听人声喧噪。

【方论选录】此方以人参、白术助脾胃之气，干葛、石膏泻阳明之火邪，贝母、橘红消阳明之痰食，麦冬滋肺经之炎，柴胡舒胆经之郁，茯苓泄太阳之滞。既攻补兼施，复彼此相制，邪安得不退避哉。

18945 平阳汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】玄参三钱 山茱萸一两 沙参二两 地骨皮一两 丹皮一两

【用法】水煎服。

【主治】阴衰之极，阳强不倒。终日报阳，绝不肯倒，然一与女合，又立时泄精，精泄之后，随又兴起。

【方论选录】此方纯是补阴之药，更能凉其骨中之髓。又恐过于纯阴，与阳有格格不入之意，复加入山茱萸，阴中有阳也，使其引阴入阳，以制其太刚之气。

18946 平呃散

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】玄参 白术各五钱 人参三钱 茯苓 甘菊花 麦冬各三钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【功用】补胃中之土，降胃中之火。

【主治】胃火微旺，胃气犹虚，口渴饮水，忽然呃逆者。

18947 平肝汤

【方源】方出《丹溪心法》卷五。名见《医部全录》卷四三一。

【组成】人参 茯苓 白芍(酒炒) 白术

【用法】上咬咀。加生姜，水煎服。

【主治】小儿惊而有热。

【加减】夏月加黄连、生甘草、竹叶。

18948 平肝汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】茯苓三钱 白术一钱 陈皮二分

神曲五分 麦冬二钱 元参二钱 桔梗一钱
苏叶三分 人参三分 枳壳二分 黄芩三分

【用法】水煎服。

【功用】补胃以散火。

【主治】胃火上升，小儿生疳，上下牙床尽肿，口角流涎，咳嗽不已，咽喉肿痛。

18949 平肝饮

【方源】《观聚方要补》卷三。

【组成】柴胡 芍药 香附各一钱三分
青皮 鳖甲 槟榔各一钱 莪术八分 吴茱萸五分 甘草少许

【用法】水煎服。

【主治】左胁下痞满，宗筋努张不快。

【加减】若积热者，加胡黄连；腹满，加枳实、厚朴；大便秘，加大黄。

18950 平肝散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】川芎 当归 赤芍药 防风 荆芥 柴胡 羌活 蝉退 菊花 蔓荆子 白芷各五分 生地黄 胆草各八分 夏枯草一钱 甘草三分

【用法】水二盏，煎一盏，去滓，加酒一杯同服。

【主治】迎风冷泪。

18951 平肝散

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】陈皮 青皮（麸炒） 香附 白芍 山梔（炒） 黄连（炒） 黄芩（炒）各一钱 姜制半夏八分 甘草五分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】七情不顺，郁火攻冲，腹痛时发时止，痛无定处。

18952 平肝散

【方源】《诚书》卷七。

【组成】羚羊角 细辛 防风 人参 车前子 黄芩 知母 羌活 茯苓 玄参

【主治】圆翳内障，不痛不痒。

18953 平肝散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】白芍 川芎 丹皮 青皮 柴胡

枳壳 薄荷 甘草

【主治】怒伤胁痛。

18954 平肝散

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】当归 佩兰 郁金 桔梗 香附 玫瑰花 白芍 木香 陈皮 柴胡 枇杷叶（炙）

【主治】上格。忧闷伤肝，致帝丁两旁凸起紫筋数条，束紧咽喉，似物撑塞，吐不出，咽不下。

18955 平沙丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】藿香叶一两 茅术三钱（米泔浸） 陈皮五钱（炒） 枳壳一两（炒） 厚朴八钱（姜汁炒） 生半夏五钱 生甘草三钱 滑石（水飞）二两 苏叶一两（姜汁炒） 二蚕沙二两 草薢河车一两（炒）（以上诸药，再用青蒿汁浸三、四次） 青皮五钱（炒） 川贝（去心）五钱 麝香一钱

【用法】上为末，姜汁为丸，约重二钱，朱砂为衣。每服一丸，灯心汤送下。

【主治】痧胀，霍乱吐泻转筋，并伤暑，心胃痛。

【禁忌】孕妇忌服。

18956 平补丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】菟丝子（酒浸，研，焙） 山茱萸（酒浸，焙） 当归 益智仁各半两 川楝肉 牛膝 葫芦巴（炒） 厚杜仲（姜制，炒） 巴戟（去心） 茯苓（酒浸，焙）各三钱半 乳香二钱

【用法】上为末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前枣汤或盐汤送下。

【主治】消肾不渴，肌肉瘦削，小便涩数而沥，如欲渗之状。或虚劳内损遗尿，或下焦虚寒，小便欲出而不禁。

18957 平补汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】黄耆（锉） 芍药各二两 甘草

(炙, 锉) 人参各一两 桂(去粗皮)二两 当归(锉, 炒)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜半分(劈碎), 大枣二枚(去核), 煎至七分, 去滓, 空腹温服, 日午、夜卧再服。

【主治】虚劳。胸中客热, 目视眈眈, 恍惚发热, 卧不得安, 少腹拘急, 小便余沥, 临事阳弱, 阴下湿痒, 小便白浊。

【加减】如寒, 加厚朴二两(去粗皮, 生姜汁炙)。

18958 平补汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】熟地一两 麦冬一两 甘草五分 白芍一两 柴胡一钱 人参五分 茯苓三钱 天花粉二钱 百合五钱 炒黑荆芥一钱

【用法】水煎服。

【主治】阴气素虚, 更加气恼, 偶犯风邪, 因而咳嗽。

18959 平补散

【方源】《得效》卷十九。

【组成】白术 甘草 白姜 陈皮各二钱 茯苓 木香各一钱 肉豆蔻二个(煨)

【用法】上为末。每服二钱, 盐汤调下, 一日三四次。利止、手足温、食进却住服。

【功用】温脾正气。

【主治】利后不止, 手足冷。

18960 平陈汤

【方源】《医学入门》卷五。

【异名】陈平饮(《灵兰要览》卷上)、陈平汤(《医级》卷七)。

【组成】苍术 半夏各二钱 甘草七分 厚朴 陈皮 赤茯苓各一钱二分半

【用法】上锉一帖。加生姜三片, 大枣二枚, 水煎服。

【功用】祛邪逐痰。

【主治】①《医学入门》: 食疟。②《医级》: 风寒风湿所伤, 致痰嗽满闷。

18961 平肾散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黑丑一钱 泽泻 当归 枸杞各二钱 白丑 苦参各八分

【用法】水煎, 食后服。只可服五剂。

【主治】目中不清, 视物不明。

18962 平和汤

【方源】《活幼心法》卷末。

【组成】人参 当归 桔梗 白芍 紫苏 黄耆各四分 防风 白芷 甘草各三分 官桂 沉香 檀香 乳香 藿香各二分

【用法】加生姜一片, 水煎, 温服。

【主治】痘症。因邪秽所触, 伏陷而出不快, 其痘痒者。

18963 平肺丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】真桑白皮(去赤皮, 锉半寸, 清水米泔浸十五日漉出, 焙令干)二两 贝母 防己 甘草 杏仁(去皮尖双仁者, 麸炒赤, 别研)各一两

【用法】上为细末。煮面为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食后、临卧生姜汤或橘皮汤送下。

【主治】上焦有热, 微寒外乘, 客滞肺经, 寒热相交, 上抢咽喉, 成咳嗽不已。或邪气留连日久, 积动经络, 或有恶物, 或胸满气促, 或饮食进退, 或寒热不常, 及咳嗽、气喘、燥嗽, 喉中呀呖, 不得睡卧。

18964 平肺汤

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】麻黄(去节) 橘皮各二两 小麦一升

【用法】上咬咀。以水五升, 煮取一升半, 分二次服。

【主治】肺气虚竭不足, 乏气, 胸中干, 口中辟辟干。

18965 平肺汤

【方源】《普济方》卷一六三引《指南方》。

【组成】天门冬 马兜铃 百部各半两

【用法】上为粗末。每服五钱, 水二盞, 煎至一盞, 去滓温服。

【主治】①《永乐大典》引《指南方》：喘，肌肉渐瘦，骨蒸。②《鸡峰》：喘而发热，医者误投燥热，火邪熏肺，重加喘息，颊赤咽燥，其脉细数。

18966 平肺汤

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】黄耆一两(锉) 沉香半两 紫菀(去土) 人参 紫苏(去梗)各二两 杏仁(去皮尖双仁，麸炒) 橘皮(汤去白，焙)各一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，一日三次。

【主治】肺病，气逆喘咳。

18967 平肺汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】款冬花 五味子 白茯苓 阿胶 白术 川芎 人参 熟地黄 黄耆 紫菀 甘草 杏仁 桂各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肺气久虚，喘急多倦。

18968 平肺汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】人参 五味子 黄耆 桂 杏仁 白茯苓各一两 麻黄二钱

【用法】上锉。每服二钱，水一盞，煎至七分，食后、临卧细细热呷。才温再暖，热呷之尤佳。

【功用】平肺气。

【主治】寒嗽。

18969 平肺汤

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】知母 半夏(汤洗七次) 杏仁(去皮尖，炒) 麻黄(去节) 阿胶(蛤粉炒) 贝母各一两 桑叶 款冬花 甘草(炙)各半两

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盞半，加生姜五片，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】咳嗽上喘。

18970 平肺汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】五味子 紫菀(洗去土) 陈皮(去白) 甘草(炙) 杏仁(泡，去皮尖) 半夏(汤浸七次) 紫苏子 桑白皮

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，加生姜四片，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】妇人喘嗽。

18971 平肺汤

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】桔梗(炒) 桑白皮(炒) 陈皮(炒)各一两 半夏(汤泡七次) 天南星(炮) 川姜(炮，洗)各二两 人参一两半(去芦)

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盞，加生姜五片，煎至七分，去滓，食后服。

【主治】肺经感寒邪，痰嗽盛者。

18972 平肺汤

【方源】《直指》卷七。

【组成】葶苈(微炒) 桑白皮(炒) 北梗 枳壳(制) 紫苏茎叶 半夏(制)各一两 麻黄(去节)三分 甘草(炒)半两

【用法】上锉散。每用三钱，加生姜五片，水煎服。

【主治】肺与肾皆以至阴积水，喘嘈嗽咳。

18973 平肺汤

【方源】《普济方》卷二十六。

【组成】黄耆一两 芍药一两半 半夏一两一钱 人参 甘草各半两

【用法】上为细末。每服四钱，以水一盞半，加生姜五片，大枣二枚，饴一块，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】肺虚有热。

18974 平肺汤

《普济方》卷一五七。为《普济方》卷一六五引《杨氏家藏方》“平肺散”之异名。见该条。

18975 平肺汤

《普济方》卷一六三。即《医方大成》卷二引《简易》“秘方平肺汤”。见该条。

18976 平肺饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】陈皮 前胡 桑皮 薄荷 防风 各五分 瓜蒌仁 苏子 桔梗各四分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】感风邪咳嗽，痰多，洒淅恶寒。

18977 平肺饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】人参 麦门冬 赤芍 槟榔 赤茯苓 陈皮 桔梗各一钱 甘草五分

【用法】水煎，空腹服。

【主治】肺病初起，咳嗽气急，胸中隐隐作痛，呕吐痰涎。

18978 平肺散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】桑斜 枸杞 水蓼 覆盆子各二两 皂儿 茴香 荆三棱各一两

【用法】上为细末。每服二钱，加生姜一块，胡桃肉半枚，食后、临卧与药同嚼细咽津。

【主治】肺胃受寒，咳嗽上气，涎痰不利，咯唾涎沫，胸满气逆，喘鸣肩息，咽干噎气，语声嘶破，身体疼痛，时发寒热。

18979 平肺散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】人参 黄耆 五味子 桑白皮 款冬花 甘草 杏仁各半两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】肺伤唾血。

18980 平肺散

【方源】《普济方》卷一六五引《杨氏家藏方》。

【异名】平肺汤（《普济方》卷一五七）。

【组成】猪猪肉四两

【用法】起薄作三片。以皂角三寸，将水浸后，捻去水，用膩粉二钱，搽入肉内，以湿纸裹煨。至五更时烂嚼，以淡姜汤或桑白皮煎汤下。至日午泻下痰涎，是病根也。

【主治】痰涎咳嗽。

18981 平肺散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】御米壳四两（锉碎，蜜水和，炒黄） 乌梅肉一两半 诃子皮一两 人参一两 贝母（去心） 百合各半两

【用法】上为末。每服三钱，水一盞，煎至七分，食后、临卧热服。

【主治】久咳嗽。

18982 平肺散

《丹溪心法附余》卷五。即《医方大成》卷二引《简易》“秘方平肺汤”。见该条

18983 平肺散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】天冬 麦冬 五味 知母 生地 桑皮 白茯苓 甘草 橘红

【主治】妇人久嗽不止。

18984 平泻汤

【方源】《辨证录》卷七

【组成】芍药二两 茯苓一两 白术二两

【用法】水煎服。

【功用】平肝泻水。

【主治】脏腑不调，肝乘脾土，湿气下行，久泻不愈。

【方论选录】此方用芍药以平肝，用白术、茯苓健脾以去湿。肝气既平，不去刑土，而脾得养，无畏于木气之克。况湿去则土燥，无波可兴，何能作泻？

18985 平治汤

【方源】《会约》卷九。

【组成】枳壳一钱半 桔梗二钱 防风 茯苓各一钱半 瓜蒌仁（去油）一钱 紫苏子（微炒，研）八分（白者不效） 甘草一钱 杏仁（去皮尖）七分 半夏一钱半

【主治】气喘，痰火内郁，风寒外束，气急有声，坐卧不宁。

【加减】冬月，加麻黄；夏月，加石膏；挟寒者，多用生姜汁。

18986 平胃丸

【方源】《鸡峰》卷十二引王叔和方。

【组成】白术四两 厚朴三两 人参一两

陈皮二两半

【用法】上为细末，蒸枣为丸，如樱桃大。每服三丸，白汤米饮嚼下，不拘时候。

【功用】和脾胃，进饮食。

18987 平胃丸

【方源】《千金》卷十五引崔文行方。

【组成】大黄二两 小草 甘草 芍药 芎藭 葶苈各一两 杏仁五十枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。一岁儿每服二丸，饮送下，一日三次。

【功用】调胃。

【主治】丈夫、小儿食实不消，胃气不调，或温壮热结，大小便不利者。

18988 平胃丸

【方源】《千金翼》卷十九引崔文行方。

【组成】菖蒲 大黄 葶苈(熬) 小草 芍药 当归 桂心 干姜 茯苓 麦门冬(去心) 芎藭 细辛各二两 甘草二两半(炙)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，空腹以酒送下，一日二次。

【功用】消谷，平胃气，令人能食。

【主治】五劳七伤。

【加减】小儿亦患冷者，减大黄，倍干姜；小便利者，生用葶苈。

18989 平胃丸

【方源】《千金》卷十五。

【组成】杏仁五十枚 丹参三两 苦参 葶苈 玄参各二两 芎藭 桂心各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，酒送下。以知为度。

【主治】①《千金》：身重不得食，食无味，心下虚满，时时欲下，喜卧者。②《圣济总录》：腹内结强，不可按抑，饮食不化。

【方论选录】《千金方衍义》：脾与胃以膜相连，脾虚合用温补，反用苦寒平胃，宁不得脾气之益困乎？只缘中气不能健运，宿食积聚于胃而蕴热，是不得不用苦寒以散食积之火。丹参、苦参、元参、葶苈，《本经》皆治

腹中寒热积聚，杏仁下气开结，芎藭理血中气，桂心辛温散结，以激发诸苦寒之性。

【备考】原书治上证，先针胃脘大仓，后服本方。

18990 平胃丸

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】白豆蔻(去皮) 枳壳(去瓢，麸炒) 白术 人参 大麦蘖(炒黄) 各一两 干姜(炮) 三分 甘草(炙) 半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心煎生姜、大枣汤送下，一日二次。

【主治】伤寒后胃气不和，不能食，纵食不消。

18991 平胃丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】半夏曲(焙)一两 肉豆蔻(去皮) 槟榔(锉)各二枚 青橘皮(汤浸，去白，焙)半两 沉香一两 木香 丁香各半两 麝香半钱(研)

【用法】上为末，枣肉与糯米粥为丸，如梧桐子大，丹砂为衣，阴干。每服三五丸，生姜汤嚼下。

【功用】进食消痰。

【主治】脾胃气虚弱，呕吐不下食。

18992 平胃丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】甘草(炙，锉) 枳壳(去瓢，麸炒) 白术 人参各一两 干姜(炮裂)半两 麦蘖(炒)一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下，不拘时候，一日三次。

【主治】虚劳胃气不调，不能食，冷即腹胀泄利。

18993 平胃丸

【方源】《保命集》卷中。

【异名】白术和胃丸(《内外伤辨》卷十)、和中丸(《脾胃论》卷下)。

【组成】厚朴一两 白术一两二钱 陈皮八钱(去白) 木香一钱 生半夏(汤洗)一两 槟榔二钱半 枳实五分 甘草三钱(炙)

【用法】上为细末,姜汁浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,生姜汤或温水送下。

【功用】和中,消痰去湿,厚肠胃,进饮食。

【主治】病久胃气虚弱,厌厌不能食,脏腑或秘或滞。

18994 平胃丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二引章运使浩方。

【组成】平胃散四两 半夏(姜制,为末)四两

【用法】上和调,用好枣一百枚,灯草一小把,水一大碗同煮,候枣烂,去灯心,枣子去皮核,取肉为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心生姜汤送下;熟水亦得。

【功用】《朱氏集验方》:正胃消痰。

【主治】痰饮。

18995 平胃丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】半夏曲(焙) 沉香各一两 肉豆蔻(去皮) 槟榔(锉)各二个 青橘皮(汤浸,去白,焙) 木香 丁香各半两 麝香半钱(别研)

【用法】上为细末,枣肉与糯米粥为丸,如梧桐子大,丹砂为衣,阴干。每服三五丸,生姜汤嚼下。

【功用】进食消痰。

【主治】脾胃气虚弱,呕吐不下食。

18996 平胃丸

【方源】《同寿录》卷一。

【组成】陈皮九两 厚朴九两 枳壳五两 山楂肉五两 甘草二两五钱 苍术九两

【用法】上为细末,水滴为丸,每服三钱,老年及孕妇只服三分。头痛发热发寒,用葱白二根,陈茶二分,生姜三片,煎汤送下;伤食恶心,生姜一片,煎汤送下;泻初起,泽泻三分,生姜一片,煎汤下;疟疾,加青皮

二分,砂仁七个,柴胡三分,同煎汤下。

【主治】头痛发热恶寒,伤食恶心,泄泻,疟疾。

18997 平胃丸

《中国医学大辞典》。即《医方类聚》卷十引《简要济众方》“平胃散”改为丸剂。见该条。

18998 平胃丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】人参三钱 白术五钱 薏仁五钱 芡实五钱 砂仁三粒 吴茱萸五分

【用法】水煎服。

【主治】肾虚吐呃。

【方论选录】此方似平治脾胃之药,不知皆治肾之法。方中除人参救胃之外,其余药品俱入肾经;而不止留在脾也。肾火生脾,脾土始能生胃,胃气一转,呕吐始平,此治胃而用治肾之药。

18999 平胃汤

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】阿胶(炙) 芍药各二两 干地黄 干姜 石膏(碎) 人参 黄芩 甘草(炙)各一两

【用法】上哎咀。以水、酒各三升,煮取三升,分三次服。

【主治】胃中寒热呕逆,胸中微痛,吐如豆羹汁,或吐血。

19000 平胃汤

【方源】《圣济总录》卷三十八

【组成】干姜(炮)二两 附子(炮裂,去皮脐)半两 人参 甘草(炙) 白茯苓(去黑皮)各三两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】霍乱,脐上筑悸。

19001 平胃汤

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】葶苈(炒)一两 官桂(去粗皮,另研)一两 马兜铃(去丝蒂)三两

【用法】上为末。每用三钱,水一盏,煎七

分, 饭后细细呷之。

【主治】老人气喘咳嗽。

19002 平胃汤

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《仙传济阴方》。

【组成】人参 草果 白术 缩砂 白茯苓 红枣肉(煨过, 焙干)

【用法】上为末。空心白汤调下。

【主治】月经不调。

19003 平胃散

【方源】《博济》卷二。

【异名】参苓平胃散(《直指附遗》卷六)、加味平胃散(《育婴秘识》卷三)。

【组成】厚朴(去粗皮, 姜汁涂, 炙令香, 净)二两半 甘草(炙)一两半 苍术(米泔水浸二日, 刮去皮)四两 陈皮(去白)二两半 人参一两 茯苓一两

【用法】上为末, 每服一钱, 水一盞, 加生姜、枣子, 同煎七分, 去滓, 空心温服; 或为细末, 蜜为丸, 如梧桐子大, 每服十丸, 空心盐汤嚼下。

【功用】治气利膈, 进食平胃。

【主治】①《博济》: 脾胃气不和, 不思饮食。②《御药院方》: 心腹肋肋胀满刺痛, 口苦无味, 胸满短气, 呕逆恶心, 噎气吞酸, 面色萎黄, 肌体瘦弱, 怠惰嗜卧, 体重节痛, 常多自利, 或发霍乱, 及五噎八痞, 膈气反胃。

19004 平胃散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】天下受拜平胃散(《岭南卫生方》卷中)、受拜平胃散(《杂类名方》)、神效平胃散(《保命歌括》卷十九)。

【组成】苍术四两(去黑皮, 捣为粗末, 炒黄色) 厚朴三两(去粗皮、涂生姜汁, 炙令香熟) 陈橘皮二两(洗令净, 焙干) 甘草一两(炙黄)

【用法】上为散。每服二钱, 水一中盞, 加生姜二片, 大枣二枚, 同煎至六分, 去滓, 食

前温服。

【功用】燥湿运脾, 行气和胃。

①《简要济众方》: 调气进食。②《局方》: 暖胃, 化宿食, 消痰饮, 辟风寒冷湿四时不正之气。③《岭南卫生方》: 温养脾元, 平和胃气, 辟岚瘴冷湿, 病后进食。④《玉案》: 和胃健脾, 祛湿消食。⑤《医方论》: 化痞, 消胀, 和中。

【主治】脾胃不和, 湿滞中阻。脘腹胀满, 食少口淡, 呕逆恶心, 噎气吞酸, 大便泄泻, 肢体困重。

①《简要济众方》: 胃气不和。②《局方》: 脾胃不和, 不思饮食, 心腹肋肋胀满刺痛, 口苦无味, 胸满短气, 呕逆恶心, 噎气吞酸, 面色萎黄, 肌体瘦弱, 怠惰嗜卧, 体重节重, 常多自利, 或发霍乱, 及五噎八痞, 膈气反胃。③《直指》: 伤湿泄泻。④《得效》: 妊娠两足浮肿, 名曰皱脚。⑤《女科撮要》: 肠胃寒, 受湿下血。⑥《保婴金镜》: 小儿乳食过伤, 肠鸣呕吐或米谷不化。⑦《济阴纲目》: 妊娠饮食停滞, 或肚腹作痛。⑧《明医指掌》: 山岚瘴雾, 令人不服水土而腹胀。⑨《症因脉治》: 胃气不平, 喘而上逆。⑩《医宗金鉴》: 湿淫于内, 脾胃不能克制, 有积饮痞膈中满者。

【宜忌】《医方考》: 惟湿土太过者能用之, 脾土不足及老弱、阴虚之人, 皆非所宜也。

【方论选录】①《医方考》: 此湿土太过之证, 经曰敦阜是也。苍术味甘而燥, 甘则入脾, 燥则胜湿; 厚朴性温而苦, 温则益脾, 苦则燥湿, 故二物可以平敦阜之土。陈皮能泄气, 甘草能健脾, 气泄则无湿郁之患, 脾强则有制湿之能, 一补一泄, 又用药之则也。②《景岳全书》: 夫所谓平胃者, 欲平治其不平也。此为胃强邪实者设, 故其性味从辛从燥从苦, 而能消能散, 惟有滞有湿有积者宜之。今见方家每以此为常服健脾之剂, 动辄用之, 而不察可否, 其误甚矣。③《成方便读》: 用苍术辛温燥湿, 辟恶强脾, 可散可宣者, 为

化湿之正药；厚朴苦温，除湿而散满；陈皮辛温，理气而行痰，以佐苍术之不及。但物不可太过，过刚则折，当如有制之师，能戡祸乱而致太平，故以甘草中州之药，能补能和者赞辅之，使湿去而土不伤，致于和平也。

【备考】方中诸药生用，名“生料平胃散”（见《得效》）。本方改为丸剂，名“平胃丸”。（见《中国医学大辞典》）

19005 平胃散

【方源】《幼幼新书》卷二十九引了时发方。

【组成】丁香（炒）五钱半 陈皮（去白）甘草（炙）各三钱半 白姜（炮）一分 肉桂（不见火）二钱半

【用法】上为细末。每服一小钱，沸汤入盐点服。

【主治】大人小儿水泻，胃气虚弱，饮食减，可传成赤白痢，羸瘦，时复腹痛不可忍。

19006 平胃散

【方源】《三因》卷八。

【异名】八味平胃散（《证治要诀类方》卷三）。

【组成】厚朴（去皮，姜制，炒）射干（米泔浸）升麻 茯苓各一两半 芍药二两 枳壳（麸炒，去瓤） 大黄（蒸） 甘草（炙）各一两

【用法】上为锉散。每服四钱，水一盏，煎七分，去滓，空心热服。

【主治】胃实热。口唇干，呕哕，烦闷，大便秘涩，及热病后余热不除，蓄于胃中，四肢发热，口渴，胸满，无汗。

19007 平胃散

【方源】《医方大成》卷十引《经济方》。

【组成】红曲（年久者）三钱半 甘草（炙）一钱 白术一钱半（面炒）

【用法】上为末。每服半钱，煎枣子米饮下。

【主治】小儿吐逆频并，手足心热，不进饮食。

19008 平胃散

【方源】《普济方》卷一九一。

【组成】附子（炮） 白术各一两 丁香半两

【用法】上为末，和匀。每服二钱，水一盏，加生姜七片，大枣三枚，煎七分，不拘时候服，一日三五次。若肿未退，可灸三阴交穴及命门穴。

【主治】水肿。

19009 平胃散

《普济方》卷三三八。为《医方类聚》卷二二四引《济生》“平安散”之异名。见该条。

19010 平胃散

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】马芹子（生） 白僵蚕（直首） 丁香各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，陈皮汤化下。诸疾觉胃气稍怯，即服之。

【功用】养脾，实胃气。

【主治】小儿吐。

19011 平胃散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】水银 硫黄各一钱（同研黑） 诃子（炮，去核） 肉豆蔻（炮） 桂（去皮） 草豆蔻（去皮） 附子（炮，去皮脐，炙）各一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。三岁一丸，食前米汤调下。

【主治】小儿伏热，吐泻烦渴，腹冷疼。

19012 平胃散

《医学入门》卷四。即《伤寒六书》卷三“加减调中饮”。见该条。

19013 平胃散

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 白术 防风

【主治】湿盛体重，或泻，多寐。

19014 平胃散

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 炙甘草 香附炒梔 半夏

【主治】伤食，嗳气有腐食气。

19015 平胃散

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】陈皮 山楂 神曲 麦芽 枳壳 苍术 厚朴各五分 甘草 砂仁各三分

【主治】小儿伤食热。

【加减】恶心，加半夏、藿香；虚，加人参、白术。

19016 平胃散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 香附 半夏 白芍 白芷 苏叶 川芎 木香 山楂 神曲 砂仁 炙草

【用法】上为末。感寒生姜为引。

【主治】伤食腹痛，不思饮食。

19017 平胃散

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】苍术（炒） 陈皮 厚朴（姜炒） 甘草（炙） 麦芽（炒） 砂仁（研）

【用法】引用姜一片，水煎服。

【主治】小儿伤乳。吐乳，口热唇干，夜卧不宁，手足心热。

19018 平胃散

【方源】《一盘珠》卷二。

【组成】苍术（漂） 陈皮 厚朴（姜水炒） 甘草各等分 香附（酒炒） 青皮（醋炒）各二钱

【用法】生姜为引。

【主治】胃脘气痛饱胀。

19019 平胃散

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】漂苍术一钱二分 紫川朴一钱五分 真广皮一钱二分 炙甘草 尖槟榔 草果仁（姜汁炒极熟）各一钱

【用法】加生姜三片，大枣三枚，水煎，清早空心服。

【功用】截疟。

【主治】小儿寒疟不止。

19020 平胃散

【方源】《宁坤秘笈》卷上。

【组成】茯苓 炙甘草 山药 广皮各等分

【主治】春天胎前泄泻。

19021 平胃散

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】苍术一钱（米泔水制） 厚朴一钱（姜汁炒） 广皮一钱 甘草三分 山梔一钱（炒） 茵陈二钱 秦艽一钱 茯苓一钱 生地一钱 葛根一钱

【用法】加灯心、生姜，水煎服。

【主治】湿郁发黄。

19022 平胃散

【方源】《异授眼科》。

【组成】黑豆（炒） 泽泻 当归 枸杞 白丑 黄芩

【用法】上为细末服。

【主治】目有白花如絮。

19023 平胃散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 建曲 谷芽 砂仁 木香

【主治】疫病不和，脾胃有停食滞，泻利如水，肿胀作痛。

19024 平胃膏

【方源】《朱氏集验方》卷十三。

【组成】平胃散

【用法】以冷水调涂。

【主治】打扑伤损，不问皮破与暗伤。

19025 平顺散

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】柴胡 甘草 乌药各一钱 白芍三钱 香附 白芥子 川芎各二钱 砂仁一粒

【用法】水煎服。

【主治】气恼之后，肝又血燥，肺又气热，一时呃逆而不止。

19026 平疮散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】寒水石二两 东丹一两 扫盆一钱 硫黄五钱 明矾七钱 川椒一钱 黄柏

五钱 牛烟胶五钱 人中黄二钱

【用法】上为细末。以板猪油、鸡脚、大黄根同打烂，擦。立效。

【主治】白泡疮、脓窠肥疮痛痒者。

19027 平怒汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白芍三两 丹皮一两 当归一两 炒栀子五钱 荆芥（炒黑）五钱 天花粉三钱 甘草一钱 香附三钱

【用法】水煎服。

【功用】平肝泻火。

【主治】横逆骤加，一时大怒，叫号骂詈，两胁大痛而声哑，口大渴，舌干燥开裂，眼珠红，肝脉洪大而无伦次。

【方论选录】肝性最急，怒则其气不平，用芍药平其气也，甘草缓其急也，肝气既平而且缓，而后可散其气而泻其火矣；当归辛以散之也，荆芥引而散之也，栀子、丹皮凉以泻之也；然而徒散其火，而火为痰气所结，则散火而未能遽散，故又加香附以通其气，加花粉以消其痰。

19028 平怒散

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白芍一两 丹皮一两 当归五钱 炒栀子 牛膝各三钱 甘草 柴胡 广木香各一钱 枳壳八分

【用法】水煎服。

【主治】横逆骤加，一时大怒，叫号骂詈，致两胁大痛而声哑，口大渴，舌干燥开裂，眼珠红，肝脉洪大而无伦次。

19029 平热汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参五钱 黄耆一两 甘草一钱 麦冬一两 黄芩一钱 青皮五分 竹沥一合 白芍五钱 茯苓三钱 枣仁三钱 炒栀子五分 天花粉三钱 柴胡五分

【用法】水煎服。

【主治】为强横者所折辱，愤懑不平，遂病心狂，时而持刀，时而踰屋，披头大叫。

【方论选录】此方变竹叶石膏汤，以治阳明之虚热也。甘温以退大热，复佐之以甘寒，使阳明之火相顺而不逆，转能健土于火宅之中，消烟于余氛之内。土既有根，火亦自息，何狂之不去乎！

19030 平脏丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】黄连（酒炒） 枳壳（麸炒） 地榆 槐角各一两 莲蕊 当归各三钱 侧柏叶一钱 京墨（烧存性）五钱 乳香 没药各二钱

【用法】上为末，水为丸。每服百丸，空心白汤送下，渐减至六十丸止。若加黑丑头末五钱共丸尤效。

【主治】漏疮。

19031 平痞散

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】儿茶五分 消石三钱 冰片二分 赤石脂一钱 乳香一钱 青黛八分 青果核（煨）一两 青鱼胆二个（阴干，焙燥）

【用法】上为末。

【主治】下疳。

19032 平崇散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】黄连末二分 甘草末 冰片各一分 硼砂三分

【用法】人乳调，点两眼角。

【主治】眼珠忽然肿胀突出。

19033 平惊丸

【方源】《慎斋遗书》卷五。

【组成】炮姜二钱 肉桂三钱 白芍一两 茯神一两 远志三钱 甘草四钱 铁衣一两

【用法】炼蜜为丸。

【功用】平惊。

19034 平疳丹

【方源】《药奁启秘》。

【组成】乌梅肉（煨存性）一钱半 月石一钱半 扫盆五分 冰片三分

【用法】上为极细末。掺疮口，上盖薄贴。

【主治】疮痈有胥肉突出者。

19035 平脔散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】乌梅三钱 煅石膏一钱 轻粉一钱 月石二钱

【用法】直接撒布水肿胬肉的疮面上,纱布压扎。

【功用】祛湿收敛,平胬肉。

【主治】各种疮面水肿肉芽增生。

【宜忌】新鲜疮面,脓毒未净者勿用;对汞过敏者禁用。

19036 平喘丸

【方源】《常见病的中医治疗研究》。

【组成】麻黄 21 克 杏仁 30 克 桂枝 9 克 冬虫夏草 香油制马钱子各 6 克 鹿茸 1.5 克

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服 3~6 克,一日二次。

【主治】哮喘,偏虚寒者。

19037 平喘片

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】粉料:五味子(制)8 千克 青皮(麸炒)8 千克 白苏子 4 千克 甘草 4 千克 前胡 8 千克 石膏 2 千克 蚯蚓(炙)20 千克 麻黄(去根)20 千克 苦杏仁 8 千克 姜半夏 12 千克 干姜 1.2 千克 枳实(麸炒)12 千克 款冬花(蜜炙)4 千克 桔梗 4 千克 白果仁(干)16 千克 黄芩 12 千克

膏料:五味子(制)14 千克 青皮(麸炒)14 千克 白苏子 7 千克 甘草 7 千克 前胡 14 千克 石膏 70 千克 蚯蚓(炙)35 千克 麻黄(去根)35 千克 苦杏仁 14 千克 姜半夏 21 千克 干姜 2.1 千克 枳实(麸炒)21 千克 款冬花(蜜炙)7 千克 桔梗 7 千克 白果仁(干)28 千克 黄芩 21 千克

【用法】先将粉料研为细粉,过 100 目筛,和匀。再将膏料水煎二次,每次三小时,药汁滤过,澄清,混合后浓缩成清膏。另取砂糖 9.6 千克制成糖浆。取混合细粉 143.2 千克,先与碳酸钙 6.4 千克和匀,再与上述清

膏和糖浆搅匀,干燥,制成颗粒。每 100 克干颗粒加润滑剂 1 克,压制成片,即得。片重 0.47 克。口服一次 4~6 片,一日 3 次。

【功用】顺气平喘,止咳化痰。

【主治】支气管哮喘轻度发作,咳嗽痰多,胸闷气急。

19038 平喘宁

【方源】《实用中医学》。

【组成】麻黄三钱 黄柏四钱 白果肉十四个 茶叶一钱(冲) 冰糖二两(分冲)

【用法】前三味煎取药液,后二味开水另冲,兑入混匀,晚饭前服一煎,临睡前服一煎。

【功用】清热和中,理肺平喘。

【主治】咳嗽吐痰,痰黄而稠,胸闷气喘,不能平卧,苔黄,脉浮滑略数。

19039 平喘汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】苏子(炒) 黄芩(酒炒) 枳实各二钱 山梔仁(炒黑) 桔梗(炒) 杏仁(去皮尖) 瓜蒌仁(去油) 桑白皮各一钱

【用法】加灯心三十茎,水煎,空腹服。

【主治】火喘。乍进乍退,得食则减,食已复喘。

19040 平痢散

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】厚朴(姜汁炒) 粟壳(蜜炒)各一两 木香三钱 延胡索(炒)五钱

【用法】上为末,米汤调下,加蜜少许。

【主治】痢疾腹痛,便下赤白,日久不愈者。

19041 平解汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】香附五钱 当归五钱 天花粉三钱 半夏二钱 茯苓三钱 神曲二钱 麦芽二钱 炒梔子二钱 黄连五分 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】大怒之后,又加拂抑,事不如意,忽大叫而厥,吐痰如涌,目不识人。

19042 平瘰散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《经验良方》。

【组成】黄柏皮 九节黄连各等分

【用法】上为末。冻疮以芸苔煎汤，候温洗令净，轻绢拭干，乌鸡子清调敷；白秃用甘草汤洗，麻油调敷。

【主治】冻疮，白秃。

19043 平嗽丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】知母一两 真川母（去心）一两 巴豆霜二分

【用法】上为末，用米汤浆糊为丸服。

【主治】多年冷嗽，气逆痰多，遇寒即发。

19044 平鲫丸

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】大鲫鱼一条（去肠留鳞，以大蒜去皮切片，填鱼腹内，湿纸包，黄泥固济，慢火煨熟，去鳞骨） 平胃散末

【用法】为丸如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】膈气不食。

19045 平肝饮子

【方源】《医方大成》卷六引《济生》。

【组成】防风（去芦） 桂枝（不见火） 枳壳（去瓢，麸炒） 赤芍药 桔梗（去芦，炒）各一两 木香（不见火） 人参 槟榔 当归（去芦，酒浸） 川芎 橘红 甘草（炙）各半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】喜怒不节，肝气不平，邪乘脾胃。心腹胀满，连两胁妨闷，头晕呕逆，脉来浮弦。

19046 平和饮子

【方源】《颅凶经》卷下。

【组成】人参 茯苓 甘草（炙） 升麻各一分

【用法】上以水一白盏，煎至一合半以来，时时与之。

【主治】①《普济方》：小儿疮疹，及诸疮疼痛，烦渴不宁者。②《幼科类萃》：婴儿变蒸，于三日后进一服，可免百病。

【宜忌】乳母忌油腻。

【加减】冷，加白术半钱，热，加芒消半钱。

【备考】加减中的“芒消”原脱，据《专治麻疹初编》补。

19047 平胡饮子

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】柴平汤（《增补内经拾遗》卷三引《宦邸便方》）。

【组成】平胃散 小柴胡汤

【主治】①《医学入门》：疟，寒热相等。②《景岳全书》：湿疟。一身尽痛，手足沉重，寒多热少，脉濡。

19048 平胃煮散

【方源】《普济方》卷二十二引《卫生家宝》。

【组成】苍术四两（洗净，锉细作片子，先以米泔浸一宿，漉出，复用清水浸一宿，漉出，焙干，或晒干用） 白术二两 橘皮（去白）二两 枣四两（锉碎） 厚朴（去粗皮）四两（先以生姜自然汁浸一宿，火上炙令香，锉细） 生姜四两（切作片） 甘草二两（锉作半寸许）

【用法】上药依数修合事了。以瓷锅或铫或瓶，入药在内，以水淹浸约二三寸许，文武火煮，乃不紧不慢火候，煮药伺干，将出火焙燥，为细末。每服二钱，水一盏，加生姜二片，大枣二枚，同煎至八分服，白水煎亦得，或沸汤点服，并宜早晨空心常进一服。

【功用】宽中利膈，消酒进食，快脾胃，止呕逆，辟四时恶气。

【主治】霍乱吐泻，时气岚瘴诸病。或酒食后，尤宜进之。

19049 平喘仙丹

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】麦冬五钱 桔梗三钱 甘草二钱 半夏二钱 黄芩一钱 山豆根一钱 射干一

钱 白薇一钱 乌药一钱 苏叶八分 茯苓三钱

【用法】水煎服。

【主治】偶感风寒，一时动喘，气急抬肩，吐痰如涌，喉中作水鸡声。

【宜忌】此治外感之喘，而不可执之以治内伤之喘也。

19050 平肌追脓散

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】干姜。

【用法】上为末，鸡子清调搽四面。如溃烂，用猪蹄汤洗净疮口，拭干，掺之觉热如烘，平肌易愈。

【主治】发背，疮头冷者。

19051 平安如意丹

《卫生鸿宝》卷一。为原书同卷“灵通万应丹”之异名。见该条。

19052 平阳清里汤

【方源】《湿温时疫治疗法》引《舌鉴辨正》。

【组成】生石膏六钱 生甘草六分 青子芩一钱半 白知母三钱 小川连八分 生川柏六分

【用法】先用犀角六分，羚羊一钱，煎汤代水。

【主治】急性时疫。心络郁而君火灼血，血热生风者。

19053 平时擦牙散

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】青竹一根 食盐

【用法】青竹逐节留节，一头截断，将食盐装实，湿纸塞口。每段用湿粗纸二层裹好，放灶中。煮饭后火灰中煨透，取出去纸及竹灰，将净盐研细，再装入新竹中，如法再煨。共三次。出火气，研细。每朝擦牙。

【功用】永无牙病，至老坚固。

19054 平肝上清丸

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】知母肉二两 生石膏一两 黄连八钱 黄芩八钱 石斛五钱 薄荷四钱 茺

蔚子一两半 车前子八钱(炒) 蔓荆子六钱 青箱子五钱 夏枯草七钱 甘草三钱

【用法】上为细末，水打为丸。每服三钱，一日二次。

【主治】偃月障症。两眼不疼不红，视物昏蒙，风轮上边一条白膜，如弯月然，缓缓下垂。

19055 平肝止血汤

《辨证录》卷十一。为《傅青主女科》卷上“平肝开郁止血汤”之异名。见该条。

19056 平肝止血散

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】白芍二两 当归一两 荆芥(炒黑)三钱 炒栀子二钱 甘草一钱 丹皮二钱

【用法】水煎服。

【主治】大怒吐血色紫，气逆两肋，胀满作痛。

【方论选录】白芍平肝而又能益肝中之气血，同当归用之，则生血活血，实有神功。丹皮、栀子不过少凉其血，以清其火，以便荆芥之引经，甘草之缓急也。

19057 平肝止痢汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白芍一两 当归五钱 栀子二钱 枳壳一钱 车前子二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】夏、秋之间，肝克脾土，腹痛作泻，变为痢疾，宛如鱼冻，久则红白相间。

19058 平肝补脾汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】当归(土炒)一钱半 白芍(酒炒)一钱 沙参三钱 白术 茯苓各二钱 白豆蔻肉(炒，研)八分 木瓜一钱二分 肉桂一钱半 甘草(炙)一钱

【用法】水煎服。

【主治】木旺侮土，脾虚发泄。

19059 平肝泻火汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】生地四钱 栀子三钱 寸冬三钱

柴胡二钱 青皮二钱 木通二钱 黄芩三钱
胡黄连三钱 银花三钱 滑石三钱 枳壳三钱
甘草一钱 车前子三钱 (外包)

【用法】水煎服。

【主治】两眼赤酸，怕日羞明，上下眼皮弦紧皮松，倒睫卷毛，刺激眼球，发生白膜，热泪常流。

19060 平肝顺气丸

【方源】《全国中药成药处方集》(大同方)。

【组成】黄连(姜炒)二两 吴茱萸(炒) 神曲(炒)各一两 麦芽七钱 山楂一两 木香三钱 香附三两 川芎二两 广皮(去白)三两 白术四两 枳实二两 梔子(炒) 莱菔子各一两 半夏一两五钱 云苓一两 砂仁(炒)四钱 干姜(炒)一两 青皮(炒)六钱 竹茹一两 炙草四钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三钱，早、晚开水送下。

【主治】胸膈膨闷，不思饮食。

19061 平肝养肺汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】生白芍三钱 石决明五钱(煨) 紫石英四钱 北沙参三钱 川贝母一钱五分 炙桑皮三钱 旋覆花三钱(包) 代赭石四钱 制香附二钱 甘枸杞三钱 橘红八分 叭杏仁三钱(去皮尖) 煨牡蛎五钱

【用法】水煎服。

【主治】肝阳冲肺，痰色青灰，木扣金鸣之咳嗽。

19062 平肝消毒饮

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】赤芍 生地 当归 川芎 荆芥 白菊花 防风 蝉蜕 胆草 谷精草 黄连各等分 甘草减半

【主治】痘后余毒入目，或红肿，或生白翳。

19063 平肝消癥汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白芍一两 当归五钱 白术一两 柴胡一钱 鳖甲二钱 神曲一钱 山楂一钱

枳壳一钱 半夏一钱

【用法】水煎服。

【功用】舒肝中之郁，助脾胃之气。

【主治】肝气甚郁，结成气块，在左胁之下，左腹之上，动则痛，静则宁，岁月既久，日渐壮大，面色黄槁，吞酸吐痰，时无休歇。

19064 平肝流气饮

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归(酒洗)一钱 白芍(酒炒)四分 川芎六分 橘皮(盐汤洗)一钱 茯苓(去皮)一钱 半夏(姜制) 青皮(醋炒)六分 黄连(酒炒)八分 柴胡七分 香附(童便浸，炒)八分 厚朴(姜汁炒)七分 梔子(盐水拌炒)八分 甘草(炙，去皮)四分 吴茱萸(煮三次，去水，炒)四分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，空心热服。

【主治】胁痛，及小腹至绕脐并疝气内外疼者。

19065 平肝救血汤

【方源】《竹林女科》卷三。

【组成】当归 麦冬(去心)各一两 川芎五钱 三七(研)一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后厥阴感邪，呕吐，两胁胀满，便血。

19066 平肝清火汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】车前子 连翘各一钱 枸杞子 柴胡 夏枯草 白芍 生地黄 当归各一钱半

【用法】上为一剂。水二钟，煎至八分，去滓温服。

【主治】黑睛胀大，属虚者。

19067 平肝清胃丸

【方源】《简明医教》。

【组成】枯芩 黄连 白芍(俱酒炒) 生地(酒洗) 柴胡 半夏各七钱 人参五钱

青皮(醋炒)五钱 赤茯苓 蔓荆各一两 甘草二钱

【用法】上为末，葱汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服百丸，空腹姜、茶汤送下。

【主治】饮食厚味，挟怒气以动肝胃之火，耳聋耳鸣者。

19068 平肝清脑汤

【方源】方出《中医临证撮要》，名见《古今名方》。

【组成】羚角粉 2.4 克(冲服) 明天麻 3 克 嫩钩藤 12 克 白蒺藜 12 克 冬桑叶 9 克 天竺黄 4.5 克 鲜竹沥 1 小杯(冲服) 京赤芍 6 克

【功用】平肝熄风，清脑开窍。

【主治】产后发痉。新产之后，陡然抽风，神志不清，口眼抽动，牙关紧闭，两手紧握，舌苔薄腻或厚腻，脉细紧，或弦或滑。

19069 平肝舒络丹

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【组成】人参(去芦) 熟地 乳香 没药 橘皮 香附 厚朴 玄胡索 茯苓 檀香 龟版(炙) 羌活 防风 紫豆蔻仁 枳壳 砂仁 藿香 木香 乌药 黄连 白术 何首乌 白及 威灵仙 佛手 木瓜 钩藤 僵蚕 柴胡 细辛 白芷 桑寄生 牛膝各三钱 沉香一两 青皮 天竺黄 肉桂 川芎 公丁香各二钱 胆南星五钱

【用法】上为细末。每十二两四钱细粉兑入冰片三钱，朱砂一两，羚羊角一钱，和匀，炼蜜为丸，重二钱，金箔为满衣，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】疏郁理气，健胃止痛。

【主治】肝郁气滞，饮食不消，倒饱嘈杂，两胁刺痛，四肢抽搐。

19070 平肝舒筋汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】柴胡一钱 白芍一两 牛膝 生地 丹皮 炒梔子各三钱 当归五钱 陈皮 甘草各一钱 神曲五分 秦艽 乌药各一钱

防风三分

【用法】水煎服。

【功用】平肝气，散内热。

【主治】大怒之后，周身百节俱疼，胸腹且胀，两目紧闭，逆冷，手指甲青黑色。

19071 平肝潜阳汤

【方源】《常见病中医治疗研究》。

【组成】生牡蛎 夏枯草各 30 克 石决明 24 克 桑寄生 生地 生杜仲各 15 克 黄芩 12 克 草决明 菊花 茺蔚子各 9 克

【功用】平肝潜阳。

【主治】肝阳上亢，头晕头痛，心悸怔忡，失眠多梦，舌红脉弦。

19072 平肝潜阳汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】酒生地 15 克 玄参 9 克 五味子 3 克 酒白芍 菊花 石决明 生牡蛎 车前子各 9 克

【功用】滋阴降火，平肝潜阳。

【主治】绿风内障，水不涵木，肝火偏盛。头痛眼胀，时轻时重，瞳神时散时收，(后期则不能收)，视物模糊，白睛淡赤，按之目珠较硬者。

19073 平补心脾汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归三五钱(若血热者用一钱半) 熟地五七钱 白术二三钱 杜仲(盐炒)二钱 枸杞二钱 白芍(酒炒)二钱 甘草(炙)一钱 五味子(蜜炒)八分 续断(酒浸)二三钱 丹皮二钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人心脾气虚，不能固摄经血，以致先期者。

19074 平补正心丹

《张氏医通》卷十四。即《局方》卷五(宝庆新增方)“平补镇心丹”。见该条。

19075 平补仙术丸

《普济方》卷二二四。即《圣济总录》卷一八五“仙术丸”。见该条。

19076 平补地榆汤

《便览》卷三。为《卫生宝鉴》卷十六“平胃地榆汤”之异名。见该条。

19077 平补苁蓉煎

【方源】《普济方》卷二二四引《十便良方》。

【组成】苁蓉 五味子 山茱萸 杜仲 茯苓 牛膝(酒浸,切,焙) 菟丝子 薯蓣 巴戟各等分

【用法】上为细末,以酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心米饮送下。

【功用】补虚填精髓。

【主治】诸虚。

19078 平补固胎汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】淮山药(炒) 当归(去尾,酒洗) 杜仲(糯米泔炒) 白芍(酒炒) 各二钱 白术一钱半 熟地三钱 益母子一钱(炒) 甘草(炙)一钱 川续断二钱 升麻(盐水炒)三分 黄耆(蜜炒)一钱半

【用法】用大枣三枚,白莲子(去心,微炒,捶碎)七粒为引。

【功用】种玉之后,平补气血,以固胎元,免其堕胎。

【加减】虚寒作呕逆者,加生姜一钱;体虚兼热,口渴便燥等证,加黄芩一钱五分,或加生地二钱;气逆多滞者,加去白陈皮八分,或加童便炒香附七分,即砂仁亦可;有所触动而动血者,加阿胶二钱。

19079 平补固真丹

【方源】《本草纲目》卷十二引《乾坤生意》。

【组成】金州苍术(刮净)一斤(分作四分:一分川椒一两炒,一分破故纸一两炒,一分茴香、食盐各一两炒,一分川楝肉一两炒,取净术为末) 白茯苓末二两 酒洗当归末二两

【用法】酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心盐、酒送下。

【主治】元脏久虚,遗精白浊;妇人赤白带

下,崩漏。

19080 平补枳术丸

【方源】《丹溪心法附余》卷七。

【异名】平胃枳术丸(《济阳纲目》卷三十七)。

【组成】白术三两 白芍药一两半(酒浸,炒) 陈皮 枳实(去瓤,麸炒) 黄连(酒浸,炒) 各一两 人参 木香各半两

【用法】上为细末,荷叶煮浓汤,打米糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,渐加至六七十丸,空腹米汤送下。

【功用】调中补气血,消痞清热。

【主治】①《丹溪心法附余》痞闷。②《医钞类编》:虚痞,大便利者。

19081 平补理癆煎

【方源】《不居集》上集卷十一。

【组成】熟地一两 地骨皮 麦冬各五钱 人参五分 北五味二十粒 山药三钱 白术 白芥子各一钱

【用法】水煎服。

【主治】未成癆而将成癆者。

【方论选录】宏格曰:此方妙在平补而无偏胜之弊,虽熟地多用,然有参、术以行气,自易制其腻滞,故转能奏功。倘谓参、术助阳,熟地过温,举世皆不知其妙也。

19082 平补萆薢丸

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】萆薢一两半 杜仲 干木瓜 续断 牛膝各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,空心盐酒,盐汤任下,一日三次。

【主治】脚膝冷气冲腰,行履不前。

19083 平补虚弱汤

【方源】《会约》卷二。

【组成】人参(少者以时下生条参三五钱代之) 白术 茯苓 炙草各一钱半 当归二钱 白芍(酒炒)一钱半 杜仲 黄耆(蜜炒)各二钱 甘枸杞 山药各二三钱 五味十五粒 附子一钱或多用

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】气血两虚，脾肾悉亏，身倦神昏者。

19084 平补鹿茸丸

【方源】《圣济总录》卷八十。

【方药】鹿茸（酥炙，去毛） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，焙） 干地黄（焙） 柏子仁（研） 菟丝子（酒浸一宿，焙）各一两 黄芪（锉细） 白茯苓（去黑皮） 桂（去粗皮） 防风（去叉） 远志（去心） 车前子 五味子各半两

【用法】上为细末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至四十丸，空心米饮送下。

【主治】水气平愈，体瘦如旧。

19085 平补镇心丹

《风劳臆膈》。为《医统》卷四十八引《局方》“平补镇心丹”之异名。见该条。

19086 平补镇心丹

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【异名】镇心丹（《证治要诀类方》卷四）。

【组成】酸枣仁（去皮，隔纸炒）二钱半 车前子（去土，碾破） 白茯苓（去皮） 五味子（去枝、梗） 肉桂（去粗皮，不见火） 麦门冬（去心） 茯神（去皮）各一两二钱半 天门冬（去心） 龙齿 熟地黄（洗，酒蒸） 山药（姜汁制）各一两半 人参（去芦）半两 朱砂（细研为衣）半两 远志（去心） 甘草（炙）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心饭饮送下；温酒亦得，加至五十丸。

【功用】常服益精髓，养气血，悦色驻颜。

【主治】①《局方》丈夫、妇人心气不足，志意不定，神情恍惚，夜多异梦，忪悸烦郁；及肾气伤败，血少气多，四肢倦怠，足胫痠疼，睡卧不稳，梦寐遗精，时有白浊，渐至羸瘦。②《张氏医通》：心血虚少，惊悸颤振，夜卧不宁。

【备考】本方方名，《张氏医通》引作“平

补正心丹”。

19087 平补镇心丹

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】熟干地黄 生干地黄 干山药 天门冬 麦门冬（去心） 柏子仁 茯神各四两（一本七两） 辰砂（别研为衣） 苦梗（炒）各三两 石菖蒲（节密者）十六两 远志（去心，以甘草煮三四沸）七两 当归（去芦）六两 龙骨一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心饭饮吞下，温酒亦得，渐加至五十丸。宜常服。

【功用】益精髓，养气血，明视听，悦色驻颜。

【主治】丈夫、妇人心气不足，志意不定，神情恍惚，夜多异梦，忪悸烦郁，及肾气伤败。血少气多，四肢倦怠，足胫痠痛，睡卧不稳，梦寐遗精，时有白浊，渐至羸瘦。

19088 平补镇心丹

【方源】《医统》卷四十八引《局方》。

【异名】平补镇心丸（《风劳臆膈》）。

【组成】白茯苓 茯神 麦门冬（去心） 五味子各一两二钱半 车前子 远志（制） 天门冬（去心） 山药（姜汁炒） 熟地黄（酒浸）各一两半 酸枣仁（炒）三钱 人参 龙齿各二两半 朱砂一两半（另研极细为衣）

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，早、晚米饮或温酒送下。

【功用】常服安心神，益荣卫。

【主治】《医统》引《局方》：治心血不足，时或怔忡，夜多乱梦，如坠岸谷。②《风劳臆膈》：心悬如大饥之状者。

19089 平补镇心丹

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】桂圆肉十四两 龙齿（另研）二两 茯苓 远志 枣仁 茯神 肉桂 熟地 人参 黄耆 柏子仁（另研） 辰砂 阿胶 紫

石英各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸。

【主治】妇人怔忡惊悸，健忘。

19090 平肺宁嗽散

【方源】《痘疹正宗》卷下。

【组成】桔芩一钱 黄连八分 牛子一钱半 桔梗七分 甘草四分 贝母一钱（去心）

【主治】肺中余火未清，疹后余嗽。

【备考】本方方名，《治疹全书》引作“平肺宁嗽散”。

19091 平肺宁嗽散

《治疹全书》卷下。即《痘疹正宗》卷下“平肺宁嗽散”。见该条。

19092 平肺绿云散

《普济方》卷三十八。为《证类本草》卷十三引《经验后方》“绿云散”之异名。见该条。

19093 平症养脾丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草（炙）当归 川芎 陈皮 半夏曲 苍术（米泔浸，炒） 厚朴（姜汁炒） 柴胡 黄芩 猪苓 泽泻 草果 常山 青皮 辣桂 九肋鳖甲（酥炙）各等分

【用法】上为末，酒煮曲糊为丸，如麻子大。陈米汤送下。

【主治】①《幼科发挥》疟疾不问新旧。②《幼幼集成》：久疟体虚者。

【临证举例】疟疾 一儿岁半病疟，二日一发，久不愈，其儿黄瘦面浮腹胀，予用平症养脾丸治之，愈。

19094 平症养脾丸

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】当归身 人参 陈皮 青皮各一钱 黄芩 草果各二钱 煨南星一钱 白术五分 茯苓一钱 柴胡一钱五分 炙草五分

【用法】上为末，水糊丸，如黍米大。竹叶、炒米煎汤送下。

【主治】久疟连绵不退者，或二日一次，或三日一次。

19095 平疟第一方

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】橘红 茯苓 半夏（制） 灵仙各一钱 柴胡 苍术（米泔浸，炒） 厚朴（姜汁炒） 黄芩各八分 青皮 槟榔各六分 炙草三分 生姜三片

【功用】平胃消痰，理气除湿。

【用法】井、河水各一钟煎，饥时服。

【主治】疟疾。间日疟，三日疟，疫疟。

【加减】头痛，加白芷；无汗，加麻黄（去节）。只用一剂，仍去之。

【备考】轻者二剂即愈，若三剂后，病势减而未全愈，可再接再服二方。

19096 平疟第二方

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】生首乌三钱 陈皮 茯苓 柴胡 黄芩各八分 当归 白术（米泔浸，土炒） 灵仙各一钱 知母（去毛，盐水炒） 鳖甲（不见汤，醋炙，研末）各二钱 炙草三分 生姜三片

【用法】井、河水各一钟煎滚，加酒半钟，再滚，空心服。

【主治】疟疾。间日疟，三日疟，疫疟。

【加减】久疟，加蓬术一钱。

【备考】此方补泻互用，虚实得宜，即极弱人，缠绵重病，数剂后立有起色。疟止后再用第三方，补弱扶元。

19097 平疟第三方

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】人参 黄耆（蜜炙）各一钱二分 白术土炒 青蒿（子亦可） 知母 麦芽 当归（土炒）各一钱 陈皮 柴胡各八分 炙草三分 升麻（酒炒）四分 生首乌二钱 生姜三片 大枣二枚

【用法】水煎，半饥时服。

【主治】疟疾。间日疟，三日疟，疫疟。

【加减】无力用参者，重用耆、术。

【备考】三五剂元气充实，永不发矣。

19098 平胃二陈汤

《症因脉治》卷二。为原书同卷“二陈平胃散”之异名。见该条。

19099 平胃二陈汤

【方源】《一盘珠》卷四。

【组成】苍术 陈皮 甘草 厚朴（姜水炒）各一钱 白苓 半夏 山楂 神曲（炒）各八分

【主治】伤食腹痛，停痰咳嗽。

19100 平胃五苓散

《脉因证治》卷上。为《增补内经拾遗》卷三引《局方》“胃苓汤”之异名。见该条。

19101 平胃分消饮

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《集略》。

【组成】半夏 白术 陈皮 厚朴各一钱 黄连 青皮 枳壳各八分 甘草五分

【用法】上锉作一贴。加生姜五片，水煎服。

【主治】胃有痰火，吞酸嘈杂。

19102 平胃六一散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 滑石

【主治】外感中暑泄泻，胸次不舒。

19103 平胃正气丸

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】沉香末二两 赤茯苓十六两 江枳壳十二两 粉桔梗六两 宣木瓜十两 净柴胡四两 大腹皮五两 广木香十两 老檀香二两五钱 粉甘草一两五钱 香谷芽十五两 六神曲十五两 茅山术八两 葛根片八两 姜半夏十两 香白芷七两 西香薷五两 紫苏叶十两 土藿香十两 楂肉炭十二两 川厚朴十两

【用法】上为细末，水泛为丸，每丸重一钱。晒燥收藏，勿令泄气。每用二粒，先服一粒，开水送下。停六个时辰，再服一粒，即愈。

【主治】腹痛不止，肚内不舒，胸膈痞闷，一切时疫，及肝胃气痛。

19104 平胃四苓散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 白术 白茯苓 泽泻 猪苓

【主治】①《症因脉治》酒积，五更泄泻。②《伤寒大白》：中焦水饮痞塞混浊。

【加减】治酒积五更泄泻，应加干葛、黄柏、若胸次不宽，再加砂仁、白豆蔻。

19105 平胃生化汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】醋炒大黄三钱 厚朴一钱 川芎二钱 当归四钱 桃仁十粒 黑料豆一合 炮姜四分 炙甘草四分 麦芽三钱（炒）

【用法】加苏木五分，降香三分，水煎，加酒五匙冲服。

【主治】产后败血冲胃。

19106 平胃生漆丸

《医统》卷七十七。即《直指》卷二十五“生漆丸”。见该条。

19107 平胃加消汤

【方源】方出《得效》卷十四，名见《医林纂要》卷八。

【组成】平胃散一帖。

【用法】作两服。每服酒、水各一盏，同煎至一盏，却投朴消半两（研细），再煎三五沸，倾出，候微温服尽。其胎即化血水而下。

【主治】死胎不下。其证指甲青、舌青，胀闷甚者，口中极臭。

【方论选录】《医林纂要》：苍术燥湿，补肝，辛烈善行，去恶气，辟不祥，故可下死胎；厚朴降逆气，破宿血，攻坚消滞，本妊娠所忌，此下死胎，宜用之；陈皮，气行不滞，而后死胎可下；甘草，方多峻急，赖此补中而缓之；朴消咸以软坚，能化死胎，而补心滋阴，且在术、朴队中，自无伤于母气也。此方甚平，而下死胎甚效。

19108 平胃发表汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】羌活 柴胡 干葛 枳实 厚朴 半夏 广皮

【主治】胃家凝结，胃阳不得敷布作汗散邪，寒热身痛，胸满无汗。

【备考】原书卷三无广皮，有独活。

19109 平胃地榆汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十六。

【异名】平补地榆汤（《便览》卷三）。

【组成】苍术一钱 升麻一钱 黑附子（炮）一钱 地榆七分 陈皮 厚朴 白术 干姜 白茯苓 葛根各半钱 甘草（炙） 益智仁 人参 当归 曲（炒） 白芍药各三分

【用法】上作一服。水二盏，加生姜三片，枣子二个，煎至一盏，去滓，食前温服。

【功用】温中散寒，除湿和胃。

【主治】结阴便血。

【宜忌】慎言语，节饮食。

19110 平胃地榆汤

【方源】《金鉴》卷五十五。

【方药】苍术（炒） 陈皮 厚朴（姜炒） 甘草 地榆

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】便血。湿盛腹不痛者。

19111 平胃快斑汤

《种痘新书》卷十二。为《片玉痘疹》卷八“平胃快斑散”之异名。见该条。

19112 平胃快斑散

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【异名】平胃快斑汤（《种痘新书》卷十二）。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 羌活 防风 官桂 猪苓 白茯苓

【用法】水煎服。

【主治】痘起发之时，遇久阴雨，不能起发。

19113 平胃败毒散

《症因脉治》卷四。为原书同卷“败毒平胃散”之异名。见该条。

19114 平胃枳术丸

《济阳纲目》卷三十七。为《丹溪心法附余》卷七“平补枳术丸”之异名。见该条。

19115 平胃香连丸

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】陈皮 甘草 厚朴（姜汁炒）各二两 木香四两 苍术（米泔浸）二两 川连八两（分四制：甘草煎水、吴萸煎水、京酒、米醋各拌川连二两，晒干）

【用法】上为末，用炒神曲五两打糊为丸。每服一二钱，生姜汤送下。

【主治】水泻，痢疾。

19116 平胃保和汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】苍术 厚朴 广皮 甘草 莱菔子 山楂 麦芽 神曲 连翘

【主治】头痛，食积作痛者。

19117 平胃保和汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】苍术 厚朴 枳实 陈皮 莱菔子 山楂 香附各一钱 炙草五分

【主治】食积，心痛如有物不得下。

19118 平胃保和散

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】平胃散 保和丸

【用法】同研服。

【主治】痰凝食滞，项强而兼胸满口噤，介齿不语，脉滑有力者；及挟食外感，胸中凝结作痛，手不可近者。

19119 平胃前胡汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【异名】前胡汤（《普济方》卷二十四）。

【组成】前胡（去芦头） 人参 白茯苓（去黑皮） 附子（炮裂，去皮脐） 半夏（生姜汁浸一宿，并生姜汁杵令匀，焙干） 白术 枇杷叶（拭去毛） 厚朴（去粗皮，生姜汁涂，炙透） 诃黎勒（纸裹煨熟，去核）各一两半 槟榔（锉） 肉豆蔻（去壳） 陈橘皮（汤去白，焙） 干姜（炮） 甘草（炙）各三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜一枣大（切），大枣二枚（擘），同煎至七分，去滓，不拘时候温服。

【主治】脾胃冷热气不和。

19120 平胃调中散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】厚朴 广皮 香附 白豆蔻 益智仁 白茯苓 葛根 防风 苍术 生姜 山楂 半夏

【主治】妇人经正行，忽然呕吐，属胃虚；或客寒犯胃，或食后怒动肝气，展转不已，头晕，口干，四肢发热，经水或止或来。

【方论选录】是方朴、广、豆仁、香附、益智以温胃和中，生姜、半夏以止吐，山楂以消食，苍术以逐寒祛积，防风以祛风，茯苓以利水理胃，葛根为使，引以入阳明也。

19121 平胃敛阴汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】扁豆(炒，研)三钱 甘草一钱 麦冬一钱 牛膝一钱 白术八分 山药一钱半 葛根一钱 三七七分 白芍一钱 五味子(微炒，捣碎)三四分 当归一钱

【用法】加百草霜、发余、蒲黄(炒黑)各三分，药调服。

【主治】胃气上冲，脾不统血，致鼻衄而血多者。

【加减】如胃热，加石膏三五钱。

19122 平胃渗湿汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】苍术一钱半(炒) 厚朴一钱半(制) 猪苓一钱半 茯苓三钱 木香一钱半 陈皮一钱半 苍耳三钱(炒) 泽泻一钱半 甘草五分 茵陈三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【功用】调中渗湿。

【主治】湿郁发黄，小便不利，大便泄泻，脉缓涩者。

19123 平胃滋肾汤

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】熟地 元参 麦冬各八钱 石膏三钱 青蒿二钱

【用法】水煎服。

【主治】胃消。大渴多饮，嘈杂易饥，得食稍减。

19124 平胃蒜肚丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】猪猪肚一具(去脂膜，入大蒜装满，以线缝住，用冷水、热水各七碗，先将水烧滚，入肚，煮至水干为度，取出捣烂) 苍术 陈皮 厚朴各五两 川椒少许

【用法】上药同猪肚再捣至肚无丝，方可为丸，如梧桐子大。每服二钱，白汤送下。

【主治】脾泻水泻，便红下血。

19125 平顺清解饮

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【组成】桔梗 甘草 山楂 僵蚕 木通 连翘 红花 牛蒡 白芷 生地 炒占米百数粒

【功用】稍能清解。

【主治】痘至起齐，不犯气虚，无甚血热者。

19126 平险如意散

【方源】《白喉全生集》。

【组成】赤小豆四钱 大黄四钱 芙蓉叶四钱 文蛤三钱 四季葱三根 鼠粘三钱 燕子窝泥五钱

【用法】上为细末。将四季葱捣汁，以陈茶水、白酒各半调和，炒微热，敷颈项。

【功用】拔毒外出，消肿止痛。

【主治】白喉，内外俱肿急者。

19127 平惊通圣散

【方源】《医统》卷五十。

【组成】当归 人参 黄连 茯神 远志 甘草(炙)各三钱 石菖蒲 朱砂(另研)各二钱

【用法】上为细末。每服二钱，食后、临卧竹叶煎汤调下。

【主治】惊悸，怔忡，健忘。

19128 平喘固本汤

【方源】《中医内科学》引南京中医学院附属医院验方。

【组成】党参 五味子 冬虫夏草 胡桃肉 沉香 灵磁石 坎脐 苏子 款冬花

法半夏 橘红

【功用】补肺纳肾，降气化痰。

【主治】肺胀。肺肾气虚，喘咳有痰者。

19129 平喘祛寒散

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】人参 麦冬(去心) 肉桂 白术(蜜炙) 吴茱萸(炮)

【用法】水煎，微冷顿服。

【主治】少阴证三四日至六七日，忽然手足倦卧，息高气喘，恶心腹痛者。

19130 平安如意灵丹

【方源】《经验汇抄良方》卷上。

【组成】真蟾酥二两 茅术(米泔浸，晒) 三两三 明天麻(蒸晒) 麻黄(去根节，晒) 雄黄(水飞) 朱砂(水飞) 各三两三 六钱 锦纹大黄(六两) 甘草(去皮) 二两四钱 丁香六钱 当归三钱

【用法】上为细末，先用火酒化开蟾酥，略加糯米薄浆泛为丸，如萝卜子大，朱砂为衣。

【主治】霍乱吐泻，中暑头晕，绞肠腹痛，心口迷闷及胃气疼痛，寒热疟痢。

【宜忌】孕妇忌服。

19131 平肌贴瘰癧膏

【方源】《普济方》卷二九一。

【组成】灯心灰 乳香 黄丹 定粉各半两

【用法】上用麻油四两，煎成膏子。贴患处。

【主治】瘰癧。

19132 平补干地黄丸

《普济方》二二一。为《圣济总录》卷一八七“延寿丸”之异名。见该条。

19133 平补枸杞子丸

《普济方》卷二二四。即《圣济总录》卷一八五“枸杞丸”。见该条。

19134 平肝开郁止血汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】平肝止血汤(《辨证录》卷十一)。

【组成】白芍一两(醋炒) 白术一两(土炒) 当归一两(酒洗) 丹皮三钱 三七根三钱(研末) 生地三钱(酒炒) 甘草

二钱 黑芥穗二钱 柴胡一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人怀抱甚郁，口干舌渴，呕吐吞酸，而血下崩者。

【方论选录】方中妙在白芍之平肝，柴胡之开郁，白术利腰脐，则血无积住之虞；荆芥通经络，则血有归还之乐；丹皮又清骨髓之热，生地复清脏腑之炎，当归、三七于补血之中，以行止血之法。自然郁结散而血崩止矣。

19135 平肝顺气保中丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】香附米三两(童便浸三日，炒) 川芎二两 陈皮(去白) 三两三 白术四两(土炒) 厚朴一两 枳实二两(炒) 黄连(姜汁炒) 二两 神曲(炒) 二两 麦芽(炒) 七钱 木香三钱 梔子(姜汁炒) 一两 莱菔子(炒) 一两 半夏(姜汁炒) 一两半 白茯苓一两 砂仁(炒) 四钱 干生姜一两 山楂(取肉) 二两 青皮六钱(香油炒) 甘草(炙) 四钱

【用法】上为末，竹沥打神曲糊为丸，如绿豆大。每服百丸，饭后白滚汤送下，一日二次。

【功用】常服顺气和中，健脾开胃，进美饮食，化痰消滞，清火抑肝。

【主治】郁火伤脾，中气不运，胃中伏火，郁积生痰，致令呕吐，吞酸嘈杂，心腹胀闷。

19136 平肝清热代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】龙胆草六分 醋柴胡六分 川芎六分 甘菊一钱 次生地一钱

【用法】水煎代茶饮。

【主治】肝热上蒸，右耳堵闷。

19137 平补熟干地黄丸

《普济方》卷二二四。即《圣济总录》卷一八七“地黄煎丸”。见该条。

19138 平胃加桂枝生姜汤

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 桂枝 生姜 各等分 甘草减半

【用法】水煎服。

【主治】产后烦闷呕恶，腹满腹痛者，名为冲胃。

19139 平胃煮散加青橘皮方

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】厚朴（去粗皮，姜汁炙）五两 苍术（去粗皮，米泔浸一宿，焙）八两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）五两 甘草（炙）三两

【用法】上为散。每服三钱匕，水一盏半，加青橘皮末半钱匕，生姜三片，大枣二枚（擘），煎至一盏，去滓温服。

【主治】大病后，重之津液，及老人津液不足，大便秘涩。

灭

19140 灭火汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】玄参三两 沙参二两 白芥子三钱 茯苓一两 熟地一两 山茱萸五钱 麦冬五钱 北五味一钱

【用法】水煎服。

【功用】滋水救火。

【主治】中火。头面肿痛，口渴心烦，一旦猝中，手足抽搐，言语不出，口眼喎斜。

【方论选录】玄参能消浮游之火，况益之熟地、沙参、茱萸、麦冬、五味之类，纯是补水添精之味，自然水足而火衰，何必用风药以搜风哉！

19141 灭邪汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】柴胡一钱 茯苓二钱 当归一钱 黄芩一钱 麦冬二钱 射干一钱 桔梗二钱 甘草 半夏各一钱

【用法】水煎服。

【主治】忽感风邪，寒入肺经，以致一时喘急，抬肩大喘，气逆痰吐不出，人不能卧。

【方论选录】此方妙在用柴胡、射干、桔梗以舒发肺金之气；用半夏以祛痰，用黄芩以去火。盖外感寒邪，则内必变为热症。今用黄芩以清解之。然徒用黄芩，虽曰清火，转足以抑遏其火气。妙在用桔梗、射干、柴胡一派辛散之品，转足以消灭火邪，此急治之一法也。

19142 灭虫汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白术一两 槟榔二钱 史君子二十个 人参三钱 楝树根三钱 陈皮五分 神曲三钱 炙甘草二钱 黄连三分 百部一钱

【用法】水煎服。

【主治】寸白虫，蛔虫，虫积不散，腹痛肚疼，面黄肌瘦，盗汗淋漓，气怯身弱。

19143 灭毒丹

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白花蛇四寸（酥） 金头蜈蚣二条（煨） 全虫四个（酒浸炙后，去头足） 露蜂房一个 龟版一两（醋炙） 雄黄一钱 飞黄丹一钱 辰砂五分 槐花米五分 雨前细茶五分 麝香三分 孩儿茶五分

【用法】上为细末，以黄米饮为丸，如绿豆大，朱砂为衣。成人体壮者，每次五至十粒，白水送下，一日二次。体弱者酌减。

【功用】散风止痒，清血解毒。

【主治】寻常狼疮（流皮漏），慢性湿疹（顽湿），慢性溃疡（顽疮）。

【宜忌】孕妇禁服，胃弱者慎用。

19144 灭疥膏

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【异名】硫黄膏。

【组成】硫黄粉 石灰块各四两

【用法】以上药入沙锅内加水二升，共煮一小时，随煮随添水，并搅拌之，然后取下，用滤纸取 500 毫升，得深红色之澄明液，随即徐徐加入花生油，随加随搅至呈黄色之稠厚液，不现出红色水珠为止，并滴少许杏仁油

作为矫味剂。搽抹患处。

【功用】杀菌，消毒，止痒，灭疥。

【主治】不论轻重或经年不愈之干湿疥疮。

19145 灭痕散

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】密陀僧 乳汁

【用法】上为细末。以乳汁调涂疮上。其痕平白，黑色自退。

【主治】①《痘疹全书》：痘疮痂痕。②《幼幼集成》：痘痂落痂，肉凸凹紫黑。

19146 灭痕膏

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】白蜜一两

【用法】涂患处。

【主治】痘已愈，毒未全散，其痂已落尽，止有痂痕尚在，或黑，或凸凹，或抓成疮者。

19147 灭痕膏

【方源】《外科启玄》卷十二。

【异名】灭痕散（《理渝》）。

【组成】羊骨髓 轻粉一钱

【用法】上研匀。涂之。

【主治】痘已愈，毒未全散，其痂已落尽，止有痂痕尚在，或黑，或凸凹，或抓成疮者。

19148 灭痕膏

《外科启玄》卷十二。为《小儿痘疹方论》“韶粉散”之异名。见该条。

19149 灭痕丹

【方源】《疡医大全》卷十二。

【组成】轻粉 白附子 黄芩（微火略炒）白芷 防风各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸。于每日洗面之时多擦数次，临睡之时又重洗面擦之。

【功用】消痕灭痂。

【主治】肺风粉刺，痂。

19150 灭痂散

《得效》卷十一。为《小儿痘疹方论》“韶粉散”之异名。见该条。

19151 灭痂散

【方源】方出《痘疹心法》卷二十三，名见《景岳全书》卷六十三。

【组成】白芷 白附子 白僵蚕 麝矢白 密陀僧各等分

【用法】上为极细末。以水调搽。

【主治】痘后面痂。

19152 灭痂散

《痘疹传心录》卷十五。为《痘疹心法》卷二十二“灭痂救苦散”之异名。见该条。

19153 灭痂散

《理渝》。为《外科启玄》卷十二“灭痕膏”之异名。见该条。

19154 灭痂膏

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】矾石 安息香（一作女萎） 狼毒 乌头 羊脂 附子 野葛 白芷 乌贼骨 赤石脂 皂荚 干地黄 天雄 芍药 芎藭 大黄 当归 莽草 石膏 地榆 白术 续断 鬼白 蜀椒 巴豆 细辛各一两

【用法】上为末，以成煎猪脂四斤和药，以此为准，煎之三上三下，以好盐一大匙下之，膏成。须服者，与服之；须摩者，与摩之；若灭痂者，以布揩令伤，敷之；鼻中息肉，取如大豆纳鼻中；如瘀血，每服如枣核大，酒送下；痔漏，以绵裹如梅子纳下部；若中风，摩患上取愈；崩中亦纳；若灭痂，取少许和麝屎白敷之。腊日合之神效。

【主治】诸色痼肿恶疮，愈后有痂。

【宜忌】摩之忌近眼，服之忌妊娠人。

19155 灭痂膏

【方源】《证类本草》卷三引《崔元亮海上方》。

【组成】黄矾石（烧令汁出） 胡粉（炒令黄）各八分

【用法】上为细末。以腊月猪脂和，更研如泥。先取生布揩令痛，即用药涂五度。

【功用】灭痂。

【主治】《圣惠》：一切疮愈后，赤黑痂痕不灭，时复痒不止。

19156 灭痂膏

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】马齿苋自然汁一升 炼成猪脂一

两

【用法】上药相和，以慢火煎成膏。日夜涂疮痂上。

【主治】小儿伤寒热毒斑疮，疹豆疮愈后。其痂尤暗，或凹凸肉起。

19157 灭癰救苦散

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】灭癰散（《痘疹传心录》卷十五）、救苦灭癰散（《景岳全书》卷六十三）、渗湿救苦散（《金鉴》卷七十六）、救苦散（《梅氏验方新编》）。

【组成】密陀僧 滑石各二两 白芷半两

【用法】上为细末。湿则干掺之，干则好白蜜调敷。

【主治】痘疮痒破者。

丙

19158 丙丁丸

【方源】《续本事》卷一。

【组成】附子一个（九钱重者，炮） 川乌一个（七钱重者，炮） 当归二两（酒浸洗） 赤芍药五两 沉香半两 益智半两

【用法】上为细末，浸当归酒煮稀糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二十丸，渐加至三十丸，食前、空心盐酒汤送下；妇人淡醋汤送下。

【功用】生血养气，升降水火，化精补肾。

19159 丙丁散

《卫生总微》卷五。为《幼幼新书》卷十引《孔氏家传》“神曲饼子”之异名。见该条。

19160 丙丁膏

《幼幼新书》卷十。为原书同卷引《孔氏家传》“神曲饼子”之异名。见该条。

19161 丙字化毒丸

【方源】《疮疡经验全书》卷十三。

【组成】牛黄 珍珠各五分 犀角 瓜儿血竭 紫草 朱砂 雄黄 白鲜皮 乳香 月月红各一钱半 僵蚕 蝉衣 山甲各一钱三分 生生乳一钱 赤芍药二钱

【用法】上药各为末，用神曲末五钱，打稠

糊为丸，如梧桐子大，另研朱砂为衣。每早空心服十六丸，每晚空腹服十一丸，人参汤送下；龙眼汤亦可。

【主治】梅毒，心经内外前后形症。

【宜忌】切忌恼怒、焦躁、茶、酒。

19162 丙种宝月丹

【方源】《药庵医学丛书·论医集》。

【组成】白薇一两八钱 泽兰一两二钱 当归六钱 白芷九钱 卷柏二两 桂心一两五钱 薰本一两二钱 川芎六钱（酒洗） 石膏二两 桃仁一两五钱 麦冬一两二钱 人参九钱 蜀椒一两八钱（炒出汗） 茯苓一两二钱 橘皮三钱 炒车前一两八钱 蒲黄一两五钱 赤石脂六钱 紫石英三两 菴藟子二两 蛇床子六钱（炒） 覆盆子一两五钱 干地黄一两八钱 泡干姜一两八钱 白龙骨一两二钱 炙远志一两二钱 太乙余粮一两二钱 北细辛一两八钱

【用法】蜜为丸，如梧桐子大。每服两小粒，空腹开水送下，一日一次。病重者每日早晚各一次，亦每次两小粒，不可间断。

【功用】调经种子。

【主治】月经不调，经行腹痛，色黑不多，或色淡如黄水，或经来腥臭，或经来结块如猪肝，或腰痠带下，或白淫赤带；并治痞块，癥瘕，乳岩，颈癆等瘤疾。

正

19163 正一丹

《局方》卷五（吴直阁增诸家名方引铁瓮城八角杜先生方）。为《幼幼新书》卷九引《养生必用》“至圣来复丹”之异名。见该条。

19164 正元丹

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】附子（炮裂，去皮脐） 阿魏（醋化面和作饼，慢火炙）各一分 硫黄（研） 远志（去心） 沉香各半两 槟榔（炮，锉）二枚 木香 青橘皮（汤浸，去白，焙） 蜀椒（去目并合口，炒取红） 干姜（炮） 茴

香子(炒) 桃仁(去皮尖双仁,炒)各半两

【用法】上为末,酒煮面为丸,如梧桐子大,以丹砂为衣。每服十五丸至二十丸,食前温酒或盐汤送下。

【功用】补虚损,益气血,壮筋骨。

【主治】下经积冷。

19165 正元丹

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】附子 干姜 良姜 乌头各四两 胡椒 荜澄茄 人参 红豆蔻 白术 桂各一两(一方添赤石脂、诃子、川椒各一两,去桂)

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前米饮送下。

【主治】脾胃虚冷,寒湿久滞,心腹胀满,胁肋卒疼,吞酸气逆,呕吐清涎,风寒入腹,拘挛不得俯仰,痼瘕积聚,上下奔冲,泻滑肠,里急后重,手足厥冷,口中气寒,腹内虚鸣,腹胀泄注,及膈间停水,肋下饮癖,眩晕恶心,饮食不下。

19166 正元丹

【方源】《普济方》卷二二六。

【组成】黄精(拣净)一斤(锉) 苍术(去皮)一斤 北枣一斤

【用法】上药煮烂为度,漉出晒干,拣去枣子,将二味入青盐一两,小茴香二两,同炒香熟为末,却将枣肉为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒、盐汤任下。

【功用】开三焦,破积聚,消五谷,益子精,祛冷除风,令阳气入脑,补益极多。

19167 正元丹

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】香附一斤(同艾三两,先以醋同浸一宿,然后分开制之,酒、盐、酥、童便各制四两) 阿胶(蛤粉炒)二两 枳壳四两(半生,半麸炒) 怀生地(酒洗) 熟地(酒浸) 当归身(酒洗) 川芎(炒)各四两 白芍药八两(半生,半酒炒)

【用法】上为末,醋为丸,如梧桐子大。每服五六十丸,空心盐汤吞下。

【功用】调经种子。

【主治】女子不孕。

【加减】治带,加白茯苓、琥珀。

19168 正元丹

【方源】《医级》卷八。

【组成】故纸一两(酒浸) 茯苓(酒洗) 巴戟 芦巴各一斤 文蛤八两 茯苓六两 龙骨 朱砂各二两

【用法】上为末,蜜为丸。每服三十丸,空心温酒送下。

【主治】真气不足,遗精盗汗,目暗耳鸣,吸吸短气,四肢瘦损。

19169 正元丹

《古今医方集成》。即《张氏医通》卷十四引《制药秘旨》“正元散”。见该条。

19170 正元汤

《圣济总录》卷二十一。为《博济》卷一“正元散”之异名。见该条。

19171 正元汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】枇杷叶(拭去毛,炙) 桂(去粗皮) 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 陈橘皮(去白,焙)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,煎至六分,去滓热服,不拘时候。

【主治】霍乱吐利不止。

19172 正元汤

《兰室秘藏》卷下。为原书同卷“固真汤”之异名。见该条。

19173 正元汤

《血证论》卷七。为《张氏医通》卷十四引《制药秘旨》“正元散”之异名。见该条。

19174 正元饮

【方源】《校注妇人良方》卷四。

【组成】红豆(炒)二钱 人参(去芦)二两 附子(炮,去皮尖)一两 茯苓 甘草(炙)各二两 肉桂五钱 川芎 山药(姜汁

炒) 乌药 干葛各一两 白术二两 干姜(炮)三钱 黄耆(炙)一两半

【用法】每服三钱,加生姜、大枣,水入盐少许煎,送服,黑锡丹。

【主治】妇人下元虚败,痰气上涌,头目眩晕,脏腑滑泄,时或自汗,手足逆冷,霍乱转筋。

19175 正元饮

《证治宝鉴》卷十引《会心录》。为《景岳全书》卷五十一“贞元饮”之异名。见该条。

19176 正元散

【方源】《博济》卷一。

【异名】正元汤(《圣济总录》卷二十一)、正阳散(《东医宝鉴·杂病篇》卷二)。

【组成】麻黄(去节) 陈皮(去白,炙) 大黄(生) 甘草(炙) 干姜(炮) 茱萸 官桂(去粗皮) 芍药(生) 附子(炮,去皮脐) 半夏(汤洗七遍)

【用法】上十味,唯麻黄多于众药一倍,余药减用一半,同捣为末。每服一大钱,水一盞,加生姜三片,大枣一枚,煎至七分,热服。如出汗,须候汗干,可去盖覆。

【功用】解伤寒。

【主治】①《博济》:才觉伤寒,四肢头目骨节疼痛;或伤冷伤食,头昏气满,及心腹诸疾。②《圣济总录》:伤寒阴证,脉候沉细。

【加减】若患阴毒伤寒,更入退阴散半钱同煎。

【方论】《本事方释义》:麻黄气味辛温,入足太阳;陈皮气味苦辛微温,入手足太阴;大黄气味苦寒,入足阳明;甘草气味甘平,入足太阴,能缓诸药之性;干姜气味辛温,入手足太阴;肉桂气味辛甘大热,入足厥阴;白芍药味酸微寒,入足厥阴;附子气味辛咸大热,入手足少阴;吴茱萸气味辛热,入足阳明、厥阴;半夏气味辛温,入足阳明;生姜之辛温入卫;枣之甘平入荣。伤寒如觉风寒吹着,四肢头目骨节疼痛,或伤冷伤食,头昏气满及心腹诸疾,皆宜服之。此表里未清,

阳气先伤,故以大辛热之药护其阳,虽有辛温之达表,苦寒之直下,皆不为害矣。

19177 正元散

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】蓬莪术一两 金铃子(去核)一分

【用法】上为末,更加礞砂一钱,炼过,研细和匀。每服二钱,空心盐汤或温酒调下。

【主治】气不接续,气短,兼治滑泄及小便数。

19178 正元散

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】乌头四两 益智三两 干姜 青橘皮各二两 茴香一两

【用法】上为粗末。每服二钱,水一盞,入盐同煮至六分,食前服。

【主治】一切冷气。

19179 正元散

【方源】《三因》卷十。

【异名】生料正元饮(《医编》卷七)。

【组成】人参 白茯苓 白术各三两 黄耆一两半 甘草(炙) 乌药(去木) 山药(姜汁浸,炒) 附子(炮,去皮脐) 川芎 干葛各一两 桂心 乌头(炮,去皮尖)各半两 红豆(炒) 干姜(炮) 橘皮各三钱

【用法】上为末。每服二钱,水一盞,加生姜三片,大枣一个,盐少许,煎至七分,食前冷服。

【功用】助阳消阴,正元气,温脾胃,进饮食。

【主治】下元气虚,脐腹胀满,心胁刺痛,泄利呕吐,自汗,阳气渐微,手足厥冷;及伤寒阴证,霍乱转筋,久下冷利,少气羸困,一切虚寒。

19180 正元散

【方源】《张氏医通》卷十四引《制药秘旨》。

【异名】正元汤(《血证论》卷七)。

【组成】人参三两(用川乌一两,煮汁收入,

去川乌) 白术二两(用橘皮五钱, 煮汁收入, 去橘皮) 茯苓二两(用肉桂六钱, 酒煎收入, 晒干, 勿见火, 去桂) 甘草一两五钱(用乌药一两, 煎汁收入, 去乌药) 黄耆一两五钱(用川芎一两, 酒煎收入, 去川芎) 薯蓣一两(用干姜三钱, 煎汁收入, 去干姜)

【用法】上六味, 除茯苓, 文火缓缓焙干, 勿炒伤药性, 杵为散。每服三钱, 水一盏, 加生姜三片, 红枣一枚(擘), 煎数沸, 入盐一捻, 和滓调服。服后饮热酒一杯, 以助药力。

【主治】命门火衰, 不能生土, 吐利厥冷, 有时阴火上冲, 则面赤热, 眩晕恶心, 浊气逆满, 则胸肋刺痛, 脐腹胀急。

【备考】本方方名, 《古今医方集成》引作“正元丹”。

19181 正中丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】五灵脂 川乌头各半两 没药 胡椒各一分

【用法】上为细末, 醋煮面糊为丸, 如绿豆大。每服五七丸, 醋汤送下。

【主治】心气痛。

19182 正气丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】楝实(麸炒) 苍术(米泔浸一宿, 炒) 茴香子(炒) 蜀椒(去目并闭口者, 炒出汗) 各一两 石菖蒲 知母(焙) 各半两 附子一枚(大者, 炮裂, 去皮脐)

【用法】上为末, 醋煮面和为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心食前温酒送下; 妇人醋汤送下。

【主治】下元虚冷, 少腹疼痛, 小便滑数; 妇人血海虚冷, 经候不调。

19183 正气丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】茴香二两 良姜二两(清油炒黄) 甘草一两 盐二两

【用法】上为细末, 水浸蒸饼为丸, 如梧桐

子大。每服五十丸, 空心生姜、橘皮汤送下。

【主治】寒冷。

19184 正气丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】吴茱萸六两 桂四两 附子 干姜 厚朴 藜蘆 藜蘆茄各二两 细辛 川椒 当归各一两

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食前热米饮送下。

【主治】气弱, 中暴伤风冷, 胸膈痞闷, 呕吐清痰, 肋肋膨胀, 气逆不通, 噎噎吞酸, 不思饮食, 霍乱吐利, 心腹疼痛。

19185 正气丸

【方源】《活幼口议》卷十九。

【异名】香朴丸(《永类铃方》卷二十一)。

【组成】藿香叶 厚朴(生姜制) 陈皮 半夏曲(炙) 白术 白茯苓各一钱 甘草(炙) 二钱 干姜一钱 三棱(炮) 二钱

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如指大。每服一丸, 生姜、枣子汤化开与服。

【主治】婴孩小儿食伤, 瘴气逆不升降, 呕吐不已, 胸膈留停积滞不化; 或一向只作干呕, 啰声频作。

19186 正气丸

【普济方】卷一八四。为《博济》卷二“大阿魏丸”之异名。见该条。

19187 正气丸

【方源】《慈航集》卷上。

【组成】广藿香三十两(微炒) 紫苏二十两(微炒) 厚朴二十两(姜汁炒) 枳壳二十两(面炒) 小生地三十两(切片, 冷开水泡, 打烂) 木通十五两 赤芍二十两(炒) 玄参二十两(微炒) 生甘草五两(研) 陈皮十五两 制半夏二十两(姜汁炒) 赤苓二十两(炒) 草薢仁三十两(研, 炒) 麦芽三十两(炒) 山楂三十两(炒焦) 神曲三十两(炒) 独活十五两(酒炒) 山梔仁二十两(炒黑) 莱菔子三十两(炒) 制军十五两(酒炒)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每颗重四钱。照后症用汤头化服，大人一丸，小儿半丸。凡感冒伤风，恶寒头痛，遍身骨节痛，用煨老姜二钱，煎汤化下一丸，盖暖出汗即愈；凡霍乱吐泻，用煨姜二钱，灶心土三钱，煎汤化下一丸；凡疟疾，用煨姜三钱，大枣三枚，煎汤化下一丸，在疟未来之前早一时服；凡红痢，用金银花三钱，川连三分，煎汤化下一丸，腹痛加广木香一钱五分，同前煎服；凡白痢，用煨姜三钱，红砂糖三钱，煎汤化下一丸；凡瘟疫，用新汲井凉水化下一丸；凡斑疹，用生石膏五钱、生甘草八分，炒升麻八分，煎汤化下一丸；凡孕妇，用砂仁一钱五分、炒黄芩五分，煎汤化下一丸；凡产后，用当归八钱，川芎一钱五分，煎汤化下。

【主治】夏秋感受寒暑，伤风头痛，恶寒发烧，遍身骨节疼痛，霍乱吐泻，瘟疫疟痢，时毒斑疹，及四时不正之气。

19188 正气丹

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】硫黄（盞内熔成汁）三分 半夏（为末，姜汁作饼，晒干） 藿香叶各一两 水银（入硫黄汁内结沙子）一分 附子（炮裂，去皮脐）半两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，以丹砂为衣。每服二十丸至三十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】下虚阴阳错逆，霍乱吐逆，粥食不下。

19189 正气丹

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】硫黄 附子 干姜 桂各四两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前熟米饮送下。

【功用】温固精气，大益脾胃。

【主治】阴寒内盛，元脏不足，阳气暴脱，下焦伤竭，手足厥逆，战栗背寒，腰膝冷重，脐腹疼痛，大便滑泄，小便频数，行步息短，色泽枯悴，呕逆喘急，咳逆自汗，霍乱转筋，

寒疝；及伤寒阴盛，脉微欲绝。

19190 正气丹

【方源】《治症全书》卷十四。

【组成】红花 甘草 桔梗 人参 黄耆 橘红 蝉蜕 防风 嫩桃实

【用法】生姜、酒为引。

【主治】痘疮触犯者。

19191 正气汤

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】藿香叶 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 半夏（为末，生姜汁作饼，晒干） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，煎至七分，去滓，未发时并两服。

【主治】胃痞不食，支满腹胀，时作寒热。

19192 正气汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】正气散（《医统》卷五十一）。

【组成】黄柏（炒）一钱 知母（炒）一钱半 甘草（炙）五分

【用法】上为粗末，作一服。水二盞，煎一盞，卧时服。

【主治】盗汗。

【方论选录】《医方考》：阴虚，则阳独活，故令有汗。火益亢，则阴益亏。阴亏，则睡去之时，卫外之阳乘虚而入，卫虚无以固表，故令盗汗。经曰：壮水之主，以制阳光。故用黄柏、知母苦寒质润之品以主之，苦能泻火，寒能胜热，质润能滋阴；佐以甘草者，和其阴阳耳。

19193 正气汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】黄耆一两 人参 焦术各五钱 当归 川芎 苡仁 附子各三钱

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】中风脱证。

19194 正气汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】柴胡一钱 前胡一钱 川芎一钱 白芷一钱 半夏(姜制)一钱 麦冬(去心)八分 槟榔一钱 草果一钱 青皮(炒)一钱 茯苓八分 桂枝一钱 甘草(炙)八分 白芍(炒)一钱 陈皮八分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,大枣二枚,水煎,预先热服。

【功用】扶正祛邪。

【主治】虚弱人疟,头痛,自汗,寒热往来。

19195 正气汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】柴胡 前胡 川芎 白芷 半夏(姜炒) 麦门冬(去心) 槟榔 草果(去壳) 青皮(去瓢) 茯苓(去皮) 各一钱 桂枝 甘草各三分

【用法】上锉一剂,加生姜三片,大枣一枚,水煎,预先热服。

【主治】疟疾初发,憎寒壮热,头疼口干有汗。

【备考】《痢症纂要》有干葛,无麦门冬。

19196 正气汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】陈皮 苏叶 泽泻 山楂 苍术 各一钱 藿香 厚朴(姜汁炒) 半夏(姜矾制) 各一钱五分 甘草三分

【用法】加老姜五片,水煎服。

【主治】霍乱吐泻不住。

19197 正气汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】玄参一两 麦冬五钱 荆芥三钱 升麻八分 甘草 黄芩各一钱 天花粉三钱 蔓荆子五分

【用法】水煎服。

【主治】春温,头痛身热,口渴呼饮,四肢发斑,似狂非狂,似躁非躁,沿门合室彼此传染。

19198 正气汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】人参 当归各一两 肉桂 炮姜

各一钱 白术五钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】妇人产后气血两虚,正不敌邪,恶寒恶心,身颤发热,作渴。

19199 正气汤

【方源】《治痧要略》。

【组成】蚕沙一钱 香附七分 青蒿六分 陈皮五分 千金子 砂仁 薄荷各三分

【用法】水煎,微冷服。

【主治】痧因于触秽者。

19200 正气饮

【方源】《古方汇精》卷三。

【组成】荆芥(炒) 川芎各八分 当归 建曲 夏曲 赤芍各一钱五分 苍术(炒) 白术各二钱 橘红一钱 赤首乌三钱 枳壳六分(炒) 藿香叶五分 桂枝木四分(尖)

【用法】引加姜皮二分,葱白三寸,水煎,疟前服。

【主治】妊娠疟。

【加减】二剂后,疟发渐早渐轻,去葱白、桂枝、荆芥、枳壳、建曲、夏曲,加党参、大生地、法制半夏各三钱,柴胡六分,炙甘草八分,引去姜皮,换姜一钱五分。

19201 正气散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄三两(去根节) 桂心二两 甘草一两(炙微赤,锉) 干姜一两(炮裂,锉) 川大黄二两(锉碎,微炒) 青橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 吴茱萸一两(汤浸七遍,焙干,微炒) 厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,不拘时候热服。

【主治】伤寒,头目四肢疼痛。

19202 正气散

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】缩沙蜜(去皮,炒) 附子(炮裂,

去皮脐) 赤石脂 肉豆蔻(去壳) 龙骨 石榴皮(焙) 甘草(炙, 锉) 人参 地榆 白术 吴茱萸(汤浸, 焙干, 炒) 干姜(炮) 各一两

【用法】上为散。每服三钱匕, 煮粳米饮调下, 不拘时候。以止为度。

【主治】水泻腹痛, 日夜不止。

19203 正气散

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】京三棱一枚三分(紧小者, 猛火炮令中心存性, 纸裹一重, 净土埋一宿)

【用法】上为散。每服一字匕, 煨葱米饮调下, 不拘时候。

【主治】小儿癰疔, 及少阴受邪冷气滞。

19204 正气散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】厚朴 人参 甘草 半夏 陈皮 藿香各一两

【用法】上为粗末。每服二钱, 水一盞, 加生姜五片, 煎至六分, 去滓, 食前服。

【功用】调顺阴阳, 祛寒正气。

【主治】体虚客寒, 阳气内弱, 中焦不和, 寒热相搏, 头痛昏倦, 肢节烦疼, 痰逆恶心, 呕吐冷沫; 及八般疟疾, 山岚瘴气, 久不能除, 时作寒热; 或暴冷内伤, 霍乱吐利; 或气脉壅滞, 手足虚肿; 又治妇人但病头痛恶心, 五种膈气, 食饮不下。

19205 正气散

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】苍术五两(米泔浸一宿, 去粗皮) 陈皮四两(去白, 炒) 香附子(去毛, 炒) 益智(炒) 茴香(淘去沙, 炒) 甘草(炒) 各一两 麦芽(炒) 茯苓(白者, 去皮) 厚朴(去皮, 姜制, 炒) 草果子诃子(炮) 乌药 丁香皮 白姜(炮, 洗) 蓬莪术(炮) 三棱(炮) 青皮(去瓢) 良姜(炒) 人参(去芦) 各一两

【用法】上为细末。每服二钱, 水一盞, 加生姜三片, 枣子一枚, 盐少许, 煎七分, 食

前服。

【主治】脾肾虚弱, 气不归元, 腹急胀满雷鸣, 有时泄泻, 不思饮食。

19206 正气散

【方源】《局方》卷二(绍兴续添方)。

【组成】甘草(炒)七钱 陈皮 藿香(去梗) 白术各一两 厚朴 半夏各三两(同厚朴为末), 生姜四两研烂, 同为饼子, 微炒)(一方无白术)

【用法】上为细末。每服二钱, 加生姜三片, 大枣一枚, 水一盞, 煎至七分, 食前稍热服。治久患疟疾, 膈气心痛, 日进三服。

【功用】顺气宽中, 正气逐冷, 辟除瘟疫。

【主治】伤寒阴证, 憎寒恶风, 胸膈壅塞, 胁肋膨胀, 心下坚痞, 吐利, 呕逆酸水, 咳逆, 怠惰嗜卧, 不思饮食, 久患疟疾, 膈气心痛。

19207 正气散

【方源】《医方大成》卷二引徐同知方。

【组成】藿香四两 草果四两 半夏 陈皮 厚朴 缩砂 甘草各一两

【用法】上为锉散。加生姜、枣子煎, 温服。疟疾, 俟发日早服。

【功用】退寒疟, 止胃寒, 进饮食。

19208 正气散

【方源】《普济方》卷二五四。

【组成】麝香一钱 茯神 人参 天门冬(去心) 鬼臼 菖蒲各等分

【用法】上为末, 蜜为丸, 如梧桐子大。每服十丸, 温酒送下, 一日三次。

【主治】客忤, 心腹绞痛胀满, 气冲心胸, 烦躁壮热, 或气闷又刺痛。

19209 正气散

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】陈皮 厚朴 苍术 槟榔 肉豆蔻 大腹皮 麦芽 香附子 草豆蔻 秦艽 甘草

【用法】上咬咀。加姜钱、苏叶, 水煎服。

【主治】疟发后, 脾胃虚弱, 手足浮肿。

19210 正气散

《伤寒全生集》卷二。为《局方》卷二(续添诸局经验秘方)“藿香正气散”之异名。见该条。

19211 正气散

《奇效良方》卷六十四。为原书同卷“异功散”之异名。见该条。

19212 正气散

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】苍术 厚朴 川芎 柴胡 藿香 半夏 陈皮 甘草各等分

【用法】用水二钟,煎至八分,温服。汗出为愈。

【主治】伤寒感冒,中寒重者。

19213 正气散

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】苍术(米泔浸,麸炒)一钱五分 陈皮一钱 川厚朴(姜汁炒)一钱五分 藿香(去土)八分 甘草五分 半夏(姜汤泡)一钱 苏叶八分 香附米(童便浸,研)二钱 槟榔二钱

【用法】用水二钟,加生姜五片,煎至一钟,空腹服。如感瘴气,以槟榔顶尖者为粗末三钱,同煎服。泄气即愈。

【主治】山岚瘴气。

【加减】暑热,加香薷、黄连;寒凉,加木香 白豆蔻。

19214 正气散

【方源】《医部全录》卷四九〇引《幼幼全书》

【组成】甘草(炙)二分 陈皮 木香 苍术各五分 厚朴(姜制)二钱 麻黄一钱 官桂三分

【用法】水煎,温服。

【主治】①《医部全书》引《幼幼全书》:痘疹严寒凛冽,恐有寒病。②《幼幼集成》:痘疹初起,因伤于寒,作热无汗,头身痛,肢强。

【备考】《痘疹全书》本方用法,加生姜一片,大枣一枚,水煎服。

19215 正气散

《医统》卷五十一。为《兰室秘藏》卷下“正气汤”之异名。见该条。

19216 正气散

【方源】《慈幼心传》。

【组成】二陈汤加柴胡 干葛 紫苏 厚朴 青皮 槟榔 草果 山楂

【主治】疟母起初,先以此发散。

19217 正气散

【方源】《种痘新书》卷九。

【组成】藿香 陈皮 半夏 紫苏 大腹皮 厚朴 茯苓 木香 白芷 山楂 神曲 炙草 白芍

【主治】痘后腹痛,而吐泻交作者。

19218 正气散

【方源】《锦京直指》。

【组成】浙藿香三钱 制苍术三钱 猪苓三钱 延胡索三钱 广木香一钱 川朴一钱 姜夏二钱 赤苓三钱 生香附三钱 红藤五钱 老姜三片

【主治】六气杂扰,霍乱吐泻,痧暑腹痛。

19219 正气散

【方源】《温热经解》。

【组成】藿香一钱半 川朴一钱半 陈皮一钱半 茯苓三钱

【主治】秋令伏暑内蕴,泄泻者。

【加减】腹痛者,加建曲、麦芽、山楂、鸡内金、木香;呕吐者,加左金丸、六一散、竹茹;舌苔白腻者,加薏仁、砂仁、草果、苍术、建曲;舌苔黄腻者,加酒芩、滑石、竹叶、猪苓、白通草;口渴者,加竹叶心、荷叶边、青蒿、莲子心、连翘。

19220 正心丸

【方源】《医统》卷八十四引《大典》。

【组成】天门冬(去心) 益智仁各二两 赤黍米(去壳,微炒) 薏苡仁(炒)各四两 茯神(去木) 百合各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服九十丸,空腹白汤送下。

【功用】常服可以正心,并免妒忌之病。

19221 正心汤

【方源】《医统》卷四十九。

【组成】人参 茯神 当归(酒洗) 生地黄(酒洗) 各一钱 羚羊角(镑) 甘草(炙) 酸枣仁(炒, 研) 远志(去心) 各八分

【用法】上哎咀。水二盏, 加莲子七枚, 煎七分, 去滓, 入羚羊角末, 麝香一分和匀, 食后、临卧服。

【主治】①《医统》: 七情五志久逆, 心风妄言妄笑, 不知所苦。②《证治宝鉴》: 七情太过而癫者。

【备考】《证治宝鉴》无麝香, 水煎, 入铁锈水和服。

19222 正心汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参 熟地各一两 玄参 麦冬各二两 菖蒲一钱 白芥子三钱

【用法】水煎服。

【主治】心包之热, 身热发狂。

19223 正心汤

【方源】《医钞类编》卷十四。

【组成】生地 当归 茯神 远志 石菖蒲 胆星 枣仁 麦冬 郁金 五味 丹砂

【用法】水煎服。

【主治】癫病, 心血不足。

19224 正本丸

【方源】《医方类聚》卷九十四引《经验良方》。

【组成】益智仁四两(擘破) 盐二两

【用法】于瓷器内同炒令香熟, 筛出盐不用, 将益智仁研为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。却以白茯苓二两, 甘草一两研罗为末, 每以末二钱, 百沸汤调下, 不拘时候。

【主治】心气妄行, 流入肾经, 腰膝疼痛, 眼见黑花, 流入经络, 四肢疼痛, 或不能举动。

19225 正舌汤

《玉案》卷二。为《卫生宝鉴》卷八“正舌散”之异名。见该条。

19226 正舌散

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【异名】茯神散(《卫生宝鉴》卷八)、通神散(《普济方》卷九十二)

【组成】蝎梢(去毒)二钱半 茯神(去木, 锉, 微炒)一两 薄荷(焙)二两

【用法】上为末。每服一二钱, 温酒调下; 或以擦牙颊间亦好。

【主治】中风舌本强硬, 语言不正。

19227 正舌散

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【异名】正舌汤(《玉案》卷二)。

【组成】雄黄(研) 荆芥各等分

【用法】上为末。每服二钱, 豆淋酒调下。

【主治】中风舌强语涩。

19228 正舌散

【方源】《奇效良方》卷二。

【组成】蝎梢(去毒)二七个 茯苓一两

【用法】上锉, 分二帖。每帖水二盏, 加生姜五片, 大枣一枚(去核), 煮八分, 去滓, 不拘时服。

【主治】中风, 舌本强难转, 语不正。

19229 正舌膏

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】天麻(明大者) 白僵蚕(直者, 去丝炒) 大叶薄荷(鄂州者) 各半两 上好朱砂(飞研)一分(半入药, 半为衣) 麝香一钱(研) 脑子(少许)

【用法】上除研者外, 为末研匀, 炼蜜为丸, 如榛子大, 朱砂为衣。每服一丸, 薄荷汤化下, 时时服。

【主治】小儿风病搐搦, 机关不利, 吃乳难下, 至不能发声者。

19230 正阳丸

【方源】《圣惠》卷九。

【异名】正阳丹。

【组成】太阴玄精二两 消石二两 硫黄二两 硃砂一两

【用法】上为细末, 入瓷瓶子中, 固济, 以火半斤, 于瓶子周一寸煅之。约近半日, 候

药青紫色，住火，待冷即出。用腊月雪水，拌令匀湿，入瓷罐中，堂屋后北阴下阴干。又入地埋二七日，取出细研，以面糊为丸，如鸡头子大。先用热水浴后，以艾汤研下一丸。以衣盖，汗出为度。

【主治】伤寒三日，头痛壮热，四肢不利。

19231 正阳丸

《圣济总录》卷二十三。为《圣惠》卷十一“来苏丹”之异名。见该条。

19232 正阳丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】鹿茸（去毛，酥炙）二两 肉苁蓉（酒浸，切，焙）石南各一两 五味子 胡芦巴（炒）各三分 木香一两半 石斛（去根） 韭子（炒） 牛膝（酒浸，切，焙）各半两 巴戟天（去心） 附子（炮裂，去皮脐）各一两 白马茎（涂酥炙干）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒或盐汤送下。

【主治】阳气虚损，下元冷极，精泄不禁，小便频数，腰脚无力，饮食减少。

19233 正阳丸

《圣济总录》卷一八五。为《普济方》卷二二二引《博济》“正阳丹”之异名。见该条。

19234 正阳丹

《圣惠》卷九。为原书同卷“正阳丸”之异名。见该条。

19235 正阳丹

【方源】《普济方》卷二二二引《博济》。

【异名】正阳丸（《圣济总录》卷一八五）。

【组成】硫黄（研） 菖蒲（切） 天雄（炮裂，去皮脐） 阿魏（醋调，面和饼子，炙）各一两 沉香（锉） 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 草豆蔻（去皮） 干姜（炮） 桃仁（去皮尖双仁，炒） 槟榔（锉）各半两

【用法】上为末，再研令匀，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，盐汤送下。

【主治】脾元虚冷，心胸满闷，饮食减少，脐腹撮痛，面色黄黑，耳焦枯，阳事弱。

19236 正阳丹

《圣济总录》卷二十七。为《圣惠》卷十一“来苏丹”之异名。见该条。

19237 正阳丹

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】硫黄 阳起石 附子 干姜 桂胡芦巴 破故纸 金铃肉 茴香各一两 木香半两

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。朱砂为衣。每服三十丸，盐汤送下；妇人醋汤送下。

【主治】下部虚冷。

19238 正阳丹

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】宣州木瓜一斤（去皮核子，切碎，以童便、好酒各一斤，煮令烂，搅取汁）大豆一升 附子半两 人参一两 银朱一钱

【用法】上将三味为细末，与银朱一处研匀，用木瓜汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎椒仁、木香汤送下。

【主治】正水。脾肾虚弱，肾虚水不能蓄，水气扬溢，脾胃虚则不能制水，水气流散于经络，皮肤紧急无纹，足胫皆肿，小便不利，其人喘急，脉沉大而疾。

19239 正阳丹

《医学纲目》卷三十一。即《卫生宝鉴》卷十五“手阳丹”。见该条。

19240 正阳丹

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】苦参一斤（酒浆姜汁各浸一夜，晒干） 人参八两（酒浆浸，晒） 白蒺藜 犀角 石楠枝 乳香（去油） 没药（去油） 红花各二两 白僵蚕（炒）一两五钱 甘草五钱

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，茶、酒任下，一日三次。

【主治】血风，鹅掌，血痹，半肢软瘫，痒风、冷风、虾蟆风。

19241 正阳丹

【方源】《伏阴论》卷上。

【组成】龙齿六钱（生用） 丹砂一钱（明

亮如箭簇者真)

【用法】上为极细末。每用一钱，开水冲服。

【功用】辟阴正阳，安魂魄。

【主治】伏阴病，呕利止或未止，心中烦，喜热饮，时去衣被、而肢体若冰，与附子理中汤加童便，其烦不退者。

19242 正阳汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】附子(炮裂，去皮脐)一两 桂(去粗皮)三分 干姜(炮)半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞，煎至半盞，去滓，食前温服。

【主治】阴毒伤寒，上气喘促。

19243 正阳汤

【方源】《三因》卷五。

【组成】白薇 玄参 川芎 桑白皮(炙) 当归 芍药 旋覆花 甘草(炙) 生姜各半两

【用法】上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，去滓，食前服。

【主治】关节禁固，腰痛，气郁热，小便淋，目赤，心痛，寒热更作，咳喘，或鼻衄，啞咽吐饮，发黄疸，喘甚则连小腹，而作寒中。

19244 正阳散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】附子一两(炮裂，去皮脐) 皂荚一挺(去皮，涂酥炙令黄色，去子) 干姜一分(炮裂，锉) 甘草一分(炙微赤，锉) 麝香一钱(细研入)

【用法】上为细散。每服二钱，以水一中盞，煎至五分，不拘时候，和滓热服。

【主治】①《圣惠》：阴毒伤寒，面青，张口出气，心下硬，身不热，只额上有汗，烦渴不止，舌黑多睡，四肢俱冷。②《何氏济生论》：肾冷，阴痿缩。

19245 正阳散

《准绳·伤寒》卷四。即《卫生宝鉴》卷十五“手阳丹”。见该条。

19246 正阳散

《东医宝鉴·杂病篇》卷二。为《博济》卷

一“正元散”之异名。见该条。

19247 正阳散

【方源】《理瀹》。

【组成】麻黄(去节) 附子(炮) 干姜 半夏 吴萸 大黄

【用法】炒熨并缚脐。

【主治】阴症面唇指甲青黑，心下结硬，脐腹筑痛，身如被杖，甚或昏不知人者。

【方论选录】此方麻黄、大黄同用，汗下并行，其法甚捷。

19248 正金丹

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】附子(炮，去皮脐，酒浸三日，切，焙；如要速用，浸软，切，焙) 大乌头(如上制) 茴香 硫黄各二两 巴戟一两 干姜四两 肉桂十二两(取皮至味)

【用法】上为细末，淡面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前米饮送下。

【功用】补虚养气。

【主治】一切痼冷。

19249 正治汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参二钱 熟地 白术 炒枣仁 各五钱 麦冬三钱 茯苓一两 竹茹一钱

【用法】水煎服。

【功用】健脾胃，益心肾。

【主治】春月伤风，身热，下利六七日，咳而呕，心烦不得眠。

19250 正诚丹

【方源】《重庆堂随笔》卷上。

【异名】正诚露珠丹(《重订通俗伤寒论》)。

【组成】透明辰砂(研极细，每砂一两用甘草水一两煎汤飞净，去头底，晒干，再研再飞，三次为度) 赭猪心中血(丝绵绞去滓，凡砂一两用心血三个，每次一个，拌砂晒干，再拌再晒，三个用讫，再研极细末)

【用法】上以糯米糊为丸，每重七分，阴干得五分，瓷瓶密收。每临文应事或卧时，以一九噙化。

【主治】殚虑劳神，火升心悸，震惕不寐，遇事善忘。

19251 正经汤

【方源】《百一》卷十八。

【组成】熟干地黄半两 人参 桂心 半夏(汤洗七次) 白芍药 牡丹皮 阿胶 麦门冬 当归各二钱半 吴茱萸(汤洗七次)二钱

【用法】上为粗末。每服三钱，水一中盏，加生姜五片，煎至七分。

【主治】妇人诸虚不足，心腹痛者。

19252 正经汤

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】泽兰二钱 当归三钱 焦山梔四钱 阿胶(烊化)三钱 丹皮三钱 茜草一钱五分 益母草三钱 柴胡(醋炒)一钱 琥珀八分 左牡蛎五钱

【用法】加藕一斤，煎汤代水。

【主治】倒经。鼻衄，吐血。

19253 正胃汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】枇杷叶(拭去毛，炙) 桂(去粗皮) 厚朴(去粗皮，姜汁炙) 陈橘皮(去白，焙)各半两。

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加生姜三片，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】霍乱吐利不止。

19254 正胃汤

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《仙传济阴方》。

【组成】半夏一两 川芎四钱 旋覆花四钱 陈皮三钱 白茯苓半钱 丁香一钱

【用法】加生姜煎，空心服。

【功用】调经。

【主治】经候不调。

19255 正胃散

【方源】《百一》卷二。

【组成】白水牛喉一条(去两头节并筋膜脂肉，节节取下如阿胶片，黑牛不可用，须就

宰牛人买下修事了，临病时旋炙修合)

【用法】上喉节用好米醋一大盞浸，频翻令匀，微火炙干，再蘸再炙，醋尽为度，存性，不得见太阳火，为细末。每服一钱，食前用陈米饮调下。轻者一服见效。

【主治】翻胃呕逆，药食俱不下，结肠三五日至七八日，大便不通。

19256 正胃散

【方源】《普济方》卷三十六。

【组成】半夏二两 天南星二两

【用法】上为末，用水五升，入坛内与药搅匀，浸一宿，去清水，焙干，重研令细。每服二钱，水二盞，加生姜三片，煎至八分，温服。至五服效。

【主治】胃反。

19257 正胃散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】人参 白术 白茯苓 新会皮 木香 广藿香 淮山药 甘草 白扁豆 缩砂仁

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】小儿虚吐，脾胃怯弱，饮食不思，四肢困倦，面惨唇白，脉沉而细，关纹不明，吐夹清水而出，不治成慢惊。

19258 正骨散

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】苏木四两(细锉) 当归四两(洗，焙) 白蒺藜子二两 无名异一两 没药半两(别研) 乳香半两(别研)

【用法】上哎咀。每服三钱，水一盞，煎至半盞，去滓，再入酒半盞，和丸温服，不拘时候。

【主治】打扑伤折，筋挛骨损。

19259 正骨散

【方源】《医方类聚》卷一八八引《烟霞圣效》。

【组成】麻黄(去节) 木贼(去节) 甘草各等分

【用法】上为细末。每服三钱，热酒调下。

【功效】活血定痛，正骨续筋。

【主治】《普济方》：伤折骨损疼痛。

19260 正骨散

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】土鳖（大者）十个 母丁香一个（有窠者） 巴豆一粒（取霜） 没药一分 自然铜（煅，酒淬三次）一钱 麝香（取当门子一分）一粒

【用法】上为细末。每用一字，先以酒漱口，吐去，次以酒一口送药下，再咽一口。暖室住歇，以手扶损处。

【主治】跌打伤重，损折不能动履者。

19261 正真丹

【方源】《普济方》卷三十九引《余居士选奇方》。

【组成】硫黄一两（研） 陈皮半两（去白） 五灵脂一分

【用法】上先捣陈皮，次捣五灵脂、硫黄，同捣匀，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮送下。

【主治】老人气虚满闷，大便秘涩，连日不通，不敢服下药者宜服此。

19262 正真汤

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】附子（炮，去皮脐） 白茯苓（去皮） 人参（去芦） 沉香（不见火） 乌药 白豆蔻 白术各半两（炒）

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜五片，煎至七分，不拘时候服。

【主治】阴阳不和，气不升降，下元虚损，上焦痰滞。

19263 正笑丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】生枣仁三钱 黄连二钱 犀角屑五分 丹砂末一钱 丹皮三钱 生甘草一钱 麦冬三钱 茯神三钱 丹参二钱 天花粉二钱

【用法】水煎服。

【主治】心包火盛，无端大笑不止，或背人

处自笑，异于平素者。

19264 正容汤

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】羌活 白附子 防风 秦艽 胆星 白僵蚕 半夏（制） 木瓜 甘草 黄松节（即茯神心木）各等分

【用法】上锉剂。水二钟，加生姜三片，煎至八分，去滓，加酒一杯服之。

【主治】口眼喎斜，仪容不正。

19265 正容散

【方源】方出《本草纲目》卷三十，名见《金鉴》卷六十三。

【组成】樱桃枝 紫萍 牙皂 白梅肉

【用法】研和。日用洗面。

【主治】雀卵斑黥。

【备考】《医宗金鉴》本方用法：兑鹰粪白三钱共研。

19266 正容膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】蓖麻子五钱（去皮） 冰片六分

【用法】共捣成泥。敷于患处，左喎敷右，右喎敷左。

【主治】面风，偏风失音，口噤，口目喎斜。

19267 正脘散

【方源】《济阴纲目》卷七。

【组成】白术 川芎 木香 槟榔 甘草 各七钱半 大腹皮 紫苏 木瓜 陈皮 沉香 独活各一两

【用法】上咬咀。每服三钱，水煎，食后服。

【主治】中焦虚痞，两胁刺痛，面目手足浮肿，大便秘涩；兼治脚气。

19268 正液丹

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】白附子一分（生用） 赤箭一分 白僵蚕一分（生用） 膩粉一分

【用法】上为末，入膩粉同研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。一二岁每服三丸，三四岁每服五丸，以熟水送下，一日二三次。

【主治】小儿慢惊风，及天吊，热疳，心胸惊悸。

【备考】本方方名,《普济方》引作“玉液丹”。

19269 正脾丸

【方源】《普济方》卷二十引《卫生家宝》。

【组成】大草果子一个(钻七孔,入丁香七粒,用面裹,以巴豆七粒,分十四片,贴在面外,再以面裹,煨焦赤,去面与巴豆不用)

【用法】取草果子、丁香为末,枣肉为丸,如绿豆大。每服十丸,淡姜汤送下,不拘时候。

【主治】脾痛经久,诸药不效者。

19270 正脾散

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】蓬莪术(炮,切) 香附子(炒) 茴香(炒) 陈橘皮(去白) 甘草(炙)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,煎灯心、木瓜汤调下。

【主治】①《杨氏家藏方》:大病之后,脾气虚弱,中满腹胀,四肢虚浮,状若水气。②《医学正传》:产后通身浮肿。

19271 正脾散

【方源】《普济方》卷二十二引《卫生家宝》。

【组成】紧实大苍术一斤(米泔浸一宿,去皮,薄切,焙干秤) 粉草二两 南木香一两(不见火) 桂心一两(去粗皮,不见火) 吴白芷一两 粉姜一两 益智仁一两 陈橘皮二两(去瓢) 荆南茴香一两

【用法】上为细末。每服一大钱,水一中盏,紫苏二叶或枣子一个,同煎至七分,入盐少许,食前通口吃,一日三次。如大便壅秘,则食后以青木香丸服,得脏腑气快为妙。

【功用】调脾养胃顺气,进饮食。

【主治】倦怠腹痛,酒后数圉如痢,气泻脾疼,及崩外瘵症。

19272 正脾方

【方源】《千金翼》卷十二。

【组成】春桑耳 夏桑子 秋桑叶各等分

【用法】上为末。以水一斗,煮小豆一升,令大熟,以桑末一升和煮微沸,着盐豉服之,一日三次。饱服无妨,三日外稍去小豆。

【功用】轻身,明目,益智。

19273 正颜丹

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】白芷二两 独活二两 薄荷一两

【用法】上为细末,蜜为丸,如弹子大。每服一丸,细嚼,茶清送下。

【主治】口眼喎斜。

19274 正翻散

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】石膏五钱(煨) 梔子(生)一两 甘草(生)三钱 防风二两(酒拌,炒) 豨莶草四两(酒润,晒干)

【用法】上为细末。壮人每服二钱,弱人一钱,小儿六七分,白滚水调下。

【主治】眼皮外翻,如舌舐唇之状。

19275 正元煮散

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】楝实(取肉,炒) 木香 桂(去粗皮)各半两 甘草(炙)一两 茴香子(炒)一分

【用法】上为散。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,临熟入盐少许温服;温酒调服亦可。

【功效】补虚。

【主治】小肠气。

19276 正气煮散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】青州枣 厚朴(去粗皮,姜汁浸一宿,炒) 甘草各一斤 陈皮(去白) 干姜各六两

【用法】上将厚朴、生姜同捣,盛瓷器中,将干姜为粗末,掺厚朴上罨一宿,次日先将罨厚朴同陈皮入锅内,水煮干,次将枣子甘草入锅内,将煮药抄在上,再入水煮干,晒干,再焙为细末。每服二钱,水一盞,煎至七分,空心、食前温服;入盐沸汤调下亦可。

【功用】常服令人气爽，饮食易消，积滞皆化。

【主治】气不和，五脏停滞，不美饮食，伤寒岚毒，诸般泻痢。

19277 正风髓丹

【方源】《元戎》卷十。

【异名】封髓丹（《古今名医方论》卷四）、风髓丹（《医钞类编》卷十四）。

【组成】黄柏（炒）二两 缩砂一两 甘草半两

【用法】酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，早晨温酒送下。

【功用】泻相火，益肾水。

【主治】①《赤水玄珠》：心火太盛，阳狂不已。②《医钞类编》：火强久旷，梦遗胃弱，不宜苦寒者。

【方论选录】《古今名医方论》：方用黄柏为君以坚肾，肾取得坚，则阴水不虞其泛溢，寒能肃清，则龙火不至于奋扬，水火交摄，精安其位；佐以甘草，以甘能缓急，泻诸火与肝火之内烦，且能使水土合为一家，以妙封藏之固；缩砂以其味辛性温，善能入肾，通三焦，达津液，能纳五脏六腑之精而归于肾，肾家之气纳。肾中之髓自藏矣。此有取于封髓之意也。

【备考】《古今名医方论》本方用法：蜜糊为丸。每服三钱。

19278 正骨烫药

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】当归 羌活 红花 白芷 乳香 没药 骨碎补 川断 防风 木瓜 川椒 透骨草各四钱

【用法】上药装入布袋，放在蒸笼内蒸热后，敷在患处。

【功用】活血舒筋。

【主治】跌打损伤。

19279 正柴胡饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡一至三钱 防风一钱 陈皮

一钱半 芍药二钱 甘草一钱 生姜三五片

【用法】水一钟半，煎七八分，热服。

【主治】外感风寒，发热恶寒，头疼身痛，或痰疟初起。

【加减】头痛者，加川芎一钱；热而兼渴者，加葛根一二钱；呕恶者，加半夏一钱五分；湿甚者，加苍术一钱；胸腹有微滞者，加厚朴一钱；寒气胜而邪不易解者，加麻黄一至三钱（去浮沫）服之，或苏叶亦可。

19280 正铁箍散

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】贝母（去心） 白芷 苍耳草灰（醋拌晒干）各二两

【用法】上为细末。水调或香油调，贴疮上。

【主治】痈疽无头起者。

【加减】或加龙骨二钱尤妙。

19281 正气人参膏

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】人参 干木瓜 甘草（锉，炒）各半两 陈橘红 罂粟米（炒） 干姜（炮） 茯苓各一分

【用法】上为末，炼蜜和膏。每服一皂子大，米饮化下。

【功用】止烦渴，调脾胃，进饮食。

【主治】小儿脾胃气虚，中寒腹痛，泄利呕逆，不入乳食，夜哭，睡中多惊，吐利蛔虫，虚烦闷乱。

19282 正气三和散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】干紫苏叶一两 干木瓜一分 木香 丁香各半两 羌活三两 白豆蔻 草果 川芎 川姜 白术 赤茯苓 青橘皮 木通 槟榔 陈橘皮 藿香叶各半两 人参二两 红豆一分 甘草二两 大腹子 缩砂 香附子 天台乌药 肉桂各一两 沉香半两（勿用火，一方用二两）

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，肥枣一个，同煎至八分，不拘时候温服。如不及煎，每服一钱，盐一捻，沸

汤点下。

【功用】调顺三焦，温养四体，和顺胃气。

【主治】血气不和，上盛下虚，阴阳不升降，心胸痞闷，两肋膨胀，情思不乐，饮食无味，口苦舌粗，四肢倦困，脚手痠疼。

19283 正气天香汤

《医学正传》卷四。即《医学纲目》卷四引河间方“正气天香散”改为汤剂。见该条。

19284 正气天香散

【方源】《医学纲目》卷四引河间方。

【组成】乌药二两 香附末八两 陈皮苏叶 干姜各一两

【用法】上为细末。调服。

【主治】①《医学纲目》：九气。②《玉机微义》：妇人一切气，气上凌心，心胸攻筑，胁肋刺痛，月水不调。

【方论选录】《医林纂要》：香附理肝郁之郁，行血中之气；乌药苦涩，能坚肾水、补命火，温下焦，而去冲任之沉寒痼冷，破土郁，行肝气；陈皮佐乌药以理气；苏叶辛温表散外淫之风寒燥湿，舒散肝郁，而色紫兼入血分，大能调理经血，但其性过于疏散，此用以佐香附；姜性行，而干姜能守，守者为行之本，此专以补肝理冲任。此调经而专入气分之药，以肝气不郁，则经血自调也。

【备考】本方改为汤剂，名“绀珠正气天香汤”（《玉机微义》）、“正气天香汤”（见《医学正传》）。

19285 正气天香散

【方源】《证治宝鉴》卷五。

【组成】干姜 沉香 苏叶 乌药

【主治】妇人性执，气痛。

19286 正气太平丸

【方源】《慈航集》卷上。

【组成】当归三十两（酒炒） 白芍三十两（酒炒） 枳实二十两（麸炒） 薄荷十五两（微焙） 广藿香三十两（酒炒） 青皮二十两（炒） 紫苏二十两（微炒） 甘草五两（生炒） 厚朴二十两（姜汁炒） 山楂三十

两（炒） 麦芽三十两（炒） 槟榔二十两（炒） 草薢仁三十两（炒） 制半夏二十两（姜汁炒） 神曲三十两（炒） 柴胡十二两（炒） 莱菔子三十两（炒） 山梔二十两（姜汁炒） 黄芩十二两（酒炒） 制军十二两（酒炒） 车前子二十两（盐水炒） 木通十五两（炒）

【用法】以上药如法炮制，各研净细末分两，炼蜜为丸，每颗重四钱。大人一丸，小儿半丸，照后汤头煎汤送服。感冒伤风，头痛恶寒发烧，遍身骨节疼痛，用煨姜三钱、葱头三枚煎汤化服一丸，盖暖出汗即愈；霍乱吐泻，用煨姜三钱、灶心土三钱，煎汤化服一丸；疟疾，用煨姜三钱、大枣三枚，煎汤化服一丸，在疟未来之前早一时服；红痢，用金银花三钱、炒地榆炭二钱，腹痛加广木香一钱五分，煎汤化服一丸；白痢，用大枣三枚、煨姜二钱、红砂糖三钱，煎汤化服一丸；瘟疫，用薄荷八分、赤饭豆五钱、炒柴胡五分，煎汤化服一丸；斑疹，用玄参五钱，知母二钱，炒升麻一钱，煎汤化服一丸；孕妇，用当归五钱，炒黄芩八分，砂仁一钱五分，煎汤化服一丸；产后，用当归八钱，炮姜八分，益母草三钱，煎汤化服一丸。

【主治】夏秋感受寒暑，伤风头痛，恶寒发烧，遍身骨节疼痛，霍乱吐泻，瘟疫疟痢，时毒斑疹，四时不正之气。

19287 正气回生汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参七钱 白术五钱 茯苓五钱 甘草一钱 陈皮一钱 附子一钱 半夏三钱 南星三钱

【用法】水煎服。

【主治】中气。

19288 正气快斑汤

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【组成】羌活 苍术 甘草 防风 干葛 当归 桔梗 白芷 川芎

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】痘疹失于调护，为寒凉所郁不能起发者。

【加减】冬月，加官桂。

19289 正气补虚汤

【方源】《得效》八。

【组成】人参 藿香叶 厚朴（去粗皮，姜汁炒） 黄耆各二两 交趾桂一两 川白芷二两 大当归（去尾）二两 五味子 白术各一两 半夏 绵附子（炮）各一两 熟地黄（酒洗，炒） 川芎 白茯苓各二两 丁香 南木香 干姜 甘草各一两

【用法】上锉散。每服三钱，水一盞半，加生姜三片，枣子二枚，水煎，空心温服。

【主治】忧患思虑，喜怒不常，失饥劳力，或饮食不调，肌肉减耗，荣卫虚弱，外邪所袭，入于经络，头痛昏闷，拘挛，身疼腰倦，脚弱转筋，自汗，手足冷，四肢麻痹，五脏诸虚百病。

19290 正气和解汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】藿香 白术 厚朴 陈皮 半夏 茯苓 白芷 桔梗 大腹皮 苏叶 甘草 柴胡 干葛

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】时气憎寒发热。

19291 正气活命散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】大附子 藿香叶 半夏 丁香 枇杷叶 人参 厚朴各一两 桂半两

【用法】上为粗末。每服一钱，水一盞，加生姜一分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】下虚中满，真气上逆，霍乱吐泻，不下饮食。

19292 正气宽中散

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】藿香 白术 厚朴 陈皮 半夏 茯苓 白芷 桔梗 大腹皮 苏叶 甘草 枳实 青皮

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】藿香正气散证兼心下痞。

19293 正气调胃散

【方源】《活幼口议》卷十六。

【组成】厚朴一两（生姜和皮二两捣，压钵中一二宿，常翻转，取二日干，慢火炒） 半夏一两（洗去滑七次） 白扁豆（炒） 藿香叶 陈皮各一两 甘草（炙） 薏苡仁（炒） 白茯苓 白术各半两

【用法】上为末。每用一钱匕，水一小盞，加生姜二小片，枣子一个，同煎服。

【主治】婴孩小儿八种虚痢作热，或吐或泻，发热霍乱，上下气不复常，心虚烦闷。

19294 正气趋痛散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】肉桂 干姜 蓬术 归尾 川芎 白芷 乌药 元胡索 防风 独活 半夏 红花 白术 青皮

【主治】产后血块筑痛。

19295 正气温中汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】藿香 白术 厚朴 陈皮 半夏 茯苓 白芷 桔梗 大腹皮 苏叶 甘草 干姜 桂心

【用法】水煎服。

【主治】夏月受寒腹痛者。

19296 正阳茴香丸

【方源】《普济方》卷一三五。

【组成】茴香子（微炒） 附子（炮裂，去皮脐） 天南星（炮裂） 硫黄（细研） 丁香 木香 吴茱萸（汤洗七遍，焙干微炒） 预知子 桂心各一两

【用法】上为末，和研了药令匀，醋煮面糊为丸，如弹子大。每服一丸，研碎，炒生姜热酒送下，良久煎葱白艾汤投之，不拘时候频服。

【主治】阴毒伤寒，四肢逆冷，心下痛硬，气欲绝者。

19297 正诚露珠丹

《重订通俗伤寒论》。为《重庆堂随笔》卷

上“正诚丹”之异名。见该条。

19298 正经四物汤

【方源】《女科旨要》卷三。

【组成】当归 白鸡冠花各五钱 白芍 白术 香附(炒)各四钱 熟地 川芎 人参 阿胶(炒) 茯苓 侧柏叶(炒) 枣仁 陈皮(去白) 炒蒲黄各二钱 炙甘草一钱

【用法】分六帖。加生姜三片，水煎服。

【主治】产后气血大虚，脾胃又弱，以致荣卫衰败，突然下血成片，相似血崩者。

19299 正经养血汤

【方源】《女科秘要》卷八。

【组成】白芍(酒炒) 当归(酒洗) 茯苓 白术(土炒) 阿胶(蛤粉炒)各二钱 炙草 川椒(炒) 五味子各一钱 姜半夏 人参各七分 柴胡八分 姜三片

【用法】水煎，食前稍热服。

【功用】益血养血，补脾胃。

【主治】月经不调。

【加减】五心烦热，日晡潮热，加胡连五分；不思饮食，加神曲、麦芽(炒)各五分；头痛，加川芎七分。

19300 正骨顺气汤

【方源】《接骨图说》。

【组成】当归 川芎 白芍药 苍术 厚朴 茯苓 半夏 白芷 枳壳 桔梗 干姜 桂枝 麻黄 甘草 羌活 蜜香

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】诸般打扑伤损。

19301 正骨紫金丸

《中药制剂手册》。为《金鉴》卷八十八“正骨紫金丹”之异名。见该条。

19302 正骨紫金丹

【方源】《金鉴》卷八十八。

【异名】正骨紫金丸(《中药制剂手册》)。

【组成】丁香 木香 瓜儿血竭 儿茶 熟大黄 红花各一两 当归头 莲肉 白茯苓 白芍各二两 丹皮五钱 生甘草三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三钱，

童便调下；黄酒亦可。

【主治】跌打扑坠闪错损伤，并一切疼痛，瘀血凝聚。

19303 正料生犀散

《济阳纲目》卷六十五。为《得效》卷八“生犀散”之异名。见该条。

19304 正料治中汤

《直指》卷二十六。为《普济方》卷二〇六引《指南方》“二陈汤”之异名。见该条。

19305 正料消风散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】前胡 芎蒭 白茯苓 甘草 防风 荆芥 羌活 僵蚕 蝉退 厚朴 人参 合香

【用法】水煎服。

【主治】胎风赤烂外障。

19306 正元草澄茄汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】草澄茄 沉香(锉) 石斛(去根)各一两 人参 赤茯苓(去黑皮) 五味子(微炒) 巴戟天(去心) 桂(去粗皮) 白术 芎蒭 木香各三分 肉豆蔻(去壳) 附子(炮裂，去皮脐) 没药各半两 陈曲(炒)一两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，大枣二枚(擘)，同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】脾脏冷气攻心腹疼痛，闷乱烦懊，手足厥冷，呕吐痰逆，不下饮食。

玉

19307 玉饮

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】真玉十两 粟谷一升

【用法】以水一斗，煮粟谷取汁五升，去粟谷澄滤却，以此汁煮玉至三升，旋分呷服之。

【功用】镇心神。

【主治】虚劳烦渴。

19308 玉女英

【方源】《百一》卷十。

【异名】滑粉散(《中医皮肤病学简编》)。

【组成】绿豆粉四两(微炒) 滑石半两(研)

【用法】拌匀如粉。绵扑子扑之。

【主治】夏月痱子痒痛。

19309 玉女英

【方源】《百一》卷十。

【组成】青蒿汁 蛤粉

【用法】新汲水搽青蒿汁调蛤粉。敷之。雪水尤妙。

【主治】夏月痱子痒痛。

19310 玉女砂

【方源】《朱氏集验方》卷八引许德修方。

【组成】辰砂八两或六两或十两(夹绢袋盛,若块大打令稍小,惟红者为上,若添砂添药)金毛狗脊(去毛) 吴茱萸 菟丝子 杜仲 瓦松(古屋瓦上青毛,焙干去土) 熟地黄 五味子 人参 肉豆蔻(面包煨) 桑寄生 川草薢 芍药 巴戟(去心) 黄耆 牡丹皮(去心) 肉苁蓉 当归 茯神(去木) 茴香(洗) 远志(去心) 山茱萸(去核)各一两

【用法】上药装在一斗瓶内,着童子小便五七升,将砂袋悬胎挂瓶中,如煮酒法,于锅内着水,亦悬药瓶于锅中,桑柴或间松柴煮五日夜,火不要急,小便不住讨添,煮令干,日足取出,将砂袋以温水涤十余次。又换温水浸半日,弃药不用,辰砂又洗三两次,糯米团子和丸。每服五丸至十丸,空心枣汤送下。

【功用】暖下元,固阳气,暖宫肾。

【主治】男子妇人诸虚百损,产后诸虚,虚病寒热,自汗盗汗。

19311 玉女粉

【方源】《医方类聚》卷八十一引《居家必用》。

【组成】益母草灰不拘多少

【用法】糯米粥搜和为团,炭火煨通红,离火俟冷,研细;再粥搜团,煨之,以雪白为

度。

【主治】黠野风刺。

19312 玉女散

【方源】《本事》卷九。

【组成】川乌(去皮脐,冷水浸七日后,薄切,晒干,纸袋盛)

【用法】碾末,每用一大钱,入盐一小钱,水一盞半,煎至七分,通口服。压下阴毒,所注如猪血相似。未已,良久再进一服。

【主治】阴毒气上攻,腹痛,四肢逆冷,恶候。

19313 玉女散

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】川乌一两(火炮,去皮脐)

【用法】上为细末。每服一钱或半钱,水一盞半,加生姜七片,大枣一枚,煎至四分,温服,不拘时候。

【主治】伤寒汗后,潮热日发,诸药不效。

19314 玉女煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生石膏三五钱 熟地三五钱或一两 麦冬二钱 知母 牛膝各一钱半

【用法】水一钟半,煎七分,温服或冷服。

【主治】水亏火盛,六脉浮洪滑大,少阴不足,阳明有余,烦热干渴,头痛牙疼,失血。

【宜忌】大便溏泻者,乃非所宜。

【加减】如火之盛极者,加梔子、地骨皮之属;如多汗、多渴者,加北五味十四粒;如小水不利,或火不能降者,加泽泻一钱五分,或茯苓亦可;如金水俱亏,因精损气者,加人参二三钱尤妙。

【方论选录】①《寒温条辨》:熟地、牛膝补肾水之不足;石膏、知母泻脾土之有余;而金则土之子,水之母也,麦冬甘以补肺,寒以清肺,所谓虚则补其母,实则泻其子也。②《医学举要》:阳明、少阴二经,皆是津液所关;阳明实则火炽而津液涸,少阴虚则水亏而津液亦涸。考两经合治之方,仲景猪苓汤养阴而兼利水;景岳玉女煎养阴而兼清火。盖

白虎汤治阳明而不及少阴，六味地黄汤治少阴而不及阳明。是方石膏清胃，佐知母以泻肺气，实则泻其子也；熟地滋肾，佐麦冬以清治节，虚则补其母也；牛膝入络通经，能交和中下，尤为八阵中最上之方。③《成方便读》：人之真阴充足，水火均平，决不致有火盛之病。若肺肾真阴不足，不能濡润于胃，胃汁干枯，一受火邪，则燎原之势而为似白虎之证矣。方中熟地、牛膝以滋肾水，麦冬以保肺金，知母上益肺阴，下滋肾水，能治阳明独胜之火，石膏甘寒质重，独入阳明，清胃中有余之热。虽然，理虽如此，而其中熟地一味，若胃火炽盛者，尤宜斟酌用之，即虚火之证，亦宜改用生地为是，在用方者神而明之，变而通之可也。

【临证举例】①牙痛 《广东医学》(祖国医学版)(1966; 1: 19): 本方加味治疗胃火牙痛，处方：生石膏五钱(打碎)，生地五钱，麦冬三钱，知母三钱，防风二钱，牛膝三钱，竹叶二钱，淮山药五钱。红肿甚者，加重石膏用量；蛀牙，加细辛一钱，乌梅一钱。作者认为，玉女煎原为张景岳治疗吐血冲气上逆之方，清代王士雄用以治疗阴虚胃火炽盛之齿痛，颇具疗效。故守其意，原方加竹叶、防风清散风热之品，则消肿之力更强，加怀山药养阴清火；蛀牙加细辛、乌梅，取其辛通酸敛而止痛。②三叉神经痛 《新医药学杂志》(1978; 6: 31): 据本方随证化裁治疗六例三叉神经痛，处方：生石膏、熟地、玄参各15克，麦冬、知母、牛膝各9克，白芷、防风各4.5克，细辛1.5克。治疗效果满意。

19315 玉井散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】瓜蒌根二两 甘遂一两(制用)

【用法】上为细末。以麝香汤调下三钱，临卧服。

【功用】泻下。

【主治】《普济方》：水肿。

19316 玉仁膏

【方源】《外科传薪集》。

【组成】当归一两 白芷五钱 紫草二钱 甘草一两二钱

【用法】用真麻油一斤，将前药浸五日，煎至药枯，去滓，将油再熬至滴水成珠，下血竭细末四钱，搅匀，再下白蜡二两溶化，离火微冷，再下轻粉四钱，研细，搅和成膏。

【主治】疮疖。

19317 玉正散

《灵验良方汇编》卷二。为《外科正宗》卷四“玉真散”之异名。见该条。

19318 玉龙丸

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】阳起石 白滑石 寒水石各一分 硃砂 南硼砂各半钱 轻粉 粉霜各一钱

【用法】上七味都一处，先用纸裹了，次用面饼子，可半寸厚者裹上，更用数重湿纸裹之，文武火烧，经两时辰取出，上面纸尽作灰，悉去之，面如未焦色，再烧半时辰，已焦熟即止，地上掘一坑子，可五六寸深，取药球焙之一宿，出火毒，来日取出，剥去焦面，将药再研如粉，饭尖和丸，如绿豆大。饭尖亦须烂研，少与药末，用力和揉令匀，若饭尖多，即药力少；如丸，以青黛为衣。

【主治】胃热伏水，胃腹膨胀。

19319 玉龙丸

【方源】《增补内经拾遗》卷三引《海上方》。

【组成】半夏不拘多少(生用)

【用法】上为细末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸，于未发之先白汤送下。至重者无过三服。

【功用】消散暑气。

【主治】暑疟。

19320 玉龙丸

【方源】《脉因证治》卷一。

【组成】焰消 明矾 滑石 硫黄一两 白面六两

【用法】水为丸。水送下。

【主治】伤暑泄泻，或二便秘。

19321 玉龙丸

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】黄连二斤 好酒五升

【用法】煮干，为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，热汤送下。

【主治】伤暑腹痛。

19322 玉龙丹

【方源】《一草亭》。

【组成】真雄黄(为末，水飞候干)三钱 寒水石(煨，为末)九钱

【用法】和匀，每日用鸡肝一具，竹刀切片，去净筋膜脂，用药一钱，入酒一盏，碗盛蒸食。

【功用】开瞽。

【主治】小儿疳积伤眼。

19323 玉龙丹

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】明矾六分 没药二钱 乳香二钱五分 炉甘石(煨，飞过)一两 珍珠一钱 黄丹(飞净)一两 麝香七分 梅花片三分

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，银朱五分为衣，收贮听用。如用，将井花凉水磨，涂眼皮外。

【主治】一切火眼赤肿。

19324 玉龙汤

《普济方》卷三五五。为《妇人良方》卷二十三“陈氏玉龙汤”之异名。见该条。

19325 玉龙散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】硫黄 滑石各等分

【用法】上为细末。每服一钱，糯米饮调下。

【主治】吐逆不止。

19326 玉龙散

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】玉簪花 蛇蛻各二钱 丁香一钱

【用法】上为末。每服一钱，酒送下。

【主治】小便不通。

19327 玉龙散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【异名】接骨丹。

【组成】人中白(醋煨七次)

【用法】酒冲服。

【主治】跌打损伤，昏晕而骨未碎者。

19328 玉龙膏

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】栝楼大者一枚(取瓢子，细锉烂为度) 零陵香 芍药 藿香叶 甘草(炙) 黄耆 杏仁(汤浸，去皮尖双仁)各一分 香白芷半两 清油十两 黄蜡一两半 麝香(研)一分 当归一分 乌蛇(酒浸，取肉，焙)半两 生姜(切)一两

【用法】上药除黄蜡、麝香外，细锉，如麻豆大，以油浸于银石器内，慢火养一日，次日添火，熬令黄色，用绵滤去滓后，入黄蜡搅匀，看硬软，欲凝方可下麝香，倾在瓷罐子内，候冷。贴肿处。

【功用】摩风止痛。

【主治】一切毒肿疼痛。

19329 玉龙膏

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】蕤仁(去皮)四十个 杏仁(去皮尖)七个 硼砂(透明者)黑豆大 滴乳香 黑豆大 牙消黑豆大 轻粉一大钱 脑 麝各少许

【用法】取蕤仁、杏仁二味同研如膏，摊在瓷碗内，用熟艾如鸡子大烧烟，熏令如粟米色，取下细研，与余药同研入白蜜少许，研为膏，用瓷合盛。每点半粟米许。

【主治】诸风毒眼赤涩，眵泪隐痛，或生瘀肉翳膜。

19330 玉龙膏

【方源】《局方》卷八(续添诸局经验秘方)。

【组成】瓜蒌大者一个(去皮) 黄蜡一两半 白芷(净拣，锉)半两 麻油(清真者)六两 麝香(研)一钱 松脂(研)一钱半 零香 藿香各一两 杏仁(去皮尖)升麻 黄耆 赤芍药 白及 白薇 甘草

(净拣, 锉) 各一分

【用法】上以油浸七日, 却比出油, 先炼令香熟, 放冷入诸药, 慢火煎黄色, 用绢滤去滓, 入银、石锅内, 入蜡并麝香、松脂, 熬少时, 以瓷盒器盛。每用少许, 薄摊绢帛上贴。若头面风癣痒, 疮肿疼痛, 并涂磨令热, 频频用之。如耳鼻中肉铃, 用纸拈子每日点之, 至一月即愈。如治灸疮及小儿瘤疮, 涂之。

【功用】摩风止痛, 消肿化毒, 兼灭瘢痕。

【主治】一切折伤, 疮肿。

19331 玉龙膏

【方源】《永类铃方》卷六引《水丘道人紫庭治瘰秘方》。

【组成】青蒿子 柴胡 白槟榔各二两 鳖甲(汤煮, 去皮裙, 酒浸, 炙黄赤) 白术 赤茯苓 木香 牡蛎各半两 地骨皮半两 人参一两 生干地黄一两 当归三钱 朱砂一钱 豆豉心二合 虎头骨(研开, 酒炙黄赤色)一两 肉苁蓉(酒浸一宿, 炙)一两

【用法】上皆为末, 又加乌梅肉、枳壳, 上前件未成, 却以杏仁五升, 壮者以童便浸, 春夏七日, 秋冬十日, 和瓶日晒, 每日一换新者。日数足, 以清水淘去皮尖, 焙干, 别以童便一升, 于银石器内文火煎至随手烂, 倾入砂盆, 用柳木捶研烂为膏, 细布滤过, 入酥一两, 薄荷自然汁二合搅匀, 和药, 用捶捣五百下为丸, 如梧桐子大。每服十五丸, 空心汤送下, 加至三十丸。如觉热, 减丸数服, 热少还添, 加减经月日, 诸证皆退, 进食安卧, 面有血色, 乃药行也, 当勤服毋怠。

【主治】劳瘵, 遗精梦泄, 腹膨高突, 咳嗽阴疼。

【宜忌】忌苋菜、白粥、冷水、生血、雀、鸽等物。

19332 玉龙膏

【方源】《普济方》卷五十二。

【组成】白藜 白芷 茅香 零陵香各等

分 栝楼仁半两 麝香少许

【用法】前三味以香油煎令稍焦, 去滓, 以蜡少许调匀, 用度为妙。

【功用】令人面光润不皱, 退一切黥黯。

19333 玉龙膏

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】白矾指头大 胆矾 硫黄各如二豆大 硃砂五粒豆大 砒指头大 乳香末 黄丹各半钱 朱砂三钱

【用法】前五味同入黑盏内, 火煨过, 候冷取出, 入余药同研匀。每用少许, 油调涂, 一日三次。至三四日, 其痔瘤皆黑色便不用, 只用催落药。

【主治】痔瘤。

19334 玉龙膏

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】草乌三两(煨) 火姜三两(煨) 白芷 官桂 赤芍药各一两

【用法】上为末。热好酒调涂, 不留孔, 每日二次。

【主治】痘毒流注。

19335 玉龙膏

【方源】《医林改错》卷下。

【异名】胜玉膏。

【组成】香油一斤 白藜 升麻 当归 川芎 连翘 银花 甲片 川乌 象皮各四钱 乳香一钱半(末) 没药一钱半(末) 轻粉三钱(末) 冰片三分(末) 麝香三分(末) 白占二两

【用法】将前九味药入油内炸枯色, 去滓, 入官粉三合, 离火, 再入乳、没、粉、片、麝, 搅匀, 再将白占投入于内。摊贴之。

【主治】跌打损伤。

19336 玉龙膏

【理渝】。为《仙传外科集验方》“回阳玉龙膏”之异名。见该条。

19337 玉仙散

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】白矾(枯)一钱 乌梅(去核)四个 杏仁(去皮尖, 麸炒)四十个 佛耳草

款冬花 知母 贝母(去心)各一钱半 甘草(炙)三钱

【用法】上为细末。每服半钱，干掺舌上咽津，不拘时候。

【主治】一切咳嗽。

19338 玉仙散

【方源】《普济方》卷三二八引《危氏方》。

【组成】香附子(瓦器炒黑色，勿焦) 白芍药一两 甘草一钱

【用法】上为末。每服三钱，沸汤调下。血崩不止，麻竹叶煎汤下；或月水不行，手足不用，加生姜、炒当归，煎木通汤下；月水不匀，当归酒下；频频下胎，血脉不住，米饮下；气痛及老妇人忽下血，加炒姜黄，炒陈皮任下。

【主治】妇人诸疾。

19339 玉仙散

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】干姜(炒)一两 香附(炒)一两 白芍(炒)一两 甘草(生)五钱

【用法】上为末。每服三钱，空心黄酒送下。

【主治】赤白带下，属寒者。

19340 玉兰丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】辰砂一两 鹿茸二两(作片，酥炙) 当归(酒浸，焙) 附子(七钱重者)四个(生，去皮脐，各切下项，挖空心，中安辰砂在内，以前项子盖定，用线扎) 木瓜大者两个(去皮瓢，切开项，入辰砂、附子四个在内，以木瓜原项子盖之，线扎定，蒸烂，取出。附子切作片，焙干，为末；辰砂细研，水飞；木瓜研如膏。宣木瓜为妙) 柏子仁(炒，别研) 沉香(别研) 巴戟(去心) 黄耆(去芦，蜜炙) 肉苁蓉(酒浸) 茯神(去心) 川牛膝(去芦，酒浸) 石斛(去根，酒浸)各一两 杜仲(去粗皮，酒浸) 菟丝子(水淘净，酒浸，焙，别研) 五味子各一两半 远志(去心，炒)二两

【用法】上为细末，用木瓜膏杵和，入少酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮、温酒、盐汤任下。

【功用】闭精，补益。

【主治】诸虚不足，膀胱、肾经虚败，阴阳不交，致生膏淋、白浊、遗精之患。

19341 玉芝丸

【方源】《局方》卷四。

【组成】人参(去芦) 干薄荷叶 白茯苓(去皮) 白矾(枯过) 南星(米泔浸一伏时，焙干)各三十两 半夏(汤洗七次，为末，生姜汁捣和作曲)六十两

【用法】上为末，用生姜汁煮面糊和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜汤送下。如痰盛燥热，薄荷汤送下。

【主治】风壅痰实，头目昏眩，咳嗽烦满，咽膈不利，呕吐恶心，神志昏愤，心忪面热，痰唾稠粘。

19342 玉芝丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【异名】灵宝丹。

【组成】黑铅一两 水银一两 硫黄一大豆大 阳起石三大豆大 代赭二大豆大 消石半分

【用法】先销铅成汁，次下水银，急手搅令匀，后下诸药咬铅，以下四味同细研了，旋旋取点入铅汁中，熟搅之，旋咬铅成灰于一畔，候咬铅尽，然后泻水银于瓷碗中，但秤水银有一两在，即止。入于后柜硫黄一两半，细研如面，入瓶子中，碗子合之，渐火逼候鬼焰出，即住。放冷细研，为柜，又将柜入一小档子中，布置以物，按中心作坑子，即将铅中水银一两，更入硫黄一分同研，结为砂子，入于内柜中，以一茶碗合定，固之令干，档子下常以二两火养，仍以草灰没档子盖之，勿令火绝，如此七日，渐以火烧，令通赤即药成矣。放冷取出，纸衬、摊于湿地，盆合一复时，出火毒，细研如面，以枣瓢为丸，如粟米大。每服五丸，空心温酒送下。若

以饭为丸，如大豆大，每服二丸，热茶送下。治天行时疾，服了，以厚衣盖身取汗，即愈。其柜长生用之。

【主治】一切风疾，并妇人血气。

【宜忌】忌羊血、鲤鱼。

19343 玉芝饮

【方源】《幼幼新书》卷三十四引《博济》。

【异名】玉芝散（《圣济总录》卷一八一）。

【组成】甘草（锉作半寸许，擘破，汤浸一日，微炒过）吴石膏（研如粉）各四两 藿香三分 山梔子六两（去皮，炒令香）

【用法】上为细末。每服二钱，以新汲水调下。

【主治】小儿膈上壅热，唇口生疮，咽喉肿痛。

19344 玉芝散

《圣济总录》卷一八一。为《幼幼新书》卷三十四引《博济》“玉芝饮”之异名。见该条。

19345 玉芝散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】香附子半生半熟 代赭石

【用法】上为末。用酒调下。大瘕崩者煎服。

【主治】血崩。

19346 玉灰散

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】风化石灰一斤（细罗过用） 韭菜一斤（洗净，细切）

【用法】将韭菜于石臼内捣烂，次入石灰同捣令匀，捏作饼子，风干。端午日合。

【主治】刀箭伤。

19347 玉贞散

《梅氏验方新编》卷六。为《外科正宗》卷四“玉真散”之异名。见该条。

19348 玉尘散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】白面 箬叶灰各三钱

【用法】上为细末，分为二服。食后并华水调下。

【主治】肺壅鼻衄。

19349 玉尘散

【方源】《幼幼新书》卷十六引《保生信效方》。

【组成】天南星（去皮） 半夏（各用汤浸，洗七遍，切，焙） 桔梗 桑根白皮（自采土下者）各等分

【用法】上为细末。每服三大钱，水一盞半，加生姜如钱大六七片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】大人、小儿痰壅咳嗽，气促喘满，咽膈不利，劳嗽。

19350 玉尘散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】寒水石（烧）三两 马牙消（枯）一钱 铅白霜半钱 南硼砂半两

【用法】上为细末，每用少许干掺口疮上，咽津无妨，不拘时候。

【主治】大人小儿咽喉肿痛，口舌生疮。

19351 玉竹汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】生黄耆 阿胶（蛤粉炒珠） 直僵蚕（酒洗） 菊花各一钱五分 黑芝麻 茯苓 当归须各一钱 玉竹一钱五分 炙甘草七分

【用法】水煎服。

【功用】柔润，熄肝风。

【主治】历节风，久服辛热之药不愈。

【备考】凡久病不愈，切不可使用风药，宜大补气血。用十全大补汤各一钱，加真桑寄生三钱、制附子七分、姜汁、竹沥各半酒杯，冲药服。

19352 玉竹粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】玉竹 15~20 克（鲜者 30~60 克） 冰糖少许 梗米二两

【用法】先将新肥玉竹洗净，去掉根须，切碎并取浓汁后去滓；或于干玉竹煎汤去滓，入梗米，再加水适量煮为稀粥，粥成后放入冰糖，稍煮一二沸即可。

【功用】滋阴润肺，生津止渴。

【主治】肺阴受伤，肺燥咳嗽，干咳少痰或无痰，或高热后烦渴，口干舌燥，阴虚低热不退，及各种类型心脏病心功能不全时的辅助疗法。

【宜忌】胃有痰湿气滞，胃部饱满感，口腻多痰，消化不良，不喜饮水，舌苔厚腻者忌服。

19353 玉竹膏

【方源】《全国中药成药处方集》(南京方)。

【组成】肥玉竹五斤

【用法】清水煎熬三次，去滓取汁，滤清浓缩，加冰糖五斤收膏。每服三钱，一日一次，开水或淡盐汤吞服。

【功用】滋阴润肺，宁心除烦。

19354 玉华丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】消石半两 硫黄半两 白矾半两 硼砂一分

【用法】上为末，入钳锅内，文火烧令赤，直候干硬，停火，候冷，取药于湿地，合着，以土拥之出火毒，一日后取出，细研为末，以粳米饭为丸，如梧桐子大。每服七丸，以醋汤送下。

【主治】食不消化，腹中结聚瘕块。

19355 玉华丹

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】矾(净瓦盆合定，用火煨过)八两

【用法】上为极细末，煮醋面糊为丸，如黍米大。食前用木瓜煎汤送服。

【主治】伏暑泄泻惊搐。

19356 玉华丹

【方源】《一草亭》。

【组成】炉甘石二两(取白而轻者，如云片，及羊脑髓样) 川黄连一两(去芦，切碎，水一钟，浸半日，隔汤煮汁) 童便一钟(取男半岁无病者，同连汁和作一碗)

【用法】将甘石置倾银罐内，炭火煨成碧色，取起，以连汁、童便淬之，如此煨淬七次，加朱砂三钱，同研为末，水飞去脚，候

干又研，极细如尘，收贮听用，名曰丹头。另制珍珠，将珠一钱许，置豆腐内，碗盛蒸一时久，研极细，收贮听用。丹头一钱，加珠末一分，旋研冰片三分和匀，入瓷罐封固。凡一切外障眼，以银簪或象牙簪沾药，点两眦内，闭一饭久，仍以簪拨出药屑，每日早饭后点一次，或夜点亦可。

【主治】眼患外障，红肿羞涩，昏翳翳膜。

19357 玉华散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】甜葶苈三两(纸上焙香) 桑白皮半两 天门冬半两(去心) 百部二钱半 马兜铃半两 半夏半两(汤洗七次，姜制) 紫菀(去土)半两 杏仁半两(去皮尖) 贝母半两(炮) 百合半两 甘草二钱半(炒) 人参(去芦头)半两

【用法】上哎咀。每服三大钱，水一盏，加大枣五枚，同煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【功用】调顺肺经，清利咽喉，安和神气。

【主治】咳嗽气喘。

19358 玉华煎

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】玉竹四钱 五味一钱 麦冬三钱 沙参四钱 党参四钱 茯苓二钱 白术一钱 山药三钱 川断二钱 牛膝二钱

【用法】元米一撮，煎汤代水。

【主治】痿证，足膝无力而不能任地。

19359 玉合丹

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《谭氏殊圣》。

【组成】寒水石 白矾各二两 黄丹(三味研匀，入盒子，大火煨过，别研) 密陀僧各半两 硫黄一分(研)

【用法】上再研细，蒸饼为丸，如绿豆大。每服四丸，冷水送下；甘草汤亦得。

【主治】肝疳腹胀体痿黄，面色如金形渐伤。咬甲得眉多吃土，爱盐糟米怕羹汤。朝朝曩泻吐还逆，昼夜频添不忍当。

19360 玉肌丹

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】红升丹(红粉)1.5克 生石膏150克

【用法】先将红升入乳钵内研细,再加生石膏研成极细末,装褐色玻璃瓶内,不宜见光。用棉花蘸药少许轻撒疮面上,或用药捻(药条)蘸药插入疮口。

【功用】拔毒提脓,去腐生新。

【主治】痈疽溃后。

【备考】玉肌丹 五五丹、重升丹三方,量疮毒轻重选用。

19361 玉肌散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】绿豆半升 滑石 白芷 白附子各二钱

【用法】上为细末。每用三匙,早、晚洗面时汤调洗患上。

【主治】①《外科正宗》:一切风湿雀斑,酒刺、白屑风,皮肤作痒者。②《中医皮肤病学简编》:脂溢性皮炎。

【备考】《疡医大全》本方用法:每晚用鸡蛋清调搽。

19362 玉肌散

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】白芷 白及 龙骨 贝母 赤石脂

【用法】外掺敷。

【主治】疳蚀疮。

19363 玉池汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】桂枝三钱 茯苓三钱 甘草二钱 芍药三钱 龙骨二钱 牡蛎三钱 附子三钱 砂仁一钱(炒研,去皮)

【用法】水煎大半杯、温服。

【主治】遗精。

【加减】湿旺木郁而生下热,倍茯苓、白芍,加泽泻,丹皮。

19364 玉池散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】寒水石(烧通红,研细)一两 细辛(去苗叶土) 胡椒各半两 荆芥穗二钱半

【用法】上为细末,与寒水石一处再研,令细匀。用软刷牙如常刷牙使用,一日三二次。

【主治】牙齿疼痛不可忍。

19365 玉池散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】升麻(去土) 藁本(去土) 甘松(去土) 茵草 香白芷 川芎各一两 华细辛(去苗叶,并土)二两 生干地黄(焙干)二两 地骨皮(拣净)一两 皂角(刮去皮,烧存性)三两 麝香一钱(拣去毛,另研细) 青盐二两

【用法】上为细末,入另研者一处,再研匀细。每日早晚揩牙,如常使用。

【主治】牙齿垢腻不洁净。

19366 玉池散

【方源】《局方》卷七(续添诸局经验秘方)。

【组成】当归(去芦) 藁本 地骨皮 防风 白芷 槐花(炒) 川芎 甘草(炙) 升麻 细辛(去苗)各等分

【用法】上为末。每用少许揩牙,痛甚即取二钱,水一盞半,加黑豆半合,生姜三片,煎至一盞,稍温漱口,候冷吐之。

【主治】风蛀牙痛,肿痒动摇,牙龈溃烂,宣露出血,口气等。

19367 玉池散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】细辛倍用 川升麻 防风 当归 川芎 藁本 地骨皮 白芷 石膏 螺青 青盐各等分

【用法】上为细末。早、晚食后常揩牙。若病甚,用药末三钱,水一大盞,加生姜五片,黑豆五十粒,煎十沸,通口漱,甚妙。须是日晒,干用为佳,经火焙则走气也。

【主治】口齿诸疾。

19368 玉池散

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】藁本（去土）升麻 防风（去芦）细辛 白芷 甘草节 当归 槐花 川芎 独活各等分

【用法】上为细末。每服三钱，加生姜三片，水一盞，煎七分，温漱，服之无妨。

【主治】牙脓血变骨槽风，及骨已出者。

19369 玉关丸

【方源】《鸡峰》卷七。

【异名】趁邪丹。

【组成】山茱萸 补骨脂 龙骨 牡蛎 白茯苓 青盐各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心煎车前子叶汤送下。

【主治】男子妇人关键不牢，精源失禁，神志恐怯。

19370 玉关丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白面（炒熟）四两 枯矾二两 文蛤（醋炒黑）二两 北五味一两（炒） 诃子二两（半生，半炒）

【用法】上为末，用熟汤为丸，如梧桐子大。以温补脾肾等药随证加减煎汤送下；或人参汤亦可。如血热妄行者，以凉药送下。

【主治】肠风血脱，崩漏带浊不固，诸药难效，及泻痢滑泄不能止者。

19371 玉关丸

【方源】《证治宝鉴》卷七。

【组成】人参六钱 枣仁 牡蛎（煨）五倍子 枯矾 龙骨各五钱 茯神一两 远志肉半两

【用法】上为末，蒸枣为丸，如梧桐子大。每服五六十九。

【主治】遗尿，小便出而不觉。

19372 玉红散

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】白矾二两 朱砂四钱 硃砂二两（先烧硃砂在锅内，次用白矾末在上枯，烟尽为度）

【用法】上为末，敷痔；干用津唾调贴，湿干敷上。

【主治】诸痔。

19373 玉红散

【方源】《秘传外科方》。

【组成】寒水石一两（煨） 轻粉少许 国丹少许

【用法】上为细末，掺疮口上，日夜二洗二换。盖蟾酥膏、桃红散，皆为毒药，故令疮疼痛，用玉红散解二药之毒，用二药散其血，则当自然安矣。

【主治】疔疮。

19374 玉红散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】灵药 雄黄 白丁香各一钱 蟾酥 乳香 没药各五分

【用法】上为细末，瓷罐收，任用。

【功用】去漏腐肉，亦可点痔。

19375 玉红膏

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】松香（同好醋、加葱头打碎，或取汁同煮）一片 飞丹六两 枯矾六两 川椒二两（另研末） 轻粉一两五钱

【用法】上为末，先以猪肉汤洗净，菜油调涂。

【主治】小儿头上恶疮，及肥水疮。

19376 玉红膏

《慈幼新书》卷六。为《外科正宗》卷一“生肌玉红膏”之异名。见该条。

19377 玉红膏

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】紫草二两 全归三两 生地四两 象皮二两 乳香二两 没药一两 甘草五钱 合欢皮二两

【用法】上药用麻油半斤，煎枯去滓，再入黄占四两，白占二两，血竭五钱，以上共煎至滴水不化，成膏听用。

【功用】止痛，生肌，长肉。

【主治】一切疮口。

19378 玉红膏

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】当归二两 白芷五钱 甘草一两二钱 紫草二钱 血竭 轻粉各四钱 白占二两 麻油一斤

【用法】前四味入油内浸三日，慢火熬至药枯，去滓滤净，次下白占、血竭、轻粉，即成膏矣。

【功用】①《伤科汇纂》：收敛。②《经验方》：生肌长肉。

【主治】①《伤科汇纂》：金疮棒毒溃烂，肌肉不生。②《中药成方配本》：痈疽溃瘍，腐肉已脱。并润肌肤枯燥。

19379 玉红膏

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】轻粉末八分 飞丹三分 珍珠(生研极细末)三分 黄柏末三分(生) 象皮(阴阳瓦焙微黄，见风稍脆，即研细末。如无，即以象牙末代之)三分。

【用法】上为细末，共一处研匀。取真麻油二两煎滚去沫，二三滚后，入老黄蜡一两或八钱，冬季止用。搅化再煎五六次，取起，盛瓷器内，置冷水中搅三五遍，出热气，急入上细药，不住手搅匀，俟冷瓷器收贮。临用以桑皮纸薄摊贴。

【主治】刎伤。

19380 玉杖丸

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】大半夏十四个(破作四片，修合时于屋下闲处地掘一小坑，深八寸，用火烧红。以薤白包半夏，入坑内，沃以米醋一小碗，就用土盖之，周时取出半夏，用斑蝥二十一个，土狗四十九个，去翅足，炒半夏黄色，去斑蝥、土狗不用) 石燕子二对(火煨醋淬，研细) 阳起石一两半(青盐三钱，炒，去盐) 灵砂一两半 龙骨一两半 诃子七个(煨，去核) 砂仁二十五粒 麦门冬(去心)一两 原蚕蛾一两半(去翅足，炒，系未交公者) 桑螵蛸一两半(斑蝥四十九个，

炒，去斑蝥不用)

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下，干物压之。若要阳举，糯米粉为糊丸药。

【主治】肾虚生痰。

19381 玉连丸

【方源】《百一》卷六。

【组成】木香 诃子(连核)各半两 黄连一斤(炒紫色)

【用法】上为细末，梗米饮糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心食前米饮送下，一日二次。

【主治】脾积下痢、蛊痢。

19382 玉连环

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】白及 白蔹 密陀僧(研) 代赭石(研) 糯米粉 绿豆粉

【用法】上为细末，以水调得所，看疮大小，剪纸环子，将摊在上。贴疮，一日一换。

【主治】一切疮肿。

19383 玉肠散

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】白石脂 当归(洗，焙) 丁香 白术各一两 草豆蔻(去皮) 厚朴(姜制)各半两

【用法】上为细末。每服半钱，粥饮调下，不拘时候。

【主治】冷利，初即大便青色，后乃作脓。

19384 玉灵丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】香附 苏子各四两 苏木 萝卜子 桃仁 当归 降香 红花 枳实 青皮各一两 沉香 木香 官桂各五钱 乳香 没药 藿香 陈皮 槟榔 蓬术 白豆蔻各三钱

【用法】上为末，和匀，用童便、黄酒、黑砂糖各一碗，合一处，煎如膏，和药为丸，如弹子大。每服一丸，黄酒化下，或用赤砂糖汤化下。

【主治】跌打损伤。

19385 玉灵膏

【方源】《普济方》卷三—四。

【组成】江子七十粒 赤芍药二钱 木鳖四枚(原去壳) 当归三钱 白芷二钱 没药一钱 乳香一钱 黄丹春夏四两半, 秋冬五两 柳枝一束

【用法】依法煎熬。

【主治】各种疮毒, 未溃肿痛, 已溃后疮口不合者。

19386 玉灵膏

【方源】《随息居饮食谱》。

【异名】代参膏(《随息居饮食谱》)、龙眼膏(《医学碎金录》)。

【组成】好龙眼

【用法】自剥好龙眼, 盛竹筒式瓷碗内, 每肉一两, 入白洋糖一钱, 碗口箬以丝绵一层, 日日于饭锅上蒸之, 蒸到百次。每以开水淹服一匙。

【功用】大补气血。

【主治】衰羸、老弱, 别无痰火、便滑之病者。产妇临盆服之尤效。

19387 玉阿散

【方源】《麻疹阐注》。

【组成】猫屎(在屋上日晒雨濯风吹白色者, 煨存性)不拘多少 冰片 青黛(如无真青黛, 用靛青花水飞净代之)各少许

【用法】研为细末。敷上。

【主治】走马牙疳。

19388 玉环丸

【方源】《重庆堂随笔》卷上。

【组成】生地(切碎同姜炒, 去姜) 丹参(去头尾, 酒洗, 炒)各四两 全当归三两 四制大香附 赤芍(酒炒)各二两 川芎(童便炒) 陈艾绒(鸡子二枚同煮水干, 炒黑)各一两

【用法】上为末, 以黑驴皮胶三两, 酒化烱, 和捣为丸, 如梧桐子大。每服二十丸。凡屡堕胎, 堕后服荡胞丸, 服至七朝, 第八朝

接服此丸, 至十四朝而止。

【主治】妊娠胎堕者。

19389 玉环丹

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】龙骨 莲花蕊 芡实(去壳) 黄柏(盐、酒炒) 石菖蒲 牡蛎(左顾者) 五味子各一两

【用法】上为细末; 金樱子竹刀刮去刺, 劈开去子, 蒸浓汁打糊为丸, 如梧桐子大。每服五六十丸, 盐汤送下。

【功用】涩精固阳。

【主治】遗精, 白浊。

19390 玉环煎

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】玉竹四钱 羚羊角一钱五分 沙参四钱 麦冬二钱 石斛三钱 贝母二钱 蒹皮三钱 蛤粉四钱 梨汁半杯(冲服)

【主治】肺热而咳, 上焦微喘, 肌表漫热, 口燥咽干。

19391 玉枝散

《普济方》卷三七五。为《御药院方》卷十一“玉柱杖散”之异名。见该条。

19392 玉枢丹

《外科精要》卷中。为《百一》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

19393 玉枢丹

《麻科活人》卷四。为《丹溪心法附余》卷二十四“太乙神丹”之异名。见该条。

19394 玉枢丹

《活人方》卷五。为《医方类聚》卷一七四引《直指》“万病解毒丸”之异名。

19395 玉枢丹

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】苦参 当归 玄参 荆芥 苍术各八两 羌活 乌药 胡麻 藁本 苍耳子 川芎 独活 白芷 白蒺藜 防风 大风肉 甘草 麻黄 红花 牛蒡子 天麻 白僵蚕 琉璃(煨灰) 海风藤 薄荷 延胡索 秋石 夏枯草 犀角 旱莲草 虎骨 血竭 柴胡 苏木 蝉蜕各二两 牛黄一钱 麝香

二钱 广木香 沉香 檀香 乳香 没药
仙灵脾各一两五钱 桑螵蛸 蕤仁 大黄
桔梗 贝母 乌药 半夏各一两

【用法】上为末，将粗药头煎汁，煮米糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服一百丸，用黄芩、大黄、羌活、独活、防己、防风、连翘、黄柏、桔梗、荆芥、当归、山梔、木通、甘草、半夏、紫苏、薄荷、升麻、川芎、麻黄、乌药等味煎汁送下，或酒送下，朝夕服。

【主治】白癰，疹痲。

【宜忌】避风。

19396 玉枢丹

《同寿录》卷一。为原书同卷“太乙紫定锭”之异名。见该条。

19397 玉枢丹

《杂病源流犀烛》卷二十三。为《准绳·疡医》卷一“一粒金丹”之异名。见该条。

19398 玉枢丹

【方源】《医钞类编》卷十八。

【组成】天南星 大半夏各一两（俱用牙皂，白矾汤浸七日，研，姜汁再蒸） 天花粉二两 玄明粉五钱（水化，拌花粉蒸一炷香久） 硼砂三钱 雄黄五分 麝香四分 生甘草一两

【用法】上为细末，滴水为丸，朱砂为衣。金银、姜皮、灯心煎汤送下。

【主治】热渴发搐，痰涎壅盛，危急之症。

19399 玉枢丹

【方源】《喉科秘钥》卷上。

【组成】明矾一两（入罐内桴炭上溶化） 枪消 硼砂各三钱

【用法】将枪消、硼砂入溶化之明矾内，和匀如指头大，逐层溶完，待罐口铺的如馒头样，方用武火炼干枯，用净瓦覆罐口一时，取起研细，用牛黄少许，冰片六匙，水调滴丹上，仍上罐口烘干听用。

【主治】一切喉证。

19400 玉矾汤

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】白矾（研化）

【用法】以竹筒盛，猛灌之。

【主治】喉闭，不通水谷。

19401 玉抱肚

【方源】《百一》卷二。

【组成】针砂四两（铁铤内火炒，用木或竹棒儿不住手搅，烟出尽为度，放冷） 白矾半两 硼砂一钱 粉霜半钱

【用法】白矾等三味同研为细末，与针砂拌和，只作一服，以水数点洒，用匙拌摊令匀，厚皮纸为贴，阔二寸以上，长四五寸，贴之；外以帛子包系疼处，或常系脐下。如觉大热，即以衣衬之。若药力过，再洒水如前拌用。其热如初，可用四五次。药力退，即将针砂再炒过，别入余药，仍可用。

【主治】停寒痼冷，心腹刺痛。

19402 玉抱肚

【方源】《普济方》卷二五〇引《德生堂方》。

【组成】川乌 川椒 小茴香 破故纸 葫芦巴 官桂 良姜 马薊花 白芷 甘松 干姜 吴茱萸 川楝子 海藻 青木香 乳香 没药各半两 好艾四两（碾末，先铺在裹肚上，后用药末）。

【用法】上细末，用细绢做夹裹肚一个，腰前檐覆过脐腹，下斜尖如匾，覆护阴囊，别作稍尾，以带抄住于后，不碍小净手。遇大净手，取下后檐，上覆腰与肾、不及背上裹肚，前后檐各铺绵，用前药末匀渗入绵，微洒以水，薄皮纸盖上绵，缀定住，翻绵在内，如缝人绵衣，常用拴裹腰腹，护囊使药气熏泌。

【功用】温暖丹田，熏蒸肾囊。

【主治】疝气。

19403 玉抱肚

【方源】《奇效良方》卷十三。

【组成】针砂四两（炒） 白矾半两 官桂一两

【用法】上为细末，和匀作一包，冰水调摊皮纸上，贴脐上下，以帛系之。如觉大热，即

以衣衬之，药干，再以水湿令润，其热如初，可用三四次。

【主治】一切虚寒，下痢赤白，或时腹痛，肠滑不禁，心腹冷极者。

19404 玉乳丹

【方源】《幼幼新书》卷六引张涣方。

【组成】钟乳粉（依古法制炼者） 柏子仁（别研） 熟干地黄（依法蒸焙者） 当归（洗，焙干）各半两 防风（锉） 补骨脂（净拣，炒）各一两 或加黄耆 茯苓

【用法】上药除别研者，碾为细末，次入钟乳粉等拌匀，炼蜜为丸，如黍米大。每服十丸，乳食前煎茴香汤送下。

【主治】婴儿头骨应合而不合，头缝开解。

19405 玉乳散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《烟霞圣效方》。

【组成】黄丹一钱 白面一钱 精猪肉四两（作片子，撒药在内，纸裹了）

【用法】上药用文武火烧熟，用米饮一大盏同吃。

【主治】泄血痢。

19406 玉命丹

【方源】《准绳·幼科》卷七。

【组成】硫黄（研）密陀僧 黄丹各半两 寒水石 白矾（俱研）各二两（用新丸瓶子入五味，用盐泥固济，煨令通赤，研匀细） 麝香一字

【用法】上研匀，以蒸饼为丸，如小绿豆大。每服十丸，用乌梅、甘草煎汤送下。

【主治】小儿久患赤白痢，及休息痢不止，腹肚虚鸣。日渐羸瘦，得眉，多吃泥土。

【宜忌】忌生冷、毒物、鲑面等。

19407 玉兔散

【方源】《鲁府禁方》。

【组成】鲜兔头一个

【用法】烧灰存性，敷之。

【主治】妇人产后阴下脱似肠者。

19408 玉珍散

【方源】《永乐大典》卷九八〇引《家宝》。

【组成】石膏半两（煨） 甘草一分（炙） 滑石半两（白者佳） 白附子一分 蚌粉（水淘去沙石，却连壳在火上煨通红，刮下，用水飞过，细研）一分 白僵蚕（直者，炒去丝）一分

【用法】上为细末，入脑、麝各少许。每服婴孩一字，二三岁半钱，五七岁一钱，麦门冬熟水调下。如渴泻不止，惊汗，灯心汤调下。小儿气怯者，脑、麝极少用。

【主治】婴孩小儿腮肿舌肿，惊躁渴泻，惊热惊汗。

19409 玉珍散

《普济方》卷六十引《经验良方》。为《圣济总录》卷一二三“盐花散”之异名。见该条。

19410 玉柱杖

【方源】《医便》卷一。

【异名】一秤金，小接命。

【组成】没石子五钱 沉香二钱 大茴香三钱 槐子三两 五加皮三两 枸杞子三两 破故纸（新瓦炒）三两 怀熟地黄三两

【用法】上药共一斤，胡桃肉一斤，白糖半斤，共为末，炼蜜一斤为丸，如弹子大。每服二丸，空心盐汤化下。

【功用】填精益肾，乌须黑发，延年益寿。

19411 玉柱散

《医方类聚》卷二四五引《医林方》。为《儒门事亲》卷十五“玉箸散”之异名。见该条。

19412 玉柱膏

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】蓬砂 龙脑 马牙消 青盐 轻粉 熊胆各一钱（并研令极细） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，出油）五枚 蕤仁四十九粒（去皮出油）

【用法】上药一处再研细，炼蜜为膏。每用粟米大，点目眵上。

【主治】赤眼肿痛。

19413 玉树油

【方源】《赵柄南临床经验集》。

【组成】桉叶油等

【用法】涂油于患处，每日数次。

【功用】辟秽解毒，消肿止痛。

【宜忌】皮肤破损处忌用。

19414 玉药丹

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】青木香七钱半 茴香 蝎梢 阳起石 礞砂(汤化去土，火气令净) 硫黄(研细)各半两 白矾(生)二钱半 黑附子(炮，去皮脐)一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。于疾发时，秤新绵二钱半烧灰，与药十五丸同研，热酒调下。甚者加至二十丸，即时气定不上攻，须臾即愈。久有此疾，日服十丸，半月后，小便中当有如桃胶，即病根除矣。

【主治】小肠气，疼痛不可忍，欲绝。

19415 玉带膏

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】龙骨五钱 梔子仁(生)三钱 黄柏五钱(生) 黄芩五钱(生)

【用法】铜锅内熬汁，煮龙骨至干，取出为末，再用铅粉五钱，麝香三分，并龙骨末共研细末，贮碗内，加黄腊一两，坐滚汤中炖化，拌匀，用连四纸铺火炉盖上，将药刷在纸上，剪成碎条，卧时贴在牙上，次早取出，有黑色可验。

【主治】牙疼。

19416 玉带膏

【方源】《理渝》。

【组成】黄蜡一两 定粉 龙骨末各五钱 麝香五分 黄芩 黄柏各五钱 桃仁三钱

【用法】黄蜡熔化，入诸药和匀，俟冷取出，熨斗烧热，铺纸用药摊之匀薄，每剪纸条，临卧贴齿龈间，至早取出。

【主治】牙齿动摇不牢而痛者。

19417 玉带膏

《青囊秘传》。为《青囊全集》卷上“玉带仙膏”之异名。见该条。

19418 玉钥匙

【方源】《三因》卷十六。

【异名】玉匙散(《脉因证治》卷四)、玉锁匙(《痘疹活幼至宝》卷终)。

【组成】焰消一两半 礞砂半两 脑子一字 白僵蚕一分

【用法】上为末，研匀。以竹管吹半钱许入喉中。立愈。

【主治】风热喉痹，及缠喉风。

19419 玉钥匙

《疮疡经验全书》卷一。为原书同卷“一字散”之异名。见该条。

19420 玉钥匙

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】西瓜霜五钱 西月石五钱 飞朱砂六分 僵蚕五分 冰片五分

【用法】上为极细末。吹患处。

【功用】退炎消肿。

【主治】一切喉症，肿痛白腐。

【宜忌】阴虚白喉忌用。

19421 玉泉丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】麦门冬(去心，晒) 人参 茯苓 黄耆(半生，半蜜炙) 乌梅肉(焙) 甘草各一两 瓜蒌根 干葛各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，温汤嚼下。

【主治】烦渴口干。

19422 玉泉丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】黄连 干葛 天花粉 知母 麦门冬(去心) 人参 五味子 生地汁 莲肉 乌梅肉 当归 甘草各等分 加入乳汁、牛乳汁、甘蔗汁、梨汁、藕汁。

【用法】上先将各汁入蜜一斤半，煎熬成膏，后将各药为末，和前膏熬数沸。每服五茶匙，食前清米汤调下。

【主治】消渴。

【宜忌】忌一切辛热之物。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“五汁玉泉丸”。据剂型，当作“玉泉

膏”。

19423 玉泉散

【方源】《普济方》卷三四六。

【组成】甘遂一钱

【用法】上为末 水调服后，用手操磨乳即至。

【主治】妇人无奶。

19424 玉泉散

《古今医鉴》卷十。为《直指》卷十七“天花散”之异名。见该条。

19425 玉泉散

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】犀角二钱 白芨 黄连各一钱(为细末) 冰片三分(另研)

【用法】每服大者五分，小者再减，浓煎甘草汤或建糖调服。

【主治】痘形一朝就结焦粒。

【备考】此方屡治痘焦者恒获速效，但犀角人不谙用法，必须粗砺瓦盘并水磨之，待澄净去水刷于绵纸上，略有干燥，方和前药用之。若以铁器锉下细末，犀不渍水则不效。

19426 玉泉散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】一六甘露散(原书同卷)、六一甘露散(《会约》卷十二)、玉泉煎、一六甘露饮(《医部全录》卷二三七)。

【组成】石膏六两(生用) 粉甘草一两加朱砂三钱亦妙

【用法】上为极细末。每服一二三钱，新汲水或热汤、或人参汤调下。

【主治】阳明内热烦渴，头痛，二便秘结，温疫斑黄及热痰喘嗽。

19427 玉泉煎

《医部全录》卷二三七。为《景岳全书》卷五十一“玉泉散”之异名。

19428 玉饼子

《小儿药证直诀》卷下。为原书同卷“白饼子”之异名。见该条。

19429 玉饼子

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】白胶一两 蓖麻子六十四个

【用法】上用白胶瓷器内溶开，去滓，再于溶开后，以蓖麻子作泥，入胶内搅匀，入小油半匙头，柱点水中，试硬软添减胶油。量疮大小，以绯帛摊膏药贴之。一膏药可治三五疔。

【主治】瘰癧，一切恶疮软疔。

19430 玉饼子

【方源】《医方类聚》卷二十四引《施圆端效方》。

【组成】川乌(炮) 干姜(炮) 天南星(炮)各半两 川芎 甘草(炒) 防风各一两 天麻 半夏(姜制)各一分

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如弹子大，捏作饼子。每服一丸，荆芥穗同嚼，茶下，不拘时候。

【主治】妇人头风，恶寒风冷，昏闷呕逆。

19431 玉饼子

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】半夏(大者)十二个 巴豆五十个(去壳，另研) 滑石 寒食面各一两(一方有轻粉)

【用法】上为末，滴水为丸，如绿豆大，捏作饼，每作五七饼，或八九饼，或十一二饼。生姜汤送下。

【主治】小儿吐泻惊疳，乳食不消，肚胀潮热，咳嗽，急慢惊风及痢疾。

19432 玉饼子

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】海螵蛸 蛤粉(南康真者)各五片 脑半分 黄蜡五分

【用法】上为末，先熔蜡，持起搅微冷，入末为丸，如青箱子大，带扁些。每用一饼，临卧纳入眼中翳膜上，经宿以水照之，其饼自出。

【主治】翳膜。

19433 玉饼子

【方源】《诚书》卷八。

【组成】茯苓 芒消 寒水石(煨) 山药

(瓦焙) 炙甘草 麦冬(去心)各五钱 朱砂三钱 龙脑一字

【用法】上为末，炼蜜为丸。砂糖汤送下。

【主治】心虚痞热，面黄颊赤，啼叫恍惚。

19434 玉津丸

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】雄黄 雌黄 硫黄 信砒各一钱 南星七钱

【用法】上为末，姜汁调摊碗内，大皂角七八条，烧烟，覆碗其上，碗极热，烟尽，冷，取出为丸，如梧桐子大。大人每服四丸，小儿每服一二丸。服时含姜片，津满口去姜，以津下药讫，便眠。

【主治】久年喘急，咳嗽困急欲死者。

19435 玉屏散

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】黄耆 防风 甘草

【主治】表气虚而恶寒者。

【加减】元气虚，加参=术；阴血虚，加归、芍。

19436 玉珠丸

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】半夏一两(汤洗十次) 消石一分

【用法】上为细末，滴水为丸，如麻子大。每服三五丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】诸涎嗽。

19437 玉珠散

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】硫黄(舶上者) 滑石(色白者) 凝水石(烧)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，艾汤调下。

【主治】中喝，冒闷吐逆，头痛出冷汗。

19438 玉真丸

【方源】《普济方》卷四十四引《指南方》。

【组成】石膏(火煨通赤，放地上出火毒) 半夏各一两 硫黄半两(细研)

【用法】上为末，姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十六丸，食前生姜汤送下。

【主治】肾厥头痛。

19439 玉真丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】龙骨(捣罗，水飞三遍，重研令细，去水，干，入熟绢袋盛，缝合；置五斗米下炊一遍了，干，重研细) 菟丝子(酒浸一宿，酒煮一宿令烂，去酒捣烂，焙干为末)各八两 鹿茸(新嫩带血者，去毛，酥炙)六两 韭子(净拣，微炒)四两半

【用法】上为末，炼白蜜为丸，如小豆大。每服七丸，温酒送下。一日二次。

【功用】补中安神定魄，去风湿劳气，治腰膝，固元气，黑髭鬓，悦颜色。

19440 玉真丸

【方源】《本事》卷二。

【组成】硫黄二两 石膏(硬者不煨，研)半夏(汤浸洗七次)各一两 消石一分(研)

【用法】上为细末，生姜汁糊为丸，如梧桐子大，阴干。每服三十丸，生姜汤或米饮送下。

【主治】①《本事》：肾厥头痛。肾气不足，气逆上行，头痛不可忍，谓之肾厥，脉举之则弦，按之石坚。②《妇人良方》：头痛筋挛，骨重少气，哆噫腹满，时惊，不嗜卧，咳嗽烦冤。

【方论选录】①《古方选注》：硫黄、消石升阳至顶，有迅雷风烈之势；石膏、半夏达阴降逆，有通玄入冥之神。治头痛不以轻清散邪，而用霸术劫夺其邪者，以浊阴上逆，乱其清阳，壅遏经隧，头痛如擘，刻欲昏愤，岂容缓治图功？然欲出补天手，迅扫浊阴，非深入圣域者不能。白沙之后，惟东壁能知之，乃曰硫黄与消石同用，配合二气，调燮阴阳，有升降水火之功。②《本事方释义》：硫黄气味辛大热，入右肾命门；石膏气味辛寒，入足阳明；半夏气味辛温，入足阳明；消石气味咸寒，入足少阴。此因肾厥头痛，以辛热咸寒入肾，和其阴阳，再以辛寒辛温入胃。佐以姜汁，欲其速入胃也。且胃为肾之关，其关下行，则上逆之气不致窃踞清虚之府，而

上下各得其宜矣。

19441 玉真丹

【方源】《普济方》卷一七七。

【组成】黄柏三两（去粗皮） 滑石六两（净末） 知母一两

【用法】上为细末。滴水，空心下。

【主治】消渴。

19442 玉真丹

《证治汇补》卷三。为《外科正宗》卷十“玉真散”之异名。见该条。

19443 玉真丹

【方源】《医级》卷八。

【组成】南星（酒浸三宿） 防风各等分

【用法】上为末，酒糊为丸。每服二钱，酒调下；昏闷欲死者，童便调灌；亦可敷疮口。

【主治】跌损刀伤经风，昏绝垂死者。

19444 玉真汤

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】阿魏（面裹，煨） 茴香（拣净，炒）各三斤 檀香一斤半 胡椒九两 干姜（炮）一斤半 杏仁（去皮尖，麸炒，别捣）三斤十二两 白粳米（炒）一斗六升 白面（炒）六两 甘草（炒）十两 盐（炒）二十三斤半

【用法】上为末。每服一钱，食前沸汤点服。

【主治】一切冷气，痰逆恶心，胸膈痞闷，脐腹撮痛，口苦无味，饮食不美。

19445 玉真散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《婴童宝鉴》。

【组成】白术半两 半夏七个 椒半分（去目，汗）

【用法】上为末。每服半字，水一呷，调下；大者一字。

【主治】小儿吮乳。

19446 玉真散

《本事》卷六。为《理伤续断方》“至真散”之异名。见该条。

19447 玉真散

【方源】《普济方》卷一一三。

【异名】夺命散。

【组成】天南星 防风各等分 没药半两（另研）

【用法】上为细末。破伤风以药调，敷贴疮口，然后以温酒调下一钱；如牙关紧急，角弓反张，用药二钱，童子小便调下；或因斗殴相打，内有伤损，以药二钱，温酒调下；打伤至死，但心头微温，以童子小便灌下二钱。并进三服。

【主治】风自诸疮入，破伤风及金刃伤，打扑伤损。

19448 玉真散

【方源】《袖珍小儿》卷四。

【组成】寒水石 石膏各二两（水飞） 甘草三钱 滑石五钱

【用法】上为末。先服香茹饮，又服此方，生姜汁和白汤调下。

【功用】凉心经，解诸热。

【主治】小儿秋夏伏暑，多有热，吐黄涎，头温，五心热，小便赤少，或干呕无物。

19449 玉真散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】玉真丹（《证治汇补》卷三）、玉正散（《灵验良方汇编》卷二）、玉贞散（《梅氏验方新编》卷六）、白附散（《经验奇方》卷上）。

【组成】南星 防风 白芷 天麻 羌活 白附子等分

【用法】上为末。每服二钱，热酒一钟调服，更敷伤处。若牙关紧急，腰背反张者，每服三钱，用热童便调服；虽内有瘀血亦愈。至于昏死，心腹尚温者，连进二服，亦可保全。若治疯犬咬伤，更用漱口水洗净，搽伤处。

【功用】散风解痉，镇痛止血。

①《北京市中药成方选集》：散风止血。②《全国中药成药处方集》：镇痛。生肌。③《中国药典》：解痉。

【主治】①《外科正宗》：破伤风牙关紧急，

角弓反张,甚则咬牙缩舌。疯犬咬伤。②《验方新编》:跌打损伤已破口者。

【宜忌】《全国中药成药处方集》:孕妇忌服。禁忌鱼腥、辛辣、葱蒜诸品;禁忌生冷、油腻等食物。

【方论选录】《中医方剂学讲义》:方中防风、南星二味,有祛风化痰之功;益以白附子祛头面之风,定搐解痉;羌活散太阳之风;白芷散阳明之风;天麻治厥阴之风。如此则祛风之力大为增强,风散搐定,病亦自愈。

【临证举例】①破伤风 《中医杂志》(1956; 8: 421):本方治外伤 200 例,其中约有 50 例破伤风,除 7 例因治疗过晚而死亡外,均治愈,未见后遗症。处方:白附子十二两,生南星(姜汁炒)、明天麻、羌活、防风、白芷各一两,蝉衣三两。典型病例:朱某某,男性,32 岁。左脚掌被锈钉刺入约四分深,出血不多。第三日忽感咀嚼不便,吞咽困难,痉挛一次;第四天痉挛次数增加,颈部、脊腰均呈强直状态,体温 39.6℃,脉搏跳动甚速,伤口呈肿硬状态。即以玉真散厚撒伤部,外用纱布绷带包扎;另给药散,每包重三钱,热黄酒调服,每隔三小时服食一包。次日痉挛次数大减。第三天伤部肿硬已完全软化平复,吞咽自由。计十二天的治疗日程完全回复正常。②外伤性腱鞘炎《江苏中医》(1960; 12: 封三)用本方外敷治疗扭转外伤所致的腱鞘炎,患者一般在 3~5 天内肿痛消失,功能恢复。方剂组成:白芷、南星、天麻、羌活、防风各一两,生白附子 60 克。

【备考】①《验方新编》本方用量:明天麻 羌活 防风 生南星(姜汁炒) 白芷各一两 白附子十二两。《经验奇方》:白附子十二个 生南星 白芷 天麻 羌活 防风各一两。②《寿世新编》本方用法:上六味切忌火炒,概宜生用,研极细末,就伤处敷上。倘伤重需内服者,可用黄酒浸服二三钱,但附子、南星须制过,否则恐致麻倒。③《浙

江中医杂志》(1964; 4: 25)报道:内服玉真散过量中毒死亡一例。患者右脚跌伤,自服黄酒调玉真散约三钱,药为本县药店所制,10 分钟后出现乌头碱中毒样症状,抢救无效死亡。作者认为,本方各药用量诸书不一,本例患者所用者,生白附用量较其他诸药总量大 3 倍。民间治跌打损伤每服 0.9~1.5 克,本例一次服用 9 克,内含生白附 3 克多,且系空腹黄酒冲服,故中毒而死。

19450 玉真散

【方源】《证治宝鉴》卷一。

【组成】天虫(炒断丝) 南星 防风 白芷

【用法】上为末。每服三钱,童便、陈酒调下;或外敷。

【主治】①《证治宝鉴》:破伤风初起,疮肿起白痂,身寒热。②《卫生鸿宝》:跌打损伤,内有瘀血。

19451 玉真散

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】生白附子一两二钱 天麻一两 生南星一两 白芷一两 防风一两 生半夏一两 冰片五钱 羌活一两

【用法】上为细末,按伤处大小将药敷于消毒纱布上,盖患处。

【功用】预防破伤风。

【主治】跌打损伤。

19452 玉壶丸

《圣惠》卷五十六。为《医心方》卷十四引《深师方》“西王母玉壶赤丸”之异名。见该条。

19453 玉壶丸

《传家秘宝》卷三。为《局方》卷四“化痰玉壶丸”之异名。见该条。

19454 玉壶丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】青黛皂荚针半斤(拍破,用河水五升浸二七日,入砂石器中煮去四升,存一升,又入藕汁半升、白蜜一两,再用慢火熬成膏,稀稠得所,去尽火,放冷) 枳壳一两(针

扎于灯上烧存性，入酒中浸过） 胡桃仁十个（依前法） 没药二钱（研） 阴地椿根白皮二两（焙干，取一两，末用） 乳香二钱（研）

【用法】上药除前膏外，后五味为末，入在前膏内为丸，如梧桐子大。每服二十丸，肠风，煎木贼汤送下；痔疾，荆芥汤送下；常时泻血，米饮送下；空心，一日三次。

【主治】肠风病，年深不效。

19455 玉壶丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】乌头（大者。炮裂，去皮脐）十五枚 硃砂（水飞，研） 阳起石（煨，研）各一两 硫黄半两（研）

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心盐汤送下；妇人醋汤送下。

【功用】益真气，进饮食，壮筋骨，驻颜色。

【主治】元脏久冷。

19456 玉壶丸

【方源】《普济方》卷一一七引《卫生家宝》。

【组成】硫黄一分 寒水石 石膏（煨）盆消 甘草 绿豆粉各一两半 太阴玄精石一两

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如弹子大。与生姜同嚼，新水下。

【主治】暑气。

19457 玉壶丸

【方源】《百一》卷七。

【异名】白龙丸（《诚书》卷九）。

【组成】舶上硫黄 焰消 滑石 白矾各一两

【用法】上为细末，入上等白面六两，拌和令匀，用新汲水为丸，如梧桐子大。每服二十丸，新汲水吞下；如闷乱欲死者，以水调灌之。

【功用】《医方类聚》引《简易》：消暑毒，止烦渴。

【主治】中暑。

【备考】《医方类聚》引《简易》本方用法：每服五十丸，用人参煎汤放冷吞下。

19458 玉壶丸

【方源】《直指》卷十七。

【异名】天花粉丸（《奇效良方》卷三十三）、天花丸（《医统》卷五十二）。

【组成】人参 瓜蒌根各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，麦门冬煎汤送下。

【主治】消渴，引饮无度。

19459 玉壶丸

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】大半夏二十五两 雪白南星十五两

【用法】上药用野外地上清洁水满满浸，逐日换水，浸十日；将半夏切作二片，南星大者切作六片，中者作四片，再逐日换水浸，五日足；每五两研细末，生白矾一两，添半夏、南星，则亦添矾，却用井水浸，须令水满，只以此水浸一月，日取些半夏或南星尝看，以不麻为度，如尚麻，更浸。候不麻，滤取晒干，和脚下水浸矾，碾细收之。每末七两，入全蝎七个，炒白附子二钱半，炒为末；甘草二钱，炒；和匀，用炊饼干末三两半；用生姜半斤研取自然汁，煮炊饼末和为丸，如梧桐子大，或干，添些白汤为丸。每服二三十丸，随意咽下亦可。此药不问是何证候，痰涎作壅，或有异证、风证、小儿惊痫之类，应手而愈验，多服之勿妨，勿拘二三十丸之说，以姜汤、白汤或药咽下皆可；无病人咽服二三十丸亦佳，永无痰证。

【主治】一切痰饮。

19460 玉壶丸

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】海藻 昆布 雷丸 海带各等分

【用法】上为细末，烧陈米饭捣和为丸，如榛子大。每服含化咽津，不拘时候，常令药力不断。

【主治】三种瘰。

19461 玉壶丸

【方源】《普济方》卷一一七引《广南卫生方》。

【组成】白面四两(白者) 白矾半两(生用) 硫黄半两(生用)

【用法】上为末,新水为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,新水送下,不拘时候。

【主治】中暑伏热,昏困不省人事。

19462 玉壶丸

【方源】《医学六要》卷五。

【组成】雄黄一钱 南星(煨裂) 半夏(炮七次) 天麻 白芷各二钱

【用法】上为细末,姜汁炊饼为丸,如绿豆大。每服一钱,食远白汤送下。

【主治】风热头痛;痰厥。

19463 玉壶丸

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】白芍 当归各五钱 赤苓三钱 枳壳五分 槟榔 甘草 车前子各二钱 萝卜子一钱

【用法】上药各为末,蜜水为丸,如梧桐子大。每服二钱,红痢,黄连二分煎汤送下;白痢,木香三分煎汤送下;久痢气虚神弱者,生、熟黄耆各五分煎汤送下。

【主治】下痢危症。

19464 玉壶丹

【方源】《普济方》卷一一七引《经效济世方》。

【组成】硫黄一两 焰消二两或二两半 绿豆细末四两或五两

【用法】上药并生为末,以绿豆粉糊为丸,如樱桃大。每服一丸,同麻油薄荷嚼,新水下;或嚼生姜亦佳。或丸如梧桐子大,新水吞数十丸亦可。

【主治】中暑。

19465 玉壶丹

《医级》卷八。为《圣惠》卷九十八“通灵玉粉”之异名。见该条。

19466 玉壶丹

【方源】《医略十三篇》卷七。

【组成】石硫黄

【用法】入猪大肠内,煮肠烂为度,蒸饼为丸服。

【主治】火衰证。

19467 玉壶丹

《中国医学大辞典》。即《局方》卷四“化痰玉壶丸”。见该条。

19468 玉壶冰

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】荸荠粉二两 牛黄五分 冰片五分 琥珀一钱 海螵蛸(去硬壳)一钱 朱砂二钱 珍珠三钱 麝香五分 大青盐五分 熊胆一钱 玄明粉三分 炉甘石(煨)四两 硼砂(煨)三钱 硃砂(炙)五分 没药(炙)五分 胆矾一钱 枯矾三分

【用法】上为极细末,瓶装重二分。用细玻璃针蘸凉开水蘸药点入眼角。

【功用】退翳明目。

【主治】云蒙翳障,胥肉攀睛,迎风流泪,视物昏花。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(北京方):忌食辛辣物。

19469 玉壶饮

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】生党参(去芦)三钱 花粉三钱

【功用】微凉兼补。

【主治】上消。

【加减】如饮酒人,加干葛一钱。

19470 玉壶散

【方源】《杂类名方》。

【组成】海藻 海带 昆布 雷丸各一两 青盐 广术各半两

【用法】上为细末,陈米饮为丸,如榛子大,噙化。以炼蜜和丸亦好。

【主治】三种瘰。

【备考】本方方名,据剂型当作“玉壶丸”。

19471 玉振丸

【方源】《汉药神效方》卷五。

【组成】巴豆三分 牵牛子 大黄各二分 荞麦一分

【用法】用糊为丸。用白汤送下，先每日将神秘丸三粒研碎，于早朝用白汤服下；服至十日后，乃将金声散一钱三分，用酒服下；于翌日即第十一早朝将玉振丸五分，用白汤吞下。服玉振丸日，不再服神秘丸。自第十二日起，再服神秘丸如前；服至十日，复如前，于是夜服金声散，翌日服玉振丸。以上共二十三日，为服一剂日数。

【主治】癩病。

【宜忌】严禁五辛、酒肉、肉面类、房事。

19472 玉脂散

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【组成】白石脂 当归(洗，焙干) 丁香 白术(炮)各一两 草豆蔻(去皮) 厚朴(生姜汁炙)各半两

【用法】上为细末。每服半钱，以粥饮调下。

【主治】冷痢，大便色青，甚则有脓。

19473 玉脂膏

【方源】《古今医鉴》卷十五引王中城方。

【组成】牛油 柏油 香油 黄蜡各一两(溶化) 银朱一钱半 官粉二钱 麝香五分

【用法】上为末，入内搅匀。抹癣上，火烤；再擦再烤。

【主治】杨梅疮愈后，鹅掌癣疮，久而不愈。

19474 玉烛汤

【方源】《观聚方要补》卷一。

【组成】香附一钱半 沉香 藿香 缩砂各六分 木香 吴茱萸各四分 莪术 桂枝各九分 甘草二分

【用法】水煎服。

【功用】调胃利气。

19475 玉烛汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆五钱 生地黄六钱 玄参四钱 知母四钱 当归三钱 香附三钱(醋炒) 柴胡一钱五分 甘草一钱五分

【主治】妇女寒热往来，或先寒后热，汗出热解，或月事不调，经水短少。

【加减】汗多者，以茵陈易柴胡，再加黄肉

数钱；热多者，加生杭芍数钱；寒多者，加生姜数钱；肾经阴虚，日晡发热者，将黄耆减半，地黄改用一两。

【方论选录】黄耆为气分之主药，能补气，更能升气；辅以柴胡之轩举，香附之宣通，阳气之抑遏者，皆畅发矣。然血随气行，气郁则血必瘀，故寒热往来者，其月事恒多不调，经血恒多虚损，用当归以调之，地黄以补之，知母、玄参与甘草甘苦化阴以助之，则经血得其养矣；况地黄、知母诸凉药，与黄耆温热之性相济，又为婆理阴阳，调和寒热之妙品乎。

19476 玉烛散

【方源】《医统》卷六十引《局方》。

【组成】四物汤加大黄 朴消 枳实 厚朴

【用法】水煎服。

【主治】①《医统》引《局方》：血痢。②《儒门事亲》：人头目有疮肿瘰癧，及胸膈肋肋之间或有疮肿，肺核不消及脓水不止。妇人月事不来。

【备考】《儒门事亲》本方用四物汤、承气汤、朴消各等分；《奇效良方》本方用川芎、芍药、当归、熟地黄各一钱，枳实、朴消、厚朴各二钱，大黄三钱。

19477 玉烛散

【方源】《玉机微义》卷四十九引戴人方。

【组成】四物汤 调胃承气汤

【用法】上咬咀，水煎服。

【主治】经闭，恶露不尽，便毒，跌打瘀血身痛。

①《玉机微义》：经候不通，腹胀或痛。②《医学正传》引《疮疡集》：便毒。③《医方考》：疥疮作痛。④《仁术便览》：产后恶露不尽，脐腹疼痛，时发寒热，大便燥结。⑤《济阴纲目》：胃热消渴，善食渐瘦。⑥《郑氏家传万金方》：产后血枯便秘。⑦《血证论》：跌打瘀血发渴，身痛便闭。

【方论选录】①《医方考》：诸痛属实，实者可泻，故用朴消、大黄泻其实；生地、赤

芍凉其血;川芎、当归和其营;甘草调其卫。②《成方切用》:取《尔雅》“四时和气,谓之玉烛”之义。③《血证论》:取四物以补调其血,而朴消、大黄逐瘀去闭。妙在生姜一味,宣散其气,使消、黄之性不徒直下,而亦能横达,俾在外在内之瘀一并廓清。④《成方便读》:夫经闭有虚实之分,虚者由乎血虚,固当补养;实者皆由血瘀,瘀则热,热则血愈坚,故不得不以大黄、芒消之入血软坚者以峻下之。又恐消、黄性急,故又以甘草缓之,即调胃之意。

【备考】《丹溪心法》加生姜三片;《金鉴》有生姜,无甘草;《医学正传》引《疮疡集》诸药用各八分;《外科发挥》除甘草用五分外,余各二钱。

19478 玉烛散

【方源】《女科万金方》。

【组成】人参 生地 川芎 朱砂 防风 细辛 石菖蒲 甘草各一钱

【用法】上为末。每服一钱,薄荷汤调下。

【主治】产后不语。

19479 玉烛散

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】当归 芍药 川芎 甘草 芒消 熟地黄 大黄 黄芩各等分

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盞,加生姜三片,煎至七分,去滓温服。

【功用】和血通经。

【主治】①《卫生宝鉴》:瘰癧。②《赤水玄珠》:室女经不行,颈多结核。

19480 玉烛散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】当归 川芎 芍药 生地黄 大黄(蒸)各一钱

【用法】水一盞半,加大枣一枚,葱白二寸,煎七分,空心服。

【主治】妇人血虚,大便秘涩。

19481 玉浮丸

【方源】《济生》卷二。

【组成】人参 白僵蚕(炒去丝) 白术

干姜(炮) 丁香 白豆蔻仁 麦蘖(炒) 附子(炮,去皮脐) 木香(不见火) 南星(炮) 槟榔 半夏(汤泡七次) 甘草(炙)等分

【用法】上为细末,每药二分,用生面一分和匀,入百沸汤煮令浮,搅和,再取生姜自然汁为丸,如梧桐子大。每服二钱,淡姜汤送下,不拘时候。

【主治】男子、妇人脾胃虚弱,一切呕吐,及久新翻胃。

【加减】恶热药者,去附子;大便秘者,去肉豆蔻。

【备考】《袖珍》有肉豆蔻(面裹煨)、橘红。

19482 玉浮丸

【方源】《朱氏集验方》卷五引赵鲁公方。

【组成】天南星(削去皮) 半夏各一钱半 陈皮(去白) 白术 茯苓 附子(去皮脐)各一钱

【用法】上药并生为末,用生面随多少拌匀,生姜自然汁为丸,如梧桐子大。每服二十丸,用滚汤煮熟,次用煮药现成汤加生姜自然汁送下,不拘时候。

【主治】痰吐头痛。

【备考】本方方名,《普济方》引作“玉液丸”。

19483 玉粉丸

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】矾石一两(细研) 生炊饼剂一枚

【用法】上为末,却作炊饼蒸熟,乘热为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后茶清送下。

【主治】恶风。

19484 玉粉丸

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】凝水石四两(炭火煨及三五时辰,取出,于地坑内安放,盖令出火毒一复时,以温水飞研如粉,取二两) 膩粉半两 粉霜(别研,锉)一两 白矾(枯过) 半夏曲各三分

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三丸，食后温水送下。取转积滞者，七丸至十丸；欲微利者，五丸。

【主治】痰癖，胁下硬痛，呕吐痰饮。

19485 玉粉丸

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】白丁香（直者，研）一两 粉霜（研）三分 硫黄（研） 膩粉（研） 硃砂（研）各半两 乳香（熔过，研）一分

【用法】上为细末，用生姜自然汁煮枣肉为丸，如豌豆大。每服七丸，临卧煎生姜、枣汤送下；未动，次夜服十丸。老少以意加減。

【功用】取冷积。

【主治】下痢赤白，日久不愈，里急后重。

19486 玉粉丸

【方源】《玉机微义》卷二十七引《三因》。

【组成】半夏（洗）五钱 草乌一字（炒）桂一字

【用法】上为末，生姜自然汁浸蒸饼为丸，如鸡头子大。每服大人一丸，至夜含化。多年不愈亦有效。

【主治】寒痰壅结，咽喉不利，语声不出。

19487 玉粉丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】南星 半夏（俱洗）各一两 官桂（去皮）一两

【用法】上为细末，薄糊为丸，如梧桐子大，每服五七十丸，食后生姜汤送下。

【主治】气痰咳嗽，脉涩面白，上喘气促，洒淅恶寒，愁不乐。

【加減】心下痞者，加枳实五钱；身热甚者，加黄连五钱；体重者，加茯苓一两；气上逆者，加苦葶苈五钱；喘促者，加人参、桔梗各五钱；浮肿者，加郁李仁、杏仁各五钱；大便秘者，加大黄五钱。

19488 玉粉丸

【方源】《洁古家珍》。

【组成】南星（汤洗） 半夏（洗）各一两 橘皮（去白）二两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后人参、生姜汤送下。

【主治】气痰咳嗽，脉涩面白，气上喘促，洒淅寒热，悲愁不乐。

19489 玉粉丸

《普济方》卷二一一。为《鸡峰》卷十四“玉粉丹”之异名。见该条。

19490 玉粉丸

《保命歌括》卷九。为《百一》卷五“三仙丸”之异名。见该条。

19491 玉粉丹

【方源】《鸡峰》卷十四。

【异名】玉粉丸（《普济方》卷二一一）。

【组成】蛤粉 硫黄各等分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下。不拘时候。先宜五苓散利小便，次以此玉粉丹、四味阿胶丸。

【主治】挟热利。下痢清水，其色赤黄，但欲饮冷，时时呕逆，小便不利得热则极，心胸烦躁，脉虚大而数。

19492 玉粉丹

【方源】《鸡峰》卷二十九。

【组成】粉霜一钱 膩粉一分 定粉一分 石燕子二个 延胡索半两

【用法】上为末，以鸡子清为丸，如梧桐子大。每服两丸，食后熟水送下。

【功用】取虚中积。

【主治】久痢及积滞。

【宜忌】《卫生宝鉴》：忌油腻、粘滑、冷硬等物。

19493 玉粉丹

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】牡蛎粉四两（研） 干姜末二两（炮）

【用法】上为末，面糊为丸，如麻子大。每服一二十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】寒淋，膏淋，下痢；妇人带下。

19494 玉粉丹

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】伏火硫黄二两 白龙骨(细末) 钟乳粉 附子(炮, 去皮脐, 取末) 白石脂(细研) 各二钱

【用法】上为细末, 汤浸蒸饼为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 空心、食前米饮送下, 次以温粥压之。

【主治】肠胃虚寒, 下利清谷, 或便纯白, 肠滑不禁, 少气羸困, 全不思食。

【备考】伏火硫黄法: 先用硫黄五两, 水飞去砂石, 研为末, 用瓷盒子盛, 以水和赤石脂封口, 盐泥固济, 晒干; 地内先埋一小罐子, 盛水令满, 置盒子在上, 用泥固济慢火养七日七夜, 候日足加顶火一煨, 候冷取, 研为细末。

19495 玉粉丹

《普济方》卷三十。即《证类本草》卷四引《经验方》“应急大效玉粉丹”。见该条。

19496 玉粉丹

【方源】《普济方》卷三四〇。

【组成】石燕 真轻粉 延胡索

【用法】上为细末, 以鸡子为丸, 如梧桐子大。每服三丸, 米饮送下。其产后并年高气血虚极老人, 皆可服。如小儿, 只一丸。

【主治】妊娠下痢赤白, 里急后重, 努责脱肛, 肠澼脓血鱼脑, 或因伤寒后余毒渗入肠间, 撮痛绞痛。

19497 玉粉散

【方源】方出《圣惠》卷三十七, 名见《圣济总录》卷七十。

【组成】石膏一两(细研) 牡蛎一两(烧为粉)

【用法】上为细散。以新汲水调如稀面糊, 候血滴间断时, 便点三五滴于鼻中, 仍以新汲水调两钱服之。

【主治】鼻衄日夜不止, 头痛心烦。

19498 玉粉散

【方源】《传家秘宝》卷三。

【异名】红豆散(《圣济总录》卷七十四)。

【组成】大黑附子(存坐正者, 炮, 去皮

脐) 红豆(拣净) 干姜(炮) 各一两(捣罗极细) 舶上硫黄一两(细研如面)

【用法】上为散。如有患者, 用半稀半稠粟米粥调药一钱, 空心温冷吃一服, 便效。如要为丸服亦得。

【主治】冷极泄泻久作, 肠滑不禁, 不思饮食。

19499 玉粉散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】天南星(白矾水煮软, 切, 焙) 半两 太阴玄精石二两(研) 甘草(炙, 锉) 半两 贝母(去心) 一两 不灰木一两半

【用法】上为极细末。每服半钱匕, 食后夜卧煎生姜、乌梅汤调下。

【主治】肺经伏热, 夜卧咳嗽。

19500 玉粉散

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】定粉一两

【用法】上为细末。每服二钱匕, 用生麻油调, 于五更时顿服。至晚逐下虫。

【主治】寸白虫。

19501 玉粉散

【方源】《幼幼新书》卷二十四引张涣方。

【组成】胡粉一两 白龙骨 水磨雄黄(各研细, 微炒) 楮木根白皮 漏芦 白马夜眼(洗净, 焙干) 各半两

【用法】上为细末。每服一字至半钱, 乳食前以鸡卵清调下。

【功用】定痢截疳。

【主治】无辜疳痢。

19502 玉粉散

【方源】《卫生总微》卷十七。

【组成】煨熟牡蛎粉二两 炮裂干姜末一两

【用法】上为末, 拌匀。冷水调, 稀稠得所。涂病处。以小便大利即愈。

【主治】水癫, 上下不定。

19503 玉粉散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】寒水石四两(火煨红取出,地上去火毒) 井泉石二两(生用) 脑子半钱

【用法】上为细末。新水调敷;干扑亦得。

【主治】①痃疔。②《普济方》:热汗浸渍成疮,肿痒焮痛。

19504 玉粉散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】定粉一两 蛤粉九两半 石膏半两 白石脂半两 滑石八两半 白龙骨半两 粟米粉二两 寒水石(烧通赤,于净地上放冷,出火毒)一两

【用法】上为极细末。干擦患处。

【主治】热汗浸渍成疮,肿痒焮痛。

19505 玉粉散

【方源】《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》。

【组成】寒水石(烧) 密陀僧 滑石各半两 膩粉 麝香各少许

【用法】上为细末。油调或干贴。

【主治】下阴疮疼不止。

19506 玉粉散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《经验秘方》。

【组成】定粉 飞白粉各等分

【用法】上为细末。洗浴净,掩敷干贴。

【主治】阴疮浸淫及不痊愈。

19507 玉粉散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】白矾(枯) 定粉各等分

【用法】上为细末。先洗浴净,淹开,掺之。

【主治】阴疮,浸淫不止。

19508 玉粉散

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】牡蛎(烧煨,入地坑出火气,为末)

【用法】湿即干掺;如干,即以津调敷。

【主治】痔漏。

19509 玉粉散

【方源】《奇效良方》卷十三。

【组成】海蛤

【用法】上为细末。每服二钱,蜜水调服。

【功用】解脏腑积热毒。

【主治】血痢。

19510 玉粉散

【方源】《外科理例·附方》。

【组成】轻粉 银朱 滑石 寒水石 孩儿茶各二钱 片脑二分

【用法】上为细末。香油调搽;干搽亦可。若肿硬不消,以防风、荆芥、牛膝、甘草、滑石各五钱,用水三碗煎二碗,乘热熏洗。

【主治】一切疔疮。

19511 玉粉散

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】南京官粉一两

【用法】火烧黄色,研细末。每服二三钱,温烧酒调下。

【主治】天疱顽疮。

19512 玉粉散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】滑石(桂府粉,包)一两(水飞过) 甘草三钱 冰片二分

【用法】上为细末。掺之疮上。

【主治】胎漏皮疮。

【备考】方中甘草用量原缺,据《洞天奥旨》补。

19513 玉粉膏

【方源】方出《千金》卷二十三,名见《圣济总录》卷十八。

【组成】矾石 硫黄各等分

【用法】上为末,蜡和。敷之。

【主治】白癰。

19514 玉粉锭

《普济方》卷六十七。为《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》“玉粉锭儿”之异名。见该条。

19515 玉容丸

【方源】《医统》卷九十八。

【组成】白芨 白附子 石榴皮 冬瓜仁 大枣(去皮核)各一两

【用法】以好酒浸三日。早起洗面毕,洗之

如玉。

【功用】润肌白面。

【备考】本方方名，据剂型，当作“玉容酒”。

19516 玉容丸

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】洗面玉容丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】甘松 山奈 细辛 白芷 白藜 白及 防风 荆芥 僵蚕 山梔 藁本 天麻 羌活 独活 密陀僧 枯矾 檀香 川椒 菊花各一钱 红枣肉七枚

【用法】上为细末，用去净弦膜肥皂一斤，同捶作丸。早、晚洗之。肌肤自然莹洁如玉，温润细腻。

【功用】《饲鹤亭集方》：润颜悦色。

【主治】①《外科正宗》：男妇雀斑、酒刺，及身体皮肤粗糙。②《饲鹤亭集方》：肌肤瘙痒。

【加减】秋、冬加生蜜五钱；皮肤粗糙，加牛骨髓三钱。

19517 玉容丸

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】铅粉三两 白芨 白藜各五钱 干胭脂一个

【用法】上为细末，鸡子白调为丸，如肥皂大。日日洗面，容自嫩。

【主治】面疮。

19518 玉容粉

《集验良方拔萃》卷四。为《种福堂方》卷四“玉容散”之异名。见该条。

19519 玉容粉

【方源】《集验良方拔萃》卷四。

【组成】绿豆一升 荷花瓣二两（晒干）白滑石五钱 香白芷五钱 冰片二钱 密陀僧二钱 白附子五钱

【用法】上为细末。早、晚洗面，用一匙擦之。

【主治】雀斑、酒刺，肺风糟鼻，面上一切斑点。

19520 玉容散

《杨氏家藏方》卷二十。为《圣惠》卷十四“白附子膏”之异名。见该条。

19521 玉容散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】牵牛四两（生） 香白芷半两 甘松（去土）半两 广零陵香一两 栝楼根七钱半 川芎半两 细辛二钱半 阿胶二钱半（炮） 猪牙皂角二两 藿香半两 栝桃儿二两 藁本半两

【用法】上为细末。每用一钱，如洗面药用，早晨、晚夕各用一次。

【主治】面上热刺黥黯。

19522 玉容散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】白芨一两半 白藜 白僵蚕（生）成炼钟乳粉各半两 白附子（生） 冬瓜子 韶脑（别研）各二钱半 栝桃儿二钱 麝香一钱（别研）

【用法】上为极细末，用玉浆调，匀稠得所。临卧涂患处，明旦用温淡浆水洗去。

【主治】面上诸黥黯及瘢痕。

19523 玉容散

《普济方》卷三九四。为《圣济总录》卷一七六“遂愈散”之异名。见该条。

19524 玉容散

《医统》卷六十六。为《医部全录》卷一三一引《医林》“玉容西施散”之异名。见该条。

19525 玉容散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】皂角三斤（去皮） 升麻八两 栝实子五两 甘松五钱 山奈三钱 砂仁（连皮）五钱 天花粉一两 白芷一两 白及一两 糯米一升（另研） 白丁香五钱（须腊月收者） 绿豆一两（另研）

【用法】上为末，和匀。量用洗面。

【功用】馨香，去垢腻。

【主治】面生黥黯，或生小疮，或生痤疮、粉刺，并皮肤瘙痒。

19526 玉容散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】白芷 白术 白芨 白茯苓 白扁豆 白细辛 白僵蚕 白莲蕊 白牵牛 白藜 白鸽粪 甘松 团粉 白丁香 白附子 麝香各等分 防风 荆芥穗 羌活 独活各减半

【用法】上为末，罐收。洗面，一日三次。

【功用】白面嫩肌。

【主治】黧黑斑、雀斑、粉刺。

【宜忌】《金鉴》：戒忧思劳伤，忌动火之物。

19527 玉容散

【方源】《种福堂方》卷四。

【异名】玉容粉（《集验良方拔萃》卷四）。

【组成】白僵蚕 白附子 白芷 山奈 硼砂各三钱 石膏 滑石各五钱 白丁香一钱 冰片三分

【用法】上为细末。临睡用少许水和，搽面；人乳调搽更妙。

【功用】《集验良方拔萃》：润颜色。

【主治】雀斑。

19528 玉容散

【方源】《女科切要》卷八。

【组成】香芷五分 肥皂一两 细辛一钱半 甘松二钱半 荆芥五钱 木贼三钱 白丁香二钱 杏仁三钱 花粉五钱 蕤仁五钱 藿香叶三钱 天虫五钱 山奈一钱半 陀僧五钱 玄明粉三钱 轻粉二钱 硫黄一钱 铅粉一两 苏合油五钱（后入） 冰片一钱

【用法】上为细末。临睡吐津调匀，擦面过夜；次日清早用煮酒一杯冲热水洗去，再拍玉容粉。

【主治】妇女面无私彩，颜色白而不润泽。

19529 玉容散

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】绿豆粉二钱 白附子 白芷 白藜 白僵蚕各一两 官粉五钱 明粉 防风 零陵香 排草香各二两 上冰片二钱 山奈 檀香各二两

【用法】上为末，用绢罗筛二三次，至极细。为清凉性之涂搽剂。

【功用】祛风止痒，化斑点。

【主治】脾湿受风，血热发斑，黑白斑痕，癩痒硬坚。

19530 玉容散

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】绿豆粉 90 克 白菊花 30 克 白附子 30 克 白芷 30 克 食盐 15 克 冰片 1.5 克

【用法】上为细末。用清水调匀外搽，代肥皂洗面，外搽 10 分钟后洗去。

【功用】祛风利湿，消斑润肤。

【主治】黄褐斑，痤疮，扁平疣等。

19531 玉容膏

【方源】《御药院方》卷十。

【异名】玉容西施膏（《东医宝鉴·杂病篇》卷九引《袖珍》）。

【组成】黄耆（去粗皮，锉） 当归（去芦头，锉） 白芍药（锉） 白芷（锉） 川芎（锉） 藿香叶 零陵香 白檀（锉） 白附子（锉） 白及（锉） 白藜（锉） 各一两 瓜蒌一个 杏仁（汤浸，去皮尖，研如泥膏）一两 龙脑二钱 清油四斤

【用法】上药除龙脑，一十三味入清油浸三日，用银器内慢火熬，令药焦黄色，用新绵滤过，去药滓，放温，入黄蜡熔，令匀，再用新绵滤过，入龙脑，不住手用柳木篦子搅，候冷，密封；冬用三两油，一两蜡，夏月五两油，二两蜡，腊月熬蜡，油入蜡。每用少许涂摩，热为度；如耳鼻有疮，用绵杖儿点少许在疮上。

【功用】舒缓筋，通流血，消肿止痛，发散邪毒。

【主治】皮肤骨疮癬痒，唇裂面皱风刺，及打扑伤损。

19532 玉容膏

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】香油二两 黄蜡一两（二味化开）

黄丹末一钱 寒水石(火煨)一两

【用法】上为细末,溶化为膏。纸摊,贴患处。

【功用】生肌止痛。

【主治】发背痈疽溃烂。

19533 玉容膏

【方源】《疡医大全》卷九。

【组成】败龟版一两 胎发 猪毛 羊毛 鹅毛 鸡毛各四两 牛油 猪板油 桐油各二两 飞黄丹八两(炒) 麻油一斤

【用法】同熬枯,滤清,以丹收之。摊贴。

【主治】诸恶疮久不收口,以及臃疮。

19534 玉浆散

【方源】《普济方》卷一九〇引《传信方》。

【组成】白面不拘多少

【用法】每服三钱,用冷水调下。

【主治】大衄。

19535 玉浆散

【方源】《医方类聚》二五〇引《永类铃方》

【组成】滑石一两 甘草二钱(炙)

【用法】上为末。三岁一钱,灯心汤送下。

【主治】小儿小便不通,茎中淋痛,口燥烦渴。

19536 玉浆散

《普济方》卷四〇三。为原书同卷“滑石散”之异名。见该条。

19537 玉屑丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】槐根白皮(去粗皮) 苦楝根白皮(去粗皮)各三两 椿根白皮(去粗皮)

以上三味,采时春宜早,秋宜晚,取嫩新润者为妙,细锉,同捣令烂极细,更用后药一处拌令匀:

天南星(生,末) 半夏(生,末)各半两 威灵仙(去土,末)一两 寒食白面二两

【用法】上药拌令匀,滴水为丸,如梧桐子大。每服三十丸,先用水一盏煎令极热,次下药煮,令浮上为度,用煮药汤下药,不嚼,

食前服。

【主治】①《圣济总录》:肠风泻血及脏毒不止。②《普济方》:痔疾有头,生于肛边如鼠乳,及生疮痛痒不止,下脓血,冷疼后重。

【方论选录】《本事方释义》:槐根白皮气味苦寒,入手足阳明;苦楝根气味苦寒,入足厥阴;椿根白皮气味苦寒,入手足阳明;天南星气味苦辛温,入手足太阴;半夏气味苦辛温,入足阳明;威灵仙气味微辛咸平,通利诸经络;寒食面气味甘温,入足阳明。此治肠风下血久不能止者,以味苦者坚其阴;以味辛者通其阳,则阴阳既得和平而病自愈矣。

19538 玉屑丸

【方源】《普济方》卷三二〇。

【组成】半夏一两(姜制) 生姜一两(炒片子) 白矾(枯) 百部一两(醋炙)

【用法】百部共矾为末,半夏、生姜同煮令烂,去生姜,将半夏研如泥,复捣百部、矾为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后、临卧姜汤送下。

【主治】咳嗽涎盛痰壅,咽喉不利。

【备考】方中白矾用量原缺。

19539 玉屑饭

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】粳米饭一盏 绿豆粉四两(锉)

【用法】将饭散于粉内,拌令匀,入汤内煮令熟,用豉汁和食之。

【主治】胸中伏热,心烦躁闷,口干气逆。

19540 玉屑散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】寒水石(研) 马牙消(研)各一分 贝母(去心) 知母各一分半 荷叶一两(水煮七沸,焙干)

【用法】上为细散。每服半钱匕,食后蜜水调下。

【主治】小儿中热积惊,及时疾后鼻衄。

19541 玉屑散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】石膏(煨)

【用法】上为细末。每服二钱，葱白点茶调下。

【主治】伤寒发热，涎潮上厥，伏留阳经，头疼眩暈不可忍。

19542 玉屑散

【方源】《咽喉脉证通论》。

【异名】五马破曹。

【组成】薄荷三两（另研） 官硼三钱五分 雄黄三钱 儿茶一钱 冰片三分

【用法】上为细末，贮瓷瓶内。临用挑少许置舌上，咀嚼片刻咽下，日用八九次；如锁喉风、口内干枯、牙关紧闭不能咀嚼者，以无根水灌下。

【功用】开关生津。

【主治】咽喉口舌颈项破烂诸痛。

【宜忌】脾胃虚弱者不宜多用。

19543 玉屑散

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《修月鲁般经》。

【组成】桂府滑石

【用法】上为末。以米汤调下。后服妙灵散。

【主治】瘰癧疮。

19544 玉屑散

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】葫芦壳（烧灰，出火气）

【用法】上为极细末。清晨饮汤调下。

【主治】肠风痔漏。

19545 玉屑膏

《兰台轨范》卷五。为《三因》卷九“玉屑膏”之异名。见该条。

19546 玉屑膏

【方源】《外台》卷三十二引《古今录验》。

【组成】玉屑 珊瑚 木兰皮各三两 辛夷（去毛） 白附子 芎藭 白芷各二两 牛脂五两 冬瓜仁十合 桃仁一升 猪脂五合 白狗脂二斤 商陆一升

【用法】上切，煎三上三下，白芷色黄其膏成。洗面，涂膏。

【功用】《圣济总录》：令光白。

【主治】面黧皤。奸。

【备考】《圣惠》本方用法：先于银锅中以文火大消诸般脂令溶，后下诸药同煎三上三下，令白芷色黄为度，滤去滓；下玉屑、珊瑚末，搅令匀，于瓷器中盛，每夜涂面。

19547 玉屑膏

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】玉屑 密陀僧 附子（生，去皮脐，捣细罗为末） 珊瑚各二两

【用法】上为细末。每度以药末二钱，用真牛酥调匀，夜卧时涂面，来日以温浆水洗之。

【主治】伤寒热毒发豌豆疮，愈后满面瘢痕。

【备考】方中白附子，原书卷四十作“附子”。

19548 玉屑膏

【方源】《三因》卷九。

【异名】玉屑散（《兰台轨范》卷五）。

【组成】黄耆 人参各等分

【用法】上为末，用萝卜大者，切一指厚，三指大，四五片，蜜淹少时，蘸蜜炙干，复蘸，尽蜜二两为度，勿令焦，炙熟。点黄耆、人参末吃，不拘时候，仍以盐汤送下。

【主治】尿血并五淋、砂石，疼痛不可忍。

19549 玉屑膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】轻粉 定粉各三钱 密陀僧二钱

【用法】上为细末，用皂角子取白仁，以热浆水浸成膏子，调药稀硬得所。涂患处，不拘时候。

【主治】面颊手指肌肤皱涩不泽。

19550 玉绣球

【方源】《古今医鉴》卷十五引周后峰方。

【组成】水银一钱 枯矾五分 樟脑一钱 大风子二十个 花椒五分 柏油五钱

【用法】上为末，不见水银星。火炙，擦之。

【主治】疥疮。

19551 玉绣球

《寿世保元》卷九。为原书同卷“一扫光”之异名。见该条。

19552 玉黄膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】当归 30 克 白芷 9 克 姜黄 90 克 甘草 30 克 轻粉 6 克 冰片 6 克 蜂白蜡 90~125 克

【用法】先将前四种药浸泡麻油内三天,然后炉火上熬至枯黄,离火去滓,加入轻粉、冰片(预先研末),最后加蜂白蜡熔化(夏加 125 克,冬加 90 克),细搅至冷成膏。

【功用】润肌止痒。

【主治】①《朱仁康临床经验集》:皮肤皴裂。②《中医皮肤病学简编》:疖。

19553 玉雪丹

【方源】《良方集腋》卷下。

【异名】救苦玉雪丹(《全国中药成药处方集》)。

【组成】真犀黄五分 水安息三钱 牛蒡子八钱 车前子八钱 青皮八钱 当门子五分 苏合油二两 大腹绒八钱 陈皮八钱 赤芍八钱 真川连一两(水炒) 半夏曲八钱 大豆卷八钱 花粉八钱 茅术八钱 真珠子三钱 鹅管石三钱 淡豆豉八钱 前胡八钱 木通八钱 血琥珀三钱 广木香八钱 土贝母八钱 防风八钱 辰砂八钱 茯苓皮八钱 大麦仁八钱 生甘草八钱 连翘八钱 冰片三分 左秦艽八钱 六神曲八钱 广藿香八钱 柴胡八钱 槟榔八钱 荆芥八钱 大黄八钱 枳壳八钱 赤苓八钱 枳实八钱 桔梗八钱 建神曲八钱 白术八钱 麻黄八钱(去节) 川桂枝八钱 寒水石一两 真厚朴一两(姜汁炒) 白螺丝壳一钱 石膏八钱(另研)

【用法】上药用阴阳水浸拌一夜,晒干,共为极细末,将麝香、犀黄、苏合油拌入神曲十二两,白蜜二十两,打浆糊丸,带潮每丸重一钱五分,晒极干,外用白蜡为衣。每服一丸,薄荷汤化服。小儿闷痘,开水化服半丸。

【主治】一切咽喉诸症及烂喉斑痧。

【宜忌】孕妇忌服。

19554 玉雪散

【方源】《简明医彙》卷五。

【组成】僵蚕(坚亮者,洗)一钱 山豆根(广西者,取皮研)五分 雄黄(飞) 玄明粉(如无,用焰消炭者) 硼砂(明亮者)各三分

【用法】上为极细末,入冰片二分拌匀。先以箸擦下舌,芦管吹入患处,闭口一时。口噤,吹入鼻。

【主治】咽喉肿痛,单双乳蛾一十八证。

【加减】加薄荷、甘、桔,研末,蜜丸,噙亦佳。

19555 玉匿丸

【方源】《简易方》引《叶氏录验方》(见《医方大成》卷五)。

【异名】三匿丹(《医方类聚》卷一五二引《澹寮方》)。

【组成】大木瓜一个(去皮瓢,作缸子,入附子在内,须留盖子盖之,竹钉签定,蒸熟,取去竹钉) 大附子一个(七八钱重者,用汤浸洗,去黑皮脐,作窍子) 辰砂一两(研,入附子窍内,不尽者留入木瓜内铺盖附子)

【用法】用白瓷碗盛木瓜于甑内,蒸一七日,将于砂钵内烂研如糊,次入干茯神末拌和为丸,如梧桐子大。每服二十丸,人参汤送下;温酒亦可。

【功用】大补心肾。

【主治】心气不足。

【备考】一法用人参切片,砌定附子于木瓜内蒸,尤妙。

19556 玉堂丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】莲须(色黄者佳)一斤 石莲肉(净肉)一斤 芡实(净肉)二两 麦冬(去心)四两

【用法】用公猪肚一个,加入莲肉(带心皮)一斤,入砂锅内,水煮烂去肚,将莲肉晒干,同前药为细末,炼蜜为丸,如梧桐子

大。每服百丸，空心莲须煎汤送下。

【主治】嗜欲无度，梦遗精滑，日夜长流，百方罔效，病将垂危者。

19557 玉匙散

《脉因证治》卷四。为《三因》卷十六“玉钥匙”之异名。见该条。

19558 玉盘散

【方源】《百一》卷九。

【组成】糯米二升（浸，捣为粉，晒令极干。若微湿则损香）黄明胶一斤（用牛皮胶半斤亦得，炙令通起，捣筛，余者皆炒作珠子，又捣取尽）皂角（去皮）二斤 干楮实一升 白及 白薇 白芷 白术 藁本 川芎 细辛 甘松 零陵香 白檀香各一两

【用法】上为末，相合成澡豆。皂角末别入，看澡豆紧慢添减。以洗面不炽为度，药末不可太细。

【主治】①《普济方》：风刺。②《医方类聚》：头痛。

19559 玉盘散

【方源】《疡医大全》卷十二。

【组成】白牵牛 甘松 香附 天花粉各一两 藁本 白薇 白芷 白附子 官粉 白及 大黄各五钱 肥皂一斤（捶烂）

【用法】同药和匀。每日擦面。

【主治】男妇面上雀斑，粉刺。

19560 玉液丸

【方源】《局方》卷四。

【异名】玉液化痰丸（《鸡峰》卷十八）。

【组成】寒水石（烧令赤，出火毒，水飞过）三十两 白矾（枯过，研细）半夏（汤洗七次，为细末）各十两

【用法】上合研，以白面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后、临卧温生姜汤送下。每服三十丸亦得。

【功用】化痰涎，利咽膈，清头目。

【主治】痰饮，风壅，咳嗽，烦热。

19561 玉液丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】百药煎一两 麝香（研）朴消各

半钱 丹砂二钱（研）龙脑（研）甘草末各一钱

【用法】上药各为末，再同研匀细，以水浸蒸饼心为丸，如梧桐子大，更用丹砂为衣，阴干。含化一丸。

【主治】毒气壅寒，咽喉不利，颊颌连肿。

19562 玉液丸

【方源】《医方类聚》卷一一九引《王氏集验方》。

【组成】天南星 半夏各一两（各用姜汁制一宿）白矾（枯）杏仁（去皮尖，麸炒）猪牙皂角（去皮弦子）青黛各半两 焰消三钱 巴豆二十一个（去壳，生用）

【用法】上为末，姜汁煮面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，小儿五丸，临卧姜汤送下。

【主治】诸般咳嗽。

19563 玉液丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】软石膏不以多少（又云：火煨红，出火毒）

【用法】上为末，醋糊为丸，如绿豆大。服之。

【功用】泻胃火。

【主治】食积、痰火。

19564 玉液丸

《普济方》卷一六五。即《朱氏集验方》卷五引赵鲁公方“玉浮丸”。见该条。

19565 玉液丸

【方源】《幼科指南》卷三。

【组成】橘红（盐水炒）枳实（炒）桔梗 半夏（制）甘草 苏子（炒）白茯苓 卜子（炒）各二钱

【用法】上为末，神曲糊为丸。白汤送下。

【主治】咳嗽因于痰者；或母乳多涌出，儿小吞咽不及，呛出而成痰嗽者；或因儿啼声未息，气未平，即与乳食，气逆而嗽者，此乳夹痰而嗽也。

19566 玉液丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】硼砂二两（细研）

【用法】上以好纸一张，裹却礞砂，以线紧系定。用瓷罐子一枚，可盛一升物者，先下黄丹五六两，便安礞砂裹子在中间，又以黄丹五六两盖之。然后以瓦子盖瓶口，于瓦桶子内砖上坐之，用粗谷糠三斗盖之。上以火烧一日，住火自销，候冷取出，去却黄丹，细研，以面糊为丸，如绿豆大。每服五丸，空心以盐汤送下。

【主治】男子元气，妇人血气，久积虚冷，脐腹疼痛。

19567 玉液丹

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】白矾二两（熬令汁枯） 硫黄 消石各半两

【用法】上为末，即入砂瓶子内，以炭火熔成汁，取出候冷，更研令细，用面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，空心米饮送下。

【主治】休息痢；兼治肠风痔漏诸疾。

19568 玉液丹

《普济方》卷三七一。即《圣惠》卷八十五“正液丹”。见该条。

19569 玉液丹

【方源】《医医大全》卷十六。

【组成】五倍子（拣明净者，敲作小块，去净虫网蛀屑。用好六安茶泡汁，待温浸洗，滤去茶汁。再用糟坊白药丸，研筛拌匀，放瓷器内，棉花覆紧，放于暖处，候生白毛为度。用筛盛放风日中，晒令极干，筛净白毛。如筛不尽，可用布将毛拭净。净末）十两 儿茶 生甘草各二两 苏薄荷叶 乌梅肉各一两

【用法】上为极细末。梨汁为丸，如龙眼核大。凉干收贮。每用一丸，清茶调匀，青绢蘸敷患上。

【主治】走马牙疳。

19570 玉液汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】天南星（炮） 半夏（汤洗七遍，去滑）各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加生姜五片，同煎至七分，去滓放温，食后夜卧细细呷之。

【功用】去痰涎，利胸膈。

【主治】咳嗽。

19571 玉液汤

【方源】《医方类聚》卷一〇九引《济生》。

【组成】半夏（洗净，汤泡七次，切作片子）

【用法】每服四钱，水二盞，加生姜十片，煎至七分，去滓，入沉香一呷温服，不拘时候。

【主治】七情伤感，气郁生涎，随气上逆，头目眩晕，心嘈忪悸，眉棱骨痛。

19572 玉液汤

【方源】《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。

【组成】牛膝一斤 天麻五两 秦艽一两 防风二两 枸杞二两 蚕沙二两（拣净） 大栗子（炒熟，用肉）一斤 桔梗二两 当归一两八钱 苍术二斤（泔浸，去皮，蒸熟） 地黄一两八钱

【用法】上俱各洗净，细切，用无灰酒二斗，瓷缸内浸，用白纸七重，封七日，取用药时，人面不得于缸口上觑。每服酒一盞，一日三次。虽患年深，亦不过二斗酒。

【功用】除风痰。

【主治】诸般风疾，麻痹痿痹，动止不得。

【宜忌】忌湿面，动风之物。

【临证举例】汴梁州判王义甫患风年半，服此药酒，未及二斗，疾痊。

19573 玉液汤

【方源】《医方类聚》卷一六五引《御医撮要》。

【组成】缩砂半两 薯蓣一两 甘草四两 豆蔻一个半

【用法】上为细末，入龙脑半钱。每服一钱，入盐少许，如茶点进。

【功用】消酒，利胸膈。

【主治】酒病。

19574 玉液汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两 生黄耆五钱 知母六钱 生鸡内金二钱(捣细) 葛根一钱半 五味子三钱 天花粉三钱

【主治】消渴。

【宜忌】忌食甜物。

【方论选录】消渴之证，多由于元气不升，此方乃升元气以止渴者也。方中以黄耆为主，使葛根能升元气，而又佐以山药、知母、花粉以大滋真阴，使之阳升而阴应，自有云行雨施之妙也；用鸡内金者，因此证尿中皆含有糖质，用之以助脾胃强健，化饮食中糖质为津液也；用五味者，取其酸收之性，大能封固肾关，不使水饮急于下趋也。

【临证举例】邑人某，年二十余，贸易津门，得消渴证。求津门医者，调治三阅月，更医十余人，不效，归家就医于愚。诊其脉甚微细，旋饮水旋即小便，须臾数次。投以玉液汤，加野台参四钱，数剂渴见止，而小便仍数，又加萸肉五钱，连服十剂而愈。

19575 玉液饮

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】甘草(炙，锉) 杏仁(去皮尖双仁，研) 人参 陈橘皮(汤浸去白，焙) 五味子(炒) 各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水二盏，加生姜三片，大枣一枚(擘)，同煎至一盏。去滓温服，不拘时候。

【主治】咳逆短气，喘息气不相续。

19576 玉液散

【方源】《博济》卷三。

【组成】半夏一两 生姜二两(去皮，切细) 陈粟米一合(拣令净，约重二两)

【用法】上药一处烂捣，研，晒，焙干，为末。每服一大钱，水一盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】①《博济》：胃虚有痰。②《御药

院方》：咳嗽呕逆，不思饮食，烦躁恶心。

19577 玉液散

【方源】《普济方》卷一六三引《指南方》。

【组成】团参 川芎 茯苓 官桂 知母 杏仁 葶苈 柴胡 半夏各一两 麻黄 石膏 橘皮 白术各一两 诃子 羌活 秦艽 甘草各半两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，加生姜五片，大枣一个，煎一盏，去滓温服。

【主治】①《普济方》引《指南方》：喘。②《鸡峰》：咳喘，肺胀。

【备考】方中秦艽，《全生指迷方》作“马兜铃”。

19578 玉液散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【异名】千缙汤(《保命集》卷下)。

【组成】半夏二两(大者，净洗去脐) 皂荚二十挺(去皮子，锉，水一斗同半夏煮至五升，取出半夏，薄切焙干)

【用法】上只取半夏为散。每服半钱匕，水一盏，加生姜一片，煎至四分。食后温服。

【主治】肺嗽痰唾。

19579 玉液散

【方源】《得效》卷五。

【组成】瓜蒌根 知母 贝母(去心，炒) 各一两 甘草(炙)半两 人参半两

【用法】上为末。每服二钱，先熔下黄腊二钱，同入米饮调下，食后服。

【主治】久近喘嗽，口干作渴。

19580 玉液散

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】丁香一钱 藿香半两 桂府滑石四两

【用法】上为末。每服一钱，清泔水半盏调下，冷服；夫人霍乱吐利，每服三钱，水打腊茶清调下。

【主治】小儿呕逆吐利，霍乱不安，烦躁不得卧，及腹胀，小便赤，烦渴闷乱，或伤寒疟病。

19581 玉液散

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】柞树皮 白芍 当归各二钱 地榆 丹参各一钱五分 熟地五钱 葛根八分 甘草一钱 黄连一钱五分(用吴萸四分同炒,去吴萸)

【用法】上为末,和匀。每服五钱,乌梅汤调下。

【主治】大便下血。

19582 玉液煎

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】石膏五钱 生地五钱 石斛三钱 麦冬二钱 玉竹四钱 葛根二钱 桔梗一钱 薄荷一钱 白茅根八钱 甘蔗汁半杯(冲服)

【主治】胃火炽盛,烦渴引饮,牙龈腐烂,或牙宣出血,面赤发热。

19583 玉液膏

【方源】《续本事》卷二。

【组成】紫苏四两 板桂半两 甘草 白梅肉各二两

【用法】上为末。捣白梅肉为丸,如鸡头子大。每服三丸,含化。

【功能】生津液。

【主治】消渴。

19584 玉液膏

【方源】《普济方》卷一五七引《德生堂方》。

【组成】人参 乌梅肉 五倍子 五味子 诃子肉 玄明粉 甘草各一两

【用法】上为细末。每用四分,临卧、食后用舌尖舔药末徐徐咽下。津液自生,咳嗽自愈。

【主治】远年近日咳嗽气喘,逆满倚息,开目不爽,语音不响,服诸药不效者。

19585 玉液膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】香油二两,黄蜡一两

【用法】将香油熬滚,入黄蜡化开,再以黄丹、寒水石(煨)各一两研细投入,熔化为膏。摊贴。

【功用】生肌止痛。

【主治】发背痈疽溃烂。

19586 玉散子

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】烂寒水石灰

【用法】上为末。三岁儿半钱,姜水调下。

【主治】小儿只吐不泻,腹中疼。

19587 玉锁丸

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】败荷叶(晒干,不见火)二两 白茯苓 牡蛎(左顾者,煨过)各一两 龙骨(用五色真者,另研)三钱

【用法】上为细末,研匀,以败蜡熔和为丸,如梧桐子大。如无败蜡,以蜡糊代之。每服三五十丸,空心用麦门冬汤送下,一日二次。如觉阳道衰微,小便清,梦遗止,即住服。

【功用】大衰痿阳道,止妄心。

【主治】梦遗失精,小便白浊。

【宜忌】忌酒,并热面、动风等物。

【备考】惟修真养性之士宜服之。如欲阳道如故,即以麝香酒解之。

19588 玉锁丹

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】破故纸 葫芦巴 吴茱萸各四两

【用法】上药炒香熟,捣罗为细末。分一半用羊白肠盛药末,酒煮香熟,去白肠,取药末。一处同分下药末同拌和匀,用煮药酒煮白面糊为丸。每服五十丸,加至一百丸,空心温酒或盐汤送下。

【主治】男子肾脏小肠等疾,及饮酒过多,大便滑泻青沫,遍数频并。

19589 玉锁丹

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】鸡头肉末 莲花蕊末 龙骨(别研) 乌梅肉(焙干,取末)各一两

【用法】煮山药糊为丸,如鸡头子大。每服一丸,空心温酒、盐汤任下。

【功用】《御药院方》:涩精养气壮阳。

【主治】梦遗漏精。

19590 玉锁丹

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】绛矾一钱(枯) 龙骨一钱(煨) 茴香一分(淘去沙,炒) 远志半两(去心,炒) 黑牵牛三分(炒) 牡蛎一两(童子小便浸三日,每日换取出,醋面裹,煨通红,别研) 菟丝子一分(酒煎蒸,再用酒浸一宿,研烂成饼)

【用法】上为细末,蒜煨取汁为丸,如梧桐子大。每服五丸,空心麝香酒送下。

【主治】白浊。

19591 玉锁丹

《普济方》卷二十九引《仁存方》。为《局方》卷五(续添诸局经验秘方)“秘传玉锁丹”之异名。见该条。

19592 玉锁匙

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】僵蚕 硼砂(煨) 冰片少许 白芷各等分

【用法】上为末。每用一指面,指揩牙床上。三次即愈。

【主治】牙疳。

19593 玉锁匙

《痘疹活幼至宝》卷终。为《三因》卷十六“玉钥匙”之异名。见该条。

19594 玉锁匙

【方源】《疡医大全》卷十七。

【异名】开关玉锁匙(《咽喉经验秘传》)。

【组成】巴豆

【用法】压油于纸上,拈成条子,点灯灭火,以烟熏入鼻中。一时鼻若流涕,其关即开。

【主治】①《疡医大全》:咽痛;②《咽喉经验秘传》:牙关紧闭。

19595 玉锁匙

【方源】《验方续编》卷下。

【组成】明矾一两

【用法】银罐内溶化,即下巴豆二十一粒,候矾枯取起,放在地上,越宿,次早去巴豆,用矾研末。每用少许吹患处。

【主治】双乳蛾。

【宜忌】孕妇忌之。

19596 玉锁匙

【方源】《喉科秘诀》卷下。

【组成】珍珠二分 朴消三分 儿茶二分 冰片五厘 僵蚕三分 牙皂三分

【用法】上为细末。吹喉三四次。立效。

【主治】喉风。

19597 玉锁匙

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】马牙消三钱 硼砂三钱(用新炼银罐,先硼后消,层层间炼,如升枯矾之状,松脆为妙) 冰片六分 僵蚕(炒研)五分 雄黄五分

【用法】上为极细末,收贮瓷瓶内。用少许,吹患处。痰涎即出。

【功用】清热消肿,解毒,利咽喉。

【主治】乳蛾喉痹,缠喉风症,痰壅口噤,痧疹毒盛,咽喉肿痛,甚则糜烂。

19598 玉锁散

《不知医必要》卷二。即《局方》卷五(续添诸局经验秘方)“秘传玉锁丹”改为散剂。见该条。

19599 玉锁散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】山药七两半 当归 桂 神曲 熟地黄 大豆卷各二两半 甘草 人参各一两七钱半 芎 白芍药 白术 麦门冬 杏仁 柴胡 白茯苓各一两八分 阿胶一两三分 干姜三分 白薇半两 防风一两半 枣一百个 桔梗一两

【用法】上为细末。每服三钱,食前温米饮调下。

【主治】气虚有热,状如劳瘵者。

19600 玉锁散

【方源】《幼幼新书》卷三十九引《灵苑方》。

【组成】蓖麻一两(去壳) 寒水石(细研如粉)

【用法】蓖麻研如膏,旋入石末同研,但旋添入石末袞得干成粉即止,不拘分两也。有

被哽者，只取一捻致舌根深处，以冷水咽之，其哽物自然不见，可用竹木片于舌深处用药试之，立验。

【主治】大人小儿一切骨哽或竹木签刺喉中不下。

19601 玉鼠散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】新生小鼠

【用法】新瓦上焙干，研末。用启膈饮加味调下。

【主治】噎膈。因于气郁挟痰阻塞胃脘者。

19602 玉蝉散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】人参（去芦头） 蓖麻叶（经霜者） 桑叶（经霜者） 诃子肉各半两 钟乳粉一两

【用法】上为细末。每服二钱，食后糯米饮调下。

【主治】肺气发喘，坐卧不得。

19603 玉簪消

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】硃砂少许 白矾皂子大 马牙消一分 消石四两 黄丹五钱 巴豆六粒 蛇蜕一条（全者）

【用法】上药用瓷锅子，依次第逐旋下，药下到巴豆时，须逐个咬破下，候火蝴蝶尽，方再下一个，如此六次。然后旋下蛇蜕方成，候冷，罐子自破，药作块。每用一字，以竹筒子吹入喉中；如些小咽喉不利，只含化少许。

【主治】喉闭。

19604 玉簪散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】玉柱散（《医方类聚》卷二四五引《医林方》）。

【组成】甘草一寸（煎水） 甘遂末一字

【用法】上同油、蜜、生姜，银钹儿搅，调下后，用冷水半盏，调夺命散。

【主治】小儿马脾风。

19605 玉簪煎

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】蛔虫二条（小儿口中吐出者为上）

【用法】将虫于瓷盒子中盛，用纸裹，向湿地埋五十日后取出，其虫化为水，以瓷瓶子盛。每日以铜箸点少许，著目眦头，及夜卧时，再点之。

【主治】小儿胎赤眼，及风赤眼。

19606 玉蕊丸

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】丹砂（研） 硃砂（研） 滑石（研） 瞿麦穗 海金沙各一分

【用法】上为末，另研蓖麻子仁为丸，如梧桐子大。每服十丸、十五丸，葱白煎酒送下。

【主治】小便不通，气上冲，心胸满闷。

19607 玉蕊丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【异名】玉蕊丹（《百一》卷四）。

【组成】木香三分 茴香子（炒） 蝎梢各半两 附子（炮裂，去皮脐）一两 白矾（烧令汁枯）一分 阳起石（煨） 硫黄（研）各半两 硃砂（飞研）一分

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下。小肠膀胱气痛，烧绵灰热酒送下；阴阳二毒伤寒，甘草汤送下；泻痢虚滑不止，腹内撮疼，煎艾汤送下；妇人赤白带下，没药酒送下；脾胃虚弱，米谷不化，温酒送下，并食前服。

【主治】元阳虚惫，脐腹冷疼，面黄肌瘦，多困少力，腰膝酸痛，饮食减少；膀胱小肠气痛；脾虚滑泄。

19608 玉蕊丸

【方源】《永乐大典》卷九七八引《聚宝方》。

【组成】天南星（去皮脐） 半夏（去脐） 白僵蚕（直者）各半两 定粉一钱 膩粉 水银各半钱（同膩粉研匀）

【用法】上为末，研匀，糯米粥为丸，如梧桐子大。头风加脑风，头旋目晕涎溢，用薄荷腊茶嚼下二丸；如要利，加至五丸；急风，薄荷酒嚼下十丸，以利为度；妇人血风，荆

芥酒下二丸；小儿急慢惊风，金银薄荷糯米煎汤化下一丸至二丸。

【主治】小儿急慢惊风。

19609 玉蕊丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】白丸子 金液丹各五十丸

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】胃虚，因吐生风。

19610 玉蕊丹

《百一》卷四。为《圣济总录》卷一八七“玉蕊丸”之异名。见该条。

19611 玉蕊散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】滑石二两 硫黄一两 丁香 肉豆蔻各半两

【用法】上为细末。每服一钱，食前米饮调下。

【功用】止吐逆。

19612 玉颜膏

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】黄柏（去皮）一两 绿豆粉四两 生甘草四两 红花二两

【用法】上为极细末，香油调成膏。从耳前眼唇面上并涂之，一日三五次。

【主治】痘疮初起。

【备考】痘疮初出，先用此药涂面。若用之早，则痘疹不生于面；用之迟，虽出亦稀少。

19613 玉糊膏

《疡科纲要》卷下。为《外科正宗》卷四“清凉膏”之异名。见该条。

19614 玉燕膏

【方源】《上池杂说》。

【组成】川山甲 全蝎 白芷 黄连 全当归 黄芩各二两 生地 赤芍 番木鳖各一两 官桂 海藻各四两

【用法】上用麻油二斤四两，入锅熬枯，去滓净，入飞丹十两，黄蜡七钱，白蜡三钱，铅粉二两，收成膏，投入水浸，取起晾干，再入锅熔化，加乳香、没药、轻粉各二钱，磨

香、雄黄、朱砂各一钱，朝北燕窠泥、雄鼠粪各五钱，血竭一两，共为细末，离火入前膏内，搅匀收贮。

【主治】瘰癧，痰核。

19615 玉霜丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】天雄十两（长大者，以酒浸七日了，掘一地坑，以半称炭火烧坑通赤，速去炭火令净，以醋二升泼于地坑内候干，乘热便投天雄在内，以盆合土拥之，经宿取出，去皮脐）磁石（醋淬七次，更多为妙）朱砂（飞研）泽泻（洗，酒浸一宿，炙）牛膝（去苗，酒浸，焙干）石斛（去根，炙）苁蓉（去皮，酒浸一宿，炙干）巴戟（穿心者）各二两 茴香（炒）肉桂（去粗皮）各一两 家韭子（微炒）菟丝子（酒浸一伏时，蒸过，晒干，杵，罗为末，去轻浮者）各五两 牡蛎（火煨，捣为粉）紫梢花（如无，以木贼代之）各三两 鹿茸（用麻茸连顶骨者，先燎去毛令净，约三寸以来截断，酒浸一伏时，慢火炙令脆）半两 白龙骨一斤（粘舌者，细研如粉，以水飞过三度，日中晒干，用黑豆一斗，蒸一伏时，以夹绢袋盛，日晒干）

【用法】上为末，炼酒、蜜各半和丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、晚食前温酒送下。

【功用】续骨联筋，秘精坚髓，延年保命，却老还童，安魂定魄，换肌秘气，轻身壮阳，益寿住世。常服补真气，壮阳道。

【主治】真气虚惫，下焦伤竭，脐腹弦急，腰脚软痛，精神困倦，面色枯槁，或亡血盗汗，遗沥失精，大便自利，小便滑数，肌肉消瘦，阳事不举。

19616 玉霜丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】半夏（汤洗七遍，去滑）滑石（研）各二两 寒水石（煨，研）四两 白矾（飞过）一两半 白附子（生用）一两

【用法】上为末，以白面糊和丸，如梧桐子大。每服十丸，食后生姜汤送下。

【功用】清头目，利咽喉。

【主治】风痰。

19617 玉霜丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】砒霜(研细如粉)二两 黄蜡一两

【用法】上药以瓷碗盛，重汤煮熔开，以东南柳枝二七茎，各长七寸，粗细如箸，每用两茎搅药，又转一头搅，候两头并黑黄色乃已；又取两茎，依前搅七次了，将出药趁软作条子收。遇病旋于火上烘软为丸，如梧桐大。小儿每服绿豆大一丸，空心新汲水送下。

【主治】水泻白痢，小腹疼痛。

19618 玉霜丸

【方源】《普济方》卷三八七引《全婴方》。

【组成】粉霜半两 半夏(姜汁浸一宿)一两

【用法】上为末，白糊为丸，如芥子大。每服三岁三丸，姜汁汤送下。

【主治】小儿咳嗽涎盛，咽喉不利。

19619 玉霜丸

《普济方》卷二一九。即《局方》卷五(吴直阁增诸家名方)“张走马玉霜丸”。见该条。

19620 玉霜丹

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】砒一两 焰消半两(以上二味同研细，以浓墨汁涂纸，候干，裹作十裹，先用熟炭火三斤烧一新坩锅子令红。先下一裹药，候烟尽，再下一裹，如此下十裹，药尽，看坩锅子内其信砒砒如汁，即倾出碟子内，候冷，研细) 寒水石一两(火煨过，候冷，研细) 白石脂一两(研细)

【用法】上为末。水和为丸，如鸡头子大，日中晒令极干，再入坩锅子内，上用园瓦子盖口，以熟炭五斤煨通红为度，倾出碟内如玉色，候冷，瓷盒收之。每服一丸或二丸，虚冷、吐泻、腹痛、下痢赤白，用米饮送下；妇

人子宫久冷、赤白带下，腹肋撮疼，用冷醋汤送下，空心服。

【主治】男子虚冷，妇人带下，及一切泻痢之疾。

19621 玉霜散

【方源】《准绳·女科》卷二。

【组成】石膏二两(细研，水飞过) 寒水石一两(细研)

【用法】上为末。每服一钱，以生地黄汁调下，不拘时候。

【主治】妇人客热烦渴，头痛痰涌如泉。

19622 玉霜膏

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】朴消二斤 牙消半斤 硼砂四两 矾石三两

【用法】上为末，火熔成汁，筑一地坑子，令实，倾入盆，覆一夕，取杵为末，入龙脑二两研匀。每服一钱，新汲水半盏合生蜜调下。小儿量与服。

【主治】一切热毒喉闭。

19623 玉螺丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】井泉石(研)五两 丹砂(研)三两 铁精(研) 芒消(研) 黄环各二两大黄(锉，炒) 黄连(去须) 丹参 地龙(炒)各一两

【用法】捣罗五味为末，与四味研者和匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，平旦时及初更后浓煎麦门冬汤送下。以知为度。

【主治】上焦热结，心气懊恼，振掉谵语。

19624 玉蟾散

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】蚶皮(即虾蟇不鸣不跳者是。用黄泥裹，火煨焦)二钱半 黄连二钱半 青黛一钱 麝香少许

【用法】上为末。湿则干掺，干则香油调抹之。先用甘草汤洗尽，令血出涂之。

【主治】小儿走马牙疳，牙龈臭烂，侵蚀唇鼻，身上肥疮。

19625 玉爆肚

《卫生宝鉴》卷十五。为《医方类聚》卷二一〇引《施圆端效方》“温内玉抱肚”之异名。见该条。

19626 玉爆丸

【方源】《普济方》卷四十引《博济》。

【组成】半夏(汤洗七次,为末,姜汁和作饼子,焙) 白附子(炮) 天南星(炮) 各二两 龙脑(研) 一分 白矾(研) 一分

【用法】前三味为末,研入白矾、脑子令匀,煮姜汁面糊为丸,如豌豆大。每服二十丸,食后姜汤送下。

【主治】风痰气厥,攻击头痛,胸膈不利,呕逆食少。

19627 玉露丸

【方源】《厘仙活人方》。

【组成】白龙骨(粘舌者,九蒸,久晒,为末) 菟丝子(酒浸,焙干用,别研) 韭子(新瓦上微炒) 各三两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前与金锁丹相间服。

【功用】助元阳,闭精气,补脑髓,固真不泄

【主治】遗精。

【宜忌】初服忌房事。

19628 玉露丸

《医学入门》卷六。即《小儿药证直决》卷下“玉露散”制成丸剂。见该条。

19629 玉露汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】陈茶叶 川黄连 荆芥穗 薄荷 甘草

【主治】初生喉肿。

19630 玉露饮

《活幼心书》卷下。为《小儿药证直决》卷下“玉露散”之异名。见该条。

19631 玉露饮

【方源】《普济方》卷一九引《仁存方》。

【组成】寒水石 石膏 滑石各等分

【用法】上为极细末,入朱砂,如桃花色。

每服一钱匕,食后麦门冬汤调下。

【主治】心肺上膈壅热,烦躁口干,生疮,小便赤涩。

19632 玉露饮

《医学六要·治法汇》卷七。为《卫生家宝产科备要》卷三“玉露散”之异名。见该条。

19633 玉露饮

【方源】《慈幼新书》卷一。

【组成】人参 茯苓 甘草 芍药 川芎 当归 枳壳 桔梗

【主治】产后无乳。

19634 玉露饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】大白萝卜一个

【用法】切下蒂,挖空,入白糖填满,仍盖定,以线扎紧;取鲜稻上露三碗,煮极烂,以纱笼罩,露一宿,煨温,空腹服。

【主治】邪热伤肺胃营分而吐血者,并治烟酒过度,致咳血失血久不愈。

19635 玉露饮

【方源】《感证辑要》卷四。

【组成】羚羊一钱五分 桑叶二钱 制西洋参三钱 象贝二钱 薄荷六分 飞滑石三钱 金银花三钱 连翘一钱五分 元参三钱 淡竹沥八钱(微点姜汁冲) 白僵蚕三钱 带心麦冬二钱 金汁一杯(冲)

【功用】清热

19636 玉露酒

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】薄荷叶五斤 绿豆粉一斤半 白沙糖一斤半 天门冬(去心)一两 麦门冬(去心)一两 天花粉四两 白茯苓(去皮)四两 柿霜四两 硼砂五钱 冰片二钱

【用法】用新盆二个,将薄荷等药层相间隔,著实盛于内,二盆合,封固如法,不许透气,蒸五炷香,取出晒干,抖去群药,止用豆粉,复加白糖、柿霜、硼砂、冰片,随用此药。不拘老幼,并皆治之。不用引子,诸物不忌。

【主治】诸疾痰饮宿滞，噎塞，气痞，奔豚，膨胀，上喘下坠，乍寒乍热，头目晕胀，咽喉肿痛。

19637 玉露散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】甘露散（原书同卷）、玉露饮（《活幼新书》卷下）。

【组成】寒水石（软而微青黑，中有细纹者是）石膏（坚白而墙壁，手不可折者是）各半两 甘草（生）一钱

【用法】上为细末。每服一字或半钱、一钱，食后温汤调下。

【主治】①《小儿药证直诀》：伤热吐泻，黄瘦。②《得效》：暑月出痘疹，烦燥热渴。

【备考】本方改为丸剂，名“玉露丸”（见《医学入门》卷六）。

19638 玉露散

【方源】《卫生家宝产科备要》卷三。

【异名】玉露饮（《医学六要》卷七）。

【组成】茯苓（锉）人参（去芦，切片）甘草（炙）各半两 桔梗（去芦，切，焙）白芷（洗，锉）川芎（洗，锉）各一两 川大黄（湿纸裹，慢火煨熟，锉）当归（去芦须，切）各一分 芍药三分（洗，锉）

【用法】上为末。每服二平钱，水一盏，煎至七分，温服，一日三次。

【功用】凉膈，压热，下乳。

【主治】产后乳脉不行，烦热，或大肠滞涩，肢体疼痛。

【加减】若脏腑泄泻，即除川大黄。

19639 玉露散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】寒水石 滑石 石膏 瓜蒌根各四两 甘草二两

【用法】上为细末。每服五钱，新水调下。

【主治】暑病，饥困伤暑，食饮不进，时时呕吐，口中常流痰水，腹肋作痛；霍乱吐泻不止；妇人产后一二日潮热口干。

19640 玉露散

【方源】《普济方》卷三四六引《便产须知》。

【组成】人参 茯苓 甘草 半夏（制）桔梗 川芎 远志（去心） 当归 芍药各等分

【用法】上锉。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，煎大半盏服。

【主治】产后乳脉将行。产三日后，体热头痛，胸膈气刺。

【备考】此证不可便作伤食伤寒，此是乳脉将行。

19641 玉露散

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】不灰木（煨）滑石各等分

【用法】上为细末。每服半钱或一字，生油并水调下。

【主治】小儿吐奶，面色赤热，烦躁。

19642 玉露散

【方源】《校注妇人良方》卷二十三。

【组成】人参 白茯苓 桔梗（炒）芍药各一钱 甘草（炙）六分

【用法】水煎服。

【主治】乳脉不行，身体壮热，头目昏痛，大便涩滞。

19643 玉露散

【方源】《片玉心书》卷四。

【组成】寒水石 滑石各一两 甘草五钱

【用法】上为末。每服一钱，冷水调下；或用此药煎汤吞理中丸。

【主治】小儿五六月泄泻，寒少热多。

19644 玉露散

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】人参 茯苓 当归 白芍（炒）桔梗各一钱 川芎 柴胡 炙甘草各六分

【用法】水煎服。

【主治】乳汁不行，身体壮热，头目晕痛属虚者。

19645 玉露散

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】玉竹四钱 花粉二钱 沙参四钱

麦冬二钱 石斛三钱 贝母二钱 杏仁三钱
茯苓二钱 山药三钱 梨三大片

【主治】瘵症。肺素有热，阳气盛而不衰，故但热而不寒，令人消烁脱肉。

19646 玉露散

《青囊秘传》。为《本草纲目》卷二十六引《鸿飞集》“清凉膏”之异名。见该条。

19647 玉露散

【方源】《汉药神效方》。

【组成】当归 白芍药 桔梗 川芎 白茯苓 天花粉 木通 穿山甲各等分

【用法】以一钱三分为一服服之。

【主治】产乳不足。

19648 玉露膏

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】黄丹半斤 水粉四两

【用法】上为末，用麻油一斤，煎至滴水成珠，方下乳香、龙骨、血竭、儿茶、轻粉（各末）二钱，搅匀，瓷器收贮。摊纸贴之。

【功用】生肌，敛口，止痛。

【主治】痈疽，瘰癧。

【加减】如贴热疮及艾灸火疮，不须下乳香、没药等。

19649 玉露膏

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】芙蓉叶

【用法】上为极细末，用凡士林调（凡士林 8/10，玉露散 2/10）。敷患处。

【功用】凉血退肿。

【主治】①《中医外科学讲义》：一切阳毒之症。②《朱仁康临床经验集》：一切疮、疖、肿毒、痈未破时，丹毒，带状疱疹。

19650 玉露霜

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】白术二两（炒） 陈皮一两五钱 莲肉四两（去心） 薏苡仁四两（炒） 糯米 绿豆 陈米锅焦各一升（俱炒）

【用法】上为末，收贮。每服二三两，临用时量加糖霜，滚水调服。

【主治】老人脾泄。

19651 玉髓丹

【方源】《扶寿精方》。

【组成】软石膏三两 半夏一两（汤泡七次） 白矾五钱

【用法】上为细末，淡姜汤打糊为丸，如赤豆大。每服三十丸，食远茶清送下。

【主治】痰火上涌，或流入四肢，结聚胸背，或咳嗽，或头目不清。

19652 玉髓膏

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】羊骨髓一两 轻粉一钱

【用法】和成膏，涂疮上。

【主治】痘疹。痘痂欲落不落。并可灭瘢痕。

19653 玉竹饮子

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】葳蕤（一名玉竹）三钱 茯苓二钱 甘草一钱 桔梗一钱 橘皮一钱 紫菀二钱 川贝母（去心，研）三钱 生姜（同橘皮蜜煎）四钱

【用法】长流水煎，入熟白蜜二匕，分二服。

【主治】痰火痰涎涌盛，咳逆喘满。

【加减】气虚，加人参二钱；虚火，加肉桂半钱；客邪，加细辛三分、香豉三钱；咽喉不利、唾脓血，加阿胶三钱、藕汁半杯；头额痛，加葱白二茎；便溏，用伏龙肝击碎煎汤，澄清代水煎服；气塞，临服磨沉香汁数匙。

19654 玉华白丹

【方源】《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）引唐冲虚先生三品制炼方。

【异名】震灵丹（《普济方》卷二〇七）。

【组成】白石脂（净瓦阁起，火煨红，研细，水飞） 左顾牡蛎七钱（洗，用韭叶捣，盐泥固济，火煨，取白者） 阳起石（用坩锅于大火中煨令通红，取出，酒淬，放阴地令干）各半两 钟乳粉（炼成者）一两

【用法】上各为极细末，拌和令匀，研一二日，以糯米粉煮糊为丸。如鸡头子大，入地坑出火毒一宿。每服一丸，空心浓煎人参汤放冷送下，熟水亦得；妇人久无妊者，以当

归、熟地黄浸酒送下；久冷，崩带，虚损，脐腹撮痛，艾醋汤送下。服毕以少白粥压之。

【功用】清上实下，助养根元，扶衰救弱，补益脏腑，常服泽肌悦色，祛除宿患。

【主治】五劳七伤，夜多盗汗，肺痿虚损，久嗽上喘，霍乱转筋，六脉沉伏，唇口青黑，腹胁刺痛，大肠不固，小便滑数，梦中遗泄，肌肉瘦瘠，目暗耳鸣，胃虚食减，久疟久痢，积寒痼冷；妇人久无妊，或久冷，崩带、虚损、脐腹撮痛；及久患肠风脏毒。

【宜忌】忌猪、羊血、绿豆粉，恐解药力。

19655 玉华白丹

《普济方》卷三十三引《仁存方》。为原书同卷“四白头”之异名。见该条。

19656 玉米粉粥

【方源】《长寿药粥谱》引《食物疗法》。

【组成】玉米粉 梗米

【用法】先以玉米粉适量，冷水溶和，待梗米粥煮沸后，调入玉米粉同煮为粥。早、晚温热服食。

【功用】益肺宁心，调中开胃。

【主治】高脂血症、冠心病、心肌梗塞、动脉硬化等心血管系统疾病，及癌症的防治。

【宜忌】霉坏变质的玉米或玉米粉不宜煮粥食用。

19657 玉柱杖丸

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】茯苓 诃子（去核） 藿香 丁香 各一钱半 人参 木香 甘草（炒）各半两 厚朴（姜制）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一九，食前白汤化下。

【主治】小儿吐泻，胃虚腹胀，脾困昏睡，不食。

19658 玉柱杖散

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】黄耆 人参 白茯苓各等分

【用法】上为末。每服一钱，水一盞，煎至六分，呷之，不拘时候。

【主治】小儿疳瘦。

19659 玉柱杖散

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】全蝎七个 薄荷十四叶 麻黄七条

【用法】上药以温汤浴润，以两叶裹蝎一个，用川麻黄一条缚定，炒至焦黑，次入白术半两（生姜自然汁浸透，焙干），同为末。每服半钱，煎丁香柿蒂汤调下，不拘时候。

【主治】急慢惊风，发不时省。

【备考】本方方名，《普济方》引作“玉枝散”。

19660 玉柱杖散

【方源】《准绳·幼科》卷八。

【组成】黄耆二两 白茯苓半两 人参 白术各一两

【用法】上为末。以水一盞，药一钱，煎七分，温服。

【主治】小儿疳瘦。

19661 玉带仙膏

【方源】《青囊全集》卷上。

【异名】玉带膏（《青囊秘传》）。

【组成】龙骨二两 官粉一两 月石五钱 梅片五钱 元寸五分 黄蜡四两（提净，开水化溶，切勿入火）

【用法】将药味研细，入蜡和匀，竹片开入纸上；如凝，开水熏气使软，再括纸上均匀，剪贴收用，不可泄气。卧时椒衣水漱口，将条贴之。次早取看，毒重者黑，轻者黄如伤口。

【功用】①《青囊全集》：拔毒。②《青囊秘传》：去风邪，固牙齿。

【主治】①《青囊全集》：一切齿痛。②《青囊秘传》：火牙痛，疳气，齿摇动不能食物。

【宜忌】水熏透软贴，不可见火。

19662 玉钥匙散

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】僵蚕一钱五分（炒，研极细） 冰片六分 牙消三钱 硼砂三钱

【用法】用新顷银罐,先翻后消,屑屑间炼,如昇枯矾之状,松脆为贵,置冷地出净火气,研细末,再加僵蚕、冰片,以极细无声为度。

【主治】咽喉肿痛。

【加减】如咽喉腐烂者,加西黄、廉珠、劈砂各三分,研细并入。

【宜忌】宜置瓷瓶勿令泄气。

19663 玉屏风散

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《究原方》。

【组成】防风一两 黄耆(蜜炙) 白术各二两

【用法】上咬咀。每服三钱,水一盞半,加大枣一枚,煎七分,去滓,食后热服。

【功用】①《张氏医通》:补脾实卫。②《古今名医方论》柯韵伯:托里固表。

【主治】表虚自汗,易感风邪。

①《医方类聚》引《究原方》:腠理不密,易于感冒。②《丹溪心法》:自汗。③《济阳纲目》:风雨寒湿伤形,皮肤枯槁。

【方论选录】①《医方考》:卫气一亏,则不足以固津液,而自渗泄矣,此自汗之由也。白术、黄耆所以益气,然甘者性缓,不能速达于表,故佐之以防风。东垣有言,黄耆得防风而功愈大,乃相畏相使者也。是自汗也,与伤风自汗不同,伤风自汗责之邪气实;杂证自汗责之正气虚,虚实不同,攻补亦异。②《古今名医方论》柯韵伯:防风遍行周身,称治风之仙药,上清头面七窍,内除骨节疼痛、四肢挛急,为风药中之润剂,治风独取此味,任重功专矣。然卫气者,所以温分肉而充皮肤,肥腠理而司开阖。惟黄耆能补三焦而实卫,为玄府御风之关键,且无汗能发,有汗能止,功同桂枝,故又能治头目风热、大风癰疾、肠风下血、妇人子脏风,是补剂中之风药也。所以防风得黄耆,其功愈大耳。白术健脾胃,温分肉,培土即以宁风也。夫以防风之善驱风,得黄耆以固表,则外有所卫,得白术以固里,则内有所据,风邪去而不复

来,当倚如屏,珍如玉也。③《古方选注》:黄耆畏防风,畏者,受彼之制也。然其气皆柔,皆主乎表,故虽畏而仍可相使。不过黄耆性钝,防风性利,钝者受利者之制耳;惟其受制,乃能随防风以周卫于身而固护表气,故曰玉屏风。④《成方便读》:大凡表虚不能卫外者,皆当先建立中气,故以白术之补脾建中者为君,以脾旺则四脏之气皆得受荫,表自固而邪不干;而复以黄耆固表益卫,得防风之善行善走者,相畏相使,其功益彰,则黄耆自不虑其固邪,防风亦不虑其散表,此散中寓补,补内兼疏,顾名思义之妙,实后学所不及耳。

【临证举例】①虚伤风《一得集》:郭绍翁年四十许,经营米业,劳顿实甚,癸酉秋,患伤风咳嗽,就诊于余,脉浮部虚大,寸口涩小,自汗淋漓。余曰:伤风症也,但脉象极虚,寸口脉应大反小,是内伤而微有外感,若服发散之药,汗必漏而不止,虚阳浮越矣,法宜补益,玉屏风散,二剂而瘳。②卫阳不固,反复感冒《福建中医药》(1984; 3: 50):刘某某,女,44岁,医务人员。患者经常感冒,每月1~2次,动则气促易汗,神疲易倦,面色苍白,食欲欠佳,舌淡苔薄白,脉细弱。免疫球蛋白检查: IgG60mg%, IgA245mg%, IgM140mg%。证属卫阳不固,腠理虚疏,感受风寒,方取玉屏风散加味。处方:黄耆15克,白术10克,防风、当归各8克,每周六剂,煎服。三个月后复查免疫球蛋白 IgG1225mg%, IgA240mg%, IgM145mg%。③术后自汗恶风《湖北中医杂志》(1981; 2: 39):用本方加党参、当归各9克,治疗16例手术后自汗恶风患者,平均服药5剂后痊愈。

【现代研究】调节机体免疫功能《上海免疫学杂志》(1983; 2: 82)在溶血空斑试验(简称PFC)中,玉屏风散能使SRBC致敏小鼠脾脏PFC基础水平偏低的增高,偏高的降低,而呈双向调节作用。《中西医结合杂志》(1986; 4: 229):玉屏风散在对兔用Vassali

氏改良法造成的实验性肾炎模型时,对肾炎的病理修复有明显作用。服药组病理好转率达 83.33%,而对照组为 33.33%,服药组治疗后与对照组相比,病理改善有显著差异($P<0.01$)。同时肾功能方面内生肌酐清除率回升较快。玉屏风散在同时使用免疫抑制剂的情况下,能使各类肾小球肾炎患者的低于正常或高于正常的 CH_{50} 、 C_3 、RFC、IgG、IgA、IgM 恢复正常。其治疗机理亦与调节机体免疫功能有关。

19664 玉屏风散

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】黄耆(炙炒)一两 大当归六钱 陈糯米一合(炒黄色)

【用法】水煎服。

【主治】麻后气血两虚,汗多,怔忡,神昏。

19665 玉屏风散

【方源】《笔花医镜》卷三。

【组成】生黄耆二钱 防风八分

【主治】小儿无端自汗者。

19666 玉桂杖丸

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】厚朴 藿香 陈橘皮 神曲 诃子皮各二钱 川芎 丁香 木香 白术 甘草各一钱 人参二钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如樱桃大。每服一丸至二丸,食前生姜汤送下;小儿一丸分二服,米饮化下。

【主治】小儿饮食减少,脏腑不调。

19667 玉粉锭儿

【方源】《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》。

【异名】玉粉锭(《普济方》卷六十七)。

【组成】定粉二钱 信一字

【用法】上为细末,煮白面脱脂,冷淘了,做为锭子如线,荫干,用黄米许贴疔处,后用麝香散治之。

【主治】牙疳蚀损,宣烂臭恶。

19668 玉容肥皂

《疡医大全》卷十二。为《丹溪心法附余》

卷二十四“肥皂丸”之异名。见该条。

19669 玉容肥皂

【方源】《女科切要》卷八。

【组成】白元米一升 肥皂(去皮核)四两 天花粉八两 滑石三两 胡桃肉八两 粉葛三两 白丁香一两 真粉三两 橄榄四十个(去核) 北细辛二两 牙皂八两 枣肉四两

【用法】苍耳草捣汁,同元米饭和捣为丸,如弹子大。洗面后擦之。

【主治】女人雀斑。

19670 玉容香粉

【方源】《女科切要》卷八。

【组成】白果肉一升(去壳,打汁) 杏仁一两(去皮,打汁) 炉甘石一两(水飞,研) 滑石(水飞)三两 元寸二分 苏合油五钱 冰片四分 铅粉一两(去铅)

【用法】上为极细末,用泉水漂去黄水,后入冰片、麝香、苏合油,加珍珠末五分,再以胭脂水调和,收贮。临用加白蜜少许。

【功用】令妇人面白如脂,夫妇不相识。

19671 玉屑面粉脂

【方源】《千金》卷六。

【组成】玉屑 白附子 白茯苓 青木香 蕤蕤 白术 白僵蚕 密陀僧 甘松香 乌头 商陆 石膏 黄耆 胡粉 芍药 藁本 防风 芒消 白檀各一两 当归 土瓜根 桃仁 芎藭各二两 辛夷 桃花 白头翁 零陵香 细辛 知母各半两 猪脂一升 羊肾脂一具 白犬脂 鹅脂各一合

【用法】上切,以酒、水各一升,合渍一宿,出之,用铜器微火煎,令水气尽,候白芷色黄,去滓,停一宿,旦以柳枝搅白,乃用之。

【功用】悦泽人面,耐老。

19672 玉屑面膏

【方源】《千金》卷六。

【组成】玉屑(细研) 芎藭 土瓜根 蕤蕤 桃仁 白附子 白芷 冬瓜仁 木兰 辛夷各一两 菟丝子 藁本 青木香 白僵蚕 当归 黄耆 藿香 细辛各十八铢 麝

香 防风各半两 麝屎白一合 猪脬三具
(细切) 蜀水花一合 白犬脂 鹅脂 熊脂
各一升 商陆一两 猪肪脂一升

【用法】上药先以水浸猪、鹅、犬、熊脂、数易水，浸令血脉尽乃可用；咬咀诸药，清酒一斗渍一宿，明旦生擘猪、鹅等脂安药中，取铜铛于炭火上，微微煎，至暮时乃熟，以绵滤；仍以练系白芷片，看色黄，即膏成；其猪脬取浸药酒，掇取汁，安铛中，玉屑、蜀水花、麝屎白、麝香末之，膏成，安药中，搅令匀。置瓷器中，以敷面。

【功用】令人洁白光润。

【主治】面无光泽，皮肉皴黑。

19673 玉绣球丹

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】砒一两(取益母草烧灰一两，独扫烧灰一两，同砒研匀，以米醋和成一块，候干，于新瓦上用炭煅火五斤，煅令通赤，以扇急扇，尽去灰，其砒自成一块如玉绣球样，研令细) 牡蛎二两(盐泥固济，候干，炭火五斤一煅，炭尽候冷，去泥土，净称一两，研如粉) 白矾二两(火煅成汁，候煅枯，净称一两，研细粉) 钟乳粉一两

【用法】上为极细末，煮糯米厚糊为丸，如鸡头子大，阴干。每服一九，空心新汲水送下。

【主治】男子、妇人一切虚冷，气血虚损，筋骨羸瘦，渐成瘵疾；及大病方安，气血未复，饮食过伤，脏腑虚滑，或腹痛暴下，全不思食，呕逆酸水，腹胁胀满，夜多虚汗；及妇人赤白带下，久无子息。

【宜忌】忌食猪羊血。

19674 玉液金丹

【方源】《良方集腋》卷下。

【组成】人参二两(老山者佳) 归身一两二钱(酒炒) 白术八钱四分(制) 川芎二两四钱 茯苓六两四钱 阿胶二两六钱(酒化) 甘草三两二钱 蕲艾六钱七分 生地一两二钱 黄耆一两二钱(蜜炙) 白芍一两六钱(酒炒) 苁蓉一两二钱(漂淡) 麦

冬二两五钱(去心) 香附二两六钱(四制) 川贝二两二钱(去心) 广皮一两六钱(盐水炒) 川断六钱四分(酒炒) 枳壳一两二钱 杜仲二两六钱(姜汁炒) 楂肉八钱四分 血余八钱四分(煅净) 厚朴一两五钱(姜汁制) 山药四两三钱 苏叶二两五钱 建莲六两四钱(去心) 羌活八钱四分 木香八钱五分 沉香一两六钱 砂仁二两九钱 西珀八钱四分 丹参四两二钱 黄芩一两二钱 菟丝子三两三钱 益母草六两四钱 大腹皮八钱四分 潼蒺藜二两二钱

【用法】先选择药料，日中晒燥，各磨细末，照方称准，用炼蜜五斤，并酒化阿胶和匀，于石臼中杵六千槌为丸，每丸二钱，再晒极干，用朱砂为衣，白蜡为壳，藏贮燥处。初孕疑似之间，腹胀呕吐，用薏仁三分煎汤下；头晕，用防风八分，煎汤下；头眩，用炒金银花一钱五分，煎汤下；胎动不安，用艾绒五分，子芩一钱，煎汤下；子呛，用桑白皮五分，煎汤下；子烦，用淡竹叶七片，煎汤下；子悬，胎动不安，如物之悬于虚中，宕而难住，神昏身狂，用赤茯苓八分，葱白一个，煎汤下；子冒，危于子悬，血热心火太盛，胎气上冲于心，胞冒于心，面红，牙关紧闭，气绝欲死，用麦冬一钱，羚羊角五分，煎汤下；子肿，用五加皮一钱，赤苓皮一钱，煎汤下；子淋，用车前子一钱，煎汤下；漏胎，用原生地二钱，煎汤下；尿血，用梗米煎汤下；小便不通，用冬葵子八分，煎汤下；潮热，用知母一钱五分，煎汤下；咳嗽，用杏仁一钱二分，桑白皮五分，煎汤下；感冒、疟疾，用苏梗四分，荆芥五分，煎汤下；跌扑损胎，用白术五分，当归一钱，煎汤下；半产，用益母草二钱，煎汤下；临产交骨不开，用龟板三钱，煎汤下；横逆难产，数日不下，及胎死腹中，用川芎一钱，当归二钱，煎汤下；胞衣不下，用牛膝二钱，檀香一钱，煎汤下；恶露不行，用五灵脂五分，桃仁五分，生蒲黄五分，煎汤下；产后喘，或藕汁半杯

或姜汁三匙，当审症用之；虚脱，用人参五分，煎汤下；胎前产后痢，用米仁三钱，煎汤下；产后肿胀，用茯苓皮一钱五分，当归一钱，煎汤下；褥劳，用官燕三钱，煎汤下；倒经吐血，用藕汁下；崩漏，用淡白矾三钱，煎汤下；经期或前或后不准，以致艰于受孕，每逢天癸时服三丸，即能调经受孕，开水送下；胎前产后患症不一，不及遍载，俱用开水送下。

【主治】①《良方集腋》：胎前、临产、产后以及室女停经不至、潮热等症。②《全国中药成药处方集》：月经不调。

19675 玉液金丹

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【组成】杜仲二两四钱 生地 黄芩各一两一钱 沙苑子二两 蕲艾八钱(炭) 建莲子五两八钱 当归八钱 肉苁蓉二两一钱 远志二两四钱 山药五两六钱 砂仁二两 山楂八钱 益母草六两 甘草二两八钱 白芍一两四钱 羌活八钱 麦冬二两二钱 贝母二两 紫丹参三两八钱 血余八钱(炭) 菟丝子二两八钱 续断八钱 枳壳二两八钱 紫豆蔻仁一两一钱 香附二两二钱(炙) 川芎二两二钱 半夏曲一两 茯苓八钱 款冬花二两 旋覆花二两 茺苳二两 党参二两 川楝子二两 梔子二两 黄连二两 黄耆二两 于术二两 藏红花一两 厚朴一两 琥珀一两 沉香六钱 人参一两(去芦) 红枣十六两(去核) 阿胶八两 山茱萸二两 鹿角胶二两 覆盆子一两 桑螵蛸一两 五倍子一两 巴戟天一两 鸡血藤四两 仙鹤草二两 龟版胶二两 海螵蛸二两 旱莲草二两 红月季花一百朵

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱，蜡皮封固。每服一丸，一日二次，温开水送下。

【功用】益气，舒郁，调经。

【主治】妇女暴怒郁结，胸肋窜痛，经期不准，白带过多。

【宜忌】孕妇忌服。

19676 玉液金丹

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】党参二两 川朴一两五钱 黄芩一两二钱 炙草一两二钱 琥珀八钱七分 粉丹皮四两五钱 沉香一两六钱 川贝二两六钱 川芎二两六钱 香附二两六钱 山药四两三钱 于术八钱四分 归身一两六钱 砂仁二两四钱 白芍一两六钱 广木香八钱四分 茯神六钱四分 川断六钱四分 橘红一两六钱 菟丝子三两二钱 杜仲二两六钱 枳壳一两二钱 益母草六两四钱 血竭八钱四分 山楂八两四钱 大腹皮八钱四分 云苓一两二钱 荷叶二两五钱 阿胶二两六钱 艾叶六两四钱 潼蒺藜二两二钱 麦冬二两五钱

【用法】上为细末，炼蜜为大丸，三钱重，蜡皮封固。每服一丸，一日二次，白开水送下。

【功用】调经活血，益气养荣。

【主治】经血不调，腰腿疼痛，气血双亏等症。

【宜忌】孕妇忌服。

19677 玉楂冲剂

【方源】《中药知识手册》。

【组成】玉竹 山楂

【用法】冲剂。每服一袋，一日二至三次。

【功用】降低甘油三脂。

【主治】冠心病心绞痛，高甘油三脂血症。

19678 玉女飞花散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】蜀桑根(即莞花根。取大者，不用木)

【用法】五月五日采，水中轻轻洗去土，烧淡醋令沸，以花根于醋中一走过，觉色变白，如寄生法。当日采，当日刮，令极细。每服一字，温酒一大盏，放药于盏，良久面上飞花，服下；敷以丝瓜汁，醋调亦可。

【主治】痢症。

19679 玉开金钥匙

【方源】《儒仙活人方》卷下。

【组成】尖草乌二钱 淮乌三钱 麝香一分

【用法】上为细末。每服用钱一字多，冷水一点调吞下。

【主治】缠喉风，咽喉闭塞，水浆不下。

【宜忌】忌热汤一时。

19680 玉石清胃汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】玉竹三钱 石膏四钱 花粉二钱 石斛三钱 生地五钱 人参一钱 麦冬二钱 蛤粉四钱 山药三钱 茯苓二钱

【用法】甘蔗汁半杯，冲服。

【主治】胃受燥热，津液干枯，渴饮杀吞。

19681 玉龙软金丹

【方源】《奇效良方》卷二十二。

【组成】沉香二钱 檀香 安息香 八角茴香 益智仁各一钱半 麝香 莲子心 仙灵脾（酥炙） 朱砂 穿山甲 犀角 乳香 丁香各一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心以温酒送下，以干物压之。

【功用】添精补髓，活血驻颜。

【主治】男子诸虚百损，五劳七伤，下元久冷，腰腿膝痛；妇人赤白带下。

19682 玉芝徐老丸

【方源】《宣明论》卷四。

【组成】天南星 干姜各半两 黄柏一两半 牵牛四两 半夏 白矾 大黄各一两 蛤粉二两

【用法】上为末，滴水为丸，如小豆大。每服十丸至二十丸，食后温水送下，一日三次。大便结者，除肠垢积物，可渐加至三五十丸。

【功用】消痰利膈。常服顺气调血，美饮食，调五味，令人徐老。

【主治】一切风壅，胸肋痞闷。

【宜忌】孕妇，滑泄病忌服。

19683 玉肌还少散

【方源】《百一》卷九。

【组成】白芷 白藜 白附子 阿胶（麸炒） 白僵蚕 白蒺藜（略炒，去刺） 白胶香（热铤内炒，熔如汁，倾在水中，冷出研）

【用法】上为末，不以多少。一料加皂角末一斤。

【主治】指爪破面。

【加减】如痘痕，加乳香常用。

19684 玉红夹纸膏

【方源】《疡医大全》卷三十七。

【组成】乳香（去油） 红血竭 没药（去油） 白儿茶 潮脑各一两 银朱八钱 铜绿三钱 嫩松香四两（研细末） 蓖麻仁四百四十粒（肥大者，去皮膜，入乳钵内乳之，以成膏为度）

【用法】上药再乳成膏。如杖疮，用夹连油纸一张，用木尺裁九寸五分长，一尺一寸宽，折过来一面用针戳孔，一面摊膏于上，合盖夹膏于内，以有孔者著肉贴之，外以桑皮纸包好，再用裹脚缠紧为妙，贴一伏时揭下，用后开洗药洗拭干净，再将膏拭净，仍用原膏贴之，至重者不过三次痊愈；如受大刑，亦用夹连油纸双折四方块，共四块，亦如前法碎刺孔眼，一面摊膏贴上，用新棉花包裹，再用裹脚缠好，或五六日一换。此膏旋摊旋贴，其膏用盖碗收贮，勿泄气，如干难摊，以滚水焗开摊。

【主治】杖疮及夹棍大刑，并跌打损伤。

【宜忌】忌铁器，忌见火。

【备考】洗刑杖法：白术、蕤灵仙、秦艽、五加皮、当归、汉防己、红花、川牛膝、羌活、甘草、刘寄奴、宣木瓜、独活、广三七、白芷、防风各二钱。煎汤洗后，再贴玉红夹纸膏。

19685 玉环来笑丹

【方源】《本草纲目》卷三十一引《皆效方》。

【组成】荔枝核四十九个 陈皮（连白）九钱 硫黄四钱

【用法】上为末，盐水打面糊为丸，如绿豆

大。遇痛时，空心酒服九丸，良久再服。

【主治】疝气癰肿，亦治诸气痛。

19686 玉枢正气丹

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】生地 红花 甘草 桔梗 人参 黄耆 橘红 蝉蜕 防风 嫩桃五个

【用法】和姜煎浓，投酒服。

【主治】痘疮，五六朝间，本美丽鼎峻，而一时失防，或触于腥血，或感于秽臭，倏忽更变。

19687 玉面桃花粉

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】杏仁三钱（研如泥） 轻粉一钱 面粉三钱 白芷末一钱 麝香二分 冰片

【用法】用鸡子白调匀。每用少许搽面。

【主治】雀子斑。

19688 玉钥启荣丸

【方源】《广嗣要语》。

【组成】人参 白术 甘草 当归 赤石脂 川芎 茯苓 芍药（俱要白者） 熟地 牡丹皮 没药 白芷 藁本 白薇 玄胡索 各一两（除石脂、没药另研外，其余用醇酒浸三日，焙，晒干，为细末，足一十五两） 香附（去皮毛，水醋浸三日，炒干，为细末）一十五两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，瓷器中封固。每服五十丸，空心温酒或白汤送下，以干物压之。待月事调匀受妊为度。

【功用】平调气血，鼓作微阳。

【主治】女子无他疾，经事调匀，容颜不损，但久无胎孕。

19689 玉容西施散

【方源】《医部全录》卷一三一引《医林方》。

【异名】玉容散（《医统》卷六十六）。

【组成】绿豆粉二两 白附子 白及 白薇 白僵蚕 白芷 天花粉各一两 甘松 三柰子 茅香各五钱 零陵香 防风 藁本 各二钱 肥皂角一挺（去皮弦）

【用法】上为细末。每洗面用之，面色如玉。

【主治】面上一切酒刺、风刺、黑黧斑。子。

19690 玉容西施膏

《东医宝鉴·杂病篇》卷九引《袖珍》。为《御药院方》卷十“玉容膏”之异名。见该条。

19691 玉容肥皂丸

《冯氏锦囊》卷十九。为《丹溪心法附余》二十四卷“肥皂丸”之异名。见该条。

19692 玉屑无忧散

【方源】《局方》卷七。

【异名】大圣夺命玉雪无忧散（《幼幼新书》卷三十四）、无忧散（《鸡峰》卷二十四）、大圣玉屑无忧散（《卫生总微》卷十七）、夺命无忧散（《普济方》卷六十引《如宜方》）。

【组成】玄参（去芦） 荆芥穗 滑石（研） 黄连（去毛） 缩砂（去壳） 白茯苓（炒令黄） 贯众（去芦） 甘草（炙） 山豆根各一两 寒水石（研、飞）二两 礞砂二钱

【用法】上为细末。每服一钱，干掺舌上，后以新水咽下，不拘时候。

【功用】《永乐大典》引《小儿保生要方》：大解百药毒，偏润三焦，消五谷，除九虫，赶瘟疫。

【主治】①《局方》：咽喉肿痛，舌颊生疮，风毒壅塞，热盛喉闭；或因误吞硬物，诸骨鲠刺，涎满气急，或至闷乱，不省人事。②《永乐大典》引《小儿保生要方》：小儿一切咽喉塞滞，口内疮；心腹胀满，脾积癥块；喉闭，缠喉风，涎生不止，奶癖；误咽叫子、鱼骨、钱、枣核、毒药硬物和吃巴豆、杏仁、石头、铁札、麦糠、棘针、瓷瓦诸般杀人药；并蛇蝎诸虫咬，气入腹；但是心腹有疾，诸药不能治者；及湿痰风闭。

【宜忌】《医方论》：此治实火，实痰之重剂，若虚火聚于咽喉，闭结不通者，万不可用。

19693 玉屑无忧散

【方源】《专治麻疹初编》卷四。

【组成】净硼砂一两五钱 煅过寒水石五钱 净盆消三钱 飞青黛三钱 苏薄荷叶五钱 蒲黄末五钱 川黄连二钱 贯众末(生晒)二钱 玄参二钱 白云苓二钱 滑石二钱(飞) 荆芥穗二钱 山豆根二钱 带壳缩砂仁二钱 生甘草二钱

【用法】上为细末。每服半钱，干掺舌上，以清水咽下。

【功用】除三尸，祛八邪，辟瘟疫，疗烦渴。

【主治】缠喉风，咽喉肿痛，语声不出，咽物有碍；或风涎壅滞，口舌生疮；大人酒癖，小儿奶癖；或误吞骨屑梗塞不下，或子舌胀，重舌，木舌，肿胀闭塞，水浆不下。

19694 玉屑妙灵散

【方源】《朱氏集验方》卷十二引陈氏方。

【组成】滑石二两(用静江者)

【用法】上为细末。每服二钱，米饮调下。若有琥珀研细，浓灯心汤服之尤佳。良久旋下，其物正如剥皮子葡萄肉，而疮尽平复。

【主治】瘰癧。

【临证举例】瘰癧《普济方》引《仁存方》：余在书局见吴伯骏，忧其长女其病日侵。楼大防访其所亲赵司户之母韩氏，自言幼子年十一岁，患此，项上可见者有七十枚。或授此方，且云是心包络中热，须用药自小便出，服觉小便涩急。遂以意用琥珀研细浓煎，灯心汤下，良久旋下，其物正如剥了皮葡萄肉，前后下十七枚，而疮尽平复。其子今为临安参军。吴女得此方，遂愈。余亲见其事。近小儿亦患此，用之立愈。小儿苦此疮始终两年，经医不知其几，终不能去，因服此药，旬日而愈。后合此药施人，愈者十余人。

19695 玉屑妙灵散

【方源】《医学正传》卷六。

【组成】滑石

【用法】上为细末。每服一钱，煎川木通汤调下。

【主治】瘰癧。

19696 玉屑润金丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】人参 知母 贝母 五味子 桑皮(炒) 地骨皮(炒) 各一两 甘草(炙)五钱 麻黄(炒，去节) 杏仁(去皮尖，面炒)各二两 罂粟壳(去筋膜，炒)一两 半夏(姜汁拌七次，微炒)一两五钱 薄荷七钱 桔梗一两(微炒)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每噙一丸，徐徐咽下，日噙三丸，夜含一丸。

【主治】远近咳逆不已，发热不退。

19697 玉雪救苦丹

【方源】《良方合璧》卷上。

【组成】水安息 廉珠粉 真血珀 鹅管钟乳各三钱 真西黄 梅片脑 当门子各三分 苏合油二两 制川朴 寒水石 川黄连(水炒)各一两 白螺蛳壳一钱 柴胡 淡豆豉 赤茯苓 辰砂片(水飞) 茅术 前胡 广藿香 大豆黄卷 防风 生白术 荆芥穗 白茯苓皮 秦艽 粗桂枝 生大黄 石膏(另研) 天花粉 江枳壳 麻黄(去节) 生甘草 苦桔梗 牛蒡子 土贝母 江枳实 赤芍药 大麦仁 小青皮 车前子 制半夏 连翘 六神曲 建神曲 广陈皮 木通 广木香 尖槟榔各八钱 大腹绒一两六钱(煎汤用)

【用法】除香料细药八味及腹绒外，其粗药用阴阳水浸拌一宿，明日晒干，共为极细末，后入细药，再同研和匀，乃将麝香、西牛黄、苏合油、水安息，外加六神曲四两，大腹绒汤打浆共捣和，加入炼白蜜一斤，糊为丸，每丸湿重一钱五分，晒干重一钱，再入石灰坛内矿燥，然后用蜡丸封固。每服一丸，用开水化药徐徐灌之，立刻回生，再进一丸即愈；或用荷叶三钱煎汤化服亦可；小儿闷痘，细叶菖蒲打汁开水冲化，服半丸；小儿时痧发不出，用西河柳五钱，煎汤化服一丸，如未透再进一丸，凡痧痘轻半丸，重一二丸；小儿急惊风，身热呕乳，惊悸抽搐，便青，用钩藤钩一钱，煎数沸去滓，量儿大小，化服

半丸或一丸，作四次服之；月内赤子胎惊不乳，用药一丸，分作四块之一，研极细末，安在乳头上，与儿吃乳同下之；痰厥不省人事，用陈胆星五分，开水化服一丸；肝气厥逆，不省人事，用生石决明二两，煎汤化服一丸；伤寒时行瘟疫，寒热头痛，胸闷体疲，一二候，身热不解，神昏谵语，开水化服一丸，如身热不尽，再进一丸；痼疽发背，脑疽疔毒，一切无名肿毒，外用牛膝一两，捣汁调药半丸敷之，又用开水，或生甘草三钱，煎汤化服，大症一丸，轻者半丸，未成即消，已成即溃。

【主治】咽喉一切诸证，及烂喉丹痧，痰涎壅塞，口噤身热，命在顷刻者；并治小儿闷痘急惊及大人痰厥伤寒时行。

19698 玉匙开关散

【方源】《药寇启秘》。

【组成】牙皂一钱 明矾一钱(入蜒蚰二条拌匀，阴干) 火消一钱半 腰黄三分 硼砂一钱半 僵蚕一钱 山豆根一钱 冰片三分

【用法】上为细末。吹入。

【主治】喉风、喉痹、乳蛾。

【加减】痰多者，加胆矾；热甚者，加朴消；夏令潮湿，加龙骨；腐烂者，加轻粉。

19699 玉液上清丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】苏州薄荷叶十四两 柿霜五两 桔梗四两半 甘草三两半 川芎二两八钱 川百药煎五钱 防风一两六钱 砂仁四钱半 福建青黛三钱 冰片 元明粉 白硼砂各二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，噙化，不拘时候。

【功用】生津液，化痰涎。

【主治】风痰上壅，头目不清，咽喉肿痛，口舌生疮。

【临证举例】喉痹 昔宋神宗患喉痹，服此药一丸，立愈。

19700 玉液化痰丸

《鸡峰》卷十八。为《局方》卷四“玉液丸”之异名。见该条。

19701 玉液至宝丹

【方源】《痘疹仁端录》卷五。

【组成】桔梗 前胡 山楂 木香 茯神 红花 青皮 通草 牛蒡子各三分 糯米一撮 灯心七根

【用法】水煎服。据症加减用之。

【主治】痘疮，自标痘至起胀六日内。

【方论选录】《仁端录》：桔梗利咽喉，载气血上行，为舟楫之剂；前胡能托痘，除内外之痰热；山楂初时多用，最能生肌发痘；木香少用以提肾毒，二帖后不用；茯神安神养心血；红花少用以活血，多则逐血，四五帖后不用；青皮能清脏腑，免后生痰，三帖后换陈皮，通草能通关节，三帖后换木通，小便清不必换。

【备考】方中通草，原书卷十四作“甘草”。

19702 玉液春膏饮

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】前胡 桔梗 山楂 贯众 蝉蜕(去头足)各八分 大力子 当归 连翘各一钱 川红花 川芎 青皮 木通各三分 陈米一百粒

【主治】痘疮起胀。

【加减】标未齐，加笋尖、倍楂、青；左颐不起，加辛夷；右颐不起，加西河柳；背浆不足，加酒炒土兰花；下身浆不足，加巴戟；灰白，倍芎、归，加肉桂、红花、桃花；干红，加丹皮、生地；紫，加芩、连，倍翘、众；皤白，加木香、官桂；心火，加黄连，甚者犀角、生地；肝火，加金银花；脾火，加芦根，甚者石膏；胃火，加山梔、石膏；口臭，加白芷；肺火、加黄芩；肾火，加知母；痰噤，加麦冬、贝母、瓜蒌仁、旋覆花，或用宁金散；寒噤，去连翘；火噤，去芎、归，加骨皮、丹皮、芩、地；毒噤，至宝饮送发灵丹；疔噤，先治疗；四五日发痒，加荆芥、石膏、元参、丹皮、白蒺藜；六日痒，加白芷、生

地、余同上,唯不用荆芥;风闭,加升、葛、羌活;误服药而喘,倍青皮,加枳壳、麦冬、黄连;饮食不进,加白术、砂仁、神曲;唇反肿或肉裂,加芦根,肠鸣,加丹参;便血,加蒲黄炒;阴症腹痛,加姜、桂、丁香、木香,甚者去蝉蜕;阳症腹痛,加升麻、黄连、木香;腹左痛,加青皮;右痛,加木香;中痛,加延胡、海藻,甚者莪术、三棱;积血在丹田,加桃仁;腰痛,加羌活、萆薢、巴戟、杜仲、胡桃肉;心胸痛,加红花、海藻、三棱、莪术;手痛,加桂枝、桃仁;头痛有风痰,加天麻、僵蚕、勾藤、荆芥、胆星、牛黄、天竺黄;有湿,加羌、芷、苍耳。

19703 玉锁九真丹

《普济方》卷三十三。即《得效》卷七“玉锁固真丹”。见该条。

19704 玉锁固真丹

【方源】《得效》卷七。

【组成】白龙骨半斤 磁石(醋淬七次)朱砂各一两 牡蛎(煅)一两 紫梢花一两半 家韭子 菟丝子各二两半 鹿茸(酒浸,炙) 白茯苓 川巴戟 官桂 肉苁蓉(酒浸,炙) 桑螵蛸(酒浸,切,炙) 远志(甘草水煮,取皮,姜汁炒) 当归(去尾) 苍术(切,酒炒) 茴香(炒) 吴茱萸(炒) 川楝子(炒) 桑寄生(真者) 沉香(不见火) 木香(不见火) 黄耆(去芦) 绵附子(熟炮)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,温酒、盐汤任下。

【主治】心气不足,思虑太过,肾经虚损,真阳不固,旋有遗溺,小便经岁白浊,或淡赤,或如膏,梦寐精泄,甚则身体拘倦,骨节酸疼,饮食不进,面色黧黑,容枯肌瘦,唇口干燥,虚烦盗汗,举动力乏。

【备考】本方方名,《普济方》引作“玉锁九真丹”。

19705 玉蕊托里散

【方源】《医方类聚》卷一七九引《经验秘

方》。

【组成】黄耆四两 人参 白芍药 当归 熟地黄 莲花蕊 乳香 没药 甘草各三钱

【用法】上为粗末。每服四钱,酒水各一盞,煎至七分,去滓温服,滓再煎,不拘时候。

【主治】疔疮,痈疽,发背,不问阴阳二证,已成未成。

【加减】如有热,加连翘三钱。

19706 玉翳泻肝散

【方源】《眼科菁华录》卷上。

【组成】当归 芍药 栀子 黄芩 连翘 知母 茺蔚子 薄荷 苦桔梗 防风 车前

【主治】玉翳浮睛,风邪入脑。

【加减】秘结,加消、黄。

19707 玉蟾生肌散

【方源】《慈幼新书》卷十一。

【组成】癞蟾一枚

【用法】用轻粉三钱,装入腹内,线缝其口,扎缚成团,以枣肉捣烂,包蟾在内,裹以熟黄泥包固,炭火烧一昼夜,去泥、枣,为细末,每一钱加乳香、没药、黄丹、海螵蛸、雄鸡肫皮各三分,研极细。将疮口洗净敷之。

【主治】疮毒已去,肉败未能生新者。

19708 玉蟾利风丹

【方源】《良方合璧》卷上。

【组成】寒水石一两(煅) 麻黄(去节,炒)四两 全蝎(水洗,焙干)五钱 乳香五钱(去油) 白芷五钱 甘草五钱 川芎五钱 当归五钱 罂粟壳(滚水泡,去筋,净末)六两 闹羊花(火酒拌,晒干)四两 草乌五钱(黑豆同煮,去豆,晒干) 自然铜(煅)一两五钱

【用法】上为细末,收贮,勿令泄气。每用三分,或四分五分为率,量人虚实,用陈酒送下,取汗避风,三服必愈。或用陈米糊捣为锭,分数同上,磨服亦可。

【主治】遍身风湿,筋骨疼痛。

19709 玉露养肺丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】法半夏十六两 厚朴(炙)十六两 橘皮十六两 槟榔十六两 枳实(炒)十六两 冬花十六两 桑皮十六两 杏仁(去皮,炒)十六两 茯苓十六两 米壳六十四两 浙贝十两 黄芩十两 甘草八两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,重二钱五分。每服一九,一日二次,温开水送下。

【功用】润肺止咳,宽中化痰。

【主治】肺气虚热,咳嗽痰喘,春秋举发,久嗽不止。

19710 玉露养肺丸

【方源】《全国中药成药处方集》。

【组成】枳实 桔梗 麦冬 桑皮各一斤 焦榔 法夏 酒芩 茯苓 于术 陈皮 川贝 冬花 厚朴各十二两 沉香三两

【用法】炼蜜为丸,每重三钱。每服三钱,开水送下。

【主治】胸膈不清,咳嗽痰喘,远年近日咳嗽。

19711 玉露通真丸

【方源】《妇人良方》卷二引《经验妇人方》。

【组成】半夏(姜汁制,炒) 人参各半两 食茱萸(醋炒) 制厚朴各一两一分 泽兰叶二两半 甘草 蝉蜕(炒) 白芍药 石膏 蚕蜕(炒用,如无,以蚕故纸三张代) 白术 当归 羌活 熟地黄(洗,焙) 白茯苓各二两 防风 干姜 柏子仁 苍术 白薇 木香 黄耆 川牛膝 附子 白茺萸(与蝉蜕同炒) 川芎 藁本各一两 川椒 苦梗各三两 白芷一两半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每九钱重,分作十丸。切记炼蜜无令太过及生。男子妇人诸虚不足,状如劳疾,黄耆煎酒送下;血气痛,烧称锤淬酒下;产前安胎,用醋汤送下;产后诸疾,用酒或盐汤送下;产前、产后泻,用米饮送下;男子妇人牙疼,用半丸揩痛处,良久盐汤咽下;产前、产后血闷,用童子小便送下;经脉不调,用红花煎酒送下;

产后风毒,生疮疥,荆芥茶送下;冷痰翻胃、醋心、干嚼下;妇人子宫久冷,崩漏、赤白带下,用童子小便、米醋、好酒一处,暖热下。

【主治】妇人诸疾。

19712 玉髓定喘丸

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】杏仁 枳壳 麦冬 桔梗 防风 橘红 荆芥 沙盐 淡竹叶一年一叶

【主治】浆足作喘。

19713 玉竹麦门冬汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】玉竹三钱 麦冬三钱 沙参二钱 生甘草一钱

【用法】水五杯,煮取二杯,分二次服。

【主治】燥伤胃阴。

【加减】土虚者,加生扁豆;气虚者,加人参。

19714 玉女长春不老丹

【方源】《医学纲目》卷四引丹溪方。

【异名】水芝丸(《赤水玄珠》卷十)。

【组成】牛膝根汁 苍耳根汁各二碗

【用法】不可入水,和一处。瓷器熬成膏,如稠蜜;金樱子为末散半斤,用不去皮莲子实,豕猪肚煮熟,取莲子晒干四两,和前二末膏子为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下。

【功用】暖身体,振精神,延年益寿。

19715 玉女煎去牛膝熟地加细生地玄参方

【方源】《温病条辨》卷一。

【异名】加减玉女煎(《温病学释义》)。

【组成】生石膏一两 知母四钱 玄参四钱 细生地六钱 麦冬六钱

【用法】水八杯,煮取三杯,分二次服,滓再煮一钟服。

【功用】《温病学释义》:两清气分、血分之热。

【主治】①《温病条辨》:太阴温病,气血两燔者。②《温病学释义》:春温、秋燥,壮热口渴,烦躁不宁,苔黄舌绛,或肌肤发斑,

甚或吐血衄血，属气血两燔者。

【方论选录】《温病学释义》：本方系从景岳玉女煎加减而成。方用石膏、知母清气分之热；玄参、生地、麦冬凉营养阴；共奏气血两清之效。

古

19716 古瓦汤

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《鸡峰》卷十九。

【组成】屋上瓦（三十年者，碎如雀脑）三升（东流水二石煮取二斗） 生白术 干地黄 生姜各八两 橘皮 人参 甘草 黄耆 远志各三两 桂心 当归 芍药各二两 大枣三十枚

【用法】上㕮咀。纳瓦汁中，煮取三升，分四次服。

【主治】①《千金》：消渴，阴脉绝，胃反而吐食。②《鸡峰》：消渴，虚乏食少无力，小便频数者。

19717 古瓦汤

【方源】《三因》卷十。

【组成】干葛 天花粉 人参 鸡胫脰（净洗，焙干）各等分

【用法】上为末。每服二大钱，用多年古瓦碓碎煎汤调下，不拘时候服。

【主治】消肾消中，饮水无度，小便频数。

19718 古月粉

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】胡椒适量（研粉）

【用法】外扑。

【功用】杀虫止痒。

【主治】慢性、亚急性皮肤搔痒症。

19719 古圣散

【方源】《济总录》卷十。

【组成】漏芦（去芦头）半两（麸炒） 地龙（去土，炒）半两

【用法】上为末。先用生姜二两取汁，蜜二两，同煎三五沸，入好酒五合，以瓷器盛。每

用七分盏调药末一钱半匕，温服，不拘时候。

【主治】历节风，筋脉拘挛，骨节疼痛。

19720 古拜散

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】荆芥穗

【用法】上为末。每服三钱，生姜汤调下。

【主治】①《医学心悟》：产后受风，筋脉引急，或发搐搦，或昏愤不省人事，或发热恶寒，头痛身痛。②《疡医大全》：鼻渊。

【备考】《医学心悟》本方用法：有火者，用陈茶调下。

19721 古墨霜

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】灯心炭四两 柿霜饼十六两 冰片六钱

【用法】上为细末，过罗装瓶，大瓶一钱六分，小瓶八分。用凉开水蘸药少许抹患处。

【功用】清胃热，祛火。

【主治】胃火上攻，口舌生疮，糜烂肿痛。

19722 古钱接骨方

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】古文钱（烧红晾凉，研末） 土鳖（一个，焙干，为末）各等分

【用法】将熟面捻作饼子，包裹前药，温酒下后，用甜瓜子研一字许，亦用温酒送下，其药直至患处。如骨碎者乱丝烧灰存性，与前二味一处同研裹服。

【主治】骨折。

19723 古庵心肾丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十九。

【组成】熟地 生苕（俱怀庆者，酒浸，竹刀切） 山药 茯神（去木）各三两 山茱萸肉（酒浸，去核） 枸杞子（甘州者，酒洗） 龟版（去裙，醋炙） 牛膝（去芦）各一两 鹿茸（火去毛，醋炙）一两 当归（去芦、酒洗） 泽泻（去毛） 黄柏（炒褐色）各一两五钱 辰砂（为衣） 黄连（去毛，酒洗）各一两 生甘草半两 牡丹皮（去心）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服五十丸，渐加至一百丸。空心温酒或淡盐汤任下。

【功用】补血生精，宁神降火。

【主治】①《丹溪心法附余》：肾水亏乏，心火上炎，发白无子及惊悸怔忡，遗精盗汗，目暗耳鸣，腰痛足痿。

【备考】方中丹皮用量原缺，据《医学入门》补。

19724 古卿古败散

【方源】《中藏经·附录》。

【异名】荆芥散。

【组成】荆芥穗一斤 干菊花半斤 川芎四两 白术三两

【用法】上为细末。每服二钱，食后茶调下。

【功用】明目去风。

【主治】头风、血风。

【备考】本方方名，原书曰日本宽本作举卿古败散。

去

19725 去风丹

【方源】《普济方》卷一一六引《瑞竹堂方》。

【异名】紫萍粒丹（原书同卷）、紫萍一粒丹（《袖珍》卷一）、浮萍一粒丹（《仙拈集》卷一）。

【组成】紫色萍（七月半采）不以多少

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心、食前以豆淋酒化下。

【主治】瘫痪风，大风，一切诸风；脚气，并颠扑伤损及破伤风。

19726 去风散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】升麻一两半 白芷 藁本（去苗土） 沉香（锉） 细辛（去苗叶） 丁香各一两 凝水石（研）二两

【用法】上为细散。再研匀，揩齿。

【主治】齿齲宣露。

19727 去斗丸

【方源】《医方类聚》卷九十引《经验良方》。

【组成】《局方》红丸子 连翘丸 青木香丸各一贴

【用法】上用斑蝥二十一个，同药入瓷铫慢火炒令斑蝥黄黑色，连药倾在地上，去火毒一伏时，去斑蝥，却将药于布袋中掣去斑蝥屑，分作十服。空心酒吞服；不饮酒，温盐汤下亦可。

【主治】膀胱肾肿。

19728 去水膏

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】甘草（生，为末）一分 砂糖 糯米粉各三分

【用法】上为膏。摊在绢上贴之。毒水自出。

【主治】痈疽破穴后，误饮皂角水及诸毒水，以致疼痛；驴马汗及尿粪一切青水。

19729 去血汤

【方源】《医心方》卷十八引《范汪方》。

【组成】赤小豆二升

【用法】煮汁二升，以淳苦酒七升合和汁中，饮一日尽之，状如热汤泼雪。

【主治】肠中伤积血。

19730 去杖汤

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】赤芍药六两 甘草一两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盏半，煎至一盏，空心食前服。

【主治】脚弱无力，行步艰辛。

19731 去来汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参三钱 茯苓三钱 苍术三钱 白术五钱 甘草二钱 川乌二钱 半夏一钱

【用法】水煎服。

【功用】补气利湿。

【主治】气虚而微感寒湿之邪，邪冲心包，一时心痛，倏痛倏已，一日而十数遍，饮食无碍，昼夜不安。

【方论选录】方中用二术为君，最有佳意。

盖痛虽由于气虚，毕竟湿气之侵心包也。二术去湿而健脾胃之气，故用之，佐以人参、茯苓补气以利湿，则湿去而气更旺也；气虽旺矣，而川乌得直入心包，以祛逐其寒邪；半夏得行于中脘，而消其败浊之痰；甘草和缓，调停于邪正之间，以奏功于眉睫矣。

19732 去妒丸

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】天门冬(去皮心) 赤黍米(去壳，微炒) 薏苡仁(去壳，炒)

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服百丸，食远白汤送下。

【功用】去妒。

【主治】妇人妒证。

19733 去苦散

【方源】方出《本草衍义》卷十七，名见《洞天奥旨》卷十六。

【组成】五灵脂一两 雄黄半两

【用法】上为末。以酒调药二钱灌之，及以药滓涂咬处，良久，复灌二钱。

【功用】《洞天奥旨》：解虫毒。

【主治】被毒蛇所伤，甚则已昏困者。

19734 去毒丸

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】天雄(炮裂，去皮脐) 附子(炮裂，去皮脐) 桂(去粗皮) 各一两 白僵蚕(直者，炒) 三两 防风(去叉) 三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，日三夜一。

【主治】风湿痹，腰脚疼痛不可忍，久不愈者。

19735 去毒丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】青绿(信州者，煨微赤) 胡粉各等分

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如皂子大。每服一丸，薄荷暖酒磨化下；如口不开，用白僵蚕末一字，吹入鼻内。口即开，吐下毒，立止。

【主治】一切喉风闭塞，咽喉诸疾。

19736 去毒丹

【方源】《三因》卷十五。

【组成】赤芍药 甘草 滑石各半两 巴豆(去皮，炒，别研后入) 黑牵牛一两(半生半炒) 朴消 大黄各一分

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服十五丸，临卧时金银薄荷汤送下，加至二十丸。次服甘草散。

【主治】大风。

19737 去毒散

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】巴豆一两(去壳) 薄荷末二两 皂荚末二两 麝香(研) 一钱 鲫鱼一头(去肠肚)

【用法】上药研匀，入在鱼腹内，用泥固济，以炭火五七斤，烧存性，候冷取出，细研。每服一钱匕，用荆芥、腊茶调下，一日三次。

【主治】瘰癧毒气，郁结成脓，发泄不止。

19738 去毒散

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【异名】车螯酒(原书同卷)、小车螯散(《卫济宝书》卷下)、转毒散(《三因》卷十四)、车螯转毒散(《本草纲目》卷四十六)、车螯散(《医学纲目》卷十八)、车螯串(《串雅内编》卷三)。

【组成】车螯(紫唇光厚者，以盐泥固济，煨赤，去泥) 一个

【用法】上为细末。每服三钱匕，入膩粉一钱匕，甘草末二钱匕，和匀，别用栝楼一枚细锉，以酒二盏，慢火煎至一盏，去滓，于五更初温前酒调下。

【主治】发背痈疽，一切恶毒疮肿。

19739 去毒散

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】血余炭三分 孩儿茶 黄连 血竭 乳香各五钱 蜂房三分 黄丹三分 胆矾一分五厘 鸡内金(烧灰) 一分 没药五分

【用法】上为末。先将葱盐热汤洗净，敷患处三五次。

【功用】烂痔。

19740 去烂丹

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】龙骨八钱 炉甘石 乳香 没药 各四钱 煨石膏 滑石各五钱 白矾 铜青 各三钱 白占一两

【用法】上为末。用猪油捣和涂贴，外用油纸盖贴，捆缚。

【主治】男妇烂腿，经年不愈。

19741 去恶散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】雄黄一钱 巴豆一个（同研如泥） 乳香 没药（各末研匀）少许

【用法】雄黄、巴豆同研如泥，入乳香、没药，又再研匀。每取少许点上。

【主治】诸疮毒有恶肉不能去者。

19742 去热散

【方源】《准绳·疡医》卷四。

【组成】吉面消 山乌豆 鸡屎子 鸡距根 水圪子 过山龙 金凉伞（大叶） 白根子 紫金藤 九牛天竹 臭木待根 连义大青 落鸦爪藤

【用法】水煎服。

【功用】退热。

【主治】马疫发热；肿疡。

19743 去铃丸

【方源】《百一》卷十五引王吉老。

【异名】资政丸。

【组成】杜茴香一斤

【用法】以老生姜汁浸茴香一夜，约姜汁尽入茴香内，以好青盐二两同炒赤，取出焙燥，研罗为末，无灰酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸或五十丸，空心、食前温酒、米饮任下。

【主治】小肠疝气。

【方论选录】此药专实脾胃，以其有青盐引入下部、遂大治小肠疝气。寻常治疝气药多

是疏导，久而未有不为害者，此药用姜汁专一发散，而无疏导之害。

19744 去铃丸

【方源】《医方类聚》卷九十引《澹寮方》。

【组成】川乌尖七个（生用） 巴豆七枚（去皮，只去九分油）

【用法】上为细末，糕糊为丸，如梧桐子大，用朱砂、麝香为衣。每服二丸，同青木香丸三十粒，空心冷盐酒或冷盐水送下，三两日一服，不可多。

【主治】奔豚疝气，或阴囊肿大。

19745 去斑膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】大枫子仁 杏仁 核桃仁 红粉 樟脑各30克

【用法】先将三仁同捣极细，再加红粉、樟脑，一同研细如泥，如太干，加麻油少许调匀。每日揉擦一次（先涂小片，观察有无过敏反应）。

【功用】润肌消斑。

【主治】酒皰鼻，粉刺，黄褐斑。

19746 去解丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】熟石膏一两 黄升一钱五分 青黛二钱

【用法】研掺，小膏药贴之，一日一次。

【功用】拔毒去脓。

19747 去瘀饮

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】大黄（酒蒸）一两 归尾五钱 桃仁（去皮尖）二十一粒

【用法】鸡鸣时服。至天明取下瘀血即愈。

【主治】跌压瘀血积痛难忍。

19748 去膜丹

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】甘石一两（制） 珍珠一钱 珊瑚二钱 冰片三分 朱砂一钱半 麝香二分 硼砂一钱 蕤仁二钱 胆矾五分 青盐 铜绿各五分 海螵蛸八分 硃砂（制）二分 黄丹（制过）二钱

【用法】上为极细末，听用。

【功用】去翳膜。

19749 去腐丹

【方源】《外科传薪集》。

【组成】黄丹一两 熟石膏一两

【主治】顽腐不脱。

【宜忌】不可常用。

19750 去腐丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】熟石膏一两 黄升一两

【用法】上为细末。搽患处。

【功用】蚀发背等腐肉。

19751 去腐散

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】麻虫 指甲 轻粉 灰面各五分

蟾酥

【用法】上为细末，津液调丸，如麻子大。

每用三四丸，入毒内外，以膏药封好。

【功用】去败生新。

【主治】肿毒。

19752 去腐散

《药奁启秘》。为《青囊秘传》“去腐定痛生肌散”之异名。见该条。

19753 去腐散

【方源】《外伤科学》。

【异名】千金散。

【组成】制乳香五钱 制没药五钱 飞朱砂五钱 醋制蛇含石五钱 轻粉五钱

【用法】上为细末。用时将粉掺疮面，或粘附在纱纸条上，插入疮中。

【功用】化腐。

【主治】一切恶疮，腐肉不脱者。

19754 去薪汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】玄参七钱 麦冬三钱 天冬三钱 生地三钱 熟地三钱 山茱萸一钱 北五味五分 白芍三钱 丹皮二钱 白芥子一钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】瘦人多火者。

19755 去翳散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】甘石三钱 珠子 硼砂各七分(口含吐去涎水) 朱砂五分 麝香二分 琥珀五分 蟾酥(烘，去油)三分 儿茶(烘，去油)三分 冰片一分 磁粉五分(人乳、黄连汁煅淬七次)

【用法】上为细末。和匀点之。

【主治】眼中翳膜。

19756 去翳散

【方源】《仙拈集》卷二引《汇编》。

【组成】蕤仁二两(去油) 硼砂一钱 麝香

【用法】上为细末。乳调点。

【功用】去翳。

【备考】方中麝香用量原缺。

19757 去翳散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】蝉蜕 枳壳 绿豆皮各一两 甘草三分

【用法】上为末。每服二钱，食后麦冬汤调下。

【主治】疹后因潮不尽，热毒上攻于目，眼中微生翳膜者。

19758 去翳散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】大濂珠(乳煅)五分 犀黄三分 当门子三分 真熊胆五分 金精石(煅，飞)一钱 石燕(煅，飞)一钱 玄精石一钱 浮水甘石(九制)三钱 银精石(煅，飞)一钱 石蟹(煅，飞)一钱 琥珀(飞)一钱 冰片三分

【用法】上为末，和透。用人乳调。

【功用】去翳退星。

19759 去三虫丸

《医方类聚》卷二〇二。即《千金》卷二十七“去三虫方”。见该条。

19760 去三虫方

【方源】《千金》卷二十七。

【异名】三尸虫丸(《医方类聚》卷二〇二)

引《得效》)。

【组成】生地黄汁三斗 清漆二升 真丹三两 瓜子末三升 大黄末三两

【用法】东向灶苇火煎生地黄汁三沸，纳清漆，以荆匕搅之，日移一尺；纳真丹，复移一尺；纳瓜子末，复移一尺，纳大黄末，微火勿令焦，候之可丸，如梧桐子大。先食服一丸，一日三次。浊血下鼻中，三十日诸虫皆下；五十日百病愈，面色有光泽。

【主治】诸虫。

【方论选录】《千金方衍义》：首取漆之生者，搜逐脏腑之积荫，直捣三虫之窟穴，且与生地黄汁同煎，解其粘着之性，可无留积之虞；兼得铅丹、大黄、冬瓜子末，共襄厥功，一入虫口，则虫皆化为水，从魄门而下矣。详《本经》干漆条下原有去长虫之治。长虫者，九虫之长，是指三尸而言。以干者性缓，故专取生者之力锐；地黄亦须鲜者，方能逐血、能祛虫，若干地黄已经火焙，反资滞血，功用天渊；更取铅丹镇肝杀虫，除热下气；冬瓜子专涤肠垢，压丹石毒；大黄推陈致新，安和五脏，而祛之下夺。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“去三虫丸”。

19761 去老膜丹

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】硃砂五分(上下瓦合定，泥固，文武火煨过) 龙骨(煨过)三钱 巴豆(去油)三厘(用甘草水煮过) 白丁香(飞过)三分

【用法】上为细末用。

【功用】去老膜。

19762 去星翳丸

【方源】《经验广集》卷二。

【组成】木贼草 当归 白芍 川芎 白蛇壳 蝉蜕 谷精草 菊花 草决明 石决明 金银花 白蒺藜(去刺) 沙蒺藜各三钱(盐水炒) 防风 荆芥 川连 龙胆草各二钱

【用法】先用生羊肝二具，用竹刀切碎，将各药末拌，蒸熟，加羊胆汁三个为丸，如梧桐子大。每服三钱，清晨、临卧滚水送下。

【主治】一切障翳及眼中起星。

【宜忌】忌烧酒、姜、蒜、鱼、虾、鸡一月。

19763 去腐灵药

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】水银一两 火消二两 食盐三钱 枯矾三钱(三味炒燥) 朱砂八钱 雄黄三钱 白砒三钱 硼砂三钱(一加硃砂三钱)

【用法】上为末，入泥固罐内，盖盖封口，架三钉上，砌百眼炉，先底火二寸，点香一支，中火一枝，顶火一枝，随以水擦盖勿住，香毕去火，次日取升上者用。

【功用】去腐。

【加减】发背未破，加花粉；已破，加乳香、没药；疔疮初起，加蟾酥；肿毒，加鹅管石，醋调敷；烂疮，加黑附子；囊痈烂，加贝母；瘰癧破，加发灰、皂角、白及，水调敷；疳疮，加滑石；鱼口，加皂角；结毒，加光粉、滑石；廉疮，加轻粉、黄丹；跌打，加文蛤、百草霜；乳蛾、走马疳、耳腮等，俱用茶调；蛇咬，加南星、川椒；虫咬，加雄黄。

19764 去翳膜丸

【方源】《眼科全书》。

【组成】兔子屎(焙干)

【用法】上药焙干为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，米饮送下。

【主治】横开翳内障，肝肾二经受风热毒攻，以致瞳仁渐渐生翳膜，青白色，只一重似纸厚，托在黄仁金井内，金井外无团遮之忧。

19765 去翳膜丹

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】甘石五钱 珍珠六分 熊胆二钱(入在甘石内，晒干) 硼砂五分 朱砂一钱 铜绿七分 石燕五分 石蟹(用清水飞过)五分

【用法】上为极细末，听用。

【功用】去翳膜。

19766 去术平胃散

【方源】《易简方》。

【组成】厚朴 橘红 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】酒疸，眼睛、头面遍身黄色。

19767 去邪如扫汤

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】王不留行五钱 泽泻三钱 白术三钱

【用法】水煎服。一剂通达如故。

【主治】小便不通，膀胱气闭，面红耳赤，口渴烦躁。

19768 去刺全目丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】冰片一分 黄连一分 硼砂半分 甘草一分

【用法】上为细末，无声为度。用人乳调少许，点肉尖上，觉眼珠火炮出，一时收入而愈。

【主治】眼内长肉二条，长一寸，如线香之粗，触出于眼外，此乃肝胆之火，长此异肉。

19769 去毒化虫汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】白芍四钱 当归五钱 生甘草三钱 陈皮五分 泽泻三钱 茯苓三钱 白术五钱

【用法】水煎服。

【主治】产门内生虫。

19770 去毒玫瑰丸

《普济方》卷六十二。为《圣济总录》卷一二三“玫瑰丸”之异名。见该条。

19771 去桂五苓散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】猪苓 白术 赤茯苓(去皮)各五钱 泽泻七钱半 (一方加羌活)

【用法】上为末。用车前草、灯心汤调下。

【主治】婴孩吐泻。

【加减】镇心，加茱萸(炒)；吐不止，加生姜自然汁；渴盛，加人参。

19772 去恶平胃散

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】当归一钱 川芎一钱 桃仁一钱 炮姜五分 楂炭三钱 广皮一钱 茅术一钱(炒) 厚朴一钱 木香五分 砂仁一钱 苏木三分 降香五分

【主治】新产之后，恶露未行，不耐久坐，平卧太早，瘀血冲胃，胸脘痞满，时时作嘔。

19773 去恶清心汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】当归二钱 川芎一钱 桃仁一钱 五分 炮姜六分 楂炭三钱 延胡一钱 琥珀一钱 生熟蒲黄各六分 丹参三钱 牛膝二钱 灯心三尺 苏木三分 降香五分

【主治】新产之后，恶露未行，不耐久坐，平卧太早，瘀血冲心，头眩神昏，不能语言，万分危险。

19774 去恶清肺汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】当归二钱 川芎一钱 桃仁一钱 炮姜五分 楂炭三钱 延胡一钱 苏子二钱 桑皮三钱 橘红一钱 贝母二钱 苏木三分 降香五分 童便一杯(冲服)

【主治】新产之后，恶露未行，不耐久坐，平卧太早，瘀血冲肺，气喘鼻掀，头汗微出。

19775 去积阿胶丸

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】阿胶二两(用麦面炒成珠，去麦面) 赤茯苓四两(去皮) 川黄连六两(去须)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十九丸，空心米汤送下。

【主治】腹中积滞，疼痛作泻痢。

19776 去湿化痰汤

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】白术 白芍 当归各五钱 白茯苓 泽泻 黑山栀 生甘草各三钱 陈皮五分

【用法】水煎服。

【主治】产门内生虫。

19777 去湿生肌散

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】茯苓一钱 贝母三分 枯矾三分
草纸灰五分 雄黄二分 三七三分

【用法】上为末。入在脐内，用纸包之。

【主治】落脐后生疮。

19778 去湿健脾汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】党参一两 山药五钱 云苓五钱
薏米五钱 牛蒡子三钱(炒) 连翘三钱 陈
皮三钱 泽泻三钱 猪苓三钱 车前子三钱
(外包) 砂仁壳一钱 甘草一钱

【用法】水煎服；外以三物化坚汤罨之。

【主治】胞虚如球(非炎性眼睑水肿)。两
眼珠微赤，稍痠痒，无泪虚胀，不坚硬，皮
不变色。

【临证举例】胞虚如球 昔濮县杨某某，
女，37岁。时至中秋，忽觉四肢无力，眼胞
沉涩，意为感冒所致，即服以姜葱发汗之物，
至晨胞虚如球，不痒，稍觉微酸。六脉虚数，
惟太阴为甚。此乃脾土虚热，清气下降，虚
火上升。内服本方，外以三物化坚散罨之，二
三日即消。

19779 去湿清热散

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】白术二钱 苍术二钱半 泽泻
茯苓 天花粉 山梔各一钱 羌活七分 甘
草四分

【用法】水煎服。

【主治】湿热发症。

19780 去湿散邪汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】白术五钱 防风一钱 荆芥一钱
苏叶一钱 陈皮五分 桔梗一钱 甘草一钱
茯苓三钱

【用法】水煎服。

【功用】发汗疏泄。

【主治】邪居于腠理之间，不肯自出。

【加减】治冬月之泄汗，或加入桂枝五分，
或加入麻黄五分，在人斟酌。

【方论选录】此方妙在用白术为主，而以表

汗为佐使。盖人之脾气健，而皮毛腠理，始得
开合自如。今用白术以健土，去湿而利腰脐，
邪已难于久住，况有防风、荆芥、苏叶之品，尽
散外邪，何敢再居营卫？又有甘草从中调治，
则邪不必攻而自散矣，此泄治之佳者。

19781 去腐万金丹

【方源】《发背对口治诀论》。

【组成】巴豆不拘多少

【用法】先洗去白膜，再以好酒煮一枝香，
取出去油，炙干，为细末。凡毒有坏肉处，以
此药将药罗筛筛上，再贴黄金碧玉膏一昼夜，
其腐肉尽去矣。

【主治】发背对口有坏肉者。

19782 去腐白玉膏

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】猪板油(腊月取，切碎，锅熬勿焦，
去滓，凝后始白时用)四两 黄蜡(净者，化
开，倾瓷盘内，露二三夜自白)一两 白蜡
(净者)一两 真铅粉二两 龙骨 蜈蚣 象
牙末 凤凰退(焙黄) 鸡内金(不见水，阴
干，焙) 乳香 没药(各去油) 真轻粉
蜗牛(焙) 水银各一钱 白粉霜 冰片二
分

【用法】上药各为细末，另以樟脑研末，放
铜盆内，以大碗盖定，湿绵纸封口，上用生
面调糊，厚涂纸上，以微火离盆底拳高，少
顷冷定，取升上碗者用四钱。先将猪油入铜
锅内重汤煮化，投黄白蜡，次下铅粉，搅匀，
离火方下龙骨等味，待将凝，下水银，急搅，
缓则沉底，末下樟片，再搅极匀，瓷罐收固。
每用少许，摊于黑膏药中心。腐肉自化，条
条片片，粘连而下。

【主治】结毒，粉毒，疳疔，烂脚，一切痈
疽、顽疮。

19783 去腐定痛生肌散

【方源】《青囊秘传》。

【异名】去腐散(《药寇启秘》)。

【组成】生石膏(用甘草水飞七次)三两辰
砂三钱 冰片三分 硼砂五钱

【用法】上为细末。掺之。

【功用】《药奁启秘》：化腐定痛，生肌收口。

未

19784 未药

【方源】《咽喉秘集》。

【组成】雄精二钱 朴消五钱 硼砂二钱

【用法】上为末。如喉咙紧闭，不能吹药，用此药吹入鼻内，其口即开，开后或点、或刺、或消肿，用已、申之药，如腐烂用子药。

【主治】一切喉症。

19785 未央丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】巨胜子（九蒸九晒） 巴戟（去心） 川椒（去目） 枸杞 甘菊花 菖蒲 人参（去芦头）各一两

【用法】上用金桶袈裟一具，东流水洗千遍，荷叶裹，用文武火烧稍干，好酒煮烂，入药为丸，如梧桐子大。每服六七十丸至百丸，空心温酒或米饮送下，日进二服。药一两，用膏末子一两。

【主治】气血虚弱，肢体沉重，情思少乐，饮食减少；及肾气衰惫，腰腿沉重。

19786 未沅麻散

《普济方》卷三四八。即《圣惠》卷八十“神效未沅麻散”。见该条。

术

19787 术汤

【方源】《外台》卷三十三引《古今录验》。

【异名】白术汤（《圣济总录》卷一五五）、白术散（《医学纲目》卷十六）、三味白术汤（《景岳全书》卷六十一引《良方》）。

【组成】白术六两 黄芩三两 芍药四两

【用法】上切。以水六升，煮取二升半，分三次服，半日令尽。微下水，令易生。

【主治】①《外台》引《古今录验》：妊娠卒得心痛，欲死。②《校注妇人良方》：妊娠内热心痛。

【宜忌】忌桃、李、雀肉。

19788 术酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】术五斗（水淘，刷去黑皮，晒干粗捣）。

【用法】以水一石，煮令极软，稍稍益水，少取汁看候黄色，乃压漉取汁，可及七斗，糯米一石，炊熟，细曲十斤捣碎，以术汁都拌和入甕，密封，三七日开。日饮三杯。

【功用】久服延年不老。

【宜忌】忌桃、李、雀肉。

19789 术酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】术

【用法】煎一斗，好酒三斗相和，入瓷甕中盛，泥封头，三七日开。初服一盏，后即任意。勿至醉为妙。

【功用】服十五日诸病皆愈，气力十倍，行及奔马。

【宜忌】忌桃、李、雀肉。

19790 术酒

《圣惠》卷九十五。为《千金翼》卷十三“白术酒”之异名。见该条。

19791 术散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】术八两 桂四两 干地黄 泽泻 白茯苓各三两

【用法】上为末。每服方寸匕，酒饮，随性调下，一日三次。

【功用】益肾补虚。

【主治】五劳百损，四肢沉滞，骨肉痠疼，大病后不复常，行动喘悒，吸吸少气，小腹拘急，腰背强痛，心悸，咽干，饮食无味，虚乏瘦削。

19792 术酥

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】肥术二石（秋末取，以水刷去黑皮，晒干）

【用法】于木臼中捣匀碎，即于甕中薄铺白茅，上施布，即下术，以布掩之，上以合，蒸

一炊久，取下入盆，以汤拌湿润，再入甑中蒸一炊久，便入于酒槽中，压令汁尽，其汁入银锅，以重汤煮，不住搅之，时取少许看硬软，如常酥即成，贮于不津器中。不拘时候，以温酒调枣许大服之。甚良。

【功用】祛风，消食，补益。

【宜忌】忌桃、李、雀肉。

19793 术煎

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】好术一石

【用法】上药先以水洗濯去黑皮，细锉，以水三石，煮至一石，去滓，所得汁，以黍米三斗，磨作末，纳汁中，微火煮之令稠，候可作饼子，丸阔二寸许。每以饮下一枚，一日三次。

【功用】除百病，轻身明目；久服断谷延年。

【宜忌】忌桃、李、雀肉。

19794 术膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】术二两 附子二枚(大者，炮) 甘草一两 羊脂五两 松脂鸡子大一块 猪脂五两(不入水者)

【用法】上微火上煎猪脂，后纳羊脂并诸药又煎，膏成绞去滓。候凝，涂疮上，一日三次。

【主治】汤沃人肉烂坏。

19795 术曲丸

【方源】《普济方》卷二十二引《十便良方》。

【组成】神曲四两 大麦蘖二两 橘红白术各一两 白豆蔻仁五钱

【用法】上为细末，浸蒸饼心为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，浓煎人参汤送下，日进三四服，不拘时候。

【功用】进饮食，快中脘。

19796 术米汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】当归一钱五分 茯苓三钱 白术一钱五分 苡米八钱 橘红一钱 半夏一钱五分 莱菔二钱 杏仁三钱 海石三钱 姜

仁四钱

【用法】水煎，加姜汁二小匙冲服。

【主治】脾经之咳，胸膈痰稠，食少体倦。

19797 术苓汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】白术 黄芩 当归

【用法】水煎服。

【主治】胎孕不安。

19798 术连丸

【方源】《医学正传》卷三。

【组成】白术四两 黄连四钱五分

【用法】上为细末，神曲糊为丸，如黍米大。津唾送下。

【主治】嘈杂。

19799 术连丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】白术(土炒)四两 黄连(吴茱萸汤浸，炒)一两

【用法】上为末，神曲糊为丸。每服五六十丸，生姜汤送下。

【主治】肝火侵中，噯酸嘈杂。

19800 术附丸

【方源】《普济方》卷二〇九引《指南方》。

【组成】白术 附子各一两 橘皮二两

【用法】上为粗末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】洞泄。

19801 术附丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】厚朴(去粗皮，姜制炙) 茯苓(白者去皮) 干姜(炮，洗) 白术各四两(炒) 半夏二两(汤泡七次)

以上并锉骰子块，入大青州好枣六两，砂钵内水浸没一指许，煮水尽，取枣去皮核，用粗布绞取肉，入后药：

附子(炮、去皮脐) 甘草(炙)各一两半

【用法】上药一处焙干为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前白汤送下。

【功用】温脾暖胃，进饮食，消痰饮，实脏腑。

19802 术附丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】苍术(去土)一斤(净,用米泔水浸,逐日换新泔,春五日,夏三日,秋七日,冬十日,切片,焙干,分四制:一分用茴香一两,盐一两同炒术黄为度;一分用川乌一个制,切片,川楝子一两打碎,同术炒黄为度;一分用川椒一两,去目及合口者,破故纸一两,同术炒黄为度;一分用好醋、好酒各一盏煮术干,焙燥用之) 香附一斤(分四制,酒、醋、盐、水、童便,如前分四时各浸日数,炒干)

【用法】上为末,老米面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心、食前白汤送下。

【主治】月经不调,脐腹疼痛,肋疼腰胀,恶心头晕,或发热发寒,心忪乏力,崩中带下。

19803 术附汤

【方源】《金匱》卷上(附方)引《近效方》。

【异名】白术附子汤(《鸡峰》卷五)。

【组成】白术二两 附子一枚半(炮,去皮) 甘草一两(炙)

【用法】上锉。每服五钱匕,加生姜五片,大枣一枚,水一盏半,煎七分,去滓温服。

【功用】暖肌,补中,益精气。

【主治】风湿痹痛,头眩肢重,及中湿泄泻,小儿慢惊。

①《金匱》(附方引《近效方》):风虚头重眩苦极,不知食味。②《济生》:中湿脉细,自汗体重。③《医统》:小儿身冷,泄泻慢惊。④《保命歌括》:寒厥暴痛。

【方论选录】《法律》:肾气空虚之人,外风入肾,风挟肾中浊阴之气,厥逆上攻,其头间重眩之苦至极难耐,兼以胃气亦虚,不知食味。故方中全不用风门药,但用附子暖其水脏,白术、甘草暖其土脏,水土一暖,则阴浊之气,尽陷于下,而头苦重眩,及不知食味之证除矣。

19804 术附汤

【方源】《普济方》卷一一八引《指南方》。

【组成】白术四两 芍药一两 附子一两半(炮,去皮脐) 甘草二两(炙)

【用法】上为粗末。每服五钱,水二盏,加生姜三片,大枣一枚,煎一盏,去滓温服。

【主治】寒湿之证。

19805 术附汤

【方源】《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》。

【组成】白术一两 附子一两(炮,去皮脐) 桂枝一两 甘草半两(炙)

【用法】上为粗末。每服四钱,煎至六分,去滓热服,不拘时候。

【主治】太阳病与阳明合病,而自利者。阳明病当多汗,而反无汗,身如虫行,皮中痒者,此久虚也。厥阴病,因风湿相搏,身体疼痛,不能转侧,脉浮涩者。

19806 术附汤

【方源】《医方大成》卷十引《幼幼方》。

【组成】大附子一个(炮) 白术一两(煨) 木香半两 肉豆蔻一枚(面煨) 甘草半两

【用法】上咬咀。每服二钱,水半盏,加生姜三片,大枣一枚,煎服。

【主治】慢脾风,身弓发直,吐乳贪睡,汗流不已。

【备考】方中木香、甘草用量原缺,据《普济方》补。

19807 术附汤

【方源】《普济方》卷二四一引《海上方》。

【组成】附子(炮,去皮脐)半两 白术六钱 人参(洗,去芦)二钱半 杜仲(去皮,姜炒去丝)六钱 甘草(炙) 官桂(去粗皮)各二钱半 川姜七钱半(炮) 当归(去土,酒浸一宿,焙干)一两二钱半 牛膝(去根,酒浸,焙干)半两

【用法】上为粗末。每服半两,水二盏,煎至八分,温热服,病在上者食后,病在下者食前服。

【主治】寒湿脚气，筋骨手足一切疼痛。

19808 术附汤

【方源】《三因》卷六。

【组成】附子(炮，去皮脐) 白术各一两 甘草(炙) 茯苓 桂心各半两

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盞半，加生姜五片，大枣两枚，煎七分，去滓，食前服。

【主治】湿症。寒热身重，骨节烦疼，胀满，谵语自汗，善呕。

19809 术附汤

【方源】《十便良方》卷十一引《指迷方》。

【组成】苍术四两 芍药 茯苓各三两 人参 甘草各一两 附子一两半

【用法】上为粗散。每服五钱，水二盞，煎一盞，去滓温服。

【主治】寒湿之邪客搏经络，阳气不得发泄，蕴于肌肉之间，但寒，头重则眩暈，肌肉痠疼，牵急不得转侧，淅淅汗出，恶寒，小便不利，大便反快，短气眩暈，足寒，或时咽痛发热，其脉迟而小弦。

19810 术附汤

【方源】《普济方》卷二〇九引《直指》。

【组成】白术 苍术各二两 芍药三两 茯苓四两 附子 干姜各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盞，煎至一盞，去滓温服。

【主治】洞泄。

19811 术附汤

【方源】《普济方》卷一四七引《保生回车论》。

【组成】白术二两(锉如麦豆) 附子一枚(以半两为率，炮裂，去皮脐，锉如麦豆粒)

【用法】上如法事治了，一处于杵臼中，良时治之，勿令作末。每用四钱匕，水一盞半，煎及七分，去滓温服，一日三次，不拘时候。凡言日进三服者，如疾势稍重，当促其数，服尽而未知，并当再作本汤剂。

【功用】①《症因脉治》：温经散湿。②

《金鉴》：除湿兼温里。

【主治】寒湿身痛，腹胀，阴黄。

①《症因脉治》：寒湿腹胀。②《张氏医通》：寒湿体痛，自汗身寒。③《伤寒大白》：阴症发黄，里有寒湿。

19812 术附汤

【方源】《活幼口议》卷十九。

【组成】附子半个(炮了者) 白术一分 干姜二钱(炮) 甘草一钱(炙)

【用法】上咬咀。每服一钱，水一小盞，煎至半盞，去滓与服。手足暖止之。

【主治】①《活幼口议》：小儿脏腑虚寒，泄泻洞痢，手足厥冷。②《医统》：湿温，小便不利。

19813 术附汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】白术 附子(炮，去皮脐) 干姜(炮) 桂各一两

【用法】上咬咀。煎一两，食前服。

【主治】心上寒，寸口脉迟。

19814 术附汤

《医方大成》卷五。即《济生》卷四“附术汤”。见该条。

19815 术附汤

【方源】《得效》卷三。

【组成】白术四两(去芦) 绵附子(炮，去皮脐，薄切片)一两半 甘草(炙)二两

【用法】上锉散。每服三钱，水一盞，加生姜十片，煎取八分，去滓后调苏合香丸二粒，并进二服。或气短头晕，手足厥逆未退者，可进养心丹三十粒至百粒，不拘时候。

【主治】中寒、中气之候，四肢厥逆，口噤，牙关紧急，痰涎壅盛，如中风状者。

19816 术附汤

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《保命歌括》卷十六。

【组成】苍术(盐炒) 香附(盐炒) 黄柏(酒炒) 青皮去白 玄胡索 益智 桃仁 茴香(盐炒) 附子(炮) 炙草

【用法】上咬咀。每服五钱，顺流水煎服。

【主治】癰疽。

19817 术附汤

【方源】《校注妇人良方》卷八。

【组成】白术 生附子(须用好者)

【用法】上为末。每服五钱，加生姜、大枣，水煎，和滓服。如不应，倍用之。

【主治】下痢，脾气脱陷，肢体不动，汗出身冷，气短喘急，或呕吐不食者。

19818 术附汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】苍术 熟附子

【主治】寒湿成痹。

19819 术附汤

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷九。

【组成】白术四两 附子(炮，去皮脐)一两五钱

【用法】每服三钱，加生姜、大枣，水煎，热服。

【主治】风湿相搏，腰膝疼痛，中气不足，四肢重着。

19820 术附汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】人参 白术三钱 附子钱半 干姜一钱

【用法】水煎，冷服。

【主治】命门火衰，中真寒而外假热，外热烦躁，腹痛胀闷，下泻而兼脓血，六脉无力，右尺更弱，或大而散。

19821 术附汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】生茅术五钱 人参二钱 厚朴三钱 生附子三钱 炮姜三钱 广皮三钱

【用法】水五杯，煮成二杯，先服一杯，约三时，再服一杯。以肛痛愈为度。

【主治】浊湿久留，下注于肛，气闭肛门坠痛，胃不喜食，舌苔腐白。

【方论选录】气虚而为寒湿所闭，故以参、附峻补肾中元阳之气；姜、术补脾中健运之气，朴、橘行浊湿之滞气。俾虚者充，闭者通，浊者行，而坠痛自止，胃开进食矣。

19822 术附膏

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】附子(大者一个，炮，去皮脐，姜汁制浸，夏三日，春秋五日，冬七日，焙干，微炒黄色)半两 白术 诃子(炮，去核) 甘草(炙)各二钱半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。三岁一丸，水半盏，煎三分，暑月食前冷服，春、秋、冬温服，危者连进三服。小可吐泻，一服效，须是首尾住奶则可。

【主治】小儿吐泻不定，气粗烦渴，眼慢困顿，肚疼不食，鼻气冷，诸药力不能攻者。

【备考】本方方名，据剂型，当作“术附丸”。

19823 术苓汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】黄耆(炙) 防风 白茯苓 白术 麻黄根节各半两 甘草(炙)二钱

【用法】上锉细。每服三钱，加小麦百粒同煎，临卧服。

【主治】虚汗，盗汗。

【加减】或加牡蛎亦得。

19824 术苓汤

《女科万金方》。为《增补内经拾遗》卷三引《局方》“胃苓汤”之异名。见该条。

19825 术苓汤

【方源】《医统》卷五十一。

【组成】白术三钱 白茯苓二钱

【用法】水一盞半，加生姜三片，大枣二枚，煎八分，调妙香散，至夜温服。

【主治】脾虚盗汗。

19826 术苓汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《入门》。

【组成】苍术(土炒) 滑石各二钱 赤茯苓 白术 陈皮各一钱

【用法】上锉，作一贴。水煎服。

【主治】吐清水。

19827 术苓汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】苍术(制) 厚朴(炒) 山楂 防风 柴胡 木香 陈皮 茯苓

【用法】生姜一片为引。兼服和中丸或五苓散。

【功用】升气宽中，分阴阳。

【主治】霍乱上吐下泻。

19828 术苓汤

【方源】《医部全录》卷四三一。

【组成】白术二钱 茯苓一钱

【用法】上煎汤。入竹沥，热下龙荟丸三十丸，保和丸二十丸。

【主治】小儿惊，因脾虚肝乘之，手足搐动，四肢恶寒而食少。

19829 术苓散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】木香 厚朴 甘草 川连 苍术 陈皮

【主治】胎前产后泄泻。

19830 术砂散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】白术 砂仁(炒) 阿胶(蛤粉炒成珠)各三两

【用法】加条芩五钱，蒲黄斟酌加。每服二钱，艾汤调下。

【主治】胎漏下血。

19831 术香散

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】木香 蓬术各一两 干漆(炒烟尽)一钱

【用法】每服一钱，醋汤下。

【主治】心脾卒痛不忍。

19832 术桂汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】麻黄苍术汤。

【组成】苍术二钱 麻黄 炒神曲 橘皮 白茯苓 泽泻各一钱 桂枝 半夏 草豆蔻仁 猪苓各五分 黄耆三分 炙甘草二分 杏仁十个

【用法】上都作一服。水二盏，加生姜五片，煎至一盏，去滓，食前热服。

【主治】寒湿所客，身体沉重，胃脘痛，面色萎黄。

19833 术桂汤

【方源】《普济方》卷一四七引《保生回生论》。

【组成】白术三两(锉) 桂一分

【用法】上为细末。每服二钱，粥饮调下，一日二三次，不拘时候，以上二药服饵。

【主治】伤寒温病，表里未解，头痛发热，口燥咽干，烦渴引水，水入即吐，或小便不利，及汗出表解，烦渴不止者。

19834 术桂汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术三两 肉桂三分

【用法】水煎服。

【主治】房劳力役，又感风湿，两腰重如带三千文，不能俯仰，兼腰痛者。

19835 术桂散

【方源】《外台》卷二十三引《古今录验》。

【组成】麻黄 桂心各五分 白术 附子(炮) 菖蒲各三分

【用法】上为末。每服方寸匕，食前酒送下，一日三次。

【主治】汗出不止。

19836 术鼓汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】苍术(炒)五两 鼓(炒)三两半 麻黄(去根节)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一大盏，煎至七分，去滓热服。盖复出汗，未汗再服。

【主治】天行时疫，三二日内，未经汗下。

19837 术膏酒

【方源】《千金》卷七。

【组成】生白术(净洗)一石五斗(捣取汁三斗，煎取半) 湿荆二十五束(束别三尺，围各长二尺五寸，径头二寸，烧取沥三斗，煎取半) 青竹三十束(束别三尺，围各长二尺五寸，径一寸，烧取沥三斗，煎取半) 生地黄根五大斗(粗大者，捣取汁三斗，煎取半) 生五加根三十六斤(洗净讫，锉，于大釜内以水四石煎

之,去滓澄清,取汁七斗,以铜器中盛,大釜内水上煎之,取汁三斗五升)

【用法】以上白术等五种药,总计得汁九斗五升,好糯米一石五斗,上小麦曲八斤,晒干为末,以药汁六斗,浸曲五日,待曲起,第一投净淘米七斗,令得三十遍,下米置净席上,以生布拭之,勿令不净,然后炊之,下饭,以余药汁浸饭,调强弱更蒸之,待饭上痂生,然后下于席上,调强弱冷热如常酿酒法,酝之瓮中,密盖头。三日后第二投,更淘米四斗,一如前法投之,三日后即加下药:桂心、甘草、白芷、细辛、防风、当归、麻黄、芎藭各六两,附子五两,牛膝九两,干姜、五加皮各一斤。上药咬咀讫。第三投以米四斗,净淘如前法,还以余汁浇饭重蒸,待上痂生,下置度上,调冷热如常酿法,和上件药投之,三日外,然后尝甘苦得中讫,密封头二七日,乃压取清酒。一服四合,一日二次,细细加,以知为度,温酒不得过热。

【主治】脚弱风虚,五劳七伤。

【宜忌】慎生冷、酢滑、猪、鲤鱼、蒜、牛肉等。

【方论选录】《千金方衍义》:脚气之病多缘肾虚痹湿所致。以脾湿故用白术、肾虚故用五加,血燥故用地黄,风湿故用湿荆,筋急故用竹沥,用以酿酒,次第更加后药,较之浸酒,工力虽繁,而功用洵不寻常。

【备考】本方方名,《外台》引作“白术膏酒”。

19838 术薏面

【方源】《活幼口议》卷十八。

【异名】术薏散(《普济方》卷三九八)。

【组成】白术半两 肉豆蔻(炮)二枚 木香二钱

【用法】上为末,面二两入药,水搜作剂,切作条子,水煮令熟,用葱白、生姜、盐各少许和汁滋味与之。看入多少,仍兼鸡青丸服。

【主治】小儿噤口痢

19839 术薏散

《普济方》卷三九八。为《活幼口议》卷十八“术薏面”之异名。见该条。

19840 术汤浴方

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】白术五两

【用法】上为粗末,米泔浸一宿,至明用慢火煎五七沸,先宜灸顶上旋毛中,小柱勿令大,三壮讫,用本方以适寒温,洗儿头及身。

【主治】小儿风痫,掣痰,身体汗出,独头无汗。

19841 术归桂草汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】白术 当归各五钱 肉桂五分 炙甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后血虚,小腹痛。

19842 术附防风汤

【方源】《医方类聚》卷九十八引《施圆端效方》。

【组成】白术 附子(熟) 甘草 防风各一两 桂三两 茯苓半两

【用法】上为粗末。每服五钱,水一盂半,煎至六分,去滓温服,日三夜一。

【主治】肢节痛重,不可转侧,脚气痛痹,自汗欲衣,或身微肿。

19843 术附姜苓汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】生白术五钱 附子三钱 干姜三钱 茯苓五钱

【用法】水五杯,煮取二杯,一日服二次。

【主治】湿久伤阳,痿弱不振,肢体麻痹,痔疮下血。

19844 术附理中丸

【方源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】人参 附子(炮) 炮姜 白术 炙甘草 木香 丁香各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服六七十丸,食前白汤送下。

【主治】中寒,心腹急痛。

19845 术苓加桂汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术 茯苓各一两 肉桂三钱

【用法】水煎服。

【主治】脾虚不能运化，水湿停积，下不能行，涌而上行，而致口眼喎斜，身欲颠仆，腹中鸣如囊裹浆之声。

19846 术苓加桂汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】白术一两 茯苓五钱 肉桂一钱

【用法】水煎服。

【主治】肾火不足，脾土虚衰，饮食之后，胸中倒饱，久久不已，遂成中满之症。甚则腹渐高大，脐渐突出，肢体渐浮肿。

19847 术苓固脾饮

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】白术一两 茯苓 人参 山药 芡实各五钱 肉桂五分 肉豆蔻一枚

【用法】水煎服。经未泻前服此。

【主治】脾虚而气不摄血，湿气先乘之，行经之前先泻三日，而后行经。

19848 术苓调中汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】白芍 猪苓 茯苓 泽泻 厚朴 各一钱二分 陈皮 甘草 苍术 白术各八分 山楂 香附 麦芽 神曲各一钱

【用法】加灯心三十茎，水煎，食前服。

【主治】过伤饮食，大便泄泻，下痢，肚腹膨胀。

19849 术苓调脾散

【方源】《痘疹传心录》卷十九。

【组成】白术一钱（炒，去芦） 白茯苓八分（去皮） 真神曲八分（炒） 白芍六分（酒炒） 白扁豆八分（姜汁浸，去壳，炒） 砂仁六分（炒，研） 香附七分（炒） 厚朴六分（姜汁炒） 甘草三分（炙）

【用法】加煨姜三片，大枣一枚（去核），同煎服。

【主治】脾土中虚泄泻。

【加减】或加人参三分。

19850 术香启中汤

【方源】《奇效良方》卷十七。

【组成】木香 人参 白术 茯苓 陈皮 半夏 枳壳 香附 缩砂 白豆蔻 甘草各等分

【用法】上咬咀。每服六钱，水一盏半，加生姜七片，大枣一枚，同煎至八分，去滓，不拘时候温服。

【功用】补脾胃，进饮食，宽膈顺气。

19851 术桂干姜汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】白术一两 肉桂三钱 干姜三钱

【用法】水煎服。

【主治】中寒。严寒之时，忽感阴冷，直入于腑，手、足、身皆冷，面目色青，口呕清水，腹中雷鸣，胸膈逆满，体寒发颤，腹中觉有凉气一裹，直冲而上，猝不知人。

19852 术桂防稀汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术二两 肉桂三钱 防己一钱 稀荳蔻五钱

【用法】水煎服。

【主治】露宿于星月之下，寒湿之气入于骨髓之内，腰痛不能转侧者。

19853 术桂豆苓汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】肉桂一钱 白术一两 茯苓三钱 肉豆蔻一枚

【用法】水煎服。

【主治】少阴入肾，而兼入于小肠之腑，小腹作痛，两足厥逆。

19854 术桂草玄丹

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】白术二两 肉桂一钱 甘草一钱 玄胡索一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人下焦寒湿相争，经水将来，三、五日前脐下疼痛，状如刀刺，寒热交作，下如黑豆汁，既而经来，因之无娠。

19855 术桂加泽泻汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术一两 泽泻三钱 肉桂五分

【用法】水煎服。

【主治】腰痛，日重夜轻，小水艰涩，饮食如故者。

19856 术茯苓前子汤

【方源】《医统》卷三十五。

【组成】白术 茯苓 车前子 泽泻 芍药 陈皮 炙甘草各等分

【用法】上㕮咀。每服七钱，水一盞半，加生姜三片、大枣一枚、灯心，煎至七分服。

【主治】一切泄泻。

【加减】伤食泄黄或食积，加神曲、麦芽、山楂子各八分，黄连七分以消之；腹中窄狭，饱闷，再加厚朴、枳实、木香各五分；小便赤涩短少，加猪苓、木通、山梔各五钱；湿泻者，加茵陈、苍术各一钱；若夏秋之间，湿热大行，暴注水泻，加炒黄连、苍术、升麻、木通各五分；发热躁渴，加干葛、石膏各一钱；口渴引饮，加葛根、人参、麦门冬各一钱，升麻、乌梅肉各一分；暑月泄泻，加香薷、厚朴；寒月溏泻，清冷腹痛，或伤冷食，加神曲、麦芽、干姜（煨）各一钱、砂仁、木香、益智各五分；胜湿须加防风、羌活、白芷、苍术、半夏；胃气下陷，加人参、黄耆、升麻、柴胡以升清气；久泻肠胃虚滑不禁，加肉蔻（煨）、石脂（煨）、诃子（煨）、木香（炒）、干姜各五分；清晨溏泄，加破故纸（炒）、茴香（炒）、肉蔻（煨）。

本

19857 本药

【方源】《喉科紫疹集》卷下。

【组成】川乌一钱 草乌一钱（焙） 淮乌一钱（焙） 乌头一钱（焙） 龙骨一钱（煨） 象牙一钱（焙） 青黛一钱 血竭五分 梅片五分 银花生五分，炙五分 硼砂一钱 珍珠五分 乳香五分 没药五分 青鱼胆五分 麝香三分 儿茶一钱

【用法】上为细末，小罐密收。凡遇喉中诸症，用此先吹，下刀后，用秘药吹之。

【主治】一切喉症疼痛者。

19858 本末丸

【方源】《普济方》卷一三九。

【组成】雄黄 朱砂 铅丹 风化灰各三钱 砒一钱

【用法】上为粗末，以枣十枚煮取肉为丸，如梧桐子大，各于丸上针一孔，晒干。每服二丸，以针穿定药，灯上烧红，急投麻油中，取出，冷齏汁送下，便卧。

【主治】伤寒素有喘息咳嗽，发动不得卧，胸满短气，病本在肾，末在肺者。亦治疟。

【宜忌】禁热物。

【加减】喘甚，加砒二钱。

世

19859 世宝丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】附子（炮，去皮脐） 牛膝（酒浸一宿，焙） 肉桂（去粗皮） 白茯苓（去皮） 椒红 五味子 茴香（炒） 枳壳（汤浸去瓢，麸炒） 人参（去芦头） 熟干地黄（洗，焙）各一两半

【用法】上为细末；次用精羯羊肉四两（细切）、肉苁蓉（洗净）二两（细切）、羊脂二两（细切）、黄蜡二两（细切）、杏仁（去皮尖）二两（炒，切）、乌梅肉一两，葱白三两，上七味，用酒五升，同入银器中，慢火煮令肉烂，研成膏，入前药末一处捣和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至四五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下；肺痿咯血，煎糯米、阿胶汤送下。

【功用】补益元气，轻健腰脚，实骨髓，耐风寒，滋养气血。

【主治】下元虚损，久积寒冷，目晕耳鸣，形体羸弱，阴痿自汗，遗沥泄精；及肺痿喘嗽咯唾有血，怯风畏寒，手足多冷，一切虚劳气劣。

19860 世传地黄丸

《医部全录》卷四一三。即《保婴撮要》卷四“世传方地黄丸”。见该条。

19861 世传苍术散

【方源】方出《保婴撮要》卷四，名见《医部全录》卷四一三。

【组成】苍术四两（米泔浸，切片、焙）

【用法】上为末，猪肝二两，批开掺药在内，用麻系定，粟米一合，水一碗，砂锅内煮熟，熏眼，候温，临卧每服三钱。

【主治】雀目。

19862 世传茯苓丸

《准绳·女科》卷二。为《百一》卷五引《指迷方》“治痰茯苓丸”之异名。见该条。

19863 世传通关散

【方源】《保婴撮要》卷五。

【组成】大南星一个（炮）

【用法】上为末。每服二分，猪胆汁调下，便能言语。

【主治】小儿惊风愈后，声哑不能言者。

19864 世秘资生丹

【方源】《宁坤秘籍》卷上。

【组成】归身（酒洗） 川芎（酒洗） 香附米（去毛，醋炒，忌铁器） 苍术（米泔水浸，炒） 玄胡（炒） 蒲黄（炒） 白茯苓（去皮） 桃仁（去皮尖） 淮熟地（酒蒸净）各一两 山茱萸（去核） 地榆（酒洗） 五灵脂（醋浸，瓦焙） 羌活 甘草（炙） 白芍（酒炒） 人参 陈皮 牛膝（去芦）各五钱 三棱（醋浸透，纸包煨）五钱 白术（土炒） 青皮 木瓜各三钱 良姜四钱 乳香（去油） 没药（去油） 木香各一钱 天台乌药一钱五分 益母草一两五钱（忌铁器） 阿胶（蛤粉炒成珠）八钱

【用法】上药各制净，为极细末，用大黄膏为丸，如弹子大。每服一丸，临用搗为细末，好酒调服，不拘时候。

【主治】子死腹中，胞衣不下，难产，产后头晕，口干心烦，寒热如疟，四肢浮肿，烦

躁癫狂，失音不语，泻痢脓血，百节痠痛，小便尿血，崩中漏下，胸膈气呕逆不定，咳嗽，喉中似蟾鸣。或产后小便赤涩，大便滞迟不通。或经行腹痛，经闭。月经不调。

【备考】大黄膏：锦纹大黄一斤（去黑皮，为极细末），苏木三两（劈碎，河水五碗，熬取三碗），红花三两（炒黄色，入好酒一大壶，同煮五六碗去滓存汁），另黑豆三升，用河水熬汁三碗。先将大黄末入锅内，用米醋五碗搅匀，熬至滴水成珠，又下醋四五碗熬，如此三次，取膏，即入红花酒、苏木汤、黑豆汁搅开，大黄膏再熬成膏取出，瓦盆盛之。

19865 世传方地黄丸

【方源】《保婴撮要》卷四。

【组成】鹿茸五钱 泽泻 茯苓 山茱萸 熟地黄 牡丹皮 牛膝各一两

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，盐汤送下。

【主治】肾虚，目睛多白。

【备考】本方方名，《医部全录》引作“世传地黄丸”。

19866 世传白花蛇酒

【方源】《本草纲目》卷四十三引《濒湖集简方》。

【组成】白花蛇一条（温水洗净，头尾各去三寸，酒浸去骨刺，取净肉一两） 全蝎（炒） 当归 防风 羌活各一钱 独活 白芷 天麻 赤芍药 甘草 升麻各五钱

【用法】上锉碎，以绢袋盛贮，用糯米二斗蒸熟，如常造酒，以袋置缸中，待成，取酒同袋密封，煮熟，置阴地七日出毒。每温饮数杯，常令相续。

【主治】诸风不论新久，手足缓弱，口眼喎斜，语言謇涩，或筋脉挛急，肌肉顽痹，皮肤燥痒，骨节疼痛，或生恶疮、疥癩等疾。

19867 世传密陀僧散

【方源】《保婴撮要》卷十。

【组成】密陀僧（研极细末如粉）

【用法】每服一钱七分，茶清调下。

【主治】惊气入心络，不能语者。

甘

19868 甘醴

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】羊蹄躑花一两 北红枣五十枚 风藤二两

【用法】烧酒五六碗，共入坛内，糠火煨。饮半小杯，令人昏迷一周时。酒未完而病已脱。

【主治】麻痹，不省人事。

19869 甘石散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】绿炉甘石 乌贼骨各等分

【用法】上为细末，入脑少许。点目眦，泪自收。二药燥，脑和之。

【主治】眼风，流泪不止。

19870 甘石散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】橡斗子（烧灰存性）二钱 密陀僧 炉甘石各一钱半 轻粉一分 龙骨半钱 麝香少许

【用法】上为细末。先用荆芥、杜仲、川椒，煎汤温浴，洗罢，然后搽药。

【主治】下疳疮。

19871 甘石散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】炉甘石 31 克 石决明 31 克 煅龙骨 31 克 熟石膏 31 克 松花粉 62 克 枯矾 15 克 冰片 6 克

【用法】上为极细末。撒布创面，或调油外敷。

【主治】足跟溃疡。

【备考】本方加入煅石膏 30 克，冰片 1 克，研末外用，名“冰石散”。

19872 甘石膏

【方源】《博济》卷三。

【组成】炉甘石（研） 代赭石（煨，醋淬七次，研） 黄丹各四两（水飞过） 白沙蜜半斤

【用法】上将二石研为极细末，次与黄丹和合，用铜锅将蜜炼去白沫，更添水五六碗，熬沸，下前药，以文武火熬，用一碗，用铜器搅，试将药滴水中沉下为度，方可住火，熬成，用夹纸四重滤过，用净瓷器盛贮，密封，不要透下尘土，恐点眼时隐眼。如眼昏花，不时点之。

【主治】眼昏花，视物不明。

19873 甘白丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】甘草 白矾各等分

【用法】每服二钱，饮下即愈。

【主治】腹中忽有应声虫。

19874 甘瓜散

【方源】《幼幼新书》卷十六引《惠眼观证》。

【组成】瓜蒂 甘草（炙）各二钱

【用法】上为末。每服一大钱，五更初用茶清调下。小儿半字。

【主治】小儿胸胎。

19875 甘芎散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】甘草（炙） 白芍药 白术（焙） 川芎 阿胶（糯米炒，却去米）各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜二片，大枣一个，同煎七分，通口服，不拘时候。安胎，入胶、艾煎；嗽，用五味子；如腹痛下痢，入干姜；白痢常服，入姜、枣。

【功用】安胎，清膈，进食。

19876 甘竹汤

《准绳·类方》卷五。为《千金》卷三“甘竹茹汤”之异名。见该条。

19877 甘麦散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】大麦麦四两 甘草半两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，煎至八分，温服，不拘时候。

【主治】脾胃不和。

19878 甘豆汤

【方源】《千金》卷二十四。

【组成】大豆汁 甘草

【主治】中乌头、巴豆毒。

【方论选录】甘草解百药毒，此实如汤沃雪，有同神妙。有人中乌头、巴豆毒，甘草入腹即定。大豆汁解百药毒，余每试之，大悬绝不及甘草，又能加之，为甘豆汤，其验尤奇。

19879 甘豆汤

【方源】《洪氏集验方》卷四。

【组成】黑豆一两 甘草半两

【用法】同煎汤服之。

【主治】脚肿。

【临证举例】脚肿 郭镇廷圭知县云，昔年太学士人，围闭中，多患脚肿，至腹则死。前后如此者非一人。后有施此方，服之皆愈。

【备考】方中甘草原脱，据《普济方》补。

19880 甘豆汤

【方源】《普济方》卷三六一引《汤氏宝书》。

【组成】黑豆一合 甘草一两（切）

【用法】用水一大碗煮。临热入沙糖少许，同煎糖化，澄清，遇渴饮之。

【主治】小儿初生，下胎黄。

【备考】加淡竹叶一握，能解五脏热毒。夏月产者，尤宜服之。

19881 甘豆汤

【方源】《直指》卷十五。

【组成】黑大豆二合 甘草二钱

【用法】加生姜七片，井水煎汁服。

【主治】诸热烦渴，大小便涩；及内蓄风热入肾，腰痛，大小便不通；血淋，诸淋。

19882 甘豆汤

【方源】《幼科类萃》卷三。

【组成】甘草一钱 黑豆二钱 淡竹叶十片

【用法】上哎咀。用水一钟，加灯心七茎煎，不拘时候服。

【主治】小儿胎热。

【备考】方中淡竹叶剂量原脱，据《医统》

补。

19883 甘豆散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】黑豆三升 生姜三两（炒） 甘草一寸

【用法】上用水五升，煎豆熟为度。取汁缓缓服。才觉产便服之。

【功用】易产，治风。

【主治】难产三日，子母不相见。

19884 甘连汤

【方源】《宁坤秘籍》卷上。

【组成】甘草五钱 川连一钱（炒） 干姜一钱

【用法】水煎，温服。

【主治】胎前泻痢。

19885 甘连汤

【方源】《女科秘要》卷三。

【组成】甘草五分 黄连二钱

【用法】水煎服。

【主治】月水将临，伤食椒、姜、鸡、热毒物，毒攻五脏，变作痢疾，诸药无效者。

19886 甘连散

《普济方》卷二九九。为方出《千金》卷六，名见《圣惠》卷三十六“杏仁丸”之异名。见该条。

19887 甘松丸

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】甘松（去土） 黄荆实 芥菜子（陈者） 赤蓼花 椴子（炒） 白僵蚕（炒） 蜈蚣壳各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，温酒化下，不拘时候。

【主治】打扑损伤，手脚筋骨疼痛。

19888 甘松汤

【方源】《普济方》卷二四二。

【组成】荷叶心 藁本 甘松

【用法】煎汤。洗之。

【功用】收湿拔毒。

【主治】湿脚气。

19889 甘松散

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】甘松一分 猪肾(薄批,炙干)一对 芦荟(研)半两 腻粉(研)一分

【用法】上为散。临卧时,先以浆水净漱口,后以药贴患处。有涎即吐之。

【主治】风痞,虫蚀肉尽。

19890 甘松粥

【方源】《药粥疗法》引《饮食辨录》。

【组成】甘松 5 克 粳米 30~60 克

【用法】先煎甘松取汁,去滓,再用粳米煮粥,待粥将成时,加入甘松药汁,稍煮一二沸即可。每天两次,空腹温热食用。3~5 天为一疗程。

【功用】行气止痛,补脾健胃。

【主治】气闷胸痛,脘腹胀痛,食欲不振,胃寒呕吐。

【宜忌】发热病人忌用。

19891 甘松膏

《普济方》卷四十八。即《千金》卷十三“生发膏”。见该条。

19892 甘矾散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】生甘草一寸 白矾一栗子大

【用法】放口内,含化咽津。

【主治】太阴口疮。

19893 甘乳散

【方源】《幼幼新书》卷九引《惠眼观证》。

【组成】白附子 川乌头(并烧存性)各一钱(先各以一两,可烧得二钱) 朱砂 硼砂各一钱 脑 麝各少许

【用法】上为末。每服一钱至二钱,薄荷汤调下。

【功用】定搐。

【主治】慢惊风。

19894 甘乳膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】乳香二钱 水飞甘石粉二钱 龙骨二钱 石脂二钱 海螵蛸二钱 凡士林四两

【用法】直接外涂,或涂于纱布上再外敷。

【功用】收干生肌。

19895 甘泽饮

【方源】《李氏医鉴》卷七。

【组成】甘草 泽泻 茯苓 通草 车前子 瞿麦 木通 扁蓄 梔子 琥珀

【主治】上焦肺热,小便秘涩。

19896 甘草丸

【方源】方出《肘后方》卷四,名见《圣济总录》卷七十九。

【组成】防己 甘草 葶苈各二两

【用法】上为末,苦酒为丸,如梧桐子大。每服三丸,一日三次。

【功用】消肿。

【主治】大腹水病。

19897 甘草丸

【方源】《外台》卷二十二引《删繁方》。

【组成】甘草六分(炙) 人参六分 半夏六分(洗) 乌梅肉六分 枣膏十分

【用法】上五味,捣筛四味,枣膏相和,入蜜为丸,如弹子大。含之。

【主治】口热干燥。

【备考】本方《千金》有生姜。

19898 甘草丸

【方源】方出《医心方》卷二十五引《古今录验》,名见《普济方》卷三九三。

【组成】甘草十八分

【用法】上药治下筛,炼蜜为丸。一岁儿服如小豆粒二十丸,一日三次,不妨食及乳,服尽更合。

【主治】小儿无辜,面黄发直,时壮热,饮食不生肌肤,积经日月,遂致死。

19899 甘草丸

【方源】《外台》卷十七引《延年秘录》。

【组成】甘草四两(炙) 人参二两 白术二两 芍药二两 黄耆二两 远志二两(去心) 大麦蘖二两(熬令黄)

【用法】上为散,以枣膏和蜜搅调和药,令成丸,如梧桐子大。食后少时,以酒或饮任下五丸,渐加至七丸,一日二次,长服勿绝,尽即更合,非止一剂即停,多分两恐难尽又

坏；分两少，服尽更常得新药。

【功用】安养五脏，长肌肉，调经脉，下气，补脾胃，益精神，令人能食，强健倍力。

【宜忌】忌海藻、菰菜、桃、李、雀肉。

19900 甘草丸

【方源】《千金》卷三。

【组成】甘草三两 人参二两 远志三两 麦门冬二两 菖蒲三两 泽泻一两(如无，以白术代之) 桂心一两 干姜二两 茯苓二两 大枣五十枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆大。每服二十丸，酒送下，一日四五次，夜再服。不知稍加。

【主治】产后心虚不足，虚悸，心神不安，吸吸乏气，或若恍恍惚惚，不自觉知者。

【加减】若胸中冷，增干姜。

【方论选录】《千金方衍义》：《千金》用参、苓补虚，多兼姜、桂，化热多兼门冬，不独甘草丸为然；菖蒲、远志引领诸味，桂心、泽泻淡渗，专导虚热下泄。

19901 甘草丸

【方源】《医心方》卷九引《效验方》。

【组成】甘草二分(炙) 瓜蒂一分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。欲下病，服三丸，一日一次。三丸不下，增之，以吐为度。

【主治】留饮。

19902 甘草丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】甘草一两(炙微赤，锉) 人参一两(去芦头) 生干地黄一两 乌梅肉一两(微炒)

【用法】上为末，以枣瓤并炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，绵裹含咽津，一日四五次。

【主治】虚劳，口干舌燥。

19903 甘草丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】甘草三分(炙微赤，锉) 人参三分(去芦头) 麦门冬一两半(去心，焙) 乌

梅肉三分(微炒) 栝楼根三分 寒水石一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，含咽津。

【主治】口舌干燥烦热。

19904 甘草丸

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】甘草一两(炙微赤，锉) 犀角屑一两半 黑豆一两(炒熟) 麝香半两(细研) 斑蝥半两(以糯米拌炒，米黄为度，去头翅足)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，空心以粥饮送下。服后觉疮痛即住药。其病当从小便中出，即于盆子内看之。

【主治】热毒结成瘰癧，日夜疼痛。

19905 甘草丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】甘草半两(炙微赤，锉) 桂心一分 杏仁一分(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，更研如膏)

【用法】上为散，入杏仁研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三丸，以乳汁研化服之，一日三四次。

【主治】儿未满百日，咳嗽上气。

19906 甘草丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】甘草(炙) 桂(去粗皮) 芦荟(别研) 蜀椒(去目及闭口，炒出汗) 豉(微炒) 木香 柏子仁 芫荽各一两

【用法】上药除芦荟外，捣罗为末，入芦荟研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧用温酒送下。渐加至三十丸。

【主治】疝气成块，在脐两边疼痛。

19907 甘草丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】甘草(炙，锉) 当归(切，焙) 芍药各一两 干姜(炮) 芎藭 人参 黄芩(去黑心) 各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹丸大。每

服一九，温酒化下，空腹夜卧服。

【功用】强神益气。

【主治】虚劳脱营，羸瘦少气，精神毁减。

19908 甘草丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】甘草一寸(炙赤色) 杏仁二十枚(汤浸去皮、尖、双仁，研) 黄连末一分

【用法】上为末，和匀。每服如杏仁大。绵裹含化咽津。

【主治】口糜生疮，痛不得食。

19909 甘草丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】甘草(炙，锉) 人参 乌梅肉(炒) 枣肉(焙) 石膏(碎)各一两 半夏(汤洗去滑，生姜汁制)一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹丸大。每服一九。含化，不拘时候。

【主治】口干心热。

19910 甘草丸

《普济方》卷五十六。为《圣惠》卷三十七“纳鼻甘草丸”之异名。见该条。

19911 甘草丸

【方源】《普济方》卷三五二。

【组成】甘草(炙)五两 当归 干姜 人参 术各二两

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如弹子大。磨纳一升酒中，作一服，一日三次。

【功用】补虚，去血，止痛。

【主治】产后虚损。

19912 甘草水

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】甘草(切碎)40克

【用法】加水2000毫升，煮沸过滤，冷后备用。取五六层重迭纱布，浸于2%甘草水溶液，外敷患处，每一二小时换用湿敷一次。

【主治】急性湿疹，湿润糜烂，流水淋漓。

【加减】可加冬桑叶30克，或五倍子10克，水煎作冷湿敷。

19913 甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】温液汤(《千金翼》卷十五)、甘草散(《医方类聚》卷五十四引《神巧万全方》)。

【组成】甘草二两

【用法】以水三升，煮取一升半，去滓，温服七合，一日二次。

【功用】①《直指小儿》：涌吐痰涎。②《金匱要略论注》：清少阴客热。

【主治】伤寒少阴病，咽喉干燥，疼痛灼热；肺痿涎唾；小儿撮口；痈疽热毒。

①《伤寒论》：少阴病二三日，咽痛。②《玉函经》：小儿撮口发噤。③《千金》：肺痿涎唾多，心中温温液液者。④《外台》：羸劣老弱，体性少热，因服石散，而寒气盛，药伏胸膈，冷热不调，烦闷短气欲死，药既不行，又不能大便。⑤《圣惠》：中蛊欲死。⑥《圣济总录》：热毒肿，身生瘰浆；舌卒肿起，满口塞喉，气息不通，顷刻杀人。⑦《伤寒总病论》：豌豆疮欲出。⑧《直指》：诸痈疽，大便秘。

【方论选录】①《法律》：本方用甘草一味，乃从长桑君以后相传之神方也。历代内府御院莫不珍之。盖和其偏，缓其急，化其毒，卓然奉之为先务，然后以他药匡辅其不逮。②《金匱要略论注》：甘草一味单行，最能和阴而清冲任之热。每见生便痢者，骤煎四两顿服立愈，则其能清少阴客热可知，所以为咽痛专方也。③《伤寒论集注》：案本论汤方，甘草俱炙，炙则助脾土而守中。惟此生用，生则和经脉而流通，学者不可以其近而忽之也。

【临证举例】①少阴咽痛 《岳美中医话集》：昔在山东时，曾治一患者，咽喉痛如刀刺，曾用西药未效，细察咽喉，局部不红不肿，诊断为少阴咽痛，病由少阴经气不能舒展所致。予服《伤寒论》甘草汤，生炙甘草并用，以舒其痉挛。饮后二日，其痛若失。②毒草中毒 《新中医》(1978; 1: 36): 苏某某，男，42岁。炒食山上采取野草约250克，5小时后出现腹痛，恶心头晕，出冷汗，全身

无力, 呕吐, 于发病后两小时就诊。取甘草 1500 克, 浓煎。第一次药后 10 分钟呕吐一次; 30 分钟后服第二次药, 2 小时后腹痛、恶心逐渐减轻; 再服第二煎药液 100 毫升, 2 小时后, 腹痛消失, 但仍感全身乏力, 头晕。4 小时后腹泻一次, 为黄褐色烂便, 再服余下的药液 100 毫升, 6 小时后诸症消失而痊愈。

【备考】《外台》本方用生甘草四两, 切。以水五升, 煮去折半, 去滓, 令顿服之。当大吐, 药亦与病俱去, 便愈矣。夫散家患心腹痛, 服诸药不愈者, 服此诸膈即通, 大便亦利, 甚验。

19914 甘草汤

【方源】方出《肘后方》卷二, 名见《千金》卷九。

【异名】阴毒汤(《千金》卷九)、当归汤(《圣济总录》卷二十七)、阴毒甘草汤(《普济方》卷一三五)。

【组成】甘草 升麻各二分 当归 椒各一分 鳖甲一两

【用法】以水五升, 煮取二升半, 分三服, 温覆取汗; 汗不出, 汤煮更作也。

【主治】阴毒, 身重背强, 蛰蛰如被打, 腹中痛, 心下强, 短气呕逆, 唇青面黑, 四肢冷, 脉沉细而紧数。

19915 甘草汤

【方源】方出《肘后方》卷二, 名见《外台》卷二引《深师方》。

【组成】甘草三两 橘皮一升

【用法】水五升, 煮取三升, 分服, 日三, 取瘥。

【主治】伤寒呃不止。

19916 甘草汤

【方源】《外台》卷三十八引《靳邵方》。

【组成】甘草(炙) 枳实(炙) 白术 梔子各二两 桔梗三两

【用法】上切。以水六升, 煮取二升, 分二服。

【主治】心痛腹胀, 兼冷热相搏。

19917 甘草汤

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【异名】甘草饮(《圣济总录》卷十七。)

【组成】甘草(炙) 防风各一两半 吴茱萸 干地黄 芍药 当归 细辛 干姜各一两

【用法】上咬咀。以水五升, 煮取三升, 分为二服。

【功用】温中止痛, 利大小便。

【主治】贼风入腹, 心腹绞痛, 胀满拘急, 不得气息, 并转筋, 寒中下重。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生葱菜、茺萸。

19918 甘草汤

【方源】《医心方》卷二十二引《产经》。

【组成】甘草二两(炙) 厚朴三两 干姜二两 当归二两

【用法】上切。以水七升, 煮取二升半, 分三服, 一日三次。

【主治】妊娠霍乱。

19919 甘草汤

《外台》卷十七引《古今录验》。为《金匱》卷中“甘草干姜茯苓白术汤”之异名。见该条。

19920 甘草汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】甘草 干地黄 麦门冬 麻黄各二两 芎藭 黄芩 栝楼根各三两 杏仁五十枚 葛根半斤

【用法】上咬咀。以水一斗五升, 酒五升, 合煮葛根, 取八升, 去滓; 纳诸药, 煮取三升, 去滓, 分二服。一剂不愈, 更合良。

【主治】在蓐中风, 背强不得转动, 名曰风痉。

【备考】《千金翼》有前胡三两。

19921 甘草汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】甘草 芍药各五两 通草三两(产宝用当归) 羊肉三斤

【用法】上咬咀。以水一斗六升, 煮肉取一斗, 去肉纳药, 煮取六升, 去滓, 分五服, 日

三夜二。

【主治】产后腹中伤绝，寒热恍惚，狂言见鬼，此病中风内绝，脏气虚所为。

【方论选录】《千金方衍义》：此治产后腹中伤绝，寒热暴病，乃独取羊肉温补精血，芍药、甘草护持营气，则伤绝可复，寒热可除，用通草者，通达气化之阻绝也。

19922 甘草汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】甘草 芍药 桂心 阿胶各三两 大黄四两

【用法】上㕮咀。以东流水一斗，煮取三升，去滓，纳阿胶令烊，分三服。一服入腹中，面即有颜色，一日一夜，尽此三升，即下腹中恶血一二升，立愈。当养之如新产者。

【主治】产乳余血不尽，逆抢心胸，手足逆冷，唇干，腹胀短气。

【方论选录】《千金方衍义》：四味温中药中，特进大黄一味，以破逆上之血。大黄虽苦寒，得桂心之辛散，功用自不寻常，一服入腹，面即有色，岂非宿有验乎？

19923 甘草汤

《千金》卷五。为《幼幼新书》卷四引《肘后方》“甘草法”之异名。见该条。

19924 甘草汤

【方源】《千金》卷七。

【组成】甘草 人参各一两 半夏一升 桂心 蜀椒各三两 小麦八合 大枣二十枚 生姜八两 吴茱萸二升

【用法】上㕮咀。以水一斗二升，煮小麦取一斗，去小麦，纳诸药，煮取三升，分为六服。

【主治】脚弱，举身洪肿，胃反，食谷吐逆，胸中气结不安而寒热，下痢不止，小便难。

【方论选录】《千金方衍义》：脚弱浮肿，脾虚湿著也，故以桂、椒、萸、半辛温散结，参、甘、小麦甘温益气，生姜、大枣辛甘和营，共襄逐湿之功，而脚膝受荫矣。

19925 甘草汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】甘草 桂心 芎蒭 麻黄 当归 芍药各一两 附子二枚 独活 防己各三两 生姜 石膏 茯神各四两 白术 黄芩 细辛各一两 秦艽 防风各一两半 侧子二枚 菊花一升 淡竹沥四升 人参二两

【用法】上㕮咀。以水一斗，先煮麻黄，去沫，取七升，纳竹沥及药，煮取三升，分四服；服三服訖，间一杯粥，后更服，待药势自汗。

【主治】偏风积年不愈，手脚枯细，面口喎僻，精神不定，言语倒错。

【宜忌】慎生冷、醋、蒜、面、乳酪、鱼等。

【方论选录】《千金方衍义》：偏风积年不愈，服药不除，而至手脚枯细，必是风从火化，而成本寒标热之患，故于附子散中除去干姜之辛燥，增入麻黄、独活搜风逐痹，芎、术、甘草健脾行湿，芎蒭、芍药养血营筋，芩、膏、菊、沥杜风化热，则附、桂、辛、防藉人参之大力，何惮历年固疾不愈耶？其余秦艽、防己、侧子、生姜，匡助术、附、麻黄之力，大方中不可无助长之味也。方后服三服，间粥一杯，于长沙太阳例，服桂枝汤后吸热稀粥以助药力法悟入。

19926 甘草汤

【方源】方出《千金》卷十，名见《普济方》卷一九八。

【组成】甘草一两 蜀漆三两 常山四两 石膏五两 鳖甲四两 香豉一升 梔子 乌梅各三七枚 淡竹叶切二升

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三服。

【主治】心热为疟不止，或止后热不歇，乍来乍去，令人烦心，甚欲饮清水，反寒多不甚热者。

【方论选录】《千金方衍义》：五脏之疟皆在于经，而诸经见证虽各不同，其主治之用总以恒山、蜀漆为破之金铉。热在于心，令人烦心欲饮清水，又须竹叶、梔子为引，以清

发渴之热。

19927 甘草汤

【方源】《千金》卷十六。

【组成】甘草 生姜 五味子各二两 人参一两 吴茱萸一升

【用法】上五味，哎咀。以水四升，煮茱萸令小沸，去滓纳药，煮取一升六合，分二服。服数剂佳。

【主治】虚羸瘦，气欲绝。

【方论选录】《千金方衍义》：参、姜、吴茱萸温中散寒，乃吴茱萸汤之变方。彼用大枣以行脾津，此用甘草以和胃气，五味子以收津液也。

19928 甘草汤

《千金》卷十八。为《伤寒论》“茯苓桂枝白术甘草汤”之异名。见该条。

19929 甘草汤

【方源】《千金》卷二十四。

【组成】甘草三两 桂心二两 豉二升 葱白半斤

【用法】上哎咀。先以水一斗五升，煮葱白作汤，澄取八升，纳药煮取三升，分三服。才服便使人按摩摇动，口中嚼物，然后仰卧，复以暖衣，汗出去衣，服汤。

【功用】解五石毒。

【方论选录】《千金方衍义》：石药之悍方炽，其人元气本虚，则寒折又难轻试，乃于葱白豉汤除去人参，易入桂心，而施从治之法。

19930 甘草汤

《千金翼》卷七。为《金匱》卷下“白头翁加甘草阿胶汤”之异名。见该条。

19931 甘草汤

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】甘草（炙） 人参 黄连各一两 梔子仁二十一枚

【用法】上切。以水五升，煮取二升，分服之。

【功用】服石药后，脾肺苦热，饮水过量，遂成痢疾。

19932 甘草汤

【方源】《医心方》卷五引《疗眼方》。

【组成】甘草一分 黄柏一分 苦参一分 当归一分

【用法】水一升二合，煎取七合，待冷洗眼，日五六，夜一。

【主治】眼为物所触中，疼痛、肿赤、结热。

19933 甘草汤

《圣惠》卷三十八。为《千金》卷二十四“桂心汤”之异名。见该条。

19934 甘草汤

【方源】方出《圣惠》卷五十五，名见《普济方》卷一九五。

【组成】甘草一两（炙微赤，锉） 梔子仁一两 黄柏一两（锉） 白术一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，一日四五次。

【主治】脾脏瘀热不散，心神烦乱，小便赤涩，或汗出如柏汁。

19935 甘草汤

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】甘草一两 黄芩一两 川大黄一两 黄连一两 当归一两 川芒消三两

【用法】上锉细。以水六升，煮至三升，去滓，还铛中，纳芒消令小沸，将帛于药汁中浸，以搗肿上。数用之效。

【主治】瘰疬浸淫，欲作未成，如桃核，或如鸡子，赤肿焮热。

19936 甘草汤

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】甘草一两（生用） 干漆一两 黄芩二两 生地黄一两 赤芍药二两 当归二两 龟甲五两

【用法】上锉细。以水七升，煎至三升，去滓，以绵蘸汤搗疮处，一日三次。

【主治】妇人阴疮。

19937 甘草汤

【方源】《养老奉亲》。

【组成】甘草一两（切，熬） 生姜一两（刮去皮，切） 乌豆一合

【用法】以水一升，煎取七合，去滓，空心服之。不过三日服愈。

【主治】老人冷热不调，下痢赤白，腹痛不止。

19938 甘草汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【异名】阴毒甘草汤（《活人书》卷十六）。

【组成】甘草 鳖甲 升麻 当归 桂枝 各二分 蜀椒一分 雄黄一分

【用法】上㕮咀。水三升，煎取一升，去滓，温温每饮一盞，食顷再服。温覆。中毒当汗吐之，汗吐则愈，不吐再服之。

【主治】阴毒证。其病身重背强，腹中绞痛，咽喉不利，毒气攻心，心坚强，气不得息，呕逆，唇青面黑，四肢厥冷，其脉沉细而紧。

19939 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】甘草（炙，锉） 羌活（去芦头） 各一两一分 人参半两 防风（去叉）一两 附子（炮裂，去皮脐）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盞半，入地黄汁一合，先同煎至八分，去滓，次入荆沥，竹沥各半合，同煎三沸，温服，日夜各一服。

【主治】风痉，口噤不语，肢体强直，神识不明。

19940 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】甘草（炙，锉） 侧子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮） 防己 附子（炮裂，去皮脐） 芎藭 人参 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙干） 当归（切，焙） 赤芍药 各一两 秦艽（去苗土）三分 茯神（去木）二两 防风（去叉）三分 白术半两 黄芩（去黑心）半两 细辛（去苗叶，微炒）半两 甘菊花（未开者）一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服六钱匕，以水二盞，加生姜半分（切），煎至一盞，去滓，入竹沥半合，更同煎沸温服，空心、日晚、近

夜服。

【主治】中偏风，积年不愈，手足枯细，口面喎斜，精神不守，言语倒错。

19941 甘草汤

《圣济总录》卷十三。为《伤寒论》“大青龙汤”之异名，见该条。

19942 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】甘草（炙，锉） 细辛（去苗叶） 干姜（炮） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 白茯苓（去黑皮） 赤芍药 吴茱萸（汤浸，焙，炒） 熟干地黄（切，焙） 各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞半，入切羊脂少许，同煎至八分，去滓，空心、日午、夜卧服。

【主治】风入腹中疝痛，并飞尸遁注，发作无时，发则抢心胀满，胁下如锥刀刺。

19943 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】甘草（炙）三分 蜀漆叶半两 天灵盖（酥炙）一两 黑豆（生） 桃仁（汤浸，去皮尖，研） 乌梅肉（炒）各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加竹叶三片，煎至七分，去滓，空腹未发前一服，临发时再服。

【主治】劳疟，寒热萎黄，渴躁烦闷。

19944 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】甘草（炙，锉） 半夏（汤洗七遍去滑） 人参 陈橘皮（汤浸去白，焙） 各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加豉半合，生姜五片，煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】霍乱，烦躁不得安。

19945 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】甘草（炙，锉） 栝楼根各二两 麦门冬（去心，焙）二分 半夏（汤洗去滑七

遍，晒干，麸炒）二两半

【用法】上为粗末。先以水二盏，淘小麦半合，煎至一盏半，去麦，下药末五钱匕，加大枣二枚（擘破）、生地黄半钱、生姜一枣大（拍破），再煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】胃热干渴。

19946 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】甘草（炙，锉）半两 黄连（去须，炒） 附子（炮裂，去皮脐）各三分 阿胶（炙令燥）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心、日午温服，一日二次。

【主治】冷痢下，色白，食不消。

19947 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】甘草（炙，锉）半两 生姜（切）一分 生蜜一合

【用法】用浆水五合，同煎至四合，去滓，空心温分二服。

【主治】夏月暴下热痢。

19948 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】甘草（炙） 地榆 当归（切，焙） 黄连（去须，炒） 芍药（炒）各半两

【用法】上锉细。每服三钱匕，浆水一盏，煎取六分，去滓温服。

【主治】赤白痢，疼痛不止。

19949 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】甘草（炙，锉） 防风（去叉）各一两 乌豆一合 桂（去粗皮） 细辛（去苗、叶）各半两 柏子仁 白茯苓（去黑皮）各二两 蕤仁（去皮，烂研）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加大枣二枚（擘破），同煎至七分，去滓，食后、临卧服。

【主治】肝气不足，两胁拘急痛，寒热，目不明。

19950 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】甘草（炙）一两 地骨皮五两 茺蔚五两 葛根（锉）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加竹叶七片，煎至七分，去滓，放温，食后、临卧服。

【主治】目赤痛，心躁口干。

19951 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】甘草（炙） 甘竹茹（细切）各一两 芦根二两（锉） 新粟米三合

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，食后服，临卧再服。

【主治】眼赤肿痛。

19952 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】甘草（炙，锉） 防风（去叉） 羚羊角（镑） 羌活（去芦头） 生干地黄（焙） 细辛（去苗叶） 菊花 玄参 杏仁（去皮尖双仁，炒令黄） 地肤子 梔子仁 青箱子 当归（切，焙） 决明子 蜀椒（去目并合口，炒出汗）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】风毒攻眼，渐生胬肉，碇涩疼痛。

19953 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】甘草（炙）半两 磁石（煨，醋淬三遍）二两 玄参 防风（去叉）各一两半 五味子 牡丹皮 桂（去粗皮）各一两 黑豆半合 附子（炮裂，去皮脐）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍碎），煎至一盏，去滓，食后服，一日二次。

【主治】咽干，涕唾如胶；或肾气不足，心中悒悒，目视眊眊，少气耳聋；消渴黄疸，一

身悉痒，骨中疼痛，小肠拘急。

19954 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】甘草(炙)二两 露蜂房一两

【用法】上锉。以水五升，煎至三升，去滓，以故帛二片浸汤中，更互洗疮上，一日二三次。

【主治】附骨痈。

19955 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】甘草(炙，锉) 白茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 杏仁(去皮尖双仁，炒)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】诸伤损，恶血积滞腹中。

19956 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】甘草一两(炙) 白茯苓(去黑皮)一两 杏仁(汤浸去皮尖双仁，炒，研)三分 人参一两

【用法】上除杏仁外，为粗末，入杏仁拌匀。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】坠扑，伤损肺气，咳唾血出。

19957 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【组成】甘草(生用)二两 白药一两

【用法】上锉细。以水三盞，同煎至二盞，去滓，候冷顿服。以吐出恶物为度。吐了后再单煎甘草一味服，尤佳。

【主治】中药毒，心膈烦闷，甚者如锥刺痛。

19958 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】甘草(炙令赤) 阿胶(炙令燥)各一两 生干地黄(焙)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。

【主治】妊娠卒下血，胎动不安，或连腰疼痛。

19959 甘草汤

《圣济总录》卷一五九。为《圣惠》卷七十七“葵子散”之异名。见该条。

19960 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】甘草(炙，锉) 桂(去粗皮)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。连三五服，未下再服。

【主治】妊娠颠扑内损，致子死腹中。

19961 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】甘草(锉)一两 桂(去粗皮)半两 香豉(炒)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞。去滓，用鸡子一枚，取清打入药内，再同煎七分，稍热服，须臾未下，再作服。

【主治】子死腹中未下。

19962 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】甘草(炙)三分 当归(切，焙)人参各一两 羊肉一斤(去脂，切碎，水四大碗，煮取汁三碗，去肉澄清) 芎藭一两 桂(去粗皮)三分 芍药一两半 生干地黄(焙)四两

【用法】上药除肉外，为粗末。每服三钱匕，以肉汁一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血虚，汗出不止。

19963 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【异名】钩藤汤(《普济方》卷三七六。)

【组成】甘草(炙，锉) 钩藤 栝楼根 黄芩(去黑心) 独活(去芦头) 桂(去粗皮) 芍药 当归(切，炒) 石膏(碎)各半两 蛇蛻六寸(炙黄) 麻黄(去节)三分

【用法】上为粗末。三五岁儿每服一钱匕，水一盞煎至五分，去滓热服，一日三次。

【主治】小儿诸病，掣痰吐舌。

19964 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】甘草(炙) 常山各一两

【用法】上为粗末。三四岁儿每服半钱匕，水半盏，加竹叶十片，同煎至三分，去滓温服。更量儿大小加减，得吐即止。

【主治】小儿疳，癖实壮热，头痛欲吐。

19965 甘草汤

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】甘草(炙，锉) 麻黄(去根节) 各一两

【用法】以水二盏，酒半盏，煎取一盏半，先以火遍炙背令热，欲汗出，即热服之。以衣覆卧，须臾大汗出即愈。

【主治】乳石发动，烦热胀满，身体生疮。

19966 甘草汤

《圣济总录》卷一八四。为《外台》卷三十七引《小品方》“甘草饮”之异名。见该条。

19967 甘草汤

【方源】《普济方》卷二一一引《十便良方》。

【异名】三神汤。

【组成】甘草(炙)二寸 乌梅肉(微炒)五枚 诃黎勒(煨，用皮)五枚

【用法】上锉。以水一大盏，煎至六分，去滓，食前分温二服。

【主治】冷热痢，心神烦渴，腹痛，胸膈滞闷。

19968 甘草汤

《妇人良方》卷十五引《专治妇人方》。为《金匱》卷下“甘草小麦大枣汤”之异名。见该条。

19969 甘草汤

《医钞类编》卷十二引《拔萃》。为《保命集》卷中“桔梗散”之异名。见该条。

19970 甘草汤

【方源】《观聚方要补》卷六引《经验方》。

【组成】白药煎 白干葛各二钱 乌梅五味子 天花粉各二钱 甘草半钱

【用法】水煎服。

【主治】烦渴口干。

19971 甘草汤

《普济方》卷二十七。为《伤寒论》“炙甘草汤”之异名。见该条。

19972 甘草汤

《普济方》卷一七八。为《千金翼》卷十九“羊髓煎”之异名。见该条。

19973 甘草汤

《普济方》卷二〇九。为《圣济总录》卷七十四“附子汤”之异名。见该条。

19974 甘草汤

《普济方》卷三三七。为《圣惠》卷七十六“甘草散”之异名。见该条。

19975 甘草汤

《丹溪心法附余》卷二十三。为《直指小儿》卷五“甘草散”之异名。见该条。

19976 甘草汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十。

【组成】甘草 白术各二钱半 桂枝二钱 炮附二钱 秦艽二钱

【主治】痛痹属寒，身痛觉骨节冷。

19977 甘草汤

《医级》卷八。为《伤寒论》“桔梗汤”之异名。见该条。

19978 甘草汤

【方源】《医钞类编》卷十四。

【组成】甘草梢 五倍子 黑豆

【用法】水煎服。

【功用】解毒缓急。

【主治】筋疝。茎筋掣痛，挺胀不收，白物如精随洩而下，此得之房术。

19979 甘草汤

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】甘草一钱 当归二钱 焦白术二钱 薤白三分

【用法】用鸡汤去净油煎药。服三剂。

【主治】曾伤八月胎者。

19980 甘草饮

【方源】《外台》卷三十七引《小品方》。

【异名】甘草汤(《圣济总录》卷一八四。)

【组成】甘草二两(炙) 大黄三两(别渍) 黄芩二两

【用法】上切。以水三升,煮三两沸,去滓分服。以利为度。

【主治】①《外台》引《小品方》:服五石散后,食便吐出,不得安住者,由癖故也。②《圣济总录》:乳石发内,热结不除,或已饮酒、冷食、澡洗,犹不解,或腹胀头痛眼目疼,或先有癖实不消,或连饮不食,或时作心痛。

19981 甘草饮

【方源】《外台》卷六引《延年秘录》。

【组成】甘草二两(炙) 人参二两 干姜四两 厚朴二两(炙) 白术二两

【用法】上切。以水五升,煮取一升五合,去滓,分温三四服,如人行八九里。

【主治】脾肾冷气乘心,痛闷吐利,四肢逆冷,或烦疼。

【宜忌】忌海藻、菰菜、桃李、雀肉等。

19982 甘草饮

【方源】方出《千金》卷二十四,名见《普济方》卷二五一。

【组成】甘草 蜜各四分 梁米粉一升

【用法】以水五升,煮甘草,取二升,去滓歌大热,纳粉汤中,搅令匀调,纳白蜜更煎,令熟如薄粥,适寒温饮一升佳。

【功用】解药毒。

【主治】鸩毒,及一切毒药不止,烦懣。

19983 甘草饮

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】甘草(炙) 黄芩(去黑心)各二两 附子一枚(炮裂,去皮脐) 人参 芎藭 防风(去叉) 麻黄(去根节) 防己各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,加生姜三片,煎至八分,去滓,空心、食前温服。

【主治】贼风入腹,角弓反张,口噤舌强,

目视不明,不能言语,举体不仁,心腹疼痛。

19984 甘草饮

《圣济总录》卷十七。为《外台》卷十四引《深师方》“甘草汤”之异名。见该条。

19985 甘草饮

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】甘草半两(半炙半生) 黑豆一百粒(半炒半生) 生姜半两(半煨半生) 乌梅肉一枚(半炒半生)

【用法】以酒、水各一盞,同入银石器内,煎至一盞,去滓,更入蜜一匙,重煎至一盞,食后、临卧放温细呷。

【主治】暴患热嗽。

19986 甘草饮

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】甘草大者二寸许(一半生,一半炙) 乌梅五枚(拍碎) 诃黎勒皮五枚

【用法】上锉细。用水一盞,煎取五分,去滓,一半冷服,一半热服。

【主治】冷热痢,或小儿痢渴不止。

19987 甘草饮

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】甘草(半炙令赤黄,半生)半两 瓜蒌一枚(去皮,取瓢)

【用法】先以酒二盞,煎甘草至一盞,入瓜蒌瓢同绞,和匀,滤去滓,放温顿服。未愈更作服之。

【主治】乳肿痛,患作痈毒,但乳痈痛甚者。

19988 甘草饮

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】甘草三两

【用法】上锉细。用水二升,煎取一升,绞汁,每服一小盞,温饮,一日三次,仍淋疮上。

【主治】毒箭伤。

19989 甘草饮

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【组成】甘草(生,锉)二两 葛粉(研)一两 白蜜半两

【用法】以水六盞,先煎甘草减半。纳葛粉

并蜜，更煎三两沸，去滓，温，分三服。如食顷再服。

【主治】中药毒，心痛烦闷。

19990 甘草饮

【方源】《圣济总录》卷一五一。为方出《医心方》卷二十一引《广济方》，名见《圣济总录》卷一五一“当归汤”之异名。见该条。

19991 甘草饮

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】淡豆豉七粒 甘草三分

【用法】水一小盏，饭锅上煨小半盏，小儿未乳之先以此药频挑与食，停一时，此后饮乳。

【主治】胎毒，消化痘自稀，或不出。

19992 甘草汤

【方源】《幼幼新书》卷四引《肘后方》。

【异名】甘草汤（《千金》卷五）。

【组成】甘草如中指节（炙，碎）

【用法】水二合，煮一合，每用一蚬壳，缠绵点口中。

【功用】吐去胸中恶汁，智慧无病。

19993 甘草油

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】甘草一两 香油三两

【用法】甘草浸入油内一昼夜，文火将药炸至焦黄，去滓备用。涂敷患处。

【功用】解毒，润肤，清洁疮面，或做赋形剂用。

19994 甘草酒

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】甘草（炙） 升麻 沉香（锉） 麝香（别研）各半两 豉一两半

【用法】上药除麝香外，为粗末，入麝香拌匀。每服五钱匕，酒一盞半，煎至八分，去滓，早、晚食前各一服。其滓热敷肿上。甚者取豉半升、梔子仁十四枚，葵菜二两，三味用水二升半，煎至一升，滤去滓，温分三服，空心、日午、晚间，服尽为度。

【主治】毒气肿，当头上如刺痛。

19995 甘草酒

《杏苑》卷八。为方出《百一》卷十六，名见《普济方》卷二八六“甘草膏”之异名。见该条。

19996 甘草散

【方源】《外台》卷三十四引《小品方》。

【异名】预服散。

【组成】甘草八分（炙） 黄芩 大豆黄卷 梗米 麻子仁 干姜 桂心各二分 吴茱萸二分

【用法】上为散。每服方寸匕，酒调下，一日三次。

【功用】令易生。母无疾病，未生一月，日前预服，过三十日，行步动作如故，儿生坠地，皆不自觉地。

【备考】《圣济总录》“大豆卷散”，即本方去梗米，加大麦。

19997 甘草散

【方源】《外台》卷三十六引《古今录验》。

【组成】甘草（炙） 蜈蚣（熬）各三分

【用法】上为散，以安脐中。

【主治】小儿风脐汁出。

19998 甘草散

【方源】《千金》卷二。

【异名】神效方（《普济方》卷三四六）。

【组成】甘草一两 通草三十铢 石钟乳三十铢 云母二两半 屋上散草二把（烧成灰）

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，食后温漏芦汤调下，一日三次，乳下止。

【主治】妇人乳无汁。

19999 甘草散

【方源】方出《千金》卷十七，名见《普济方》卷二三七。

【组成】甘草 干姜 干地黄 茯苓 羊脂 当归 细辛各一两 芍药 吴茱萸 桂心各二两 梔子仁十五枚

【用法】上咬咀。以水八升，煮取三升，去滓，纳脂烊尽，分三服。

【主治】卒中恶，贼风寒冷入腹便绞痛，或

飞尸遁尸发作无时，抢心胸满，胁痛如刀刺，口噤者。

【加减】欲利者，加大黄二两。

20000 甘草散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】甘草一两（生用） 川升麻半两 射干半两

【用法】上锉细。都以水三大盏，煎至二盏，去滓，分为四服，日三服，夜一服。

【主治】伤寒二三日，毒气攻咽喉肿痛。

20001 甘草散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】甘草（炙微赤，锉） 桂心 茯神 人参（去芦头） 阿胶（捣碎，炒令黄燥） 麦门冬（去心）各一两 生干地黄二两 麻黄二两（去根节）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分。煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】阳毒伤寒，脉洪大，心中悸状。

20002 甘草散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】甘草（炙微赤，锉） 茯神 远志（去心） 苍术各一两 枳实半两（麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒脉结代，心下悸。

20003 甘草散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】甘草一两（炙微黄，锉） 黄芩一两 麦门冬一两（去心，焙）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】骨蒸肺痿，心中烦热。

20004 甘草散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】甘草（炙微赤，锉） 葛根（锉） 桔梗（去芦头） 玄参 车前子 前胡（去

芦头） 贝母（煨令微黄） 犀角屑 川升麻各半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹叶二七片，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】热毒攻眼，胸膈壅闷，烦喘。

20005 甘草散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】甘草（锉，生用） 白术 阿胶（捣碎，炒令黄燥） 干姜（炮裂，锉） 黄芩各一两 伏龙肝一合

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】卒吐血不止。

20006 甘草散

【方源】方出《圣惠》卷三十九，名见《圣济总录》卷一四六。

【组成】甘草（生，锉） 贝齿 胡粉各一两

【用法】上为细散。每服二钱，水调下。

【主治】食诸菜中毒。

20007 甘草散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】甘草一两（炙微赤，锉） 干姜一两（炮裂，锉） 白术三两 白茯苓三两 当归二两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】肾着之为病，身体冷，从腰以下痛重。

20008 甘草散

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】甘草一两（炙微赤，锉） 生干地黄一两 干姜一两（炮裂，锉） 当归一两（锉，微炒） 赤茯苓一两 细辛一两 桂心一两 赤芍药一两 防风一两（去芦头） 梔子一十五枚 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，

煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风尸及中恶贼风，寒气入腹疗痛，飞尸遁尸，发作无时，抢心胁如刀刺，口噤。

20009 甘草散

【方源】《圣惠》卷七十六。

【异名】甘草汤（《普济方》卷三三七）。

【组成】甘草一两（炙微赤，锉） 黑豆一两（炒熟） 干姜半两（炮裂，锉） 糯米一两 大麻子一两 白茯苓半两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以煖酒调下。若未入月，不得辄服。

【功用】妊娠十月满足，入月预服易生。

20010 甘草散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】甘草半两（炙微赤，锉） 牡蛎粉半两 黄芩半两 赤芍药半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至四分。去滓，取鸡子清一枚，投入散中，熟搅掠去沫，徐徐温服。

【主治】小儿伤寒热渴，而下后觉烦闷。

20011 甘草散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】甘草一分（炙微赤，锉） 地榆一分（锉） 蛭蛇胆一钱（细研） 蜗牛壳一两（炒令微黄） 麝香一钱（细研） 兰香根灰一分 人粪灰一分 龙脑半钱（细研）

【用法】上为细散。入龙、麝等，研令匀，每服半钱，以粥饮调下。亦可吹于鼻中，三岁以下可服一字。

【主治】小儿鼻疳生疮，痛痒不止。

20012 甘草散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】甘草一分（炙微赤，锉） 龙骨一分 赤茯苓一分 牡蛎一分（烧为灰粉） 生干地黄一分 黄芩一分 当归半两（锉，微炒） 桂心一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，入淡竹叶七片，煎至五分，去滓，入白蜜一

钱，更煎一两沸，一日三四次。

【主治】小儿中魅。

20013 甘草散

【方源】方出《圣惠》卷九十，名见《圣济总录》卷一八二（文瑞楼本）。

【异名】芍药散（《普济方》卷四〇八）。

【组成】甘草三分（锉） 赤芍药三分 白朮三分 黄芩三分 黄连半两（去须） 黄柏半两（锉）

【用法】上为细散，用白蜜和如膏，涂于疮上，一日二次。亦可作汤洗之。

【主治】小儿恶疮，一身如麻豆带脓，乍痛乍痒，烦热。

20014 甘草散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】甘草一分（炙微赤，锉） 乌梅肉一分（微炒） 诃黎勒二枚（煨，用皮）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，入生姜少许，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痢渴不止。

20015 甘草散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】甘草三分（炙微赤，锉） 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令黄熟） 人参半两（去芦头） 黄连半两（去须，微炒） 龙骨一两 白茯苓半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候服。

【主治】小儿暴痢。

20016 甘草散

《医方类聚》卷五十四引《神巧万全方》。为《伤寒论》“甘草汤”之异名。见该条。

20017 甘草散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】甘草（末） 青蛙（自死者，烧作灰） 母猪蹄甲（烧作灰） 救月杖（烧灰） 各一两

【用法】上为细末，拌匀。以蜜涂敷疮上，一日三五次。

【主治】月蚀疮。

20018 甘草散

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】甘草(半生半炙) 黄连(去须,炒)各二两

【用法】上为散,每服二钱匕,温浆水调,食前服。

【主治】产后下痢赤白,久不愈。

20019 甘草散

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】甘草(炙,锉)一分(为末) 油麻半升

【用法】上二味,先取油麻去皮,研细,绞取汁一合,调甘草末半钱匕服,一日二次。

【主治】小儿丹毒,防入腹。

20020 甘草散

【方源】《幼幼新书》卷十八引《疹痘论》。

【组成】大甘草不以多少(炙过)

【用法】上为细末。每服一钱或二钱,水一盞,煎至六分,去滓呷之,不拘时候。以少解利热毒即住。若疮出迟,当服紫草饮子(紫草二两)。大人当针两腕视子骨间,男左女右取之。或灸一壮,亦助发出。疹痘毒气已发,不必用之。

【主治】疮未出及虽出躁渴者。

20021 甘草散

【方源】《三因》卷十五。

【组成】甘草 滑石各半两 山豆根一两(生) 大黄一分(生)

【用法】上为末,每服一钱,蜜熟水调下,日二服。次服解毒丸。

【主治】大风。

20022 甘草散

【方源】《直指小儿》卷五。

【异名】甘草汤(《丹溪心法附余》卷二十三)。

【组成】粉甘草(微炙) 栝楼根各等分

【用法】上为末。煎服一钱。

【主治】疮痘略出,烦渴不止。

20023 甘草散

《普济方》卷一一七。为《袖珍》卷一引《圣惠》“龙须散”之异名。见该条。

20024 甘草散

《普济方》卷二五一。为《杨氏家藏方》卷二十“甘粉散”之异名。见该条。

20025 甘草散

【方源】《简明医彙》卷六。

【组成】大甘草(炙)

【用法】上为末。每服五分,食后白汤调下。人中黄尤佳。

【功用】预服消毒。

【主治】痘出不太盛。

20026 甘草煎

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】甘草(炙,为末)半两 猪膏四两 白蜜二两 黄连(去须,为末)一两

【用法】上药先煎脂令沸,去滓,下蜜并药等,慢火熬成煎。每服一匙头,含咽津。以愈为度。

【主治】口疮。

20027 甘草膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】甘草一两 当归一两 胡粉半两 羊脂一两半 猪脂三两

【用法】上咬咀,以猪羊脂并诸药,微火煎成膏。绞去滓,候凝敷之。

【主治】灸疮。

20028 甘草膏

【方源】《朱氏集验方》卷十二引《崔元亮海上秘方》。

【组成】甘草三大两(生,为末) 大麦面九两

【用法】上用一大盘中搅和令匀,取上等好醋少许,别捻入药令匀,百沸水搜和如饼剂。方圆大于疮一分,热敷肿上。以轴片及故纸隔令通风,冷则换之。已成脓自出,未成脓便内消。

【主治】发背。

20029 甘草膏

【方源】《幼幼新书》卷三十三引《婴童

方》。

【组成】甘草 黄芩 黄连 芍药 白芷 藁本 当归各三两 附子一两

【用法】上取猪脂四斤煎为膏，纳药煎三沸，至白芷黄，去滓。用枣大涂耳，敷鸡骨粉。

【主治】小儿耳聋、聾耳脓血出。

20030 甘草膏

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】甘草二两（生用） 川大黄一两 胡粉一两（细研） 羊髓二两 猪脂二合

【用法】上为细散，入铛中，与脂、髓同煎三五沸，膏成，下胡粉，搅令匀，收瓷盒中。每用可疮涂之。

【主治】疮疽，浸淫广大，焮赤黑烂成疮。

20031 甘草膏

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】甘草（生，捣末） 雄黄（研）各半两 泔淀一合 牛屎汁一合 羊肾脂三两（炼过） 青黛（研）半分

【用法】上六味，先于铜器中微火煎三味脂汁五七沸，次下三味药末搅匀，慢火熬成膏。取桃枝如箸大，以绵裹头点药，热烙齿缝中十余遍，一日三次。好肉生即止。

【主治】牙齿挺出，疼痛不可忍。

20032 甘草膏

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】甘草（为末）半两 乳香少许（研） 蜡少许

【用法】熔蜡，入二药末成稀膏。贴之。

【主治】灸疮，痛不可忍。

20033 甘草膏

【方源】方出《百一》卷十六，名见《普济方》卷二八六。

【异名】甘草酒（《杏苑》卷八）。

【组成】好粉甘草一两

【用法】四寸截断，以溪涧长流水一碗（井河水不可用），文武火慢慢蘸水炙，约自早炙至午后，炙水令尽，不可急性，擘甘草心觉

水润然后为透，细锉；却用无灰酒二小青碗入上件甘草，煎至一碗，温服之。服此药虽不能急消，过二十余日必消尽。投两服亦无害。

【主治】悬痈。谷道前后生痈，初发如松子大，渐如莲子，数十日后始觉赤肿，如桃李，即破。

【临证举例】悬痈 林判院康朝尝患此病，已破，服此药两服，疮即合。

20034 甘草蜜

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】甘草

【用法】上为末。白蜜调敷。

【主治】阴头生疮。

20035 甘枳汤

【方源】《普济方》卷三八八。

【组成】甘草一钱 枳壳（煨）一钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿大便秘结。

20036 甘柏散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】甘草 黄柏 白矾（烧令汁尽）

【用法】上为末。敷之疮上。

【主治】疮疡。

20037 甘胆丸

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】甘草二两（去皮，作二寸段，中半劈开，以猪胆汁五枚，浸三日，取出火上炙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服四十丸，卧时茶清吞下。

【主治】吃醋呛喉，咳嗽不止，诸药无效。

20038 甘胆汤

【方源】《幼幼新书》卷十引《小儿形证论》。

【组成】甘草一截（以猪胆涂炙）

【用法】上为末。每服半钱，米泔调下。

【主治】慢肝风，羞日，目肿出血。

20039 甘蚕豆

【方源】《仙拈集》卷四引《要览》。

【组成】甘草三钱 大蚕豆三十粒

【用法】水二碗，煮一碗，取蚕豆去皮食。

【主治】阴发背。

20040 甘桂汤

【方源】《幼幼新书》卷十四引《庄氏家传》。

【组成】甘草(炙) 官桂(去皮) 五味子 黄芩各一两半 柴胡四两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，加生姜五片，煎七分，去滓温服。以二服滓再合煎一服。

【主治】春间疫气欲作，气壅畏风，痰嗽头昏，鼻塞困闷。

【临证举例】疫疾 政和二年壬辰，余在澧阳，是春疫疾大作，诸小儿服此药皆免。

20041 甘桂汤

【方源】《易简方》。

【组成】茯苓 白术各一两 官桂一两 甘草一分

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞，加生姜七片，大枣一个，煎至六分，去滓，不拘时服。

【主治】停饮目眩。

20042 甘桔汤

《医方大成》卷七引《局方》。为《伤寒论》“桔梗汤”之异名。见该条。

20043 甘桔汤

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】桔梗二两 甘草一两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】小儿肺热，手掐眉目鼻面。

【加减】加荆芥、防风，名“如圣汤”；热甚，加羌活、黄芩、升麻。

20044 甘桔汤

【方源】《普济方》卷三八四引《钱氏方》。

【异名】甘桔散(《准绳·幼科》卷九)。

【组成】桔梗一两(末，浸一宿，焙干用) 甘草二两(炒)

【用法】上为细末。每服二三钱，水一盞，

加阿胶半片(炮过)，煎五分，食后温服。

【主治】①《普济方》引《钱氏方》：上焦热，咽痛。②《医学纲目》：嗽脓血。

20045 甘桔汤

《易简方》。为《三因》卷十六“荆芥汤”之异名。见该条。

20046 甘桔汤

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】桔梗 杏仁(汤浸，去皮尖，麸炒)各二两 甘草(炙)一两

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盞半，煎至一盞，去滓，微温时服。

【功用】下一切气。

【主治】胸中结气，咽喉不利。

20047 甘桔汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】桔梗 甘草 防风 牛蒡子 玄参 升麻 射干

【用法】水煎服。

【主治】瘡后咽喉肿痛。

【加减】热甚，加黄芩；小便黄涩，加木通、天花粉、薄荷。

20048 甘桔汤

【方源】《幼科类萃》卷二十五。

【组成】人参(去芦)五钱 桔梗(蜜浸，炒)一两 甘草(半生半炙)二钱

【用法】上锉散。水煎，不拘时服。

【主治】小儿感冒风热，火气熏逼，痘疮蕴毒上攻，咽喉肿胀，痰气不顺，咳嗽失音。

20049 甘桔汤

《医统》卷六十五引《拔萃》。即《保命集》卷中“桔梗散”。见该条。

20050 甘桔汤

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】甘草二钱(生) 桔梗二钱 花粉一钱 鼠粘子一钱 连翘 山梔仁一钱 生黄连一钱 生地黄一钱

【功用】疏风。

【主治】弄舌喉风。

20051 甘桔汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】甘草 防风 荆芥 薄荷 黄芩 各一钱 桔梗三钱 加玄参一钱

【用法】上锉一剂。水煎，食后频频嚥咽。

【主治】喉闭。

【加减】咳逆，加陈皮；咳嗽，加知母、贝母；咳发渴，加五味子；唾脓血，加紫菀；肺痿，加阿胶；面目肿，加茯苓；呕，加半夏、生姜；少气，加人参、麦门冬；肤痛，加黄耆；目赤，加栀子、黄连；咽痛，加鼠粘子、竹茹；声哑，加半夏、桂枝；疫毒头痛，肿，加鼠粘子、大黄、芒消；胸膈不利，加枳壳；心胸痞，加枳实；不得卧，加栀子；发斑，加防风，荆芥；酒毒，加干姜、陈皮之类。

20052 甘桔汤

【方源】《幼科指南》卷下。

【组成】桔梗 甘草 杏仁泥

【用法】水煎，加竹沥半钟和服，细茶咽下。

【主治】咳嗽，咽痛，声哑者。

20053 甘桔汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】桔梗（米泔制） 牛蒡（炒，研） 甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘疮之后，咽喉痛。

20054 甘桔汤

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】甘草 桔梗 大力子 天花粉 山豆根 麦冬

【用法】竹叶、灯心为引，水煎服。

【主治】痘起发光壮，收靥咽痛。

20055 甘桔汤

【方源】《保命歌括》卷十七。

【组成】桔梗 当归 栝楼仁 汉防己 桑白皮 贝母 杏仁（炒） 甘草节 薏苡仁 百合 黄耆 玄参各等分

【用法】上咬咀。水二盏，加生姜二片，煎服。

【主治】肺癰，咳唾脓血。

20056 甘桔汤

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】桔梗 甘草各等分 紫苏叶减半 乌梅肉少许

【用法】水煎，去滓，入阿胶化服。

【主治】咳嗽，风寒外感，不热不渴者。

20057 甘桔汤

【方源】《外科启玄》卷十二。

【异名】大甘桔汤（《古方汇精》卷二）。

【组成】桔梗八分 甘草一钱半 射干 牛蒡子（炒）各六分 防风 玄参各四分

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】①《外科启玄》：咽痛。②《古方汇精》：痰壅声哑。

【备考】方中防风、玄参用量原缺，据《古方汇精》补。

20058 甘桔汤

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】薄荷一贝母 黄芩各一钱 山梔子 连翘各七分 甘草五分 桔梗一钱五分

【用法】上咬咀。用水煎熟，食后温服。

【主治】重衣厚被，或过食煎煨热物，致项热头重，喉音不清，咳嗽口燥。

20059 甘桔汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十三。

【组成】甘草 桔梗 牛蒡 荆芥 玄参 天花粉

【功用】清利咽喉。

【主治】痘疹，咽喉痛。

20060 甘桔汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】甘草 桔梗 山豆根 黑参 鼠粘子 荆芥等分 麦门冬倍用

【用法】水煎，温服。

【主治】麻疹咽痛，口舌生疮。

20061 甘桔汤

【方源】《种痘新书》卷十一。

【组成】桔梗 甘草 牛子 连翘 玄参 黄芩 山豆根

【用法】水煎，嚥。

【主治】喉痛。

20062 甘桔汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】甘草 桔梗 玄参 炒芩

【用法】水煎，频频噙咽。

【主治】痘，口干，咽喉疼痛。

20063 甘桔汤

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】生甘草 芽桔梗 熟石膏 净知母 牛蒡子

【用法】生薄荷叶五片为引，水煎服。

【主治】小儿麻疹，胃火炎肺金，咳嗽面浮，应出不出。

20064 甘桔汤

【方源】《疡医大全》卷二十一。

【组成】甘草 桔梗 麦门冬各一两

【用法】水煎服。

【主治】胃痛，小便赤涩，腹满不食。

20065 甘桔汤

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】甘草 桔梗 连翘 玄参 防风 牛蒡子

【用法】水煎服。

【主治】麻疹，咽喉肿痛，不能食者。

20066 甘桔汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】桔梗 前胡 牛蒡 杏仁 苏子 橘红 象贝母 羚羊角

【主治】疹后感冒而呛者。

【加减】痰多者加莱菔子、白芥子。

20067 甘桔汤

【方源】《喉科枕秘》卷二。

【组成】当归(酒洗) 川芎 薄荷(炒) 黄芩 山梔 连翘 甘草 银花 元参 防风 桔梗 荆芥 大黄(酒浸)

【用法】水二钟，煎服。

【主治】心经积热，舌上生疳，状似杨梅，作事心烦；或因受湿热，七情所伤，靠舌根横起紫红色筋。

20068 甘桔汤

【方源】《白喉全生集》。

【组成】甘草三钱 桔梗四钱 银花一钱五分 麦冬(去心) 僵蚕(姜汁炒) 鼠粘各二钱 冬桑叶三钱

【用法】水煎服。

【主治】白喉虚热证。白见于关内，外色稍不润，喉内红肿，下午痛甚，口干不渴，舌苔虽黄而滑，小便略赤而长，饮食稍碍，心烦不眠。

20069 甘桔散

【准绳·幼科】卷九。为《普济方》卷三八四引《钱氏方》“甘桔汤”之异名。见该条。

20070 甘莲散

【仙拈集】卷二。为《直指》卷十“莲子六一汤”之异名。见该条。

20071 甘粉散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】甘草散(《普济方》卷二五一)。

【组成】甘草二两(生)

【用法】上锉，用水三碗，煎一碗，去滓，入绿豆粉一合，打匀，再煎数沸，入蜜半两，温服。

【功用】解一切药毒。

20072 甘理散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】黄耆 葛根 当归 赤芍 甘草 川芎 生地 白芷 白术 厚朴 陈皮 人参 前胡 枣子

【主治】产后阴蚀，阴中生疮。

20073 甘菊丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】天南星四两(洗，焙为末，以好酒一升，煮成膏，并蜜同搜和诸药) 鸡苏(去土) 四两 荆芥穗二两 细辛(去叶土) 二两 川芎 防风(去芦头) 甘草(炙) 各一两半 白僵蚕(炒去丝嘴) 菊花各一两

【用法】上件除天南星外，并为细末，次入天南星膏子，并炼蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜汤吞下。

【主治】风痰壅盛，头目昏痛，肢节拘倦，

鼻塞耳鸣, 头皮肿痒。

20074 甘菊丸

《赤水玄珠》卷三引《宝鉴》。为《普济方》卷八十一引《卫生家宝》“甘菊花丸”之异名。见该条。

20075 甘菊汤

《圣济总录》(文瑞楼本)卷一〇四。即原书(人卫本)同卷“甘菊花汤”。见该条。

20076 甘菊汤

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】甘菊花 大黄(锉, 炒) 旋覆花 升麻 石决明 芎蒭各半两 羌活(去芦头) 地骨皮(洗) 青箱子 车前子 石膏(碎) 木贼(锉, 炒) 黄芩(去黑心) 梔子仁 草决明(炒) 甘草(炙, 锉) 荆芥穗 防风(去叉) 各一两 黄连(去须) 一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加蜜少许, 同煎至七分, 去滓, 食后、夜卧温服。

【主治】①《圣济总录》: 内外障翳。②《普济方》: 一切眼疾。

20077 甘菊汤

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】甘菊苗叶不拘多少

【用法】捣烂, 百沸汤淋汁熏洗。

【主治】阴户肿。

20078 甘菊汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】决明子 甘菊 当归 川芎 赤芍 甘草 防风 荆芥 蔓荆子

【主治】目赤烂。

20079 甘菊汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】熟地 淮山各四钱 玄参三钱 甘菊花七钱 白芍(酒炒) 当归 党参(去芦)各二钱 建神曲一钱

【用法】水煎服。

【主治】痿症, 腿足不能起立, 能食易饥者。

20080 甘菊汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】白菊花一钱半 石决明三钱(煅) 熟军一钱半 泽泻一钱半 青箱子一钱(炒) 赤芍一钱 当归一钱半 没药五分(去油) 生草一钱

【用法】竹叶, 灯心为引。

【主治】风火眼疾, 红肿疼痛。

20081 甘菊汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】白菊花一两 金银花一钱半 生甘草三钱

【用法】水煎, 连服三四次。

【主治】一切疔毒, 不论生于何处。

20082 甘菊散

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】甘菊花(择) 旋覆花 防风(去叉) 石膏(碎研)各等分

【用法】上为散。每服二钱匕, 腊茶调服。如煎此药沐发, 大去白屑。

【主治】头面风, 头目昏眩。

【备考】本方方名, 《普济方》引作“甘菊花散”。

20083 甘菊散

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【异名】菊花散(《普济方》卷八十一)。

【组成】甘菊花 旋覆花 密蒙花 青箱子 石决明 羌活(去芦头) 木贼(锉) 决明子(炒) 苍术(米泔浸一宿, 去皮, 切, 炒) 蝉壳(洗) 荆芥穗 甘草(炙, 锉) 防风(去叉) 芎蒭 人参 黄芩(去黑心) 各一两

【用法】上为散。每服二钱匕, 米饮调下, 早、晚食后服。

【主治】风毒冲目, 赤肿涩痛。

【备考】本方方名, 《普济方》引作“甘菊花散”。

20084 甘菊散

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】甘菊花 羌活(去芦头) 木贼

荆芥穗 芎藭各四两 甘草(炙, 锉) 防风(酒浸一宿) 黄耆(切) 附子(炮过用) 蝉壳(洗) 蛇蛻一条(卷在青竹上, 炙) 白蒺藜(去角) 旋覆花 石决明(泥裹, 烧令通赤, 别研) 各一两

【用法】上药除附子、蛇蛻、决明外, 余皆锉碎, 于新瓦上焙令燥一时, 捣罗为细散。每服二钱匕, 用第二米泔煎熟后调下, 空心、日午、夜卧各一服。

【主治】风毒气攻眼, 昏涩疼痛。

【备考】本方方名, 《普济方》引作“甘菊花散”。

20085 甘菊散

《普济方》卷七十九。即《圣惠》卷三十三“甘菊花散”。见该条。

20086 甘菊膏

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】茵草 芎藭 甘草(炙) 防风 黄芩 大戟各一两 生地黄四两 芍药一两半 细辛 大黄 蜀椒(去目闭口, 汗) 杜仲 黄耆各半两 白芷一两(一方添甘菊二两)

【用法】上咬咀。以腊月猪脂四升, 微火煎五上下, 白芷候黄成膏。以敷疮上, 日易二次。

【功用】止痛生肌。

【主治】金疮、痈疽。

20087 甘黄饮

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】生甘草 熟大黄

【用法】酒煎。空心服。

【主治】悬痈未成脓者。

20088 甘甜味

【方源】《普济方》卷一九三引《经验良方》。

【组成】甘遂半两(水煮) 甜葶苈一两(炒) 细辛(去苗) 一两半 川椒二两(炒)

【用法】上为末。炼蜜为丸, 如梧桐子大。

每服十五丸, 朝晨、日午、临卧白汤送下。

【主治】水肿腹胀。

20089 甘葱煎

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】甘草 大胡葱

【用法】上药煎浓汤, 候温, 洗患处, 洗净用药。

【主治】诸疮有脓水者。

20090 甘葶散

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】葶苈半两(炒) 麻黄一分(去节) 甘草 贝母 杏仁(去皮) 各一钱

【用法】上为末。三岁一钱, 水半盏, 煎三分, 去滓温服。

【主治】小儿咳嗽, 有痰气急; 亦治喘促胸闷, 坐卧不安。

20091 甘湿散

【方源】《医学纲目》卷二十。

【异名】痞湿散、蛭蛇胆散(《普济方》卷三二六)。

【组成】蛭蛇胆(真者) 青木香 石硫黄 铁精 麝香各四分(临时入用, 缘麝辟蛇毒, 若先以相和, 蛇胆即无力也)

【用法】上为末, 更研细。有患取如三棋子大, 和井花水, 日再服讫, 先令便利了, 即以后方桃枝熏下部讫, 然后取药如棋子, 安竹管里, 纳入下部中, 一日二次。老少量减。其熏法每日一度, 不可再。

【主治】妇人明疮。

【备考】桃枝熏法: 取东南桃枝五七枝, 轻打头使散, 使绵缠之; 又捣石硫黄为末, 将此绵缠桃枝燃转之, 令末少厚; 又截一竹筒, 先纳下部中, 仍以所燃药桃枝烧热熏之。

20092 甘遂丸

【方源】《外台》卷二十引《古今录验》。

【组成】甘遂二两(熬) 葶苈子二两(熬) 杏仁五十枚(熬) 巴豆四十枚(去心皮, 熬)

【用法】上药治下筛, 炼蜜为丸, 如大豆大。

每服三丸，饮送下。当吐。不知，可至五丸。

【主治】风水黄疸，体大如囊，面目皆合，阴肿如斗，正如霜瓜。

【宜忌】禁野猪肉、芦笋。

20093 甘遂丸

【方源】《幼幼新书》卷三十二引《婴童方》。

【组成】甘遂(炒) 芍药 杏仁 车前子 黄芩 猪苓 葶苈(炒)各三分 鳖甲七分(醋炙)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆大，竹叶饮送下。二岁五六丸，日再量之。

【主治】小儿肿满结实，诸治不效。

20094 甘遂丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】甘遂一分(煨微黄) 芫花半两(醋拌炒令干) 甜葶苈一两(隔纸炒令紫色) 川大黄一两(锉碎，微炒) 青橘皮一两(汤浸去白瓢，焙) 大戟半两(锉碎，微炒) 川芒消一两 贝母一两(煨微黄) 桂心一两 乌喙一分(炮裂，去皮脐)

【用法】上为末，其杏仁研如膏，与诸药末拌令匀。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以粥饮送下，一日二次。以利为度。

【主治】痰冷癖饮久不愈，腹肋胀满，不下饮食、四肢浮肿。

20095 甘遂丸

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《圣济总录》卷八十。

【组成】郁李仁一两(汤浸，去皮，微炒) 陈橘皮一两(汤浸，去白瓢，焙) 甘遂一两(煨令微黄) 赤茯苓一两 甜葶苈二两(隔纸炒令紫色) 瞿麦一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心以温水送下。良久，当利三两行；如不利，即加丸再服，以利即效。

【主治】水气遍身浮肿，皮肤欲裂，心腹气急胀大，小便不利。

20096 甘遂丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】甘遂半两(煨令微黄) 蒜瓣半两(煨熟，研) 黑豆半两(炒熟)

【用法】上药除蒜外，捣罗为末，用蒜并枣肉为丸，如梧桐子大。每服十丸，以木通汤送下，一日二次。

【主治】卒身面浮肿，上气喘息。

20097 甘遂丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】甘遂一分(煨令微黄) 雄黄半两(细研) 石膏半两(细研，水飞过) 牡蛎半两(烧为粉) 巴豆半两(去皮心，绢囊盛，于淳酒中煮半日，取出焙干) 丹砂半两(细研，水飞过) 蕤仁二分(汤浸，去皮研入) 麝香一分(细研)

【用法】上为末，与巴豆都研令匀，炼蜜为丸，如黍米大。每服一丸，以粥饮送下，一日二次。

【主治】小儿癰瘕，肋下坚硬如石，四肢黄瘦，不欲乳食。

20098 甘遂丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】甘遂一分(煨令微黄) 赤芍药半两 黄芩半两 真珠末一分 杏仁半两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 巴豆霜半两

【用法】上为末，入杏仁、巴豆霜，同研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。二三岁儿，每服二丸，空腹以温水送下。以利为效，未利再服。

【主治】小儿腹内痞结，乳食不消，心腹刺痛。

20099 甘遂丸

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】甘遂一两(煨令微黄) 麝香一分(细研) 川大黄一两(锉，微炒) 前胡二两(去芦头) 黄芩半两 木香一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。三岁儿，每服三丸，食前以温水送下。

【主治】小儿阴肿壮热。

20100 甘遂丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】甘遂(微炒黄色) 芫花(醋炒黄色) 桃仁(汤去皮尖双仁,炒黄别研) 芎藭 当归(切,焙) 柴胡(去苗) 蜀椒(去闭口及目,炒出汗) 吴茱萸(汤淘七遍,焙干,炒) 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 桂(去粗皮) 各一两

【用法】上药除桃仁外,捣罗为末。入桃仁捣令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,空腹煎生姜汤送下,一日二次。

【主治】瘕气。

20101 甘遂丸

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】甘遂一两 细辛(去苗叶)一两半 附子(炮裂,去皮脐) 木通(锉) 各一两一分 干姜(炮裂) 吴茱萸(汤浸,焙干,炒) 桂(去粗皮) 各一两

【用法】上为末。炼蜜为丸,如枣核大。以绵裹纳鼻中。仰卧即涕出,日三易之,以愈为度。

【主治】鼻多清涕。

【宜忌】避风。

20102 甘遂丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】甘遂(微煨)一两一分 葶苈(隔纸炒)二两 黄连(去须) 天门冬(去心,焙) 各一两半 苦葫芦一枚(取瓢)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大。每服十丸至十五丸,空心温酒送下。得水利即疏服。

【主治】妇人水分,四肢浮肿,经水断绝。

20103 甘遂丸

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】甘遂(炒) 葶苈(纸上炒) 车前子 猪苓(去黑皮) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒,研) 芍药各三分 泽漆叶 黄芩(去黑心) 鳖甲(去裙襖,醋炙) 各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。五六岁儿每服五丸,竹叶汤送下。以利为度。

【主治】小儿肿满结实,诸治不愈。

20104 甘遂丸

【方源】《普济方》卷五十六引《海上方》。

【组成】甘遂 通草 细辛 附子各等分

【用法】上为末。以白雄犬胆和为丸,如枣核大。绵裹纳鼻中。辛热涕出,四五次愈。

【主治】鼻鼾,及鼻塞不闻香臭,亦治息肉。

20105 甘遂丸

《普济方》卷一六六。为《外台》卷八引《范汪方》“大甘遂丸”之异名。见该条。

20106 甘遂丸

《普济方》卷三八六。为《圣济总录》卷一七四“泽漆丸”之异名。见该条。

20107 甘遂丸

《赤水玄珠》卷十四。为《本草纲目》卷十七引《济生》“遂心丹”之异名。见该条。

20108 甘遂方

【方源】方出《肘后方》卷三,名见《普济方》卷一九三。

【组成】猪肾一枚(分为七脔) 甘遂一分(以粉之)

【用法】火炙令熟,剥去皮食之,一日一食。至四五,当觉腹胁鸣,小便利,不尔更进。须尽为佳,不尔再之。

【主治】①《肘后方》:卒身面肿满。②《普济方》:身面背洪肿,大小便涩。

【宜忌】勿食盐。

20109 甘遂汤

【方源】《千金》卷十一。

【组成】甘遂 黄芩 芒消 桂心 细辛 各一两 大黄三两

【用法】上咬咀。以水八升,煮取二升半,分三服。

【主治】暴坚久痞,腹有坚者。

20110 甘遂汤

《普济方》卷一九四。即《圣惠》卷五十四“甘遂散”。见该条。

20111 甘遂汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】甘遂(炒令微黄)半两 半夏(汤浸去滑,生姜汁炒干)一两

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水一大盏,煎至七分,去滓,再入芍药末并人参末一钱匕,蜜半匙头,更煎三两沸,空心、晚食前温服。气虚人减服。

【主治】留饮病,脉伏,其人欲自利,利后乃快,虽利心下续结满,此为留饮未除。

20112 甘遂汤

【方源】《普济方》卷三九二引《汤氏宝书》。

【组成】甘遂 甘草(炙)各二分 黄芩 大黄各四分

【用法】以水二升,破鸡子二个,和取白,投水中,搅令沫上,吹去之,纳药煮,合为二服。

【功用】破痞除热。

【主治】小儿服汤已得大利,温热已解,而滞实不去,心下坚痞满,不可按,按之则啼,内有伏热。

20113 甘遂饼

【方源】《圣济总录》卷八十引《膜外气方》。

【组成】甘遂 大麦面各半两

【用法】上为末。以水和作饼子,烧熟热服之。如不利,以热饮投之。如利,以冷水洗手面即止。

【主治】膜外水气。

20114 甘遂散

【方源】《外台》卷三十三引《小品方》。

【组成】太山赤皮甘遂二两

【用法】上为末,以白蜜二合和,每服如大豆粒,多觉心下烦。得微下者,每日一次,下后还服猪苓散;不得下,一日二次。渐加可至半钱匕,以微下为度。

【主治】妊娠子淋,大小便并不利,气急,已服猪苓散不愈者。

20115 甘遂散

《圣惠》卷八。为《千金》卷九“水导散”之异名。见该条。

20116 甘遂散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】甘遂一两(煨令微黄) 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 泽泻三两 黄芩一两 泽漆一两 赤茯苓二两 郁李仁一两(汤浸,去皮微炒) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 川朴消二两

【用法】上为细散。每服一钱,五更初煎桑根白皮汤调下。以利为效。

【主治】水气遍身浮肿,心胸急硬,气满上喘,大小便涩。

【备考】本方方名,《普济方》卷一九四引作“甘遂汤”。

20117 甘遂散

【方源】方出《圣惠》卷五十四,名见《普济方》卷一九三。

【组成】甘遂半两(煨令微黄) 槟榔半两 牛蒡子二分(微炒) 商陆一分

【用法】上为细散。每服半钱,用猪肾一只,切作四五片,掺药,用湿纸裹,煨火中煨熟,空心顿服,又微呷酒三二合。须臾,下利为效。

【主治】水气,心腹鼓胀,上气喘急。

20118 甘遂散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【异名】甘遂破结散(《婴童百问》卷五)。

【组成】甘遂一分(煨令微黄) 青橘皮半两(汤浸,去瓢,锉,焙) 黄芩半两 川大黄半两(锉碎,微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓,量儿大小,分减服之。以利即止。

【功用】①《圣惠》:破痞除热。②《普济方》:破结散气。

【主治】①《圣惠》:小儿内有伏热诸候,腹内痞结,虽服汤得利,而滞实不去,心下坚满,按之则啼。②《普济方》:胸膈热实,腹

有留饮，肠内气结而胀，时或壮热。

20119 甘遂散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】甘遂一分（煨令微黄） 槟榔一分 川大黄一分（锉碎，微炒） 牵牛子半两（微炒） 甜葶苈一分（隔纸炒，令紫色）

【用法】上为细散。每服一字，以温水调下。以利为效。

【主治】小儿水气，遍身肿满，大小便难，喘促不得睡卧。

20120 甘遂散

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】甘遂（生）半两 牵牛子（半生半炒） 续随子（去壳，研） 大戟各一两 葶苈（纸上炒）一分

【用法】上为散。每服半钱匕，空心浓煎灯心汤调下。利下水为效，未减更一服。

【主治】三焦气不通，心腹胀，喘促，大小便不利。

20121 甘遂散

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】甘遂半两 槟榔（生锉） 木香 牵牛子（半生半炒） 莱菔子（研）各一两

【用法】上为散。每服半钱匕，煎紫苏木瓜汤调下，空心服。利下水为度。量人虚实加減。

【主治】三焦水气，甚者四肢虚肿。

20122 甘遂散

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】甘遂（炒） 蓬莪术（炮） 青橘皮（汤浸，去白，焙）各一两 大戟（微煨） 桂（去粗皮）各三分 石菖蒲（米泔浸，炒干） 木香各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，空腹用葱汤调下；渐加至二钱匕，微吐泻为度。

【主治】水蛊水肿，脚气。

20123 甘遂散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】甘遂一两（炒） 木香一分

【用法】上为散。每服一钱匕，温蜜酒调下，

不拘时候。

【主治】大便不通。

20124 甘遂散

【方源】《幼幼新书》卷三十二引茅先生方。

【组成】甘遂 大戟 黑牵牛 槟榔 陈橘皮（去白） 木香各半两

【用法】上为末。每岁一钱，五更初用葱酒调下。不会吃酒用葱汤调下。天明通下黄水来，可依形证调理。

【主治】气肿，水肿。

20125 甘遂散

【得效】卷八。为《本草纲目》卷十七引《济生》“遂心丹”之异名。见该条。

20126 甘遂散

【普济方】卷三十二引《仁存方》。为方出《本事》卷四，名见《普济方》卷二四〇“甘遂散”之异名。见该条。

20127 甘遂散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷二引《入门》。

【组成】甘遂末 葱汁

【用法】和丸。绵裹塞耳中，口含甘草汤。两药须各两处修制妙。

【主治】耳聋。

20128 甘遂散

【方源】《新医学》（1972；11：55）。

【组成】甘遂一两

【用法】研为细末，装瓶备用。用时用甘遂散三钱，面粉适量，麝香少许（无麝香用冰片代），加温水调成糊状，外敷于中极穴处（脐下四寸），方圆约二寸。一般三十分钟即能小便通利。无效时可继续使用或再加热敷，疗效更速。

【主治】小便不通。

【临证举例】小便不通 用甘遂散外敷治疗不同疾病引起的小便不通患者共八例，外敷一次即排尿的五例；外敷二次排尿的二例；外敷二次再热敷一次排尿的一例。

20129 甘遂汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】人参(少者用山药四钱炒黄代之) 白术 茯苓 甘草(炙)各一钱半 升麻五分 陈皮七分 苡仁(炒) 芡实(炒)各二钱 木瓜 白豆蔻曲(炒,研)各一钱 红枣四枚

【用法】水煎,温服。

【主治】泄泻急而趋下,不能少停,此脾气虚而下坠也。

【加减】小便清而大便泄,或加肉豆蔻(面包煨)一钱,煨木香四分。

20130 甘藷水

【方源】《实用正骨学》。

【组成】硼砂 炉甘石各半斤

【用法】加水十倍煎,滤净去滓,候冷,贮玻璃瓶内,用消毒药棉蘸洗伤口。

【功用】去腐消炎。

20131 甘蔗粥

【方源】《养老奉亲》。

【组成】甘蔗汁一升半 青梁米四合(净淘)

【用法】上以蔗汁煮粥,空心渐食之,每日一二服。

【功用】①《养老奉亲》:极润心肺。②《药粥疗法》:清热生津,养阴润燥。

【主治】①《养老奉亲》:老人咳嗽虚热,口舌干燥,涕唾浓粘。②《药粥疗法》:热病恢复期,津液不足所致的心烦口渴,肺燥咳嗽,大便燥结。

20132 甘薯梗

【方源】《纲目拾遗》卷八引《群芳谱》。

【组成】糯米 薯梗 白糖 芝麻

【用法】将糯米水浸五七日,以米酸为度,淘净晒干,捣成细粉。看晴天将糯米粉入生水,和作团子,如杯口大。即将薯根拭去皮,洗净沙石土,徐徐磨作浆,要极细,勿搀水。将糯团煮熟,捞入瓶中,用木杖尽力搅作糜,候热得所,大约以可入手为度。将薯浆倾入,每糯粉三斗,入薯浆一斤,搅极匀。先将干小粉筛平板上,次将糜置粉上,又著干粉,捍

薄晒半干,切如骰子样,晒极干,收藏。用时慢火烧锅令热,下二合许,慢火炒,少刻渐软,渐发成圆珠子。次下白糖、芝麻,或更加香料,炒匀,候冷极浮脆。每梗二升,可炒一斗。

【功用】厚肠胃,健脚力,缩痰涎,解毒活血。

20133 甘鳖散

【方源】方出《本事》卷四,名见《普济方》卷二四〇。

【异名】甘遂散(《普济方》卷三十二引《仁存方》)。

【组成】连珠甘遂一两 木鳖子二个(一雌一雄,去壳研)

【用法】上为末。猪腰子二个破开,药末一钱掺匀,湿纸裹数重,漫火煨熟,放温,五更初细嚼,米饮下。积水多则利多,少则少也。

【主治】①《本事》:肾脏风攻注脚膝。②《普济方》:脚气。

【宜忌】宜软饭将息。

【临证举例】肾脏风 壬子年在毗陵有姓马人鬻油,久不见,因询其亲,云:宿患肾脏风,今一足发肿如瓠,自腰以下,钜细通为一律,痛不可忍,卧欲转侧,则两人挟持方可动。或者欲以铍刀决之。予曰未可,予有药,当合以赠。如上法服之,辰巳间下脓如水晶者数升,即时痛止肿退。一月后尚拄拐而行,予再以赤乌散令涂贴其膝方愈。后十年过毗陵,率其子列拜以谢云:向脚疾至今不复作,虽积年肾脏风并已失,今健步不苦矣。

20134 甘露丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】寒水石二斤(烧令通赤,摊于地上出毒一宿) 铅霜三分(细研) 马牙消三两(细研) 龙脑三分(细研) 甘草三分(炙微赤,锉)

【用法】上为末。再入乳钵内,研令极细,

用糯米饭为丸，如弹子大。每服半丸，食后以新汲水磨下。

【功用】解壅毒，退风热。

【主治】①《圣惠》：口舌干燥。②《局方》：风壅痰热，心膈烦燥，夜卧不安，谵语狂妄，目赤鼻衄，口燥咽干；中暑。

20135 甘露丸

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】寒水石（煨，候冷，夹绢袋盛，并底浸七日，取出令干，研）四两 天竺黄半两 马牙消（研）二两 甘草（锉）一两 龙脑半钱

【用法】上为末，糯米粥为丸，如鸡头子大。每服一丸，生姜蜜水磨下。

【主治】暑毒燥闷。

20136 甘露丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】甘草（炙，锉）地黄 金粉 大黄（蒸，锉，焙）天门冬（去心，焙）各一两 防风（去叉）远志（去心）羌活（去芦头）桑根白皮（锉，炒）秦艽（去苗土）地骨皮各三分 玄参 羚羊角（镑）胡黄连各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十九，食后姜蜜汤下。

【主治】肺脏气极，风热所伤，津液不通。

20137 甘露丸

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】舶上硫黄一两 消石一两 白明矾半两 滑石半两 飞面四两

【用法】上为极细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服三十九或五十丸，用新汲水送下。

【主治】赤白痢，肠风脏毒，酒积下血便血。

20138 甘露丸

【方源】《回生集》卷下。

【组成】象牙末八钱 飞白矾五钱 大马蜂巢二个（带子者）刺猬皮一张（上二味用新砂锅焙黄色）瓜儿血竭五钱 朱砂六钱 明雄黄七钱 滴乳香三钱（去油净）没

药三钱（去油净）儿茶四钱（去油尽）

【用法】上为细末，熔黄蜡为丸，如梧桐子大。每服二十四丸，槐花煎汤冲黄酒空心送下。药内加白颈蚯蚓、槐花更妙。

【主治】眼漏、鼻漏、耳漏、牙漏、肘漏、腕漏、乳漏、胸漏、脐漏、大肠漏、小肠漏、臀漏、膝漏、踝漏，或周身，或一处不等及诸疮年久不愈者。

【宜忌】服药后忌醋、荤腥、气恼。

20139 甘露丹

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】水银一钱二分（烧酒研）银朱樟脑 花椒 佛香各五分

【用法】上为末，烧酒为十二丸。每晚火炉中慢火烧三丸，令鼻闻烟。四晚熏完。

【功用】杨梅结毒。

20140 甘露汤

《圣惠》卷九十五。为《证类本草》卷三引《传信方》“石旻山人甘露饭”之异名。见该条。

20141 甘露汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】菱莢（焙）四两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加薄荷二叶，生姜一片，蜜少许，同煎至七分，去滓，食后、临卧服。

【主治】眼见黑花，赤痛昏暗。

20142 甘露汤

【方源】《普济方》卷三十六引《潘家方》。

【异名】观音应梦散（原书同卷）、甘露饮（《寿亲养老》卷二）。

【组成】干杨糟六分（头酿者）生姜四分（和皮）

【用法】上拌和，研烂作饼子，或焙或晒干，每十两用甘草二两炙，同研为末。每服入盐少许，沸汤调下，不拘时候。

【功用】快利胸膈，调养脾胃，快进饮食。

【主治】翻胃呕吐不止，饮食减少。

【临证举例】翻胃 常传一富人病翻胃，往

京口甘露寺，设水陆，泊舟岸下，梦一僧持汤一杯与之。饮罢犹记其香味，便觉胸膈少快。早入寺，知客供汤，乃是梦中所饮者，胸膈尤快。遂求其方，修制数十服后，疾遂愈。

20143 甘露汤

【方源】《丹溪心法附余》卷十三引《经验方》。

【组成】百药煎 白干葛各三钱 乌梅五味子 天花粉各二钱 甘草半钱

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】烦渴口干。

20144 甘露汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】人参 白术 升麻 附子 黄耆 丹皮各二钱

【用法】加大枣二枚，煎八分，食远服。

【主治】中焦虚火，服凉药反盛者。

20145 甘露饮

《局方》卷六（绍兴续添方）。为《阎氏小儿方论》“甘露饮子”之异名。见该条。

20146 甘露饮

【方源】《伤寒心要》。

【组成】茯苓 泽泻 甘草 石膏 寒水石二两 白术 桂枝 猪苓半两 滑石四两

【用法】上为末。每服三钱，汤调或新汲水调服，姜汤尤妙。

【主治】汗后烦渴。

20147 甘露饮

《寿亲养老》卷二。为《普济方》卷三十六引《澹寮方》“甘露汤”之异名。见该条。

20148 甘露饮

【方源】《普济方》卷二九九引《如宜方》。

【组成】枇杷叶 石斛 甘草（炙） 生地 黄 黄芩 麦门冬（去心）各等分

【用法】上咬咀。水煎，食后服。

【主治】口舌生疮，牙宣心热。

20149 甘露饮

【方源】《得效》卷十一。

【组成】寒水石 石膏 郁金 甘草 薄荷各等分

【用法】上为末。每服一钱，食后薄荷汤调下。

【主治】潮热乍来乍去，心烦面赤，口干如症状。

20150 甘露饮

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】石膏 寒水石各一两 甘草三钱

【用法】上为末。三岁半钱，灯心汤调下，暑热，冷水调下。

【主治】小儿伏热吐泻，兼中暑昏迷，烦渴不止，心燥体热，头疼及伤风体热，烦渴噤煎。

【宜忌】立夏后、立秋前宜用，余月不可。

20151 甘露饮

【方源】《医统》卷九十一。

【组成】黄芩 生地黄 天门冬 麦门冬 枇杷叶 茵陈 石斛 桔梗 甘草 枳壳各等分

【用法】水煎，食后服。

【主治】痘疮，热毒攻牙，口肿。

【宜忌】不可吃热物。

20152 甘露饮

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】麦门冬（去心）一两 天门冬（去心）二两 生地黄四分 熟地黄六分 石斛（去根） 枇杷叶各五分 山茵陈 枳壳 黄芩 犀角屑各六分 甘草一字

【用法】水煎服。

【主治】小儿牙疳。

20153 甘露饮

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】天冬 麦冬 生地 熟地 茵陈 枇杷叶 黄芩 苡仁 石斛 甘草 山梔（一方无茵陈、山梔，用枳壳）

【主治】三消。

20154 甘露饮

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】知母 麦冬 连翘 薄荷 桔梗 黄芩 玄参 滑石 石膏 甘草

【主治】三阳热毒上冲之咽喉痛。

20155 甘露饮

【方源】《痘科金镜赋集解》卷六。

【组成】人参 白茯苓 甘草 生地 麦冬 五味子 知母 花粉 葛根

【主治】喉舌牙疳，痘后牙疳出血，口臭口烂。

【加减】上焦火，加生藕汁，桔梗、山梔；中焦火，加石膏、黄连；下焦火，加黄柏、熟地，去葛根。

20156 甘露饮

【方源】《灵验良方汇编》卷一。

【组成】枇杷叶(拭去毛) 生地黄 熟地 天冬 黄芩 石斛 山豆根 犀角屑 枳壳 各一钱 甘草五分

【用法】水二钟，煎七分，食后服。

【主治】口舌生疮，咽喉肿痛，牙龈肿烂，时出脓血。

20157 甘露饮

【方源】《疡医大全》卷十四。

【组成】犀角 生甘草 生地 银柴胡 枳壳 麦门冬 知母 枇杷叶 黄芩 钗石斛 茵陈各一钱

【用法】用淡竹叶七片，灯心十根为引，水煎服。

【主治】茧唇。

20158 甘露饮

【方源】《玉钥·续编》。

【组成】大熟地三钱 大生地二钱 玉竹三钱 大麦冬(去心)二钱 天门冬(去心)一钱 马料豆二钱 炙甘草四分

【用法】井水二钟，文火煎服。

【主治】喉白，咽干不润，咳嗽，唇燥舌干。

【备考】是方得人参更妙。

20159 甘露饮

【方源】《白喉全生集》。

【组成】生地黄四钱 熟地 麦冬(去心)各三钱 僵蚕二钱(姜汁炒) 银花 天冬 各一钱五分 石斛 枳壳 粉草各一钱

【用法】水煎服。

【主治】白喉虚热症。白见于关内外，色稍

不润，喉内红肿，下午痛甚，口干不渴，舌苔虽黄而滑，小便略赤而长，饮食稍碍，心烦不眠。

20160 甘露饮

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】大生地五钱 鲜生地六钱 天冬 麦冬(去心)各三钱 鲜石斛四钱 黄芩(炒)一钱 银花三钱 川贝母一钱 生炙甘草各五分

【用法】加竹茹一团，姜汁炒。

【功用】存阴清邪，以复胃中津液。

【主治】温热病。

20161 甘露饮

【方源】《医学摘粹》。

【组成】生地三钱 熟地三钱 天冬三钱 麦冬三钱 石斛三钱 甘草二钱 枳壳二钱 枇杷叶三钱

【用法】水煎大半杯，温服。

【主治】口糜龈烂出血；食亦，善食而瘦。

20162 甘露茶

【方源】《易简方便医书》卷一。

【组成】柴胡 厚朴 防风 山楂 枳壳 苍术 神曲 谷芽 陈皮 川乌各一两

【用法】用陈茶八两同药拌匀。每服二钱，加生姜一片，煎水服之。取出微汗而愈。

【主治】头痛发烧，胸痞闷，气结不舒，脾胃不和，饮食停滞，霍乱吐泻，以及四时不正之气；并疟疾，红白痢疾，暑热伤食等。

【备考】柴胡改前胡亦可。

20163 甘露酒

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】圆眼肉 红枣肉 葡萄 桃仁 当归 枸杞 杜仲 熟地各二两

【用法】浸烧酒十斤。常服。

【主治】诸虚百损。

20164 甘露散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】甘草半斤 不灰木半斤

【用法】上药须是腊月内预办，修合取冰雪水浸泡，阴干，又投入水中，如此三二十度

后,阴令极干,为细散。每服一钱,以新汲水调下,不拘时候。

【主治】心胸烦热,不得安定。

20165 甘露散

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】黄连(去须,锉)一两 吴茱萸半两

【用法】上二味同炒,以茱萸黑色为度,放地上出火毒;不用茱萸,将黄连为细散。每服半钱匕,食后茶清或新水调下。

【主治】暑气。

20166 甘露散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】干猪胆十枚

【用法】上剪破出却气,去却系著处,用干盆子一只,烧胞,烟尽取出,研令极细。每服一钱匕,温酒调下,不拘时候。

【主治】渴疾,饮水不止。

20167 甘露散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】白僵蚕(炒) 天南星各等分

【用法】上为细散。每服一钱匕,生姜、薄荷汤调下。

【主治】咽喉肿痛。

20168 甘露散

《小儿药证直诀》卷下。为原书同卷“玉露散”之异名。见该条。

20169 甘露散

【方源】《卫生总微》卷三。

【组成】牙消一分 龙脑薄荷叶一两 大黄半两 甘草半两(炙) 芎藭一分 雄黄一分(水飞)

【用法】上为末。每服半钱,蜜水调下,不拘时候。

【主治】小儿诸热。

20170 甘露散

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】好滑石二两(研细,桂府白色者妙) 甘草末半两(一方更有防风半两,为末)

【用法】二者拌匀。每服一钱,以浓煎萝卜汤调下。

【功用】解表发汗。

【主治】伤寒壮热,头疼体痛。

20171 甘露散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】熟干地黄 生干地黄 天门冬(去心) 麦门冬(去心) 枇杷叶(刷去毛,净) 枳壳(麸炒,去瓤) 苦参 石斛(去根) 山茵陈 甘草各等分

【用法】上为末。每服二钱,水一盞,煎至半盞,去滓,食后温服。

【主治】小儿胃热,牙龈宣露出血,口臭,脸肿,赤眼口疮,不欲乳食,肌体烦热及疮疹已未发。

20172 甘露散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】寒水石 石膏 防风 荆芥 薄荷 甘草

【用法】上为末。每服半钱,用井花水调下,或薄荷汤调下。

【主治】惊风,潮热不退。

20173 甘露散

【方源】《普济方》卷一一五引《瑞竹堂方》。

【组成】白滑石六两半 泽泻 甘草(去皮)各一两 人参 茯苓 白术 木猪苓(去黑皮)各半两

【用法】上为细末。每服三钱,白汤调服。欲分阴阳,蜜和丸,如弹子大,用汤化如稀面糊调服之。

【功用】分阴阳。

【主治】《医统》:脾虚水湿不利,腹胀中满。《准绳·类方》:肿胀用下药得利后,以此补之。

20174 甘露散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】藿香 茯苓 薄荷叶 川朴 桔梗 白芷各五钱 半夏一钱 神曲 香薷

扁豆 紫苏 陈皮 朱砂 苍术 木瓜 山楂 甘草 葛根各二钱 明雄黄六分 大腹皮三钱

【用法】上为极细末。每服二钱，小儿酌减，白开水送下。

【功用】健胃解毒，清暑祛湿。

【主治】感冒发热，中暑吐泻，神识昏愤，伤食腹满，头痛呕逆，肢节痠痛。

【宜忌】忌食生冷硬物。

20175 甘露膏

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】兰香饮子。

【组成】半夏二分(汤洗) 熟甘草 白豆蔻仁 兰香 升麻 连翘 桔梗各五分 生甘草 防风各一钱 酒知母一钱五分 石膏三钱

【用法】上为极细末，汤浸蒸饼，和匀成剂，捻作薄片子，日中晒半干，擦碎如米大。每服二钱，食后淡生姜汤送下。

【主治】消渴，饮水极甚，善食而瘦，自汗，大便结燥，小便频数。

20176 甘露膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《经验普济加减方》。

【组成】黄连二两(碎) 黄丹 铜青各七钱 当归四钱(切) 白丁香二钱 白矾三钱 没药一钱(七味用水五升，同熬一升，去滓) 轻粉一钱 鹏砂二钱(研) 水银半钱 龙脑 麝香各少许(研)

【用法】上为细末，入前膏搅匀。每点三箸至五箸，觉涩便睡十日。

【主治】一切眼病，昏晕翳膜，赤肿痒痛。

20177 甘氏乌膏

【方源】《医心方》卷十七引《古今录验》。

【组成】水银一两 黄连二两 墨二钱

【用法】上三物，猪膏和，熟研，调如脂，敷。不过二三即愈。

【主治】天下众创，医术不能愈，有虫者。

20178 甘竹沥汤

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【异名】蜜竹沥饮(《圣济总录》卷六)。

【组成】甘竹沥一斗 生姜三两 防风甘草(炙)各三两 防己 麻黄(去节) 人参 黄芩 白术 细辛 茵芋 秦艽 桂心各一两 附子一枚(大者，炮)

【用法】上咬咀。以汤渍药令赤，合竹沥，煮取四升，分为四服。

【主治】卒中恶风噎倒闷，口噤不能语，肝厥，尸僵，死不识人，闭目，灸针不知痛，风狂。

【宜忌】忌海藻、菰菜、桃、李、雀肉、生葱、生菜、猪肉、冷水。

20179 甘竹茹汤

【方源】《外台》卷二引《深师方》。

【组成】甘竹茹四两 生白米一升

【用法】以水八升煮之，取米熟汤成。去滓，徐徐分服。

【主治】风热气哕及诸哕。

20180 甘竹茹汤

【方源】《千金》卷三。

【异名】甘竹汤(《准绳·类方》卷五)。

【组成】甘竹茹一升 人参 茯苓 甘草各一两 黄芩三两

【用法】上咬咀。以水六升，煮取二升，去滓，分三服，一日三次。

【主治】产后内虚，烦热短气。

【备考】《济阴纲目》有麦门冬一两。

20181 甘李根汤

《东医宝鉴·杂病篇》卷二。为《活人书》卷十六“李根汤”之异名。见该条。

20182 甘李根散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】甘李根二两(锉) 吴茱萸半两(汤浸七遍，焙干，微炒) 半夏一两(汤洗七遍，去滑) 人参一两(去芦头) 附子一两(炮裂，去皮脐) 桂心一两 当归一两(锉，微炒) 干姜半两(炮裂，锉) 槟榔一两

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】奔豚气，脐腹胀痛，翕翕短气，发作有时，四肢疼痛。

20183 甘松香丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】半夏曲 天南星各二两 甘松一两 陈橘皮一两半

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜汤送下。

【主治】痰眩。

20184 甘松香散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】甘松香 莽草 川乌(去皮，炮)各二钱 北细辛(去叶)二分 硫黄半钱 香附子(炒去毛)二钱

【用法】上为末。以手指蘸少许，揩牙上，后以盐汤灌漱。

【主治】一切牙痛。

20185 甘乳药捻

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】甘石粉

【用法】上为极细末(水飞甘石最适宜)，棉纸捻成药线。按需要长度剪成小段，用镊子夹持插入疮口内，于疮口外留约0.5~1公分长为度。

【功用】收干，生肌。

【主治】脓痈久不敛口。

20186 甘草豆方

【方源】《养老奉亲》。

【组成】甘草一两 乌豆三合 生姜半两(切)

【用法】以水二升，煎取一升，去滓，冷渐食服之。

【主治】①《养老奉亲》：老人中风，热毒心闷，气壅昏倒。②《寿亲养老》：冬月小儿诸热毒。

20187 甘草饮子

【方源】《外台》卷九引《广济方》。

【组成】甘草六分(炙) 款冬花七分 豉

心一合 生麦门冬八分(去心) 葱白一握 槟榔十颗(合子碎) 桔梗六分 地黄汁半升

【用法】上切。以水六升，煮取二升，绞去滓，下地黄汁，分温三服。如人行四五里进一服。

【主治】肺热咳嗽，涕唾多粘。

【宜忌】忌生菜、热面、炙肉、海藻、菰菜、鱼、蒜、粘食、猪肉、茺萸。

20188 甘草饮子

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】甘草一两(炙微赤) 陈橘皮一两(汤浸，去白瓢，焙) 川升麻一两 生姜一两 葛根一两 人参一两(去芦头)

【用法】上锉细，和匀。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，毒气攻胃，呕哕不止。

20189 甘草数方

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】甘草一两

【用法】上为末。韭汁调敷。

【主治】蟻螫疮。

20190 甘草摩膏

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】甘草(炙) 防风(去叉)各一两 白术 桔梗各三分 雷丸二两半

【用法】上为粗末，用不入水猪脂一斤，锅内火上先炼过，去滓，入诸药末，更煎令成膏，新绵滤去滓，入瓷盒内贮之。每用特取少许，炙手，以膏摩之，百度效。小儿无病，每日以膏摩肉上及手足心良。

【功用】辟风寒。

【主治】小儿新生，肌肤嫩弱，喜为风邪所中，身体热，或中大风，手足惊掣。

20191 甘菊花丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】甘菊花三分 人参三分(去芦头) 当归三分 防风半两(去芦头) 秦艽半两(去苗) 山茱萸半两 白鲜皮半两 黄耆半

两(锉) 汉防己半两 桂心半两 白术半两 白蒺藜半两(微炒,去刺) 生干地黄半两 独活半两 薯蓣半两 芎藭半两 细辛半两 苍耳子半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以温酒送下,不拘时候。

【主治】头面风,皮肤痒,肢节疼痛,头目不利,项强耳聾。

20192 甘菊花丸

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】甘菊花一两 决明子一两半 车前子二两 防风二两(去芦头) 蕤仁一两半(汤浸,去赤皮) 黄连二两(去须) 川升麻一两 子芩一两 川大黄三两(锉碎,微炒) 玄参一两 蕤仁二两

【用法】上为末。炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后以温浆水送下。

【主治】风毒攻眼,涩痒肿疼,久赤不愈。

20193 甘菊花丸

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】菊花 决明子 车前子 丹参 防风(去叉) 玄参 蕤仁(去皮) 升麻 黄连(去须) 黄芩(去黑心) 大黄(锉,炒) 蕤仁 细辛(去苗叶) 甘草(炙,锉) 人参各一两。

【用法】上为末。炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后温水送下,临卧再服。

【主治】风毒冲目,虚热赤痛。

20194 甘菊花丸

【方源】《普济方》卷八十一引《卫生家宝》。

【异名】甘菊丸(《赤水玄珠》卷三引《宝鉴》)。

【组成】甘菊花二两(去土) 枸杞四两 熟地黄三两 干山药半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,空心、食后各一服,温水送下。

【功用】明目,暖水脏,活血驻颜,壮筋骨。

【主治】男子肾脏虚弱,眼目昏暗,或见黑花。

20195 甘菊花汤

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】甘菊花 地骨皮各一两 升麻一两半 黄连(去须) 茯神(去木皮) 蕤仁 防风(去叉) 木通(锉)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加竹叶十片,同煎至八分,去滓,食后温服,一日三次。

【主治】风毒冲眼,赤眼。

【备考】本方方名,原书(文瑞楼本)作“甘菊汤”。

20196 甘菊花汤

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【异名】菊花汤(原书卷一八〇)。

【组成】甘菊花一两 甘草(炙)一分 防风(去叉)半两 山茱萸七枚

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水一盞,煎至六分,去滓,分温三服,早晨、日午、晚各一服。

【主治】小儿鼻多涕,是脑门为风冷所乘。

20197 甘菊花汤

《圣济总录》卷一八〇。为《圣惠》卷八十九“甘菊花散”之异名。见该条。

20198 甘菊花汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】菊花 升麻 旋覆花 石决明 川芎 大黄(炒)各五钱 石膏 羌活 地骨皮 木贼(炒) 青箱子 黄芩 防风 栀子仁 草决明 荆芥 黄连 甘草

【用法】上为细末。每服五钱,蜜一盞,煎至七分,食后温服。

【主治】内外障翳,一切眼疾。

20199 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】甘菊花一两 牛黄半两(细研如粉) 犀角屑三分 铁粉半两 麦门冬半两(去心,焙) 黄连三分(去须) 铅霜半两 人参一两(去芦头) 甘草一分(炙微赤,

性)

【用法】上为细散，入牛黄，更同研令匀。每服一钱，食后以竹沥调下；或金银煎汤调下亦得。

【主治】胆实，久有伏热，精神惊悸不安。

20200 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】甘菊花 人参(去芦头) 大腹皮(锉) 半夏(汤洗七遍，去滑) 木香 白术 威灵仙 枳壳(麸炒微黄，去瓤) 肉桂(去皱皮) 诃黎勒皮 赤茯苓 郁李仁(汤浸，去皮尖，微炒) 甘草(炙微赤，锉) 各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏痰毒，胸膈壅滞。

【备考】《普济方》有桔梗，无枳壳。

20201 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】甘菊花半两 旋覆花半两 防风一两(去芦头) 芎藭一两 蔓荆子半两 细辛半两 酸枣仁一两 蕤蕤一两 枳壳半两(麸炒微黄，去瓤) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒痰壅，头痛心烦，四肢拘急，不得睡卧。

20202 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】甘菊花三分 天麻一两 石膏二两 芎藭三分 独活二分 防风三分(去芦头) 白术三分 杏仁半两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 茯神一两 羚羊角屑三分 杜若三分 黄芩三分 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，

加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风头旋，忽忽如醉，痰逆，不下饮食。

20203 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】甘菊花三分 茯神一两 犀角屑三分 防风一两(去芦头) 川升麻三分 石膏二两 白芷半两 芎藭半两 甘草半两(炙微赤，锉) 牡荆子一两 葛根一两(锉) 枳壳半两(麸炒微黄，去瓤)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】头风目眩痛。

20204 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】甘菊花一两 川升麻一两 芎藭一两半 细辛一两 防风(去芦头)三分 石膏二两 羚羊角屑一两半 川大黄一两(锉碎，微炒) 黄连一两(去须) 甘草三分(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】诸风毒攻头目，睛中如针刺痛，及欲成障翳。

20205 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】甘菊花一两 旋覆花半两 人参一两(去芦头) 川升麻三分 防风半两(去芦头) 车前子半两 石膏一两 羚羊角屑半两 黄芩半两 决明子一两 杏仁半两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 甘草一分(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝脏风毒，上攻眼目，始即昏暗，久成内障。

【宜忌】忌炙煨、热面。

【备考】本方方名,《普济方》引作“甘菊散”。

20206 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】甘菊花 赤箭 酸枣仁(微炒)各一两 旋覆花 犀角屑 防风(去芦头) 白鲜皮 白芷 细辛 沙参(去芦头) 羌活 甘草各三分

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食后温服。

【主治】风邪入目,致瞳子不正,眼常偏视。

20207 甘菊花散

【方源】《医方类聚》卷六十六。即《圣惠》卷三十三“菊花散”。见该条。

20208 甘菊花散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】防风汤(《圣济总录》卷一八〇)、甘菊花汤(《圣济总录》卷一八〇)。

【组成】甘菊花 白术 防风(去芦头) 人参(去芦头) 细辛 白茯苓 甘草(炙微赤,锉)各一分

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,入生姜少许,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿脑户伤于风冷,鼻内多涕,精神昏闷。

【备考】本方方名,《幼幼新书》卷三十三引作“菊花散”。

20209 甘菊花散

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】甘菊花一两 白蒺藜 木贼 防风(去叉) 甘草(炙)各半两 木香一分

【用法】上为细散。每服一钱匕,沸汤点服,不拘时候。

【主治】肝气壅塞,翳膜遮睛,隐涩难视。

20210 甘菊花散

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】甘菊花四两 防风(去叉)二两 蒺藜子(炒去角) 恶实(炒)各一两 甘草(炙,锉)半两

【用法】上为散。每服二钱匕,熟水调下,食后、临卧服。

【主治】风毒攻眼,疹痛不可忍。

20211 甘菊花散

【方源】《普济方》卷四十五。即《圣济总录》卷十七“甘菊散”。见该条。

20212 甘菊花散

【方源】《普济方》卷七十五。即《圣济总录》卷一〇四“甘菊散”。见该条。

20213 甘菊花散

【方源】《普济方》卷七十五。为《圣济总录》卷一〇八“菊花散”之异名。见该条。

20214 甘菊花散

【方源】《普济方》卷七十七。即《圣济总录》卷一〇六“甘菊散”。见该条。

20215 甘菊花散

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】甘菊花 谷精草 石决明各等分

【用法】上为末。每服二钱,水一盞,入干柿一个,同煎至七分,干柿细嚼服。

【主治】小儿斑疮入眼。

20216 甘露饮子

【方源】《阎氏小儿方论》。

【异名】甘露饮(《局方》卷六(绍兴续添方))、大甘露饮(《咽喉经验秘传》)。

【组成】生干地黄(焙) 熟干地黄(焙) 天门冬 麦门冬(各去心,焙) 枇杷叶(去毛) 黄芩(去心) 石斛(去苗) 枳壳(麸炒,去瓢) 甘草(锉,炒) 山茵陈叶各等分

【用法】上为粗末。每服二钱,水一盞,煎八分,食后温服;牙齿动摇,牙龈腥热,含漱并服。

【功用】①《广西中医药》(1985; 3: 20): 清热利湿,润肺利咽。②《上海中医药杂志》(1985; 11: 27): 滋阴清热,行气利湿。

【主治】心胃之热上冲,牙龈、咽喉肿痛,口舌生疮,目赤肿痛;湿热黄疸,阴虚盗汗,胃脘疼痛。

①《阎氏小儿方论》: 心胃热,咽痛,口舌

生疮,并疮疹已发未发;又治热气上攻,牙龈肿,牙齿动摇。②《局方》(绍兴续添方):丈夫、妇人、小儿胃中客热,牙宣口气,牙龈肿烂,时出脓血;目睑垂重,常欲合闭,或即饥烦,不欲饮食,及赤目肿痛,不任凉药,疮肿已发未发;又疗脾胃受湿,痰热在里;或醉饱房劳,湿热相搏,致生痘病,肢体微肿,胸满气短,小便黄涩;或时身热。③《上海中医药杂志》(1985;11:27):胃脘痛,阴虚盗汗,温热病,咳嗽,消渴,肝郁头痛,衄血,痛经。

【宜忌】《广西中医药》(1985;3:20):素体阳虚,溃疡日久难愈,肢冷,腰膝酸楚,溲清,舌嫩有齿痕,脉沉细等肾阳不足,阴损反阳,水不济火,虚火上炎之证,不宜用此方。

【方论选录】①《医方集解》:此足阳明少阴药也。烦热多属于虚,二地、二冬、甘草、石斛之甘,治肾胃之虚热,泻而兼补也;茵陈、黄芩之苦寒,折热而去湿;火热上行为患,故又以枳壳、枇杷叶抑而降之也。②《医林纂要》:熟地黄以滋养肾水;生地黄能升肾水以上交于心;麦冬以清肺宁心;天冬能滋肺金以下生肾水;石斛甘微咸,得水石清虚之气,故能补心安神,清金保肺,去胃中之湿热而布膻中之清化;茵陈去胃中沉郁之湿热;黄芩降肺逆;枳壳破郁积,且能敛阴;枇杷叶酸能补肺敛阴,宁心收散,苦能泄逆气,泻火清金;甘草补中而亦能去热。热盛则水涸,二地以滋之;热盛则金流,二冬以保之;清用黄芩、枇杷叶;去湿用茵陈、枳壳,而皆有悠扬清淑之致。不必大为攻下,此所以为甘露。热莫盛于胃,而诸热皆统于心,心化不足,则热妄行,石斛补心以除妄热,所谓热淫于内,治以咸寒,佐以苦甘,以酸收之,以苦发之也。③《时方歌括》:足阳明胃为燥土,喜润而恶燥,喜降而恶升,故以二冬、二地、石斛,甘草之润以补之;枇杷、枳壳之降以顺之。若用连、柏之苦,则增其燥;

若用耆、术之补,则虑其升。即有湿热,用一味黄芩以折之,一味茵陈以渗之,足矣。盖以阳明之治,最重在养“津液”二字。此方二地、二冬等药,即猪苓汤用阿胶以育阴意也;茵陈、黄芩之折热而去湿,即猪苓汤中用滑泽之除垢意也。

【临证举例】①口疮 《广西中医药》(1985;3:20):本方加减治疗口疮31例,方药为:干地黄15克、熟地黄12克、天门冬12克、麦门冬15克、黄芩10克、茵陈9克、枇杷叶9克、枳壳6克、石斛10克、黄连6克、桔梗6克、甘草9克。每日一剂,煎水分三次服完,小儿量酌减。除婴儿外,重症者可用柳花散加煎汤含漱(青黛10克、冰片9克、黄柏15克、甘草15克。每日一剂)。典型病例:肖某,女,69岁。口舌生疮,灼热疼痛,屡治不愈五年余,且伴口苦咽干,头晕头痛。体温39℃,口喉干涩,咽喉疼痛,纳少,溲黄便结。口腔及舌缘两边有黄白色的溃疡点16个,两侧扁桃体呈Ⅰ度肿大,咽喉部充血,舌质红,苔薄黄,脉弦数。给予甘露饮加减(干地黄15克、熟地黄12克、天门冬12克、麦门冬15克、黄芩15克、茵陈9克、枇杷叶9克、枳壳6克、石斛10克、黄连6克、桔梗6克、甘草9克)。每日一剂,煎水分三次内服。另用柳花散加煎水含漱。连用二日后,口腔溃疡点由原来16个减少至八个,颜色变浅,面积也明显缩小,诸恙亦愈。上方加生黄耆15克,继用五剂后治愈。随访一年未见复发。②胃脘痛《上海中医药杂志》(1985;11:27):李某某,男,31岁。上腹部于饭后隐隐灼痛反复发作三年余。症见纳差,口干多饮,大便干结。舌质红,少苔,脉弦细。诊断为慢性胃炎。证属胃阴不足,虚热内扰。用甘露饮去茵陈、枇杷叶,加入金铃子9克,延胡索9克,青木香9克,乌梅6克。连服七剂腹痛消失,食欲好转。后又减理气止痛之品,加入太子参18克,淮山药12克,鸡内金9克,连服30余剂,症状

消失。③阴虚盗汗 《上海中医药杂志》(1985; 11: 27): 魏某某, 女, 4岁, 患儿睡后汗出不止二年, 尤以夏天为甚。平素体弱, 口干喜饮, 纳差, 大便干结, 小便短急, 五心烦热。经用多法治疗无效。唇赤舌红, 无苔, 脉细数。X线胸透, 肺部正常。辨证为阴虚内扰, 心液不敛。用甘露饮去茵陈、枇杷叶, 余各味减量三分之一, 再加太子参12克, 五味子6克, 浮小麦6克。服三剂后好转。后又在此基础上减味, 并先后用白芍6克, 淮山药9克, 生牡蛎12克, 连服10余剂, 盗汗消失, 手足烦热好转, 五年未复发。④温热病《上海中医药杂志》(1985; 11: 27): 褚某某, 男, 35岁。因受凉后发烧五天, 体温达39.5℃, 微恶风寒, 伴有头痛, 咳嗽, 痰少黄稠, 口渴唇干, 喜冷饮, 三天无大便, 小便短赤, 舌质红, 苔薄白, 中间微黄, 脉滑数, X线胸透, 为左侧支气管炎, 辨证为外感风热, 邪传阳明。用甘露饮去茵陈, 枳壳, 加石膏30克, 大黄9克(后下), 银花9克, 连翘9克, 日服二剂, 每日四次。二天后体温下降, 大便通畅, 头痛减轻, 但仍有咳嗽, 低烧, 周身酸痛, 去上方加味之药合麻杏石甘汤及蔓荆子。日服一剂, 每日二次, 连服五剂, 症状消失。

20217 甘露饮子

《症因脉治》卷三。为原书同卷页“清肺饮”之异名。见该条。

20218 甘露神膏

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷九。

【组成】甘露(于草木上张布, 设法取之)一钟 蜂白蜜大半钟 人乳一钟 人参一二钱至四五钱(随症轻重, 煎汁一钟)

【用法】四汁并作一处, 重汤炼浓, 温和, 日服。

【主治】一切燥热咳嗽, 吐血, 干癆。

20219 甘风丹荆汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】丹皮一两 防风五分 荆芥五分

甘菊花五钱

【用法】水煎服。

【主治】目痛之后, 眼角刺触, 羞明喜暗。

20220 甘芍附子汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】甘草 白芍 附子

【主治】汗出过多, 阳虚营竭。

20221 甘麦大枣汤

《金匱》卷下。为原书同卷“甘草小麦大枣汤”之异名。见该条。

20222 甘豆竹叶汤

【方源】《女科秘旨》卷二。

【组成】甘草 黑豆 淡竹叶各等分

【用法】煎浓汁服。

【主治】误服毒药, 伤胎欲堕。

20223 甘连大黄丸

《家塾方》。为原书“林钟丸”之异名。见该条。

20224 甘羌麻附饮

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】甘草 天麻 荆芥 羌活 防风 薄荷 黄芩 麻黄 全蝎 僵蚕 白芷 竹节附 细辛

【用法】水煎服。

【主治】头痛, 风寒痰湿侵入三阳者。

20225 甘草干姜汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】干姜甘草汤(《外台》卷六引《备急》)、复阴汤(《鸡峰》卷五)。

【组成】甘草四两(炙) 干姜二两

【用法】以水三升, 煮取一升五合。去滓, 分温再服。

【功用】复阳气。

【主治】脾胃阳虚, 手足不温, 口不渴, 烦躁吐逆; 老年虚弱尿频, 下半身常冷, 咳唾痰稀, 眩晕短气, 脉沉无力。现用于胃脘痛、吐酸、肠鸣腹泄、胸背彻痛、眩晕、喘咳、经期腹痛属寒证者。

①《伤寒论》: 伤寒脉浮, 自汗出, 小便数, 心烦, 微恶寒, 脚挛急, 反与桂枝, 欲攻其

表,此误也,得之使厥,咽中干,烦躁吐逆者。②《金匱》:肺痿,吐涎沫而不咳者,其人不渴,必遗尿,小便数。所以然者,以上虚不能制下故也。此为肺中冷,必眩,多涎唾。③《外台》引《备急》:吐逆水米不下。④《类聚方广义》老人小便频数,吐涎,短气眩暈,难以起步者。

【宜忌】《外台》引《备急》:忌海藻、菰菜。

【方论选录】①《内台方议》:脉浮,自汗出,恶寒者,为中风。今此又兼小便数者,心烦脚挛急,为阴阳之气虚,不可发汗。反与桂枝汤误汗之,得之便厥,咽中干,烦躁上逆也,此乃不可汗而误攻其表,营卫之气虚伤所致也。故与甘草为君,干姜为臣,二者之辛甘,合之以复阳气也。②《寒温条辨》:此即四逆汤去附也。辛甘合用,专复胸中之阳气,其夹食夹阴,面赤足冷,发热喘嗽,腹痛便滑,内外合邪,难于发散,或寒冷伤胃,不便参术者,并宜服之,真胃虚挟寒之圣剂也。③《伤寒今释》:干姜与附子,俱为纯阳大热之药,俱能振起机能之衰减。惟附子之效,偏于全身;干姜之效,限于局部。其主效在温运消化器官,而兼于肺,故肺寒、胃寒、肠寒者,用干姜;心脏衰弱,细胞之生活力减退者,用附子。吉益氏《药徵》谓附子逐水,干姜主结滞水毒。盖心脏衰弱者,往往引起郁血性水肿,其舌淡胖,如经水浸,用姜附以强心,则水肿自退,非姜附能逐水也。

【临证举例】①伤寒《名医类案》卷一:吕沧州治一妇伤寒,乃阴间阳,面赤,足蹇而下痢,躁扰不得眠。论者有主寒、主温之不一,不能决。吕以紫雪、金匱理中丸进,徐以冰渍甘草干姜汤饮之,愈。且告之曰:下痢足蹇,四逆证也,苟用常法,则上焦之热弥甚,今以紫雪折之,徐以甘辛以温里,此热因寒用也。众皆叹服。②寒证《中医杂志》(1965;11:6):本方治疗34例寒证(胃脘痛8例,吐酸2例,脘腹胀2例,肠鸣腹泻1例,胸痛2例,眩暈13例,咳嗽2例,

经来腹痛4例),均取效。认为中医所称寒证,实际上包含副交感神经过度兴奋的病理生理现象;认为干姜辛辣,服后刺激口腔粘膜,可能引起反射性交感神经兴奋而起对抗副交感神经作用;甘草则对胃平滑肌有一定解痉作用,因而取效。③眩暈 《新中医》(1983;10:20):何某某,男,80岁,农民。素患慢性支气管炎,年老体弱,卧床已半年,近出现头晕耳鸣,如坐舟车之中,觉物旋转,耳鸣如潮水,不能起床,不敢张目,同时伴咳嗽气急,咳唾涎沫和胸闷不适感。听诊右中下肺野有散在中小水泡音,曾用四环素、磺胺嘧啶、麻杏止咳糖浆等消炎止咳药无效;又用天麻钩藤饮、百合固金汤等加减方亦无效。眩暈日见加重,咳唾涎沫不止,思热饮,不欲食。面色萎黄,舌苔薄白,脉沉细。拟诊眩暈病,肺中虚冷,水气不化,清阳不升,浊阴不降。处方:炙甘草15克,炮姜12克,三剂。服一剂后,眩暈锐减,咳唾涎沫好转,服完二剂,能起床活动,三剂眩暈除,诸症基本消失,精神大振。④遗尿 《广东中医》(1962;9:13):刘某,30岁,小学教师。患遗尿证甚久,日则间有遗出,夜则数遗无间,良以为苦。医咸以为肾气虚损。诊其脉,右部寸关皆弱,舌白润无苔,口淡,不咳,唾涎,口纳略减。小便清长而不时遗,夜为甚,大便溏薄,审系肾脾肺三脏之病。但补肾温脾之药,服之屡矣,所未服者唯肺耳。景岳云:“小水虽利于肾,而肾上连肺,若肺气无权,则肾水终不能摄,故治水者必先治气,治肾者必先治肺”。本证病缘于肾,因知有温肺化水之治法。又甘草干姜汤证原有治遗尿之说。遂疏方:炙甘草八钱,干姜(炮透)三钱,一日二帖。三日后,尿遗大减,涎沫亦稀,再服五日而诸症尽除。

20226 甘草干姜汤

【方源】《直指》卷二十六。

【异名】二神汤(《朱氏集验方》卷七)。

【组成】甘草(炙) 川白姜(炮)各等分

【用法】上锉散。每服三钱，食前煎服。

【主治】男女诸虚出血，胃寒不能引气归原，无以收约其血。

20227 甘草干姜汤

【方源】《疟气证治论》

【组成】甘草 干姜各五分 蜀椒 附子各三分

【用法】水煎服。

【主治】诸疟泄利者。

20228 甘草大豆汤

【方源】《外科精义》卷下引《圣惠》。

【异名】大豆甘草汤（《金鉴》卷六十九）。

【组成】甘草三两 赤皮葱三茎 大豆一合

【用法】用水三升，煮豆熟为度。用槐条一握同煮，取清汁热淋浴，冷即再温。浸三二时为度。

【主治】外阴蚀，下疳，疮疮肿痛。

20229 甘草大枣汤

《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。为《伤寒论》“茯苓桂枝甘草大枣汤”之异名。见该条。

20230 甘草乌梅丸

《鸡峰》卷十四。为《肘后方》卷三“乌梅丸”之异名。见该条。

20231 甘草石膏汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】生地黄 细辛各一分 熟地黄 黄连各三分 甘草五分 石膏六分 柴胡七分 黄柏 知母 当归身 桃仁（炒，去皮尖） 荆芥穗 防风各一钱 升麻一钱五分 红花少许 杏仁六个 小椒二个

【用法】上锉，如麻豆大。都作服，水二盏，煎至一盏，食后温服。

【主治】渴病久愈，又添舌白滑微肿，咽喉咽津觉痛，啞肿时时有，渴喜冷饮，口中白沫如胶。

20232 甘草归地汤

【方源】《四圣悬枢》卷三。

【组成】甘草（生）一钱 当归一钱 生地

一钱 芍药二钱 桔梗二钱 玄参二钱 丹皮二钱 黄芩一钱

【用法】流水煎半杯，温服。

【主治】痢脓者。

20233 甘草归蜡膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】甘草二两 当归 蜂蜡各一两 香油四两

【用法】涂于纱布上再外敷，或做成油纱条高压灭菌备用。

【功用】祛脓长肉，和血生肌，收干固皮。

【主治】疮疡久不敛口。

20234 甘草芍药汤

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷四〇八。

【组成】甘草 芍药 白薇 黄芩 黄连 黄柏 苦参各半两

【用法】上为末。以蜜和敷之，日二夜一；亦可作汤洗之。

【主治】小儿火灼疮，一身尽如麻豆，或有脓汁，乍痛乍痒。

20235 甘草芍药汤

【方源】《千金翼》卷八。

【组成】甘草（炙） 芍药 当归 人参 白术各一两 橘皮一把 大黄半两

【用法】上咬咀。以水四升，煮取二升，分再服，相去一炊顷。

【主治】妇人产后崩中去血，逆气满心胸，生疮，烦热。

20236 甘草芍药汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】甘草 芍药 生地黄 川芎各一两

【用法】上咬咀。每服一两，水三盏，煎一盏半，去滓，入棕榈灰五钱，调匀温服。不止者，刺隐白。

【主治】妇人伤寒，太阳标病，汗解表除，邪热内攻，入血室，经水过多，无满实者。

20237 甘草芍药汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】甘草 砂仁 陈皮 山楂 白芍(炒)

【用法】水煎服。

【主治】痘出时，肚腹胀痛。

20238 甘草防风汤

《麻科活人》卷四。为《小儿痘疹方论》“桔梗甘草防风汤”之异名。见该条。

20239 甘草附子汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】四物附子汤（《外台》卷十九引《深师方》）、附子汤（《外台》卷十九引《古今录验》）、白术附子汤（《外台》卷十五引《近效方》）、桂枝附子汤（《三因》卷五）、桂枝甘草附子汤（《类聚方》）。

【组成】甘草二两（炙） 附子二枚（炮，去皮，破） 白术二两 桂枝四两（去皮）

【用法】以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，一日三次。初服得微汗则解，能食汗止；复烦者，将服五合；恐一升多者，宜服六七合为妙。

【功用】《外台》引《近效》：暖肌补中，益精气。

【主治】①《伤寒论》：风湿相搏，骨节疼痛，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者。②《外台》引《近效方》：风虚头重眩，苦极不知食味。

【宜忌】《外台》引《近效》：忌海藻、菰菜、猪肉、生葱、桃、李、雀肉等。

【方论选录】①《内台方议》：风则卫伤，湿流关节，风湿相搏，两邪乱经，故骨节疼痛，掣痛不得屈伸，近之则痛剧。风胜则卫气不固，汗出短气，恶风不欲去衣，为风在表也。湿胜则水气不行，小便不利，或身微肿，为湿气内搏也。故用附子为君，除湿祛风，温经散寒；桂枝为臣，祛风固卫；白术去湿为使；甘草为佐，而辅诸药。疏风去寒湿之方也。②《医方考》：风湿相搏，故骨节疼痛；伤风则恶风，故不欲去衣；小便不利，而大便燥者，为热；今小便不利而大便反快，则

湿可知矣。附子之热，可以散寒湿；桂枝之辛，可去解风湿；甘草健脾，则湿不生；白术燥脾，则湿有制。是方也，以桂、附之辛热而治湿，犹之淖潦之地，得太阳暴之，不终朝而湿去，亦治湿之一道也。③《金匱玉函经二注》周扬俊：汗出短气，恶风不欲去衣，邪风袭入而中，卫之正气俱虚也；小便不利，身微肿者，中外为湿所持，而膀胱之化不行也，安得不以甘、术和中，桂、附去邪耶？然此症较前条更重，且里已受伤，曷为反减去附子耶？此条风湿半入里，入里者妙在缓攻，仲景正恐附子多则性猛且急，骨节之窍未必骤开，风湿之邪岂能托出？徒使汗大出而邪不尽尔。君甘草者，欲其缓也，和中之力短，恋药之用长也。此仲景所以前条用附子三枚者，分三服，此条止二枚者。初服五合，恐一升为多，宜服六七合，全是不欲尽剂之意。④《古方选注》：甘草附子汤，两表两里之偶方，风淫于表，湿流关节，阳衰阴盛，治宜两顾。白术、附子顾里胜湿，桂枝、甘草顾表化风，独以甘草冠其名者，病深关节，义在缓而行之，徐徐解救也。

【临证举例】①风湿痛《外台》引《古今录验》：驃骑使吴潜，以建元元年八月二十六日始觉如风，至七日，卒起便顿倒，髀及手皆不随，通引腰背疼痛，通身肿，心多满。至九月四日服此汤一剂，通身流汗，即从来所患悉愈。《谢映庐医案》高汉章、得风湿病，遍身骨节疼痛，手不可触近，近之则痛甚，微汗自出，小水不利。当时初夏，自汉返舟求治，见其身面手足俱有微肿，且天气颇热，尚重裘不脱，脉象颇大，而气不相续。其戚友满座，问是何症？予曰：此风湿为病。巢曰：凡驱风利湿之药，服之多矣，不惟无益，而反增重。答曰：夫风本外邪，当从表治，但尊体表虚，何敢发汗；又湿本内邪，须从里治，而尊体里虚，岂敢利水乎？当遵仲景法处甘草附子汤。一剂如神，服之三剂，诸款悉愈。②寒痹《上海中医药杂志》（1965；6；

26):单用本方治疗寒痹2例,西医诊断为慢性腰骶关节炎继发坐骨神经痛。其中一例已有十余年病史。均获治愈。作者认为,凡属风湿寒痹,即使没有汗出恶风、短气、小便不利等症,用本方亦可取效。③风湿性心脏病《河北中医》(1986;6:45):某女,45岁。素患风湿性心脏病、心悸短气、汗出恶风、关节冷痛、痛有定处、下肢浮肿、小便不利、舌淡苔白,脉沉弦。此为风湿相搏,日久不愈,邪从寒化。治宜温脾化湿散寒为主,佐以强心通阳。炙甘草15克、炮附子10克、白术10克、桂枝5克、茯苓15克。煎服。一个月后,心悸短气较前减轻,关节已不疼痛,下肢浮肿消失,小便正常。

20240 甘草附子汤

【方源】《普济方》卷一四〇引《指南方》。

【组成】甘草一两 附子一两(炮,去皮脐) 桂四两(去皮)

【用法】上为粗末。每服五钱,水二盏,煎一盏,去滓服。

【主治】伤寒虚汗不止。

20241 甘草附子汤

【方源】《金生指迷方》卷二。

【组成】甘草(炙)二两 附子(炮,去皮脐)一两

【用法】上为散。每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】风湿,掣痛不得屈伸者。

20242 甘草青盐丸

【方源】《医学从众录》卷二。

【组成】甘草一斤 青盐四两

【用法】将甘草研细末,用滚水冲入青盐,将青盐水炼甘草末为丸,如梧桐子大。早晚服之。

【主治】大便下血。

20243 甘草泻心汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】甘草四两(炙) 黄芩三两 干姜三两 半夏半升(洗) 大枣十二枚(擘) 黄

连一两

【用法】以水一升,煮取六升,去滓,再煎取三升。温服一升,一日三次。

【功用】《方剂学》:益气和胃,消痞止呕。

【主治】伤寒痞证,胃气虚弱,腹中雷鸣,下利,水谷不化,心下痞硬而满,干呕心烦不得安;狐惑病。常用于急慢性胃肠炎、白塞氏综合症等。

①《伤寒论》:伤寒中风,医反下之,其人下利日数十行,谷不化,腹中雷鸣。心下痞硬而满,干呕心烦不得安。医见心下痞,谓病不尽,复下之,其痞益甚。此非结热,但以胃中虚,客气上逆,故使硬也。②《金匱》:狐惑之为病,状如伤寒,默默欲眠,目不得闭,卧起不安。蚀于喉为惑,蚀于阴为狐;不欲饮食,恶闻食臭,其面目乍赤、乍黑、乍白,蚀于上部则声哑。③《方函口诀》:产后口糜,泻。

【方论选录】①《古方选注》:甘草泻心,非泻结热,因胃虚不能调剂上下,致水寒上逆,火热不得下降,结为痞。故君以甘草、大枣和胃之阴,干姜、半夏启胃之阳,坐镇下焦客气,使不上逆;仍用芩、连,将已逆为痞之气轻轻泻却,而痞乃成泰矣。②《医宗金鉴》:方以甘草命名者,取和缓之意。用甘草、大枣之甘温,补中缓急,治痞之益甚;半夏之辛,破客气逆之上从;芩、连泻阳陷之痞热,干姜散阴凝之痞寒。缓急破逆,泻痞寒热,备乎其治矣。③《金匱要略释义》:湿热肝火生虫而为狐惑证,故宜清湿热,平肝火;由于虫交乱于胃中,又当保胃气,因人以胃气为本,故选用甘草泻心汤。君甘草以保胃气;连、芩泻心火,去湿热。虫疾之来也非一日,其脏必虚,卧起不安,知心神欠宁,故用人参补脏阴,安心神;大枣以和脾胃;用姜、夏者,虫得辛则伏也。

【临证举例】①急性胃肠炎《山东中医杂志》(1986;3:14):用本方不予加减,只按比例加重其剂量;甘草60克,干姜45克,大

枣 30 克(去核),黄连 15 克(捣),半夏 100 克,黄芩 45 克,共治疗 60 例急性胃肠炎。其中未经西药治疗者 49 例,经西医治疗无效者 11 例;病程最短者 4 小时,最长者 15 天。全部用本方治愈。其中服一剂而愈者 8 例,2 剂而愈者 23 例,3 剂而愈者 18 例,4 剂而愈者 8 例,5 剂而愈者 6 例。②狐惑 《赵锡武医疗经验》:郭某某,女,36 岁,口腔及外阴溃疡半年,在某医院确诊为口、眼、生殖器综合征,曾用激素治疗,效果不好。据其脉症,诊为狐惑病,采用甘草泻心汤加味,方用:生甘草 30 克,党参 18 克,生姜 6 克,干姜 3 克,半夏 12 克,黄连 6 克,黄芩 9 克,大枣 7 枚,生地 30 克,水煎服十二剂。另用生甘草 12 克,苦参 12 克,四剂煎水,外洗阴部。复诊时口腔及外阴溃疡已基本愈合。仍按前方再服十四剂,外洗方四剂,患者未再复诊。③慢性泄泻 《浙江中医药》(1979;8:297):刘某某,男,36 岁。1979 年 10 月 23 日初诊。四年前因伤食引起腹泻,治后获愈。但遇进食稍多或略进油腻即复发。发时脘腹胀闷,肠鸣漉漉,大便稀溏,挟有不消化物或粘液,日 2~3 次;并有心悸,失眠,眩晕,脉沉细,舌苔白而微腻,腹平软,脐周轻度压痛。予甘草泻心汤加白术、厚朴。服三剂,大便成形,纳增,睡眠转佳,尚有肠鸣,心悸。原方去厚朴加桂枝,续服六剂,大便正常。23 个月随访,未复发。使用此法治疗 22 例慢性泄泻,均获较好效果。其病程有自 5 个月~6 年,1~3 年为多,计 15 例。治后 18 例症状消失未再复发,2 例半年后出现反复,2 例无效。④胃虚便秘 《北京中医》(1984;1:36):郭某,女,21 岁。主诉:便坚难解,四五日一行,已五六年,每次均需用通便药,大便仍燥结如羊粪;心下痞塞不通,不知饥,不欲食,夜寐欠安,口不渴,小便正常;舌淡红,苔薄白根微黄,脉滑。遂投甘草泻心汤。炙甘草 12 克,半夏 10 克,干姜 5 克,川连 3 克(冲服),黄芩 10 克,党参 12 克,大枣

10 枚。五剂,水煎服。药后大便畅通,肠鸣增多。再予五剂,大便通畅,纳增,心下痞塞除,诸症悉愈。⑤白塞氏综合症 《中医杂志》(1963;11:9):作者根据该病以口腔溃疡、前阴或肛门溃疡、发冷发热、皮肤损害等主要症状,认为即是《金匱》狐惑病。用本方治疗 60 例,均有效。其加减为:不欲食,加佩兰;咽喉溃疡,加升麻、犀角;口渴,去半夏,加花粉;目赤,加赤芍、夜明砂;口鼻气热,加石膏,知母;胸肋满痛,加柴胡;湿偏盛者,加赤苓、木通;热偏盛者,以生姜易干姜;便秘,加酒制大黄;五心烦热,加胡黄连。同时用《金匱》苦参汤外洗,雄黄散烧熏肛门。⑥口腔糜烂 《浙江中医杂志》(1980;11~12:515):陈某某,男,48 岁,农民。口舌糜烂已 20 余天,尿赤,脉洪数,予导赤散 2 剂无效,大便三日未解,于原方加凉膈散 2 剂,大便解,口舌糜烂遂愈。半月后复发,症状较前为剧,舌红绛,边有脓疮,尿黄。先后用二冬甘露饮、六味地黄汤加肉桂均无效。出现满唇白腐,舌脓疮增多,不能食咸味,以食冷粥充饥,口内灼热干痛,喜用冷水漱口。于是因思日人《橘窗书影》所载口糜烂治验二则,认为本证属胃中不和所致,用甘草泻心汤。炙甘草 12 克,干姜 5 克,半夏、黄芩、党参各 9 克,川连 6 克,大枣 6 枚,2 剂。药后口内灼热糜烂减轻,已不须漱水,仍予原方 2 剂而愈。

【备考】《金匱》有人参三两。

20244 甘草泻心汤

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】甘草一两(炙微赤,锉) 黄芩半两 黄连半两(去须) 干姜半两(炮裂,锉) 半夏半两(汤洗七遍,去滑) 木通半两(锉)。

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加大枣二枚,煎至五分,去滓温服,一日三四次。

【主治】伤寒中风下之后,日数多,腹中雷

鸣,心下痞坚而满,干呕而烦,非是结热,是胃中虚气上逆。

20245 甘草泻心汤

《伤寒大白》卷三。即原书同卷“生姜半夏泻心汤”多加甘草。见该条。

20246 甘草茵陈汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】茵陈三钱 梔子三钱 大黄三钱 甘草二钱

【用法】水煎大半杯,热服。

【主治】阳黄属谷疸,腹满尿涩者。

20247 甘草莱菔丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】吴茱萸四两(以酒、醋各一升,浸一伏时,煮酒、醋令尽,焙干,再炒熟) 甘草一两 梔子弹子大一块(烧令通赤,以醋七遍淬) 干姜一两 缩砂仁一分 肉豆蔻五个(大者,和皮用)

【用法】上为细末。酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸至十五丸,烧生姜汤送下。

【主治】脏腑虚寒,脾胃怯弱,米谷不化,肠滑泻痢,心腹疼痛,腹胀肠鸣,饮食减少。

20248 甘草炮姜汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】炮姜一钱五分 炙草二钱 北味一钱

【用法】水煎服。

【主治】大吐大衄,外有寒冷之状者。

20249 甘草桔梗汤

《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》。为《伤寒论》“桔梗汤”之异名。见该条。

20250 甘草涂敷方

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】甘草(半生半熟) 矾石灰 人中白 密陀僧各半两

【用法】上为末。入童子小便半盏,以微灰火熬,用竹篦搅成膏。取涂疮上,一日三五次。

【主治】反花疮。

20251 甘草粉蜜汤

【方源】《金匱》卷中。

【组成】甘草二两 粉一两 蜜四两

【用法】上三味,以水三升,先煮甘草,取二升,去滓,纳粉、蜜,搅令匀,煎如薄粥。温服一升,愈即止。

【功用】《金匱要略释义》:安蛔止痛,解毒和胃。

【主治】蛔虫之为病,令人吐涎,心痛,发作有时,毒药不止。

【方论选录】①《金匱要略辑义》:案:粉,诸注以为铅粉;然古单称粉者,米粉也。而《千金》诸书,藉以治药毒,并不用铅粉。盖本方非杀虫之剂,乃不过用甘平安胃之品而使蛔安,应验之于患者,始知其妙而已。②《成方便读》:吐涎心痛,皆由虫食上膈,故俱作止有时。所谓蛔饱而静则不痛,蛔饥求食,扰乱胃中则痛而吐涎。毒药不止者,用毒药攻杀之品,而虫不去也。大抵虫之所食,亦有喜恶,故用正治之法而不去者,必用其所喜之味以诱之。甘草、白蜜之甘,而搅以白粉善杀虫者,诱之使食,待甘味既尽,毒性便发,虫患乃除,此医药之变诈也。③《金匱要略今释》:若用粉锡,则不当单称粉。且经文云“毒药不止”,示本方为平剂也。用粉锡杀虫,则仍是毒药矣!若用甘草粉,依桃花汤用赤石脂之例,当云甘草三两,二两锉,一两筛末。今直云甘草二两,粉一两,明非甘草粉也。若谓粉即粉草,将谓水即水银、豆即豆蔻乎?强辞甚矣!惟本方改用粉锡,亦可下蛔,改用草粉,亦可缓急迫,故尾台、雉间各以其试效云尔。

【临证举例】①蛔厥《湖北中医杂志》(1986;3:47):郭某某,8岁。因右上腹部阵发性绞痛三天,经用中西药物驱虫、止痛无效,其父送我处门诊。见其肢冷,腹痛,呕吐清水,痛时上腹部可摸到不规则包块,痛止时消散,诊为蛔厥证。遂投乌梅丸加减与服,次日其父谓服药后已下蛔虫,但腹痛不

止。诊之，肢冷已除，呕吐好转，但腹痛不止而包块已无。说明蛔得驱而腹痛不止，符合《金匱》甘草粉蜜汤之证。遂令买甘草一两煎水，加米粉、白蜜调匀，徐徐饮服。服两小时后，腹痛开始缓解，半天后停止。后用此法治愈多例。②妊娠合并胆道蛔虫症《新中医》(1984; 11: 44): 陈某某，27岁。因右上腹钻顶痛，频繁呕吐，吐蛔十余条，收入住院治疗。检查：体温36.8℃，脉搏96次/分，呼吸22次/分，血压90/60mmHg。呈痛苦病容，面部潮红，呻吟，精神差，眼睑下凹，口唇干燥，腹痛隆而软，剑突下压痛，宫底脐上二横指，胎心音140次/分，无宫缩及出血。诊断为：胆道蛔虫合并感染；轻度脱水；七月宫内孕。经中西医服镇痛、驱蛔两法治疗三天后，疼痛仍不止，阵痛频作，每痛则大汗淋漓，唇干喜饮，舌少津，不大便，尿少黄，神疲脉细，属气阴虚乏之症。用生甘草15克，蜂蜜12克，梗米粉10克，以生甘草煎汤，乘温冲粉、蜜顿服。二剂后诸症缓解，住院六天痊愈出院。足月后顺产一男婴。③十二指肠球部溃疡《浙江中医杂志》(1985; 8: 352): 郭某，男，40岁。上腹部持续隐痛、烧灼感已年余，多在夜间痛醒，进食后稍减；痛处喜温喜按，伴有泛酸，纳差，便溏，舌淡苔白，脉沉。西医诊断为十二指肠球部溃疡。证属脾胃气虚，治宜益气 and 胃止痛，用甘草粉蜜汤：炙甘草30克，梗米粉20克，蜂蜜6克，早晚饭前服。3剂后，疼痛及泛酸均减轻。服二月后，钡餐造影示龛影基本消失。

【备考】《成都中医学院学报》(1986; 1: 18)报道，四川省某县1970年7月发生一起应用甘草粉蜜汤集体驱蛔，因使用铅粉，致使接受该方的74人全部中毒，无一幸免。中毒者在服药时曾觉药有铅臭，数小时后心烦，轻微呕吐，胃中嘈杂不适。2~9天内先后不同程度出现头昏头痛，身软无力，懒言嗜睡，口臭流涎，口腔糜烂，食欲逐渐下降，胸腹

胀满，四肢及眼胞浮肿。部分病例在牙龈边缘可见蓝灰色铅线。中毒者初起面色灰白少华，大便秘结；3~5天后部分病人面色发黄，甚至全身发黄；大便由秘结转溏泻，小便深黄量少。舌质：中毒初中期淡红，苔白滑或厚腻；中后期有少数患者出现舌绛少苔；脉象多虚弦、滑数无力或见有濡弱之脉。经用昆布、海藻、金钱草、板蓝根等加减治疗，除1例死亡外，全部治愈。据此，作者认为原方“粉”，应为米粉。

20252 甘草黄芩汤

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】甘草二钱 黄芩二钱 茯苓三钱 半夏三钱 石膏三钱

【用法】煎半杯，热服。

【主治】湿热薰蒸，口气秽恶者。

20253 甘草营实汤

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】大黄 营实各大 白桃花 甘草各中

【用法】水煎服。

【主治】胃中支饮，腹中雷鸣，或吐黄水，郁热上攻眼目者。

20254 甘草麻桂汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】甘草 麻黄 桂枝

【主治】寒湿腹胀，身重身冷无汗。

20255 甘草麻黄汤

【方源】《金匱》卷中。

【异名】麻黄汤（《千金翼》卷十九）、麻黄甘草汤（《三因》卷十四）、二物汤（《普济方》卷三八六）、麻甘汤（《医学入门》卷七）、走马通圣散（《金匱要略今释》卷五引《秘传经验方》）。

【组成】甘草二两 麻黄四两

【用法】以水五升，先煮麻黄，去上沫，纳甘草，煮取三升，温服一升。重覆汗出，不汗再服。

【主治】里水，一身面目黄肿，其脉沉，小

便不利。

【宜忌】①《金匱》：慎风寒。②《外台》：忌海藻、菰菜。

20256 甘草黑豆汤

《医方集解》。为《医方考》卷五“甘草梢黑豆汤”之异名。见该条。

20257 甘草滑石散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】甘草 大黄 黄耆各半两 滑石一两 山梔子半两 乳香一钱 地椒半两

【用法】上为细末。每服一钱，食前乳香酒调下。未愈再服。

【功用】行下焦滞热。

【主治】阴中疼痛，小便难。

20258 甘草鼠粘汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】炒甘草二两 桔梗（米泔浸一夜，炒）一两 鼠粘根二两

【用法】上为末。每服二钱，水一钟半，加阿胶一钱煎服。

【主治】肺热，咽喉痛。

20259 甘姜苓术汤

《金匱》卷中。为原书同卷“甘草干姜茯苓白术汤”之异名。见该条。

20260 甘桔元射汤

【方源】《四圣悬枢》卷三。

【组成】甘草二钱 桔梗二钱 元参一钱 射干一钱

【用法】流水煎半杯，热服。

【主治】少阴咽痛者。

20261 甘桔牛蒡汤

【方源】《疹科正传》。

【组成】粘子 甘草 桔梗 玄参 连翘 黄芩 麦冬

【主治】咽痛失音。

20262 甘桔牛蒡汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】桔梗 甘草 牛蒡 连翘 玄参 川连 梔子 豆根 酒芩 射干

【主治】麻疹咽喉痛，毒火上升，火郁在肺。

20263 甘桔升麻汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】甘草五分 桔梗一钱 升麻七分 杏仁二钱五分 当归二钱五分 玄明粉三钱

【主治】疹后脱肛，由大肠积热，下攻脱肛，肿硬疼痛，或时下血，或粪细小，唇赤齿燥，其腹坚实，其脉洪数有力者。

20264 甘桔化毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷九。

【组成】甘草 桔梗 射干 连翘 大力子（炒）

【用法】水煎，加入竹沥服。

【主治】痘疮初起，失于调解，以致毒火熏蒸，喉舌生疮；又失于解毒，其疮稠密，饮水则呛，食谷则嘔，甚者失声；亦有先本无疮，因食辛热之物，或误投辛热之药，其后旋生是症者。

20265 甘桔化毒汤

【方源】《会约》卷二十。

【组成】甘草 桔梗 射干 黄连（酒炒）牛蒡子（炒）各钱半

【用法】水煎，入竹沥服。

【主治】痘灌脓之时，喉肿生疮。

20266 甘桔玄参汤

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】甘草 桔梗 玄参 黄芩 贝母 天花粉 枳壳 生地各等分

【用法】水煎服。

【主治】鼻渊。

20267 甘桔防风汤

《明医杂著》卷六。为《小儿痘疹方论》“桔梗甘草防风汤”之异名。见该条。

20268 甘桔防风汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】甘草 桔梗 防风 薄荷 荆芥 牛蒡 射干 玄参 连翘 黄芩 银花

【主治】疹后余毒不散，结于咽喉，破烂肿痛者。

20269 甘桔泻肺汤

【方源】《疹科正传》。

【组成】石膏 知母 麦冬 粘子 橘红 桔梗 甘草 薄荷

【主治】疹出未透，咳嗽气喘促，面目浮肿，毒火不能外达内熏。

【加减】气急加苏子、枇杷叶。

20270 甘桔柴芩汤

【方源】《四圣悬枢》卷三。

【组成】甘草一钱(生) 桔梗二钱 柴胡一钱 黄芩一钱

【用法】流水煎半杯，温服。

【主治】咽痛。

【加减】风盛咽燥，加生地、白芍。

20271 甘桔射干汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】桔梗二钱 甘草 射干 连翘 豆根 牛蒡 玄参 荆芥 防风各一钱

【用法】加竹叶，水煎服。

【主治】咽痛不肿。

20272 甘桔消痰饮

【方源】《外科十三方考》卷下。

【组成】桔梗 豆根各一钱 梔子 连翘 防风 薄荷 甘草各五分 黄连七分 大力子一钱 赤芍 白芷 川芎各五分 玄参 麦冬各七分 淡竹叶五分

【用法】水煎服。

【主治】暗门疳症。此病生于喉咙小舌之上，左右各有一个肉球，塞住喉咙，致水米不下，眼多有脓，形如烂冬瓜状。

20273 甘桔清金散

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【组成】桔梗一两 甘草五钱 牛蒡子(炒)七钱 连翘(去心)五钱 诃子皮五钱

【用法】上为细末。每服一钱，加薄荷叶少许，同煎服。

【主治】①《痘疹心法》：肺热，声不清响者。②《景岳全书》：肺热咽痛。

20274 甘桔散痰汤

【方源】《简明医彙》卷八。

【组成】甘草 桔梗 枳壳 羌活 川芎 芍药 前胡 大腹皮 紫苏 黄芩 柴胡各

等分

【用法】水煎服。

【主治】癰痈，先从喉下起。

20275 甘桔黑豆汤

【方源】《证因方论集要》卷一。

【组成】甘草 桔梗 黑豆

【功用】解毒开提。

【主治】肺痈初发。

【方论选录】甘草和中解毒，黑豆散热解毒，桔梗开提肺气，初发用之，毒自解散。

20276 甘家松脂膏

【方源】《肘后方》卷五。

【异名】松脂膏(《圣惠》卷三十六)。

【组成】松脂 白胶香 薰陆香各一两 当归 蜡各一两半 甘草一两(并切) 猪脂 羊肾脂各半合许 生地黄汁半合

【用法】以松脂等末纳脂膏、地黄汁中，微火煎令黄，下蜡，绞去滓。涂布贴疮。

【功用】咽喉，不痴无瘢。

【主治】①《肘后方》：热疮。②《普济方》：脾肾热毒，唇上生结核，肿痛。

20277 甘菊花饮子

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】甘菊花一分 石膏一两(捣碎) 葛根半两(锉) 薄荷一握(切) 生姜一分(拍碎) 葱白一握(切) 豉一合

【用法】以水二大盏，煎至一盏，去滓，分温二服，不拘时候。

【主治】妇人头痛目眩，心神烦渴。

20278 甘菊荆芥汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【异名】甘菊花荆芥汤(《御药院方》卷一)。

【组成】甘菊(择) 防风(去叉) 旋覆花 芎藭各半两 皂荚(酥炙，去皮子) 石膏(碎)各一两 枳壳(去瓢，麸炒) 甘草(炙) 荆芥穗各三分

【用法】上为粗末。每服三钱七，水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓，食后热服。

【主治】风痰头痛，咽膈壅闷。

20279 甘寒补气汤

【方源】《法律》卷二。

【组成】人参一钱 麦冬一钱 黄耆(蜜炙)一钱二分 白芍一钱(酒炒) 甘草(炙)七分 生地黄二钱 牡丹皮八分 淡竹叶(鲜者，取汁少许，更妙干者)七分

【用法】用水二大盏，煎至一盏，加梨汁少许热服。无梨汁，用竹沥可代。

【主治】中寒服药后，诸证尽除，但经络间微有室塞，辛温药服之，不能通快者。

20280 甘遂半夏汤

【方源】《金匱》卷中。

【组成】甘遂(大者)三枚 半夏十二枚(以水一升，煮取半升，去滓) 芍药五枚 甘草如指大一枚(炙)

【用法】以水二升，煮取半升，去滓，以蜜半升和药汁，煎取八合，顿服之。

【功用】《张氏医通》：渌痰逐饮。

【主治】①《金匱》：痰饮，病者脉伏，其人欲自利，利反快，虽利心下续坚满，此为留饮欲去故也。②《类聚方广义》：饮家心下满痛，欲呕吐，或胸腹挛痛者。

【方论选录】①《金匱要略直解》：留者行之，用甘遂以决水饮；结者散之，用半夏以散痰饮。甘遂之性直达，恐其过于行水，缓以甘草、白蜜之甘，收以芍药之酸，虽甘草、甘遂相反，而实有以相使，此酸收甘缓，约之之法也。《灵枢经》曰：约方犹约囊，其斯之谓欤！②《古方选注》：甘遂反甘草。反者，此欲下而彼欲上也。乃以白芍约之，白蜜润之，则虽反而甘遂仍得下渗。《灵枢》有言：约方约囊是也。甘遂、半夏逐留饮潴漫于肠胃之间，虽利而续坚满，苟非以甘草、白蜜与甘遂大相反者激而行之，焉能去其留着之根。相反为方，全赖芍药酸可胜甘，约以监反，庶不溷乱中焦而有害。③《金匱要略心典》：脉伏者，有留饮也。其人欲自利，利反快者，所留之饮从利而减也。虽利，心下坚

满者，未尽之饮，复注心下也。然虽未尽而有欲去之热，故以甘遂、半夏因其势而导之。甘草与甘遂相反，而同用之者，盖欲其一战而留饮尽去，因相激而相成也。芍药、白蜜，不特安中，抑缓药毒耳。

【临证举例】①留饮《续名医类案》：吴孚先治西商王某，气体甚厚，病留饮，得利反快，心下积坚满，鼻色鲜明，脉沉。此留饮欲去而不能尽去也，用甘遂、半夏、白芍，加白蜜五匙顿服，前症悉痊。或问：甘遂与甘草其性相反，用之无害而反奏效，何也？曰：正取其性之相反，使自相攻击，以成疏瀹决排之功。②肺心病腹水《四川中医》(1984；1：25)：徐某某，女，46岁。患肺原性心脏病伴腹水已年余。用强心利尿剂后，病反加剧。症见胸满腹胀，四肢水肿，喉间痰鸣，心悸而烦不得卧，气短欲绝，面色晦暗，唇周发绀，二便不通，不食不饥，口不渴，舌胖淡，苔润，脉弦而结代。证属脾肾两虚，痰饮内阻，元气欲脱。拟甘遂半夏汤化裁：人参15克，甘草3克煎汤，送服甘遂蜜丸(即本方)3克。服后四小时下大便三次，先下黑粒状，继下浆糊样便，小便亦通，胸满肢肿，痰鸣等症均已见轻，呼吸好转，颜面转微白，唇周淡红，胃纳好转。翌日，投木香12克，人参15克，甘草3克煎汤吞服甘遂蜜丸3克。服后二便畅通，继以八味丸固本，经治月余，诸症消失，至今六年，未复发。③腹壁脂肪增多症《江西中医药》(1982；3：45)：蒋某某，女，32岁。患者腹部逐渐增大已四月，经中西药治疗无效而转外地某医院。诊时见：腹部膨隆，大如妊娠八个月，按之松软如棉絮，自觉胀闷不舒，沉重乏力，神疲嗜睡，纳减便溏，经闭三月，白带量多，质清稀而有腥味，小便清长，舌淡苔白腻，脉沉滑。证属脾虚失运，痰湿内停。治以健脾涤痰，方用甘遂半夏汤加减。甘遂9克，半夏9克，白芍9克，炙甘草9克，白术12克，茯苓18克。三剂。药后腹胀大为减轻，精神

转佳,食纳增加,白带减少,惟大便溏泻反剧,泻下之物粘腻如鱼冻,余无不适。原方继进三剂,腹胀大已减三分之二,余症俱觉好转,大便仍间有粘腻物,脉沉滑,原方再进三剂。两年后,患者至某医院分娩遇见,谓药后健如常人,腹大全消,带止经行,尔后怀孕。

【现代研究】利尿作用《经方研究》:李春响等实验报告,用本方100%水提取液进行家兔利尿作用的实验,每公斤体重给药1毫升,药后30分钟时5分钟内尿液,与药前5分钟内的尿液比较无明显增加,但1小时后五分钟内尿量与药前五分钟内尿量比较,有显著增加。

20281 甘遂破结散

《婴童百问》卷五。为《圣惠》卷八十八“甘遂散”之异名。见该条。

20282 甘遂通结汤

【方源】《中西医结合治疗急腹症》。

【组成】甘遂末0.6~1克(冲服) 桃仁 木香 生牛膝各9克 川朴 赤芍各15克 大黄10~24克

【功用】行气活血,逐水通下。

【主治】肠梗阻较重,腹胀疼痛,恶心呕吐,大便秘结,肠腔积液较多者。

【宜忌】本方药性峻烈,非体壮邪实者禁用。

20283 甘遂麻黄散

【方源】方出《圣惠》卷五十四,名见《普济方》卷一九三。

【组成】甘遂一两(煨令微黄) 麻黄一两(去根节) 桑根白皮一两半(锉)

【用法】上为细散。每服二钱,煮赤小豆汁调下,一日二次以利为度。

【主治】卒身面浮肿,喘息气促,小便赤涩。

20284 甘遂槟榔散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】甘遂 青皮(去白) 陈皮(去白) 槟榔一钱(生用)

【用法】上为末。紫苏木瓜汤点下;脚肿,木瓜汤下。

【主治】小儿积水、疳水。

【宜忌】忌服甘草药。

20285 甘露内消丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十引《应验方》。

【组成】薄荷叶一两 川芎二钱 桔梗(去芦头)三钱 甘草一钱 人参 诃子各半钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如皂角子大,朱砂为衣。每服一丸,噙化下,不拘时候。

【主治】咽喉肿痛不利,咽干痛,上焦壅滞,口舌生疮。

20286 甘露回天汤

【方源】《寿世保元》卷八。

【异名】甘露回天饮(《痘疹活幼至宝》卷终)、回天甘露饮(《顾氏医径》卷五)。

【组成】沙糖半酒杯

【用法】百沸汤调一大碗,温服。

【主治】痘疮十一二日,当靨不靨,发热蒸蒸者。

20287 甘露回天饮

《痘疹活幼至宝》卷终。为《寿世保元》卷八“甘露回天汤”之异名。见该条。

20288 甘露消毒丸

《中药制剂手册》。为《医效秘传》卷一“甘露消毒丹”之异名。见该条。

20289 甘露消毒丹

【方源】《医效秘传》卷一。

【异名】普济解毒丹(《温热经纬》卷五)、普济解毒饮(《续名医类案》卷五)、甘露消毒丸(《中药制剂手册》)。

【组成】飞滑石十五两 淡芩十两 茵陈十一两 藿香四两 连翘四两 石菖蒲六两 白蔻四两 薄荷四两 木通五两 射干四两 川贝母五两

【用法】神曲糊为丸。

【功用】《方剂学》:利湿化浊,清热解毒。

【主治】①《医效秘传》:时毒疔气,病从湿化,发热目黄,胸满,丹疹,泄泻,其舌

或淡白，或舌心干焦，湿邪犹在气分者。②《温热经纬》：湿温疫疔，发热倦怠，胸闷腹胀，肢酸咽肿，斑疹身黄，颐肿口渴，溺赤便秘，吐泻痢疾，淋浊疮疡。并治水土不服诸病。

【方论选录】《方剂学》：本方主治乃湿温、时疫之邪留恋气分，湿热并重之证。湿热交蒸，故身热倦怠，肢体酸楚；湿蔽清阳，阻滞气机，故胸闷腹胀，甚或上吐下泻；热毒上壅，则咽颐肿痛；热为湿遏，郁阻于内，不得发越，故郁而发黄；小便短赤，舌苔黄腻，皆为湿热内蕴之象。治宜利湿化浊，清热解毒。故方中重用滑石、茵陈蒿、黄芩三药，其中滑石清利湿热而解暑；茵陈清热利湿而退黄；黄芩清热解毒而燥湿；余以石膏、白豆蔻、藿香、薄荷芳香化浊，行气悦脾；射干、贝母降肺气，利咽喉；木通助滑石、茵陈清利湿热；连翘协黄芩清热解毒。诸药相伍，重在清解渗利，兼事芳香行气，理肺利咽。如此则湿邪得利，毒热得清，悦脾泄肺，行气化浊，用治湿温时疫，湿热并重者，最为相宜。凡湿温、暑温挟湿、时疫及现代医学之肠伤寒、黄疸型传染性肝炎、胆囊炎、急性胃肠炎等属湿热并重者，皆可以本方加减治之。

【临证举例】①小儿急性传染性肝炎《上海中医杂志》(1965; 9: 27)：用本方治疗小儿急性传染性肝炎 26 例。男 17 例，女 9 例。年龄最小者 2 岁，最大者 10 岁。主要症状为黄疸、食欲不振、肝脾肿大等，结合肝功能试验，确诊为本病。用甘露消毒丹原生药粗末煎服，并口服葡萄糖、维生素 B₁、C 适量。服药后，黄疸指数 1 周内降至 6 单位以下者 5 例，2 周内降至正常者 15 例；谷丙转氨酶 2 周内降至正常者 15 例，3 周内降至正常者 9 例，5 周内降至正常者 2 例；肝肿大消退，于治疗 3 周后检查，平均缩小 1.4 厘米。26 例无一例死亡，均痊愈出院。②水肿《福建中医药》(1986; 1: 20)：郭某，男，5 岁。两

周前患猩红热，近周来复见肌热，浮肿尿少，血尿明显，如洗肉水样，时见呕吐，头晕，大便稀溏，食欲减退。脸色苍白，呈急性病容，下肢 I° 浮肿，按之不凹陷；心脏听诊，1~2 级收缩期杂音，心率：140 次/分，窦性心律，肝，剑突下一横指半，无压痛，质软，脾（一），血压 130/90mmHg，尿常规：蛋白（+++），红血球 10~15 个/mm³，颗粒管型 3~4 个/mm³，口唇红，舌质红，苔黄腻，脉弦滑数。证属湿毒邪交阻困脾，脾失健运，肺失宣肺，肾气开阖失司，湿浊上逆，形成水肿。治以清热解毒，宣肺利水，芳香化湿，并佐以凉血。方用甘露消毒丹加白茅根、夏枯草各 10 克。二剂后，尿量增加，头晕、呕吐好转，体温降至 38℃。再二剂，24 小时内排尿量达 2000~2500 毫升，诸症全消，继以原方加减治愈出院。半年后随访，未发。

【备考】《温热经纬》本方用法：生晒研末。每服三钱，开水调下；或神曲糊丸，如弹子大，开水化服。

20290 甘露解毒汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】猪苓 泽泻 麦冬 地骨 木通 黄芩 甘草 官桂 连翘

【用法】水煎服。

【主治】痘疹因夏月衣被太厚，热气熏蒸不能靨者。

20291 甘露解毒汤

【方源】《种痘新书》卷八。

【组成】白术 茯苓 猪苓 泽泻 木通 麦冬 地骨皮 连翘 官桂 香薷

【主治】痘疮，因夏月炎天，暑气熏蒸，不能靨者。

20292 甘草梢黑豆汤

【方源】《医方考》卷五。

【异名】甘草黑豆汤（《医方集解》）。

【组成】生甘草梢二两 黑豆半斤

【用法】水五倍，煎去半，空心服。

【功用】《医方集解》：解百药毒。

【主治】筋疝。

【方论选录】①《医方考》：筋疝者，茎筋掣痛，挺胀不堪也。子和云：此以邪术得之。邪术者，房术春方之故也。治宜解毒缓急，故用甘草梢、黑豆以主之。②《医方集解》：此足阳明药也。甘草和中以解毒，黑豆散热以解毒。若治筋疝，当用甘草梢，以梢能径达茎中也。

20293 甘桔加梔子汤

【方源】《医部全录》卷四九三。

【组成】桔梗 甘草 梔子各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疹烦不得眠。

20294 甘菊花荆芥汤

《御药院方》卷一。为《圣济总录》卷十六“甘菊荆芥汤”之异名。见该条。

20295 甘遂牵牛子丸

【方源】《名家方选》。

【组成】甘遂 牵牛子 大黄各等分

【用法】上为末，糊为丸，如梧桐子大。白汤送下。

【主治】上部郁热诸疾，齟齿者。

20296 甘草干姜人参汤

【方源】《脉因证治》卷三。

【组成】甘草四两 干姜二两 人参一两 大枣三个

【用法】水煎服。

【主治】肺痿。

20297 甘草小麦大枣汤

【方源】《金匱》卷下。

【异名】甘麦大枣汤（原书同卷）、大枣汤、麦甘大枣汤（《本事》卷十）、小麦汤（《三因》卷十八）、甘草汤（《妇人良方》卷十五引《专治妇人方》）、十枣汤（《万氏女科》卷二）、麦枣汤（《杏苑》卷八）、枣麦甘草汤（《会约》卷十四）、大枣甘草汤（《一见知医》卷四）。

【组成】甘草三两 小麦一升 大枣十枚

【用法】以水六升，煮取三升，分三服温服。

【功用】①《血证论》：养胃生津，化血润

躁。②《金匱要略讲义》：补益心脾，安神宁心。

【主治】脏躁。精神恍惚，常悲伤欲哭，不能自主，睡眠不安，甚则言行失常，呵欠频作，舌红少苔。现用于瘧病及神经衰弱属心脾两虚肝郁者。

①《金匱》：妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸。②《类聚方广义》：痢症狂症，因平素忧郁无聊，夜夜不眠，发则恶寒发热，战慄错语，心神恍惚，居不安席，酸泣不已者。③《方函口诀》：小儿啼泣不止者。

【方论选录】①《金匱要略论注》：小麦能和肝阴之客热而养心液，具有消烦利溲止汗之功，故以为君；甘草泻心火而和胃，故以为臣；大枣调胃，而利其上壅之燥，故以为佐。盖病本于血，心为血主，肝之子也，心火泻而土气和，则胃气下达；肺脏润，肝气调，燥止而病自除也；补脾气者，火为土之母，心得所养，则火能生土也。②《金匱要略心典》：五志生火，动必关心，脏阴既伤，穷必及肾也。小麦为肝之谷，而善养心气；甘草、大枣甘润生阴，所以滋脏器而止其躁也。③《血证论》：三药平和，养胃生津化血；津水血液，下达子宫，则脏不燥，而悲伤太息诸证自去。此与麦门冬汤滋胃阴以达胞宫之法相似，亦与妇人乳少催乳之法相似。乳多即是化血之本，知催乳法，则知此汤生津液润燥之法。

【临证举例】①脏躁（孙氏医案）：表嫂孀居二十年矣。右瘫不能举动，不出门者三年，今则神情恍惚，口乱语，常悲泣。询其故，答曰：自亦不知为何故也。诊之，两寸脉短涩，以石菖蒲、远志、当归、茯苓、人参、黄耆、白术、大附子、晚蚕沙、陈皮、粉草，服四帖，精神较好于前，但悲泣如旧，夜更泣。予思仲景大枣小麦汤，正与此对。即与服之，两帖而瘳。方用大枣十二枚，小麦一合，大甘草（炙过）三寸，水煎饮之。②妇女更年期症候群（福建中医药）（1960；10：17）：用

本方治疗 30 例, 显效者 22 例, 进步 4 例, 有效 4 例。方药为: 甘草 3~6 克, 小麦 30 克, 大枣 10 枚。有严重失眠及烦躁不安者, 则加酸枣仁或茯神。典型病例: 杨某某, 48 岁, 家庭妇女。心慌, 呼吸迫促、发喘, 发作性颜面发红, 发热, 有胸部阻塞感, 严重时或被窒息样, 伴有严重失眠, 已断续发作约一年。一年前月经不规则, 量时多时少。自此后上述症状依次发生, 尤以经期前后更为明显, 经医治无效。体型消瘦, 颜面潮红, 精神高度紧张, 呼吸及说话均表现极度不安, 迫促非常。心脏, 心律、心率正常, 肺部 (一), 腹部正常。血压 145/95mmHg。入院诊断: 更年期症候群。用苯巴比妥、三溴、卵巢素等无效。后改用中药甘麦大枣汤每日一剂, 服至三剂后, 症状基本消失, 能熟睡 6~7 小时, 并可自理生活, 服至十二剂后, 症状全消出院。③歇斯底里精神性发作《中医杂志》(1960, 2: 32): 本方治疗歇斯底里精神发作 25 例, 主要症状为: 神态恍惚, 无故悲伤, 哭泣叫嚷吵闹, 躁扰不宁, 夜卧不安等。治疗后均获痊愈。④癫痫小发作《浙江中医杂志》(1984; 3: 106): 赵某某, 男, 4 岁。半年来几乎每日频繁发作发愣, 咀嚼, 双手肌肉小抽搐等动作, 每次历时几十秒钟, 止后如常。诊断为癫痫小发作。用苯妥英钠后无明显好转。症见颈软, 精神不振, 问答稍迟缓, 舌质淡红, 苔薄白, 脉弦细。经用甘麦大枣汤加味, 五剂后, 病情基本停止, 再以本方合六君子汤调理获愈。

【现代研究】①镇静作用《国外医学·中医中药分册》(1983; 3: 53): 保田和美报道, 本方水提取物对环己烯巴比妥的睡眠时间稍有延长作用。在对大鼠自发运动量的实验中, 口饲至第三四天后, 可观察到运动量减少。②抑制平滑肌运动《国外医学·中医中药分册》(1983; 3: 53): 本方水提取物在 5×10^{-3} 克/毫升时能够抑制组织胺、乙酰胆碱所致的豚鼠回肠收缩; 2×10^{-3} 克/毫升时即可抑制

大鼠子宫收缩, 5×10^{-3} 克/毫升浓度时则能完全抑制。

20298 甘草知母鳖甲丸

【方源】《痰症论疏》。

【组成】甘草 (去头尾, 好酒浸, 蒸从巳至午, 取出晒干) 五钱 知母 (槐砧上锉碎, 入干木臼内捣烂) 一两 鳖甲 (取九肋者, 洗去皮肉, 醋醋煮透, 炙黄色) 一两 常山 (临用去苗, 用甘草末同水拌蒸, 取出, 好酒润一宿) 三两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十丸, 好酒送下, 未发、临发、正发各一服。

【主治】脾疟。

20299 甘草桔梗升麻汤

【方源】《云歧子保命集》卷下。

【组成】甘草半两 桔梗一两 升麻半两

【用法】上锉细。每服二钱, 水煎。

【主治】小儿斑出欲透, 皮肤身热, 咽喉不利。

20300 甘草桔梗射干汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】甘草二钱 (生) 桔梗三钱 半夏三钱 射干三钱

【用法】水煎半杯, 热漱, 徐服。

【主治】咽喉肿痛生疮。

20301 甘桔加阿胶紫菀汤

【方源】《医学纲目》卷十七。

【组成】甘草二两 桔梗一两 阿胶 紫菀

【用法】上咬咀。每服五钱, 水煎温服。

【主治】肺痿唾脓血。

20302 甘草干姜茯苓白术汤

【方源】《金匱》卷中。

【异名】甘姜苓术汤 (原书同卷), 甘草汤 (《外台》卷十七引《古今录验》)、肾着汤 (《千金》卷十九)、除湿汤 (《三因》卷九)、苓姜术甘汤 (《类聚方》)、茯苓干姜白术甘草汤 (《奇正方》)。

【组成】甘草 白术各二两 干姜 茯苓

各四两

【用法】以水五升，煮取三升，分温三服。腰中即温。

【功用】暖土胜湿。

①《金鉴》：补土制水，散寒渗湿。②《血证论》：和脾利水。③《谦斋医学讲稿》：温脾化湿。

【主治】肾着。寒湿下侵，身重，腰以下冷重而痛，饮食如故，口不渴，小便自利。

①《金匱》：肾着之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，饮食如故。病属下焦，身劳汗出，衣里冷湿，久久得之。腰以下冷痛，腰重如带五千钱。②《圣济总录》：胞痹，小便不利，鼻出清涕者。③《金匱要略讲义》：呕吐腹泻，妊娠下肢浮肿，或老年人小便失禁，男女遗尿，妇女年久腰冷带下等，属脾阳不足而有寒湿者。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菰菜、桃李、雀肉、酢物。

【方论选录】①《医方考》：肾着于湿，腰冷如冰，若有物者，此方主之。肾主水，脾主湿，湿胜则流，必归于坎者，势也，故曰肾着。腰为肾之府，湿为阴之气，故令腰冷如冰；若有物者，实邪着之也。干姜、辛热之物，辛得金之燥，热得阳之令，燥能胜湿，阳能曝湿，故象而用之；白术、甘草，甘温之品也，甘得土之味，温得土之气，土胜可以制湿，故用以佐之；白茯苓甘淡之品也，甘则益土以防水，淡则开其窍而利之，此围师必缺之义也。②《金匱要略心典》：其病不在肾之中脏，而在肾之外府，故其治法不在温肾以散寒，而在燥土以胜水。甘、姜、苓、术，辛温甘淡，本非肾药，名肾着者。原其病也。

【临证举例】①肾着 《广东中医》(1962; 7: 31): 杜某，女，52岁。腰痛，腰部重倦有冷痹感，两侧髋关节痛，行动拘急痛，俯仰困难，四肢倦怠无力已五月余，治疗无效。诊其脉沉迟，此肾着证也，肾虚而寒湿所侵，

腰受冷湿着而不去，治宜温通驱寒湿为治，拟用肾着汤。白术一两，云苓一两，干姜一两，炙甘草五钱，二剂，清水三钟，煎至一钟，温服。后以原方加桂枝尖、杜仲，共进八剂而愈。②半身出汗 《陕西中医》(1984; 3: 26): 本方治疗半身出汗12例，病程最长2.5年，最短半年；有布氏杆菌病史者2例，风心病史1例，非特异性结肠炎病史3例。病者皆有脾阳不足，寒湿内盛的症状，如汗出、身冷、畏寒等。结果治愈9例，好转3例。服药最少2剂，最多12剂。③滑精 《金匱要略今释》引《古方便览》：一士人，年七十三，平生小便频数，腰冷如坐水中，厚衣覆盖而坐，精液时泄不自禁，诸治并无效，如此已十余年矣。余诊之，心下悸，即与此方而痊愈。④带下 《浙江中医杂志》(1985; 4: 175): 丁某，女，44岁。带下年余，近半月来加重，色白清稀，绵绵不绝，少腹隐痛，头晕乏力，面色苍白，形寒肢冷，腰酸，舌胖苔白，脉小略滑。乃寒湿阻滞胞宫。药用茯苓、白术各30克，干姜、甘草各10克，苍术20克，煎服。四剂后，带下明显减少，腰痛、头晕明显好转。

【现代研究】对肠管的兴奋作用 《经方研究》：王培忠等报道，甘姜苓术汤的水煎液在小量时对家兔离体肠管有轻微的兴奋作用；加大剂量后，其兴奋作用未见明显加强。认为其水煎液兴奋肠管的作用与剂量关系不大。

东

20303 东山丸

【方源】《名家方选》。

【组成】大黄 轻粉各二钱 竹茹八钱 甘草五分 黄连三分 川芎五分 阿仙药三钱

【用法】上为末，糊为丸，辰砂为衣。

【主治】结毒，经年不愈者。

20304 东风散

【方源】《痢症纂要》卷十一。

【组成】苍术 地榆 当归 赤芍 黄芩 甘草 丹皮 红花 枳壳 槟榔 楂肉 厚朴 青皮各一钱

【用法】艾叶为引。

【主治】痢疾初起。

20305 东风散

【方源】《痢疾明辨》。

【组成】黄芩 槟榔 枳壳 山楂 青皮 川朴 当归 白芍 炙草

【主治】痢疾。

【加减】肢冷，加肉桂；热甚，加黄连，兼症，加柴胡；红痢，加桃仁，红花、地榆；白痢，加香附、陈皮。

20306 东瓜汤

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】东瓜皮

【用法】煎汤熏洗。

【主治】痔疮。

20307 东邻饮

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】人参 白术 陈皮 贝母 茯苓 桔梗 紫苏 黄芩 前胡 粉草 桑白皮各等分。

【用法】水煎，温服。

【主治】妊娠伤风咳嗽，腹中吊痛，痰壅喉音不清，头晕目眩。

20308 东矾散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生明矾 100 克 飞黄丹 10 克。

【用法】上为细末，取 25 克，用米醋 500 毫升，放入瓷面盆（切不可用铜、钢、无瓷面盆）。滚开后，放入药粉，用棍棒搅，即取下面盆，用纱布浸洗。

【主治】手癣。

20309 东封丹

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】皂角末 燕巢泥 干步土（即门限下土） 秽桶下土

【用法】葱白捣汁，和烧酒调各药，敷喉外肿处。

【主治】风火喉，痛而微痒，色鲜红，有表证者。

20310 东流饮

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】细茶一撮 生芝麻一撮 生桃仁七枚 大黄一钱或二三钱

【用法】用长流水生捣碎服。

【主治】大便热结闭塞。

20311 东篱散

【方源】《本草纲目》卷十五引《孙天仁集效方》。

【组成】野菊花一把（连茎捣烂）

【用法】酒煎，热服。取汗。取滓以敷之。

【主治】痈疽疔肿、一切无名肿毒。

20312 东瓜皮散

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】东瓜皮 牛皮胶各一两

【用法】二味入杓内，炒松，研末。每服五钱，热酒送下。被盖取汗，其痛即止，另服他药。

【功用】发汗。

【主治】跌打损伤。

【宜忌】如在危急，先服护心丸，后用此法。

20313 东华玉髓

【方源】《类证治裁》卷五。

【组成】大风子（研末，隔汤化油）四两 乳香 没药 血竭各二钱 牛黄一钱五分 麝香五分 阿胶一钱 琥珀 珍珠各三钱 雄黄五钱 地龙（炙）七钱 冰片三钱 芒消八分

【用法】大风油调药。每服一钱，酒下。

【主治】大麻风。

20314 东方一号膏

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】川茅术 黄柏 汉防己 宣木瓜 元胡索 郁金 生地榆各 30 克 白及 60 克（切片） 冰片（冷后加） 生石膏 炉甘石各 240 克（另配，以后煅过，研粉，用 100 目筛子筛过） 麻油二斤

【用法】（1）浸渍：将茅术，黄柏、防己、

木瓜、元胡、郁金、生地榆、白及浸于麻油内 24 小时。(2) 煎熬：将上述油及药物置盛器内（一般用铜锅，钢精锅亦可），置文火上煎约二小时至二小时半（200 毫升），至药材枯黄状，去药滓过滤（可用丝棉或铜筛滤）至除尽药滓为度。(3) 炼油：滤净油用火加热约二小时到二小时半，至油滴入水中能聚集成珠状。(4) 成膏：炼好之油，趁热加入煨石膏，炉甘石细粉（勿使结成块或沉于锅底），边加边搅拌，加完后继续加热保持微沸，此时上面应无浮油或仅极少量浮油，加热约二小时到二小时半，可取出少量放冷，如已成半固体膏状，即可停火。待膏冷却后，再加入冰片搅匀即成。(5) 将东方一号均匀涂布在半透明膏药纸上，剪成小块，贴于创面，外用纱布覆盖，隔日换药一次，以后可二、三天换一次。

【功用】清热消炎，润肤生肌，止痛。

【主治】疔疮、痈疽、无名肿毒。

20315 东方甲乙丹

【方源】《千金珍秘方选》。

【异名】青龙丹。

【组成】灯草炭五钱 青黛三钱 犀黄一钱二分 硼砂二钱 珠粉（生研）三分 人中白三钱 冰片五厘 儿茶五分 道地紫雪丹五分 风化消二钱

【用法】上为末，和匀吹入。

【主治】喉症，口疳，重舌。

【加减】如喉症初起，并不腐烂，但形红肿。去犀黄、珠粉，加薄荷五分，蒲黄（生用）三分。

20316 东华解毒膏

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】五枝膏（桃枝、柳枝、槐枝、桑枝，俱用嫩枝，榆皮、地骨皮各五升，以长流水一担，熬至五分，去滓，加当归末四两，慢火熬成膏，滴水成珠，听用） 沥青（净）一斤 松香（净）半斤 乳香一两（另研） 没药一两（另研） 轻粉二钱（另研） 铜青

二两（另研） 黄蜡二两 血竭二钱（另研） 麝香一钱（另研） 安息香五钱 黄丹一两（水飞研细）

【用法】用川芎、大黄、红花、白芷各二两，入麻油熬黑色，去滓，春、夏用油四两，秋、冬用油六两，如法煎至滴水不散；次下沥青、松香、黄蜡化开；下五枝膏二两，以槐枝搅百余遍；下乳香、没药、血竭、轻粉、安息香、黄丹，再搅百余遍；下麝香、铜青，再搅百余遍，滴水面浮似青荷叶为度，拔扯二百余遍，浸一日取起，收贮。如贴疮毒，用槐枝、葱白煎汤，洗过，用绢唾津摊贴，三五日一换。

【主治】无名肿毒，诸般恶毒疮疖，痈疽发背，痘毒风毒。

20317 东实西虚泻南补北汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【异名】泻阳补阴汤（《东医宝鉴·杂病篇》卷四）。

【组成】黄连（淡姜汁炒）四两 黄柏（盐水炒）六两 枯芩（生用）二两 知母（去毛）三两 贝母（去心）四两 桔梗二两 杏仁（去皮尖）三两半 五味子（盐水炒）三两 紫苑（去土）二两半（用沉香煎水浸晒） 当归（童便浸）二两 赤芍药二两半 生地黄（酒洗）三两 天门冬（汤泡去心）四两 天花粉二两 白术（麸炒）一两半 白茯苓二两

【用法】上锉。每服八钱，乌梅一个，灯心三分，水煎，温服。

【主治】酒色过度，妄泄真阴，阴虚火动，火旺痰多，发热咳嗽，咯血吐血。

【加减】吐衄盛，加茜根、大小蓟、藕节、白茅根、侧柏叶、京墨；痰盛，加半夏、前胡、竹沥、荆沥；喘急，加瓜蒌仁、石膏、葶苈、桑白皮、紫苏子、沉香、枇杷叶；热甚，加柴胡、地骨皮、连翘、银柴胡；风盛，加防风、荆芥穗、酸枣仁、薄荷、甘菊花、旋覆花；寒盛，加人参、黄耆、桂枝；心下怔

仲惊悸，加茯神、远志、柏子仁、酸枣仁；肋下气膨，加枳壳、青皮、白芥子；淋浊，加猪苓、泽泻、木通、车前子；小便涩，加木通、石韦、滑石、海金沙。遗精，加牡蛎、莲子肉；盗汗，加黄耆、牡蛎、麻黄根、浮小麦；热燥，加滑石、石膏、火麻仁、山栀子。

【方论选录】黄连泻南方火，宽心下痞满，止呕吐之要药也；黄柏补北方水，除热济阴，抑诸火之要药也；枯芩清肺滋源；知母降北方右尺相火，除骨蒸劳热要药；贝母清西方金，消痰解烦；桔梗引诸药至西方肺金之地，助子扶母之虚也；杏仁收敛耗散之金，乃降气生津之药也；五味子滋少阴不足之水，收太阴耗散之金；紫苑大降气止嗽；当归补血和血之圣药；赤芍药平东方有余之木，安中央不足之土；生地黄凉血生血，清荣中之伏火；天门冬润肺清痰中血，止吐血，清诸经混杂之血；天花粉止渴生津；白术益脾土以生肺金；白茯苓泻诸经火于小便中出。

厉

20318 厉风膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大风子肉五钱 木鳖子肉五钱 当归一两 细生地一两 防风五钱 紫草五钱 黄柏五钱 玄参五钱 麻黄五分 黄占二两 麻油八两

【用法】麻油入锅，先将生地熬枯，去滓；再将当归、防、柏、紫、麻黄、玄参熬枯去滓；再入大风子肉，木鳖子肉，沥净，熬至滴水成珠，入占和匀。

【主治】风湿。

布

20319 布海丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】昆布 海藻各一斤(洗净，入罐炊成膏) 枳实四两 陈皮二两 青皮一两 半澄茄 青木香各五钱

【用法】上为末，入前膏为丸。空心沸汤送下。

【主治】水肿，痰肿、气肿、鼓胀、喘咳，及癥瘕瘰癧。

【加减】气盛，加三棱、莪术各二两。

20320 布袋丸

【方源】《袖珍小儿》卷五。

【组成】夜明砂(拣净) 茺莢(炒，去皮) 使君子(肥白者，微炒，去皮)各二两 白茯苓(去皮) 白术(无油者，去芦) 人参(去芦) 甘草 芦荟(研细)各半两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如弹子大。每服一丸，以生绢袋盛之；次用精猪肉二两，同药一处煮，候肉熟烂，提取药于当风处悬挂，将所煮肉并汁令小儿食之。所悬之药，第二日仍依前法煮食，药尽为度。

【主治】①《袖珍小儿》：诸疳疾，面黄腹大，饮食不润肌肤。②《医述》：小儿丁奚，哺露，无辜疳。

【方论选录】《医灯续焰》：是方以四君补脾运土治其本，茺、使、芦、砂杀蛔清热治其标。食肉不食药者，收药味于肉，并肉并味从类而归脾。若脾疳面黄腹大，饮食不调，肌肉枯瘠，每见蛔者，服之自效，恐诸疳则未必也。

20321 布膏药

【方源】《青囊秘传》。

【组成】生地 当归 首乌 川芎 川断 红花 加皮 川草乌 茅术 良姜 官桂 香附 乌药 枳壳 陈皮 柴胡 白芷 羌独活 灵仙 麻黄 莪术 三棱 寄奴 荆芥 防风 赤芍 青皮 桃红 川军 牙皂 藁本 连翘 南星 山柰 姜半夏 海风藤 甘松各三钱

细料方：麝香一钱 附子二钱 冰片五分 洋樟三钱 木香三钱 肉桂一钱 乳没药 细辛 阿魏 八角茴香各三钱(共研末)

【用法】麻油四斤，入药煎枯，下净血余三

两，溶化，再下飞广丹三十两，熬膏。再下后细料药，搅匀用之。筋骨疼痛，腰腿痠软，四肢无力，贴两膏肓及肾俞；男子艰嗣，梦遗精滑，贴命门；妇女漏下半产，白带，贴子宫穴；左瘫右痪，手足麻木，贴肩井、曲池、环跳；跌打损伤，贴痛处；鹤膝风，贴膝眼；赤白痢疾，贴丹田；漏肩风，贴肩井；胁肋气痛，贴期门、章门；大、小疟疾，贴肺俞；心腹痛、呕吐，贴中脘；癰疽痞癖，贴痛处、气海；哮喘咳嗽，贴肺俞，中脘；木肾疝气，贴丹田、肾俞；瘀血作痛，贴丹田、气海；腰背疼痛、偏正头风，贴太阳、风门。

【主治】男子艰嗣，梦遗精滑，妇人半产漏下，白带及跌打损伤，遍身筋骨疼痛，腰脚痠痛，足膝无力，左瘫右痪，水泻痢疾，手足麻痹，腰肋气痛，哮喘咳嗽，癰疽痞癖，心腹肚痛，呕吐，木肾疝气，偏正头风，漏肩鹤膝，疟疾，瘀血作痛。

20322 布精起痠汤

【方源】《古今名方》引吴承忠家传验方。

【组成】肥玉竹 炒薏苡仁各9克 天门冬 麦门冬 怀牛膝 怀山药 蒸白术 白茯苓各4.5克 炙黄柏 炙甘草各2.4克

【功用】输布津液，濡煦气血。

【主治】温热病后足蹇不能行，或因温证误服辛温而成痠者。

【加减】若病深日久，其用量可按此比例酌增。

石

20323 石一

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“沉香阿魏丸”之异名。见该条。

20324 石二

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“宝花散”之异名。见该条。

20325 石七

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“细辛大黄丸”之异名。见该条。

20326 石八

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“紫朴汤”之异名。见该条。

20327 石三

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“乌药顺气汤”之异名。见该条。

20328 石五

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“沉香郁金散”之异名。见该条。

20329 石六

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“棱术汤”之异名。见该条。

20330 石四

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“降香桃花散”之异名。见该条。

20331 石散

《普济方》卷一〇二。为《圣济总录》卷十四“风引汤”之异名。见该条。

20332 石干散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】木香一钱 甘遂五分 石干二钱 蛤蟆一只（火逼干）

【用法】上为末。每用三分，好酒下。

【主治】膨胀。

20333 石干散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】石干 木香 黑丑各等分

【用法】上为末。每用一钱，姜汤调下。

【主治】膨胀。

20334 石干散

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】石干一钱 黑丑一钱（头末） 沉香五分 木香五分 槟榔一钱 葶苈八分 琥珀五分 海金沙一钱

【用法】上为细末。先服五皮散一二帖，然后服此末药，实者一钱，虚者九分，空心葱白汤送下。隔一日一服，轻者二帖，重者不过三帖。全愈后，服健脾养胃之药。

【主治】《寿世保元》：蛊胀。

【宜忌】忌盐、荤腥二七天。

20335 石子汤

【方源】《三因》卷十八。

【组成】猪肾一对(去脂膜,四破,无则以羊肾代之) 香豉 葱白 粳米 当归 芍药各二两

【用法】上为铤散,分两剂。每一剂用水三升,煮取一小碗,去滓,分三服,任意服。

【主治】①《三因》:蓐劳。妇人因产理不顺,疲极筋力,忧劳心虑,致虚羸喘乏,寒热如疟,头痛自汗,肢体倦怠,咳嗽痰逆,腹中绞刺者。②《医略六书》:蓐劳脉虚数弦浮者。

【方论选录】《医略六书》:产后经血亏乏,邪乘虚袭,流布经络隧道,故腰痛而寒热不解,势将必致蓐劳。当归养血以荣经络,白芍敛营以和血脉,香豉发越外邪,葱白通彻阳气,猪肾补肾藏精血,粳米养胃家津液也。水煎温服,使血脉内充,则外邪自解而经络融和,何有腰痛寒热之患,其蓐劳可冀免乎。

20336 石子汤

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】猪肾一对(去脂膜,用竹刀切作四片) 香草二两 葱白头二两 白芍药二两

【用法】分二帖。每用水三升,煮一升半,匀三服。

【主治】蓐劳。产后虚羸,寒热自汗,气促。

20337 石韦丸

【方源】《千金》卷十九引高阳负方。

【组成】石韦 蛇床子 肉苁蓉 山茱萸 细辛 礞石 远志 茯苓 泽泻 柏子仁 菖蒲 杜仲 桔梗 天雄 牛膝 续断 薯蓣各二两 赤石脂 防风各三两

【用法】上为末,枣膏或蜜和丸,如梧桐子大。每服三十九,酒送下,一日三次。二十日百病除,久服良。

【主治】五劳七伤。五劳:一曰志劳,二曰思劳,三曰心劳,四曰忧劳,五曰疲劳。七伤:一曰阴衰,二曰精清,三曰精少,四曰阴消,五曰囊下湿,六曰腰肋苦痛,七曰膝厥痛,冷不欲行,骨热,远视泪出,口干,腹

中鸣,时有热,小便淋沥,茎中痛,或精自出。

【方论选录】《千金方衍义》:劳伤阳气式微,不能护持中外,每致虚风外袭,痰癖内蕴,阻碍气化流行之道,故用石韦治劳热闭癰;礞石破五内癰结;防风通百骸阳气。使阴邪退听,则阳和敷布矣。

20338 石韦丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】石韦(拭去毛,焙) 京三棱(煨,锉) 附子(炮裂,去皮脐) 吴茱萸(水洗七遍,焙干,炒) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 蜀椒(去闭口及目,炒出汗)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空腹煎荆芥汤送下。

【主治】肝积气。

20339 石韦丸

【方源】《永乐大典》卷一〇三三引《方便集》。

【组成】石韦一两(刮去叶上毛,用叶) 滑石半两(不用青黑者) 木通半两 茅花(茅根可食者,用花)半两 猪苓(去皮)半两 黄芩二分 茯苓一两

【用法】上为细末,水煮薄荷米糊为丸,如绿豆大。每服二十丸,空心温白汤送下;小便少者,加车前草汤送下。

【功用】宽滑水道。

【主治】小儿尿血。

20340 石韦丸

《摄生众妙方》卷七。即《外台》卷二十七引《古今录验》“石韦散”改为丸剂,见该条。

20341 石韦汤

【方源】《外台》卷三十四引《集验方》。

【组成】榆白皮五两 石韦(去毛) 黄芩各三两 通草三两 大枣二十枚 葵子一升 白术一两

【用法】上切。以水八升,煮取二升半,分

为三四服。

【主治】产后卒患淋证。

20342 石韦汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】石韦二两 榆皮五两 黄芩二两 大枣三十枚 通草二两 甘草二两 葵子二升 白术 生姜各三两

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取二升半，分三服。

【主治】产后卒淋。气淋、血淋、石淋。

【方论选录】《千金方衍义》：产后淋证，得之卒然，无问气血与石，一皆不离于热。石韦大寒，《本经》专主五癃不通，兼榆皮、葵子之属，虽云利窍，并可散血，血散而淋自愈矣。

20343 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】石韦（去毛）一两 榆白皮（锉）一升 鬼箭羽三两 滑石（碎）四两 葵子木通（锉） 甘草（炙、锉）各三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕。水一盞半，煎至一盞，去滓温服。

【主治】胞转小便不通。

20344 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】石韦（去毛） 木通 柴胡（去苗） 茅根各一两半 梔子仁 芒消各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓温服，一日三次。

【主治】谷疸。趺阳脉紧而数，紧则为实，数则为热，紧数相搏，胃中苦热，骨节烦痛，小便不利。

20345 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】石韦（拭去毛，炙）三分 徐长卿（炙）半两 茅根三分 木通（锉、炒） 冬葵子各一两 滑石二两 瞿麦穗半两 槟榔一分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，下朴消末一钱匕，

空心、食前温服，一日二次

【主治】气壅，关格不通，小便淋结，脐下妨闷。

20346 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】石韦（去毛） 瞿麦穗 虎杖 海金沙各半两 滑石一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加灯心半握，煎至七分，去滓温服。

【主治】心与膀胱俱热，小便赤涩不利。

20347 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】石韦（去毛） 瞿麦（取穗） 冬葵子（炒） 车前子各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】卒淋。

20348 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】石韦（去毛）一两 鸡肠草三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】气淋。小便不利，胀满。

20349 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】石韦（去毛）三分 葛根（锉） 甘草（炙、锉） 桑根白皮（锉） 独活（去芦头） 防风（去叉）各半两 冬葵子（略炒）一两 木通（锉）一两 滑石（碎）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】血淋，小肠涩痛，烦闷。

20350 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】石韦（去毛）一两 甘遂（炒）三分 木通（锉）二两半 冬葵子一两半 车前子二两 滑石一两 蒲黄二两 赤芍药 当归（切，焙）各一两半 大黄（锉，炒）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，不拘时候，去滓温服。

【主治】血淋，小肠内结痛。

20351 石韦汤

《圣济总录》卷一五六。为《圣惠》卷五十八“滑石散”之异名。见该条。

20352 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】石韦(去毛) 赤芍药各一两 当归二两(锉，炒) 赤茯苓(去黑皮) 瞿麦(取穗)各一两半 冬葵子二分(炒) 大黄半两(生，锉)

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。以利为度。

【主治】产后大小便不通，脐下妨闷兼痛。

20353 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】石韦(去毛) 赤芍药 大黄(锉，炒) 滑石(研) 麦门冬(去心，焙) 甘草(炙) 升麻各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一小盞，煎至五分，去滓，食前服，一日三次。

【主治】小儿淋或涩痛，小便如血。

20354 石韦汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】石韦(去毛) 瞿麦各一两半 滑石一两

【用法】上为粗末。五六岁儿每服一钱匕，水八分，加小麦一百粒，同煎至五分，去滓温服，如人行十里再服。

【主治】小儿小便不通。

20355 石韦汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】石韦(去毛，锉) 车前子(锉，车前叶亦可)各等分

【用法】上浓煮汁饮之。

【主治】心经蕴热，传于小肠，小肠热则渗于脬中，脬辟而系转，小便微涩赤黄，渐渐不通，小腹膨满，心脉大而牢。

【加减】若腹胀，溺澀不得，好卧屈膝，阴

缩肿，此厥阴之厥，加赤茯苓、黄芩。

20356 石韦汤

《普济方》卷二一六。为《圣济总录》卷九十五“石韦饮”之异名。见该条。

20357 石韦汤

《校注妇人良方》卷八。为《圣惠》卷七十二“石韦散”之异名。见该条。

20358 石韦汤

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】石韦 瞿麦 车前子 葵子 木通 甘草 茯苓

【用法】水煎服。

【主治】妇人小便淋沥，阴中痛。男子脓淋。

20359 石韦饮

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【异名】石韦汤(《普济方》卷二一六)。

【组成】石韦(去毛) 瞿麦 葛根(锉) 麦门冬(去心，焙) 黄芩(去黑心) 赤茯苓(去黑皮) 冬葵子 生干地黄(焙) 滑石(碎)各一两 甘草(炙，锉)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞半，煎取八分，去滓，空心顿服。

【主治】膀胱蕴热，小便不通。

20360 石韦饮

《赤水玄珠》卷十五。为《外台》卷二十七引《集验方》“石韦散”之异名。见该条。

20361 石韦散

【方源】《外台》卷二十七引《范汪方》。

【组成】石韦(去毛) 滑石各三分

【用法】上为散。每服一刀圭，用米汁或蜜水下，一日二次。

【主治】石淋。

20362 石韦散

【方源】《外台》卷二十七引《集验方》。

【异名】长将散(《鸡峰》卷十八)、石韦饮(《赤水玄珠》卷十五)。

【组成】石韦二两(去毛) 瞿麦一两 滑石五两 车前子三两 葵子二两

【用法】上为散。每服方寸匕。一日三次。

【主治】热淋，沙淋，小便不利，赤涩疼痛。

①《外台》引《集验方》：淋，小便不利，阴痛。②《圣济总录》：热淋，小便热涩。③《医方考》：沙淋痛盛者。

【方论选录】①《医方考》：沙淋者，溺出沙石也，此以火灼膀胱，浊阴凝结，乃煮海为盐之象也。通可以去滞，故用石韦、瞿麦；滑可以去着，故用滑石、车前、冬葵。②《医略六书》：湿热蕴蓄膀胱，其气不得施化而结成沙石，故小便涩痛，淋漓不止焉。石韦通淋、涤小肠之结热；葵子滑窍，利膀胱之壅塞；瞿麦清心通淋闭；滑石通窍化沙石；车前子清热利水以快小便也。为散，白汤调下，使热结顿化，则沙石自消而小便如其常度，安有涩痛胀闷、淋漓不止之患乎？此滑窍通淋之剂，为沙淋胀闷涩痛之专方。

20363 石韦散

【方源】《外台》卷二十七引《古今录验》。

【组成】通草二两 石韦二两(去毛) 王不留行一两 滑石二两 甘草(炙) 当归各二两 白术 瞿麦 芍药 葵子各三两

【用法】上为散。每服方寸匕，食前以麦粥清下，一日三次。

【主治】①《外台》引《古今录验》：石淋、劳淋、热淋，小便不利，胞中满急痛。②《局方》：肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋漓不宣，出少起数，脐腹急痛，蓄作有时，劳倦即发，或尿如豆汁，或便出沙石。

【备考】本方改为丸剂，名“石韦丸”(见《摄生众妙方》)。

20364 石韦散

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】石韦 当归 蒲黄 芍药各等分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【主治】①《千金》：血淋。②《圣惠》：血淋心烦，水道中涩痛。

【方论选录】《千金方衍义》：石韦治癃闭不通，为归、芍、蒲黄导血之宣使。

20365 石韦散

【方源】《幼幼新书》卷三十引《玉诀》。

【组成】石韦(去毛) 瞿麦 海金沙 滑石 木通 甘草(炙)各等分

【用法】上为末。每服一钱，炒灯心煎汤调下。

【主治】小便淋热涩痛。

20366 石韦散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】石韦一两(去毛) 木通半两(锉) 瞿麦一两 甘草半两(炙微赤，锉) 葵子三合 子芩半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】热病，小便不通。

【备考】《医统》加灯心煎服。

20367 石韦散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】石韦三分(去毛) 瞿麦一两 王不留行三分 冬葵子一两 车前子一两 当归三分

【用法】上为细散。每服二钱，食前煎木通汤调下。

【主治】虚劳烦热，小便不利，阴中疼痛。

20368 石韦散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】石韦半两(去毛) 赤芍药半两 白茅根一两(锉) 木通一两(锉) 瞿麦一两 滑石二两 葵子一两 川芒消一两 木香一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】气壅不通，小便涩结，脐下妨闷疼痛。

20369 石韦散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】石韦一两(去毛) 瞿麦一两 滑石二两 车前子一两 葵子一两 甘草三分(炙微赤，锉)

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮

调下。

【主治】热淋，心神烦闷，小腹满胀。

【宜忌】《普济方》：忌酒、面物。

20370 石韦散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】石韦一两（去毛） 瞿麦一两 赤芍药一两 葵子一两 麻子二合 榆白皮一两（锉） 白茅根二两（锉） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】小便难，脬中有热，水道中痛。

20371 石韦散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【异名】石韦汤（《校注妇人良方》卷八）。

【组成】石韦（去毛） 黄芩 木通（锉） 榆白皮（锉） 葵子各一两 甘草一两（炙微赤，锉） 瞿麦一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】妇人小便卒淋涩。

20372 石韦散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】石韦一两（去毛） 榆白皮一两（锉） 赤芍药半两 黄芩三分 木通一两（锉） 葵子半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生地黄一分，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】产后小便卒淋涩，溺血。

20373 石韦散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】石韦二两（去毛） 榆白皮二两（锉） 黄芩一两 木通二两（锉） 赤芍药二两 冬葵子二两 甘草二两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】产后脏有积热，致小便出血。

20374 石韦散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】石韦（去毛） 葵子 木通（锉） 赤茯苓 车前子 瞿麦 榆白皮（锉） 各半两 滑石一两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一中盏，加葱白五寸，煎至六分，去滓，分三次服，如人行十里再服。

【主治】小儿诸淋涩，水道中痛，脐下痞满。

【备考】《幼幼新书》引张涣方有甘草一分。

20375 石韦散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】石韦（去毛） 赤芍药 川大黄（锉，微炒） 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙微赤，锉） 川升麻 川朴消各一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至六分，去滓，不拘时候服。

【主治】小儿诸淋，涩痛不利。

20376 石韦散

【方源】《医方类聚》卷一三三引《神巧万全方》

【组成】石韦（去毛） 消石各一两 葵子 桂心 黄耆 巴戟（去心，酒浸一宿） 王不留行各三分

【用法】上为末。每服二钱，食前以葱白汤调下。

【主治】劳损肾气、虚热所致劳淋、小便不利，阴中痛，日夜数起。

20377 石韦散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】石韦（去毛） 槟榔（锉） 各等分

【用法】上为细散。每服二钱匕，生姜汤调下。

【主治】咳嗽。

20378 石韦散

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】石韦（去毛） 瞿麦穗 冬葵子各二两 滑石（碎）五两

【用法】上为散。每服三钱匕，食前温水调下。

【主治】小便不利。

20379 石韦散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】石韦(去毛) 当归(切,焙) 木通(锉) 地胆(去足翅,炒) 钟乳粉 车前子 瞿麦穗 蛇床子(炒) 细辛(去苗叶) 露蜂房(炙) 各半两

【用法】上为散。每服三钱匕,食前煎冬葵子汤调下。

【主治】石淋,疼痛淋漓,昼夜不利。

20380 石韦散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】石韦(去毛) 滑石 瞿麦穗 王不留行 冬葵子各等分

【用法】上为细散。每服二钱匕,食前葱白汤调下。

【主治】劳淋,日夜数起,小便不利,引阴中痛。

20381 石韦散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】石韦 原蚕蛾(炒) 各等分。

【用法】上为散。干贴。

【主治】玉枕疮。生枕骨上如痈,破后如箸头。

20382 石韦散

【方源】《幼幼新书》卷三十引《丁时发传》。

【组成】石韦(去皮) 瞿麦 滑石 甘草 各一两 灯心一把

【用法】上为末。每服一钱,水八分,加小麦一百粒,同煎五分,去滓温服。

【主治】小儿小便不通。

20383 石韦散

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】石韦半两(去却上黄毛,去不尽即损肺) 木通 瞿麦各半两 桂府滑石一两 甘草半两

【用法】上为细末。每服四钱,水半升,灯心一束,同煎至一半,去滓,徐徐呷之。

【功用】利小便。

【主治】水气。

20384 石韦散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】石韦(去毛) 海金沙 木通 滑石

【用法】上为末。水一小盏,煎至半盏,通口服。

【主治】小儿热淋、沙淋、石淋。

20385 石韦散

【方源】《医学纲目》卷五。

【组成】石韦 木通 滑石 王不留行各二两 甘草梢一两 当归 白术 瞿麦 芍药 葵子各三两 黄耆二两

【用法】上为细末。每服空心煎汤调下。

【主治】膀胱有热,水道淋涩,或尿如豆汁及出沙石。

20386 石韦散

【方源】《普济方》卷三八八。

【组成】石韦半两(洗) 海金沙三钱 车前子三钱 海蛤一钱 瞿麦半钱

【用法】上加木通、石燕子,同煎服。一方为末,用灯心、金银汤下。

【主治】小儿热淋。

20387 石韦散

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】白芍药 白术 滑石 葵子 木通 瞿麦 石韦(去毛) 当归各八分 甘草梢五分 王不留行 人参 黄耆各七分

【用法】上吹咀。水煎熟,食前服。

【主治】淋沥不出,脐腹疼痛,劳役则发。

20388 石贝丸

【方源】《仙拈集》卷一引万密斋方。

【组成】石膏四两(猪牙皂五钱,切片,煨水一罐。将石膏煨红,入牙皂水淬之,水干为度,去皂不用) 贝母(去心)一两

【用法】荞麦面不拘多少,打糊为丸,如梧桐子大。每晚上床服五分,白滚水送下。不可多服,恐作泻。

【主治】男妇多年哮喘。

20389 石击散

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】白矾 巴豆

【用法】共烧灰。吹喉中。

【主治】喉疮日久不愈。

20390 石龙丹

【方源】《囊秘喉书》。

【组成】太阴元精石 龙胆草 川柏 知母(盐水炒) 元参 川贝母 丹皮 金银花 淡竹叶 朱灯心 冬瓜子 生苡米

【用法】上药各为细末。吹喉，煎服亦可。惟元精石有商酌，分量随症定。

【主治】阴火上炽，形寒里热，咽嗌微痛。

20391 石灰方

【方源】《直指》卷十四。

【组成】石灰(炒热)

【用法】以帛包裹，肛坐其上，冷又另换。仍以海螵蛸末敷之。

【主治】大肠积冷，久年脱肛。

20392 石灰汤

【方源】方出《证类本草》卷五引《肘后方》，名见《产科发蒙》卷四。

【组成】石灰一升(熬之)

【用法】以水二斗，投灰中，适寒温，入水中坐，须臾更作。

【主治】产后玉门不闭。

20393 石灰酒

【方源】《千金》卷十三。

【组成】石灰三升

【用法】细筛，水拌令湿，极熟蒸之，炒令至焦，以木札投之，火即着为候，停冷取三升，绢袋贮之，以酒三升渍三宿。初服半合，日三四夜二，稍加至一合。

【主治】头发落不止。

20394 石灰酒

【方源】《千金》卷二十三。

【组成】石灰一石(拌水和湿，蒸令气足) 松脂成炼十斤(末之) 上曲一斗二升 黍米一石

【用法】先于大铛内炒石灰，以木札著灰中，火出为度。以枸杞根锉五斗，水一石五升，煮取九斗，去滓，以淋石灰三遍澄清，以

石灰汁和渍曲，用汁多少一如酿酒法，讫，封四七日开服，恒令酒气相及为度。百无所忌，不得触风。其米泔及饭糟不得使人、畜、犬、鼠食之，皆令深埋却。此酒九月作，二月止，恐热。膈上热者，服后进三五口冷饭压之。其松脂末初酿酿酒，摊饭时均散在饭上，待饭冷乃投之。此酒饭宜冷，不尔即醋。

【功用】生毛发眉须，去大风。

【主治】恶疾大风；及妇人不能食饮，黄瘦积年及蓐风。

【方论选录】《千金方衍义》：石灰烈火煨出，性最暴劣，故《本经》治疽疡、瘰热、恶疮、痼疾、死肌、堕眉，杀虫去黑子、恶毒。松脂惯历风霜，质禀刚燥，故《本经》治痼疽、恶疮、顽疡、白秃。

20395 石灰散

【方源】《千金》卷二十四。

【组成】石灰一升 青木香 枫香(一作沉香) 熏陆香 丁香各二两 橘皮 阳起石各三两 矾石四两

【用法】上药治下筛，以绵作篆子，粗如指，长四寸，展，取药使着篆上，以绢袋盛，着腋下。先以布揩令痛，然后夹之。

【主治】狐臭。

【方论选录】《千金方衍义》：素禀腥臊遗气，淫于肝脏而泄于腋下。虽用辛香达窍诸药，终难拔除病根。不得已而用石灰壮火之余烈，兼阳起石以破阴邪之固结，配矾石之酸涩收敛，囊盛腋之，以辟秽恶之气。

20396 石灰散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】风化石灰一合 小麦面二合 皂荚灰一合 白薇一合

【用法】上为细散。以酃浆水和如面糊，涂贴，一日换三四次。

【主治】一切肿及发背、乳痈等。

20397 石灰散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】石灰二斗(以小便浸五日，细淘

过) 大麻心五两 檉叶一两 桑叶五两 青蒿叶半斤 刺薊六两 益母草六两 芸薹子六两

【用法】以端午日收采,相和石灰,纳臼中,杵令烂溶,作片,晒干,用时即旋捣罗为散。以敷疮上。

【主治】金疮血不止。

20398 石灰散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】石灰一升 地松苗汁 细辛末二两 旋覆根汁 葛叶汁 青蒿汁 麦门冬苗汁 莓苗汁各一两 猪脂一斤(炼了者)

【用法】上以诸药汁,并石灰入脂,和作饼子,晒干,捣末如粉。以敷疮上。五月五日合之更妙。

【功用】辟风水,续筋骨,止脓血,生肌。

【主治】金疮久不愈。

20399 石灰散

【方源】《妇人良方》卷七引《妇人经验方》。

【组成】猪贴脊血半盏 石灰一钱

【用法】将猪血于汤上暖,用杖子搅停后,用石灰于火上烧令黄,为末,罗过,入灰一钱,同血搅停。放温服,立愈。

【主治】妇人血气痛不可忍者。

20400 石灰散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《经验良方》。

【组成】干姜 石灰各等分

【用法】上烂捣,入清油相和,捏作饼子。贴在疮肿上。

【主治】疮肿软疔。

20401 石灰散

【方源】《普济方》卷一九〇。

【组成】石灰

【用法】以石灰刀头上烧,用井水调下。后用扁柏叶,同阶前草根研自然汁咽下。

【主治】吐血妄行。

20402 石灰散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】五倍子 石灰

【用法】上用五倍子同石灰炒黄色,去灰,摊地出火毒,砂盆内研为细末,不犯铜铁。干搽疮上,五七次愈。

【主治】肾漏,阴囊先肿,后穿破,出黄水,疮如鱼口,能致命。

20403 石灰散

《普济方》卷三〇三。即《圣惠》卷六十八“法炼石灰散”。见该条。

20404 石灰散

【方源】《普济方》卷三〇七。

【组成】蜈蚣草 雄黄 石灰各等分

【用法】上为末。敷患处。

【主治】虫、蛇、蜂、蝎、蜈蚣、蜘蛛、沙虫等伤。

20405 石灰散

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】陈石灰八两 黄柏末一两 商陆根(去筋,净末)二两

【用法】上为末,和匀。油调敷。

【主治】杖疮。

20406 石灰散

【方源】《济阳纲目》卷八十七。

【组成】风化石灰 嫩韭叶

【用法】上药同捣,入鹅血调和成饼,乘风阴干,为末。敷患处。无鹅血亦得。

【主治】①《济阳纲目》:金疮。②《内外科百病验方大全》:一切疮毒,无论已破未破,及跌打损伤。

20407 石灰散

【方源】《仙拈集》卷四引内府方。

【组成】陈石灰二两(炒粉红色) 大黄五倍各一两

【用法】上为末。醋调涂。

【主治】一切肿痛。

20408 石灰散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】陈石灰(炒)

【用法】上为细末。掺伤处,干则以香油调涂之。

【主治】破伤。

20409 石灰煎

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】古石灰（取古塔、古殿、老屋者，刮去土）

【用法】上为末。每服三钱，水一碗，煎至六分，去滓澄清，灌服。少顷痰下自愈。

【主治】痰厥气绝，心头温，喉中响者。

20410 石灰膏

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【异名】石杏膏。

【组成】石灰末（炒）杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各二两 猪膏半斤（切）

【用法】合煎，令杏仁黄，药成，绞去滓。涂疮上，日夜五六次。

【功用】止血、定痛、生肌。

【主治】金疮血不止，疼痛。

20411 石灰膏

【方源】《普济方》卷九十二引《仁存方》。

【组成】石灰一合

【用法】醋炒如泥。斜向右涂左，向左涂右。立正即洗去。一方水和。

【主治】中风口眼喎斜。

20412 石花汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】白石英（煨，研）三钱 合欢花二钱 鲜百部四钱 沙参四钱 麦冬一钱五分 贝母二钱 桑皮二钱 苏子一钱五分 杏仁三钱 茯苓二钱 苡仁四钱 淡竹叶十张 金丝荷叶二张（去背上白皮）

【主治】肺气壅塞，致成肺病，咳吐脓痰，气甚腥秽者。

20413 石杏膏

《圣济总录》卷一三九。为原书同卷“石灰膏”之异名。见该条。

20414 石连散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】黄连（姜炒）一钱 石膏（火煨）二钱

【用法】上为末。滚水下。

【主治】胃热呕吐。

20415 石辛散

【方源】《普济方》卷六十七引《海上方》。

【组成】寒水石十分 细辛五分 萆薢三文 荆芥三分

【用法】上为末。掺之。

【主治】牙疳急露宣。

20416 石英酒

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】白石英十两

【用法】碎如大豆，盛埧瓶中，用好酒一斗三升浸如泥，封口。以马粪、糠粃火烧之，从卯至午后，常令酒小沸，火尽即便添，烧毕，于平处安置。每日饮三次。如不饮酒，亦据器量少饮之。余石英以酒更一度烧煮，依前服。

【主治】石水。

20417 石英粉

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】白石英任多少（莹静者）

【用法】上先以生绢袋盛，于一斗米饭甑中蒸四五遍，然后捣罗，又用玉锤乳钵内细研，以清水飞过，更以白绢袋盛，于饭甑中又蒸三遍。每四两为一剂，取炼成白蜜和之，分为二十一丸，用瓷盒盛之。每日空心及晚食前嚼一丸，用暖酒送下。服后吃少粥了，宜行百步，以展药力。

【主治】风虚劳损，眼目不明，神思昏浊。

20418 石英散

《医学纲目》卷二十四。即《三因》卷十八“石茎散”。见该条。

20419 石英煎

【方源】《千金》卷十九。

【组成】紫石英 白石英各一斤（碎如米，以醇酒九升，铜器中微火煎取三升，以竹篦搅，勿住手，去滓澄清） 干地黄一斤 石斛五两 柏子仁 远志各一两 茯苓 人参 桂心 干姜 白术 五味子 苁蓉 甘草 天雄 白芷 细辛 芎藭 黄耆 山茱萸 麦门冬 防风 薯蓣各二两 白蜜三斤 酥

一升 桃仁三升

【用法】上药治下筛，纳煎中，如不足，加酒取足为限，煎之令可丸，为丸如梧桐子大。每服三十丸，酒送下，一日三次，稍加至四十丸为度。无药者可单服煎。

【功用】令人肥白充实。

【主治】男子女人五劳七伤，消枯羸瘦，风虚固冷，少气力，无颜色，不能动作。口苦咽燥，眠中不安，恶梦惊惧。

【方论选录】《千金方衍义》：白石英治男子消渴阳痿，紫石英治风寒在子宫，皆镇摄虚风之药，佐以助阳益气，和血滋阴，祛风润燥等味，补虚逐热之法靡不毕具。

20420 石茎散

【方源】《三因》卷十八。

【组成】石茎一两 当归尾 马鞭草 红花(炒) 乌梅肉各半两 蓬茂(炮) 三棱(炮) 苏木节 没药 琥珀(别研)各一分 甘草一钱

【用法】上为末。每服二钱，浓煎苏木酒调下。不饮酒，姜、枣煎汤调亦得。

【主治】妇人血结胞门，或为癥瘕在腹胁间，心腹胀满，肿急如石水状，俗谓之血蛊。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“石英散”。方中石茎，《医学纲目》作“紫石英”。

20421 石刻方

【方源】《医统》卷七十七引《夷坚志》。

【组成】五倍子二两 雄黄末一钱 甘草三钱(炙) 丁香 木香 麝香 轻粉各少许 糯米十粒

【用法】用水一大碗，于砂锅内煮至七分，候药面生皱皮为熟，绢滤去滓，通口服。服毕平正仰卧，枕令头高，觉腹中有物冲心，不得动，若吐出，以盆盛之，如鱼鳃之状，乃是恶物。吐罢饮茶一盞，泻亦无妨，旋煮白粥补之，后服解毒丸三五丸。

【主治】蛊毒。

【宜忌】忌生冷、油腻、醋酱十日。

【备考】方中雄黄末，《奇效良方》作“硫黄末”。

20422 石珍散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】石膏(煨) 轻粉各一两 青黛 黄柏末各三钱

【用法】上为细末。患处以甘草汤洗净，以此药掺之。其疼即止。

【主治】天泡日久作烂，疼痛不已，脓水淋漓者。

20423 石珍散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】石膏(煨)四两 青黛 黄柏各一两二钱 井泥(晒干)八钱

【用法】上药各取净末，研细和匀收贮。用生地汁调敷。

【主治】一切火疮、天泡疮。

20424 石珍散

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】生石膏一两 轻粉 黄柏 海螵蛸各五钱

【用法】上为细末。甘草汤净洗患处，以此掺之。

【主治】火赤疮。

20425 石珍散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】熟石膏二两 青黛 黄柏各三钱

【用法】上为细末。香油调敷。

【主治】一切疮痍破烂，作痛嫩赤者。

20426 石柏散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】煨石膏15克 黄柏9克 蛤壳粉9克 白芷9克 黄丹3克

【用法】上为细末。调油外敷。

【主治】带状疱疹。

【加减】痒，加轻粉、明矾。

20427 石南丸

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【异名】石南煎丸(《鸡峰》卷四)。

【组成】石南叶(炙，去毛) 桂(去皮)

附子(炮) 防风(去芦)各六两 牛膝(酒浸) 白茯苓(去皮)各八两 熟地黄 菟丝子(酒浸)各二分 薏苡仁六分 五加皮六分

【用法】上为细末，用大木瓜一枚(去皮子)，蒸熟，研成膏，和前药末为剂。如干硬，入少熟蜜和剂为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心木瓜酒送下，一日二次。

【功用】下气，除筋骨间邪气。

【主治】肾气虚弱，风湿脚气，筋急拘挛，湿痹缓弱，阴不仁，寒厥痿痹，腰脊痛，脚膝冷，转筋腿紧，不能久立，及如履物隐痛。

【备考】《鸡峰》本方用法：用薏苡汤送下。

20428 石南丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】赤芍药 薏苡仁 赤小豆 当归(去芦) 石南叶 牵牛子 麻黄(去根节) 陈皮(去白) 杏仁(去皮尖双仁，炒) 大腹皮(连子用) 川芎各二两 牛膝(去苗) 五加皮各三两 萆薢 独活(去芦) 杜仲(锉，炒) 木瓜各四两

【用法】上为细末，以酒浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五、二十丸，木瓜汤送下。早起、日中、临卧各一服。

【功用】常服补益元气，令人筋骨壮健，耳目聪明。

【主治】风毒脚弱少力，脚重疼痛，脚肿生疮，脚下隐痛，不能踏地，脚膝筋挛，不能屈伸，项背腰脊拘急不快。风毒上攻，头面浮肿，或生细疮，出黄赤汁，或手臂少力，或口舌生疮，牙龈宣烂，齿摇发落，耳中蝉声，头眩气促，心腹胀闷，小便时涩，大便或难。妇人血气。

【备考】《直指》有川续断二两。

20429 石南丸

《圣济总录》卷四十二。为《圣惠》卷三“豆淋酒煎附子丸”之异名。见该条。

20430 石南丸

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】石南 白术 牛膝(三味酒同浸一宿，焙干) 防风(去叉) 天麻 枸杞各二两 黄耆(锉)二两 桂(去粗皮) 鹿茸(酥炙，去毛)各一两半

【用法】上为末。用木瓜一枚(去皮瓤)，炊令烂熟，捣作膏，和药末，更用面糊少许同为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒送下；盐汤亦得。

【功用】去风湿，活血脉，益元气。

【主治】脚膝挛痹。

20431 石南丸

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】石南 续断 黄耆 狗脊 木瓜 乌药各半斤 地龙 乌头各四两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心木瓜汤送下。

【主治】①《鸡峰》：风湿气，脚重少力，脚膝缓弱，或肿或不肿，痹麻胫冷，脚下隐痛，行履艰难，筋脉挛急，不得屈伸，项背腰脊肿痛。及虚风上攻，头面浮肿，生疮痒痛，脓汁浸渍，手脚少力，牙龈宣烂，齿摇发落，耳内啸鸣。②《普济方》：脚气痛楚，不可履地。

20432 石南丸

【方源】《医方类聚》卷九十五引《王氏集验方》。

【组成】石南藤一斤(去芦梗) 乳香半两(别研) 没药半两 川乌二两(炮) 五灵脂(淘去沙土，澄清)四两 自然铜半两 木瓜四两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒送下。

【功用】舒筋活血，去风益精。

【主治】腰脚疼痛，或曾经坠堕打扑损伤，筋骨疼痛，一切虚损之证。

20433 石南汤

【方源】《千金》卷八。

【异名】石南根饮子(《准绳·疡医》卷五引《神巧万全方》)。

【组成】石南 干姜 黄芩 细辛 人参

各一两 桂心 麻黄 当归 芍药各一两半
干地黄十八铢 甘草二两 食茱萸三十铢

【用法】上㕮咀。以水六升，酒三升，煮取三升，分三次服。大汗勿怪。

【主治】六十四种风，注走入皮肤中，如虫行，腰脊强直，五缓六急，手足拘挛。隐疹搔之作疮。风尸身痒，卒风面目肿起，手不至头，口噤不能言。

【方论选录】《千金方衍义》：此首取石南胜阴复阳，专治风痹痿弱；麻、桂、细辛祛风散邪；姜、萸、参、草实脾杜湿；芍、归、地黄养血荣筋；黄芩一味开发郁闭之风热，风能胜湿，当无大筋软短、小筋弛长之患矣。

20434 石南汤

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】石南叶一把 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）半两

【用法】以水二盏，煎取一盏半，去滓，下消石、白矾各半两，搅令消，以绵搥涂于患处，干即易。

【主治】小儿风疹。

20435 石南汤

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】大戟 川乌头（炮，去皮脐） 顽荆叶 草乌头（生，去皮尖） 石南叶 藁本（去土，焙） 杜仲（锉，炒断丝） 川楝子肉 川椒（去目）各等分

【用法】上㕮咀。每用一两半，以水五升，煎三五沸，乘热熏洗淋濯，拭干。勿令见风。

【主治】脚气。

20436 石南酒

【方源】方出《千金》卷三。名见《普济方》卷三一七。

【组成】石南（一方用石韦） 细辛 天雄 茵芋各二两 山茱萸 干姜各三两 薯蓣 防风 贯众 独活 藁茺各四两

【用法】上㕮咀，以酒三斗，渍五日。初饮二合，一日三次，稍稍加之。

【主治】妇人自少患风，头眩眼痛。

20437 石南酒

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】石南叶（去粗茎，生用）三两

【用法】上为末。每服半钱至一钱匕，用酒三合，煎一沸，空心温服。

【主治】风瘾疹，经旬不解。

20438 石南散

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】石南（炙）五分 薯蓣 天雄（炮） 桃花 菊花 甘草（炙）各四分 黄耆三分 山茱萸七分 真珠二分 石膏八分（碎） 升麻 葳蕤各六分

【用法】上为散。每服方寸匕，食后温清酒送下，一日二次。

【主治】肉极热，则体上如鼠走，或风痹，唇口坏，皮肤色变。

【宜忌】忌猪肉、海藻、菰菜。

【备考】《千金》有芍药一两，无甘草。

20439 石南散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】石南二两半 薯蓣三分 黄耆三分（锉） 山茱萸三分 天雄半两（炮裂，去皮脐） 桃花半两 独活一两 薏苡仁一两 丹参一两 川升麻三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】肉极，则身上如鼠走，或风痹，唇口坼，皮肤色变。

20440 石南散

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】石南叶（酒醋微炒） 山芋各一两 黄耆（锉）三分 天雄（炮裂，去皮脐）一两 山茱萸一两半 桃花（生用） 菊花（未开者，炒）各三分 真珠（别研）一分 石膏（别研） 升麻各一两 甘草（炙，锉）三分 葳蕤（锉）一两 丹砂一分（别研，仍与真珠、石膏末一处同研极细）

【用法】上药除别研外，将十味捣罗为末，

次入所研者药拌匀。每服一钱匕，空心温酒调下，日二夜一，渐加至二钱匕。

【主治】热痹，肌肉热极，体上如鼠走，唇口反坏，皮肤色变。兼治诸风。

20441 石南散

【方源】《三因》卷八。

【组成】石南一两一分 天雄（炮，去皮脐） 山药 桃仁（制炒，去皮尖） 芍药 甘菊花 甘草（炙）各一两 升麻 萎蕤各一两半 黄耆 辰砂（别研）各三分 石膏（煨）二两 山茱萸一两三分

【用法】上为细末。每服二大钱，食前温酒调下。

【主治】肉实极，肌痹，淫淫如鼠走，津液脱，腠理开，汗大泄，或不仁，四肢急痛，或复缓弱，唇口坏，皮肤变色。

20442 石南散

《本草纲目》卷三十六。为《幼幼新书》卷六引《龙木论》“通顶石南散”之异名。见该条。

20443 石南散

【方源】《妇产科学》。

【组成】石南叶五钱 仙灵脾五钱 蛇床子五钱

【用法】上为细末。每服一钱，一日三次。亦可改为汤剂煎服，如量作一剂。

【功用】温肾助阳，祛风止痒。

【主治】肾虚阳衰之外阴白斑。伴经来过少或经闭，面色不华，小腹冷感，腰痠乏力。

【方论选录】方中石南叶益肾祛风；仙灵脾、蛇床子温肾止痒。

20444 石草散

《松峰说疫》卷二。为方出《肘后方》卷二，名见《医心方》卷十二引《录验方》“石膏散”之异名。见该条。

20445 石点膏

【方源】《中国医学大辞典》引《眼科龙木论》。

【组成】黄连三钱（锉，清水一碗，煎至半碗） 防风八分 当归身 甘草各六分 蕤

仁泥三分

【用法】同熬至滴水不散，绞去滓，入炼蜜少许，再熬片时。须静心点之，一日五次，临卧点尤效。

【主治】一切翳膜。

20446 石炭散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】石炭二两（打研） 赤鲤鱼鳞五千干藕节四两 乱发一两 败蒲二两 棕榈皮二两 红蓝花一两 芫花一两

【用法】上药都入一瓷瓶子内，使盐泥固济，候干，以砖坯子盖头，用炭火半秤断之，如人行一二里以来，其初青烟出，后白烟出，渐去火，经一宿，冷取出，捣细罗为散，更入麝香一分，同研令细。每服一钱，以温酒调下，如人行三五里再服。其恶血自下。

【主治】产后恶血，攻刺心腹疼痛。

20447 石钟鸣

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】西瓜霜三两 人中白（煨）六钱 雄黄六钱 朱砂一两二钱 犀角一钱 牛黄一钱 珍珠（炙）一钱 冰片三钱 麝香五分

【用法】上为细末，过罗，每瓶装一分。每用一分，吹入喉内。

【功用】清热，消肿，止痛。

【主治】咽喉肿痛，喉痹，白喉，单双乳蛾，糜烂流涎，食水难咽。

【禁忌】忌烟、酒、油腻。

20448 石胆丸

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】石胆（研） 吴茱萸 天雄（炮，去皮） 芫花（熬） 柏仁各一分 防风 芫花（熬） 杜仲（炙）各三分 菖蒲 葶苈（熬）各一两 菟丝子三合

【用法】上为末，炼蜜为丸，如蜚豆大。每服三丸，以饮送下，一日二次。

【主治】足胫肿，小便黄，胸痛烦，车骨筋解开痛。

20449 石胆丸

【方源】方出《圣惠》卷三十三，名见《普济方》卷八十。

【组成】石胆一两（细研） 波斯盐绿一两 石盐半两 硃砂半两 乌贼鱼骨三分 蕤仁三分（汤浸去赤皮） 秦皮三两 细辛一两 决明子二两 石决明一两（捣碎，细研，水飞过） 防风三两（去芦头） 铅丹一两 黄连三两（去须） 贝齿一两（焙灰）

【用法】上为末，都研令匀，炼蜜和捣五七百杵，放于瓷盒中。每次少许，更用蜜调如稀汤，点黍米大于大毗头，一日二三次。

【主治】眼中一切障翳不消，风热毒气上攻，眼常漠不见物，不计年远，翳膜厚者。

【备考】《普济方》有鸡舌香半两。

20450 石胆丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】石胆一分（细研） 硃砂一分（细研） 石决明半两（细研，水飞过） 盐绿一分 乌贼鱼骨半两 黄连一两（去须） 秦皮半两（去粗皮） 细辛半两 干姜一分（炮裂，锉） 决明子三分 龙脑一分（细研） 鸡舌香半两 波斯盐一分（细研）

【用法】上为末，入研了药，更研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。每夜临卧，于大毗头各点一丸。

【主治】眼生翳障，远年不愈，风泪出，痒烂及生息肉。

20451 石胆丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】石胆一分 杏仁一分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 腻粉一分

【用法】上为细散，炼蜜为丸，如鸡头子大。绵裹一丸含。有涎即吐之。

【主治】口舌疮。

20452 石胆丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】石胆三钱 黄柏一分（末） 蟾酥少许

【用法】上为细末，面糊为丸，如皂荚子大。每次一丸，用水化破，以篦子取少许，涂于疮上，日夜三两次。

【主治】口舌疮肿。

20453 石胆丸

【方源】方出《圣惠》卷三十六。名见《普济方》卷二九九。

【组成】石胆一分 雄黄一分 腻粉一分

【用法】上为细末，以蟾酥为丸，如芥子大。临卧时含一丸，吐津。口中热痛勿讶。

【主治】口疮久不愈。

20454 石胆丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】石胆一分 乳香一分 黄丹半分 密陀僧一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如酸枣大。每服一丸，绵裹含之。

【主治】口疮久不愈。

20455 石胆水

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】胆矾二分 水二合

【用法】调匀贮之。

【主治】热眼及有脓之眼目。

20456 石胆散

【方源】方出《证类本草》卷三引《梅师方》，名见《圣济总录》卷一二九。

【组成】石胆一两（于火上烧令烟尽）

【用法】上为细末。敷疮上。不过四五次愈。

【主治】①《证类本草》引《梅师方》：甲疽。②《圣济总录》：甲疽赘肉疼痛，脓血不止。

20457 石胆散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】石胆半钱 马牙消一两 黄连半两（去须） 龙脑一钱 黄柏一分（锉） 角蒿一分

【用法】上为细散，入龙脑、马牙消等，更研令细。每取半钱，用新棉薄裹，含良久，有涎即吐之。

【主治】热病口舌生疮。

20458 石胆散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】石胆半两 石盐一两 朱砂一两 盐绿半两 龙脑一分 膩粉一钱

【用法】上为细末。每以铜箸头取如小豆大，点目中，一日三四次。

【主治】眼生肤翳，目赤痛，痒涩。

20459 石胆散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】石胆半分 朱砂半两 蕤仁半两（汤浸，去赤皮） 真珠末一分 琥珀一分 马珂一分 珊瑚一分 紫贝一分 决明子一分

【用法】上为细散，入乳钵内研令匀细。每用药小豆大，点大眦头。二三次效。

【主治】眼生翳膜，经年不愈。

20460 石胆散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】石胆半两 鲫鱼一枚（长三寸者，开肚满填盐，烧鱼焦） 雄黄一分

【用法】上为细末。先以泔汤洗口及疮上，用散贴之，每日三五次，夜后漱口后贴之，其疮便愈。

【主治】急疳，唇口赤疮出者。

20461 石胆散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】石胆三分（细研） 雄黄 乱发灰 人粪灰各一分 鲫鱼一枚（长三寸者，开肚纳盐，烧为灰）

【用法】上为细散，先以甘草汤洗疮后，即敷此药半钱于疮上，一日三四次。有涎即吐却。

【主治】牙齿急疳疼痛，齿齙生疮。小儿疳虫蚀儿鼻。

20462 石胆散

【方源】方出《圣惠》卷三十四，名见《普济方》卷六十七。

【组成】牛膝（烧灰） 石胆 麝香各一分

【用法】上为细末。临卧时先漱口，后掺药于牙缝上，不过三两次。

【主治】急疳。

20463 石胆散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】石胆半分 麝香半钱 杏仁一分（汤浸，去皮尖双仁，生研） 膩粉一钱

【用法】上为末。每取少许，掺于疮上。良久吐出涎水愈。

【主治】口疮经久，肿痛赤烂，不能下食。

20464 石胆散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】石胆半两 蚺蛇胆一分 龙脑一分

【用法】上为细散。每用少许，涂于疮上一日三次。以愈为度。

【主治】小儿口疮赤烂。

20465 石胆散

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】石胆一钱半（烧，研） 白芷一钱（为末）

【用法】上药再研匀细。每服半钱匕，温浆水调下。取出涎后转一两行愈。

【主治】缠喉风及狗咽。

20466 石胆散

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】石胆（研）半两 龙脑（研）少许

【用法】上为末。以少许涂疮上，愈。

【主治】小儿燕口疮。

20467 石胆散

【方源】《幼幼新书》卷二十五引张涣方。

【组成】石胆一两 地龙一分（洗净） 须发（烧灰） 蓂蓉子（生用）各半两

【用法】上为细末，入麝香一钱，同研匀。每服一字，贴于疮上。

【主治】鼻疳病，疳虫上蚀于鼻，赤痒及连唇生疮赤烂。

20468 石胆散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】胆矾 密陀僧 轻粉各等分

【用法】上为细末。津唾调擦之。数次除根。

【主治】腋气。

20469 石胆散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】石胆三钱 胡桐律半两 蟾酥半两 轻粉抄一钱(称重半钱)

【用法】上为细末。每用半字，食后、临卧敷贴患处。吐津，误咽不妨。

【主治】齿龈肿痛生疮，或欲成疳，乍愈乍发。

20470 石胆散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】胡桐律 黄矾(烧过) 朱砂 升麻各半两 石胆 华细辛(净) 当归(锉) 牛膝(锉) 川芎 棘刺(炒) 地龙(去土，烧)各三钱 乳香 麝香各二钱半 龙脑一字

【用法】上为极细末。每用药少许，早晨、临卧并每食后敷擦牙龈上，吐津，日用五六次。误咽不妨。

【主治】牙齿龈肉退缩虚浮，时有脓汁，或牙齿动摇疼痛。

20471 石胆散

【方源】《普济方》卷八十三。

【组成】石胆(研如粉)一分 黄连(去须，捣) 黄柏(去粗皮，捣)各三分 茯神(去皮，研) 铜青(研) 芒消各半两

【用法】上为末，更入乳中冲，重研令极细匀。每取如黍米大，点目眦头。

【主治】针眼。暴肿痛不得开。

20472 石胆散

《普济方》卷八十三。为《圣济总录》卷一一三“洗眼石胆散”之异名。见该条。

20473 石胆散

《普济方》卷三六五。为《活幼口议》卷二十“大效金丝膏”之异名。见该条。

20474 石胆煎

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】石胆半钱(烧、研末) 蜜一合 黄柏末一钱匕 蟾酥(研)半钱

【用法】先于铛中慢火煎蜜，次下药末，煎如饴。每含如杏核大。吐津，不得咽。

【主治】口疮疼痛。

20475 石胆膏

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】石胆一分(细研) 蜜陀僧半两(细研) 蜜三两

【用法】上药相和于银器中，慢火熬成膏。每用少许涂疮上，咽津。立效。

【主治】久口疮及内疳疮。

20476 石胆膏

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】石胆半钱 乌贼鱼骨半字 乳糖一钱 蜜一皂子大 龙脑少许

【用法】上为末，入新汲水半盏相和，以帛子滤过，入瓷瓶内，用新汲水浸瓶十日。每用点眼，点了，用青盐汤热洗。洗时不得犯铜铁箸，只用鸡翎沥在眼内。

【功用】退翳膜，去风痒。

【主治】风毒眼。

20477 石亭丸

【方源】《名家方选》。

【组成】硫黄三十钱 消石十五钱 百草霜五钱

【用法】上为末，糊为丸，如梧桐子大。每服自五丸至一钱五分，冷茶送下。

【主治】头痛诸药不效者。

20478 石室丹

【方源】方出《石室秘录》卷一，名见《医学集成》卷三。

【组成】元参一两 麦冬九钱 甘菊花三钱 人参一钱 熟地九钱 菟丝子一钱

【用法】水数碗，煎汤四碗，恣其吞饮。胃火渐平，则两足自然生力。

【主治】痿证。阳明火盛，终年不能起床，面色光鲜，足弱无力，不能举步者。

20479 石室丹

《医学集成》卷三。为《石室秘录》卷一“解热至圣丹”之异名。见该条。

20480 石蚕散

【方源】《解围元藪》卷四。

【异名】倒阳方。

【组成】石蚕(生)

【用法】上为末。每服一钱，酒送下。阳萎即痿软不举。

【功用】大风肿斑黑顿消后戒色。

20481 石莲丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】石莲肉(去心) 附子(炮裂，去皮脐) 干姜(炮) 各一两

【用法】上为末，粟米粥为丸，如绿豆大。每服十丸，蜀椒汤送下。止勿再服。

【主治】胃寒哕逆。

20482 石莲丸

【方源】《普济方》卷九十三引《卫生家宝》。

【组成】草乌头(去皮，锉) 天南星(锉) 各二两 川乌三两(去皮，锉) 五灵脂(夹石者，去石用) 木鳖子(去壳) 踯躅花(去枝梗) 蔓荆子(去皮) 干地龙(去土，以布裹，捶) 白胶香(通明者) 各一两 没药半两(通明者，别研) 乳香半两(研) 麻黄(去节) 地榆(净，锉) 天麻(洗，锉) 各一两 京墨二寸(煨令通红，别研)

【用法】上除墨外，并生用不见火，日晒干，为细末，入墨、酒糊为丸，如石莲样。常于端午日午时合用。急用辰时腊日合亦可。如卒中风，新汲井水、生姜、薄荷自然汁磨药，以温酒浸服。轻者半丸，重者一九，小儿天弔等风，一九分四服；打扑伤损，以姜汁磨涂患处；伤风咳嗽鼻塞，服之衣被覆汗立愈。如无生薄荷，干者亦可。

【主治】中风瘫痪，涎潮肢痹，遍身瘾疹，走注风痛，打扑伤损，癰疽，一切风疾。

【宜忌】忌猪、鸡、鹅、鸭、毒物。

20483 石莲汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】石莲子(炒，取肉) 人参 杵头糠各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，

煎至六分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】咽喉如有物噎塞，饮食不下。

20484 石莲汤

【方源】《血证论》卷八。

【组成】人参一钱半 黄芩三钱 黄连二钱 石莲(即莲米有黑壳者)三钱

【主治】痢疾，噤口不食。

【方论选录】胃火甚则拒格不纳食，用芩、连以清火，用人参、石莲以补胃，故治噤口不食。

20485 石莲散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】石莲心三十枚(炒令黄) 浮萍一分

【用法】以水一中盞，加生姜少许，煎至六分，去滓，每服半合，徐徐服之。

【主治】小儿热渴久不止。

20486 石莲散

【方源】《卫生总微》卷十一。

【方药】石莲不拘多少(去皮，用沙糖炒过)

【用法】上为细末。每服一钱，乳食前米饮调下。

【主治】小儿脏寒泄泻，下利纯白，腹中绞痛，虚气胀满，手足逆冷。

20487 石莲散

【方源】方出《百一》卷六引孟公实方，名见《医统》卷三十六。

【异名】进食丹(《瘴症指南》卷下)。

【组成】石莲不以多少(不炒，剥去壳)

【用法】将肉并心研为细末。每服二钱，陈米饮调下。

【主治】噤口痢。

【备考】《医统》引本方“石莲微炒”。

20488 石莲散

【方源】《妇人良方》卷二十二引《妇人经验方》。

【组成】石莲肉(炒)一两半 白茯苓一两 丁香半两

【用法】上为细末。每服三钱，米饮调下，

不拘时候。

【主治】①《妇人良方》引《妇人经验方》：产后气吃噎，吐逆，心怔目晕，不思饮食。②《济阴纲目》：产后胃寒咳逆，呕吐不食，或腹作胀。

【方论选录】《济阴纲目》：石莲，其味甘，其性降，故能益胃清水而治呕。况加茯苓以下气，丁香以散寒，生姜佐之。

20489 石莲散

【方源】《得效》卷十二。

【组成】莲肉（去心，炒）

【用法】上为末。每服一钱，空腹米饮调下。

【主治】小儿噤口痢，因服涩住药太过，伤损胃气，闻食口闭，四肢逆冷。

20490 石莲散

【方源】方出《校注妇人良方》卷十八，名见《医略六书》卷三十。

【组成】人参 石莲肉（不去心） 石菖蒲 各等分。

【用法】每用五钱，水煎服。

【主治】①《校注妇人良方》：产后不语。②《医略六书》：产后气虚挟热，不语，脉沉满数者。

【方论选录】产后气虚挟热，心包受病而心窍不通，神机闭遏，故令不语焉。石莲清心气以除热，人参助心气以益虚，石菖蒲开通心窍，以鼓舞神机也。为散水煎，使心气内充，则心热自化，而心窍无不通，何不语之足患哉。

20491 石莲散

《医学入门》卷七。为《奇效良方》卷三十四“莲肉散”之异名。见该条。

20492 石莲散

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】莲蕊 石莲肉 芡实 人参 麦门冬 茯神 远志 甘草

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】遗精。

20493 石盐膏

《普济方》卷八十二。为方出《千金》卷

六，名见《圣济总录》卷一〇九“点眼食盐膏”之异名。见该条。

20494 石夏丸

【方源】《朱氏集验方》卷五引鄂渚孟少师府方。

【组成】半夏一两（泡） 滑石一两（火煨，去火毒）

【用法】生姜糊为丸，如梧桐子大。不拘多少，白汤调下。

【主治】痰嗽。

20495 石脂丸

《普济方》卷一八六引《指南方》。为《金匱》卷上“赤石脂丸”之异名。见该条。

20496 石脂丸

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】白石脂 厚朴（去粗皮，生姜汁炒） 当归（锉，炒）各一两 干姜（炮） 赤石脂 诃黎勒皮 陈橘皮（去白，焙）半两

【用法】上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服五丸，空心米饮送下。

【主治】小儿洞泄。

20497 石脂散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】白石脂一两（烧过） 乌梅肉半两（微炒） 黄连半两（去须，微炒） 胡粉半两（炒令微黄） 槟榔半两 诃黎勒半两（炒，用皮） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】热病下痢脓血。

20498 石脂散

【方源】《产乳备要》。

【组成】赤石脂六钱 干姜四钱 糯米一合（炒黄）

【用法】上为末，分为二服。水二盏，煎至一盏，食前温服。

【主治】妊娠泻痢。

20499 石脂散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】赤芍药四两（炒） 干姜 香附子

二两

【用法】上为细末。每服三钱，空心酒下；如带赤冷，即用陈米饮下，煎阿胶艾汤尤妙。

【主治】白冷精带下，阴挺脱出，或青黑黄白，腹下攻痛，胸闷，头旋眼晕，耳聾啾啾，痰上壅。

【加减】若要顺气，加茴香。

【备考】方中干姜用量原缺。

20500 石脂膏

【方源】《良方合璧》卷下。

【组成】赤石脂 寒水石 大黄各等分

【用法】上为末。用新汲水调敷患处。

【主治】烫火伤赤烂，热痛不止。

20501 石粉散

【方源】《普济方》卷三八九。

【组成】寒水石（煨） 牡蛎（煨）各等分

【用法】上为末。三岁半钱，冷水调下，连进二服。

【主治】小儿衄血，日夜不止，头痛心烦。

20502 石粉散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】石膏 轻粉各三钱

【用法】韭汁调敷，水调亦可。

【主治】漆疮。

20503 石黄散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《惠眼观证》。

【组成】硫黄半两 滑石一分

【用法】上为细末。每服半钱，米泔下。

【主治】小儿霍乱，吐泻不止。

【备考】《幼幼新书》引《谭氏殊圣》：治小儿吐泻，用滑石、硫黄各等分，每服一字。

20504 石黄散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】熟石膏 黄柏各等分

【用法】上为细末，和匀。可掺，可油调。

【主治】湿疮发痒。

20505 石斛丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】石斛一两（去根，锉） 防风一两

（去芦头） 仙灵脾三分 牛膝二两（去苗） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 桂心三分 羌活一两 当归一两（锉，微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 木香半两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日三十丸，空心温酒送下，晚食前再服。

【主治】肾脏风毒流注，腰脚疼痛，四肢少力，不能饮食。

20506 石斛丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】石斛一两（去根，锉） 天门冬半两（去心，焙） 五味子三分 巴戟半两 牛膝一两（去苗） 肉苁蓉三分（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干） 干漆半两（捣碎，微炒） 菟丝子一两（酒浸三宿，焙干，别捣为末） 白术三分 远志半两（去心） 白茯苓三分 熟干地黄三分 覆盆子半两 薯蓣半两 补骨脂一两（微炒） 人参半两（去芦头） 石龙芮三分 五加皮三分 草薢三分（锉） 狗脊半两 石南半两 杜仲二分（去粗皮，炙微黄，锉） 天雄三分（炮裂，去皮脐） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下，渐加至五十丸。

【主治】肾脏虚损，头昏耳鸣，目暗茫茫，心中喜忘，恍惚不定，饮食无味，心恒不乐，多有恐思，时吐酸水，面无光泽，肌体虚羸，骨萎不能行立。

20507 石斛丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】石斛（去根，锉） 牛膝（去苗） 桂心 杜仲（去粗皮，炙微黄，锉） 续断 白茯苓 菟丝子（酒浸一宿，焙干，别捣） 枸杞子 五味子 山茱萸 黄耆（锉） 防风（去芦头） 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干），远志（去心） 人参（去芦头） 天

门冬(去心,焙)各一两 熟干地黄二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下。

【主治】风劳气,四肢羸弱,心神虚烦,食欲不振,肢节多疼,脚腰无力,夜多盗汗,小便赤黄。

20508 石斛丸

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】石斛一两(去根,锉) 天雄三分(炮裂,去皮脐) 黄耆一两(锉) 肉桂半两(去粗皮) 鳖甲一两(涂醋炙令黄,去裙襖) 当归三分 芎藭三分 白术三分 沉香三分 海桐皮三分(锉) 牛膝一两半(去苗) 杜仲一两半(去粗皮,微炙,锉) 巴戟一两 五味子三分 干漆三分(捣碎,炒令烟出) 枳壳三分(麸炒微黄,去瓢)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心及晚食前以温酒送下。

【主治】虚劳衰损,气血虚弱,风邪所乘,肢节不利,身体疼痛。

【宜忌】忌菹菜。

20509 石斛丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】石斛一两(去根,锉) 熟干地黄三分 麦门冬一两半(去心,焙) 五味子半两 牛膝一两(去苗) 泽泻半两 肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 防风半两(去芦头) 芎藭三分 独活半两 秦艽二分(去苗) 人参半两(去芦头) 桂心三分 甘草半两(炙微赤,锉) 细辛半两 附子一两(炮裂,去皮脐) 黄耆半两(锉) 石龙芮半两 白芍药半两 白茯苓三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下。

【主治】虚劳痿痹,四肢挛急,肌体枯瘦。

【宜忌】忌生冷、猪、鸡、牛、马肉。

20510 石斛丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】石斛二两(去根,锉) 汉椒二两(去目及闭口者,微炒去汗) 硫黄二两(细研,水飞过) 杜仲一两(去粗皮,炙微黄,锉) 楮实二两(水淘去浮者,焙干) 柏子仁一两半 补骨脂二两(微炒) 续断一两 鹿茸一两(去毛,涂酥炙微黄) 桂心三分 巴戟一两 附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以暖酒送下。

【主治】虚劳冷气,腰脚疼痛。

20511 石斛丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】石斛一两(去根节) 黄耆三分(锉) 桂心三分 白茯苓一两 山茱萸一两 薯蓣一两 牛膝一两半(去苗) 木香三分 附子一两(炮裂,去皮脐) 羌活三分 巴戟一两 桂心三分 菟丝子一两(酒浸三日,晒干,别捣为末)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心以温酒送下,晚食前再服。

【主治】虚劳乏力,膝冷无力。

20512 石斛丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】石斛一两半(去根,锉) 巴戟二两 杜仲一两半(去粗皮,炙微黄,锉) 牛膝一两(去苗) 桑螵蛸一两(微炒) 鹿茸一两半(去毛,涂酥炙微黄) 补骨脂一两(微炒) 龙骨一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下。

【主治】虚劳肾气衰弱,阳痿失精,腰膝无力。

20513 石斛丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】石斛三两(去根,锉) 天雄一两(炮裂,去皮脐) 侧子三两(去苗) 牛膝三两(去苗) 赤茯苓一两半 狗脊一两 桂心一两 干姜半两(炮裂,锉)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】风虚冷气攻腰痛，强直不能俯仰。

20514 石斛丸

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】石斛一两（去根，锉） 牛膝一两（去苗） 桂心三分 丹参三分 独活三分 赤茯苓一两 萆薢一两（锉） 薏苡仁一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 槟榔二两 白蒺藜一两（微炒去刺） 麻黄一两（去根节） 楮实三分（水淘去浮者，晒干，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以暖酒送下。

【主治】脚气，缓弱无力，心腹满闷。

20515 石斛丸

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】石斛一两（去根） 牛膝一两（去苗） 狗脊三分（去毛） 杜仲一两（去皱皮，炙微黄，锉） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 鹿茸半两（去毛，涂酥炙微黄） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两 萆薢三分（锉） 羌活三分 木香一两 牡丹皮一两 人参三分（去芦头） 黄耆一两（锉） 山茱萸三分 防风半两（去芦头） 芎藭半两 槟榔一两半 熟干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下，一日三次。

【功用】打扑损伤后，止疼痛，补虚损。

20516 石斛丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】石斛一两（去根，锉） 熟干地黄一两 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桂心三分 赤茯苓一两 甘草半两（炙微赤，锉） 人参三分（去芦头） 五味子一两 紫菀三分（洗去苗土） 黄耆一两（锉） 白术一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 沉香一两 当归一两 枳实三分（麸

炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人风虚劳损，羸弱短气，胸胁逆满，不欲饮食。

20517 石斛丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】石斛一两（去根，锉） 牛膝一两半（去苗） 丹参一两 续断三分 当归三分（锉，微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心三分 芎藭一两 延胡索一两 熟干地黄一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 桑寄生二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒或生姜汤送下。

【主治】产后虚损，气血不和，腰间疼痛，手足无力。

20518 石斛丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】石斛二两（去根，锉） 牛膝（去苗） 山茱萸 续断 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 沉香 钟乳粉 桂心 熟干地黄 白茯苓 泽泻 黄耆（锉） 菟丝子（酒浸三日，晒干，别捣为末） 蛇床子 薯蓣 附子（炮裂，去皮脐） 鹿茸（去毛，涂酥，炙令微黄） 巴戟 杜仲（去粗皮，炙微赤，锉） 补骨脂（微炒）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】①《圣惠》：强筋骨，悦颜色，耐寒暑，倍气力。②《普济方》：补精益髓。

【主治】肝肾久虚，腰体不利，肌肤羸弱。

20519 石斛丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】石斛二两（去根，锉） 蛇床子一两 牛膝一两（去苗） 桂心一两 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干） 人参一两（去芦头） 鹿茸一两（去毛，涂酥

炙令微黄) 熟干地黄二两 杜仲一两(去粗皮,炙微黄,锉) 木香一两 薯蓣一两 白茯苓二两 附子二两(炮裂,去皮脐) 巴戟一两 防风一两(去芦头) 钟乳粉二两 干漆一两(捣碎,炒令烟出) 泽泻一两 山茱萸一两 覆盆子一两 补骨脂二两(微炒) 五味子一两 石龙芮一两 槟榔一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每日三十丸,空心以温酒送下。四时宜服。

【功用】补虚损,利腰膝,暖水脏,祛风冷,强气力,悦颜色。

20520 石斛丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】石斛二两(去根,锉) 肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 菟丝子一两(酒浸三宿,晒干,别捣为末) 牛膝一两(去根,锉) 熟干地黄一两 杜仲一两(去粗皮,炙微赤,锉) 泽泻一两 枸杞子一两 山茱萸一两 桂心一两 白茯苓一两 补骨脂一两(微炒) 覆盆子一两 附子一两(炮裂,去皮脐) 巴戟一两 桑螵蛸一两(微炒) 钟乳粉一两 车前子一两 牡蛎粉一两 龙骨一两 阳起石一两(酒煮半日,细研,水飞过)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每日三十丸,空心以温酒送下。

【功用】补虚损,壮腰膝,暖水脏,止小便滑数。久服好颜色,强志倍力,耐寒暑,填精髓,令人肥健。

20521 石斛丸

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】石斛(去根) 牛膝(酒浸,切,焙) 续断各三分 菟丝子(酒浸,别捣) 石龙芮(炒) 桂(去粗皮)各一两 肉苁蓉(酒浸,切,焙)三分 鹿茸(去毛,酥炙)一两 杜仲(去粗皮,炙,锉) 白茯苓(去黑皮) 熟干地黄(切,焙)各三分 附子(炮裂,去皮脐)一两 巴戟天(去心)半两 防风(去叉)三分 桑螵蛸(炙) 芎

芎各半两 山茱萸三分 覆盆子半两 补骨脂(微炒) 苁蓉茄各三分 五味子半两 泽泻一两 沉香 茴香子(微炒)各三分 薏苡仁(炒)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心以温酒送下,一日二次。

【主治】肾虚骨痹,肌体羸瘦,腰脚痠疼,饮食无味,小便滑数。

20522 石斛丸

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】石斛(去根) 肉苁蓉(酒浸,切,焙) 桂(去粗皮) 山茱萸 五味子 白茯苓(去黑皮) 山芋 泽泻 石龙芮 人参 木香 牛膝(酒浸,切,焙) 覆盆子(去梗) 柏子仁 菟丝子(酒浸,别捣) 熟干地黄(焙) 鹿茸(茄子者,去毛,酥炙) 附子(炮裂,去皮脐) 茴香子(舶上者,炒) 枳壳(去瓤,麸炒) 巴戟天(去心) 续断 木瓜各一两 槟榔(锉) 肉豆蔻仁 防风(去叉) 蒺藜子(炒去角) 蛇床子各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心煎姜、枣汤或盐汤、温酒任下。

【功用】利腰膝。

【主治】虚劳腰痛。

20523 石斛丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】石斛(去根) 黄耆(锉) 鹿茸(去毛,酒浸一宿,酥炙) 地骨皮 附子(炮裂,去皮脐)各一两 菟丝子(酒浸,别捣) 山茱萸各一两一分 远志(去心) 熟干地黄(焙) 菖蒲(米泔浸一宿,锉,焙) 防风(去叉)各三分 桂(去粗皮)半两 玄参一两

【用法】上药将十二味捣罗为末,入菟丝子末再罗,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒送下。以愈为度。

【主治】肾虚耳内作声,或如蝉噪,或如风

水声，诊其左手尺脉微而细，右手关脉洪而大。

【加减】妊娠人去桂、附，加蜀椒三分，丹参半两。

20524 石斛丸

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】石斛（去根） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 泽泻 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮） 鹿茸（酥炙，去毛） 山茱萸 山芋 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 白茯苓（去黑皮） 杜仲（去粗皮，炙，锉） 生干地黄（微炒）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎枣汤送下，不拘时候。

【主治】产后虚渴，或脱血过多，脏腑虚渴，骨节烦热，倦怠。

20525 石斛丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】石斛（去根） 远志（去心） 槟榔（煨，锉） 牛膝（酒浸一宿，焙） 桑螵蛸（炙焦再炒） 桂（去粗皮） 干姜（炮）各半两 五味子（炒） 覆盆子（微炒） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，切，焙） 巴戟天（去心，微炒） 枳壳（去瓢，麸炒） 柏子仁（研） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各二两 鹿茸一对（去毛，酥炙） 泽泻 白蒺藜（炒去角）各三分 天雄（炮裂，去皮脐） 菟丝子（酒浸，捣烂，焙三日）各二两

【用法】上为细末，和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【功用】平补诸虚不足。

20526 石斛丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】石斛（去根）一两 牛膝（酒浸一宿，焙干）一两 肉苁蓉（酒浸一宿，焙干）一两 杜仲（去粗皮）一两（姜汁浸，锉，炒） 金毛狗脊七钱半（燎去毛） 萆薢七钱半 木香一两 牡丹皮一两 人参（去芦

头）七钱半 黄耆一两 山茱萸七钱半 防风（去芦头）半两 羌活（去芦头）七钱半 川芎半两 槟榔一两半 熟干地黄一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【主治】风湿客搏经络，筋骨冷疼，四肢重痛。

20527 石斛丸

【方源】《朱氏集验方》卷八引庐山刘立方。

【组成】葫芦巴 萆薢 石斛 附子 巴戟（去心） 萆薢 茯苓 山药 沉香 鹿茸（蜜炙）各一两

【用法】上为细末，猪腰五味煮烂，同汁打米糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心米饮送下；酒亦可。

【主治】肾经积寒，丹田凝阴，小肠时痛，腰膝时冷，小便白浊，头晕耳鸣，或痰涎壅塞，身或倦怠，膈满怔忡，饮食化迟，肠鸣气走。

20528 石斛丸

《普济方》卷三十三。为《局方》卷五“金钗石斛丸”之异名。见该条。

20529 石斛丸

《普济方》卷二二一。为《圣济总录》卷一八七“鹿茸丸”之异名。见该条。

20530 石斛丸

《普济方》卷二三三。即《千金》卷十九“肾气丸”。见该条。

20531 石斛汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】石斛（去根） 附子（炮裂，去皮脐） 五味子 泽泻 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 黄耆 白茯苓（去黑皮） 人参各一两 槟榔半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】膀胱虚寒，小便频数，腰背及腹痛。

20532 石斛汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】石斛(去根, 锉)二两 苍术四两(米泔浸一宿, 切, 麸炒) 桔梗(锉, 炒) 陈橘皮(去白, 焙) 甘草(炙, 锉) 麻黄(去节) 骨碎补(去毛) 桂(去粗皮)各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞半, 加乌梅半个、生姜二片、大枣一枚(擘), 同煎至八分, 去滓, 稍热服。

【主治】虚劳, 身体疼痛, 发热羸瘦。

20533 石斛汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】石斛(去根) 附子(炮裂, 去皮脐, 切) 白术(锉, 炒) 秦艽(去苗土) 桂(去粗皮)各一两

【用法】上锉, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 加小麦五十粒, 同煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后虚热, 汗出不止。

20534 石斛汤

【方源】《医方大成》卷四引《济生》。

【组成】小草 石斛(去根) 黄耆(去芦) 麦门冬(去心) 生地黄(洗) 白茯苓(去皮) 玄参各一两 甘草(炙)半两

【用法】上咬咀。每服四钱, 水一盞半, 加生姜五片, 煎服, 不拘时候。

【主治】精实极, 眼视不明, 齿焦发落, 通身虚热, 甚则胸中烦疼, 夜梦遗精。

20535 石斛饮

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】石斛(去根) 当归(切, 焙) 人参 肉苁蓉(酒浸一宿, 切, 焙) 附子(炮裂, 去皮脐) 芎藭 桂(去粗皮)各半两 白茯苓(去黑皮) 熟干地黄(焙) 白术(米泔浸一宿, 锉, 炒令黄) 桑螵蛸(切破, 炙黄) 磁石(火煨醋淬二七遍)各一两 羊肾一对(批去筋膜, 炙令黄)

【用法】上咬咀, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】肾气虚损, 骨痿体瘦无力, 两耳聩聩, 甚即成聋, 短气不足。

20536 石斛酒

【方源】《千金》卷七。

【组成】石斛 丹参 五加皮各五两 侧子 秦艽 杜仲 山茱萸 牛膝各四两 桂心 干姜 羌活 芎藭 橘皮 黄耆 白前 蜀椒 茵芋 当归各三两 薏苡仁一升 防风二两 钟乳八两(捣碎, 别绢袋盛, 系大药袋内)

【用法】上咬咀, 以清酒四斗渍三日。初服三合, 日再稍稍加。以知为度。

【主治】风虚气满, 脚疼痹挛, 弱不能行。

【方论选录】《千金方衍义》: 石斛酒中大都皆祛风散结开痹和营药, 惟茵芋之大毒专主关节风湿痹痛, 钟乳之悍悍能通百节、利九窍, 使湿苑之毒从之开泄也。

20537 石斛酒

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】生石斛一斤 秦艽 远志各五两(去心) 橘皮 白术各三两 丹参 茯神 五加皮各六两 桂心四两 牛膝八两

【用法】上咬咀, 以酒三斗渍七日。一服六合, 稍加至七八合。以知为度。

【主治】脚气大下之后而四体虚寒, 脚中羸弱, 腰挛痛, 食饮减少, 皮肉虚疏。

20538 石斛酒

【方源】《幼幼新书》卷十三引《婴童方》。

【组成】石斛二分 牛黄 蜀椒(汗) 白术 细辛各四分 秦艽 紫石英 当归 干姜各八分 防风 杜仲 桂心 人参 黄耆 甘草(炙)各六分 独活十分 附子(炮) 地黄 防己各五分(一本无此, 有白鲜皮六分) 麦门冬七分

【用法】绢袋盛, 清酒五升半浸, 泥器口, 春、夏五日, 秋、冬十日。初服半合, 一日三次。稍加, 以知为度。

【功用】镇心止惊。

【主治】风挛, 两脚疼痛。

20539 石斛酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【异名】石斛浸酒(《圣济总录》卷五)。

【组成】石斛四两(去根) 黄耆二两 丹参二两 杜仲(去粗皮) 牛膝(去苗) 人参(去芦头) 五味子 白茯苓 山茱萸 薯蓣 草薢 防风(去芦头) 生姜各二两 枸杞子三两 天门冬三两(去心) 细辛一两 薏苡仁三两

【用法】上锉细,以生绢袋盛,用酒五斗,于瓷甕中浸之,七日开。初温服三合,一日二次。渐加至一盞为度。

【功用】补虚劳,益气力,利关节,坚筋骨。

【主治】①《圣惠》:腰脚痹弱,头面游风。

②《普济方》:腰痛强直,不可俯仰。

【备考】方中细辛用量原缺,据《普济方》补。

20540 石斛酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】石斛四两(去根) 丹参 芎藭 杜仲(去粗皮) 防风(去芦头) 白术 人参(去芦头) 桂心 五味子 白茯苓 陈橘皮(汤浸,去白瓢,焙) 黄耆 薯蓣 当归各二两 干姜二两(炮裂) 甘草一两(炙微赤) 牛膝三两(去苗)

【用法】上锉细,以生绢袋盛,用清酒五斗,于甕中渍,七日开。初温服三合,一日二次,渐加至一盞为度。

【主治】①《圣惠》:风虚劳,腹内冷,不多食。②《圣济总录》:脚气痹弱,筋骨疼痛。

20541 石斛酒

【方源】《奇效良方》卷一。

【组成】石斛四两 黄耆(去芦) 人参(去芦) 防风(去芦) 各一两半 朱砂(水飞) 杜仲(炒,去丝) 牛膝(酒浸) 五味子 白茯苓(去皮) 山茱萸 山药 草薢 各二两 细辛(去苗) 一两 天门冬(去心) 生姜各三两 薏苡仁 枸杞子各半升

【用法】上咬咀,并入朱砂末,用稀绢袋盛

药,以酒五斗,浸三日三夜后,温热酒随量饮之,不可断绝服,不拘时候。

【功用】补虚损。

【主治】心脏中风,下注腰脚,头面游风。

20542 石斛散

【方源】《外台》卷十六引《古今录验》。

【组成】石斛七分 桑螵蛸 紫菀各二分 干漆(熬) 五味子 干地黄 钟乳(研) 远志皮 附子各二分(炮)

【用法】上药治下筛。每服方寸匕,以酒送下,渐渐增至二匕,一日三次。

【主治】男子梦泄精。

【宜忌】忌猪肉、冷水、茺萸。

20543 石斛散

【方源】方出《千金》卷十二,名见《普济方》卷二二九。

【组成】甘草一斤 石斛 防风 苁蓉 山茱萸 茯苓 人参 薯蓣各四两 桂心 牛膝 五味子 菟丝子 巴戟天 芎藭各三两(并为末) 生地骨皮(切)一升 丹参二两 胡麻二升(以水二斗,煮取四升,去滓) 牛髓三升 生地黄汁一升 生姜汁一升 白蜜三升 生麦门冬汁三升

【用法】上药先煎地黄、地骨皮、胡麻汁减半;纳牛髓、蜜、姜、门冬等汁,微火煎,余八升;下诸药散,和令调匀,纳铜钵中,汤上煎令可丸,为丸如梧桐子大。每服三十丸,酒送下,一日二次,加至五十丸。

【主治】男子风虚劳损,兼时气。

【备考】本方方名,据剂型当作“石斛丸”。

20544 石斛散

【方源】《千金》卷十九。

【组成】石斛十分 牛膝二分 附子 杜仲各四分 芍药 松脂 柏子仁 石龙芮 泽泻 草薢 云母粉 防风 山茱萸 菟丝子 细辛 桂心各三分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕,酒下,一日二次;亦可为丸,以枣膏为丸,如梧桐子大,每服七丸,酒送下。

【功用】除风轻身，益气明目，强阴，令人有子，补不足。

【主治】饮酒中大风，露卧湿地，寒从下入，四肢不收，不能自反覆，两肩中疼痛，身重胫急，筋挛不可以行，时寒时热，足腠似刀刺，身不能自任，腰以下冷，子精虚，众脉寒，阴下湿，茎消，令人不乐，恍惚时悲。

【宜忌】《圣惠》：忌生冷、油腻、牛肉。

【加减】阴不起，倍菟丝子、杜仲；腹中痛，倍芍药；膝中疼，倍牛膝；背痛，倍萆薢；腰中风，倍防风；少气，倍柏子仁；蹶不能行，倍泽泻；随病所在倍三分。

【方论选录】《千金方衍义》：石斛散专主风虚诸证，故以石斛之治伤中除痹下气，补五脏虚劳羸瘦，强阴益精气，久服厚肠为主；佐以细辛，防风、萆薢、泽泻、柏仁、松脂、菟丝、云母，皆祛风逐湿开痹之味，石龙芮为风寒湿痹，心腹邪气、利关节止烦满之峻药，余俱调补肾肝，强阴益精之品，所以能令有子。

【备考】《圣惠》有鹿茸一两（去毛，涂酥炙令微黄）、巴戟一两。

20545 石斛散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】石斛一两（去根，锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 五味子三分 泽泻三分 当归三分（锉，微炒） 牛膝三分（去苗） 白茯苓三分 沉香三分 人参三分（去芦头） 桂心三分 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁） 黄耆三两 肉苁蓉一两（酒浸，去皱皮，微炒） 茴香子三分 枳实三分（麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】膀胱虚冷，两胁胀满，脚胫多疼，腰脊强痛，小便滑数。

20546 石斛散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】石斛一两半（去根，锉） 巴戟一两（去心） 桑螵蛸三分（微炒） 菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别杵为末） 杜仲

三分（去粗皮，炙微黄赤，锉）

【用法】上为细散，入菟丝末和匀。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】肾气虚损，小便余沥，梦遗白浊，阴痒腰背寒痛。

①《圣惠》：伤寒后肾气虚损，小便余沥，及夜梦失精，阴下湿痒。②《圣济总录》：阳气虚惫，小便白淫。③《普济方》：男子阴衰，腰背痛苦寒。

20547 石斛散

《圣惠》卷十九。为《千金》卷七“内补石斛秦艽散”之异名。见该条。

20548 石斛散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】石斛三分（去根，锉） 附子三分（炮裂，去皮脐） 白术三分 桂心 秦艽 黄耆三分（锉）

【用法】上为细散。每服一钱，以温水调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：风虚汗出不止。②《圣济总录》：肌瘦中风，汗出太多，致成寒中泣出。

20549 石斛散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】石斛一两半（去根，锉） 牛膝一两半（去苗） 五加皮一两 白术一两 山茱萸一两 天麻一两半 甘草一两（炙微赤，锉） 桂心一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 薏苡仁一两 独活一两 防风一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】肉极，身体津液大泄，为疔风。若下焦虚极，则脚膝缓弱。

20550 石斛散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】石斛（去根，锉） 麻黄（去根节） 丹参 牛膝（去苗） 侧子（炮裂，去

皮脐)各一两 桂心 沉香 当归 羌活 枳壳(麸炒微黄,去瓢) 草薢(锉)各三分 续断半两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】虚劳偏枯,手足不遂,筋脉拘急,骨节疼痛。

20551 石斛散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】石斛二两(去根,锉) 山茱萸一两 五味子半两 草薢三分(锉) 远志半两(去心) 桂心半两 人参一两(去芦头) 黄耆一两(锉) 当归三分 白茯苓三分 肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙令干) 附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】虚劳羸瘦,不能饮食,面色黄黑,手足多冷。

20552 石斛散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】石斛一两半(去根,锉) 黄耆一两(锉) 赤芍药三分 桑螵蛸一两(微炒) 鸡肫脰一两(微炒) 白龙骨三分 人参一两(去芦头) 牛膝一两(去苗) 麦门冬三分(去心) 熟干地黄一两 当归一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚劳手足烦疼,羸瘦无力,不能饮食,小便数。

20553 石斛散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】石斛一两(去根,锉) 肉苁蓉一两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 麦门冬二两(去心,焙) 白蒺藜半两(微炒) 甘草半两(炙微赤,锉) 干姜三分(炮裂,

锉) 桂心半两 熟干地黄二两 续断一两 黄耆三分(锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】大渴后,虚乏脚弱,小便数。

20554 石斛散

【方源】《普济方》卷二四三引《圣惠》。

【异名】内补石斛散(《圣济总录》卷八十一)。

【组成】石斛 附子(炮裂,去皮脐) 独活(去芦头) 天门冬(去心,焙) 桂(去粗皮)各四两 秦艽(去苗土) 乌头(炮裂,去皮脐) 人参 天雄(炮裂,去皮脐) 干姜(炮) 防风(去叉) 细辛(去苗叶) 杜仲(去粗皮,炒) 莽草(炙)各二两 当归(锉,焙)四两

【用法】上为散。每服二钱,温酒调下,日三夜一。

【主治】①《普济方》引《圣惠》:风痹脚弱,久服汤,虚弱而气未除,手足拘挛痹弱,小腹紧急,不能食、五劳七伤,肾气不足。②《普济方》:风湿痹,脚弱拘挛疼痛,不能行,跌踵肿胀。

20555 石斛散

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】石斛(去稍黑者)一两 山茱萸 五味子 草薢各一两 肉苁蓉(酒洗,去皱皮,切,炙)一两半 远志(去心) 人参 桂(去粗皮)各一两 菟丝子一两半(酒浸一宿,别捣) 秦艽(去苗土)一两一分 赤茯苓(去黑皮)三分 蜀椒(去目并闭口者,炒出汗)一两

【用法】上为散。每服二钱匕,空腹温酒调下,日午、夜卧再服。

【主治】虚劳腹中拘急,食不生肌肉,面色黑黄,手足疼痛,小便不利。

20556 石斛散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】石斛(去根) 仙灵脾(锉)各一

两 苍术(米泔浸,切,焙)半两

【用法】上为散。每服三钱匕,空心米饮调下,一日二次。

【主治】雀目,昼视精明,暮夜昏暗,视不见物。

20557 石斛散

《鸡峰》卷七。为《千金翼》卷十五“大补益散”之异名。见该条。

20558 石斛散

【方源】《本事》卷二。

【组成】石斛四钱(去根,净洗,锉细,酒炒) 牛膝(酒浸,水洗,焙干) 柏子仁(去皮,研) 五味子(拣) 远志(去心苗,洗,锉,炒黄色) 木香 杏仁(去皮尖,炒令香熟) 肉苁蓉(酒浸,水洗,焙干) 诃子肉(炮) 青橘皮 柴胡(去苗,净洗) 人参(去芦) 熟地黄(酒洒,九蒸九晒,焙干)各三钱 茯苓四钱(去皮) 甘草二钱(炙) 干姜一钱半(炮) 神曲(碎,炒) 麦蘖各六钱

【用法】上为细末。每服二钱,食前米饮调下,一日二三次。

【主治】虚劳,羸瘦乏力,少食倦怠,多惊畏。

【方论选录】《本事方释义》:石斛气味甘平微苦咸,入足厥阴少阴;茯苓气味甘平,淡渗入胃,能引诸药达于至阴之处;柏子仁气味苦辛微温,入足厥阴;牛膝气味酸咸平,入肝;远志气味辛温,入手足少阴;木香气味辛温,入手足太阴;五味子气味酸咸微温,入肾;杏仁气味苦辛微温,入肺;肉苁蓉气味咸温,入肾;诃子气味苦温微涩,入手阳明、手足太阴;陈橘皮气味辛温微苦,入手足太阴;柴胡气味辛平,入足少阳;人参气味甘温,入脾胃;熟地黄气味甘寒微苦,入肾;甘草气味甘平,入脾,能行十二经络;干姜气味辛温,入手足太阴;神曲气味甘温,入脾胃;麦蘖气味甘平,入脾胃。此因虚劳不复,神倦多惊,以补足三阴之药固其本,佐以清

肺平肝、驱除陈腐之药,则病去而元自复矣。

20559 石斛散

【方源】《普济方》卷二二二。

【组成】石斛 山茱萸 肉苁蓉 牛膝 五味子各六分 附子四分(炮) 远志六分(酒浸,去心) 桂心四分 人参 茯苓各六分 秦艽四分 菟丝子八分(酒渍)

【用法】上为散。每服方寸匕,食前以酒送下,早、午、晚各一次。

【主治】男子七伤,面目黄黑,饮食不生肌肉,手足悁疼,少腹里急,小便不利。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱、酢物。

20560 石斛散

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】柴胡 防风 北五味 黄耆 小草 官桂 白术(麸炒) 石斛 甘草(炙) 茯苓各等分

【用法】上吹咀。每服一两,水二盏,加生姜三片,煎至一盏,去滓,食前温服。

【主治】虚盗汗。

20561 石斛散

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】人参 枣仁 茯神 远志 白芍 石斛 麦冬 炙草 五味子

【用法】桂圆汤下。

【主治】产后血虚惊悸。

20562 石斛露

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】石斛

【用法】蒸,取露。用以代饮。

【功用】养胃阴,平胃逆,除虚热,安神志。

【主治】温热痧症之后,津液伤残,虚火内炽,及真阴素亏,胃热不清者。

20563 石淋散

【方源】《续名家方选》。

【组成】浮石 阿胶各一钱 木通 甘草各五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】砂石淋。

20564 石绿散

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】石绿 白芷各等分

【用法】上为末。先以生甘草水洗疮，拭干敷药。一日愈。

【主治】肾疳，耳上生疮，及肥疳，头疮鼻烂，浸久不愈者。

20565 石葛汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】石膏五两 葛根（锉） 生姜（锉）各五钱

【用法】上锉。每服五钱，水煎温服。

【主治】饮酒过多，大醉难醒。

20566 石粟膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】石灰二两 粟米二合

【用法】将石灰罗细，同粟米纳瓶中，以水浸经三宿，取出研如膏，晒干重研如粉，以面脂调匀，入瓷盒中盛。每洗面讫，拭面涂之。

【主治】面粉皴，痒痛如麻子。

20567 石榴丸

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】石榴皮（焙，锉） 橡实 附子（炮裂，去皮脐）各二两 无食子四枚 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 干姜（炮）各一两半

【用法】上为末，米饮和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前生姜汤送下，一日二次。

【主治】久痢成疳，便下白色，食不为肌肤。

20568 石榴汁

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】醋石榴一枚（大者）

【用法】捣研绞取汁，空心服。

【主治】①《圣济总录》：久痢不愈，肠垢出。②《卫生总微》：小儿泻下五色。

20569 石榴汤

【方源】《外台》卷二十六引《广济方》。

【异名】石榴根汤（《圣济总录》卷九十九）。

【组成】醋石榴根（东引者）一大握 茺萸

三两 牵牛子半两（熬末）

【用法】以水六升，煮取二升，去滓，别和牵牛子末，分三次服，每服如人行五里更服。尽快利，虫亦尽死出。

【主治】寸白虫，虫如马薊叶大，于下部出不尽，令人渐渐羸瘦。

【宜忌】忌生冷、猪、鱼、牛肉、白酒、葵笋等。

20570 石榴汤

【方源】《普济方》卷二二九引《圣惠》。

【组成】酸石榴根（南引者，掘取洗净，细锉）半升

【用法】用水五升，煎取半碗以下，去滓。五更腹空时，先炙猪肉，随意吃下引虫，不可过饱，然后温服此药。只作一服，虫自取下。吃白粥一日补之。

【主治】寸白虫，蛔虫。

20571 石榴汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】酸石榴一枚（大者） 黄连（去须）一两 干姜（炮）二两

【用法】上咬咀。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，加阿胶二片令烊，顿服之，不拘时候。

【主治】冷利洞泄及赤白滞痢。

20572 石榴浆

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】新生酸石榴（每于五月内，拣取东南枝上平坐不侧大者）

【用法】于顶上用箸扎眼子，深一寸以上，用水银半两灌眼子内，更不封闭，从风日雨露直至十月叶落尽，方取下，壳内尽成水。每用以小猪胞代指，于汁内旋蘸拈之。随手以水濯，其色不落，可百日不变也。

【功用】荣养髭鬓。

20573 石榴散

【方源】方出《圣惠》卷五十七，名见《圣济总录》卷九十九。

【组成】酸石榴根一两（锉） 干漆一两

(捣碎, 微炒) 狼牙一两 鹤虱一两 槟榔一两

【用法】上为细散。每服二钱, 空心以温酒调下, 良久更再服。虫当下。

【主治】蛲虫。

20574 石榴散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】酸石榴皮 陈橘皮(汤浸, 去白) 甘草(微炙, 锉) 干姜(炮) 各等分

【用法】上药焙干为散。每服二钱匕, 陈米饮调下, 一日三次。

【主治】结阴泻血不止。

20575 石榴散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】酸石榴一枚 白矾一两

【用法】上用酸石榴札作窠子, 纳白矾, 慢火内深焙, 烧半日存性, 为散。贴之, 取愈为度。

【功用】止痛生肌。

【主治】诸疮。

20576 石榴散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】酸石榴一枚(大者) 黄连(宣州者, 去须) 白矾(熬) 各一两 谷精草半两(炒焦)

【用法】先将石榴割下盖子, 去里面子, 三分取出一分, 次将黄连、白矾同拍碎, 入在石榴内, 却用盖子掩定, 湿纸裹, 胶泥固济, 炭火煨赤, 候冷去泥, 与谷精草同研极细, 入麝香一钱和匀。每服一钱匕, 空心热酒调下。

【主治】牡痔, 肛边生鼠乳。

20577 石榴煎

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】酸石榴五枚(大者, 于木杵臼中捣碎, 入酒中煎) 防风(去芦头) 羌活 芎藭 天麻 羚羊角屑 五加皮 仙灵脾 子芩 牛膝(去苗) 附子(去皮脐) 薏苡仁 天蓼木子 丹参 桂心 木香各一两

(上十六味捣罗为末) 竹沥 梨汁 薄荷汁 牛蒡汁 白蜜各五合

【用法】以无灰酒五升, 先煎石榴至三升, 滤去滓; 次下诸药末, 以柳木篦搅; 次下竹沥、白蜜等五味, 仍不住手搅, 令稀稠得所, 以瓷器盛。每服一茶匙, 空心及晚食前以温酒调下。

【主治】一切风。

【宜忌】忌生冷、猪、鸡、鱼、粘滑动风物。

【备考】《医方类聚》有白附子, 无子芩。

20578 石碱丸

《医学入门》卷七。为《丹溪心法》卷三“小阿魏丸”之异名。见该条。

20579 石碱丸

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】海粉 三棱 蓬术(醋炙) 五灵脂 红花 香附 石碱 瓦龙子(火淬)

【用法】上为末, 醋糊为丸, 如梧桐子大。白术汤送下。

【主治】血症。

20580 石碱丸

【方源】《经验良方》。

【组成】石碱八钱 芦荟 大黄各二钱

【用法】上为末, 取二厘为一丸。每服十五丸, 日数次。

【主治】黄疸并肝脾闭塞。

20581 石碱膏

【方源】《经验良方》。

【组成】石碱 密陀僧各七十二钱 黄蜡十二钱

【用法】上文火炼和, 下火而俟稍冷, 加龙脑一钱, 麻油少许, 研和为膏。贴患部。

【主治】癰疾, 足心等腐蚀者。

20582 石脂散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】干姜 厚朴 甘草 木香 青皮 肉豆蔻各半两 枳实 槟榔 益智 三棱 陈皮 蓬莪术 桂各一两

【用法】上为细末。加盐少许, 生姜三片, 大枣一个, 水一盞, 药二钱, 同煎至七分, 去

滓，食后温服。

【主治】膈脘痞闷，吐沫食少。

20583 石膏丸

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】石膏一两（细研，水飞过） 栝楼根一两 乌梅肉一两 葛根一两（锉） 牡蛎粉一两 麦门冬一两半（去心，焙） 天竺黄一两（细研） 麻黄根一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以新汲水送下，不拘时候。

【主治】心脏壅热，口舌干燥，常多汗出。

20584 石膏丸

【方源】《圣惠》卷三十九。

【组成】石膏一两（细研，以水飞过） 马牙消半两 太阴玄精石半两 硫黄半两 雄黄半两 朱砂半两

【用法】上为细末，加麝香末一钱，重研令匀，用汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五丸，葱汤送下，不拘时候。

【主治】头痛不止，心神烦闷。

20585 石膏丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】石膏二两（细研，水飞过） 甘菊花一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 防风二两（去芦头） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 郁李仁一两（汤浸，去皮尖，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后及夜临卧时以温水送下。

【主治】痰厥头痛，目眩，心膈不利。

20586 石膏丸

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】石膏（碎） 麦门冬（去心，焙） 龙齿（别研） 人参 升麻 玄参 茯神（去木） 黄芩（去黑心）各一两 银箔一百片（与石膏、龙齿同研） 枳壳（去瓢，麸炒）三分 白薇（锉） 赤芍药 萎蕤各一分 虎睛一对（炙） 甘草（炙，锉）半两

【用法】上药除别研外，为末和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，一日三次。

【主治】中风邪，惊悸心不安。

20587 石膏丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】石膏（煨通赤，净地出火毒，以器覆之）一两 白附子（炮）一分半 铅霜（研） 丹砂（研） 龙脑（研）各一分

【用法】上为细末，薄荷汁煮面糊为丸，如梧桐子大，丹砂为衣。每服二丸，好茶嚼下。

【主治】风盛痰壅，头疼不止。

20588 石膏丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】石膏（研） 菊花 防风（去叉） 葛根（锉）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，食后、临卧熟水送下。

【主治】风毒上攻头痛。

20589 石膏丸

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】石膏（细研，水飞过）四两 乌头（去皮脐，生用）一两 消石（研）一两半 太阴玄精石（研）二两

【用法】上为末，和匀如粉，以生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，荆芥茶送下。甚者不过三服。

【主治】①《圣济总录》：伤寒，头痛痰盛。②《鸡峰》：偏正头痛，恶心痰逆。

20590 石膏丸

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】石膏（别研入） 麦门冬（去心，焙） 栝楼根 茯神（去木） 知母（焙） 黄连（去须） 枸杞根皮 白茯苓（去黑皮）各一两 胡粉（炒黄色）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下，晚食前再服。或作散，每服二钱匕，冷熟水调下。

【主治】痢后渴不止。

20591 石膏丸

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】石膏一两 硫黄一两 消石一两
(合硫黄同研) 天南星一两(用生姜一两同捣)

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。
每服五十丸,食前米饮送下,一日二次。

【主治】肺厥头痛及肾虚咳嗽,烦闷遗尿。

20592 石膏丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】石膏(别研) 白附子(炮) 半夏(汤洗七次) 川芎 天南星(炮) 白僵蚕(炒去丝) 菊花(拣净) 陈皮(去白) 旋复花 天麻各一两 全蝎(炒)半两

【用法】上为细末,生姜汁浸,蒸饼为丸,如梧桐子大。每服五十丸,渐加至一百丸,食后生姜汤送下。

【主治】诸风痰涎,头痛目眩,眩晕欲倒,心忪悸动,恍惚不宁,神思昏愤,肢体倦疼,颈项强硬,手足麻痹。常服治偏正头痛。

【宜忌】忌粘滑、生硬等物。

20593 石膏丸

【方源】《医学正传》卷二。

【组成】石膏(煨)

【用法】上为细末,醋为丸,如绿豆大。清米饮送下。

【功用】泻胃火并食积痰火。

【备考】《济阳纲目》:每服三四十丸。

20594 石膏丸

【方源】《简明医彙》卷四。

【组成】软石膏一斤(火煨红,倾入无灰白酒、米泔、水各一碗内,如此三次) 土山药(如手者,湿纸裹,煨熟,晒燥)四两 蚌壳(火煨)二两

【用法】上为极细末,水叠丸或末服。早、晚大麦汤送下,或蜜为丸噙。

【主治】久近痰火。

20595 石膏汤

【方源】《外台》卷一引《深师方》。

【异名】三黄石膏汤(《伤寒总病论》卷五)。

【组成】石膏 黄连 黄柏 黄芩各二两 香豉一升(绵裹) 梔子十枚(擘) 麻黄三两(去节)

【用法】上切。以水一斗,煮取三升,分三次服,一日并服出汗。初服一剂小汗,其后更合一剂,分两日服,常令微汗出,拘挛烦愤即愈。得数行利,心开令语,毒折也。

【主治】①《外台》引《深师方》:伤寒病已八九日,邪攻内而表未解,三焦热,其脉滑数,昏愤,身体壮热,沉重拘挛,或时呼呻,体犹沉重拘挛。②《伤寒总病论》:伤寒发汗或下或误吐后,三焦热,脉候洪数,谵语不休,昼夜喘息,鼻中屢衄而疾势不解,身目如发黄,狂躁欲走。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

【方论选录】①《外台》引《深师方》:今直用解毒汤,则牵急不愈;直用汗药,则毒因加剧。而方无表里疗者,意思以三黄汤以救其内,有所增加以解其外,故名石膏汤。②《医方集解》:此足太阳、手少阳药也。表里之邪俱盛,欲治内则表不除,欲发表则里又急,故以黄芩泻上焦之火,黄连泻中焦之火,黄柏泻下焦之火,梔子通泻三焦之火,而以麻黄、淡豉发散表邪,石膏泻胃火,能解肌,亦表里分消之药也。

20596 石膏汤

【方源】《千金》卷五。

【异名】石膏散(《圣惠》卷八十三)。

【组成】石膏一合 麻黄八铢 甘草 射干 桂心 芍药 当归各四铢 细辛二铢

【用法】上咬咀。以水三升半,先煮麻黄三沸,去上沫,纳余药,煮取一升,三岁儿分四次服,一日三次。

【主治】小儿中风恶,瘖不能语,口眼了戾,四肢不随。

20597 石膏汤

【方源】方出《千金》卷五，名见《医部全录》卷四二〇。

【组成】大黄 黄芩 甘草 芒消 麦门冬各半两 石膏一两 桂心八铢

【用法】上㕮咀。以水三升、煮取一升半，分三次服，一岁以下小儿作五次服。

【主治】小儿腹大短气，热有进退，食不安，谷不化。

20598 石膏汤

【方源】《千金》卷七。

【组成】石膏 龙胆 升麻 芍药 贝齿 甘草 鳖甲 黄芩 羚羊角各一两 橘皮当归各二两

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，分三次服。

【主治】脚气风毒，热气上冲头面，面赤筋急，鼻塞去来，来时令人昏愤，心胸恍惚，或苦惊悸，身体战掉，手足缓纵或酸痹，头目眩重，眼反鼻辛，热气出口中，或患味甜，诸恶不可名状者。

20599 石膏汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】石膏（鸡子大）三枚 麻黄三两 杏仁四十枚 鸡子二枚 甘草一尺

【用法】上㕮咀。以水三升，破鸡子，纳水中烱令相得，入药煮取一升服之。覆取汗，汗不出，烧石熨取汗出。

【功用】逐风毒。

【宜忌】《普济方》忌海藻、菰菜。

【方论选录】《千金方衍义》：麻黄、杏仁得石膏清解之力，则风毒外散；石膏、甘草得鸡子润燥之功，则热毒内化。乃知麻杏甘石汤不独分解邪热，又添化毒之用也。

20600 石膏汤

【方源】《千金》卷十三。

【异名】石膏散（《圣惠》卷四）。

【组成】石膏一斤 地骨皮五两 梔子仁三七枚 淡竹叶一升 茯苓三两 小麦三升

香豉一升

【用法】上㕮咀。先以水一斗五升，煮小麦、竹叶，取八升澄清，下诸药，煮取二升，去滓，分三次服。

【主治】心热实，或欲吐，吐而不出，烦闷喘急头痛。

【备考】本方方名，《外台》引作“泻心汤”，《普济方》引作“竹叶汤”。

20601 石膏汤

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】石膏三两 黄连一两（去须） 黄柏一两 黄芩一两 豉二两 梔子仁一两 麻黄一两（去根节） 川大黄二两（锉碎，微炒） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上锉细和匀。每服半两，以水一大盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服，如人行十里再服。以微利为度。

【主治】伤寒病九日，曾经发汗吐下未解，三焦生热，其脉滑数，昏愤沉重，欲入百合状证。

20602 石膏汤

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】石膏二两 知母 地骨皮 甘草（炙微赤，锉） 人参（去芦头）各一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加粳米一百粒，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒，已大汗，后下利，其人频渴不解，其脉洪大。

20603 石膏汤

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】麦门冬一两（去心） 石膏二两 芦根一两（锉）

【用法】上为散。每服半两。以水一大盏，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】热极渴不止。

20604 石膏汤

【方源】《博济》卷一。

【组成】石膏一两 麻黄一两(去根节) 何首乌五钱 干葛三分

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，加生姜一片，同煎至八分，温服。

【主治】伤寒头痛不可忍者。

20605 石膏汤

【方源】《伤寒微旨》卷上。

【组成】石膏三两 芍药 柴胡各一两 升麻 黄芩 甘草各三分

【用法】上为末。每服三钱，水一盞半，加豉一合，煎八分，去滓热服。芒种以后至立秋以前服。

【主治】伤寒阳盛阴虚，邪气在表，脉浮数，或紧或缓，其脉上出鱼际，寸脉力大于关尺，发热冒闷，口燥咽干者。

【加减】如三五服后热不解，加知母一两；又未解，加大青一两。

20606 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】石膏(碎)一两 麻黄(去根节，煎，掠去沫，焙干)一两半 芎藭 芍药 桂(去粗皮) 黄芩(去黑心) 甘草(炙) 人参 当归(切，焙) 防风(去叉) 各半两 杏仁十五枚(汤浸，去皮尖双仁，炒)

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜半分(切片)，煎至八分，去滓，空心、午时、夜卧各一服。后吃热生姜葱薤稀粥，取微汗出。

【主治】肝脏中风，筋脉拘挛，手足不随，或缓或急。

【宜忌】慎外风。

20607 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】石膏(碎)三分 滑石半两 白茅根(锉) 篇蓄(锉) 各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食后热服。

【主治】中风，头痛烦热，口干，小便赤。

20608 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】石膏(碎) 枳壳(去瓤，麸炒) 羌活 防风(去叉) 菊花 旋复花 芎藭 各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盞，加生姜三片，薄荷五叶，同煎取七分，去滓，食后温服。

【主治】风头痛。

20609 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】石膏(碎) 莎草根(炒去毛) 天麻 藿香叶各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加腊茶半钱匕，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】头痛。

20610 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】石膏 甘草(炙) 麻黄(去根节，煎，掠去沫，焙) 桂(去粗皮) 芍药 各二分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大(拍碎)，煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】中风伤寒，头痛，四肢疼痛，身体沉重。

20611 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】石膏(碎)二两 葛根(锉) 栀子仁 柴胡(去苗) 赤芍药各一两 甘草(炙，锉)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大(拍碎)，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气头痛壮热。

20612 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】石膏(碎)一两 葛根(锉)三分 芍药 贝母(去心) 百合 升麻各半两 梔

子仁 甘草(炙)各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，加豆豉五十粒，葱白三寸，同煎至一盞，去滓温服。

【主治】时行疫疠病，壮热头痛，唇干。

20613 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】石膏二两 人参 贝母(炮，去心)各半两 麦门冬(去心，焙) 赤茯苓(去黑皮)各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加竹叶三七片，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒肺热，咳嗽头痛。

20614 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】石膏一两半 麻黄一两(去根节) 桂(去粗皮)半两 葛根一两 黄连(去须)三分 故鞋一只(去土，细锉) 蜀椒(去目并闭口，炒出汗)一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓温服。衣覆取汗。

【主治】伤寒发黑斑。

20615 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】石膏(碎)二两 柴胡(去苗) 虎杖各一两 知母(焙)半两 芍药一两 山梔子仁三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒天行，壮热头痛，发疮如豌豆。

20616 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】石膏(碎) 前胡(去芦头)各一两 犀角(镑) 防风(去叉) 芍药各半两 龙齿(研)三分 牛黄(研)一钱

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加豉一百粒，葱白五寸，煎至八分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒刚痉，身热仰目，头痛项强。

20617 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】石膏二两(研) 荆芥穗一两 青竹茹半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒后阴阳易，头痛壮热。

20618 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】石膏(碎)二两 白秫米五十粒 常山(锉)三分 一方加乌梅肉二七枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞半，加淡竹叶七片(细锉)，煎至一盞，去滓，空腹温饮一服，欲发时一服，正发时一服。三服訖，净室中卧，勿与人语。过发时后，即得洗手面及饮食。久疟不过再剂。

【主治】疟症。

【宜忌】七日内禁房室及酒面。

20619 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】石膏二两 麦门冬(去心，焙) 升麻各一两半 桔梗(去芦头，切，炒) 甘菊花(择去梗) 黄耆(薄切)各一两 人参半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】心虚悸，头项热痛，狂走言语无度，小腹气壅。

20620 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】石膏四两(碎研) 人参 知母(焙) 赤石脂 梔子(去皮) 芍药 白术 茯神(去木) 紫菀(洗，切)各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，加竹沥少许、生地黄汁一合，更煎一两沸，食后温服。

【主治】心实热，梦多惊恐，畏惧不安。

【加减】若要利，加芒消一两，去芍药。

20621 石膏汤

《圣济总录》卷四十四。为《圣惠》卷五

“石膏散”之异名。见该条。

20622 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】石膏 麻黄(去根节,汤煮,掠去沫) 桑根白皮(锉,炒) 甘草(炙,锉) 款冬花(去梗,焙) 熟干地黄(炒) 各一两 麦门冬(去心,焙) 桔梗(炒) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,加竹叶少许,水一盞,煎至七分,去滓温服,日三夜一。

【主治】肺胀。

20623 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】石膏(碎) 山梔子(去皮) 赤茯苓(去黑皮) 甘草(炙,锉) 木通(锉) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服。

【主治】膀胱实热,小便癃闭,舌燥引饮,烦闷。

20624 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】石膏四两 地骨皮三两 栝楼根二两半 麦门冬(去心,焙) 三两 茯神(去木) 知母(焙) 萎蕤各二两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水二盞,加竹叶二十片、生地黄半分(切)、生姜三片,大枣二枚(擘破),同煎至一盞,去滓,食后温服,一日三次。

【功用】清热止渴。

【主治】渴利,虚热引饮不止。

20625 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】石膏(碎) 一两半 知母(焙) 一两半 犀角(镑屑) 一两 升麻三分 栝楼根(生者,削去皮,细切,可半斤,烂研,生布绞取汁) 两合半(如无,以干者四两代之) 土瓜根(绞取汁) 两合半(无生者,以干者四两代之)

【用法】上药除汁外,为粗末。每服三钱匕,二药汁各半合,水一盞半,加小麦少许,同煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】消渴后成痼症。

20626 石膏汤

《圣济总录》卷六十九。为方出《千金》卷十二,名见《普济方》卷一九〇“石膏散”之异名。见该条。

20627 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【组成】石膏五两 葛根(锉) 生姜(细切) 各三两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水二盞,煎至一盞,去滓温服,不拘时候。

【主治】饮酒过多,大醉不醒。

20628 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】石膏(碎) 知母(焙) 芍药 半夏(生姜汁制) 独活(去芦头) 桂(去粗皮) 白术 防风(去叉) 甘草(炙) 各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,酒少许,加生姜二片,同煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后中风,烦热,身体拘急,头目昏痛。

20629 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】石膏二两 黄芩(去黑心) 一两半 前胡(去芦头) 葛根各二两半 升麻 桑根白皮(锉) 荆芥穗各一两半 赤芍药 柴胡(去苗) 各二两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,豉十粒,同煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后伤寒,时行瘟疫,壮热恶风,头疼体痛,鼻塞咽干,心膈烦满,寒热往来,咳嗽痰壅。

20630 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】石膏(碎)一钱 白术半两 麻黄(去根节) 桔梗(炒) 甘草(炙) 水萍(晒干) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水半盏,加葱白少许,煎至三分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿伤寒,头痛肌热,喘粗喉鸣。

20631 石膏汤

《圣济总录》卷一七四。为《千金》卷五“二物石膏汤”之异名。见该条。

20632 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】石膏(别捣,研)一两一分 大黄(锉,炒)一两半 柴胡(去苗)一两一分 升麻 知母(焙) 黄芩(去黑心) 芍药 枳实(去瓤,麸炒)各三分 甘草(炙)一两半 大青半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盏,加生姜少许,同煎至六分,去滓,分三次温服。

【主治】小儿痰实,壮热头痛。

20633 石膏汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】石膏 大青各三两 黄芩(去黑心) 升麻 芍药各二两

【用法】上为粗末。每用五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓,分二次温服。

【主治】乳石发,大热,心腹满胀。

【加减】如腹痛,加续断二两。

20634 石膏汤

【方源】方出《本事》卷一,名见《普济方》卷十五。

【组成】麻黄(去根节) 钓藤(取皮) 石膏(雪白硬者,不煨) 干葛 半夏曲 柴胡(去苗,洗) 甘草(炙) 枳壳(去瓤,麸炒黄) 甘菊(去萼梗)各等分

【用法】上为粗末。每服四钱,水一盏半,加生姜三片,大枣一个,同煎至八分,去滓

温服。

【主治】肝厥,状如痢疾,不醒,呕吐,醒后头晕发热。

20635 石膏汤

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】石膏 独活(去芦) 川升麻各一两 麻黄(去根节) 桂枝 赤芍药 防风(去芦并叉枝) 细辛(去苗)各半两 甘草一分

【用法】上为末。每服一大钱,水一盏,加薄荷、竹叶各数片,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿中风口噤,颌颊紧急,冥冥如醉。

20636 石膏汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】石膏二两 知母半两 白芷七钱

【功用】解利伤寒。

【主治】伤寒身热。

20637 石膏汤

【方源】《岐子保命集》卷下。

【组成】石膏 葛根 麻黄各五钱 黄芩 芍药 甘草各七钱

【用法】上锉细。每服七钱,加生姜,同煎服。

【主治】伤寒汗下后,头痛不止者。

20638 石膏汤

【方源】《普济方》卷一三六。

【组成】石膏二两(碎,绵裹) 防风二两 葛根一两 芍药一两 前胡一两 葱白(并根)三茎 生姜二两(切)

【用法】以水七升,先煮葛根,减二升,去上沫,纳诸药,煮取三升,去滓,温服一升,一日三次。

【主治】太阳病,气逆,面赤,头痛目疼不可忍者。

20639 石膏汤

【方源】《普济方》卷二六一。

【组成】石膏八两 茯神 蒺藜 黄芩各四两 橘皮 干蓝 五味子 麻黄(去根

节) 甘草(炙) 犀角屑各二两 杏仁(汤浸, 去皮尖, 锉碎) 梔子各三两

【用法】上切。以水八升, 煮取三升, 分服之愈。

【主治】心忪热, 烦闷如火, 气上。

20640 石膏汤

《普济方》卷三四六。即《千金》卷二“单行石膏汤”。见该条。

20641 石膏汤

【方源】《痘科类编》卷三。

【组成】石膏一两 梔子 大青 升麻 芒消各一钱五分 豆豉一合 葱白五根 生姜五钱

【用法】水一钟半, 煎七分, 去滓, 入芒消, 候温, 徐徐服之。

【主治】阳明胃实, 或下, 或下之太早, 胃烂发斑及时气发斑者。

20642 石膏汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】石膏 白芍药 柴胡 升麻 黄芩 甘草 白术 茯苓 附子

【主治】阳虚寒湿之眩晕。

20643 石膏汤

《疡医大全》卷十六。为《赤水玄珠》卷三“经验石膏汤”之异名。见该条。

20644 石膏饮

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】石膏(碎) 淡竹叶各三两 常山 甘草(生·锉) 乌梅各二两 梗米半合

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 煎至一盞, 去滓温服。吐痰即愈。

【主治】一切痰症。

【加减】如热盛, 加大黄一两。

20645 石膏茶

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】石膏二两(捣碎) 淡竹叶一握, 茱萸半两 木通半两

【用法】上锉细。以水二大盞, 煎至一盞, 去滓, 分作四服。点腊面茶, 不拘时候服。

【主治】热病, 头疼壮热, 心燥烦渴。

20646 石膏茶

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】石膏二两(捣末) 紫笋茶(碾为末)

【用法】上以水一中盞, 先煎石膏末三钱, 煎至五分, 去滓, 点茶服之。

【主治】伤寒头疼烦热。

20647 石膏散

【方源】方出《肘后》卷二, 名见《医心方》卷十二引《录验方》。

【异名】石膏甘草散(《伤寒总病论》卷五)、石草散(《松峰说疫》卷二)。

【组成】甘草二两 石膏二两

【用法】上为末。每服方寸匕, 以浆送下, 一日二次。

【功用】①《医心方》引《录验方》: 止汗。②《圣济总录》: 止烦。

【主治】大病愈后多汗, 湿温多汗。

①《肘后方》大病愈后多虚汗。②《圣济总录》: 金疮烦闷。③《伤寒总病论》: 湿温多汗, 妄言烦渴。

【宜忌】《外台》引《延年秘录》: 忌海藻菘菜。

20648 石膏散

【方源】方出《外台》卷十三引《崔氏方》, 名见《妇人良方》卷五引《灵苑方》。

【组成】石膏十两

【用法】研如乳粉。法水和服方寸匕, 一日二次, 以体凉为度。

【主治】①《外台》引《崔氏方》: 虚劳内蒸, 外寒内热, 骨肉自消, 食饮无味, 或皮燥而无光, 四肢渐细, 足趺肿起。②《医方考》: 热劳, 附骨蒸热, 四肢微瘦, 有汗脉长者。

【宜忌】①《准绳·女科》引《灵苑方》: 非实, 能食, 大便实者不可服。②《医方考》: 若新产失血、饥困劳倦之病, 合禁用之。

【方论选录】《医方集解》: 石膏大寒质重, 能入里降火; 味辛气轻, 能透表解肌; 虽寒

而甘，能缓脾益气。火劳有实热者，非此不为功。

【临证举例】骨蒸内热 《妇人良方》引《名医录》：睦州杨寺丞有女事郑迪功。女有骨蒸内热之病，时发外寒，寒过内热附骨。蒸盛之时，四肢微瘦，足跗肿者，其病在五脏六腑之中，众医不愈。因遇处州吴医看曰：请为治之。只单用石膏散服之，体微凉如故。

20649 石膏散

【方源】《深师方》引武家黄素方。（见《外台》卷十四）。

【组成】石膏二两（研） 甘草一两（炙）

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下，可以七服。

【主治】①《深师方》引武家黄素方：柔风体疼，白汗出。②《普济方》：若暴中风，自汗出如水者。

20650 石膏散

【方源】方出《千金》卷十，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷六。

【组成】滑石 石膏各等分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，以大麦粥汁送下，一日三次。小便极利则愈。

【主治】女劳疸，日晒所发热恶寒，小腹急，身体黄，额黑，大便溏黑，足下热。

20651 石膏散

【方源】方出《千金》卷十二，名见《普济方》卷一九〇。

【异名】石膏汤（《圣济总录》卷六十九）。

【组成】石膏四两 厚朴三两 麻黄 生姜 半夏 五味子 杏仁各二两 小麦一升

【用法】上咬咀。以水一斗，煮麻黄去沫，澄取七升，纳药，煮取二升半，分二次服。

【主治】①《千金》：噫，唾血。②《圣济总录》：心肺有热，唾血不止。

20652 石膏散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】石膏二两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 黄芩一两 麦门冬一两（去心） 前

胡一两（去芦头） 甘菊花一两 地骨皮一两 羚羊角屑一两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】肝脏壅热，上攻头目不利，心烦口干。

【宜忌】忌炙煨。

20653 石膏散

《圣惠》卷四。为《千金》卷十三“石膏汤”之异名。见该条。

20654 石膏散

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】石膏汤（《圣济总录》卷四十四）。

【组成】石膏一两 麦门冬一两半（去心） 柴胡一两（去苗） 犀角屑一两 栝楼根一两 地骨皮一两 葛根十两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，加竹叶二七片，煎至六分，去滓，入蜜半合，生地黄汁二合，搅令匀，食后分二次温服。

【主治】脾实热，头痛胁满，烦闷或渴，唇口干燥。

20655 石膏散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】石膏二两 桂心一两 麻黄一两（去根节） 杏仁二十枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 黄芩一两 甘草一两（炙微赤，锉） 赤芍药一两 白术一两 芎藭一两 香附子一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，分二次服，不拘时候。

【主治】伤寒已经三日，不得汗，头痛发热。

20656 石膏散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】石膏一两 莽莛一两 葛根一两（锉） 黄芩二分 麻黄三分（去根节） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒三日，虽发汗后，头痛壮热未得全解，毒气犹盛。

20657 石膏散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】石膏一两 黄芩半两 甘草一分（炙微赤，锉） 川大黄半两（锉碎，微炒） 葛根半两

【用法】上为散。以水二大盏半，加竹叶三七片，煎至一盏二分，去滓，分三次服，不拘时候温服。

【主治】伤寒五日，头痛，口舌干燥，烦渴欲饮水。

20658 石膏散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】石膏二两 龙齿一两 犀角屑半两 前胡半两（去芦头） 秦艽一两（去苗）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加豉五十粒，葱白七寸，煎至五分，去滓，再加牛黄末一字，搅令匀，不拘时候温服。

【主治】伤寒阳痉，通身热，仰目头痛。

20659 石膏散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】石膏一两 葛根半两（锉） 赤芍药半两 柴胡一两（去苗） 甘草一分（炙微赤，锉） 黄芩半两 梔子仁半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白二茎，豉五十粒，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒未解，热毒气上冲，头痛，目赤涩。

20660 石膏散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】石膏一两 知母 柴胡（去苗） 麻黄（去根节） 甘草（炙微赤，锉） 黄芩 赤芍药 防风（去芦头） 赤茯苓 川升麻 甘菊花各半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白七寸，豉一百粒，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】阳毒伤寒，壮热头痛，肢体烦重，口干心燥。

20661 石膏散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】石膏半两 麻黄三分（去根节） 桂心半两 细辛半两 白术半两 赤芍药三分 桔梗半两（去芦头） 干姜半两（炮裂，锉） 甘草一两（炙微赤，锉） 附子三分（炮裂，去皮脐） 薄荷半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白七寸，豉五十粒，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热频服。

【主治】伤寒头痛壮热。

20662 石膏散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】石膏一两 前胡三分（去芦头） 柴胡三分（去苗） 甘菊花三分 赤茯苓三分 赤芍药三分 防风三分（去芦头） 蔓荆子三分 黄芩一分 甘草三分（炙微赤，锉） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒，心胸壅闷，潮热头痛，肢节拘急。

20663 石膏散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】石膏一两 子芩三分 前胡一两（去芦头） 葛根一两（锉） 桑根白皮三分（锉） 川升麻半两 荆芥三分 赤芍药一两 柴胡一两（去苗）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，豉五十粒，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒，头痛咳嗽，壮热，四肢痠痛。

20664 石膏散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】石膏三分 牡蛎三分(烧为粉) 地骨皮半两 白术半两 五味子半两 黄耆半两(锉) 麻黄根半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒，头痛恶寒，虚汗不止。

20665 石膏散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】石膏一两 赤芍药三分 川大黄二两(锉，微炒) 川升麻三分 甘草一分(炙微赤，锉) 柴胡一两(去苗) 木通一两(锉) 黄芩三分 川朴消二两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，不拘时候温服。以得利为度。

【主治】伤寒五六日，壮热头痛，大便不通，小便血色。

20666 石膏散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】石膏六两 葛根(锉) 百合 赤芍药 贝母(煨令微黄) 桔梗(去芦头) 川升麻 栝楼根各二两 栀子仁一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加葱白二茎，豉五十粒，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】时气壮热，头痛咳嗽。

20667 石膏散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】石膏二两 麻黄二两(去根节) 黄芩一两 桂心一两 赤芍药一两 柴胡一两(去苗)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一大盏，加葱白五寸，生姜半分，煎至五分，去滓，不拘时候热服。衣覆取汗，未汗再服。

【主治】热病一日，头痛壮热。

20668 石膏散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】石膏一两 知母一两 柴胡一两(去苗) 秦艽一两(去苗) 栀子仁三分 麦门冬三分(去心) 黄连三分(去须) 甘

草半两(炙微赤，锉) 木通一两(锉)

【用法】上为散。每服五钱，用水一大盏，煎至五分，去滓，加蜜一合，搅令匀，更煎一二沸，放温，慢慢含咽之。

【主治】热病六日不解，壮热头痛，小便赤涩，口内生疮，粥食不下。

20669 石膏散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】石膏一两 麻黄一两(去根节) 葛根一两(锉) 黄耆三分 甘菊花半两 栀子仁三分 赤芍药三分 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加豉少半合，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】热病壮热头痛，百骨痠痛。

20670 石膏散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】石膏四两 麦门冬三分(去心) 黄芩三分 栀子仁三分 地骨皮三分 柴胡三两(去苗) 栝楼根三分 葳蕤三分 甘草三分(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加竹叶三七片，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】热病，毒气在心，烦渴不止。

20671 石膏散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】石膏二两 麦门冬一两(去心，焙) 知母半两 人参半两(去芦头) 黄芩三分 柴胡半两(去苗) 犀角屑半两 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加葱白二茎，豉五十粒，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】热病得汗后，余热不退，头痛心烦。

20672 石膏散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】石膏一两半 知母一两 人参一

两(去芦头) 蕤蕤一两 甘草三分(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服五钱, 以水一大盏, 加生姜半分, 煎至五分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】热病已得汗, 余热未退。

20673 石膏散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】石膏二两 枳壳三分(麸炒微黄, 去瓤) 茺萆半两 防风半两(去芦头) 甘菊花半两 独活半两 芎藭半两 黄芩三分 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 不拘时候温服。

【主治】风头痛, 心烦体热。

【宜忌】忌炙煨、热面。

20674 石膏散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】石膏一两(研) 甘草一两(炙微赤, 锉) 苍术一两(锉, 炒微黄) 麻黄根一两

【用法】上为细散。每服二钱, 不拘时候, 以温浆水调下。

【主治】风虚汗出不止。

20675 石膏散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】石膏二两 梔子仁一两 黄耆一两(锉) 防风一两(去芦头) 犀角屑一两 桂心三分 茯神一两 人参一两(去芦头) 麦门冬一两半(去心) 桑根白皮一两(锉) 杏仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】脉极伤风, 损于心气, 多汗, 无润泽, 虚烦。

20676 石膏散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】石膏四两 麻黄(去根节) 五味

子 半夏(汤浸七遍去滑) 黄耆(锉) 麦门冬(去心) 各一两 杏仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 生干地黄二两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 小麦一百粒, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】虚劳吐血, 喘促, 头痛, 吃食全少。

20677 石膏散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】石膏二两 犀角屑 川升麻 柴胡(去苗) 葛根(锉) 黄芩各一两 甘草半两(炙微赤, 锉) 麦门冬一两半(去心, 焙)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加淡竹叶二七片, 煎至六分, 去滓, 食后温服。

【主治】肝脏壅热, 毒攻眼赤, 头痛烦渴。

20678 石膏散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】石膏四两 麻黄二两(去根节) 五味子二两 杏仁三两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 鸡苏茎叶二两 半夏二两(汤浸七遍去滑)

【用法】上为粗散。每服五钱, 以水一大盏, 加生姜半分, 小麦五十粒, 煎至五分, 去滓, 食后温服。

【主治】唾血不止, 胸膈气闷。

20679 石膏散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】石膏二两 甘草半两(炙微赤, 锉) 麦门冬二两(去心) 黄芩 川升麻 生干地黄 青竹茹 瓜蒌根 葛根各一两

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】心胸烦热, 吐血不止, 身重, 头眩。

20680 石膏散

【方源】《圣惠》卷三十



【组成】石膏一两 白鲜皮三分 枳壳三分(麸炒微黄,去瓢) 玄参三分 芥苳一分 黄芩三分 前胡一两(去芦头) 葳蕤二分 甘草半两(生用)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,葱白七寸,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】乳石发动,头痛鼻塞,寒热。

20681 石膏散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】石膏一两 犀角屑半两 玄参一两 甘草半两(炙微赤,锉) 桑根白皮一两(锉) 川升麻三分 紫雪一两 射干半两 槟榔一两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】服乳石气壅,致脚气发盛,心躁烦闷,头痛咽干,不能饮食。

20682 石膏散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】石膏二两 麦门冬一两(去心) 甘草三分(炙微赤,锉) 白茯苓一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,豉一百粒,竹叶二七片,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】霍乱,烦渴头痛。

20683 石膏散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】石膏二两 秦艽一两(去苗) 犀角屑一两 梔子仁一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】脑黄。

20684 石膏散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】石膏二两 羌活半两 防风半两(去芦头) 桑根白皮三分(锉) 赤茯苓三

分 枳壳三分(麸炒微黄,去瓢) 赤芍药三分 芎藭三分 黄芩三分 当归三分(锉,微炒) 甘草半两(炙微赤,锉) 柴胡一两(去苗) 羚羊角屑半两 酸枣仁半两(微炒) 甘菊花半两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】妇人风眩头疼,心神闷乱,肩背四肢烦疼,不欲饮食。

20685 石膏散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】石膏一两 人参一两(去芦头) 麦门冬一两(去心) 细辛半两 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 柴胡一两(去苗) 赤芍药一两 甘草半两(炙微赤,锉) 葵子二分

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】妊娠十月伤寒,头痛壮热,咳嗽烦闷。

20686 石膏散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】石膏二两 黄芩一两半 桂心一两半 生干地黄一两 牡蛎二两(煨过) 赤芍药二两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】产后寒热头痛。

20687 石膏散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】石膏二两 当归(锉,微炒) 羚羊角屑 白芍药 白术 子芩 生干地黄 甘草(炙微赤,锉) 各半两 茯神三分 前胡三分(去芦头) 麦门冬一两(去心,焙)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,不

拘时候温服。

【主治】产后体虚，头痛烦热。

20688 石膏散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】石膏一两 人参半两 龙骨半两

【用法】上为细散。每服一钱，用水一小盏，煎至五分，去滓，温服之。

【主治】小儿夜啼，壮热惊惧。

20689 石膏散

《圣惠》卷八十三。为《千金》卷五“石膏汤”之异名。见该条。

20690 石膏散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】石膏一两 知母半两 地骨皮半两 甘草半两（炙微赤，锉） 人参半两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加粳米一百粒，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】小儿伤寒，大汗后，及已下利，烦渴不解，其脉洪大。

20691 石膏散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】石膏半两（细研） 大青一分 黄芩一分 梔子一分 知母一分 葳蕤一分 川升麻一分 葛根一分（锉） 龙胆一分（去芦头） 川大黄半两（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】小儿热病，烦热惊悸。

20692 石膏散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】石膏一两（细研） 蝉蜕二枚（微炙） 柴胡一两半（去苗） 川升麻三分 钩藤三分 子芩一两 知母一两 梔子仁半两 龙齿一分 赤芍药半两 麻黄三分（去根节） 葛根一两（锉） 甘草一分（炙微赤，锉） 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，

煎至五分，去滓，加竹沥一合，更煎一二沸，温服。

【主治】小儿一岁至四岁，壮热，大惊发痫。

20693 石膏散

【方源】《博济》卷一。

【组成】石膏一两 麻黄一两（去根节） 何首乌五钱 干葛三分

【用法】上为末。每服二钱，加生姜一片，水一盞，同煎至八分，温服。

【主治】①《博济》：伤寒，头痛不可忍者。②《张氏医通》：风热头痛。

20694 石膏散

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》

【组成】石膏 麻黄（去根节）各一两 防风 羚羊角屑 独活 五加皮 前胡 肉桂 附子（炮） 人参 芎藭 当归 杏仁（汤浸，去皮尖，麸炒） 甘草（炙）各半两

【用法】上为末。每服四钱，水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】卒中风，身如角弓反张，口噤不语。

20695 石膏散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】石膏（火煨，研） 天南星（炮） 白僵蚕（炒）各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，加葱白二寸，腊茶一钱，同煎汤，连葱点顿服，良久再服。

【主治】脑风，邪气留连，头痛不已。

20696 石膏散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】石膏（研） 芎藭 旋覆花各一两 白附子（炮） 细辛（去苗叶） 甘草（炙）各一分

【用法】上为散。每服半钱匕，腊茶调下，不拘时候。

【主治】风壅头痛，眉骨疼。

【备考】《普济方》有防风一两。

20697 石膏散

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】石膏（碎） 菊花各二两 牛黄

(研) 枳壳(去瓢, 麸炒) 独活(去芦头) 柴胡(去苗) 白附子(炮) 大黄(锉, 炒) 漏芦(去芦头)各一两 木香 干蝎(炒) 槟榔各半两

【用法】上为散。每服二钱匕, 薄荷汤调下。

【主治】肝脏实热, 目痛如刺, 渐生淫肤息肉。

20698 石膏散

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】石膏(碎) 甘菊花 羌活(去芦头) 白附子(炮) 白僵蚕(炒) 玄参 黄连(去须)各等分

【用法】上为散, 研匀。每服二钱匕, 生姜、茶清调下。

【主治】上焦壅热, 目赤口干。

20699 石膏散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】石膏二两(火煨过) 芎藭一两 甘草(炙, 锉)半两

【用法】上为细散。每服一钱匕, 食后生葱、好茶调下, 一日二次。

【主治】目风眼寒, 偏头痛, 夹脑风, 鼻出清涕, 眼目冷痛。

20700 石膏散

【方源】《幼幼新书》卷十四引张涣方。

【组成】石膏 白茯苓 葛根各一两 甘草(炙) 黄芩 芍药各半两

【用法】上为细末。每服一钱, 水一盞, 加竹叶 薄荷少许, 煎五分, 去滓温服。

【主治】小儿热病。

20701 石膏散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】石膏一两 甘草半两(炙)

【用法】上为末。每服三钱, 新汲水下, 又生姜汁、蜜调下。

【主治】热嗽喘甚。

20702 石膏散

【方源】《普济方》卷四十七引《卫生家宝》。

【组成】石膏一两(研) 天麻 防风(去

芦) 大青 白附子 僵蚕(去丝嘴, 炒令赤) 羌活各半两 麝香一分(别研) 甘草一分(炙)

【用法】上为末, 加香豉一合, 汤浸软, 碾细和药为丸, 如弹子大, 微火焙干。每服一丸, 细嚼, 浓煎薄荷汤送下。

【主治】痰热蓄于胸中, 呕吐, 上热头痛。

【备考】本方方名, 据剂型, 当作“石膏丸”。

20703 石膏散

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】石膏 赤芍药各一两 川芎三钱

【用法】上药生用, 为细末。每服一钱, 食后、临卧茶清调下, 并吃三服。

【主治】偏正头风。

20704 石膏散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】石膏一两 人参(去芦) 甘草(炙)各半两

【用法】上为细末。每服三钱, 新水、蜜水调下; 生姜汤亦可。

【主治】暑病; 热嗽。

20705 石膏散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】石膏(水飞)三钱 龙脑一钱(另研)

【用法】上为细末。每用少许, 鼻内搐之。

【主治】脑热鼻塞, 头目昏重。

20706 石膏散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【异名】芎芷散(《保命歌括》卷二十九)。

【组成】川芎 石膏 白芷各等分

【用法】上为末。每服四钱, 热茶清调下。

【主治】阳明风热头痛, 孕妇乳房结核。

①《卫生宝鉴》: 头痛。②《杏苑生春》: 阳明头痛, 目痛鼻干, 恶热。③《疡科心得集》: 阳明风热头痛, 或孕妇乳房结核。

20707 石膏散

【方源】《眼科龙木论》卷十。

【组成】石膏 石决明(煨) 荆芥 白芷

川芎 防风 旋覆花各等分

【用法】上为细末。每服一钱，食后薄荷、生葱、茶清调下，一日三次。

【主治】头风攻注于目，目中常早晨昏者。

20708 石膏散

【方源】《普济方》卷四十四引《经验方》。

【组成】麻黄（去根节）一两 石膏一两 何首乌半两 干姜七钱半 川芎一两

【用法】上为细末。每服四钱，水一盞，加生姜三片，同煎至七分，去滓，稍热服。极者三服必效。

【主治】头疼不可忍。

20709 石膏散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】石膏 细辛 柳根各等分

【用法】上为末。搽牙。

【功用】除腐气，牢牙。

20710 石膏散

《普济方》卷七十。为《圣济总录》卷一一“揩齿石膏散”之异名。见该条。

20711 石膏散

《普济方》卷一一九。为《杨氏家藏方》卷三“清气散”之异名。见该条。

20712 石膏散

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《黄帝七十二证眼论》。

【组成】石膏一两（生） 川乌半两（炮，去皮脐） 山茵陈半两 僵蚕半两 甘草半两 防风半两 川芎半两 白芷半两

【用法】上为末。每服二钱，食后茶调下。

【主治】一切风毒气眼，烂弦风，头风疼，冷泪睛疼。

20713 石膏散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】石膏 川芎 白芷 葛根

【用法】上为细末。

【主治】外感头痛。

20714 石膏散

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】石膏五钱 麻黄一两 干姜七钱

五分 何首乌五钱

【用法】上为末。每服二钱，白水煎，食后服。

【主治】雷头风，内障。

20715 石膏散

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】川芎 石膏 黄芩 白芷

【用法】水煎服。

【功用】《医略六书》：清热散火。

【主治】痰火头痛。

【方论选录】《医略六书》：白芷散阳明之痰湿，石膏散炎上之火邪，川芎活血于头，黄芩清热于膈，使痰火顿除，则经络通畅，而清阳上奉，头痛无不愈矣。

【备考】《医略六书》本方用川芎一两 石膏三两 白芷一两半 黄芩一两半

20716 石膏散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】生石膏三两 藁本 白术（生）甘草（炙）各一两半 白蒺藜（炒，去刺）一两

【用法】上为散。每服四五钱，热茶清调，空腹、临卧各一服。

【主治】头风患眼。

20717 石膏散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】石膏（煨） 猪毛（烧存性）各一两

【用法】上为末。香油调搽。

【主治】汤火疮。

20718 石膏散

【方源】《续名家方选》。

【组成】滑石三铢 丹一铢 光明朱一铢 石膏三铢

【用法】上为极细末。点眼。

【主治】眼中多泪。

20719 石膏粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】石膏半斤 粳米一合

【用法】上以水五大盞，煮石膏，取二大盞，

去石膏，用米煮粥，欲熟，加葱白二茎，豉汁二合，更同煮，候熟，空心食之。石膏可三度用之。

【功用】《长寿药粥谱》：清热止渴。

【主治】①《圣惠》：风邪癰痈，口干舌焦，心烦头痛，暴热闷乱。②《长寿药粥谱》：中老年人高热不退，神昏谵语，烦躁不安，口渴多饮等发热性疾病。

20720 石膏粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】石膏二两（碎） 葱白（切）三茎 豉半合 生姜（拍碎）三钱半 米三合

【用法】以水三升，先煮石膏至二升，次下葱、姜、豉，再煎至一升半，去滓，下米煮粥，候熟食之。

【主治】发背痈疽，头痛不可忍。

【加减】若渴，加干葛根一两。

20721 石膏煎

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】石膏半斤（切，研） 蜜一中盏 地黄汁一中盏

【用法】以水三大盏，先煮石膏，取一盞，乃纳蜜及地黄汁，复煎取一盞，去滓，每服抄一匙，含咽。

【功用】洗心除热。

【主治】热病口疮，喉中鸣。

20722 石膏煎

《圣济总录》卷一一七。为《外台》卷三引《集验方》“石膏蜜煎”之异名。见该条。

20723 石膏煎

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】石膏 凝水石 滑石（并碎）各一斤 郁金（研） 犀角（镑屑）各一两 黄芩（去黑心）五两 山栀子（去皮）二两 升麻三两 黄连（去须）三两 芒消（研）各一斤 马牙消（研）半两

【用法】先以石膏、凝水石、滑石等，用水三斗，入金十两，无金入银十两亦得，先煎金石药汁至一斗五升澄清，次入犀角、郁金

草药等，再煎至七升，去滓再煎；先下芒消，煎三二沸，次下马牙消，搅令化，不住手搅，良久，用一新瓦盆盛，一两日凝结。每服一钱匕，用蜜水调下。

【主治】心脾积热，生重舌，及时行阴黄，丹石发动，一切热毒。

20724 石燕丸

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】石燕一枚（细研） 真珠末一钱 麸金石三分（细研） 木香二分 井泉石三分 续随子三分（去皮） 槟榔一两 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒）

【用法】上为末，同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以粥饮送下。

【主治】瘰癧结肿，寒热疼痛，心腹烦壅。

20725 石燕丸

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】石燕（细研） 瞿麦 梔子仁 滑石（细研） 木通（锉） 葵子 海蛤（细研）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服七丸，以葱白汤送下，一日三四次。

【主治】小儿诸淋，脐下妨闷，心神烦热。

20726 石燕丸

《三因》卷十二。为《鸡峰》卷十八“石燕子煎”之异名。见该条。

20727 石燕丹

【方源】《幼幼新书》卷三十引张涣方。

【组成】石燕（烧赤醋淬，放冷，研细） 瞿麦 滑石各一两 木通（锉） 海蛤（细研）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如黍米大。每服十粒，食前以葱白汤送下。

【主治】小儿小便淋涩痛闷。

20728 石燕丹

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】炉甘石四两（用黄连一两，归身、木贼、羌活、麻黄各五钱，河水二升，童便一升，同煮去滓，将炉甘石丸如弹子，多刺以孔，煅赤淬药汁内，以汁尽为度，置地上

一宿，去火气，取净一两） 硼砂（铜勺内同水煮干） 石燕 琥珀 朱砂（水飞，各取净末）一钱半 麝屎白一钱（如无，白丁香代之） 冰片 麝香各一分半

【用法】上为极细末。每用少许点大眦。

【主治】外障诸翳。

【加减】枯涩无泪，加熊胆一分，白蜜少许；血翳，加真阿魏；黄翳，加鸡内金、风热翳，加蕤仁；热翳，加珍珠、牛黄；冷翳，加附子尖、雄黄；老翳，倍硼砂，加猪胰子。

20729 石燕丹

【方源】《一盘珠》卷十。

【组成】甘草四两 川连一两 木贼 归身 防风 羌活 麻黄各五钱

【用法】水二碗，童便一碗，同煎去滓。甘石（炭火煅红，淬六七次，候干为度，水飞，晒干听用），外加硼砂（铜勺煮干）一钱 石燕（火煅，醋淬七次，水飞过）一钱 琥珀（锉末）一钱半 朱砂（水飞）一钱半 白丁香上冰片 上麝香各一分半 共研如尘。点眼。

【主治】外障诸翳，努肉攀睛。

【加减】加熊胆三分尤妙。

20730 石燕酒

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】石燕子

【用法】以童便三分，磨取自然汁，微暖送下赤小豆七粒。

【功用】催产。

【主治】难产。

20731 石燕散

【方源】《普济方》卷二九八引《肘后方》。

【组成】石燕 不拘多少（洗净）

【用法】每日空心取一枚，放坚硬无釉钵内，温水磨服之，如弹子大者，分三次服，晚食前服。或为细末，水飞过，取白汁如泔乳者，澄去水，晒干，以磁石刮去杵头铁屑后，入硬坚瓷钵内，以硬乳捶研。每服半钱至一钱，清饭饮调下；温水亦得。此方须常服，勿

令歇，服及一月勿歇即愈。

【主治】肠风痔漏，三十年不愈，面色萎黄，饮食无味；脏腑伤积泄泻，暑月常泻不止；诸般淋沥，久患消渴；妇人月候不调，赤白带下，多年不愈。

20732 石燕散

【方源】方出《圣惠》卷十三，名见《卫生总微》卷七。

【组成】石燕

【用法】上为细散。每服半钱，以葱白汤调下，不拘时候频服。以得通为度。

【主治】伤寒小腹胀满，小便不通。

20733 石燕散

【方源】方出《圣惠》卷五十八，名见《普济方》卷二一五。

【组成】石燕半两 赤小豆半两 商陆子半两 红蓝花半两

【用法】上为细散。每服一钱，食前煎葱白汤调下。

【主治】血淋心烦，水道中涩痛。

20734 石燕散

《济阳纲目》卷一〇一。为《秘传眼科龙木论》卷十“石燕子散”之异名。见该条。

20735 石燕散

【方源】《医级》卷八。

【组成】石燕一对（圆大者为雄，长小者为雌） 麝香少许

【用法】将石燕以灯心汤磨下，入麝香搅匀，钳去拳毛，然后点眼角中，洗用茶清。

【主治】目疾损弦，拳毛倒睫。

20736 石霜膏

【方源】《医方类聚》卷一八四引《吴氏集验方》。

【组成】风化石灰 百草霜各等分

【用法】上为末。以米醋调，鹅毛顺手扫起。

【主治】便毒虏气。

20737 石黛散

【方源】《外台》卷二十二引《广济方》。

【组成】干虾蟆（烧灰） 石黛 甘皮各等分

【用法】上为末。敷齿上。

【主治】龋齿。

20738 石蟹丸

【方源】《普济方》卷八十引《卫生家宝》。

【组成】地骨皮一两 枳壳一两(麸炒) 石蟹三两 牛膝三两(酒浸) 防风一两 破故纸半两(炒) 甘草半两 木贼半两 枸杞子半两 甘菊花半两 生地黄三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，熟汤送下。

【功用】退翳明目，去肝热。

20739 石蟹散

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】石蟹(碎)一枚 乳香一分 滑石一两半

【用法】上为细散。每服一钱匕，煎灯心汤调下。

【主治】妊娠子淋，日夜频数涩痛。

20740 石髓丸

【方源】《普济方》卷九十五。

【组成】牛膝一两 天麻半两 续断半两 人参 大防风各半两 巴戟十八铢 五味子十铢 杜仲半两 附子半两 菟丝子一两 虎胥骨半两 阳起石半两 当归半两 白术一两 鹿茸 大芎各十八铢

【用法】上各依法制了，碎锉焙干为细末，以西山木瓜二十枚，去皮瓤切片，用羊筋髓二两，雄羊腰子二枚，去筋膜切片，好酒半斤，加青盐八铢，椒末少许，好苡蓉一两，洗切，铤内煮令软，沙盆内和研膏，用杵牛膝等末，至硬软得所，为丸如梧桐子大。每服五十丸至八十丸，空心盐、酒、米汤任下皆可，一日二次。

【功用】健脾胃，助阳气，快胸膈，美饮食，壮筋骨，悦颜色，和五脏。

【主治】风脚软，举动步履不稳，冷秘，食不美，非时呵欠倦怠。

20741 石韦饮子

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】石韦(汤浸，刷皮) 瞿麦 木通各一两 陈橘皮 茯苓 芍药 桑白皮 人参 黄芩各三分

【用法】上为细末。每服二钱，水一大盏，加生姜一分，煎至七分，温服。

【主治】气淋，小便涩痛。

【宜忌】忌冷物。

20742 石中黄丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】石中黄(烧赤，醋淬七遍)三两 五灵脂一两半 禹余粮(煅赤，醋淬五遍)二两 桑黄(炙) 高良姜各半两 赤芍药 熟干地黄(焙)各一两 木鳖子(去壳，慢火炮) 木贼(锉，炒) 地榆各半两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前麝香酒送下。

【主治】妇人血海久虚，脐腹疼痛，经脉不止，面黄肌瘦，四肢无力，不思饮食。

20743 石中黄散

【方源】《医方类聚》卷一二九引《医林方》。

【组成】石中黄(火烧，醋蘸七次)

【用法】上为细末。每服三钱，温酒调下。

【主治】血蛊。

20744 石中黄散

【方源】《普济方》卷三〇七。

【组成】槐花头 五倍子(去虫) 石中黄粉各等分

【用法】上为末。水调涂。

【主治】蛇伤。

20745 石长生丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】石长生五两 升麻三分 鸡舌香水银粉 消石(别研)各二两 石膏(碎) 葛根(锉) 大黄(锉，炒) 射干各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，早、晚食前温米饮送下。渐加至二十丸，以知为度。

【主治】下焦受热，大便难，及多疮疡。

20746 石龙芮丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】石龙芮一两 石斛三分(去根, 锉) 牛膝三分(去苗) 续断三分 菟丝子一两(酒浸三日, 晒干, 别捣为末) 肉桂一两(去皴皮) 鹿茸一两(去毛, 涂酥炙微黄) 肉苁蓉三分(酒浸一宿, 锉去皴皮, 炙令干) 杜仲三分(去粗皮, 炙令微黄, 锉) 白茯苓三分 熟干地黄三分 附子一两(炮裂, 去皮脐) 巴戟半两 防风三分(去芦头) 桑螵蛸半两(微炙) 芎藭半两 山茱萸三分 覆盆子半两 补骨脂三分(微炒) 草澄茄三分 五味子半两 泽泻一两 沉香三分 茴香子三分(微炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心以温酒送下, 晚食前再服。

【主治】肾气不足, 风冷所攻, 脏腑气虚, 视听不利, 肌体羸瘦, 腰脚痠痛, 饮食无味, 小便滑数。

20747 石龙芮汤

《圣济总录》卷十九。为《圣惠》卷七“天雄散”之异名。见该条。

20748 石竹花汤

【方源】《普济方》卷三五七。

【组成】石竹花三钱 木通 滑石 葵子 榆白皮各五钱 枳壳五钱 百草霜一钱

【用法】上为末。清油少许, 沸汤调服。久而未生, 再服即下。

【功用】催生。

20749 石决明丸

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】石决明一两(捣, 细研, 水飞过) 黄连三分(去须) 玄参三分 地骨皮三分 防风三分(去芦头) 梔子仁三分 子芩三分 独活三分 茯神三分 甘菊花三分 车前子三分 青箱子三分 枳壳三分(麸炒微黄, 去瓢) 秦艽三分(去苗) 五加皮三分 决明子三分(微炒) 蒺藜三分 沙参三分(去芦头) 蕤仁三分(汤浸, 去赤

皮) 川大黄三分(锉碎, 微炒) 茺蔚子三分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 以薄荷汤送下, 不拘时候。

【主治】肝脏热极, 目赤涩痛, 泪不止, 风湿痒, 心膈壅滞, 头目常疼。

20750 石决明丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】石决明一两(捣, 细研, 水飞过) 茺蔚子二两 防风一两(去芦头) 车前子一两 细辛一两 桔梗二两(去芦头) 人参一两(去芦头) 白茯苓一两 薯蕷一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空心及晚食前以盐汤送下。

【主治】眼乌风内障。

20751 石决明丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】石决明一两 桂心半两 槐子一两 熟干地黄一两 阳起石一两(酒煮半日, 细研, 水飞过) 磁石二两半(烧, 醋淬七遍, 细研, 水飞过) 菟丝子一两(酒浸三日, 晒干, 别捣为末) 肉苁蓉一两(酒浸一宿, 刮去皴皮, 炙令干)

【用法】上为末, 入研了药令匀, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 食前以盐汤送下。渐加至三十丸。

【主治】眼昏暗, 渐成内障。

20752 石决明丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】石决明半两(捣碎, 细研, 水飞过) 决明子 酸枣仁(微炒) 蒺藜 蕤仁(汤浸, 去赤皮) 胡黄连 蓝叶 龙胆(去芦头) 青箱子各半两

【用法】上为末, 用羊胆汁和为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 食后以清粥饮送下。

【主治】眼障翳, 经年不消, 远视不明。

20753 石决明丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】石决明一两(捣碎, 细研, 水飞

过) 黄连三分(去须) 秦皮三分 细辛半两 葶藶子一两 蕤仁三分(汤浸,去赤皮) 车前子三分 甘草(炙微赤,锉)半两 羚羊角屑三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后以温水送下。

【主治】视物漠漠,似隔绢看物。

20754 石决明丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】石决明 菟丝子(酒浸一宿,别捣末) 五味子各一两 熟干地黄(焙) 细辛(去苗叶) 知母(焙) 山芋各一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心米饮送下。

【主治】肝虚血弱,目久昏暗。

20755 石决明丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】石决明一两 黄连(去须) 车前子 细辛(去苗叶) 梔子仁 大黄(锉,炒) 子芩各半两 菊花一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后淡浆水送下,临卧再服。

【主治】肝实,眼目生淫肤息肉,肿痛。

20756 石决明丸

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】石决明(刮削,净洗) 地肤子 黄连(去须) 青葙子 大黄(锉,炒) 茺蔚子各一两 皂荚(去黑皮,涂酥炙) 人参 黄芩(去黑心) 甘草(炙)各三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后淡浆水送下,临卧再服。

【主治】眼肿赤痛。

20757 石决明丸

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】石决明(刮洗) 车前子 细辛(去苗叶) 人参 白茯苓(去黑皮) 柏子仁(炒,别捣) 防风(去叉)各一两 山芋 茺蔚子各二两

【用法】上药除柏子仁外,并锉细焙干,为

末,拌匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后温水送下,临卧再服。加至三十丸。

【主治】雀目。昼视精明,暮夜昏暗。

20758 石决明丸

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】石决明 车前子 防风 知母(焙)各二两 茺蔚子 细辛(去苗叶) 五味子 黄芩(去黑心) 人参 白茯苓(去黑皮) 大黄(锉,炒)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。眼科后,每服十五丸,食前茶汤送下。

【主治】内障滑翳。

20759 石决明丸

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】石决明 谷精草 白术 川芎 羌活 防风 甘草 楮子 蝉壳 草决明 蕤仁各半两 木贼 青橘皮各三分 蛇皮一钱 细辛一分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如樱桃大。每服一丸,食后、临卧茶清嚼下,一日三次。

【主治】肝经风毒上攻,眼生翳膜,隐涩羞明,头目昏重。

20760 石决明汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】生石决明 僵蚕 防风 穿山甲 连翘 羌活各一钱 乳香 甘草 忍冬藤 黄连 归尾 大黄 花粉各八分

【用法】酒、水煎,空心服。行过三次,方进饮食。

【主治】脑后肿。坚肿木硬,口燥舌干,恶心,烦渴便秘。

20761 石决明散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】石决明一两(捣碎,细研,水飞过) 蕤藶一两 黄连三分(去须) 葶藶子一两 决明子三分 秦皮三分 川升麻三分 犀角屑一两 梔子仁三分 甘菊花一两 细辛半两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为细散。每服二钱，食后以竹叶汤调下。

【主治】眼生肤翳，昏暗，头额疼痛。

20762 石决明散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】点眼决明散（《圣济总录》卷一一一）、点药石决明散（《杂病源流犀烛》卷二十二）。

【组成】石决明三分（捣碎，细研，水飞过） 乌贼鱼骨半两 龙脑一钱 真珠末三分 琥珀三分

【用法】上为细末。每以铜箸取如大豆大点眼，一日三次。

【主治】眼生丁翳，根脚极厚，经久不愈。

20763 石决明散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】石决明一分（捣碎令细） 龙脑半分 膩粉一分 黄丹一分 麝香半分

【用法】上为极细末。每于夜卧时取少许点眼。

【主治】①《圣惠》：小儿眼生翳膜。②《普济方》：眼生胬肉，睛上有翳。

20764 石决明散

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】石决明 井泉石 石膏（碎）各一两 黄连（去须） 菊花各二两 甘草（生，锉）一两

【用法】上为散。每服二钱匕，浓煎竹叶熟水调下。

【主治】肝脏热壅，目赤涩痛。

20765 石决明散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】石决明 羌活（去芦头） 草决明 菊花各一两 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，水一盏，煎至六分，和滓，食后、临卧温服。

【主治】风毒气攻入头系，眼昏暗，及头目不利。

20766 石决明散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】石决明（刮洗） 车前子 白茯苓（去黑皮） 五味子 人参 细辛（去苗叶）各一两 知母（焙）二两

【用法】上为散。每服三钱匕，食后、临卧米饮调下，一日三次。

【主治】眼睑肿硬。

20767 石决明散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】石决明一两（火煨） 蒺藜（炒去刺）二两 荆芥穗二两 薄荷叶一两 人参（蜜炙）五钱

【用法】上各于地上出火毒，研末。每服二钱，食后沙糖水调下。

【主治】眼生外障。

20768 石决明散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】石决明（煨） 枸杞子 木贼 荆芥 晚桑叶 谷精草 粉草 金沸草 蛇蜕 苍术 白菊花各等分

【用法】上为末。每服二钱，茶清调，食后服。

【主治】目生障膜。

20769 石决明散

《普济方》卷七十一。为《得效》卷十六“大决明散”之异名。见该条。

20770 石决明散

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】石决明（醋煨） 防风 人参 羌蒺藜子 车前子 细辛（减半） 知母 白茯苓 辽五味 玄参 黄芩各等分

【用法】上为细末。每服二钱，食前茶清调下。

【主治】银障。瞳神中生白色内障，轻则一点白亮，而如银星一片，重则瞳神皆雪白而圆亮。

20771 石决明散

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】石决明一钱 人参一钱 茯苓一钱 车前子一钱 细辛五分 防风二钱 大黄一钱 羌蒺藜子二钱 桔梗一钱半

【用法】上为细末，令匀。每服二钱，食后米饮汤调下。

【主治】浮翳内障。

20772 石英水粥

《医统》卷八十七。为《圣惠》卷九十七“石英水煮粥”之异名。见该条。

20773 石南叶散

【方源】《串雅外编》卷二。

【组成】石南一两 藜芦三分 瓜丁五七个

【用法】上为末。每吹少许入鼻，一日三次。内服平肝药，或加牛黄。

【主治】小儿误跌，或打着头脑受惊，肝系受风，致瞳人不正，观东见西，观西见东。

20774 石南芽茶

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】嫩石南芽

【用法】蒸熟火焙，如造茶法。每旋取为末，煎法如茶服之。

【功用】治风补暖。

20775 石南煎丸

《鸡峰》卷四。为《脚气治法总要》卷下“石南丸”之异名。见该条。

20776 石钟乳丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】石钟乳（依法别研为粉）菟丝子（酒浸，别捣为末）五味子（炒）蛇床子（洗，焙）黄耆（锉）续断 萆薢 乌头（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上为末。酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午、夜卧温酒送下。

【主治】肾脏虚损，骨痿羸瘦，行坐无力，短气不足，腰背相引疼痛。

20777 石钟乳丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】石钟乳（浆水煮，研）阳起石（酒煮，研）各一两 附子（炮裂，去皮脐）一两半 桂（去粗皮）硫黄（研）各半两 消石（研）一分 盐精半两

【用法】上为末，用糯米粥为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前生姜盐汤送下。

【主治】下焦虚冷，脐腹疼痛，手足厥逆，脉气沉短。

20778 石钟乳丸

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】石钟乳（研）磁石（煨，醋淬七遍，捣研为粉，水飞）鹿茸（酒浸，炙去毛）石斛（去根）细辛（去苗叶）白茯苓（去黑皮）云母粉（研）远志（去心）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心酒送下。渐加至三十丸。

【主治】肾脏虚，风热冲目，昏暗多泪。

20779 石钟乳汤

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】石钟乳（别研）半两 黄连（去须，炒）一两 防风（去叉）附子（炮裂，去皮脐）黄柏（去粗皮，蜜炙）当归（切，焙）干姜（炮）各一两 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗）半两

【用法】上药除钟乳外，锉加麻豆，再同和匀。每服四钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，空心、食前温服，一日二次。

【主治】大病后，重下赤白痢，腹中疝痛。

【备考】《普济方》有“甘草一两”。

20780 石钟乳汤

《圣济总录》（文瑞楼本）卷一六六。为《千金》卷二“钟乳汤”之异名。见该条。

20781 石胆矾丸

【方源】《普济方》卷三九一引《保婴方》。

【组成】胆矾五钱 绿矾五钱

【用法】上用无油盐蒸饼一个，约重三两，去其顶，掬去心，装二矾在内，用生面糊其顶上，用文武火烧黄色，悬于屋梁上风干，碾为细末；又用肥枣三十个，无灰酒一大碗，慢火熬成膏，生绢滤，并去滓再熬成膏子；为丸如黄米大。每服三十丸，加至四五十丸，空心、临卧温米饮汤送下。如男子妇人服之，为

丸如梧桐子大。每服三四十丸，生姜汤送下。

【主治】小儿面黄肌瘦，肚大腹胀，癖积块硬，及大人癖积聚。

【宜忌】忌一切生冷、硬物。

20782 石胆散方

【方源】《外台》卷二十二引《广济方》。

【组成】石胆（研）

【用法】以人乳汁和，以敷痛齿上，或孔中，一日三二次，每以新汲水漱令净。

【功用】止痛生齿。

【主治】齿痛、齿落。

20783 石亭脂丸

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】石亭脂二两（细研） 蚌粉五两

【用法】上药置于铤子内，先以蚌粉铺作坑子，投入石亭脂末，以慢火烧，勿令大焰，待药熔及微焰断，取出研细，于地上出火毒一夜，即和蚌粉，以粟米烂饭为丸，如绿豆大。每日十丸，空心米饮送下。

【主治】脾胃一切虚冷，大肠滑泄，下利青白，呕逆翻胃，面色萎黄。

20784 石亭脂丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】石亭脂 紫贝铅各二两 盐卤五两

【用法】上三味，旋烧铅，煎卤中汁淬尽，将铅、石亭脂搅匀炒之，或焰起，即将铤子盖上焰即止，俟匀熟，水浸炊饼为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎石莲、干枣、干柿、干姜汤送下。

【主治】多年胃反不止。

20785 石亭脂散

《圣济总录》卷一七六。为《博济》卷四“真珠散”之异名。见该条。

20786 石亭脂散

【方源】《普济方》卷五十七。

【组成】石亭脂一钱 当归 轻粉各半钱 脑子少许 槟榔三钱

【用法】上为细末，用绢袋盛了，于鼻内闻之，至夜用津唾湿疮，将药于鼻疮上擦磨，天

明用水洗去药。仍以苍耳草，五月五日午时采取，阴干，用酒浸，九蒸九晒，研为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，食后温酒化下，一日三次。

【主治】酒伤肺经，面上生赤鼻红疮。

20787 石室秘丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】苍术 白术各一两五钱 天南星一钱五分 附子五分 半夏 山茨菇 大戟各五钱 麝香五分

【用法】上药各为细末，和匀做成饼子，如玉枢丹一样。每用一饼，姜汤化开饮之。

【主治】心虚无故见鬼。

20788 石莲子汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】石莲肉 陈皮 甘草 白术（炒） 当归 川木瓜 白芍（炒） 白茯苓 白扁豆（炒） 丹皮

【用法】乌梅二枚为引。

【主治】久痢，元气虚弱，暑热在内，唇红作烦，而成噤口，水米不进者。

【备考】服此方，宜兼服香连丸。

20789 石莲子散

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】石莲子半两 石菖蒲 人参各二钱

【用法】上为细末，分作三服。不拘时候，陈米饮调下。

【主治】噤口痢。

20790 石脂饴托

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】赤石脂五两 白面六两

【用法】上合和作托。煮熟，下葱、椒，空心食。三四遍则愈。

【主治】老人虚冷气痢。

20791 石菖蒲丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】石菖蒲一两 桂心一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如皂子大。每

服一丸，含化。

【主治】肺寒不能发声。兼治心疼。

20792 石菖蒲丸

《圣济总录》卷十四。为《圣惠》卷二十“菖蒲丸”之异名。见该条。

20793 石菖蒲丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】石菖蒲 牛膝(二味切，同以酒浸一宿，焙) 远志(去心) 人参 白茯苓(去黑皮) 地骨皮 生干地黄(焙) 菟丝子(酒浸，别捣末) 白术各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午、夜卧温酒送下。

【功用】强筋力，滋血脉。

【主治】瘵病筋脉相引。

20794 石菖蒲丸

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】石菖蒲(米泔浸半日，切片，焙) 五两 肉苁蓉(酒浸半日，切，焙) 附子(炮裂，去皮脐) 蜀椒(取红)各二两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空心、食前温酒送下；盐汤亦得。

【主治】小便滑数，腰膝少力。

20795 石菖蒲丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】石菖蒲(九节者佳)一两半 柏子仁 杜仲(去粗皮，炙，锉) 百部 山芋 甘草(炙，锉) 五味子(炒) 贝母(去心) 丹参各一两 人参 防风(去叉) 白茯苓(去黑皮) 茯神(去木)各一两半 生干地黄(焙) 麦门冬(去心，焙)各二两 远志(去心)半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心、食前熟水嚼下，一日三次。

【功用】平补诸虚，活血益气，润泽肌肤。久服轻身延年。

20796 石菖蒲丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】石菖蒲 香附子(炒) 陈橘皮

(去白) 高良姜(锉如骰子大，滴油炒紫色) 半夏曲各一两 远志(去心) 白豆蔻仁 蓬莪术(煨香，切)各半两

【用法】上为细末，用神曲末三两煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前生姜米饮送下；心痛，醋汤送下。

【主治】心脾虚冷，气滞不散，时发疼痛。

20797 石菖蒲汤

【方源】方出《一盘珠》卷七引《石室秘录》，名见《卫生鸿宝》卷五。

【组成】柴胡五两 白芍一两 当归五两 桃仁三两 甘草一两 茯神三两 菖蒲一两 元参三两 白芥子五两

【用法】水煎服。如不肯服，用人灌之，一剂即愈。

【功用】平肝祛邪。

【主治】花癲病。妇人情志不遂，致肝木枯燥，内火炽盛，忽然癲病，寸口脉弦，见男子则抱住不放。

20798 石菖蒲酒

【方源】《串雅外编》卷三。

【组成】菖蒲三斤(薄切)

【用法】日内晒干，以绢囊盛之，好酒一坛，悬囊在内，封闭一百日，取视之，如绿菜色，以一升熟黍米纳中，十四日开出饮酒。

【主治】三十六种疯。

20799 石菖蒲散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】石菖蒲半两 钟乳粉半两 五味子半两 桂心一两 细辛半两 诃黎勒皮一两 杏仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 干姜半两(炮裂，锉) 陈橘皮半两(汤浸，去白瓢，焙)

【用法】上为细散，入钟乳粉，都研令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】风冷伤肺失声，咽喉不利。

【备考】本方方名，《普济方》引作“菖蒲散”。

20800 石菖蒲散

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】石菖蒲一两 栝楼根二两 黄连(去须)半两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后、临卧新汲水调下。

【主治】消渴，日夜饮水，随饮即利。

20801 石菖蒲散

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】菖蒲(锉，石上者) 五味子(炒) 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 细辛(去苗叶) 紫菀(去苗土) 干姜(炮裂) 各半两 诃黎勒(炮，去核) 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 各一两

【用法】上为细散。每服一钱匕，食后以温酒调下。

【主治】风冷伤肺，声嘶不出。

20802 石菖蒲散

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【异名】菖蒲散(《普济方》卷六十五)。

【组成】石菖蒲 棘针(烧灰) 细辛(去苗叶) 各半两 干姜(炮裂) 鸡舌香各一分

【用法】上为散。以绵裹一钱匕，贴牙龈上。有涎吐之。

【主治】牙齿动摇疼痛，作臭血出。

20803 石菖蒲散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】石菖蒲(九节者) 甘草 白茯苓 淡豉 皂角(肥实不蛀者，去皮弦子) 各等分

【用法】上为末。临卧先以皂角洗面，拭揩令极干，用鸡子清调涂面上，至来早，将此药如澡豆用之。

【主治】面上黥黥、风刺、疮痂。

20804 石菖蒲散

【方源】《普济方》卷二八〇。

【组成】石菖蒲

【用法】上为末。油调涂之。

【主治】疥瘡痒。

20805 石斛浸酒

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】石斛一两(去根) 天麻一两 芎藭一两 仙灵脾一两 五加皮一两 牛膝一两(去苗) 草薺一两 桂心一两半 当归一两 鼠粘子一两 杜仲一两(去粗皮) 附子一两半(炮裂，去皮脐) 虎胫骨二两(涂酥炙令黄) 乌蛇肉一两(微炒) 茵芋一两 狗脊一两 丹参一两 川椒一两半(去目及闭口者，微炒去汗)

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用好酒二斗，于瓷瓮中浸，密封。经七日后，每日旋取一小盏，不拘时候温饮之，常令酒气相续。其酒取一盏，入一盏，以药味薄即止。

【主治】中风，手足不遂，骨节疼痛，肌肉顽麻。

20806 石斛浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】石斛半两(去根) 牛膝半两(去苗) 五加皮二两 羌活二两 防风二两(去芦头) 附子三两(炮裂，去皮脐) 天麻三两 海桐皮二两 木香二两 桂心二两 虎胫骨五两(涂酥炙令微黄) 芎藭二两 甘菊花二两 川椒二两(去目及闭口者)

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用好酒三斗，以瓷瓮子盛，密封。头浸经七日后开取，每次温饮一小盏，一日三次。每取却一盏，即添一盏，直候药味稍薄，即更换之。

【主治】风冷气攻腰脚，行立无力。

20807 石斛浸酒

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】石斛二两半(去根) 丹参二两半 侧子二两(炮裂，去皮脐) 桂心一两半 芎藭一两半 干姜一两(炮裂) 五加皮二两半 独活一两半 牛膝二两(去苗) 杜仲一两(削去皱皮，微炙令黄) 秦艽二两(去苗) 薏苡仁五合 山茱萸二两 陈橘皮一两(汤浸，去白瓢，焙) 黄耆一两半 白前一两半 茵芋二两半 当归一两半 钟乳粉四两 川椒一两半(去目及闭口者，微炒去汗)

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用清酒三斗，于瓷瓶中渍三宿。每于食前暖一小盏服。

【主治】脚气痹挛，及风虚肿满，不能行立。

20808 石斛浸酒

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】石斛二两（去根） 附子（炮裂，去皮脐） 牛膝（去苗） 茵芋 桂心 芎藭 羌活 当归（锉，微炒） 熟干地黄各一两

【用法】上锉细，用生绢袋盛，以清酒一斗，浸三日。每服一小盏，不拘时候暖服。

【主治】产后中风，四肢缓弱，举体不仁。

20809 石斛浸酒

【方源】方出《圣惠》卷九十五，名见《普济方》卷一五五。

【组成】石斛十两（去根） 牛膝半斤（去苗） 杜仲四两（削去粗皮） 丹参四两 生地黄酒（切）一升（晒令水气干）

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用清酒五斗，于瓮子中密封，浸七日开。每服一中盏，一日二三次。

【功用】利关节，坚筋骨，令人强健悦泽。

【主治】风痹脚弱，腰膝冷疼。

20810 石斛浸酒

《圣济总录》卷五。为《圣惠》卷九十五“石斛酒”之异名。见该条。

20811 石斛浸酒

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】石斛（去根）五两 牛膝（酒浸，切，焙）一两 杜仲（去粗皮，炙）半斤 丹参六两 熟干地黄（焙）十两 桂（去粗皮）四两

【用法】上锉细，用酒一斗，瓷瓶内浸，密封，以重汤煮二三个时辰，取出候冷开封。每服一盞，不拘时候温服。常令如醉。

【主治】风湿寒冷伤著，腰脚冷痹，痛麻不仁。

20812 石硫黄丸

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】石硫黄半两 桂心四两 礞石

（烧） 附子（炮，去皮） 天雄（炮，去皮） 乌头（炮，去皮）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，空腹酒送下，一日三次。

【主治】脚风弱，胸腹中冷结。

20813 石硫黄汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】石硫黄（明者，细研） 紫笋茶（微火焙干，研末）各一两

【用法】以水一盞，下硫黄末半钱匕，茶一钱匕，煎至六分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】虚冷，大便不禁，气脱神昏。

20814 石硫黄散

【方源】《千金》卷二十。

【组成】石硫黄 白石英 鹿茸 远志 天雄 僵蚕 女娄 蛇床子 五味子 白马茎 菟丝子各等分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。

【功用】补虚损，益房事。

【宜忌】无房禁服。

20815 石硫黄膏

【方源】《外台》卷二十二引《广济方》。

【组成】石硫黄（研） 白矾（烧） 朱砂（研） 水银 麝香 黄柏（末）各一分

【用法】上药和水银，研于瓷钵中，以水银尽，用腊月猪脂和如泥。先拭净，涂之，一日三五次。以愈为度。

【主治】紧唇疮久不愈者。

20816 石硫黄膏

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】石硫黄 墨各一两半

【用法】上为细末。先以布揩患处令赤，醋调药成膏涂之。若作疮，愈后再涂。

【主治】白癜风，皮肤斑白，毛发亦变。

20817 石榴皮汤

【方源】《医心方》卷二十二引《产经》。

【组成】安石榴皮二两 当归三两 阿胶二两（炙） 熟艾（如鸡子大）二枚

【用法】以水九升，煮取二升，分三次服。

【主治】妊娠暴下不止，腹痛。

20818 石榴皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】酸石榴皮（微炒） 干姜（炮）各一两 黄柏（去粗皮，炙，无黄柏，用黄连亦得） 阿胶（炙令燥）各三分

【用法】上为粗末。每服四钱匕，用水一盞，煎至四分，去滓，空心温服。

【主治】①《圣济总录》：虚寒客于下焦，肠滑洞泄，困极欲死。②《医方类聚》引《御医撮要》：冷痢泄及白带下。

【宜忌】《医方类聚》引《御医撮要》：忌生冷、猪肉、油腻。

20819 石榴皮汤

《圣济总录》卷九十九。为《圣惠》卷四十三“石榴皮散”之异名。见该条。

20820 石榴皮汤

【方源】《霉疔新书》。

【组成】石榴皮 香附子各十钱 甘草二分

【用法】以水一升，煮取五合，去滓温服。

【主治】霉疮。

20821 石榴皮散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【异名】石榴皮汤（《圣济总录》卷九十九）。

【组成】酸石榴皮一两（锉） 桃符二两（锉） 胡粉一两 酒二合 槟榔末二钱

【用法】以水二大盞，煎前二味至一盞，去滓，下胡粉、槟榔、酒，更煎一沸，稍热，分三次服。

【主治】诸虫心痛不可忍，多吐酸水。

20822 石榴皮散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】酸石榴皮一两 龙骨一两（烧过） 河黎勒一两（煨，用皮）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】赤白痢，日夜行数不减。

20823 石榴皮散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】酸石榴皮三两（微炒） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 地骨皮一两 黄柏一两（微炙，锉） 当归一两（锉，微炒） 芎藭三分

【用法】上为细散。每服一二钱，以薤白粥饮调下，不拘时候。

【主治】妊娠下痢赤白，疔刺腹痛不可忍。

20824 石榴皮散

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】酸石榴皮（微炒） 干姜（炮裂） 黄连（去须） 河黎勒（煨，去核）各一分

【用法】上为细散。每服半钱匕，空心、午后各用米饮调下。

【主治】小儿脓血痢。

20825 石榴皮散

【方源】《袖珍》卷四引《经验方》。

【组成】酸石榴皮（烧灰存性）不以多少

【用法】上为细末。每服二钱，空心米饮调下。

【主治】暴泻不止及痢下赤白。

20826 石榴皮煎

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】酸石榴皮三分（炙令焦，锉） 黄连三分（去须，锉，微炒） 赤石脂三分

【用法】上为粗末，以水二升，煎至五合，去滓，纳蜡一两，更煎三五沸。每服半合，不拘时候温服。

【主治】小儿冷热痢不止。

20827 石榴花散

【方源】方出《圣惠》卷六十八，名见《圣济总录》卷一三九。

【组成】石榴花半斤 石灰一斤（炒）

【用法】上为细散。敷疮上，以帛裹。勿令着风水，疮合即愈。

【主治】金疮，俱刀斧伤损，出血不止。

20828 石榴枝汤

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】东引石榴枝三两 木香 陈橘皮

(汤浸,去白,焙) 吴茱萸(汤洗,焙炒) 各一两半 大黄(煨) 芍药各二两 薏苡根二两半

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,空心温服。

【主治】九虫动作,腹中刺痛,口吐清水,面色黑黄,及虫攻心痛者。

20829 石榴根汤

《圣济总录》卷九十九。为《外台》卷二十六引《广济方》“石榴汤”之异名。见该条。

20830 石榴根汤

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】酸石榴根一握 楝皮一两 槟榔三枚(锉,捣为末)

【用法】上药除槟榔末外,各锉细。以水三盞,煎至一盞半,去滓,入槟榔末搅匀。分二次温服,空心相继服尽。当有虫出。次煮薤粥补之。

【主治】寸白虫。

20831 石榴根汤

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】酸石榴根(东引者)一握

【用法】上锉细。用水半碗,均作三分,煎取二分,更入冷水半盞,同煎去滓,取汁。来日鸡鸣时,将槟榔一颗,用冷热水磨一分,余二分末。更入朴消半钱,同入研槟榔汁内拌匀,即入前石榴汁内温过。先嚼干脯一片咽汁,少顷,顿服此药八分一盞。坐良久,待药行后方睡。睡觉腹痛,虫即出。

【主治】寸白虫。

20832 石榴根散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】东引石榴根二两 膩粉一钱 陈橘皮(去白,焙)半两 芍药(锉,炒)三分 槟榔 草薢各一两

【用法】上为细散。每服二钱匕,空心煎枣汤调下,日晚再服。

【主治】蛔虫、寸白虫等,心腹疼痛。

20833 石榴根散

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】酸石榴根(东行者,去土)五两(碎锉,水二碗,煎至一小碗,去滓) 槟榔一颗(生,锉为末) 膩粉(研)半钱匕 铅丹(炒)半钱匕

【用法】先取槟榔末等三味细研和匀。再温石榴根汁调药末,五更顿服。凡欲服药,清早先食肥猪肉,次便服药。

【主治】寸白虫。

20834 石榴浸酒

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】酸石榴七枚(和皮捣烂) 甜石榴七枚(和皮捣烂) 人参二两(去芦头) 苦参二两(锉) 沙参二两(去芦头) 丹参二两 苍耳子二两 羌活二两

【用法】上锉细,绵裹,以无灰酒一斗,于一瓷瓶中浸之,密封头,春、夏七日,秋、冬二七日。每于食前,暖服一中盞。旋添酒,味薄再合。

【主治】大风,头面热毒,皮肤生疮,面上生结,及眉落者。

20835 石膏饮子

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】石膏二两(捣碎) 柴胡半两(去苗) 豉一合(微炒) 麻黄一两(去根节) 葱白二茎 薄荷一分

【用法】上锉细。以水二大盞,煎至一盞二分,去滓;分三次,不拘时候稍热服,如人行三里相继服。尽厚盖取汗。

【主治】伤寒一日,头痛壮热,心神烦闷。

20836 石膏饮子

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】石膏二两(捣碎) 甘草半两(炙微赤,锉) 赤芍药一两 黄芩一两 柴胡一两(去苗) 桂心半两 生地黄三两 竹茹二两

【用法】上锉细和匀。每服半两,先以水一大盞半,浸伏龙肝二两,澄取清一大盞,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】时气鼻衄,烦躁不止,头痛气逆。

20837 石膏饮子

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】石膏四两(捣碎) 茯神一两 犀角屑一两 川芒消一两 梔子仁一两半 生地黄(切)三大合 甘草半两(炙微赤, 锉) 赤小豆一合

【用法】上锉细和匀。每服半两, 以水一大盏, 煎至五分, 去滓, 加蜜竹沥半合, 更煎一沸, 不拘时候温服。

【主治】心劳实, 好笑, 四肢烦热。

20838 石膏煮散

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】石膏(研, 水飞过)一两半 旋覆花一两 白茯苓(炒) 甘菊花 山梔子仁 茵陈蒿 太阳玄精石(研) 芍药各半两

【用法】上药捣罗六味为细末, 入石膏等研匀。每服三钱匕, 水一盏, 加荆芥少许, 同煎至七分, 不去滓, 温服, 不拘时候。

【主治】伤寒头痛。

20839 石膏蜜煎

【方源】《外台》卷三引《集验方》。

【异名】石膏煎(《圣济总录》卷一一七)。

【组成】石膏半斤(碎) 蜜一斤

【用法】以水三升, 煮石膏取二升, 乃纳蜜, 复煎取一升, 去滓。含如枣核许, 尽更含。

【功用】下气除热。

【主治】天行热病, 口苦, 喉中鸣。

20840 石燕子丸

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】石燕子 青礞石 寒水石 海金沙 白丁香 硼砂 硃砂 轻粉各六钱

【用法】上为细末, 炼蜜和至第六七日, 为丸如梧桐子大。每服五丸, 茴香汤送下。

【主治】胁下有硬癖, 寒热不尽。

20841 石燕子丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】木香 槟榔各二钱 石燕子二枚(火炙, 醋淬七遍) 使君子肉一钱 郁李仁一分(汤浸, 去皮, 别研如膏)

【用法】上将前四味为细末, 次入郁李仁同

研匀, 煮面糊为丸, 如黍米大。每服十丸, 乳食前煎紫苏、陈橘皮汤送下。

【主治】小儿啼哭, 气不正, 动击于阴, 偏坠肿胀, 小腹作痛。

20842 石燕子丸

【方源】《普济方》卷一九四。

【组成】石燕子四个(煨) 木通 大戟 海金沙 石韦 苦楝根 猪苓 海藻 扁竹 茴香 白牵牛 海蛤 瞿麦 通草 元胡各半两

【用法】上为细末, 灯心、竹叶煎汤, 打面糊为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 食前用灯心竹叶汤送下。

【主治】妇人男子气蛊、血蛊之疾。

20843 石燕子散

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】石燕子一个 滑石末一分 冬葵子 续随子(去皮, 别研) 海金沙(别研) 各一两

【用法】上为散, 与别研者和匀。每服二钱匕, 煎木通汤放冷调下。

【主治】心热, 小便赤涩不利。

20844 石燕子散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】石燕子五对(紧小者, 火烧醋淬七遍, 研) 茯苓(去皮)五两 寒水石(烧过去火毒, 研)半斤 细辛(拣净) 香白芷各一两

【用法】上为细末, 入研药匀。每用药半钱, 食后或临卧以指蘸药擦牙龈上, 合口少时, 用温盐汤微漱一两口, 存药性, 日用一两遍。

【主治】牙齿风冷疼痛, 及牙龈不密固。

20845 石燕子散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷十。

【异名】石燕散(《济阳纲目》卷一〇一)。

【组成】石燕子一双(煨, 醋淬十次) 玳瑁 羚羊角各一两 犀角五钱

【用法】上为末。食后用好酒、薄荷汤或茶清调下。

【主治】迎风有泪。

20846 石燕子煎

【方源】《鸡峰》卷十八。

【异名】石燕丸（《三因》卷十二）。

【组成】石燕子一两 滑石 石韦 瞿麦穗各等分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前煎瞿麦、灯心汤送下，一日二三次。

【主治】沙石林，每发不可忍者。

【备考】本方方名，据剂型，当作“石燕子丸”。

20847 石子荠苳汤

《三因》卷十。为《千金》卷二十一“猪肾荠苳汤”之异名。见该条。

20848 石韦瞿麦散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】瞿麦 石韦 车前子 滑石 葵菜子各半两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，同煎至七分，食前空心服。

【主治】五淋。

20849 石中黄子散

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】石中黄子 干姜（炮） 续断 决明子 甘草（炙） 地胆（去头、足、翅，炒）一分 龙胆 菴苢根各半两 大黄半分 细辛（去苗叶）半两

【用法】上为散。敷疮上，一日四五次。

【主治】思虑忧怒，其根在胆，因致浮疽瘰，始发于颈，如两指，使人寒热欲卧。

20850 石母降炎汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】石膏 茯苓 荆芥（炒黑）各三钱 知母一钱 麦冬一两 玄参一两 甘草一钱 升麻五分 天花粉三钱

【用法】水煎服。四剂全愈。

【主治】胃火独盛，有升无降，牙痛日久，上下牙床尽腐烂，至饮食不能用，日夜呼号。

20851 石连光明散

【方源】《本草纲目》卷九引张氏方。

【组成】炉甘石半斤（取如羊脑、鸭头色者，以桑柴灰一斗，火煅赤，研末。用雅州黄连各四两，切片，煎水浸石，澄取粉，晒干。） 铅粉二铤（以二连水浸过，炒） 雄黄（研末）

【用法】每用甘石、铅粉各三分，雄黄一分，片脑半分，研匀，点眼。

【主治】目中五轮八廓诸病。

【备考】据雅州黄连后“各四两”及铅粉二铤后“二连水”，在雅州黄连后疑脱“胡黄连”。

20852 石膏解毒丸

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】浮水石四两 石膏四两 青黛二两

【用法】上为末，蒸饼为丸，如芡实大。并花水化下；或姜汤送下。

【主治】疔疮。

【加减】如毒在下体，干于肝肾，去浮水石，加寒水石。

20853 石英水煮粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】石英水粥（《医统》卷八十七）

【组成】白石英二十两 磁石二十两（并捶碎）

【用法】以水二斗，器中浸，于露地安置，夜即揭盖，令得星月气。每日取水作羹粥，及煎茶汤吃。用却一升，即添一升。

【功用】久服气力强盛，颜如童子。

【主治】肾气虚损，阴萎，周痹风湿，肢节中痛，不可持物。

20854 石刻安肾丸

【方源】《得效》卷八。

【组成】苍术四两（一两用茴香一两炒，一两用青盐一两炒，一两用茺萸一两炒，一两用猪苓一两炒，各炒令黄色，取术用） 川乌（炮，去皮脐） 附子（炮，去皮脐） 川楝子（酒浸，去核） 巴戟（去心，炒） 白

术(炒) 陈皮(炒)各一两 肉苁蓉(酒浸,炙) 破故纸(炒)各二两 茯苓一两(炒) 肉豆蔻(面裹煨) 木香(不见火) 当归(烘焙干)各一两 杜仲(炒去丝)二两 熟地黄(酒浸,蒸十次,烘焙) 菟丝子(酒浸,炒) 茴香 黑牵牛(半生,半炒) 山药(炒)各一两 晚蚕蛾(去头足翅,炒) 葫芦巴(酒浸,炒) 肉桂(不见火) 石斛(炒) 川牛膝(酒浸,炒)各一两

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服四十丸,空心盐汤送下。

【功用】久服壮元阳,益肾气,健筋骨,生血驻颜,扶老资寿。

【主治】真气虚惫,脚膝软弱,目暗耳鸣,举动倦乏,夜梦遗精,小便频数,一切虚损。

20855 石刻安肾丸

【方源】《普济方》卷二二四。

【组成】苍术半斤 川椒 破故纸 葫芦巴 陈皮 茴香(炒) 续断 川楝各四两

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服六十丸,空心盐汤或温酒送下。

【功用】补下元。

20856 石刻安肾丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】鹿茸一两 赤石脂三两 山药四两 戟肉 肉果 补骨脂 苁蓉 柏子仁 菟丝子 茯苓 远志 黄肉 茅术 附子 石斛 川乌 小茴 川椒 韭菜子各二两 青盐四钱

【用法】山药末糊为丸。每服三钱,淡盐汤送下。

【主治】真气虚惫,梦遗滑精,便溏洩数,腰膝软弱,恶寒畏冷,诸阳不足。

20857 石南根饮子

《准绳·疡医》卷五引《神巧万全方》。为《千金》卷八“石南汤”之异名。见该条。

20858 石首鱼脑汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】诃子 甘草各一钱 荆芥 细辛 人参各五分 桔梗二钱 石首鱼脑骨五钱(煨存性,为末)

【用法】将上药煎好,去滓,入石首鱼脑骨末,再煎一二沸服。

【主治】肺气虚寒,鼻流不臭清涕,经年不愈。

20859 石室神效膏

【方源】《理瀹》。

【组成】党参三两 元参五两 生地八两 生黄耆 当归 麦冬各三两 川芎二两 丹皮 牛膝 荆芥 生甘草各一两 银花一斤 防风 茜草各五钱

【用法】油熬丹收,下广木香、乳香、没药、血竭各一两,象皮末五钱,麝香一钱,临用时再加川贝、五倍、儿茶、血竭、藤黄、炒乳香、贝母、冰片末,掺贴。

【主治】痈疡,外症溃后。

20860 石脂泽兰散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】泽兰九分 禹余粮十分 石膏 白芷 干地黄 赤石脂 肉苁蓉 鹿茸 芎藭各八分 藁本 蜀椒 白术 柏子仁各五分 桂 甘草 当归 干姜各七分 芫莩 细辛 厚朴 人参三分 防风十分

【用法】上为细末。每服方寸匕,酒送下,一日三次。

【主治】产后风虚。

20861 石脂神砂丹

【方源】《医学纲目》卷二十三。

【组成】生附子 干姜各五钱 赤石脂一两半(水飞) 朱砂一两(细研)

【用法】上为细末,酒糊为丸,如黑豆大。每服十五丸,米白汤送下。

【主治】痢疾。

20862 石斛万病散

《普济方》卷一八五。为《千金》卷七“淮南八公石斛万病散”之异名。见该条。

20863 石斛万病散

《普济方》卷二二七。为《外台》卷十七

引《古今录验方》“淮南八公石斛万病散”之异名。见该条。

20864 石斛牛膝汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】石斛 牛膝 木瓜 白芍 枣仁 生地 杞子 茯苓 黄柏 甘草 车前子

【主治】产后腿痛。

20865 石斛玄参汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】金钗石斛一两 玄参二钱

【用法】水煎服。

【主治】胃火上冲于心，心中烦闷，怔忡惊悸，久则成痿，两足无力，不能动履。

20866 石斛地黄煎

【方源】《千金》卷三。

【组成】石斛四两 生地黄汁八升 桃仁半升 桂心二两 甘草四两 大黄八两 紫苑四两 麦门冬二升 茯苓一斤 淳酒八升（一方用人参三两）

【用法】上为末，于铜器中炭火上熬，纳鹿角胶一斤，耗得一斗，次纳饴三斤，白蜜三升和调，更于铜器中，釜上煎微耗，以生竹搅，无令着，耗令相得，药成。每服如弹子大一丸，食前酒送下，一日三次。不知，稍加至二丸。

【主治】妇人虚羸短气，胸逆满闷，风气。

【方论选录】《千金方衍义》：虚羸短气，而用地黄、门冬，举世之通套；用桂心、大黄、近世所未闻。须知地黄、门冬得桂心则滋而不滞；桂心得大黄则宣而遂通；鹿角胶、醇酒、饴糖、白蜜等温养精血之味，咸得辛温敷布之力。群行补剂之中虽有一味大黄，只能行滞，断无泄泻之理。

【备考】本方方名，《外台》引作“石斛生地黄煎”。

20867 石斛防风汤

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】石斛一钱 防风七分 川芎 丹参 麦门冬各八分 熟地黄一钱五分 杜仲

一钱二分 桂心三分 独活六分

【用法】上咬咀。用枣子一枚，水煎熟，不拘时服。

【主治】内虚肾弱，语言謇涩。

20868 石斛苁蓉散

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】肉苁蓉一两半 石斛 五味子 黄耆 丹参 牛膝 附子 当归 人参 杜仲 沉香 茯苓 石南 枳实 熟地黄各半两 桂 磁石各二两

【用法】上为粗末。每服三钱，羊腰子汁一盞半，煎至八分，去滓温服。

【功用】补肾气。

20869 石斛青蒿汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】石斛三钱 银花 麦冬（去心）川地骨各二钱 丹皮一钱 青蒿 连翘 黑山栀（杵）各一钱五分

【用法】加淡竹叶十片，灯心一团，水煎服。

【主治】热症火微，非壮热者。

【加减】口渴，加花粉二钱。

20870 石斛明目丸

【方源】《北京市中成药规范》。

【组成】石斛二十五斤 肉苁蓉二十五斤 麦门冬五十斤 茯苓一百斤 五味子二十五斤 人参一百斤 熟地黄一百五十斤 菟丝子二十五斤 草决明二十五斤 苦杏仁二十五斤 山药二十五斤 蒺藜二十五斤 川芎二十五斤 青箱子二十五斤 甘草二十五斤 牛膝二十五斤 黄连二十五斤 生地黄二十五斤六两 天门冬一百斤 防风二十五斤 枳壳二十五斤 菊花二十五斤 枸杞子二十五斤 生磁石二十斤 生石膏五十一斤

【用法】将药材加工洁净，炮制合格。取菟丝子、熟地黄、牛膝、枸杞子、天门冬、麦门冬、苁蓉、五味子、枳壳、甘草、苦杏仁煮提两次，时间分别为2.5小时、1.5小时。苦杏仁待群药沸腾后再下锅。合并以上药液，过滤沉淀，减压浓缩至比重1.35、温度

(50℃)的稠膏。余药粉碎为细粉，过一百孔罗，混合均匀为原粉。取原粉与稠膏按比例制丸，低温干燥。每斤干燥丸药用生赭石粉一两二钱为衣闯亮。每百粒干重五钱，每袋内装三十粒。每服三十粒，一日二次，温开水送下。

【功用】平肝清热，滋肾明目。

【主治】肝肾两亏，虚火上升引起的瞳仁散大，夜盲昏花，视物不清，内障抽痛，头目眩晕，精神疲倦。

【宜忌】忌辛辣食物。

20871 石斛夜光丸

《原机启微》卷二。为《瑞竹堂方》卷三“夜光丸”之异名。见该条。

20872 石斛夜光丸

【方源】《全国中药成药处方集》(西安方)。

【组成】薄荷七钱 当归二两 石斛一两半 杭芍二两 菊花四两 川芎六钱 生地山萸 羌蔚各二两 胆草五钱 丹皮一两 栀子五钱 柴胡 北五味各七钱 羌活五钱 赭石二两 磁石二两 生草八钱

【用法】炼蜜为小丸。每服二三钱，淡盐水送下。

【功用】消炎，镇静，强壮。

【主治】内障，视物不清，云翳攀睛，瞳仁返背，慢性目疾。

【宜忌】忌刺激性食物。

20873 石斛泽兰丸

《千金》卷四。为原书同卷“三石泽兰丸”之异名。见该条。

20874 石斛黄耆丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】石斛(去根)二两 肉苁蓉(酒浸，切，焙干)一两半 五味子 黄耆(微炙，锉) 枳壳(去瓢，麸炒) 熟干地黄(焙)各一两 河黎勒皮半两 木香 山芋 苍术(切碎，炒) 泽泻各一两

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前温

酒或盐汤送下。

【主治】真脏气弱，洞泄寒中，腹内雷鸣，时多便泄，饮食减少，多困嗜卧。

20875 石斛清胃散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】石斛 茯苓 橘皮 枳壳 扁豆 藿香 丹皮 赤芍等分 甘草减半

【用法】上为散。每服三四钱，加生姜一片，水煎服。

【功用】《千家妙方》：养胃津，益脾气。

【主治】麻疹后呕吐，胃虚不食，热滞。

20876 石膏二川汤

【方源】《异授眼科》。

【组成】石膏 川乌 川芎 防风 荆芥 川羌活 连翘 升麻

【用法】水煎服。

【主治】目有白星散乱，头昏眼花黑暗者。

20877 石膏二母汤

【方源】《温热经解》。

【组成】石膏三钱 川贝二钱 知母二钱 甘草一钱

【主治】胃中有火，午前咳嗽者。

20878 石膏大青汤

【方源】方出《千金》卷二，名见《张氏医通》卷十五。

【组成】石膏八两 前胡 栀子仁 知母各四两 大青 黄芩各三两 葱白(切)一升

【用法】上咬咀。以水七升，煮取二升半，去滓，分五次服。别相去如人行七八里再服。不利。

【功用】《张氏医通》：散邪安胎。

【主治】妊娠伤寒，头痛壮热，肢节烦疼。

20879 石膏川芎汤

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】石膏 川芎各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水煎服。

【主治】伤寒热病后，头痛不止。

20880 石膏升麻散

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】石膏 升麻 地骨皮 羊胫骨灰 各等分。

【用法】上为末。每用少许，频擦牙齿根上。

【主治】足阳明经虚，风热所袭，流传牙齿，攻蛀牙龈，致肿结妨闷，甚者与龈间津液相搏，化为脓汁。

【备考】《景岳全书》：“或加麝香少许更妙”。

20881 石膏化痰汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】石膏 知母 人参 甘草 葛根

【主治】热病发瘧，目赤狂言，咽痛烦闷，瘧如纹锦，不恶寒反恶热，身热不退，脉沉而数。

20882 石膏六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤四两 石膏 知母各五钱

【主治】妊娠伤寒，身热大渴，蒸蒸而烦，脉长而大者。

20883 石膏甘草散

《伤寒总病论》卷五。为方出《肘后方》卷二，名见《医心方》卷十二引《录验方》“石膏散”之异名。见该条。

20884 石膏白及膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】煅石膏 62 克 白及末 31 克 密陀僧 21 克 轻粉 15 克 枯矾 9 克

【用法】上为极细末，加凡士林 125 克，调成泥膏。外用。

【主治】阴囊湿疹。

20885 石膏芍药汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】石膏（碎） 芍药 前胡（去芦头） 葛根 柴胡（去苗）各一两 升麻半两 桑根白皮（锉） 荆芥穗 黄芩各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，稍热服。

【主治】中风伤寒，壮热，肢节疼痛，头目昏眩，咳嗽喘粗。

20886 石膏竹叶汤

《易简》。为《伤寒论》“竹叶石膏汤”之异名。见该条。

20887 石膏竹茹汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】石膏二两 竹茹（焙） 人参 白茅根 半夏（汤洗七遍，炒）各一两 玄明粉 桔梗（炒） 甘草（炙，锉） 葛根（锉）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜五片，同煎至八分，去滓温服。

【主治】上焦壅热，见食呕吐，头痛目赤。

20888 石膏牡蛎丸

《杂病源流犀烛》卷十七。即方出《肘后方》卷二，名见《圣济总录》卷七十“牡蛎散”改为丸剂。见该条。

20889 石膏杏仁汤

【方源】《伤寒总病论》卷五。

【组成】石膏四两 杏仁 前胡各二两 甘草一两 梔子仁 麻黄 紫菀 桂枝 大青 玄参 葛根各一两半

【用法】上㕮咀。水九升，煎四升，每次温饮一盞，一日三四次。

【主治】肺府脏温病，阴阳毒气，若府虚则阴邪所伤，乍寒乍热，损伤肺气，暴嗽呕逆。

20890 石膏羌活散

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】羌活 密蒙花 木贼 香白芷 细辛 干萝卜菜子 麻子 川芎 苍术 甘菊花 荆芥穗 黄芩 石膏 藁本 甘草各等分

【用法】上为末。每服一钱至二钱、食后临卧用蜜水一盞调下，或茶清、或淘米第二遍泔亦得，一日三次。服至十日渐明，服至二十日大验。

【主治】久患双目不睹光明，近年近日内外气障，风昏暗，拳毛倒睫，一切眼疾。

【方论选录】羌活治脑热头风，密蒙花治羞明怕日，木贼退翳障，香白芷清利头目，细辛、萝卜菜子二味起倒睫，麻子起拳毛，川

芎治头风, 苍术明目暖水脏, 甘菊花、荆芥穗治目中生疮, 黄芩、石膏二味洗心退热, 藁本治偏正头痛, 甘草解诸药毒。

20891 石膏建中汤

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】芍药 官桂 石膏 甘草

【用法】水二钟, 加生姜五片, 大枣二枚, 煎一钟, 食前服。

【主治】霍乱, 表虚自汗, 风暑合病。

20892 石膏知母汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【异名】石膏泻白散(原书卷三)。

【组成】石膏 知母 桔梗 桑白皮 地骨皮 甘草

【主治】伤暑咳嗽, 身热引饮, 内热烦躁。或燥火身肿, 有咳嗽者。

20893 石膏泻白散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】石膏 知母 桑白皮 地骨皮 甘草

【用法】上为粗末。水煎服。

【主治】燥火伤肺, 咳嗽气喘。

【加减】痰多, 加贝母、瓜蒌。

20894 石膏泻白散

《症因脉治》卷三。为原书卷二“石膏知母汤”之异名。见该条。

20895 石膏枯矾膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】煅石膏 18 克 枯矾 18 克 雄黄 6 克 冰片 1 克

【用法】上为极细末, 加凡士林 187 克, 调成软膏。外用。

【主治】阴囊湿疹。

20896 石膏茵陈散

《东医宝鉴·杂病篇》卷六。为方出《圣惠》卷五十五, 名见《得效》卷三“茵陈散”之异名。见该条。

20897 石膏独活汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】石膏(碎)一两 麻黄(去根节,

煎, 掠去沫, 焙) 羌活(去芦头) 独活(去芦头) 甘草(炙, 锉) 天南星(炮) 青橘皮(去白, 麸炒) 枳壳(去瓢, 麸炒) 干姜(炮) 柴胡(去苗) 益智(去皮) 桂(去粗皮) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加葱白二寸, 豉二七粒, 煎至一分, 去滓热服。盖覆出汗。

【主治】中风伤寒, 头痛体疼, 发热恶寒。

20898 石膏神术汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】石膏 熟苍术 甘草

【主治】湿温身痛。

【加减】上部痛, 加防风、荆芥、白芷、川芎; 下部痛, 加防己、秦艽、黄柏。

20899 石膏栝楼汤

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】黄连 黄芩 甘草 栝楼根各一两 石膏一两半

【用法】上为粗末。每服四钱, 水一盞半, 煎八分, 每次温服一盞。

【主治】伤寒小产后, 烦闷, 大燥渴。

20900 石膏柴胡汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二

【组成】石膏 柴胡

【主治】室女经闭成癆。

20901 石膏理中汤

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】理中汤加石膏

【用法】上锉。水煎, 食前服。

【主治】《治痢南针》: 霍乱后转筋者。

20902 石膏黄芩汤

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】石膏 黄芩 甘草 桑白皮 荆芥 鸡苏 桔梗各等分

【用法】水煎服。

【主治】鼻渊。

20903 石膏黄芩散

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】石膏(碎)一两 黄芩(去黑心)

山梔子仁 葛根(锉,焙) 知母(焙) 人参 黄连(去须,炒)各半两

【用法】上为细散。每服二钱匕,空心、食前浓煎葱白竹叶汤调下,一日二次。以愈为度。

【主治】伤寒后,食肉劳复如初,壮热头痛,心烦欲吐,小便赤黄。

20904 石膏菊花散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】石膏(研,飞过)一两 天南星(炮)一两半 白僵蚕一两(炒) 甘菊花一两 甘草(炙,锉)三分

【用法】上为散。每服二钱匕,食后腊茶调下。

【主治】脑风头痛难任,时愈时发。

20905 石膏崇命汤

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】石膏(研) 黄芩(去黑心) 芍药各一分 桂(去粗皮) 细辛(去苗叶) 龙骨(研) 当归(切,焙) 干姜(炮) 大黄(锉,炒) 牡蛎(煨,研) 赤石脂 白石脂各三分 甘草(炙)一两

【用法】上为粗末。一二岁儿每服半钱匕,水半盏,加大枣一枚(擘),同煎至三分,去滓温服,至夜三四服。

【主治】小儿诸痢。

20906 石膏麻桂汤

《类证活人书》卷二十。为《圣惠》卷九“麻黄汤”之异名。见该条。

20907 石膏清燥汤

《伤寒大白》卷二。为原书同卷“清燥汤”之异名。见该条。

20908 石膏葱白汤

【方源】《伤寒总病论》卷五。

【组成】豉半升 葱白(连须)二两 石膏 生姜各四两 梔子仁 升麻 大青 芒消各一两半

【用法】上㕮咀。水八升,煎三升半,去滓,下芒消化匀,每次温饮一盞,一日三四次。

【主治】肺腑脏温病,阴阳毒气,若脏实为

阳毒所损,体热生斑,气喘引饮。

20909 石膏解毒汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】石膏二钱 生地 牛蒡 石斛各一钱 紫草 金银花 连翘各八分 黄芩 红花 甘草 木通各六分

【用法】水煎与噙,频频渐服。

【主治】痘后口臭,牙根发痒出血。

【备考】不过二剂,不痒不臭,其热即解,而即愈矣,若舍此失治,则成走马牙疳。

20910 石膏梗米汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生石膏二两(轧细) 生梗米二两半

【用法】用水三大碗,煎至米烂熟,约可得清汁两大碗。乘热尽量饮之,使周身皆汗出,病无不愈者。若阳明腑热已实,不必乘热顿饮之,徐徐温饮下,以消其热可也。

【主治】温病初得,其脉浮而有力,身体壮热。并治一切感冒初得,身不恶寒而心中发热者。

【方论选录】此方妙在将石膏同梗米煎汤,乘热饮之。俾石膏寒凉之性,随热汤发散之力,化为汗液,尽达于外也。且与梗米同煮,其冲和之气,能助胃气之发达,则发汗自易。其稠润之汁,又能逗留石膏,不使其由胃下趋,致寒凉有碍下焦。此方梗米多至二两半,汤成之后,必然汁浆甚稠。饮至胃中,又善留蓄热力,以为作汗之助也。

20911 石膏熟艾汤

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】荆芥 木鳖子(去壳) 熟艾各等分 软石膏(煨)一钱半

【用法】上㕮咀。每半两,水三升,橘叶五十皮,同入瓦罐中浑令香熟,却用小口酒壶盛药,坐其口上熏之。如药稍温,略略洗之,不拘时候,其药汁可作两日用。

【主治】痔疾。

20912 石髓平渊散

【方源】《医级》卷八。

【组成】僵蚕(去嘴)一钱 石髓(黄鱼头中石, 醋煅五七次)

【用法】上为末, 吹入鼻中。外另取丝瓜近根藤数条, 烧存性, 研末。每服一钱, 白汤送下。

【主治】肝胆风热郁脑成渊, 时时流臭黄水, 久则如漏, 头脑苦痛者。

20913 石英磁石浸酒

【方源】方出《千金翼》卷二十二。名见《医方类聚》卷二十四引《食医心鉴》。

【组成】白石英五大两(泽州者) 磁石五大两(无毛, 连针多者十两亦得)

【用法】各别捣令碎, 各用两重帛练袋盛之, 以好酒一斗置不津器中, 挂药浸经六七日以后, 每日饮三两杯, 常令体中微有酒气。其酒三五日后即渐添一二升, 常令瓶满。所加草药疑力尽者任换之, 经三四个月疑石力稍微者, 即更出捣碎, 还以袋盛, 经半年后即弃之, 准前更合。

【功用】①《千金翼》乌发壮腰聪耳。②《医方类聚》引《食医心鉴》: 益精保神守中。

【主治】①《千金翼》: 中年以后, 须发斑白, 腰疼耳聋。②《医方类聚》引《食医心鉴》: 手足痹弱, 不可持物, 行动无力, 及耳聋肾脏虚损。

【加减】欲加牛膝、丹参、杜仲, 生地黄、吴茱萸、黄耆等药者, 各自量冷热及所患, 并随所有者加之, 仍随所加有忌者即禁之, 余者无忌。

20914 石室紫药神丸

《普济方》卷三七六。即《幼幼新书》卷十一引《婴童方》之“黄帝石室紫药神丸”。见该条。

20915 石斛生地黄煎

《外台》卷三十四。即《千金》卷三“石斛地黄煎”。见该条。

20916 石斛麦门冬散

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】金钗石斛(酒浸一宿, 焙) 麦门冬(汤浸, 去心) 黄耆(去芦头) 白芷 官桂(去粗皮) 白术各半两 人参半两(去芦头) 当归半两 甘草半两(炙) 熟干地黄(焙干)半两

【用法】上为细散。每服一钱, 空心盐汤送下。

【功用】平益宫脏, 退积冷, 除膀胱痛, 止带, 进饮食。

【主治】妇人虚劳。

20917 石膏鼠粘子散

【方源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】石膏 鼠粘子(炒)各等分

【用法】上为细末。每服二钱, 食后用温酒或茶清调下。

【主治】偏正头疼, 连睛疼。

20918 石蜜煎点眼方

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】石蜜三两半 朱砂半两(细研) 石盐半两(细研) 川芒消半两(碎) 盐绿一分(研) 蕤仁一两半(去赤皮, 细研) 黄连一两(去须, 捣为末) 细辛半两(末) 石决明半两(细研, 水飞过) 乌贼鱼骨半两(细研)

【用法】上为末, 以蜜调成煎, 瓷器中盛。每点如绿豆大, 纳眼两大眦中。

【主治】眼暴赤。

【宜忌】宜避风日。

20919 石曼山人甘露饭

【方源】《证类本草》卷三引《传信方》。

【异名】甘露飧(《圣惠》卷九十五)。

【组成】蜀朴消

【用法】上为末。每一大斤用白蜜冬十三两, 春、夏、秋十二两。和令匀, 便入新青竹筒, 随小大者一节著药得半筒以上即止, 不得令满。却入炊甑中令有药处在饭内, 其虚处出其上, 不妨甑箬即得。候饭熟取出承热绵滤, 入一瓷钵中, 竹篦搅勿停手, 令至凝即药成。收入盒中, 如熟月即于冷水中浸钵,

然后搅。每食后或欲卧时含一匙，渐渐咽之。如要通转亦得。

【功用】①《证类本草》引《传信方》：除热壅，凉膈上，欧积滞。②《圣惠》：镇心除热。

20920 石膏人参解肌汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】石膏(碎) 麻黄(去根节)各一两 柴胡(去苗) 人参各半两 桂(去粗皮) 甘草(炙)各一分 葛根(锉)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞。加葱、豉、生姜，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】伤寒初得一二日，头痛壮热，恶寒，脉浮紧者。

20921 石膏知母化斑散

《奇效良方》卷六十五。为《幼幼新书》卷十八引《张氏家传》“化斑散”之异名。见该条。

20922 石膏知母竹叶汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】石膏五钱至一两 肥知母一钱至二三钱 淡竹叶三片至一百片 麦冬三钱至五钱 薄荷叶三钱 西河柳一两许

【用法】水煎服。

【主治】麻疹邪热壅于肺，发热时多喘者。

右

20923 右归丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】大怀熟地八两 山药(炒)四两 山茱萸(微炒)三两 枸杞(微炒)四两 鹿角胶(炒珠)四两 菟丝子(制)四两 杜仲(姜汤炒)四两 当归三两(便溏勿用) 肉桂二两(渐可加至四两) 制附子二两(渐可加至五六两)

【用法】上先将熟地蒸烂杵膏，加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百余丸，食前用滚汤或淡盐汤送下。或丸如弹子大，每嚼服二三

丸，以滚白汤送下。

【功用】①《景岳全书》：益火之原，以培右肾之元阳。②《方剂学》：温补肾阳，填精止遗。

【主治】①《景岳全书》：元阳不足，或先天禀衰，或劳伤过度，以致命门火衰不能生土，而为脾胃虚寒，饮食少进；或呕恶膨胀；或翻胃噎膈；或怯寒畏冷；或脐腹多痛；或大便不实，泻痢频作；或小水自遗，虚淋寒疝；或寒侵溪谷，而肢节痹痛；或寒在下焦而水邪浮肿。总之，真阳不足者，必神疲气怯，或心跳不宁，或四肢不收，或眼见邪祟，或阳衰无子等症。②《会约》：阳亏精滑，阳萎精冷。

【加减】如阳衰气虚，必加人参以为之主，或二三两、或五六两，随人虚实以为增减；如阳虚精滑，或带浊便溏，加补骨脂(酒炒)三两；如殄泄肾泄不止，加北五味子三两、肉豆蔻三两(面炒，去油用)；如饮食减少，或不易化，或呕恶吞酸，皆脾胃虚寒之证，加干姜三四两(炒黄用)；如腹痛不止，加吴茱萸二两(汤泡半日，炒用)；如腰膝痠痛，加胡桃肉(连皮)四两；如阴虚阳萎，加巴戟肉四两、肉苁蓉三两，或加黄狗外肾一二付，以酒煮烂捣入之。

【方论选录】《方剂学》：本方立法，“宜益火之原，以培右肾之元阳”。培补肾中元阳，必须“阴中求阳”，即在培补肾阳中配伍滋阴填精之品，方可具有培补元阳之效。方中桂、附加血肉有情之鹿角胶，均属温补肾阳，填精补髓之类；熟地、山茱萸、山药、菟丝子、枸杞、杜仲，俱为滋阴益肾，养肝补脾而设；更加当归补血养肝。诸药配伍，共具温阳益肾。填精补血，以收培补肾中元阳之效。

【临证举例】①白血球减少症《河南中医》(1984；2：34)：殷某某：男，50岁。患者主诉头昏失眠，全身乏力已十年，多次查白细胞均在4000/立方毫米以下。现症：形体消瘦，面色萎黄，头昏目涩，口干不喜饮，纳

谷不馨,食后脘胀,大便时溏,夜寐不实,舌淡,苔薄白,脉沉细,查血白细胞 2500/立方毫米,始用归脾汤治疗,腹胀便溏好转,但仍诉头昏乏力,转以肾命火衰,精血不足论治,转方拟右归丸改汤剂煎服。处方:熟地黄 20 克,菟丝子 10 克,怀山药 10 克,枸杞子 10 克,山萸肉 10 克,仙灵脾 10 克,全当归 12 克,鹿角胶(烔冲) 6 克,上肉桂 4 克,熟附片 3 克,杜仲 12 克。七付药后,全身感到较前有力,头昏耳鸣减轻,夜寐亦安。唯感口干,时值长夏,故去附子,余药续服,十五剂药以后,二次复查白细胞,先后为 3700/立方毫米,4400/立方毫米。临床症状逐渐改善而出院。②遗传性小脑型共济失调 《上海中医药杂志》(1984, 2: 35): 续某某,女,20 岁,患小脑共济失调症已四年,近数月来病情加重。步履蹒跚,左右摇晃,头昏耳鸣,记忆减退,形寒肢冷,腰膝无力。苔薄舌质偏淡,边有齿印,脉细,两尺沉而无力。治以温肾补督,益精养髓,拟景岳右归丸加减:淡附片 6 克,上肉桂 4 克,鹿角霜、杜仲、淮山药、怀牛膝、全当归各 9 克,菟丝子、龟板、杞子、熟地、制首乌各 12 克。服药二十剂后,患者自觉精神好转,足膝步履较前有力,亦较稳健,惟头晕未已,口渴欲饮,苔薄脉细。前方得手,再加生地 12 克,服药五十剂后病情显著好转。在家人扶持下,每日在病区走廊内行走 90 余圈,每圈约 50 米。单行走时,步履较前稳健。现随访治疗五个月余,病情稳定,续有进步,已能上下楼梯,单独行走,仍按原意,继续将息调治,以资巩固。③带下 《浙江中医学院学报》(1982; 6: 27): 陈某某,女,30 岁。腰痠背痛,带下绵绵,色如蛋清,少腹重胀,头昏耳鸣,病经二年未愈。经量少,色淡,无痛经,每日晨起面目浮肿,生育四胎,“人流”两次,舌淡苔白,脉濡细。肾阳不足,阳虚内寒,带脉失约,任脉不固,治拟调补带任二脉,补摄固带为宜。熟地、淮山、菟丝子、覆盆子

各 15 克,杞子、萸肉、鹿角霜、炒杜仲各 12 克,熟附块、肉桂各 3 克,当归、炒白术各 10 克,红枣六枚。服七剂后,带下明显减少,余症减半,苔脉如前,嘱原方续服半月,随访数月未见复发。

【现代研究】对甲减大鼠胸腺胞浆雌二醇受体的作用 《上海中医学院上海市中医药研究院学报》(1987; 1: 55): 用他巴唑造成甲减大鼠模型,观察补肾阳方剂右归丸对甲减大鼠胸腺重量、血清雌二醇 (E_2) 含量及胸腺胞浆 E_2 受体的影响。结果表明: 右归丸明显增高甲减动物胸腺重/体重比值 ($P < 0.05$) 及血清 E_2 含量 ($P < 0.01$), 并减少胸腺胞浆 E_2 受体数量。推测其作用机制可能是通过促进下丘脑—垂体—性腺轴的功能; 提高甲状腺功能,改善对 E_2 外周代谢的影响或直接作用于胸腺增强功能。

20924 右归丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】熟地五两 萸肉三两 附子一两(炮) 肉桂一两(去皮) 山药三两(炒) 茯苓一两半 沉香五钱 丁香一两

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服三钱,乌梅汤送下。

【主治】产后肾虚冷伏,真火不归,直冲清道,而升降失常,故呃逆连连不止,脉沉细者。

【方论选录】方中熟地制阴滋肾,萸肉秘气涩精,附子补真阳以归真气,肉桂暖其血以吸虚阳,茯苓渗湿和脾气,山药益阴补脾元,丁香温胃散中宫之滞,沉香温肾降九天之气也。炼蜜为丸,乌梅汤下,使肾暖阳回,则伏冷自消,而真火无不归之患,清道无冲逆之虞,自然升降如常,呃逆无不自平矣。

20925 右归饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地二三钱或加至一二两 山药(炒)二钱 山茱萸一钱 枸杞二钱 甘草(炙)一二钱 杜仲(姜制)二钱 肉桂一二

钱 制附子一至三钱

【用法】水二钟，煎七分，空腹温服。

【功用】《方剂学》：温肾填精。

【主治】肾阳不足，腰膝痠痛，气怯神疲，大便溏薄，小便频多，手足不温，及阳萎遗精，舌苔淡薄，脉象沉细者。

①《景岳全书》：命门之阳衰阴胜者。②《会约》：阳虚咳嗽。③《医部全录》：产妇虚火不归元而发热者。④《医方简义》：肾虚火衰，举坠而痛。⑤《方剂学》：肾阳不足，气怯神疲，腹痛腰痠，肢冷，舌淡苔白，脉沉细；或阴盛格阳、真寒假热之证。

【加减】如气虚血脱，或厥，或昏，或汗，或运，或虚，或短气者，必大加入参、白术，随宜用之；如火衰不能生土，为呕哕吞酸者，加炮干姜二三钱；如阳衰中寒，泄泻腹痛，加入参、肉豆蔻，随宜用之；如小腹多痛者，加吴茱萸五七分；如淋带不止，加破故纸一钱；如血少血滞，腰膝软痛者，加当归二三钱。

【方论选录】《方剂学》：方用熟地为主，甘温滋肾以填精，此本阴阳互根，于阴中求阳之意；附子、肉桂温补肾阳而祛寒，山萸肉、枸杞养肝血，助主药以滋肾养肝，山药、甘草补中养脾，杜仲补肝肾，壮筋骨，以上诸药共为辅佐药。各药合用，有温肾填精的作用。

【临证举例】①肾虚眩晕 《新医药学杂志》(1979; 6: 24): 鄢某某，女，56岁，小学教师。患高血压(180~190/90~100毫米汞柱)已多年，经常头昏目眩，甚则晕倒，梦多睡差，腰膝痠冷，多尿，大便时溏，脸面时红，经用平肝潜阳等法治之无效，来我科就医。诊得其脉沉细，两尺弱，舌淡而润。脉症合参，此为肾阳不足，治用右归饮加减。处方：萸肉10克，杜仲10克，熟地12克，淮山药10克，枸杞子15克，桂皮4克，附片(先煎)6克，磁石12克，钩藤12克。复诊：服五剂后，眩晕、腰痠等均大减，血压降至140/80毫米汞柱，尿正常，便溏，多梦等如

前，脉沉细。肾阳渐复，治守前方除钩藤，加沙苑子15克，菟丝子10克，朱茯苓12克，珍珠母12克，继服六剂，血压稳定正常。②精子缺乏症 《浙江中医杂志》(1983; 11: 497): 运用右归饮加味治疗精子缺乏症6例，获得满意效果。一般资料：患者年龄为30~35岁，婚后3~6年未育，精液常规检查，精子计数均显著低于正常，最低者500万/ml，精子活动率均低于20%，最低者3%，其中有遗精史1例，早泄2例，举而不坚1例，大便频溏1例，患者面色㿠白或萎黄，或苍黯不华，有不同程度畏寒，舌质淡，苔薄白，脉象沉细而软，呈现一派命门火衰、肾阳不足之象。治疗方法：以补命门之火，兼温肾阳为主，伴大便频溏者，兼顾脾阳。方用右归饮加味：有遗精史及早泄者，加韭菜子、金樱子、龙骨、牡蛎；大便频溏者，加补骨脂，炒白术、党参、干姜；举而不坚者，加淮牛膝、巴戟天、续断。每日1剂，连服3周后，除每晚续服汤剂外，早晨及中午吞服右归丸(鹿角胶改为鹿茸，并加入参)，每次9克。治疗效果：除1例服药近3个月，因工作调动结果不详外，其余5例患者的爱人均受孕生育，其中服药2个月及4个月者各1例，3个月者3例。

20926 右归饮

【方源】《医家心法》。

【组成】熟地六两六钱 山药 山萸肉 菟丝各二两二钱 补骨脂 桂心 附子 甘草(炙)各一两一钱 北五味八钱八分

【主治】命门虚寒，腹痛泄泻胀满，阳萎精寒，不能生子，两膝痠疼，脚软无力，眼目昏花，八味丸治之不效者。

20927 右归饮

【方源】《性病》。

【组成】大熟地二两 菟丝子三钱 上玉桂(研末，冲) 生五味八分(捣碎) 鹿茸二钱 锁阳三钱 熟附片四钱 果杞三钱(酒炒) 川椒七分(去闭口，炒) 淮牛膝

二钱 淮山药五钱 固脂二钱(核桃肉拌炒)

【用法】水煎服。

【主治】命门火衰，精气虚寒，阳物不举，或下部极冷者。

20928 右军方

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】乌药五钱 白芷五钱 雄黄二钱 朱砂二钱 没药 乳香各一钱

【用法】上为末，面为丸，如梧桐子大。每服三十丸，烧酒送下。五七日见效。

【主治】杨梅疮后鹅掌风。

20929 右归饮加减汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】熟地四钱 淮山药(炒) 半夏(制) 枸杞各二钱 萸肉一钱五分 附子(制)一钱 肉桂(去皮，另炖)五分 炙草七分

【主治】病在下焦，朝食暮吐，暮食朝吐，食入久而反出者。

左

20930 左龙丸

【方源】《保命集》卷中。

【组成】左蟠龙五钱(炒) 白僵蚕 蜈蚣各五钱(炒) 雄黄一钱

【用法】上为细末，烧饼为丸，如梧桐子大。每服十五丸，温酒送下。

【主治】破伤风。

【加减】如里证不已，当于左龙末一半内加巴豆霜半钱，烧饼为丸，如梧桐子大。每服一丸，同左龙丸一处合服。每服药中加一丸，如此渐加服至利为度。

【备考】本方方名，《普济方》引作“左盘龙丸”。

20931 左龙丸

《金鉴》卷三十九。为《保命集》卷中“江蟠丸”之异名。见该条。

20932 左归丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】大怀熟八两 山药(炒)四两 枸杞四两 山茱萸肉四两 川牛膝(酒洗，蒸熟)三两(精滑者不用) 菟丝子(制)四两 鹿胶(敲碎，炒珠)四两 龟胶(切碎，炒珠)四两(无火者不必用)

【用法】上先将熟地蒸烂杵膏，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百余丸，食前用滚汤、或淡盐汤送下。

【功用】①《景岳全书》：壮水之主，培左肾之元阴。②《方剂学》：填补肝肾真阴。

【主治】真阴肾水不足，不能滋养营卫，渐至衰弱，或虚热往来，自汗盗汗；或神不守舍，血不归原；或虚损伤阴；或遗淋不禁；或气虚昏运；或眼花耳聋；或口燥舌干；或腰痠腿软，凡精髓内亏，津液枯涸之证。

【加减】如真阴失守，虚火上炎者，宜用纯阴至静之剂，于本方去枸杞、鹿胶，加女贞子三两，麦冬三两；如火烁肺金，干枯多嗽者，加百合三两；如夜热骨蒸，加地骨皮三两；如小水不利、不清，加茯苓三两；如大便燥结，去菟丝，加肉苁蓉三两；如气虚者，加人参三四两；如血虚微滞，加当归四两；如腰膝痠痛，加杜仲三两(盐水炒用)；如脏平无火而肾气不充者，加破故纸三两(去心)，莲肉、胡桃肉各四两，龟胶不必用。

【方论选录】①《何氏虚劳心传》：以纯补犹嫌不足，若加苓、泽渗利，未免减去补力，奏功为难，故群队补阴药中更加龟、鹿二胶，取其为血气之属，补之效捷耳。②《方剂学》：方中重用熟地滋肾以填真阴；枸杞益精明目；山茱萸涩精敛汗；龟、鹿二胶，为血肉有情之品，鹿胶偏于补阳，龟胶偏于滋肾，两胶合力，沟通任督二脉，益精填髓，有补阴中包涵“阳中求阴”之义。菟丝子配牛膝，强腰膝，健筋骨，山药滋益脾胃，共收滋肾填阴，育阴潜阳之效。

【临证举例】①疟疾 《扫叶庄医案》：脉左数搏，是先天真阴难充，则生内热，疟热再伤其阴，与滋养甘药填阴。左归丸去杞子、牛

膝,加天冬、女贞。②腰肌劳损 《江苏中医杂志》(1982;1:35);王某某,男,42岁。患腰肌劳损,腰痛已两载,经用封闭、推拿、针灸等治疗效果不显,患者腰脊痠痛,并伴见头晕、失眠、咽干、遗精等证,诊脉弦细,两尺尤弱,苔薄中裂,舌质较红,良由肾水不足,精髓内亏,治宜育阴补肾为主,拟予左归丸加味:鹿角片12克、熟地12克、炙龟版12克、杞子12克、净萸肉12克、菟丝子12克、淮山药12克、淮牛膝9克、川石斛9克、川杜仲9克、桑寄生9克。服药十三剂,腰痛大减,睡眠转佳,眩晕、咽干等症相继消失。后以青娥丸调治善后。

20933 左归饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地二三钱或加至一二两 山药二钱 枸杞二钱 炙甘草一钱 茯苓一钱半 山茱萸一二钱(畏酸者少用之)

【用法】水二钟,煎七分,空腹服。

【功用】①《景岳全书》:壮水。②《方剂学》:养阴补肾。

【主治】真阴不足,腰痠且痛,遗精盗汗,咽燥口渴。

①《景岳全书》:命门之阴衰阳胜者。②《会约》:阴衰阳胜,身热烦渴,脉虚气弱。③《医方简义》:肾虚腰痛,偏坠遗精。④《方剂学》:真阴不足,症见腰痠遗泄,盗汗,口燥咽干,口渴欲饮,舌光红,脉细数。

【加减】如肺热而烦者,加麦冬二钱;血滞者,加丹皮二钱;心热而躁者,加玄参二钱;脾热易饥者,加芍药二钱;肾热骨蒸多汗者,加地骨皮二钱;血热妄动者,加生地二三钱;阴虚不宁者,加女贞子二钱;上实下虚者,加牛膝二钱以导之;血虚而燥者,加当归二钱。

【方论选录】①《成方切用》:按六味乃虚中挟湿热而滞者宜之。若纯虚者,无取泽泻之泄,丹皮之凉,也宜以此甘纯之剂平补之。②《血证论》:《难经》谓左肾属水,右肾属火,景岳此方,取其滋水,故名左归,方取

枣皮酸以入肝,使子不盗母之气;枸杞赤以入心,使火不为水之仇;使熟地一味,滋肾之水阴;使茯苓一味,利肾之水质;有形之水质不去,无形之水阴亦不生也。然肾水实仰给于胃,故用甘草、山药,从中宫以输水于肾。景岳方多驳杂,此亦未可厚非。③《方剂学》:方中重用熟地为主,甘温滋肾以填真阴;辅以山茱萸、枸杞子养肝血,合主药以加强滋肾阴而养肝血之效;佐以茯苓、炙甘草益气健脾,山药益阴健脾滋肾。合而有滋肾养肝益脾之效。

【临证举例】①虚劳 《张聿青医案》:今稍一感触,即觉伤风,表气不固已甚,肺在上主气之出,肾在下主气之纳,肾虚封藏不固,则肾气不能仰吸肺气下行,气少归纳,所以体稍运动,即觉气急,素有之痰饮,为冲阳挟之而上,咽痒咳嗽,甚至见红。特是肾之阴虚,与肾之阳虚,皆令气不收藏,左脉弦大,且有数意,断无命阳不振,寒饮上泛,而脉不沉郁,转见弦大之理,所以脉大而左部为甚,以肝肾之脉,皆居于左,其为肾阴虚不能收摄无疑。况所吐之痰,牵丝不断,并非水饮。饮之所以为痰者,热炼之也。仲景小青龙汤、真武汤为痰饮之要方。汤曰青龙,为其行水也,真武水神名,为其治水也,足见饮即水类,与痰浊绝不相同。下虚如此,断勿存观望之心,而使根蒂日近空乏,用介宾先生左归饮法。紫口蛤壳、生地炭、怀山药、长牛膝、萸肉、白茯苓、车前子。②眩晕 《湖北中医杂志》(1980;1:22)。某女,40岁,家庭妇女,1953年秋末,在月经期间入河水中洗衣被,从而发病。开始时,恶寒发热,月经亦止而停潮。经治疗未效,三日后其寒热自罢,旋即转为头目眩晕,不能起床,目合不语,时而睁眼暂视周围而遂闭合,目光如常,脉细沉涩。乃正虚血瘀,风木上扰,治宜滋水涵木,以祛瘀息风,方用左归饮加味:熟地15克,山药12克,枣皮12克,茯苓12克,枸杞12克,炙草9克,车前子9克,

五味子6克。水煎服。患者服药一剂后即大便下血而诸证遂失，神清人慧，其病告愈，继之服完第二剂，以巩固疗效。

20934 左归饮

【方源】《会约》卷九。

【组成】熟地三钱或七八钱 山药二钱 枸杞一钱半 甘草(炙)一钱 茯苓一钱半 枣皮一钱 麦冬一二钱 当归二钱 白芍一钱半 丹皮一钱

【用法】水煎服。

【功用】壮水济火。

【主治】金被火刑，虚劳咳嗽。

【加减】或加生地一二钱；如五心热，加玄参一钱半；如肾热骨蒸，加地骨皮一钱半。

20935 左关煎

《医部全录》卷二五五。为《景岳全书》卷五十一“佐关煎”之异名。见该条。

20936 左金丸

【方源】《丹溪心法》卷一。

【异名】回令丸(原书同卷)、黄连丸(《医学入门》卷七)、茱连丸(《医方集解》)、佐金丸(《张氏医通》卷十六)二味左金丸(《全国中药成药处方集》天津方)

【组成】黄连(一本作芩)六两 吴茱萸一两或半两

【用法】上为末，水为丸，或蒸饼为丸。每服五十丸，白汤送下。

【功用】①《丹溪心法附余》：泻肝火，行湿，开痞结。②《方剂学》：清泻肝火，降逆止呕。

【主治】肝火犯胃，嘈杂吞酸，呕吐胁痛，筋疝痞结，霍乱转筋。

①《丹溪心法》：肝火胁痛。②《医方集解》：肝火燥盛，左胁作痛，吞酸吐酸，筋疝痞结。③《霍乱论》：霍乱转筋。

【方论选录】①《医方考》：左金者，黄连泻去心火，则肺金无畏，得以行令于左以平肝，故曰左金。吴茱萸气臊味辛性热，故用之以反佐。以方君一臣一，制小其服者，肝

邪未盛也。②《医方集解》：此足厥阴药也。肝实则作痛，心者肝之子，实则泻其子，故用黄连泻心清火为君，使火不克金，金能制木，则肝平矣；吴茱萸辛热，能入厥阴肝，行气解郁，又能引热下行，故以为反佐。一寒一热，寒者正治，热者从治。③《古方选注》：经脉循行，左升右降，药用苦辛，肃降行于升道，故曰左金。吴茱萸入肝散气，降下甚捷；川黄连苦燥胃中之湿，寒胜胃中之热，乃损其气以泄降之，七损之法也。当知可以治实，不可以治虚，若误论虚实而用之则误矣。④《金鉴》：胡天锡曰，此泻肝火之正剂。独用黄连为君，以实则泻子之法，以直折其上炎之势；吴茱萸从类相求，引热下行，并以辛温开其郁结，惩其肝格，故以为佐。然必木气实而土不虚者，庶可相宜。左金者，木从左，而制从金也。⑤《谦斋医学讲稿》：方中黄连入心，吴茱萸入肝，黄连的用量六倍于吴萸，故方解多作实则泻其子，并以吴茱萸为反佐药。我认为肝火证很少用温药反佐，黄连和吴茱萸归经不同，也很难这样解释。从效果研究，以吞酸嘈杂最为明显，其主要作用应在于胃。黄连本能苦降和胃，吴茱萸亦散胃气郁结，类似泻心汤的辛苦合用。故吞酸而兼有痰湿粘涎的，酌加吴茱萸用量，效果更捷。

【临证举例】锑剂反应性呕吐《上海中医药杂志》(1983; 3: 33)。一卫性男青年，工人，患慢性血吸虫病，在血吸虫病病房住院治疗，采用酒石酸锑钾(简称锑剂)二十天疗法。至疗程第七天(注射第7针)时，泛恶呕吐，难以忍受，遂要求中止治疗。当时我建议用中成药左金丸治之，每次3克，一日三次。药后1天，泛恶呕吐缓解。继续注射锑剂，配合服用左金丸，不再发生呕吐，以致疗程顺利结束。与此同时，该病房另有恶性呕吐反应者八人，经服用左金丸，均获得了止呕的效果。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“回

金丸”。

20937 左金汤

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】川连（或生或炒随酌） 吴茱萸（汤泡） 制半夏 茯苓 陈皮 甘草 枳壳 竹茹 藿香

【主治】霍乱吐泻转筋，手足寒，心烦热渴。

20938 左金汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】白术（净） 陈皮各一钱五分 黄连八分 吴萸（泡）四分

【用法】水煎服。

【主治】肝火胁痛。

20939 左经丸

【方源】《苏沈良方》卷二。

【组成】草乌（肉白者、生，去皮脐） 木鳖子（去壳，别研） 白胶香 五灵脂各三两半 当归一两 斑蝥一百个（去翅足，少醋煮熟）

【用法】上为末，用黑豆去皮，生杵粉一斤，醋煮糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，酒磨下。

【功用】通荣卫，导经络。

【主治】筋骨诸疾，手足不随，不能行步运动。

【宜忌】《准绳·疡医》：此方非内有污血痼积不宜用。

【临证举例】不能行立 予邻里胡生者，一女子膝腕软不能行立，已数年。生因逆净因佛寺与僧言，有一僧云能治，出囊中丸十枚，以四枚与生曰：“服此可瘥”。生如其言，与服，女子遂能立。有一里巷儿，年十余岁，两足不能行，以一丸分三服服之，尽四五丸遂能行。自此大为人所知，其效甚著。此药能通荣卫，导经络，专治心肾肝三经，服后小便少淋沥乃其验也。

20940 左经丸

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）

【组成】生黑豆一斤（以斑蝥二十一枚，去头足同煮，候豆胀为度，去斑蝥不用；取豆焙干） 川乌（炮，去皮脐）二两 乳香（研）一两 没药一两半 草乌（炮）四两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【功用】常服通经络，活血脉，疏风顺气，壮骨轻身。

【主治】左瘫右痪，手足颤掉，言语謇涩，浑身疼痛，筋脉拘挛，不得屈伸，项背强直，下注脚膝，行履艰难，骨节烦痛，不能转侧；跌扑闪肭，外伤内损。

20941 左经汤

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】羌活 前胡 苍术（米泔水浸一宿，去皮，炒） 人参（去芦） 白茯苓（去皮）各一两 川芎 枳壳（麸炒，去瓤） 桔梗（炒） 甘草各半两（炙） 官桂（去粗皮，不见火） 附子（生，去皮脐） 干木瓜 干姜（炮，洗）各一两

【用法】上咬咀。每服二钱半，水一盏半，加生姜三片，薄荷两叶，煎至七分，去滓，食前服。

【主治】风湿所搏，肢体沉重。

20942 左经汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】麻黄 桂心 黄芩 枳壳 柴胡 半夏 甘草 羌活 防风 厚朴 白姜 茯苓 小草 防己 麦冬各等分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】三阳经脚气，痰湿风肿，腰足拘挛，喘满烦闷，大小便秘。

20943 左盘龙丸

《普济方》卷一一三。即《保命集》卷中“左龙丸”。见该条。

20944 左金地骨饮

【方源】《羊毛温证论》。

【组成】大熟地五钱 骨碎补（去毛，蜜制）三钱 钗石斛三钱 白芍药五钱 云茯

芩一钱 蝉蜕七钱

【用法】磨刀水煎，去滓服。

【主治】羊毛温邪内伤金土，木气横逆，胁痛不止，气闭壅胀，难以转侧，脉象弦大，或沉弦而细，并治牙疼久不能愈。

20945 左金加陈米汤

【方源】方出《医方集解》，名见《退思集类方歌注》。

【组成】黄连六两（姜汁炒） 吴萸一两（盐水泡） 糯米一撮

【用法】浓煎服。但得三匙下咽，即不复吐矣。

【主治】噤口痢，汤药入口即吐。

龙

20946 龙砂

【方源】《眼科阐微》卷四。

【组成】蚕砂一斗（合千里光烧灰，以滚童便淋汁五碗） 甘石二两（打碎如豆，入铜锅内，用白童便浸出二指，桑柴煮干，取起，再浸再煮，如此七次，尝苦咸味方止。如淡再煮。每次要焙干，取起听用。）

【用法】上药入铜锅内，桑柴火徐徐煮至汁尽为度，煨红，冷成腻粉；入朱砂一钱五分，听用。饭后点大眼角，不可近黑珠，每日点十余次。

【主治】目赤肿痛痼痒；云膜胬肉，赤白翳障。

【备考】原书用本方，须兑虎液、五烹、冰片合用。

20947 龙胶

【方源】《不居集》上集卷十四。

【组成】阿胶（炒） 蛤粉各一两 辰砂少许

【用法】上为末。藕节捣汁，和蜜调下。

【主治】大人、小儿吐血。

20948 龙马丹

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】马齿苋二钱 黄柏五钱 陈年石

灰二钱 轻粉一钱 地龙粪三钱 伏龙肝二钱 黄丹三钱 赤石脂三钱

【用法】上药各为细末。蜜调敷之。

【主治】①《洞天奥旨》：湿毒疮。多生于两足，非在足胫，即在足踝，非在足背，即在足跟。②《外科真铨》：瓜藤缠。疮疡绕胫而发。

20949 龙牙散

【方源】《千金》卷十七。

【组成】龙牙 茯苓各二两半 雄黄 枣膏 芍药各五分 干地黄 石斛 胡燕屎各三分 铜镜鼻 甘草 橘皮 芎藭 鬼督邮 远志 鳖甲各半两 狸阴二具 蜈蚣一枚 鬼箭羽 乌头 羌活 露蜂房 曾青 真珠 桂心 杏仁 防风 桃奴 鬼白 鸛骨各一两 人参 大黄各一两半 苏子四合 白术二两

【用法】上药治下疳。每服一刀圭，酒下。以知为度，当有虫从便出。

【主治】百疔邪气，飞尸万病。

【方论选录】《千金方衍义》：龙牙散中鸛骨、狐阴、雄黄、曾青、乌头、三鬼辟邪攻毒之味无不毕具，宜为百疔万病之类治也。

20950 龙车散

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】柴胡 甘草各一钱 白芍 茯苓各五钱 车前子三钱 龙胆草五分

【用法】水煎服。

【主治】少阳痼病。感湿热之气，又感风邪，颈项强直，一目或左右视，手足搐搦。

20951 龙化丹

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】黄丹一钱 赤枯矾一钱 蚯蚓粪三钱 冰片一分 轻粉三分 烟胶一钱 炉甘石一钱

【用法】上药各为末，研细。用香油搽。

【主治】月蚀疳。

20952 龙爪散

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】猪蹄甲四十九个

【用法】洗净控干，每个猪甲内入半夏、白矾末各一字，入一罐子内封闭，不透烟，火煨通赤，放冷，为细末，入研细麝香一钱拌匀。每服半钱，空腹糯米饮调下。

【主治】小儿涎喘咳嗽。

20953 龙凤丸

【方源】《得效》卷七。

【组成】鹿茸（火燎去毛）一两（酒浸，炙） 山药 菟丝子（酒浸，炒）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下；浓煎入参汤亦可。

【主治】消渴。饮酒多，发积为酷热，熏蒸五脏，津液枯燥，血泣，小便并多，肌肉消烁，专嗜冷物寒浆。

【备考】《普济方》：一方面糊为丸。盐酒汤送下。名“龙肝凤髓丸”。

20954 龙凤丹

《痘疹仁端录》卷十三。为《摄生众妙方》卷十“龙凤膏”之异名。见该条。

20955 龙凤膏

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【异名】龙凤丹（《痘疹仁端录》卷十三）。

【组成】乌鸡卵一个 地龙（活者细小者）一条

【用法】上以鸡卵开一小窍，入地龙在内，夹皮纸糊其窍，饭甑上蒸熟，去地龙。与儿食之；每岁立春日食一枚亦可。

【功用】预防痘疹。

20956 龙凤膏

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】凤凰壳（即出鸡蛋壳，不拘多少，微火炒黄色，为细末） 蚯蚓粪末各等分

【用法】用腊月猪脂油调膏。敷疮。

【主治】一切恶疮。

20957 龙火汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】苁蓉三钱 肉桂五分 党参四钱 茯苓二钱 白术一钱 归身二钱（酒炒） 白

芍一钱（酒炒） 木香五分 川断二钱 独活一钱（酒炒） 角霜四钱 蚕沙三钱 红枣十枚 姜三片

【功用】调养气血，温通经络。

【主治】痛痹。

20958 龙石散

【方源】《幼幼新书》卷三十四引《张氏家传》。

【组成】寒水石（烧一日）一斤 生脑子一钱 朱砂（飞）一两

【用法】上为细末。每用少许擦患处，咽津。儿疮疹攻口齿，先用化毒丹，次用此药擦之。

【主治】上膈壅热。咽喉肿塞疼痛，口舌生疮。

20959 龙石散

【方源】《魏氏家藏方》卷七引李防御五痔方。

【组成】龙骨（煨过，去火毒） 香白芷 好黄丹 软石膏（煨过，去火毒）各等分

【用法】上为极细末。干掺疮口上，又须候痔头焦落尽，以此药收敛疮口，更预先准备些好血竭末，或要止血，或要收敛疮口要用。

【功用】收敛疮口。

【主治】痔疮。

20960 龙石散

【方源】《医方类聚》卷一八三引《修月鲁般经》。

【组成】龙骨 赤石脂 海螵蛸 白芷 黄丹 血竭 朱砂各等分

【用法】上为细末。敷患处。

【功用】痔落尽后收敛疮口。

20961 龙石散

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】伏龙肝不拘多少 滑石少许

【用法】各为极细末，和匀。掺在疮上，外用草纸革之。

【主治】湮尻疮。湿热之气湮烂成疮，生于新生之儿，或在颐下项边，或在两肢窝内，或在两腿丫中。

20962 龙生丸

【方源】《中国内科医鉴》。

【组成】石硫黄 胡椒

【用法】糊为丸。每服五七粒，白汤送下。

【主治】胃病。

20963 龙朱散

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】马牙消半斤 川芒消四两 寒水石四两 石膏三两

【用法】以水五升，浸三日，用银器中煎至水尽，后入寒水石及石膏，候凝硬，阴干，别入龙脑半两、朱砂一两，同研为末。每服一钱，不拘时候，以蜜水调下。

【主治】心肺热渴，面赤口干；兼治喉痹肿痛。

20964 龙朱散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】龙脑一字（研） 朱砂一钱（研，水飞） 竹筒杆内虫粪三钱（研） 坯子胭脂半钱（研） 麝香一字（研）

【用法】上为细末，以鞣耳子挑药入病耳中，如有脓水者，先以新绵捻子缠之净尽，方倾入药，每夜临卧时一次。

【主治】小儿耳内肿，及生疮出脓汁，或只痒痛虚鸣，应耳中一切诸病。

20965 龙华散

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】蛇蜕皮一条或三五条（着卷灰火烧存性）

【用法】上为末。每服一字，无根水送下，未发前一时服。一方用生皮塞耳，临发服少许盐醋，令吐。

【主治】诸疟疾。

【宜忌】忌鸡、鱼、冷物。

20966 龙衣粉

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】蛇皮 100 克

【用法】微炒黑后，研细粉外用。

【主治】下腿溃疡。

20967 龙衣散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】蛇蜕（全者）一条 马勃一两 皂角子二十四粒。

【用法】上入小瓷罐内，盐泥封固，烧赤，勿令烟出，候令存性为末。食后温水调下。

【主治】疹后因潮不尽，热毒上攻于目。翳膜侵睛，或成珠子，或如蟹眼，在黑睛上者。

20968 龙连膏

【方源】《普济方》卷八十六。

【组成】黄连四两（洗净，锉，用水四盏慢火熬成膏，去滓） 蜜一斤（慢火熬令得所，却入黑膏子熬） 黄丹少许 龙涎粉一两

【用法】上将先前药膏，熬后入粉，再用半盏水研细，倾入蜜药膏在内，慢火熬，用篦子搅令紫色，倾在罐子内，再用水半盏洗熬药器物，依前倾入药内。却入麝香半钱，片脑半钱，搅令匀。遇患点之。

【主治】眼疾。

20969 龙肝散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】伏龙肝 铅丹 牡蛎各半两

【用法】上为散，再同研细。每服二钱匕，陈米饮调下，不拘时候。

【主治】肠风泻血。

20970 龙肝散

【方源】《普济方》卷三五七。

【组成】伏龙肝

【用法】上为末。熟水调下；童便调尤妙。

【主治】子死腹中，母气欲绝。

20971 龙肝散

【方源】《普济方》卷三八九。

【组成】灶心土（经十年以上者）

【用法】上为末。醋调涂患处。鼻衄，入蜜水调下；肠风下血，米汤调下；婴儿夜啼，钩藤汤调下；脐中疮湿久不愈，干用；火瘃，屋漏水调涂，冷水亦可；赤游肿行于身，上至心即死，鸡子白调涂。

【主治】①《普济方》：小儿壅肿，鼻衄下血，夜啼脐湿，火丹赤游肿，汤火熟油疮等。

②《医统》：热甚吐血。

【备考】《医统》本方用法，每服二钱，新汲水调下，频服。

20972 龙肝膏

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】伏龙肝一两 生地汁 麦冬汁 小蓟汁 藕汁各三合 姜汁一合

【用法】入蜜半匙，慢火熬成膏。每服一匙。

【主治】吐血不止。

20973 龙角丸

【方源】《千金》卷五。

【异名】五惊丸（《外台》卷三十五引《崔氏方》）。

【组成】龙角三铢 牡蛎九铢（一作牡丹） 黄芩半两 蚱蜢二枚 牛黄（如小豆）五枚 川大黄九铢

【用法】上为末，蜜为丸，如麻子大。蓐里儿每服二丸，随儿大小，以意增减。

【主治】①《千金》：小儿五惊夜啼。②《圣惠》：小儿惊啼，以壮热心烦，眠卧不安，睡中或时搐搦。

【备考】《圣惠》本方用法：用煎金银汤研服。

【方论选录】《千金方衍义》：龙角丸取东方木气以透肝风，牡蛎以敛肾气，大黄以涤惊痰，黄芩以解风热，牛黄以定胎惊，蚱蜢专止夜啼，为胎热惊啼峻药。

20974 龙角丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《婴童方》。

【异名】大黄丸（《圣惠》卷八十五）。

【组成】龙角 远志 牡蛎（煨） 大黄各二分 黄芩四分

【用法】上为末，蜜为丸。二岁每服如小豆大五丸，一日二次。一岁丸如麻子大。

【主治】小儿五惊及身热。

【加减】成痼者，加牛黄一分。

【备考】方中龙角《圣惠》作“龙骨”。

20975 龙角散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】龙角一两（赤锦纹者） 干姜三分（炮裂，锉） 甘草三分（炙微赤，锉） 桂心三分

【用法】上为细散。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳失精。

20976 龙角散

【方源】《卫生总微》卷二十。

【组成】地龙（去土称）一两 荆芥穗一两 甘草一两 角刺一两（取紫色不枯者，净洗，捣去骨，只用皮）

【用法】上为粗末。每用一合，水三盏，酒一盏，煎至二盏半，去滓，再煎至二盏，加研细乳香末一钱调匀，渐渐与服，五七岁半盏，以下分二服，一日三次。

【主治】①《卫生总微》：小儿痲疹才发，赤肿作痛。②《普济方》：小儿痲疽肿疔一切等疮，或发头面，或发虚处，无故身热，微觉憎寒，或有疹处。

20977 龙沙丸

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】天麻 芎藭 附子（炮裂，去皮脐） 狗脊（去毛） 踯躅花 藿香叶 紫葳（即凌霄花） 干蝎（去土，炒） 地龙（去土，炒） 藁本（去苗土） 白芷 乳香（研） 枫香脂（研） 白僵蚕（炒） 蒺藜子（炒去角） 独活（去芦头）各半两 白花蛇（酒浸，去骨皮，炙） 麻黄（去根节） 草薢 败龟（醋炙）各一两 乌头（炮裂，去皮脐）二两

【用法】上药捣罗一十九味为末，与二味研者和匀，炼蜜为丸，如弹子大，别以丹砂一分，龙脑、麝香各二钱，同研为衣。每服一丸，空心薄荷温酒嚼下。

【主治】一切风毒，头面虚肿痛麻，遍身风瘙生疮，风气走注，骨肉疼痛，攻刺胸膈头项，热疼冷痹；白虎风，脚手干小；肾脏风，拘急，四肢转动不得，流注脚膝，上冲眼目昏暗，涩泪赤肿；女人血风钻刺；四肢痲痹，

发落头疼；男子肾脏风下注，变为脚气，疮紫黑胀烂等疾。

20978 龙齿丸

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】龙齿一两 人参一两（去芦头） 茯神三分 远志半两 黄芩三分 麦门冬一两（去芦头） 黄连三分（去须） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候，以冷米泔送下。

【主治】伤寒，邪热在心，狂言妄语，精神错乱，志意不定。

20979 龙齿丸

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】龙齿一两 人参一两（去芦头） 远志半两（去心） 铁粉半两（细研） 防风三分（去芦头） 茯神一两 生干地黄一两 麦门冬一两半（去心，焙） 黄连二分（去须） 马牙消三分（细研） 麝香半两（细研）

【用法】上为末，都研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以竹叶、金银汤送下。

【主治】伤寒后，伏热在心，心虚惊悸。

20980 龙齿丸

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】龙齿一两 人参一两（去芦头） 虎睛一对（酒浸一宿，微炙） 茯神一两 犀角屑一两 龙胆一两（去芦头） 鬼臼三分（去毛） 桂心一两 防风半两（去芦头） 远志三分（去心） 甘草一分（炙微赤，锉） 麝香一钱（细研）

【用法】上为末，入麝香研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以金银汤送下。

【主治】伤寒后，心虚惊悸，神气不定。

20981 龙齿丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】龙齿一两 人参一两（去芦头）

远志三分（去心） 茯神一两 铁粉一分（细研） 金箔五十片（细研） 防风三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 银箔五十片（细研）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，不拘时候，以粥饮送下。

【主治】风虚，心惊不定。

20982 龙齿丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】龙齿半两（细研） 虎睛一对（微炒） 赤茯苓半两 铁精三分 人参半两（去芦头） 川大黄二两（锉碎，微炒） 独活一两 远志半两（去心） 细辛半两 贯众半两 鬼箭羽半两 天雄三分（炮裂，去皮脐） 露蜂房半两（微炒） 桂心三分 钩藤皮半两 蚱蝉七枚（微炒） 衣中白鱼三七枚 川升麻半两 石膏一两（细研）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以荆芥汤送下。

【主治】风痫。发即卒倒，口吐涎沫，手足俱搐、一无所觉，苏而复发。

20983 龙齿丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】龙齿三分 黄耆一两（锉） 熟干地黄一两 人参三分（去芦头） 柏子仁三分 防风三分（去芦头） 独活三两 甘草半两（炙微赤，锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 白术三分 干姜三分（炮裂，锉） 桂心三分 鳖甲一两（涂醋炙微黄，去裙襕） 桔梗半两（去芦头） 茯神一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以温酒送下。

【主治】虚劳，风邪惊悸，心气不定，吃食少，四肢瘦损无力。

【宜忌】忌菖菜。

20984 龙齿丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】龙齿一两(细研) 朱砂三分(细研,水飞过) 麝香一钱(细研) 犀角屑半两 人参三分(去芦头) 茯神一两 赤箭一分 槟榔半两 当归三分(锉,微炒) 远志一分(去心) 防风半两(去芦头) 天麻三分 生干地黄半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,不拘时候,研薄荷暖酒送下。

【主治】妇人血风气上攻。心神恍惚,惊悸,眠卧不安。

20985 龙齿丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙齿一分 麝香一钱(细研) 朱砂一分(细研) 白芥子一分(微炒) 阿魏一钱(面裹煨,面熟为度) 水银一分 金箔二十片 银箔二十片(以上三味细研为砂子)

【用法】上为末,都研令匀,以炼蜜为丸,如黍米大。每服三丸,以温酒送下。

【主治】小儿慢惊风,壮热,手足拘急。

20986 龙齿丸

【方源】《普济方》卷一〇〇引《指南方》。

【组成】牛黄 麝香 朱砂 龙骨各半两 羚羊角 羊齿(火煨) 龙齿 蛇蛻(炒)各一分

【用法】上为末,蜜为丸,如梧桐子大。每服五丸,空心米饮送下。

【主治】痫证昼发者。

【备考】《全生指迷方》有白僵蚕一分。

20987 龙齿丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】龙齿(研) 铁粉(研) 凝水石(研)各一两 茯神(去木)一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温米饮送下,不拘时候。

【主治】因惊成痫,狂言妄语。

20988 龙齿丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】龙齿 远志(去心) 生干地黄

(焙) 白茯苓(去黑皮) 天门冬(去心,焙) 山芋 防风(去叉) 五味子 车前子 麦门冬(去心,焙) 地骨皮(去土) 人参各等分。

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每日二十丸,空心竹叶汤送下,一日二次。

【主治】心神狂越,多喜善笑。

20989 龙齿丸

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】龙齿 白僵蚕 当归(切,焙) 芍药 蜗牛 钩藤各半两 代赭(研) 牡蛎(煨)各二两 麝香(研) 牛黄(研)各一分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如绿豆大。二岁儿三丸,井华水化下。

【主治】①《圣济总录》:小儿惊啼及夜啼。②《普济方》:惊热。

20990 龙齿丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】茯神 远志 人参 龙齿 菖蒲 知母 黄柏

【主治】精浊。

【备考】《丸散膏丹集成》本方用法:研为细末,水泛为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,熟汤送下。

20991 龙齿丹

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】紫苏子一两 龙齿 石菖蒲 远志(去心) 铁粉(别研) 木香 白僵蚕(炒去丝嘴) 橘红 白花蛇(酒浸一宿,取肉,焙干称,炙黄) 朱砂(别研,留少许为衣) 天麻(去苗,酒浸一宿,焙) 麻黄(去根节) 天南星(汤浸,薄切片子,生姜汁制一宿) 人参(去芦头)各半两 全蝎一分(去毒,炒) 龙脑半钱(别研) 麝香一分(别研)

【用法】上为细末,次入研者药和匀,炼蜜为丸,每一两作一十五丸。每服一丸,食前、空心薄荷汤化下。

【主治】因惊神志恍惚，久而成痼，时发时止者。

20992 龙齿丹

【方源】《医方类聚》卷一五八引《济生》。

【组成】龙齿 附子（炮，去皮脐，切片，姜汁浸一宿） 远志（去心，甘草煮） 酸枣仁（炒，去壳，别研） 当归（去芦，酒浸） 官桂（去皮，不见火） 琥珀（别研） 南星（锉，姜汁浸一宿） 各一两 木香（不见火） 紫石英（煨，醋淬七遍） 沉香（别研） 熟地黄（酒蒸，焙） 各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，不拘时候，用枣汤送下。

【主治】心血虚寒。怔忡不已，痰多恍惚。

20993 龙齿汤

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】龙齿 麦门冬（去心，焙） 各三两 远志（去心） 茯神（去木） 各二两半 防风（去叉） 甘草（炙，锉） 人参（锉） 羚羊角（镑） 各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，大枣三枚（拍破），同煎至七分，去滓，空心、午时、夜卧各一服。

【主治】风惊恐怖，或因迫逐惊惧，悲伤感动，志意颠越，言语失次。

20994 龙齿汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】龙齿（捣） 前胡（去芦头） 各半两 犀角（镑） 木通（锉） 黄芩（去黑心） 各一分 牛黄（研） 半钱

【用法】上药除牛黄外，各锉细，分作二服。每服用水一盞半，煎至八分，去滓，入牛黄一字搅匀，不拘时候温服。

【主治】伤寒刚痉，身热不渴，烦闷头疼。

20995 龙齿汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】龙齿 人参各三分 芍药 淡竹茹 当归（切，焙） 半夏曲 茯神（去

木） 羌活（去芦头） 各半两 木香 茅根 各一分 银半斤（用水三升，煎取一升）

【用法】上药除银外，为粗末。每服五钱匕，用银水一盞半，加生姜五片，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】心虚惊悸，睡卧不安。

20996 龙齿汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】龙齿 麦门冬（去心，焙） 人参 各一两 远志（去心） 三分 甘草（炙，锉） 一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓，食后温服。鬼黄，宜烙中脘穴，更灸二七壮，次烙背心及灸上膻一七壮，又烙心俞、肝俞、肾俞。

【主治】鬼黄。病人汗不出，渐加困重，慢气心胀，唇黑，遍身黄，妄见异物。

20997 龙齿汤

《圣济总录》卷一六八。为《圣惠》卷八十二“龙齿散”之异名。见该条。

20998 龙齿汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】龙齿 大黄（锉，炒） 各一分 枳壳（大者）一枚（去瓢，麸炒黄） 朴消 甘草（炙，锉） 各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水半盞，煎至三分，去滓，食前温服，一日二次。

【主治】小儿百日以来，痰实壮热兼惊。

20999 龙齿汤

【方源】《医方大成》卷五引《简易方》。

【组成】官桂二两半 半夏二两（汤泡） 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 甘草（炙） 当归 龙齿（研） 桔梗（炒） 茯神（去皮） 各一两 远志（去心） 枳壳（去瓢，麸炒） 各一两半 黄耆（蜜炙） 一两

【用法】上为末，每服三钱，水一盞，加生姜三片，大枣一枚，梗米百粒，煎服。

【主治】心下怔忡，常怀忧虑，神思多惊，如堕险地，小便或赤或浊。

21000 龙齿汤

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】麦门冬（去心） 地骨皮 远志（去心） 人参（去芦头） 白茯苓（去皮） 甘草（微炒） 防风（去芦头） 各二钱 紫石英一钱 石膏一钱 羚羊角一钱 龙齿二钱

【用法】每服二钱，水六分，煎至四分，去滓，乳食后、临卧温服。

【主治】小儿潮热往来，睡多盗汗，肌体瘦，久不愈者。

21001 龙齿饮

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】龙齿（碎）二两半 黄芩（去黑心） 防风（去叉） 赤芍药 白茯苓（去黑皮） 各一两半 升麻一两 大青三分 大腹皮（锉）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盂半，加生姜两枣大者（拍碎），竹沥半合，银半两许，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】劳风。肺热气壅，卧即多惊，时复头旋。

21002 龙齿饮

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】龙齿（捣研） 石膏（捣研） 各一两一分 黄芩（去黑心） 大黄（锉，炒令香熟） 各一两 龙胆 栀子仁 甘草（炙，锉） 各半两 钩藤三分（锉）

【用法】上为粗末。一二岁儿每服一钱匕，水半盂，煎至三分，去滓，连夜三五服。

【主治】小儿风痫。

21003 龙齿饮

《圣济总录》卷一七二。为《圣惠》卷八十五“龙齿散”之异名。见该条。

21004 龙齿散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】龙齿三分（细研如粉） 汉防己三分 麦门冬三分（去心） 黄耆三分（锉） 人参一两（去芦头） 独活一两 羚羊角屑一两 甘草三分（炙微赤，锉） 细辛三分 桂

心三分 生干地黄一两 远志三分（去心） 白茯苓一两 杏仁四十九枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。先以水一大盂，加银一两，煎至六分，去银；次加药末四钱，又煎至四分，去滓；加竹沥半合，更煎一两沸，不拘时候温服。

【主治】心风。恍惚惊恐，心气不安。

21005 龙齿散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】龙齿一两 远志半两（去心） 茯神一两 防风半两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 人参三分（去芦头） 麦门冬三分（去心） 羚羊角屑三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盂，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】心脏风虚，惊悸失常，或喜或怒，神思不安。

21006 龙齿散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】龙齿半两（细研） 朱砂一两（细研如粉） 牛黄一分（研入） 细辛一两 龙脑一分（细研） 犀角屑一两 防风一两（去芦头） 羌活一两 荆芥一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 天竺黄一两（细研） 茯神一两 沙参一两（去芦头） 天麻一两 川升麻一两 子芩一两 麦门冬一两（去心，焙） 羚羊角屑一两 甘草半两（炙微赤，锉） 甘菊花半两

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，食后煎竹叶汤调下。

【主治】心脏风热，心神恍惚，烦躁多惊，不得眠卧。

21007 龙齿散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】龙齿三分 前胡二分（去芦头） 犀角屑半两 木通半两（锉） 子芩半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，加牛黄末一字，搅令匀，不拘时候温服。

【主治】伤寒阳痉，通身大热。

21008 龙齿散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】龙齿一两 前胡一两（去芦头）犀角屑半两 牛黄半分（别研）麦门冬二两（去心，焙）

【用法】上为细散，入牛黄同研令匀。每服二钱，以竹沥调下，不拘时候温服。

【主治】伤寒阳痉。通体大热，心神烦躁。

21009 龙齿散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】龙齿二两 犀角屑一两 川升麻一两 茯神一两半 玄参一两 麦门冬一两（去心，焙） 甜竹根三分（锉） 赤芍药一两半 马牙消一两 生干地黄二两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒心热，狂言恍惚，卧不安席。

21010 龙齿散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】龙齿一两 子芩三分 防风三分（去芦头） 茯神三分 川升麻半两 大青半两 人参三分（去芦头） 石膏一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，加竹沥半合，搅匀，不拘时候温服。

【主治】伤寒后心虚惊悸，烦热口干，头项时疼。

21011 龙齿散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】龙齿一两 人参一两（去芦头）白鲜皮三分 川升麻三分 葳蕤三分 秦艽三分（去苗） 川大黄一两（锉碎，微炒） 石膏一两半 川芒消一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，

煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】热病，心肺热壅，狂言不安。

21012 龙齿散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】龙齿一两 甘草半两（炙微赤，锉） 黄耆一两（锉） 麦门冬一两（去心） 熟干地黄一两 人参一两（去芦头） 桂心半两 干姜半两（炮裂，锉） 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】虚劳，不汗出而闷，心悸虚烦，脉结。

21013 龙齿散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】龙齿 黄矾 白石灰各二两 桂心一分 芎藭半两 皂荚刺一两（锉，微炒）

【用法】上为末，不津器中盛之。每食后，用少许贴之。有津勿咽。

【主治】牙齿根宣露挺出，烂肉，黑血不止，疼痛摇动，臭气，欲脱落。

21014 龙齿散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】龙齿三两 远志（去心） 人参（去芦头） 茯神 熟干地黄 甘草（炙微赤，锉） 当归（锉，微炒） 白芍药 麦门冬（去心，焙） 牡蛎（烧为粉）各一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶二七片，生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】产后脏气虚，心神惊悸，不自觉知，言语错误，志意不定。

21015 龙齿散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【异名】龙齿汤（《圣济总录》卷一六八）。

【组成】龙齿一分 川大黄半两（锉碎，微炒） 梔子仁一分 朴消三分 枳壳一分

(麸炒微黄,去瓢) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服。

【主治】小儿百日以来,结实壮热兼惊。

21016 龙齿散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】龙齿半两 麦门冬半两(去心,焙) 赤芍药一分 川升麻一分 川大黄一分(锉碎,微炒) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓频服。

【主治】小儿惊啼烦热,眠卧不安。

21017 龙齿散

【方源】《圣惠》卷八十五

【组成】龙齿一分(细研) 芦荟一分(细研) 朱砂一分(细研) 黄连一分(去须) 赤石脂一分 铁粉一分 牡蛎一分(烧为粉)

【用法】上为细散,都研令匀。每服一字,不拘时候,以温水调下。

【主治】①《圣惠》:小儿惊热,下泻不定,兼渴。②《普济方》:下痢烦满。

21018 龙齿散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙齿一两(细研) 犀角屑一两 茯神一两 人参一两(去芦头) 牛黄一分(细研) 蝉壳一分(微炒) 赤石脂一两 黄芩三分 牡蛎粉三分 川升麻三分

【用法】上为细散。每服半钱,不拘时候。以荆芥、薄荷汤调下。

【主治】小儿惊热,心神烦乱,手足缩掣不定。

21019 龙齿散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】龙齿饮(《圣济总录》卷一七二)。

【组成】龙齿半两(细研) 钩藤半两 白茯苓半两 蝉壳二七枚(微炒) 黄丹一分

甘草一分(炙微赤,锉) 铁粉一分(细研) 朱砂一分(细研) 川大黄一分(锉碎,微炒)

【用法】上为末,入研了药令匀。每服一钱,以水一小盏,煎至六分,不拘时候温服。

【主治】小儿天钓,手脚掣动,眼目不定,有时笑啼或嗔怒,爪甲皆青。

21020 龙齿散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙齿一两 钩藤三分 川升麻三分 子芩三分 防风三分(去芦头) 犀角屑三分 麦门冬一两(去心,焙) 川芒消一两

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,加竹叶七片,煎至五分,去滓,分作二服,一日四次。

【主治】小儿壮热发痛,心神惊悸,多啼,或吐白沫。

21021 龙齿散

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】龙齿(研) 丹砂(研)各半两 牛黄一分 马牙消 地龙(炒)各一两 麝香一钱(研)

【用法】上为散。每服一钱匕,以生姜、蜜水调下,不拘时候。

【主治】伤寒心热,狂妄,精神不安。

21022 龙齿散

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】龙齿 人参 远志(去心) 白茯苓(去黑皮) 麦门冬(去心,焙)各半两 丹砂(研) 铁粉(研末,飞) 龙脑(研) 牛黄(研) 麝香(研)各一分

【用法】上为散,再同研匀细。每服半钱匕,食后、夜卧温热水调下,一日三次。

【主治】肾虚,热毒乘虚攻耳,致耳内常鸣如蝉声。

21023 龙齿散

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】龙齿二钱 丹砂半分 铅白霜三

钱 天南星(水浸七日,逐日换水,薄切晒干为末)五钱 龙脑少许

【用法】上为散。每服一字匕,葱白、金银汤调下。三服后汗出立愈。

【主治】小儿急惊风,及四时伤寒,浑身壮热,唇口焦干,两目翻露,搐搦昏迷。

21024 龙齿散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】龙齿(烧,研) 龙脑(锉) 桔梗(炒) 白茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 麝香(研)各一分 蛭蟥三枚(去翅足,炙焦)

【用法】上为散。一二岁儿每服半钱匕,用温水调下;三四岁儿一钱匕,空心、午后服。

【功用】退热。

【主治】小儿疳疔,腹胀气急。

21025 龙齿散

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】龙齿半两 丁香一分 黄连(去须) 胡粉(炒) 赤茯苓(去黑皮)各半两 枳壳(去瓢,麸炒)一分

【用法】上为散。每服半钱匕,食前粥饮调下。或加牛黄一钱亦得。

【主治】小儿疳疔,或口内生疮。

【加减】有鲜血,加芫荽一分。

21026 龙齿散

【方源】《本事》卷十。

【组成】羌活(去芦) 龙齿 蝉壳(去头足) 钩藤(有钩子者) 茯苓(去皮) 人参(去芦)各等分

【用法】上为末。每服一大钱,水一大盏,煎六分,去滓温服。

【主治】①《本事》:小儿拗哭。②《婴童百问》:小儿拗哭,肚痛惊热。

【方论选录】《本事方释义》:龙齿气味凉涩,入足厥阴,蝉壳气味甘咸寒,入足少阳厥阴,钩藤气味甘微寒,入足厥阴;羌活气味辛甘平,入足太阳;茯苓气味甘平淡渗,入足阳明,人参气味甘温,入足阳明。小儿无

故拗哭,亦因肝风内动,脾胃不和所致,故以风药泄其风而镇补之药护其中也。

【备考】《婴童百问》本方用法:加姜、枣,煎服。

21027 龙齿散

【方源】《卫生总微》卷三。

【组成】龙齿

【用法】上为末。调服;或以烂龙角研浓汁,每服一二合。

【主治】小儿惊热如火;温壮。

21028 龙齿散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】龙齿 茯苓 白附子(炮) 蝉蜕 甘草各等分。

【用法】上为细末。每服一小钱,临卧薄荷汤下。

【主治】小儿惊悸夜啼。

21029 龙齿散

【方源】《袖珍》卷四引《澹寮》。

【组成】蝉壳(去翅足,洗泥土) 钩藤(有钩子者) 龙齿 茯苓(去皮) 人参各等分

【用法】上为末。每服一钱,水半盏,煎服。

【主治】小儿夜哭不住。

21030 龙齿散

【方源】《永乐大典》卷一〇三三引《方便集》。

【组成】龙齿半两 赤茯苓三两 远志(去心取皮)半两 茯神(去木)半两 半夏曲半两 甘草半两

【用法】上为细末,和匀。每服一大钱,水一小盏,加生姜三片,葱一茎,与熟水同煎,食后、临卧温凉服。

【功用】镇心。

【主治】尿血涩痛 因惊则甚。

21031 龙齿散

【方源】《普济方》卷四〇一引《傅氏活婴方》。

【组成】石膏 人参 龙齿 朱砂 麝香 甘草各等分

【用法】上为末。每服一字，金银薄荷汤点服。

【主治】客忤，夜啼，惊悸。

21032 龙齿散

《普济方》卷三五三。为《圣惠》卷七十八“熟干地黄散”之异名。见该条。

21033 龙齿散

【方源】《普济方》卷三七七。

【组成】麻黄（去节） 大黄 牡蛎（熬） 黄芩各四两，寒水石 白石脂 石膏（研） 赤石脂 紫石英 滑石（研）各八两 人参 桂心各三两 蛇蛻皮一两（炙） 龙齿六两（研） 甘草三两（炙）（一方无麻黄、龙齿、蛇蛻皮）。

【用法】上为散，以药八两，用一薄绢袋盛散药，用水一升五合，煮取七合，绞去滓，顿服之。一日二次。少小百日服一合，热多者一日二次，三五日一服亦得。

【主治】大人小儿风痫卒倒，呕沫不省。

【宜忌】忌海藻、菰菜，生葱、热面、荞麦、猪肉、蒜、粘食。

21034 龙齿散

【方源】《普济方》三七八。

【组成】茯苓 龙齿各二分 钩藤 芍药 黄芩各一分 甘草半分 蚱蜢二枚（去翅足，炙） 牛黄二大豆大（新）

【用法】上为细末，加竹沥一合研，候汤欲成下；以东流水二斗，银器煮金银各十两，取三升，入药，煎取一升半，间乳细细与服。此药未出月小儿，大即加药。

【主治】小儿痫极。

21035 龙齿散

【方源】《医统》卷六十四引《经验方》。

【组成】龙齿（煨存性） 人齿（煨存性） 各三钱 人参 枸杞子 破故纸 牛膝 沉香各一两 石燕一升（煨） 旱莲草 青盐各二两 小茴香 升麻 麝香（研）各半两 花椒三钱 当归七钱半 桂枝二钱半

【用法】上为细末。日擦三次，良久漱之。

有津咽下亦不妨。

【功用】长牙固齿。

21036 龙齿散

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】龙齿 蝉蛻 钩藤 羌活 茯苓 人参 天麻 防风 全蝎各等分

【用法】上为末。灯心汤调下。

【主治】小儿拗哭、肚疼、惊热。

21037 龙虎丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】白芍 陈皮各二两 锁阳 当归 各一两半 虎骨（酒浸，酥炙）各一两 知母（酒炒） 熟地黄各三两 黄柏半斤（盐炒） 龟版四两（酒浸，酥炙）

【用法】上为末，酒煮羊肉捣汁为丸服。

【功用】补下焦。

【加减】冬月，加干姜半两。

21038 龙虎丸

【方源】《丹溪治法心要》卷四。

【组成】上甲（醋炙）六两 药苗（酒蒸焙干）二两 侧柏二两 黄柏（酒炒）半斤 知母（盐、酒炒）二两 熟地黄二两 芍药二两 锁阳（酒捣）五钱 当归（酒浸）五钱 陈皮（去白）二两 虎骨（酒浸，酥炙）一两 龟版（酒浸，酥炙）四两

【用法】上为末，酒煮羊肉为丸服。

【功用】补下焦。

【主治】诸虚。

【加减】冬月，加干姜。

21039 龙虎丸

【方源】《春脚集》卷四。

【组成】龙骨（煨） 虎骨（煨） 川芎 当归（洗） 桂圆肉（煮烂，捣膏） 熟地（煮烂，捣膏） 砂仁 木香 山楂 破故纸（盐炒） 防风 广皮 酸枣仁（炒） 杜仲（炒炭） 菟丝子 黄芩 贯众（炒炭） 白蒺藜各四两（炒） 川膝（浸） 煨石膏 神曲（炒） 川贝（去心） 木通 甘草一钱

【用法】上为细末，用方内桂圆膏、熟地黄

合炼蜜为丸，三钱重。每日早、晚各服一丸，藕汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》：扶虚养气，补血化瘀。

【主治】①《春脚集》：一切吐血症。②《全国中药成药处方集》：身体衰弱，劳伤失血，痰中带血，气虚咳嗽，心跳气短，自汗盗汗，不思饮食，精神疲倦，久病失调。

21040 龙虎丸

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】西牛黄三分 巴豆霜三分 水飞辰砂一分 白石三分

【用法】酌加米粉为丸。一小料分作二十丸，辰砂为衣。轻则一丸，重则二三丸，以温开水送下。约半小时许，非吐即泻，逾时再服一丸，以俟之。如年远者，须服数丸。症重则白石仍用三分，病大愈，接服侯氏黑散。如年远痰坚窍闭，宜先服猪心丸，次日服龙虎丸，见效尤速。

【主治】痰热癫痫，发狂。

①《经验各种秘方辑要》：阴癫阳痫。②《重订通俗伤寒论》：伤寒发狂。③《全国中药成药处方集》：痰热搅乱心脑引起神志失常，不省人事，癫痫发狂，神呆静坐，语无伦次，叫骂不休，痰涎壅盛，口噤肢搐。

【宜忌】愈后忌食猪肉二年。孕妇忌服。体虚者不忌。

21041 龙虎丸

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】西牛黄三分 巴豆霜三分 冰片一分 水飞辰砂一分 白信三分

【用法】上为末，酌加烂饭同捣为丸。病轻者服一丸，重者服二丸，以温开水送下。若不肯吃者，纳药于粉糕中，便不觉而食之。服后约半时许，非吐即泻，逾时再服一丸以俟之。如年远者，须服数丸以见效。

【主治】阴癫阳狂，痰入心包络，不省人事，登高弃衣，歌笑不寐；或神呆静坐，语言不发。

【宜忌】孕妇忌服。愈后忌食猪肉一、二年。

【方论选录】癫痫之疾，皆由于痰入心包络，白信专能燥痰，以之为君；巴豆辛热破痰，导之下行，使白信之性过而不留，以之为臣；反佐以牛黄之甘寒，通窍辟邪，清心解毒，制白信、巴豆之猛烈，合朱砂为镇摄，真治癫狂之圣药也。

21042 龙虎丹

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷二〇〇。

【组成】狗头骨半两 鼠头骨半两 蛇头一枚 牛头骨半两 虎头骨半两 兔头骨半两 狸头骨半两 龙角半两 獼猴头骨半两 马头骨半两 天灵盖半两 鳖甲半两 龟甲半两 雄黄一两（细研） 朱砂一两（细研） 阿魏半两（细研） 麝香半两（细研）

【用法】上药并生用为末，入研了药，更研令匀，以软饭为丸，如鸡头子大。以青绢裹手中指上，男左女右，系一丸。如未定，即以醋茶下一丸。

【主治】症久不愈，或止或发，继月连年。

21043 龙虎丹

【方源】《局方》卷一。

【组成】黑牵牛（煨） 藿香叶（生） 天麻（去苗） 牛膝（去苗，酒浸，切，焙，微炒） 硫黄（结沙） 天竺黄（生研） 细辛（去苗，洗） 半夏（汤洗七次，生姜汁制） 附子（炮，去皮脐） 何首乌（去粗皮） 羌活（去苗，洗焙） 独活（去苗） 柴胡（去苗） 川芎（洗） 桔梗（生） 各二两 寒水石（烧通赤，研飞） 一斤 茴香（淘去土，焙） 甘松（洗去土，焙） 肉桂（去粗皮） 五灵脂（生） 白芷（生） 菊花（去土） 川乌（炮，去皮脐） 白僵蚕（去丝嘴，炒） 缩砂仁（生） 各五两 牙消（研） 木香（生） 水银（与硫黄用慢火结成沙子） 雄黄（研飞） 麝香（研） 各一两 地龙（去土，煨） 白干姜（炮） 朱砂

(研飞) 白蒺藜(燼) 防风(去苗)各三两 乌蛇(酒浸,炙,去皮骨)八两 龙脑(研)半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一丸,用薄荷酒嚼下,一日一次,重即二次。产后惊风,乱道见物,朱砂酒磨下;产后身多虚肿,血风,频增昏沉,身如针刺,发随梳落,面黄心逆,并煎当归酒嚼下,一日二次;若治伤寒,炒葱、豉,酒嚼下一、二服,盖覆出汗立愈;小儿惊风,薄荷酒化下少许;大人急风,口噤失音等,薄荷酒化灌之。常服茶、酒任下,不拘时候。

【主治】丈夫妇人新得、久患急、缓风,半身不遂,手脚筋衰,及风毒攻注,遍身疮疥,头风多饶白屑,毒风面上生疮,刺风状如针刺,痛风急倒作声,顽风不认痛痒,痹风颈生斑驳,暗风头旋眼黑,敲风面生赤点,肝风鼻闭眼暗,偏风口眼喎斜,节风肢节断续,脾风心多呕逆,酒风行步不前,肺风鼻塞项疼,胆风令人不睡,气风肉似虫行,肾风耳内蝉鸣,阴间湿痒。

21044 龙虎丹

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】草乌头(锉) 枫香脂(研) 五灵脂 木鳖子(去壳,别研) 地龙(炒)各一两 乳香(别研)半两

【用法】上为末,并华水拌和为丸,如鸡头子大,以丹砂为衣。每服一丸,临卧以冷酒磨下,乳香酒亦得,仍先嚼胡桃仁半枚服之。药成阴干,勿令见火。

【主治】腰脚风痛。

21045 龙虎丹

【方源】《普济方》卷三九二引《幼幼新书》。

【组成】朱砂(称) 膩粉(炒) 粉霜(炒) 礞石(称) 白丁香(称) 枯矾(炒)各一钱 定粉(炒)二钱 黄丹 消石 硃砂(各炒)各半钱

【用法】上为末,蒸饼心水浸为丸,如樱桃

大。大人每服二丸,小儿一丸,米饮送下。

【主治】虚中积,泄痢腹痛后重。

21046 龙虎丹

【方源】《百一》卷三。

【异名】火龙丸。

【组成】地龙四两(去土) 玄胡索四两(生) 松节二两 核桃肉十五个 乳香三钱 蜈蚣十四个 蜈蚣二条 没药三钱 草乌头四两(生,不去尖) 蝎十四个(蜈蚣、蜈蚣、蝎三味用好酒一升,同煎十数沸,取出焙干)

【用法】上为细末,用煮肉药酒打糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,左瘫右痿,麝香酒送下。

【主治】左瘫右痿,口眼喎斜。五种脚疼。

21047 龙虎丹

《普济方》卷一四五引《保生回春论》。为原书同卷“灵砂丹”之异名。见该条。

21048 龙虎丹

【方源】《瑞竹堂方》。

【组成】龙骨(研) 虎骨(酥炙) 人参 箭头朱砂(研) 远志(甘草水煮,去骨) 酸枣仁(炒,去壳)各一两 大天南星三四枚(泔水洗浸,去皮滑涎,控干,竹刀剥成罐,装朱砂末,以南星末盖之) 猪心一个(取新杀猪带血热心,纳置南星内,以灯草裹猪心,外用麦门冬草洗净,不拘多少,包之,甑上九蒸九晒,取出南星,于金银器内盛之,取日精月华之气晒露十昼夜,捣罗为末,后加余药同和匀)

【用法】上为细末,用无灰酒打面糊,冷定和搜成剂,为丸如梧桐子大,每服五七十丸,空心温酒送下;小儿丸如黄米大,每服三五十丸,煎人参汤送下。病甚者,不过二十服即愈,除根不发。

【主治】男子妇人,心神恍惚,阳明经大盛,时复惊惧哭泣,口发狂言,不避亲疏,一切风病等。

21049 龙虎丹

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】草乌 苍术 白芷各一两(碾粗末,水拌发酵盒过,入后药) 乳香 没药各二钱(另研) 当归 牛膝各五钱

【用法】上为末,酒糊为丸,如弹子大。每服一丸,温酒化下。

【主治】走注疼痛,或麻木不遂,或半身痛。

21050 龙虎丹

【方源】《医学纲目》卷十七。

【组成】败龟版(酒炙) 虎骨(酒炙) 黄柏(酒炙) 干姜二钱半 锁阳七钱半 金箔十片 神曲

【用法】上为末,糯米糊为丸。空心白汤送下。

【主治】痿证。

【加减】如懒言语,加山药末七钱。

【备考】方中败龟版、虎骨、黄柏、神曲用量原缺。

21051 龙虎丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术半斤(用生姜十二两捣汁,或入童便,同拌成饼) 草乌四两或半斤(用生葱四两,捣汁拌成饼)

【用法】俱摊壁上阴干,为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,用酒送下,即吐;如欲下行,用生姜汤送下。吐下后俱宜姜汤和胃。

【主治】一切痰火瘫痪,痛风,咳嗽胀满。

【加减】脚疾,加黄柏半斤。

21052 龙虎丹

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】龙骨 虎骨各等分

【用法】上为末,水为丸,如弹子大,朱砂为衣,端午时制。临发日,预握男左女右手心内。即止。

【主治】疟疾。

21053 龙虎丹

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】草乌 苍术各八两 穿山甲二两

(炒成珠) 补骨脂一两 白芷一两 葱白八两 老姜八两(洗净,捣烂,拌乌、术二味入坛内,于三伏天盒出白毛,有香味,取出晒干)

【用法】上为末,米糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,加至三十丸止,临卧服,间一日再服,不可多用。左瘫右瘓,半身不遂,防风汤送下;惊风,薄荷汤送下;手足顽麻、风痒,葱白汤送下;头风,川芎汤送下;跌打损伤,乳香汤送下;元虚畏冷,筋骨疼痛,葱汤送下;肠风痔漏下血,槐花汤送下;遍身痒疥,荆芥汤送下;寒湿气、脚气,木瓜汤送下;胃伤食积,生姜汤送下;皮黄水肿,姜皮汤送下;赤白痢疾,米汤送下;下部疝气,小茴汤送下;小儿肚腹膨胀,史君子汤送下;五淋,灯心汤送下;疟疾,桃枝汤送下;无名肿毒疮,酒送下;腰腿疼痛,合桃酒送下。

【主治】左瘫右瘓,半身不遂,惊风,手足顽麻、风痒,头风,跌打损伤,元虚畏冷,筋骨疼痛,肠风痔漏下血,遍身痒疥,寒湿气,脚气,胃伤食积,皮黄水肿,赤白痢,下部疝气,小儿肚腹膨胀,五淋,疟疾,无名肿毒疮,腰腿疼痛。

21054 龙虎丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】蝙蝠(煨) 冰片各少许

【用法】上为细末。外敷。

【功用】消肿敛疮。

【主治】瘰癧已溃,或未成脓者。

21055 龙虎汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】鹿茸一两(去毛,酒浸,炙) 附子二两(炮,去皮脐) 黄耆(盐水浸,炙) 茯神(去木) 肉苁蓉(酒浸,去皱皮) 白术(炒)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盂半,煎至七分,去滓,食前服。

【功用】调荣卫。

【主治】虚劳寒热。

21056 龙虎汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】柴胡一钱五分 黄芩一钱五分 半夏(姜制)七分 石膏二钱五分 黄连一钱五分 黄柏一钱二分 知母一钱(去毛) 山梔仁一钱 梗米一撮

【用法】上锉一剂。加生姜一片,大枣二枚,水煎温服。阳毒入深者,先以青布折叠数重,新汲水渍之,搭于心胸之上,须臾再易,如此三次,热势稍退,即服此药。

【主治】热症火盛,舌卷焦黑,鼻如烟煤,六脉洪数弦紧。

21057 龙虎饮

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】鹿茸(酒浸,酥炙) 附子(炮,去皮脐)各二两 人参(去芦) 革薺 金钗石斛(酒浸) 杜仲(去皮,锉,姜汁制,炒去丝) 肉苁蓉(酒浸,去皱皮) 木瓜 当归(去芦,酒浸) 黄耆(蜜水炙)各半两

【用法】上咬咀。每服三钱,水一盞半,加生姜三片,枣子一枚,煎七分,去滓,食前服。

【功用】壮筋益血。

【主治】虚劳脚弱。

21058 龙虎散

【方源】《理渝》。

【组成】明雄黄五钱 土贝母 蓖麻仁(去油) 木鳖仁各四钱 大蜈蚣十条 蟾酥三钱 大全蝎七个 大山甲七片 僵蚕七条 露蜂房(有子者佳)三钱 大蜘蛛(腿脚要全)三个 凤仙子二十四粒 朱砂 轻粉 制乳香 制没药 炒铅粉 炒黄丹 寒水石 磁石 礞砂 漂铜绿 牙皂 母丁香 樟脑 黄蜡 白蜡 延胡 白芷 决明各二钱 枯矾五分(研) 草乌 南星各二钱 蝉蜕 蛇蜕各一钱

【用法】共为末。掺贴。

【功用】能消、能溃、能提、能敛。

【主治】肿毒。

【加减】症重,多加犀黄、麝、冰和穆;已长新肉,加桃花散、黄丹、石膏,共研末和掺,免痛。

21059 龙虎散

【方源】《医方简义》卷三。

【组成】煅龙骨二两 琥珀一两 玄武板四两 生鳖甲二两 桂枝一两 煅磁石(醋淬一次)一两 赤芍药一两 远志肉五钱 枣仁(炒)一两 左牡蛎四两 石菖蒲四钱

【用法】上为细末。每服三钱,姜汤调下。

【功用】《全国中药成药处方集》:补心益肾,养血安神。

【主治】①《医方简义》:寒厥肢冷。②《全国中药成药处方集》:骨蒸劳热,血液不足,耳鸣目昏,头晕心烦,怔忡不安。

21060 龙虎膏

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】龙骨二两 虎骨三两(涂酥,焙) 当归(切,焙) 桂(去粗皮)各一两 皂荚半斤(肥者,去子)

【用法】上为末,先别用好皂荚十挺,以苦酒三升,浸取汁,去滓,入铛中煎减半,即入前药同煎如稀汤,入瓷合盛。每用少许,揩摩痒痹处。

【主治】风湿著痹,肌肉痒厚,不知痛痒。

21061 龙虎膏

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】陈小粉一斤 土木鳖(连壳整炒)二两 川乌 草乌 干姜 白及 花椒各五钱

【用法】上为细末,凡疮未成者,漫头敷;已成者,中留一孔;已溃烂者,敷于四围,俱以醋调煨温敷上,外用绵纸贴,干则温醋鸡毛扫上。

【主治】一切无名痈疽大毒。

21062 龙乳膏

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】龙胆草一斤

【用法】铜锅煎成膏，用上号白蜜收之，每两加冰片五分，瓷器盛之，勿泄气。临时取出，用健壮妇人乳调开，点眼。

【主治】一切目疾。

21063 龙肤散

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】天南星（牛胆制者）八钱 雄黄 甘草各半钱 天竺黄二钱 朱砂 麝香各一钱

【用法】上为末。每服一字，薄荷汤调下；中暑烦闷，雪水调下。

【主治】小儿伤寒瘟疫，身热昏睡气粗，风热痰实壅嗽，惊风潮搐，中暑冒闷。

21064 龙实散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】龙实（龙骨中有之，深黄或淡黄土褐色，紧掬人舌者）白矾（烧，研） 蜗牛壳 胡粉 牛黄各一钱

【用法】上为细散。每用少许，掺粘窍内。

【主治】小儿漏瘡，虫蚀有窍。

21065 龙参丸

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】地龙（干者）一两 苦参一两 乌头（去皮脐）半两（半生半炮）

【用法】上为末，以醋糊为丸，如绿豆大。每服七丸至十丸，食前米饮送下，一日三次。

【主治】肠痔，肛边生核，肿痛下血。

21066 龙荟丸

【方源】《脉因症治》卷上。

【组成】柴胡 甘草 青皮 连 大黄 归 木香 草龙胆 芦荟 川芎

【主治】食积发热，木盛肋痛。

21067 龙荟丸

《医方类聚》卷一九七引《新效方》。为《宣明论》卷四“龙脑丸”之异名。见该条。

21068 龙荟丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】龙胆草 芦荟 当归 黑山栀 广木香 黄连 黄芩 麝香

【用法】蜜为丸服。

【主治】肝火盛，目赤涩痛。

21069 龙荟锭

【方源】《理渝》。

【组成】柴胡 龙胆草 黄芩 青皮 胆星 芦荟 黄连 青黛 大黄 木通 菖蒲 皂角 细辛各一两 全蝎三个 陈小粉（炒黑）五两

【用法】上为末，以青鱼胆汁一杯，和姜汁、竹沥为锭，临用磨敷耳一周。

【主治】耳鸣耳聋，并治耳痛及一切肝火。

【加减】有脓日久不干者，加枯矾、雄黄、轻粉、海螵蛸末。

21070 龙砂汤

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】缩砂仁二两一分 甘草 盐各一两半

【用法】上将甘草同盐炒，候甘草黄熟取出，泻在缩砂上，即以盏碗盖之，候冷，同为细末。汤点二钱。

【功用】和氣。

21071 龙星丹

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】牛胆南星 朱砂（另研为衣）各三钱 片脑（另研）三字 牛黄（另研）三字 麝香（另研）三字 全蝎 防风 薄荷各一钱 黄芩 黄连各二钱 青黛（另研）一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，噙化。

【主治】中风，风热痰涎壅盛者。

21072 龙骨丸

【方源】方出《医心方》卷十一引《葛氏方》，名见《圣济总录》卷二十六。

【组成】龙骨 干姜 附子各等分

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸至十丸，一日三次。

【主治】①《医心方》引《葛氏方》：冷痢，纯下白如鼻涕。②《圣济总录》：伤寒后脏腑虚冷，下痢白脓腹痛者。

21073 龙骨丸

【方源】《外台》卷三十四引《深师方》。

【组成】干姜 甘草(炙) 桂心各二两 龙骨四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，一日三次。

【主治】产后虚冷下血，及水谷下痢，昼夜无数，兼疗恶露不绝。

21074 龙骨丸

【方源】《医心方》卷十四引《深师方》。

【组成】龙骨四分 恒山八分 附子三分 大黄八分

【用法】上药各治，用鸡子为丸，如大豆大。发前服七丸，临发服七丸。

【主治】三十年疟疾。

【宜忌】忌生葱、生菜、猪肉等。

21075 龙骨丸

【方源】《医心方》卷二十一引《经心录》。

【组成】龙骨 阿胶(炙) 赤石脂 牡蛎 干地黄 当归 甘草各二两 蒲黄三两

【用法】上为末，为丸如梧桐子大。每服十五丸，一日三次。

【主治】妇人崩中漏下。

21076 龙骨丸

【方源】《千金》卷三。

【组成】龙骨四两 干姜 甘草 桂心各二两 (一方用人参、地黄各三两)。

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，暖酒送下，一日三次。

【主治】产后虚冷下血，及谷下昼夜无数；兼治产后恶露不断。

【方论选录】《千金方衍义》：《本经》言：龙骨治泄利脓血，女子漏下，而兼干姜、桂心温散寒结；甘草专和胃气，为冷痢之专药；姜、桂辛散，不须复用向导也。

21077 龙骨丸

【方源】《千金》卷十五。

【组成】龙骨 当归 龙胆 附子 干姜 黄连 羚羊角各三十铢 赤石脂 矾石各一两半 犀角 甘草 熟艾各十八铢

【用法】上为末，蜜为丸，如小豆大。每服

十五丸，食前服，一日三次。加至二十丸。

【主治】血痢腹痛。

【方论选录】《千金方衍义》：治久痢滑脱证。本属热盛，因痢久正虚，虚能受热，故假姜、附、熟艾鼓舞；犀角、羚羊、龙胆、黄连以散本病之热；龙骨、矾石、石脂以固痢久之脱；当归、甘草以和血气之伤也。

21078 龙骨丸

【方源】《千金》卷二十。

【组成】龙骨 柏子仁 甘草 防风 干地黄各五分 桂心 禹余粮 黄耆 茯苓 白石英各七分 人参 附子 羌活 五味子各六分 玄参 芎蒭 山茱萸各四分 磁石 杜仲 干姜各八分

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹酒送下，一日二次。加至四十丸。

【主治】膀胱肾冷，坐起欲倒，目眈眈，气不足，骨痿。

21079 龙骨丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】龙骨三分 艾叶一两(微炒) 赤石脂三分 白矾三两(烧令汁尽) 黄连三分(去须，微炒) 当归三分(锉碎，微炒) 附子一两(炮裂，去皮脐)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】水谷痢，日夜数行，腹内疼痛。

21080 龙骨丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】龙骨三分 地榆一两(锉) 赤石脂三分 没石子三分 艾叶三分(微炒) 黄柏三分(微炙，锉) 橡实半两 当归三分(锉，微炒) 芎蒭半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】久赤白痢不止，腹痛不食。

21081 龙骨丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】龙骨三两 禹余粮二两(烧醋淬七遍) 紫石英三两(细研,水飞过) 人参二两(去芦头) 桂心二两 川乌头二两(炮裂,去皮脐) 川椒一两(去目及闭口者,微炒去汗) 桑寄生三两 石斛三两(去根,锉) 泽泻三两 当归三两(锉,微炒) 杜仲二两(去粗皮,炙微黄,锉) 远志二两(去心) 肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 干姜三两(炮裂,锉) 牡蛎粉一两 甘草一两(炙微赤,锉)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下。渐加至五十丸。

【主治】妇人劳损,月水不断,五脏气虚,肉色黄瘦,血竭暂止,少日复发,不耐动摇,小劳辄剧及久疾失治者。

21082 龙骨丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】龙骨二两(烧过) 鹿茸一两(去毛,涂酥炙微黄) 椒红一两(微炒) 附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为细散,以酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前温酒送下。

【主治】妇人小便滑数。

21083 龙骨丸

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】龙骨一两 乌贼鱼骨三分(烧灰) 白芍药半两 侧柏二两(微炒) 鹿茸一两(去毛,涂酥炙微黄) 熟干地黄一两半 干姜半两(炮裂,锉)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以粥饮送下。

【主治】①《圣惠》:妇人崩中下五色,久不止者。②《普济方》赤白带下。

21084 龙骨丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】龙骨半两 雄黄一钱(细研) 麝香一钱(细研) 朱砂一分(细研) 蜗牛二十枚(炒令微黄) 橡实半两 牛黄一钱

(细研) 白土一钱 青黛一分 诃黎勒一分(煨,用皮)

【用法】上为末。入研了药,同研令匀,用面糊为丸,如绿豆大。每服五丸,以粥饮送下,一日三次。

【主治】小儿疳痢,日夜度数不常,肌体羸瘦者。

21085 龙骨丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】白龙骨一分 胡粉三钱(炒微黄) 黄连一分(去须,微炒) 黄柏一分(微炙,锉) 诃黎勒一分(煨,用皮) 白矾半两(烧令汁尽) 干姜半两(锉,微炒) 当归半两(锉,微炒) 木香一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服五丸,以粥饮送下,一日三四次。

【主治】《圣惠》:小儿久赤白痢不止,腹痛者。

21086 龙骨丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】香连丸(《局方》卷十)、香连煎(《鸡峰》卷二十四)。

【组成】龙骨半两 黄连半两(去须,微炒) 白石脂半两 白矾半两(烧令汁尽) 干姜半两(炮裂,锉)

【用法】上为末,醋煮面糊为丸,如麻子大。每服五丸,以粥饮送下,一日三四次。

【主治】①《圣惠》:小儿冷热不调,时有洞泄,下痢不止。②《局方》:小儿泄泻烦渴,米谷不化,腹痛肠鸣;或下痢脓血,里急后重,夜起频并,不思乳食,肌肉消瘦,渐变成疳。

【备考】《幼幼新书》引《万全方》有木香半两。

21087 龙骨丸

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】龙骨 白茯苓(去黑皮) 远志(去心) 防风(去叉) 人参 柏子仁(别捣) 犀角(镑) 生干地黄(焙) 各一两

牡蛎一两半(烧,研如粉)

【用法】上药除柏子仁外,捣罗为末,同拌匀,加煮枣肉二两,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前粥饮送下。

【主治】阳气内郁,肝气不治,少气善怒,视听昏塞,煎迫厥逆者。

21088 龙骨丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】龙骨一两(烧醋淬三五度) 白矾灰半两 铅丹(炒黑)一分

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,腊茶清送下,不拘时候。

【主治】久患滑泄下痢。

21089 龙骨丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【异名】螺皮丸(原书同卷)、龙骨皮丸(《普济方》卷二九八)。

【组成】龙骨 螺皮(炙令焦)各一两 黄耆(锉) 当归(切,焙) 枳壳(去瓢,麸炒) 干姜(炮)各三分 熟艾叶半两 附子(炮裂,去皮脐)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四十丸,空心以黄耆汤送下,日晚再服。

【主治】五痔连年不止,兼痔漏者。

21090 龙骨丸

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】龙骨 甘草(炙) 赤石脂 乌梅肉(炒) 人参 黄芩(去黑心) 枳壳(去瓢,锉,炒) 赤茯苓(去黑皮)各半两 厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉) 黄连(去须)各三分

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前米饮送下,一日三次。

【主治】产后日久泄泻,倦怠烦渴。

21091 龙骨丸

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】白龙骨一分 白石脂一两半 鸡屎矾(烧灰) 黄连(去须) 胡粉(炒) 赤茯苓(去黑皮) 阿胶(炙燥)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如麻豆大。每服五丸、七丸,空心、食前米饮送下。

【主治】小儿一切疳痢。

21092 龙骨丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【异名】益元丸(《普济方》卷二一七引《仁存方》)。

【组成】龙骨 远志(去心)各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、临卧冷水送下。

【功用】养精气,益元阳。

21093 龙骨丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】牡蛎(煨为粉) 熟干地黄(洗,焙) 菟丝子(酒浸一宿,别捣,焙干) 白茯苓(去皮)各半两 龙骨(五色者) 肉桂(去粗皮) 白石脂 五味子各二钱半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心、食前温酒或盐汤送下。

【主治】下虚胞寒,小便白浊,或如米泔,或若凝脂,腰重少力。

21094 龙骨丸

【方源】《普济方》卷三十三引《卫生家宝》。

【异名】龙蛎丸(《医学入门》卷七)。

【组成】龙骨半两 牡蛎半两

【用法】上为细末,同入鲫鱼腹内,用纸裹,入火内炮熟为度,只用二味和鱼肉杵为丸。每日用鲫鱼(大小不拘)三四尾,只看上件药尽为度。每日二十丸,空心米饮送下。

【主治】肾虚白浊,赤浊。

【加减】服时看药效如何,更加茯苓半两,远志半两尤佳。

21095 龙骨丸

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】糯米饭(晒干)四两 赤石脂(炒令焦黄) 龙骨(煨,别研) 白茯苓(去皮)各二两

【用法】上为细末,醋煮面糊为丸,焙干。

每服五十丸，空心、食前盐汤送下。

【主治】白浊。

21096 龙骨丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】禹余粮石二两（火煨通红，醋淬七次，别研细，取一两净） 乌鱼骨（煨灰存性）半两 鹿茸（煨去毛，切片酥炙） 白龙骨（煨）各一两 附子（大者）一枚（炮，去皮，七八钱亦得）

【用法】上为细末，粟米粉煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日午、晚食前温酒或淡醋汤送下。

【功用】固养血脉，温下元，止崩带，暖子脏。

【主治】妇人血气虚寒，营卫不调，冲任经虚，即血脉不禁而血滑崩漏者，或坠胎下漏。

21097 龙骨丸

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】龙骨 苦楝子各二两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心温酒送下。

【主治】失精，脉涩者。

21098 龙骨丸

【方源】《普济方》卷四十。

【组成】龙骨 艾叶（炒）各一两 鳖头骨二枚（涂酥炙令焦黄，研）

【用法】上为散。每服二钱，食前粥饮调下。

【主治】诸痢疾脱肛，久不止。

【备考】本方名龙骨丸，据剂型，当作“龙骨散”。

21099 龙骨丸

【方源】《普济方》卷三二一。

【组成】黄连（慢火炒） 干姜（炮） 当归各半两（酒浸，焙干） 赤石脂（醋煨七次） 阿胶二钱半（炮，蛤粉炒）

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心乌梅汤送下。

【主治】下痢不止。

【备考】本方名“龙骨丸”，但方中无龙骨，

疑脱。

21100 龙骨丸

【方源】《医家心法》。

【组成】龙骨（煨） 苁蓉（酒洗，去鳞膜） 补骨脂（盐水炒） 二蚕砂各二两二钱 五味子一两

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸。

【主治】肾气不足，不能上交心火者。

21101 龙骨丸

【方源】《女科秘要》卷三。

【组成】龙骨 海螵蛸 生地各一钱 牡蛎 川归 白芍 川芎 黄芩 白茯苓各八分

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服百丸，空心酒送下。

【主治】经来臭如腐肉。

21102 龙骨汤

【方源】方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷二引《深师方》。

【组成】龙骨半斤

【用法】捣碎。以水一斗，煮取五升，使极冷，稍稍饮。其间或得汗即愈。

【功用】《外台》引《深师方》：除热毒，止痢。

【主治】①《肘后方》：热病不解，下痢因笃欲死者。②《外台》引《深师方》：伤寒已八九日至十余日，大烦渴热盛，而三焦有疮，匿者多下痢。或张口吐舌呵呼，咽烂口鼻生疮，吟语不识人。

21103 龙骨汤

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《圣济总录》卷十四。

【异名】获神汤（《鸡峰》卷十一）。

【组成】龙骨 远志 茯神 防风 牡蛎各二两 甘草七两 大枣七枚

【用法】以水八升，煮取二升，分二次服，日日作之。

【主治】惊忧怖迫逐，或惊恐失财，或激愤

惆怅,致志气错越,心行违僻不得安定者。

21104 龙骨汤

【外台】卷十六引《小品方》。为《金匱》卷上“桂枝加龙骨牡蛎汤”之异名。见该条。

21105 龙骨汤

【方源】《外台》卷十五引《深师方》。

【组成】龙骨 茯苓 桂心 远志(去心)各一两 麦门冬(去心)二两 牡蛎(熬) 甘草(炙)各三两 生姜四两

【用法】上㕮咀。以水七升,煮取二升,分为二服。

【主治】宿惊失志,忽忽喜忘,悲伤不乐,阳气不起者。

【宜忌】忌海藻、菰菜、醋、生葱。

21106 龙骨汤

【方源】《外台》卷二十五引《古今录验》。

【组成】龙骨 牡蛎各三两(煨) 乌梅肉 熟艾 白头翁 干姜各一两 女萎 黄连 当归各二两 甘草六两(炙)

【用法】上切。以水七升,煮取三升二合。分服,日三夜一,断便止。

【主治】白滞下,昼夜无复数。

【宜忌】忌海藻、菰菜、猪肉、冷水。

21107 龙骨汤

【方源】《千金》卷十五。

【异名】龙骨散(《普济方》卷三八四)。

【组成】龙骨 甘草 大黄 赤石脂 石膏 桂心 寒水石 栝楼根各二两

【用法】上药治下筛。以酒、水各五合,煮散二合,二沸去滓服。

【主治】少小壮热,口渴引饮,下痢。

【方论选录】《千金方衍义》:此方专为痢下津伤烦渴,故以龙骨、石脂收敛津气;石膏、寒水石、栝楼根化热止渴;桂心、大黄散结下积;甘草调和诸药之性。寒热固涤萃于一方,亦惟婴儿可以胜任是法。

21108 龙骨汤

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】龙骨 黄连 干姜 赤石脂 当归各三两 枳实五枚(炙) 半夏一升

(洗) 附子(炮,去皮,破) 人参 桂心 甘草(炙)各二两

【用法】上㕮咀。以水九升,煮取三升,分三次服。

【主治】霍乱吐痢呕逆。

21109 龙骨汤

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《婴童方》。

【异名】龙骨散(《圣惠》卷九十三)。

【组成】龙骨 甘草(炙) 黄连各四分 当归 干姜各一分

【用法】以水四升,煮一升二合。食前分三次温服。

【主治】①《幼幼新书》引《婴童方》:小儿下利不住。②《圣济总录》:小儿冷痢腹痛。

21110 龙骨汤

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《婴童方》。

【组成】龙骨五分 甘草(炙) 干姜 当归 黄连 赤石脂 附子(炮裂,去皮脐) 前胡各三分

【用法】以水四升,煮一升二合。分为六服,旦服至午令尽。

【主治】小儿利,已服汤利去实,实去后而利不住。

21111 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】龙骨二两半 白茯苓(去黑皮) 远志(去心) 当归(切,焙干) 甘草(炙令微紫,锉) 防风(去叉) 人参各二两 桂(去粗皮)一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水二盏,加生姜三片,大枣二枚,同煎至一盏,去滓,空心、午时、夜卧各一服。

【主治】风惊恐,恍惚多忘,神气怯弱。

21112 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】龙骨 犀角(镑) 当归(切,焙) 阿胶(锉,炒燥) 黄连(去须,锉,

炒)各一两 人参三分

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,食前温服。

【主治】伤寒后热毒攻肠胃,下痢赤白,困绝。

21113 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】龙骨(研) 人参 茯神(去木) 紫石英(研) 赤石脂 当归(切,焙) 干姜(炮) 桂(去粗皮) 甘草(炙) 白术 芍药 紫菀(去苗土) 防风(去叉)各一两 远志(去心,焙)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加大枣三枚(擘破),同煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】伤寒后心气虚悸,恍惚多忘,或梦寐惊厥。

21114 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】龙骨(白者,碎) 附子(炮裂,去皮脐)各一两 干姜(炮) 甘草(炙) 人参各一两半

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服。

【主治】霍乱吐利,手足逆冷。

21115 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】龙骨 当归(切,焙) 干姜(炮裂) 甘草(微炙) 人参各一两 附子(炮裂,去皮脐)半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓热服,一日三次。

【主治】霍乱后虚冷腹痛,下利不止。

21116 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】龙骨 黄耆(锉) 肉苁蓉(酒浸,切,焙)各一两 白薇 牡蛎(煨) 附子(炮裂,去皮脐)各三分 甘草(炙,锉)半两

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,大枣二枚(擘破),煎至七分,去滓,空心、食前温服,一日三次。

【主治】肺痿,小便数,渐觉气弱。

21117 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】龙骨一两半 当归(切,焙) 厚朴(去粗皮,姜汁炙)各一两 赤石脂一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,空心、食前温服,一日三次。

【主治】冷白滞痢腹痛。

【加减】热,加白头翁三分(水洗晒干);牡蛎一两(烧令赤)。

21118 龙骨汤

【方源】《圣济总录》(人卫本)卷七十七。

【组成】龙骨 桑根白皮 赤石脂 天雄(炮裂,去皮脐) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 麻黄(去节根)各一两半 白芷 黄连(去须) 地榆 桂(去粗皮) 当归(切,焙) 木香 白术 诃黎勒皮(煨)各一两 黄芩(去黑心)半两 肉豆蔻(去壳)二枚

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞,加生姜一枣大(切),煎至六分,去滓温服。

【主治】新久泻痢。

【备考】本方方名,原书(文瑞楼本)作“龙骨散”。

21119 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】龙骨(研)五两 人参 白茯苓(去黑皮) 甘草(炙) 牡蛎(煨) 桂(去粗皮) 熟干地黄(焙)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,空心、食前服。

【主治】小便白淫及遗泄,无故自出者。

21120 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】龙骨 阿胶(炙令燥) 干姜(炮) 黄连(去须,炒)各一两 梗米三合(炒熟) 石榴一枚(大者,切,别捣入) 附子(炮裂,去皮脐) 甘草(炙,锉) 芍药 黄芩(去黑心)各三分

【用法】上哎咀,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盂半,煎至一盂,去滓,空心温服,一日二次。

【主治】大便不禁,真气羸弱。

21121 龙骨汤

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】龙骨一两 黄连(去须) 黄柏(去粗皮,炙) 地榆(炙)各三分 白头翁 干姜(炮) 当归(切,焙) 酸石榴皮 白术各半两

【用法】上为粗末。一二岁儿每半钱匕,水半盂,加生姜三片,同煎至三分,去滓,分二次温服,早、晚食前服。口疮,取芦荟、赤地利末敷之;下部生疮,取蛭蛇胆、黄连、麝香等分为末,涂敷之。

【主治】小儿三岁以上,疳痢,口疮,身体脚手心热。

21122 龙骨汤

【方源】《准绳·幼科》卷七引张涣方。

【组成】龙骨 诃黎勒皮(焙,炮) 赤石脂各半两 醋石榴皮(炒黄) 木香 使君子仁各一分

【用法】上为细末。每服一字或半钱,麝香汤调下,不拘时候。

【主治】疳气瘦弱,下痢白脓,久而不愈。

21123 龙骨饮

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】龙骨三两 青竹茹二两 干姜(炮)一两 伏龙肝五两 榭叶十枚(炙)

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盂半,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人经血暴下不止。

21124 龙骨饮

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】龙骨 黄连(去须)各一两半 人参 甘草(炙,锉) 干姜(炮裂) 半夏(汤洗十遍,焙干) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉) 赤石脂各一两

【用法】上为粗末。一岁儿每一钱匕,水半盂,加大枣一枚(擘破),同煎至三分,去滓,分二次温服,空心、午后各一服。

【主治】小儿五岁以下,百日以上冷痢者。

21125 龙骨散

【方源】《医方类聚》卷一三四引《肘后方》。

【组成】龙骨大如指(赤理如锦者) 甘草一两 桂心 干姜各二两

【用法】上为散。每服方寸匕,酒调下,一日三次。

【主治】男子失精。

【备考】方中甘草,《医心方》引《小品方》作“薰草”。

21126 龙骨散

【方源】《医心方》卷十六引《范汪方》。

【组成】龙骨七分 牡蛎三分(一方各等分)

【用法】上药治下疳。每服五分匕,食前服,一日三次。

【主治】瘰癧朝夕发热。

21127 龙骨散

【方源】方出《外台》卷十五引《深师方》,名见《普济方》卷三七八。

【组成】龙骨 大黄 干姜各四两 牡蛎三两(熬) 滑石 赤石脂 白石脂 桂心 甘草(炙)各三两

【用法】上药治下疳,韦囊盛。大人三指撮,以井花水二升,煮三沸,药成。适寒温,大人每服一升,未满百日儿每服一合。未能饮者,绵裹箸头纳汤中,着小儿口中,以当乳汁。热多者每日服四次。

【功用】除热。

【主治】大人风,少小惊痫掣风,日数十发,

医所不能疗者。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生葱。

21128 龙骨散

【方源】《医心方》卷五引《集验方》。

【组成】龙骨一分 贝齿三枚(烧) 矾石一分(烧)

【用法】上药治下筛。着毗头上，一日二次。

【主治】白翳覆瞳子黑睛。

21129 龙骨散

【方源】《医心方》卷十二引《古今录验》。

【组成】桑耳三两 矾石二两 牡蛎二两 龙骨三两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，一日三次。

【主治】遗尿。

21130 龙骨散

【方源】《千金》卷三。

【组成】五色龙骨 黄柏根皮(蜜炙令焦) 代赭 赤石脂 艾各一两半 黄连二两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，饮送下，一日三次。

【主治】产后痢。

【方论选录】《千金方衍义》：取连、柏苦寒而治崩迫后重，以其专散湿热，柏根名曰檀桓，能治腹中百病；代赭石、龙骨、艾叶性味皆涩，专主虚寒脱泄。用散不用汤者，欲其止涩，故无取于荡涤也。

21131 龙骨散

【方源】《千金》卷四。

【异名】温中龙骨散(《准绳·女科》卷一)。

【组成】龙骨三两 黄柏 半夏 灶中黄土 桂心 干姜各二两 石韦 滑石各一两 乌贼骨 代赭各四两 白僵蚕五枚

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒送下，一日三次。服药三月，有子即住药。

【主治】腹下十二病绝产：一曰白带，二曰赤带，三曰经水不利，四曰阴胎，五曰子脏坚，六曰脏癖，七曰阴阳患痛，八曰内强，九

曰腹寒，十曰脏闭，十一曰五脏痠痛，十二曰梦与鬼交。

【宜忌】寡妇、童女不可妄服。

【加减】白多者，加乌贼骨、僵蚕各二两；赤多者，加代赭五两；小腹冷，加黄柏二两；子脏坚，加干姜、桂心各二两。

【方论选录】《千金方衍义》：此龙骨散专清子脏。方中龙骨、代赭、灶中黄土，各司痼痼坚结，赤沃漏下，胎漏下血之任；桂心、干姜、半夏，各司通经散结，温中涤秽，下气运痰之任；滑石、石韦、黄柏，各司湿热留着，痼闭不通，阴伤蚀疮之任；乌贼、僵蚕，各司散血行经，祛风化痰之任。

21132 龙骨散

【方源】方出《千金》卷四，名见《圣济总录》卷一五二。

【组成】牡蛎 伏龙肝 赤石脂 白龙骨 桂心 乌贼骨 禹余粮各等分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，空心酒送下，一日二次。

【主治】女人漏下，或愈或剧，常漏不止，身体羸瘦，饮食减少，或赤或白或黄，使人无子者。

【加减】白多者，加牡蛎、龙骨、乌贼骨；赤多者，加赤石脂、禹余粮；黄多者，加伏龙肝、桂心。

【方论选录】《千金方衍义》：方中浑是固脱，惟桂心、乌贼散血润枯，亦是固中寓散之法。又须随所见之色而加增剂料，不必更易药味也。

21133 龙骨散

【方源】方出《外台》卷三十三引《广济方》，名见《妇人良方》卷十三。

【组成】当归 白龙骨 干地黄各八分 地榆 阿胶 芍药 干姜各六分 熟艾四分 牛角腮(炙令黄)十分 蒲黄五分

【用法】上为散。每服方寸匕，空腹以饮送下，一日二次。渐加至二匕，愈止。不吐利。

【主治】妇人因损娠，下血不止。

【宜忌】忌生冷、油腻、猪、鱼、蒜、茺萸。

21134 龙骨散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】龙骨一两 赤茯苓一两 紫菀一两(洗,去苗土) 人参一两(去芦头) 羚羊角屑一两 薏苡仁一两 麦门冬一两(去心)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】肝气逆,四肢沉重,面色青,不欲见人,多嗔怒。

21135 龙骨散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】龙骨一两 牡蛎粉一两半 远志三分(去心) 白茯苓一两 柏子仁一两 麦门冬一两(去心,焙) 寒水石一两 犀角屑一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为细散。每服一钱,以金银汤放温调下,不拘时候。

【主治】心风恍惚,惊恐妄语,忽喜忽嗔,悲伤不乐。

21136 龙骨散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】龙骨 白薇 牡蛎(烧为粉) 白芍药各一两 甘草半两(炙微赤,锉) 附子三分(炮裂,去皮脐)

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至五分,去滓,食前温服。

【主治】伤寒后虚损,夜梦失精,头目眩疼,四肢羸劣。

21137 龙骨散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】龙骨 黄连(去须,微炒) 黄柏(微炙,锉) 当归(锉,微炒) 阿胶(杵碎,炒令黄燥)各二两

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】时气诸痢不止。

21138 龙骨散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】白龙骨二两 甘草半两(炙微赤,锉) 续断一两 泽泻一两 牡蛎粉三分 附子一两(炮裂,去皮脐) 覆盆子三分 棘刺三分(微炒) 白芍药一两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】虚劳梦中失精,心悸,小腹急痛,阴间寒,目眶疼痛,头发脱落。

21139 龙骨散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】龙骨一两 韭子三分(微炒) 赤石脂一两 黄耆一两(锉) 桑螵蛸一两(微炒) 远志三分(去心) 茯神一两 麦门冬一两半(去心,焙) 熟干地黄一两

【用法】上为粗散。每服三钱,用水一中盏,加大枣三枚,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】虚劳失精,心多忪悸。

21140 龙骨散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】白龙骨一两 生于地黄一两 干姜半两(炮裂,锉) 曲头棘针一分 白矾一分(烧灰)

【用法】上为末。每用半钱,揩敷齿龈下。

【主治】齿龈血出不止。

21141 龙骨散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】龙骨一两 黄连一两(去须,微炒) 地榆一两(锉) 当归一两(锉,微炒) 犀角屑半两 黄芩一两 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥)

【用法】上为细散。每服一钱,以粥饮调下,不拘时候。

【主治】赤痢烦渴,腹痛不欲饮食。

21142 龙骨散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】龙骨一两 厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 赤石脂二两 当归二两

(锉碎, 微炒) 白朮一两 吴茱萸三分(汤浸七遍, 焙干, 微炒)

【用法】上为细末。每服二钱, 以粥饮调下, 不拘时候。

【主治】白痢腹痛, 不能饮食。

21143 龙骨散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】龙骨一两 赤石脂三两 当归一两(锉, 微炒) 肉豆蔻一两(去壳) 牡蛎二两 干姜一两(炮裂, 锉)

【用法】上为细散。每服二钱, 以粥饮调下, 不拘时候。

【主治】冷痢洞泄, 腹中疔痛不可忍。

21144 龙骨散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】白龙骨一两 当归一两(锉, 微炒) 白矾三两(烧令汁尽) 白石脂一两 附子一两(炮裂, 去皮脐) 干姜三分(炮裂, 锉)

【用法】上为细散。每服二钱, 不拘时候, 以粥饮调下。

【主治】久冷痢, 食不消化, 日夜三二十行, 渐加困笃。

21145 龙骨散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】龙骨一两 黄连三分(去须, 微炒) 犀角屑三分 黄柏三分(锉) 赤芍药半两 黄芩半两 当归半两(锉, 微炒) 赤地利二分 黄耆三分(锉) 茜根三分 鼠尾草花三分

【用法】上为细散。每服二钱, 不拘时候, 以粥饮调下。

【主治】热痢, 下赤黄色脓, 心神烦热, 腹内疼痛, 饮食减少。

21146 龙骨散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】龙骨一两 木香一两 当归一两(锉, 微炒) 肉豆蔻一两(面裹煨, 令面黄为度) 厚朴二两(去粗皮, 涂生姜汁炙令

香熟)

【用法】上为细散。每服二钱, 粥饮调下, 一日三四次。

【主治】水泻腹痛, 不纳饮食。

21147 龙骨散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】龙骨一两 艾叶一两(微炒) 鳖头骨三枚(涂酥炙令焦黄)

【用法】上为细散。每服二钱, 食前以粥饮调下。

【主治】诸痢疾, 脱肛久不止。

21148 龙骨散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】龙骨一两 川大黄半两(生用) 白薇半两 黄耆半两(锉) 黄芩半两 白及半两 牡蛎半两(烧为粉) 雌黄半两(细研) 甘草半两 芍药半两

【用法】上为细散。用猪胆调令如膏, 摊于帛上涂贴, 取穴为度。

【功用】化脓止痛。

【主治】痈疽赤肿, 未得脓溃者。

21149 龙骨散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】龙骨三两 当归一两(微炒) 芍药一两 续断一两 熟干地黄一两 鹿茸半两(去毛, 涂酥炙令微黄) 乌樟根一两 突厥白一两

【用法】上为细散。用敷疮上, 血出即止; 如服, 即每服二钱, 温酒调下, 一日三次。

【主治】金疮血出不止。

21150 龙骨散

【方源】方出《圣惠》卷七十二, 名见《普济方》卷三二一。

【组成】羚羊角屑 龙骨 当归(锉, 微炒) 蒲黄各半两 生干地黄一两

【用法】上为细末。每服二钱, 食前粥饮调下。

【主治】妇人尿血不止。

21151 龙骨散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】五色龙骨一两(烧灰) 乌贼鱼骨一两(炙黄) 白芍药三分 干姜半两(炮裂, 锉)

【用法】上为细散。每服二钱, 食前以温酒调下。

【主治】妇人漏下作五色, 连年不愈者。

【备考】《普济方》本方用法: 以赤糙米粥饮调下。

21152 龙骨散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】白龙骨一两 乌贼鱼骨一两半(烧灰) 白芍药三分 当归一两(锉, 微炒) 禹余粮二两(烧, 醋淬七遍) 桂心一两 熟干地黄一两半 吴茱萸半两(酒或汤浸七遍, 焙干, 微炒) 干姜半两(炮裂, 锉)

【用法】上为细散。每服一钱, 食前以热酒调下。

【主治】妇人久冷白带下, 脐腹痛。

21153 龙骨散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】龙骨二分 当归三分(锉, 微炒) 地榆三分(锉) 艾叶半两(微炒) 阿胶三分(捣碎, 炒令黄燥) 熟干地黄一两 蒲黄半两 犀角屑三分

【用法】上为细散。每服二钱, 食前以粥饮调下。

【主治】因损娠, 下恶血不止。

21154 龙骨散

【方源】方出《圣惠》卷七十八, 名见《普济方》卷三五三。

【组成】龙骨一两 麻黄根一两

【用法】上为细散。每服二钱, 以粥饮调下, 不拘时候。

【主治】产后虚汗不止。

21155 龙骨散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】龙骨一两 厚朴一两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 肉豆蔻三分(去壳) 白术三分 艾叶三分(微炒) 干姜半两(炮

裂, 锉) 人参半两(去芦头) 诃黎勒一两(煨, 用皮) 当归一两(锉, 微炒) 地榆半两 木香半两 白头翁半两

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 一日三四次。

【主治】产后久痢, 腹内疼痛, 不欲饮食。

21156 龙骨散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】龙骨一两 牡蛎一两(烧为粉) 桂心半两 菝葜一两(锉) 乌药一两 桑螵蛸半两(微炒) 熟干地黄一两半

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三枚, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】产后小便数多。

21157 龙骨散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】白龙骨 牡蛎粉 黄耆(锉) 人参(去芦头) 麻黄根 熟干地黄 甘草(炙微赤, 锉) 各半两 麦门冬一两(去心, 焙)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】小儿夜后常有盗汗, 黄瘦。

21158 龙骨散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】龙骨末一分 草豆蔻末半两 烂籐籐(末) 半分

【用法】上为末。以奶汁三合, 煎至二合, 去滓, 别入牛黄、麝香、兔毛灰各一字, 生姜汁少许, 调令匀, 分三次服, 如人行五里一服。

【主治】小儿霍乱, 吐泻不止。

21159 龙骨散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】龙骨一分 胡粉一分(炒令黄色) 白矾灰一分 黄连半两(去须, 锉碎, 微炒)

【用法】上为细散。每服半钱，以米饮调下，一日三次。

【主治】小儿疳痢，日夜不止。

21160 龙骨散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】河黎勒散（《圣济总录》卷一七三）。

【组成】龙骨半两 河黎勒一分（煨，用皮） 赤石脂半两 密陀僧一分 酸石榴皮一分（锉，微炒） 麝香一分（研入）

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。

【主治】小儿疳痢久不愈。

【备考】《圣济总录》本方用法：若是脓血痢，黄连汤调下。

21161 龙骨散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】白龙骨一两 茯神三分 人参三分（去芦头） 胡黄连半两 麦门冬三分（去心，焙） 茅根三分（锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痢，渴，体热烦闷。

21162 龙骨散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】白龙骨三分 白石脂三分 黄连三分（去须，微炒） 胡粉三分（炒令黄） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】小儿水谷痢不止。

21163 龙骨散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】龙骨一两 黄连三分（去须，微炒） 地榆三分（微炙，锉） 黄芩三分 乌梅肉半两（微炒） 赤地利三分 鼠尾花三分

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。

【主治】小儿热痢，烦闷，口干多渴，不欲乳食。

21164 龙骨散

《圣惠》卷九十三。为《幼幼新书》卷二十八引《要孺方》“龙骨汤”之异名。见该条。

21165 龙骨散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】龙骨一两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 当归半两（锉，微炒） 黄连一两（去须，微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿暴痢。

21166 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】龙骨 黄连（去须，炒）各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，食前温米饮调下，一日二次。

【主治】伤寒热病后，下痢脓血。

21167 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】龙骨 黄连（去须，炒）各一两 白矾（熬令汁枯） 阿胶（炙燥） 白石脂（研） 干姜（炮） 当归（切，焙） 胡粉（炒） 赤石脂（研） 牡蛎（煨，研）各三分 甘草（炙，锉） 附子（炮裂，去皮脐）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，食前米饮调下，一日二次。

【主治】大便青黑，状如鹑粪者。

21168 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】龙骨半两 黄连（去须） 牡蛎（煨）各一两 乌梅肉（焙干）三分

【用法】上为散。每服二钱匕，食前温米饮调下。

【主治】赤白痢，肠胃虚滑。

21169 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】龙骨 黄连（去须） 黄柏（去粗

皮) 干姜(炮) 阿胶(炙燥) 人参 厚朴(去粗皮, 生姜汁炙) 各二两

【用法】上为散。每服二钱匕, 空腹粥饮下, 一日二次。

【主治】气痢腹内虚鸣, 日久不愈。

21170 龙骨散

《圣济总录》(文瑞楼本) 卷七十七。即原书(人卫本)“龙骨汤”。见该条。

21171 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】龙骨 人参 远志(去心) 各一两一分 白茯苓(去黑皮) 肉苁蓉(酒浸, 切, 焙) 各一两半 蛇床子(炒) 桂(去粗皮) 菟丝子(酒浸, 捣, 焙) 巴戟天(去心) 石斛(去根) 各一两

【用法】上为散。每服三钱匕, 温酒调下, 一日三次。

【主治】五劳七伤, 失精腰痛, 少气, 面目萎黄, 手足痹冷, 不思饮食。

21172 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】龙骨(煨赤, 地上去火毒, 研) 赤芍药(为末) 各半两 铅丹一分 胡粉半钱

【用法】上为细末。先以葱汤洗疮, 洗后拭干, 以药掺之。

【功用】敛疮口。

【主治】发背, 疮已破者。

21173 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】龙骨 乌贼鱼骨(去甲) 胡粉各半两 铅丹一钱(炒紫色)

【用法】上为细末。先用盐汤洗了, 贴之, 一日三五次。

【主治】发际疮, 初生如黄米大, 或痒或痛。

21174 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】龙骨 干姜(炮) 各一两 当归(烧) 禹余粮(煨, 醋淬五七遍) 阿胶(炙燥) 续断各二两 牛角腮(炙焦) 三两

【用法】上为散。每服三钱匕, 食前温酒调下, 一日三次。

【主治】妇人带下。

21175 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】龙骨一两 乌贼鱼骨(去甲) 鹿茸(去毛, 酥炙) 续断 芍药(锉, 炒) 赤石脂 肉苁蓉(酒浸, 切, 焙) 各三分 干地黄(炒) 一两半

【用法】上为散。每服二钱匕, 空腹米饮调下, 一日二次。

【主治】妇人经血暴下, 兼赤白带下不止。

21176 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】龙骨半两 生干地黄(焙) 地榆(去苗, 细锉) 各一两半 当归(切, 焙) 芍药各一两 干姜(炮裂) 蒲黄(微炒) 阿胶(炒令燥) 牛角腮(取黄牛角内者, 炙令匀焦, 锉取末) 各半两 艾叶末一分

【用法】上为散。每服二钱匕, 煎生地黄酒调下。

【主治】妊娠坠胎后, 血出不止。

21177 龙骨散

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】龙骨(研) 白石脂(研) 胡粉(炒) 白矾(枯过) 各一两 河黎勒皮二两 黄连(去须) 陈橘皮(去白, 麸炒) 阿胶(炙燥) 当归(切, 焙) 人参 厚朴(去粗皮, 生姜汁炙) 各一两半

【用法】上为散。每服一钱匕, 空腹煮白粥饮调下, 一日二次。

【主治】小儿赤白痢。

21178 龙骨散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】砒霜 蟾酥各一字 粉霜五分 龙骨一钱 定粉一钱五分 龙脑半字

【用法】上先研砒粉极细, 次入龙骨再研, 次入定粉等同研。每用少许敷之。

【主治】小儿口疮，走马疳。

21179 龙骨散

【方源】《普济方》卷三七五引《全要方》。

【组成】天浆子三十一粒(炒) 蜈蚣一条(炙) 蝎尾(去钩子) 乌蛇肉(酒浸，焙) 朱砂各一钱 脑子一分 麝香一分

【用法】上为末。三岁一字，薄荷煎汤调下。

【主治】小儿急慢惊风，诸药不效者。

21180 龙骨散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】龙骨 赤石脂 诃子(煨，去核) 白术 枳壳(麸炒，去瓤) 各等分

【用法】上为细末。每服一钱，乳食前温米饮调下。

【主治】小儿久痢脱肛。

21181 龙骨散

【方源】方出《百一》卷十二，名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】猪粪(不以多少，新瓦上焙干，入火中烧令通红取出，于瓶罐内窖成炭，存性，碾为细末) 五钱 白龙骨(细研末) 二钱半 轻粉二钱半 槟榔末一钱

【用法】和令极匀。先以口含唾水或温盐汤洗，令疮净见肉，然后以真麻油调药，随疮大小敷之。未愈再敷，不过三五日定安。

【主治】脚疽并久远恶疮，它药不效者。

21182 龙骨散

【方源】《普济方》卷三三一引《妇人良方》。

【组成】龙骨(烧灰)

【用法】上为细末。每服二钱，空心煎艾叶汤调下。

【主治】妇人赤白带下，或因经候不断者。

21183 龙骨散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】龙骨 诃子肉(炒) 各二钱半 没石子(大者) 二枚 罂粟壳(去瓤，醋炙) 赤石脂各二钱

【用法】上为末。每服一钱，米饮调下。

【主治】小儿大肠虚，肛门出。

21184 龙骨散

【方源】《直指小儿》卷四。

【异名】明矾散(《得效》卷十二)。

【组成】明矾(煨) 龙骨(研) 各三钱 黄丹(煨) 二钱 胭脂一钱 麝少许

【用法】上为细末。先以绵杖捻去水，次以鹅毛管吹药入耳。

【主治】小儿肾经气实，其热上冲于耳，遂使津液壅滞为稠脓、为清汁者；或因沐浴，水入耳中，水湿停留，搏于血气，酝酿成热，致令耳脓者。

【加减】加海螵蛸末亦好。

【备考】《绛囊撮要》有五倍子一钱。

21185 龙骨散

【方源】《普济方》卷五十三。

【组成】龙骨 杏仁各等分

【用法】每日点半杏仁许入耳中。

【主治】耳聋无问年月者。

21186 龙骨散

《普济方》卷一八九。为方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一八九“立效散”之异名。见该条。

21187 龙骨散

【方源】《普济方》卷二一六。

【组成】龙骨 桑螵蛸 瓜蒌根 黄连

【用法】上为散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】小便数而多。

21188 龙骨散

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】龙骨(煨) 白芷 黄丹 寒水石(煨) 各等分

【用法】上为末。掺疮口上。

【主治】痔漏。

21189 龙骨散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】乌鱼骨 赤石脂 龙骨 孩儿茶 各等分

【用法】上为末。干贴之。

【主治】疳疮。

21190 龙骨散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】空肚草(干为末) 龙骨(生用) 虎骨(湿纸裹衣,灰火内煨存性)

【用法】上为细末。敷之。

【主治】冷疳。

21191 龙骨散

【方源】《普济方》卷三〇三。

【组成】龙骨 寒水石 滑石 枯矾 乳香 没药 轻粉(些少) 黄丹(炒)各半分

【用法】上为细末。每用干掺,外用膏药贴之。

【功用】生肌长肉,定痛止血,敛疮口。

【主治】金疮刀箭伤。

21192 龙骨散

《普济方》卷三四三。为《圣济总录》卷一五八“地榆散”之异名。见该条。

21193 龙骨散

【方源】《普济方》卷三五二。

【组成】龙骨(研) 赤石脂(研)各六分 乌贼鱼骨 牡蛎粉 肉苁蓉各五两 龟甲 芍药

【用法】上为散。每服方寸匕,饮送下,一日三次。渐加之。

【主治】产后崩中下血。

【加减】加干地黄十分佳。

【备考】方中龟甲、芍药用原缺。

21194 龙骨散

《普济方》卷三八四。为《千金》卷十五“龙骨汤”之异名。见该条。

21195 龙骨散

【方源】《普济方》卷三八八。

【组成】鸡肠草一两 牡蛎粉三钱 龙骨 茯苓各半两 麦门冬半两(去心) 桑螵蛸半两

【用法】上咬咀。每服一钱,水一小盏,枣子同煎服。

【主治】寒淋,小便不禁,或睡中遗出不觉者。

21196 龙骨散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】龙骨一分 赤石脂 缩砂(去皮)各一两

【用法】上为末。小儿每服一字或半钱,大人一钱,面汤送下。

【主治】大人、小儿吐利。

【加减】若止吐,加丁香一分代缩砂。

21197 龙骨散

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】龙骨 甘草(炙微赤,锉) 使君子 黄芩 黄连(去须,微炒) 栝楼根各半两

【用法】上为细末。每服半钱,以粥饮调下,一日三四次。

【主治】小儿痢,渴不止,身体壮热。

21198 龙骨散

【方源】《普济方》卷四〇一。

【组成】白龙骨一分 牛黄半分(细研) 葛根一分(锉)

【用法】上为散。每服半钱,以温水调下,一日三四次。

【主治】小儿中客忤,体热。

21199 龙骨散

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】龙骨 赤石脂 五倍子 黄丹(煨) 海螵蛸各等分

【用法】上各研,入麝少许,共研匀。掺上。如干,先以盐水洗疮,取药干掺。

【主治】金疮。

【备考】本方原名龙骨膏,与剂型不符,据《景岳全书》改。

21200 龙骨散

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】龙骨(煨) 当归 香附子(炒)各一两 棕毛灰五钱

【用法】上为细末。每服四钱,空心米汤调下。

【主治】妇人血崩不止。

【禁忌】忌油腻、鸡鱼、煨炙物。

21201 龙骨散

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】枯矾 龙骨 胭脂胚各一钱 麝香少许

【用法】上为细末。先以棉裹杖子拭去耳中脓，再吹一字入耳中，一日二次。

【主治】小儿诸脓耳。

【加减】加海螵蛸一钱尤妙。

【备考】《幼幼集成》有铅丹二钱。

21202 龙骨散

【方源】《准绳·幼科》卷一。

【组成】龙骨(煨) 轻粉各半钱 黄连(去须)一钱半

【用法】上为极细末。每用少许，干掺脐。

【主治】脐中疮。

21203 龙骨散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】诃子肉 龙骨(生) 细茶各等分

【用法】上为末。干掺。

【功用】生肌肉。

21204 龙骨散

【方源】《济阳纲目》卷一〇七。

【组成】黄柏 藜芦 石膏 铜青 胆矾 麝香 龙骨(病急多用，病轻少用)

【用法】上以火焙存性，为末。每用五分，擦于患处。

【主治】走马牙疳。

21205 龙骨散

【方源】《诚书》卷六。

【组成】龙骨(煨)一钱 轻粉五分 黄连一钱半 矾(煨)五分 (一方无轻粉、黄连)

【用法】上为末。干掺脐中。

【主治】小儿脐内疮。

21206 龙骨散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】龙骨(火煨，研极细) 赤石脂 绵胭脂(烧灰，研)各一钱 枯矾三分

【用法】上为末。干掺之。

【主治】小儿断脐太短，或剪刀有伤，致令啼哭，脐出血者。

【加减】加血余少许尤妙。

21207 龙骨散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】龙骨(煨) 白及各等分

【用法】伤口小，干敷；伤口大凉水调敷。

【主治】金疮。

21208 龙骨散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】龙骨(煨) 枯矾少许

【用法】掺之；油调敷亦可。

【主治】①《杂病源流犀烛》：脐疮。②《中医儿科学》：脐湿。

21209 龙骨散

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】龙骨三两 牡蛎三两 海螵蛸三两 黄柏十六两 雄黄三两 滑石粉一两

【用法】直接扑上；或油调外用。

【功用】解毒收敛。

【主治】湿疹(湿疡)，接触性皮炎(湿毒疮)，脂溢性皮炎，趾间足癣(臭田螺)。

【禁忌】化脓性陈旧肉芽疮面禁用。

21210 龙骨膏

【方源】《朱氏集验方》卷十三。

【组成】真龙骨少许 海螵蛸 五倍子 赤石脂 虢丹(煨过，不用亦可，如使血竭尤佳) 石庭脂(一方不用，却用麝)

【用法】上药斟酌，或等分亦得。如伤大，先以冷盐水洗净，却用黄桑生浆涂四围，待水干皮敛，即以药干敷，百发百中。如小小伤，只以冷盐水略洗，便敷药。

【主治】金疮。

【备考】本方方名，据剂型当作“龙骨散”。

21211 龙骨膏

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】龙骨 乳香 没药 陀僧各二钱 海螵蛸一钱半 肥皂子(烧存性)五个

【用法】上为末。用绵纸双重，以针撞乱孔，

清油调药夹内，缚贴疮上，隔日一翻，两面贴之。

【主治】疔疮。

21212 龙香丸

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《谭氏殊圣》。

【组成】母丁香三个 麝少许 青黛一分 蟾一个（去肚 炙黄）

【用法】上为散。煮浆水饭为丸，如粟米大。每服三丸，温水送下。

【主治】小儿多热发惊，口内烧干，面色青，咬甲爱盐，仍吃土，时时咳嗽，夜多声，气疳传脏，心头痛，掣眼得眉，不转睛。

21213 龙香丸

【方源】《普济方》卷三八八。

【组成】龙骨（煨） 牡蛎（煨）各一两 茴香（炒） 白茯苓各半两（一方加赤石脂半两）

【用法】上为末，糯米糊为丸，如小豆大。三岁三十丸，茴香汤送下。

【主治】小儿寒淋，因热淋服冷药太过，小便不禁，或取冷过度，下焦受冷，气入脬，不能禁止，故遗尿。

21214 龙香散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】地龙（去土，炒，为末） 乳香（研）各等分

【用法】上为末，掺在纸上，作纸捻。于灯上烧令烟出，即迎烟熏鼻，随患左右用之。

【主治】偏头痛不可忍。

21215 龙香散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】当归（去芦，净洗） 龙骨（煨） 赤石脂 乌鱼骨 白术 香白芷 人参（去芦）各等分

【用法】上为细末。每服半钱至一钱，乳食前温米饮调下。

【主治】小儿肠胃虚弱，滑泄无度，腹痛肠鸣，或疳泻不止。

21216 龙香散

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】白术一分 石胆半钱（研） 龙齿一钱 陈皮（末）一钱 麝香半字（研）

【用法】上为细末。每服半钱，二岁以下者每服一字，米饮调下，不拘时候。

【主治】小儿五疳瘦悴，多啼叫唤，口疮发穗。

21217 龙泉散

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】井泉石 赤石脂各等分

【用法】上为细末。生油调涂。

【主治】汤烫火烧，热痛疮肿。

21218 龙泉散

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】龙泉粉（炒） 瓦粉 广茂 京三棱（酒洗，炒） 昆布各五钱

【用法】上为细末。煎熟水调涂之。

【主治】①《兰室秘藏》：耳下或至缺盆，或肩生疮，坚硬如石，动之无根，名曰马刀，或生两胁，或已流脓，作疮未破者。②《金鉴》：诸般瘰癧，未成或已成者。

21219 龙须汤

【方源】《普济方》卷三二七。

【组成】牛膝（洗，去芦，酒浸一宿，急用酒蒸熟为度） 当归（酒浸，去芦） 白术 防风（去芦） 独活（去芦） 甘草各二钱半 黄耆一两（蜜炙）

【用法】上咬咀。每服半两，井水五盏，加生姜十片，薤白一握，同煎至三盏，去滓，不拘时候服。

【主治】胎前产后身疼。

21220 龙须散

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【异名】濯热散（《百一》卷七）、甘草散（《普济方》卷一一七）。

【组成】白矾（生）一两 五倍子（生。一作五味子） 乌梅（捶，去仁）各二两 甘草一两半（炙。一方生用） 飞罗面二两（一方用清明日面尤佳）

【用法】上为末，入飞罗面拌匀。每服二钱，新水调下。

【主治】①《袖珍》引《圣惠》：中暑，迷闷不省人事，泄泻、霍乱作渴。②《普济方》：冒暑伏热，心膈躁闷，饮水过度，不知人事，衄血吐血，小便下血，头旋目晕。

【加减】加诃子肉，滴水为丸，如弹子大，细嚼，水送下，名“龙涎丸”。

21221 龙胆丸

【方源】方出《千金》卷三，名见《普济方》卷三一七。

【组成】栝楼根 麦门冬 龙胆各三两 大黄二两 土瓜根八两 杏仁二升

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，饮送下，一日三次，渐加之。

【主治】妇人经服硫黄丸，忽患头痛项冷，冷歇，又心胸烦热，眉骨眼毗痒痛，有时生疮，喉中干燥，四体痛痒。

21222 龙胆丸

【方源】《普济方》卷二三六引《千金》。

【组成】龙胆 黄连(去须)各一两 梔子(去皮)十枚 苦参 大黄(锉，炙) 黄芩(去黑心) 芍药 青箱子 栝楼根 芒消(别研)各半两(一方无苦参)

【用法】上为末，拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次二十丸，空心、食前米饮送下，一日二次。微利为度。

【主治】骨蒸羸瘦，烦闷短气，喘息鼻张，日晚即发。

【备考】本方改为散剂，名“龙胆散”(见《圣济总录》)。

21223 龙胆丸

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】龙胆 苦参 黄连 黄芩各二两 大黄三两 黄柏 李子仁(去皮) 栝楼 青箱子各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，食前饮送下，一日二次。不知增之。

【主治】身体有热，羸瘦不能食。

21224 龙胆丸

【方源】《医心方》卷三引《效验方》。

【组成】龙胆二分 黄连二分 黄芩二分 人参二分 芒消二两 大黄二分

【用法】上药治下筛，蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，一日三次。不知，可至七丸。

【主治】朝寒暮热，手足烦，鼻张面青，不能饮食。

21225 龙胆丸

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】龙胆一两(去芦头) 前胡三分(去芦头) 白鲜皮一两 黄连三分(去须) 子芩半两 梔子仁三分 川大黄一两半(锉，微炒) 川升麻三分 大麻仁一两半(别研如膏) 鳖甲一两(去裙襖，涂醋炙令微黄) 川芒消一两

【用法】上为末，加麻仁，同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不拘时候，以温浆水送下。

【主治】伤寒，潮热不退，四肢沉重，不欲饮食，胸中隘塞，小便赤涩。

21226 龙胆丸

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】龙胆一两(去芦头) 青箱子一两 黄芩半两 梔子仁半两 苦参半两(锉) 黄柏三分(锉) 栝楼根半两 川升麻三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温水送下，不拘时候。

【主治】伤寒后，余热在于胸中，烦渴闷乱。

21227 龙胆丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】龙胆一两(去芦头) 枳壳一两(麸炒微黄，去瓢) 地骨皮三分 甘草半两(炙微赤，锉) 麦门冬一两半(去心，焙) 赤茯苓一两 桃仁三分(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 梔子仁三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以粥饮送下。

【主治】传尸羸瘦，经久不损。

21228 龙胆丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】龙胆三钱（去芦头） 胡黄连二钱 牛黄一钱（细研） 川大黄二钱 犀角屑二钱

【用法】上为末，入牛黄都研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以薄荷汤化破服。

【主治】小儿心肺风热。

21229 龙胆丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】龙胆一两（去芦头） 黄连一两（去须） 铅霜半两（细研） 牛黄一钱（细研） 铁粉一分（细研）

【用法】上为末，都研令匀，以粟米饭为丸，如绿豆大。每服五丸，不拘时候，以薄荷蜜水送下。

【主治】小儿心脏气壅，烦热闷乱。

21230 龙胆丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙胆三分（去芦头） 牛黄一分（细研） 龙齿三分

【用法】上为末，研入麝香二钱，炼蜜为丸，如黄米大。每服五丸，荆芥汤送下，不拘时候。

【主治】小儿惊热不退，变为发病。

21231 龙胆丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【异名】龙粉丸（《小儿药证直诀》卷下）、梅肉丸（《杨氏家藏方》卷十八）。

【组成】龙胆半两（去芦头） 定粉半两 乌梅肉半两（微炒） 黄连半两（去须）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸，以温水送下，一日四五次。

【主治】小儿疳渴，吃水不止。

21232 龙胆丸

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】龙胆一分（去芦头） 川大黄一分（锉碎，微炒） 人参半两（去芦头） 梔子仁半两 川朴消半两 茵陈一分 郁李仁半

两（汤浸，去皮，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。一二岁儿以温水研下三丸。

【主治】①《圣惠》：小儿口疮，多睡吐乳。

②《普济方》：小儿唇疮不合。

21233 龙胆丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】龙胆一分（去芦头） 使君子半两 胡黄连半两 麝香一分 苦楝树根皮半两（炙微黄，锉） 蟾酥半两 臭椿根皮半两（炙微黄，锉）

【用法】上为末，更都研令匀，面糊为丸，如绿豆大。一岁儿每服一丸，以粥饮送下。儿稍大，以意加之。

【主治】小儿疳痢久不愈，体热心烦，不欲乳食。

21234 龙胆丸

【方源】《苏沈良方》卷五。

【组成】草龙胆 白矾（煨）各四两 天南星 半夏各二两半（水浸，切作片，用浆水雪水各半同煮三五沸，焙干，各二两）

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后、临卧腊茶清送下。面糊须极稀，如浓浆可也。

【功用】解暴热，化涎凉膈，清头目。

【主治】痰壅膈热，头目昏重。岭南瘴毒，才觉意思昏闷。咽喉肿痛，口舌生疮，凡上壅热涎诸证。

21235 龙胆丸

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《万全方》。

【组成】龙胆 升麻 麝 水银（枣肉研） 干蝎 铁粉 熊胆 雄黄 朱砂各一分 芦荟 胡黄连 天麻各半两

【用法】上为末，枣肉为丸，如绿豆大。每服三丸，汤送下。

【主治】肝疳，体热烦渴，心躁，夜不得卧。

21236 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】龙胆(去土) 钩藤 升麻 犀角(镑) 黄芩(去黑心) 玄参 白茯苓(去黑皮) 防风(去叉) 秦艽(去苗土) 地骨皮(锉) 大麻仁(研膏同捣) 槟榔(锉) 黄连(去须,炒) 大黄(锉,炒) 天竺黄(别研) 琥珀(别研) 甘草(炙,锉) 马牙消(研) 麦门冬(去心,焙) 龙齿(别研) 真珠末(别研) 各一两 青黛二两(别研) 蛭螂三十五枚(去头足,生用) 蚱蝉三十五枚(去头足,生用) 金箔七十片(与丹砂同研) 银箔一百片(与金箔、丹砂同研) 铁粉一两一分(别研) 虎睛一对(酒蘸炙燥,去皮,捣) 牛黄(研) 半两 丹砂三分(别研,入金银箔同研)

【用法】上药除十二味别研外,余药捣罗,与研者药末合研匀,炼蜜为丸,如绿豆大。每服十丸,小儿每服三丸至五丸,食后煎人参、茯苓汤送下,一日三次。

【主治】癫痫狂悖迷乱,心神恍惚,四体抽搐,吐沫嚼舌。

21237 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】龙胆 山栀子仁 白薇 茯神(去木) 大黄(锉,炒) 各二两 麦门冬(去心,焙) 三两 人参 甘草(炙,锉) 各一两半 玄参 羚羊角(镑) 各二两半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后煎大枣汤送下。

【主治】心实热,惊悸善笑。

21238 龙胆丸

《圣济总录》卷九十三。为《医心方》卷十三引《玄感传尸方》“小龙胆丸”之异名。见该条。

21239 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】龙胆一两一分 黄柏(厚者,去粗皮) 黄芩(去黑心) 人参 栀子仁 黄连(去须) 白芍药 甘草(炙) 各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,粥饮送下,空心、夜卧各一眼,以知为度。

【主治】虚劳骨蒸身热,手足烦疼,心胸懊侬,羸困不能下食。

21240 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】龙胆三两 柴胡(去苗) 秦艽(去苗土) 菱蕤 升麻 百部 枳实(麸炒,去瓢) 玄参 旋复花 马兜铃 百合 紫菀 射干 木香 防风(去叉) 黄芩(去黑心) 栀子仁 大黄(锉,炒) 栝楼实 沙参 贝母(去心) 滑石(研) 凝水石 茵陈蒿 石膏(碎) 知母(切,焙) 青蒿 款冬花 麦门冬(去心,焙) 各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,米饮或酒送下。

【主治】骨蒸热病,诸劳瘵毒,多痰气促,头痛口干,目涩少食,渐渐羸劣。

21241 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】龙胆 枳壳(去瓢,麸炒) 地骨皮 黄芩(去黑心) 甘草(炙,锉) 山栀子仁各一两 鳖甲(去裙襕,醋炙) 各一两半 桃仁(去皮尖双仁,炒) 二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后良久,米饮送下。

【主治】骨蒸羸瘦,经久不愈,邪热留连。

21242 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】龙胆(去芦头,炙) 一两 昆布(洗去咸,炙) 海藻(洗去咸,炙) 各二两 马刀(研) 海蛤(研) 香草各半两 大黄(炒,锉) 一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。绵裹一丸,朝暮含咽之。

【主治】气瘤。

21243 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】龙胆一两 熊胆(研)一分 马牙消(研) 朴消(研) 山梔子(去皮) 玄参 人参 枳壳(去瓢, 麸炒) 柴胡(去苗) 当归(切, 焙) 陈橘皮(去白, 焙)各半两 麝香(研)半钱 沉香半两 甘草(炙, 锉) 赤茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上药除研者外, 捣罗为末, 共研匀, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。一岁一丸, 温化下。

【主治】小儿骨热生风。

21244 龙胆丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】龙胆 地龙粪(炒令干) 乌梅(去核, 炒令干) 龙骨各一两 黄连(去须)二分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如麻子大。一二岁儿每服三丸, 三五岁儿五丸, 食后并用新汲水送下, 一日三次。

【主治】小儿疳痢, 不知行数, 手足逆冷, 或下鲜血, 渴不止。

21245 龙胆丸

【方源】《永乐大典》卷一〇三三引《全要方》。

【组成】黄连 龙胆草各等分

【用法】上为末, 糊为丸, 如小豆大。三岁三十丸, 或作散子, 以浓盐水送下。

【主治】小儿衄血不止。

21246 龙胆丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】龙胆草(去苗) 芦荟(别研) 肉豆蔻(面裹, 煨香) 黄连(去须, 微炒) 木香 神曲(炒黄) 麦蘖(炒)各等分

【用法】上为细末, 煮面糊为丸, 如黍米大。每服三十丸, 温米饮送下, 不拘时候。

【主治】小儿五疳潮热, 面色萎黄, 乳食迟化, 日渐羸瘦。

21247 龙胆丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【异名】龙脑丸(《得效》卷十二)。

【组成】龙胆草 川升麻 苦楝根皮(焙) 防风 赤茯苓 芦荟 油发灰各二钱 青黛(干) 黄连(净)各三钱

【用法】上为末, 猪胆汁浸糕糊丸, 如麻子大。每服二十丸, 食后薄荷、紫苏泡汤送下。仍以芦荟末入鼻。

【主治】①《直指小儿》: 脑疳、脑热、饼疮。②《得效》: 脑疳, 头皮光急, 满头饼疮, 脑热发结, 身汗, 腮肿凶高。

21248 龙胆丸

《局方》卷十(续添诸局经验秘方)。为《直指小儿》卷三“龙胆草丸”之异名。见该条。

21249 龙胆丸

【方源】《医方类聚》卷六十七引《修月鲁般经》。

【组成】草龙胆 当归 黄连各等分

【用法】上锉, 煎熬成膏, 入绿豆粉, 和剂为细条, 以竹刀切剂, 为极细丸, 以筒盛贮。点目。

【主治】眼干。

【备考】加脑、麝尤妙。

21250 龙胆丸

【方源】《普济方》卷一七七引《徐氏家传渴浊方》。

【组成】人参一两 粉草二两(用猪胆一枚取汁浸, 炙尽为度)

【用法】上为末, 加脑子半钱, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二丸, 空心细嚼, 冷白水送下, 噙之亦可。

【主治】消渴。

21251 龙胆丸

《普济方》卷一〇二。即《圣济总录》卷十四“定心龙胆丸”。见该条。

21252 龙胆丸

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】龙胆(研) 麝香(研) 丹砂(研) 牛黄(研) 胡黄连 熊胆 芦荟 丁香 木香 黄连(去须) 大黄(锉) 麒麟竭各一分 蟾酥(研)一钱

【用法】上为细末，再研匀，和饭为丸，如绿豆大。每服三丸至四丸，薄荷汤送下。

【主治】小儿渴痞黄瘦，日饮水无定。

21253 龙胆丸

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】宣黄连（去毛） 赤芍药各半两
草龙胆（去苗） 青皮（去瓢）各二钱半 槟榔一个（大者） 麝香少许

【用法】上为末，猪胆汁少入面糊为丸，如萝卜子大。每服三二十丸，空心米饮送下。

【主治】小儿疳热，食后多发热，或夜则凉。

21254 龙胆丸

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】龙胆草 柴胡 黄芩 鳖甲（醋炙）各一两 桃仁（去皮尖） 山梔子 陈皮 当归（酒洗） 大黄 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心白汤送下。如小儿，减丸数服之。

【功用】解肌骨之热，散滞毒。

【主治】积热劳瘦不食，热壅疮肿。

21255 龙胆丸

【方源】《医统》卷八十九。

【组成】龙胆草 赤茯苓 川黄连 胡黄连 朱砂各二钱 麝香一字

【用法】上为极细末，蒸饼泡为丸，如黍米大。每服二十丸，空腹白汤送下。

【主治】小儿心疳，颊赤面黄，鼻干心燥，口内生疮，惊悸。

21256 龙胆丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】苦参 龙胆草 牛蒡子各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后米泔送下。

【主治】眼两胶粘睛，赤烂成疮。

21257 龙胆水

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】生山龙胆 生艾叶 生少柏各等分

【用法】上药水煎，滤过去滓，再浓煎至如膏为度，收贮。临用少许，和解净水。

【主治】天行眼病。

21258 龙胆汤

【方源】《千金》卷五。

【异名】龙胆散（《圣惠》卷八十二）。

【组成】龙胆 钩藤皮 柴胡 黄芩 桔梗 芍药 茯苓（一方作茯神） 甘草各六铢 蛭螂二枚 大黄一两

【用法】上咬咀。以水一升，煮取五合。服之如后节度。药有虚实，虚药宜足数合水。儿生一日至七日，分一合为三服；儿生八日至十五日，分一合半为三服；儿生十六日至二十日，分二合为三服；儿生二十日至三十日，分三合为三服；儿生三十日至四十日，尽以五合为三服。若日月长大者，以次依此为例，十岁以下小儿皆服之。皆得下即止，勿复服也。

【功用】《金鉴》：清热舒利。

【主治】婴儿发热，呕吐下利，舌上生疮，毛发不泽，脐风，惊痫。

①《千金》：婴儿出腹，血脉盛实，寒热温壮，四肢惊掣，发热，大吐或者。若已能进哺，中食实不消，壮热及变蒸不解，中客人鬼气，并诸惊痫。②《直指小儿》：胎惊，月内气盛发热。脐风，撮口壮热。③《得效》：小儿魅病，下利，寒热去来，毫毛鬓发不悦泽，及妇人有儿，未能行时，复有孕，使儿饮此乳，亦作此病。④《金鉴》：撮口，舌上生疮如黍米状，吮乳不得，啼声渐小，因胎热所致者。

【方论选录】《千金方衍义》：龙胆苦寒，专祛肝旺实热；钩藤、柴胡、黄芩、芍药皆清理二家之匡佐；蛭螂一味，方中罕用，考之《本经》，为小儿惊痫、癰疽之专药，为药中健卒，得大黄为内应，何憚憚丸不克耶；茯苓、甘草用以留中安辑邦畿，尤不可缺。

【备考】《直指小儿》引本方用法：为末。每服一钱，北枣煎服；或加防风、麦门冬以导心热，黄芩减半用。

21259 龙胆汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】龙胆 萎蕤 芍药 黄芩(去黑心) 石膏 麻黄(去根节) 升麻 甘草(炙, 锉) 各三分 葛根(锉) 一两 桂(去粗皮) 大青各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜一枣大(拍碎), 煎至六分, 去滓温服。

【主治】伤寒温病后烦躁。

21260 龙胆汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】龙胆 枳壳(去瓢, 麸炒) 柴胡(去苗) 梔子仁 知母(切, 焙) 地骨皮 木通(锉) 芍药 甘草(炙) 羚羊角(镑) 麦门冬(去心, 焙) 升麻各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 用水一盞半, 煎至一盞, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】伤寒发黄烦热, 皮肉皆黄, 小便赤不利。

21261 龙胆汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】龙胆 黄连(去须) 木通(锉) 柴胡(去苗) 麦门冬(去心, 焙) 人参 各一两 陈橘皮(去白, 焙) 黄芩(去黑心) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 以水一盞, 煎取七分, 去滓, 食后温服, 一日二次。

【主治】胃热, 善食而瘦。

21262 龙胆汤

《圣济总录》卷六十。为《圣惠》卷五十五“龙胆散”之异名。见该条。

21263 龙胆汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】龙胆 秦艽(去苗土) 各一两半 升麻一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盞半, 浸药一宿, 平旦煎至八分, 加黄牛乳五合, 再煎至一盞, 去滓, 空心温服, 一日二次。取利为度。

【主治】阴黄。

21264 龙胆汤

《圣济总录》卷六十。为《圣惠》卷五十五“龙胆散”之异名。见该条。

21265 龙胆汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】龙胆(去苗, 洗) 犀角(镑) 生地黄(洗, 切) 各一两 麦门冬(去心, 生用) 三分 升麻(锉) 甘草(炙) 各半两 牡蛎(慢火炒) 一两半

【用法】上吹咀。每服四钱匕, 水一盞半, 煎至八分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】小便赤涩, 额上汗出, 手足烦热。

21266 龙胆汤

《圣济总录》卷一六七。为《圣惠》卷八十八“龙胆散”之异名。见该条。

21267 龙胆汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】龙胆(去根) 冬葵子 萎蕤 大青 柴胡(去苗) 各一分 赤茯苓(去黑皮) 甘草(炙) 各半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕, 以水半盞, 煎至三分, 去滓, 分三次服, 如人行十里已来一服。

【主治】小儿生四五十日, 服药下后, 身体壮热如火, 伤寒兼腹满, 头面丹肿。此皆内有伏热。

21268 龙胆汤

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】龙胆 当归(切, 焙) 大黄(锉, 炒) 黄芩(去黑心) 栝楼根 甘草(炙) 桂(去粗皮) 人参(切) 牡蛎(熬) 麻黄(去根节) 赤石脂(别研) 芍药各一两

【用法】上为粗末。二三岁儿每服一钱匕, 水一盞, 加大枣一枚(擘), 同煎至五分, 去滓, 分二次温服。

【主治】小儿诸痢, 寒热吐利, 不能乳哺。

21269 龙胆汤

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】草龙胆一两(锉碎)

【用法】水二盏，煮取一盏，去滓，隔宿不食，至五更头顿服。

【主治】蛔虫攻心，其痛如刺，吐出清水。

21270 龙胆汤

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】龙胆不以多少（焙干）

【用法】上为细末。每服一大钱，加猪胆汁三两，空心、临卧，点入温酒少许调服。

【主治】伤寒汗后盗汗不止，或妇人、小儿一切盗汗。

21271 龙胆汤

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】龙胆草（微炒） 钩藤皮 柴胡 北梗 芍药 川芎 茯苓 甘草（炙）各二钱 人参一钱 大黄二钱半（湿纸裹煨）

【用法】上锉散。每服二钱，井水煎服。仍以红纱袋盛夜明砂与儿佩带。

【主治】小儿魃病。

21272 龙胆汤

【方源】《普济方》卷九十六。

【组成】防风 黄连 草龙胆 白僵蚕（炒）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，煎一盏，去滓温服。

【主治】五脏生风发痉，日夜数十发者。

21273 龙胆汤

《普济方》卷二九九。即《圣惠》卷十一“龙胆煎”。见该条。

21274 龙胆汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】草龙胆 生犀角 升麻 茵陈 加山梔 木通 黄连

【用法】水、灯心煎服。

【主治】伤寒时气，瘀血发黄。

【加减】大便实者，加大黄。

21275 龙胆汤

《奇效良方》卷六十。为《卫生宝鉴》卷十二“龙胆泻肝汤”之异名。见该条。

21276 龙胆汤

《赤水玄珠》卷三。为《元戎》“四物龙胆

汤”之异名。见该条。

21277 龙胆汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】黄连 黄芩 梔子 当归 陈皮 胆星各一钱 龙胆草 香附各八分 玄参七分 青黛 木香各五分 干姜（炒黑）二分

【用法】上锉一剂，生姜三片，水煎至七分，加玄明粉三分，痰盛加至五分，食后服。如作丸药，加芦荟五分、麝香二分为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，淡姜汤送下。

【主治】忿怒动胆火，致左耳聋者。

21278 龙胆汤

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】防风 木贼草 密蒙花 蝉蜕 蔓荆子 龙胆草 菊花 黄连 白芷 蒺藜

【用法】水煎服。

【主治】翳膜遮睛。

21279 龙胆汤

《幼幼集成》卷四。为《兰室秘藏》卷八“龙胆泻肝汤”之异名。见该条。

21280 龙胆饮

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】龙胆（去根） 犀角（镑屑）各半两 升麻 天麻（锉，炒） 甘草（炙） 鳖甲（去裙襕，醋浸，炙黄色）各三分 槟榔（煨，锉）一枚

【用法】上为粗末。每服一钱匕，以水半盏，煎至三分，去滓，分三次温服。

【主治】小儿壮热胀满，不饮乳。

21281 龙胆饮

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】龙胆 钩藤（锉） 柴胡（去苗） 黄芩（去黑心） 桔梗（锉，炒） 赤芍药 茯神（去木）各一分 蛭蟥二枚（炙，去足头甲） 大黄（蒸三度，炒）一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一小盏，煎取四分，分数服。

【主治】小儿被客气忤犯，状似惊痫，但眼不上戴，耳后脉急数。

21282 龙胆饮

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【异名】龙胆饮（《普济方》卷三六四）。

【组成】龙胆 钩藤 土瓜根 茯神（去木）各半两 甘草（炙） 桑根白皮（炙） 防风（去叉）各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一盞，加大枣半枚（去核），同煎至六分，去滓，早、晚分二次服。

【主治】小儿肝受病，目昏渐生翳膜，散漫侵睛，因此失明。

21283 龙胆饮

《奇效良方》卷五十七。为《直指》卷二十“龙胆散”之异名。见该条。

21284 龙胆饮

《诚书》卷七。为《保婴撮要》卷四“龙胆饮子”之异名。见该条。

21285 龙胆饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】黄芩 犀角 木通 车前 黄连 黑参各一钱 梔子（炒黑） 大黄 芒消各一钱半 龙胆草 淡竹叶各八分 黄柏（酒炒黑）五分

【用法】水煎。食后分二次热服。

【主治】肝经湿热，目赤肿痛。

【备考】《盘珠集》有知母。

21286 龙胆散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】龙胆半两（去芦头） 麦门冬半两（去心，焙） 知母半两 人参半两（去芦头） 甘草一分（生，锉） 柴胡半两（去苗）

【用法】上为细散。每服二钱，磨犀角温水调下，不拘时候。

【主治】伤寒心脾热，唇干舌肿，口内生疮。

21287 龙胆散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】龙胆三分（去芦头） 葛根一两（锉） 桂心半两 葳蕤三分 赤芍药三分 黄耆三分（锉） 石膏二两 麻黄三分（去

根节） 大青三分 川升麻三分 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盞，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】热病未得汗，体热烦躁。

21288 龙胆散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】龙胆一两（去芦头） 川升麻半两 麦门冬三分（去心） 犀角屑一两 甘草半两（炙微赤，锉） 梔子仁半两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盞，加生姜半分，煎至五分，去滓，加生地黄汁一合，更煎一两沸，不拘时候温服。

【主治】热病黄疸，热渴，额上汗出，手足热，小便赤涩。

21289 龙胆散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【异名】龙胆汤（《圣济总录》卷六十）。

【组成】龙胆一两（去芦头） 木通一两（锉） 土瓜根一两 石膏二两 犀角屑一两 梔子仁一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 茅根一握（锉） 川朴消一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盞，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】急黄。烦躁，渴欲饮水，面目如金色。

21290 龙胆散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【异名】龙胆汤（《圣济总录》卷六十）。

【组成】龙胆二分（去芦头） 甘草三分（炙微赤，锉） 牡蛎一两（烧为粉） 麦门冬三分（去心） 柴胡三两（去苗） 川升麻三分 犀角屑三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盞，煎至五分，去滓，加生地黄汁半合，不拘时候温服。

【主治】劳黄，额上汗出，手足中热，四肢烦疼，薄暮寒热，小便自利。

21291 龙胆散

《圣惠》卷八十二。为《千金》卷五“龙胆汤”之异名。见该条。

21292 龙胆散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】龙胆半两(去芦头) 犀角屑一分 川升麻半两 槟榔一分 川大黄一分(锉碎, 微炒) 甘草一分(炙微赤, 锉) 鳖甲一分(涂醋炙令黄, 去裙襖)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓放温, 渐与服。

【主治】小儿壮热肚胀, 不饮乳。

21293 龙胆散

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】龙胆(去芦头) 木香 熊胆(研入) 蜗牛(炒黄) 芦荟(细研) 夜明砂(微炒) 地龙(微炒) 麝香(细研) 各一分 青黛半两(细研) 朱砂半两 干蟾头一枚(炙令焦黄)

【用法】上为末。每服半钱, 以粥饮调下。更吹少许入鼻中。

【主治】小儿一切疳, 日渐黄瘦。

21294 龙胆散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【异名】龙胆汤(《圣济总录》卷一六七)。

【组成】龙胆一分(去芦头) 钩藤一分 柴胡一分(去苗) 黄芩一分 桔梗一分(去芦头) 赤芍药一分 茯神一分 甘草一分(炙微赤, 锉) 蛭螂二枚(去翅足, 微炒) 川大黄一两(锉碎, 微炒) 人参一分(去芦头) 当归一分(锉, 微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓, 分为二服, 一日三四次。

【主治】小儿百病, 变蒸, 客忤, 惊痫, 壮热不解。

21295 龙胆散

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【组成】龙胆草一两(去头) 铁粉二两

【用法】上为末。每服一钱, 不拘时候, 以

磨刀水调下。

【主治】阳毒伤寒, 毒气在脏, 狂言妄语, 欲走起者。

21296 龙胆散

《圣济总录》卷九十三。即《普济方》卷二三六引《千金》“龙胆丸”改为散剂。见该条。

21297 龙胆散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】龙胆 熊胆(研) 蜗牛(炒令黄) 芦荟(研) 夜明沙(炒) 麝香(研) 各一分 青黛(研) 丹砂(水飞) 各半两 干蟾头(炙焦) 一枚

【用法】上为散。每服半钱匕, 米饮调下。

【主治】小儿疳渴羸瘦。

21298 龙胆散

【方源】《直指》卷九。

【组成】龙胆草 防风各等分(晒干)

【用法】上为末。每服一钱, 临卧温米饮调下。

【主治】盗汗有热。

21299 龙胆散

【方源】《直指》卷二十。

【异名】龙胆饮(《奇效良方》卷五十七)。

【组成】龙胆草 梔子仁各二钱 防风 川芎 玄参 荆芥 山茵陈 甘菊(去萼) 楮实 甘草各一钱

【用法】上为末。每服一钱半, 食后茶清调下。

【主治】肝热, 乌睛浮肿, 赤晕昏疼。

21300 龙胆散

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】龙胆 芦荟 麝香 青黛(各别研) 黄连(去须) 羊子肝(切, 焙) 各等分

【用法】上为细末。每次半钱或一字, 吹鼻中及涂口中。

【主治】小儿干疳, 瘦瘁, 鼻痒口疮。

21301 龙胆散

【方源】《仙拈集》卷一引《蕴要》。

【组成】龙胆草

【用法】上为末。每服二钱，鸡子清、白蜜化凉水送下。

【主治】伤寒发狂。

21302 龙胆煎

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】龙胆一两（去芦头） 黄连一两（去须） 川升麻一两 槐白皮一两 大青一两 苦竹叶五十片 白蜜十盏

【用法】上锉细。都以水三大盏煎，去滓，取汁一盏，入蜜更煎五七沸，放冷，涂于疮上，一日三四次，有涎即吐之。

【主治】伤寒，上焦烦热，口内生疮不止。

【备考】本方方名，《普济方》引作“龙胆汤”。

21303 龙胆煎

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】龙胆一两（去芦头） 黄连一两（去须） 川升麻一两 槐白皮一两（锉） 大青一两 竹叶二两 蔷薇根二两（锉）

【用法】上锉细，以水五大盏，煎至一大盏，去滓，入蜜三合，慢火煎成膏。涂于疮上，有涎吐之。

【主治】热病，口疮发渴，疼痛不可忍。

【备考】方中大青，《奇效良方》作“大黄”。

21304 龙胆煎

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】龙胆 黄连（去须） 黄柏（去皮，蜜炙） 升麻（去土） 苦竹叶（切） 槐白皮 大青各一两 白蜜半合 酥半合

【用法】上药细锉七味如麻豆大，以水三升半，煮取七合，绞去滓，纳蜜及酥，再煎五六沸。每服一匙头，含化咽津，一日五六次。

【主治】喉中疮，并口疮。

21305 龙胆膏

【方源】《普济方》卷一一六引《博济》。

【组成】消梨一个 乌蛇胆一个 冬瓜一枚（截作五寸许，去瓢用）

【用法】掘地可深三尺以来，拂拭令净洁，

置冬瓜于其内，以物载之，安蛇胆、消梨其上，即以土隔截盖之，至三七日看一次，冬瓜未甚坏则候七七日，看蛇胆、消梨、瓜肉浑化为汁，在冬瓜皮内取出一茶匙，以匙头温过，搅酒吃三两。

【主治】大风疾。

21306 龙胆膏

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】龙胆一两 胆矾（研） 乳香（研）各一分

【用法】上药捣研令匀，炼沙糖为丸，如豌豆大。每服一丸，绵裹含化咽津，未愈再服。

【主治】咽喉肿痛，及缠喉风，粥饮难下者。

21307 龙胆膏

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】炉甘石不以多少（拣粉红梅花色者为妙，用甘锅子盛，火煨七次，入黄连，淬七次） 黄连（不以多少，捶碎，以水浸一宿，滤去黄连滓，将煨红炉甘石淬足七次了，同黄连水细研，飞过，候澄在下，去上面水，晒干，再用乳钵，以蜜细嚼，罗过）三钱 龙胆草（不以多少，洗净，晒干，不见火，细研为末）一钱 桑柴灰（罗过）二钱 好黄丹（罗过）半钱

【用法】上药同白蜜四两，一处入在一紫黑瓷器内，文武火慢熬，以竹篦子搅如漆色，不粘手为度。切勿犯生水，仍不可用铁器熬药，药成依旧用瓷器盛。每服如皂角子大，新冷水半盏化开，洗三日不用。每日洗数次无碍。药盏须用纸盖，不可犯灰尘。

【功用】截目赤。

【主治】近年日近翳膜遮障，攀睛瘀肉，连眶赤烂，视物昏暗，不睹光明，隐涩多泪，迎风难开。

【备考】本方方名，《普济方》引作“龙脑膏”。

21308 龙胆膏

《丹溪心法附余》卷十二。为《袖珍》卷三“片脑膏”之异名。见该条。

21309 龙涎丸

【袖珍】卷一。即原书同卷引《圣惠》“龙须散”加诃子，改为丸剂。见该条。

21310 龙涎汤

【方源】《普济方》卷三二〇。

【组成】沉香 木香各一钱（不见火） 人参四钱（不见火） 甘草二钱（炙） 丁香四钱（不见火） 乌药六钱 陈皮七钱（浸，去瓤）

【主治】妇人心腹胀闷呕吐，不思饮食，噎塞。

21311 龙涎散

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】龙骨 密陀僧 花蕊石 黄柏各一分

【用法】上为末。每用少许，干敷上。

【功用】生肌。

【主治】痔漏。

21312 龙涎膏

【方源】《幼幼新书》卷二十引茅先生方。

【组成】阴林下大螺不以多少

【用法】去壳，烂研，入画粉如螺大，加脑少许，滴水为丸，如梧桐子大，悬当风，久愈妙。每服十丸至十四丸，枇杷叶（炙去毛）浓煎汤送下。

【主治】小儿诸渴。

21313 龙宫汤

【方源】《疡科捷径》卷中。

【组成】熟地黄 肉桂 白芥子 麻黄 鹿角霜 干姜

【主治】肾痹。

21314 龙珠丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【异名】龙珠丹（《奇效良方》卷二十四）。

【组成】长蚯蚓不拘多少

【用法】上五月五日取，以龙脑、麝香相和研匀，为丸如麻子大。每用以生姜汁涂鼻中，逐边各纳一丸，立愈。

【主治】头痛目运，及喉痹缠喉风等。

21315 龙珠丹

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】川乌头（炮，去皮脐尖） 虎骨（酒炙） 牛膝（酒浸一宿） 败龟（酒浸，炙） 干蝎（去毒，炒）各一两 香白芷 附子（炮，去皮脐） 枫香脂（研） 踯躅花（去心） 独活（去芦头） 藿香叶（去土） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 麻黄（去根节） 当归（酒洗） 白花蛇（酒炙，取肉） 地龙（去土，炒） 草薢 金毛狗脊（去毛） 天麻（去苗） 川芎 凌霄花 犀角屑 没药（别研）各半两 朱砂（别研） 牛黄（别研）各一分 麝香（别研） 乳香（别研） 龙脑（别研）各一分

【用法】上为细末，研匀，炼蜜为丸，每一两作十五丸，朱砂为衣。每服一丸，细嚼，温酒送下；或病大，可服两丸。如不饮酒，以荆芥茶送下，不拘时候。

【主治】一切中风，左瘫右痪，半身不遂。或颠扑折伤，骨节疼痛，筋脉拘挛，腰脚无力，行步艰难，肢节痛。及头风肩臂疼，并白虎风不可忍者。

21316 龙珠丹

《奇效良方》卷二十四。为《圣济总录》卷十六“龙珠丸”之异名。见该条。

21317 龙珠散

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】真珠五钱（别研） 南硼砂五钱（另研） 乳香五两（另研） 川芎五钱（另研） 荆芥五钱（另研） 雄黄五钱（另研） 炉甘石（桑柴火煅七遍，水飞过）五钱 干菊五钱（另研） 薄荷五钱（另研） 甘草五钱（另研） 干山药五钱（另研） 蔓荆子三钱（另研） 轻粉四钱 粉霜四钱 龙脑四钱 麝香少许

【用法】上药晒，为极细末。点眼。

【功用】截赤定痛。

【主治】眼目病。

21318 龙珠散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】珍珠末 冰片各等分

【用法】敷之。

【主治】热甚舌出不收。

21319 龙珠膏

【方源】《医学正传》卷六。

【组成】龙芽草五两 棘枣根五钱 海藻二钱五分 苏木五钱

【用法】上切细，量水二十碗，煎至十二三碗，滤去滓。又用桑柴灰二碗半、石灰二碗半、苍耳草灰二碗半，以草纸二层，皮纸二层，放罗底，次置灰于上，用煎汤热淋，取灰汁十碗许澄清，入锅内煎成膏，用巴豆霜、白丁香、石膏、麝香、轻粉，瓷罐子收贮。每用取敷核上，再敷即去旧药并腐，再上新药，其核即溃而愈。根小者，但只涂药于根上，其核自溃。若瘰癧自溃者，其核犹存，先用铁烙烧赤，烙去破核犹存者并肉溃处，次用本膏。

【主治】瘰癧。

21320 龙珠膏

【方源】《四圣心源》卷六。

【组成】川椒五钱 附子五钱 乌头五钱 巴豆三钱（研去油） 桂枝五钱 茯苓八钱 牡蛎五钱 鳖甲五钱

【用法】芝麻油、黄丹熬膏，加麝香、阿魏研细，布摊贴病块。

【主治】奔豚已结气块，坚硬。

21321 龙盐膏

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】盐 龙脑 蓬砂（研） 马牙消（研） 硃砂（研，飞过） 蕤仁各一分 杏仁（去皮尖双仁）二七枚

【用法】上为细末，再同研匀，以生蜜和，稀稠得所，新瓷合盛。用竹箸卧点眼。

【主治】沙土入眼，痛不可忍，肿赤者。

21322 龙射丸

《外科大成》卷二。为原书同卷“内塞散”之异名。见该条。

21323 龙脂丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】诃子 肉豆蔻 黄连 龙骨 当归 赤石脂 缩砂 木香各一两 草豆蔻 白矾 干姜各半两

【用法】上为细末，粟米饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】脾胃虚弱，或停冷结聚，变成脓血痢。

【宜忌】忌油腻、鸡肉、猪肉等。

21324 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】龙脑半两（研入） 犀角屑半两 秦艽半两（去苗） 防风半两（去芦头） 麻黄一两（去根节） 汉防己半两 天雄半两（炮裂，去皮脐） 茵芋半两 甘菊花半两 赤箭一两 独活半两 白僵蚕半两（微炒） 桂心半两 芎藭半两 当归半两（锉，微炒） 羚羊角屑半两 鹿角胶半两（捣碎，炒令黄燥） 乳香半两（研入） 乌蛇一两半（酒浸，去皮骨，炒令黄） 干蝎半两（生用） 牛黄一分（研入） 麝香一分（研入） 朱砂一分（研入）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以薄荷温酒送下，不拘时候。

【主治】肝脏中风，口眼不正，四肢抽掣，语涩昏沉。

21325 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】白龙脑一分（细研） 朱砂半两（细研） 琥珀半两（细研） 牛黄一分（细研） 雄黄半两（细研） 附子三分（炮裂，去皮脐） 天麻一两 白僵蚕一两（微炒） 麝香一分（细研） 安息香一两（用酒半升煎成膏） 玳瑁三分（细研）

【用法】上为末，入研了药，都研令匀，用安息香膏为丸，如梧桐子大。每服七丸，不拘时候，以温酒送下。

【主治】卒中风，心神烦闷，肢节拘急疼痛。

21326 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】龙脑一两(细研) 麝香一分(细研) 干蝎半两(微炒) 天南星一两(炮裂) 朱砂半两(细研) 阿胶半两(捣碎，炒令黄燥) 香墨半两 白附子半两(炮裂) 蝉壳一分 防风半两(去芦头) 羚羊角屑半两 肉桂半两(去皱皮) 羌活半两 乌蛇肉三分(酒浸，炙令微黄) 牛黄一分(研入)

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，不拘时候，以温酒送下。

【主治】中风，身如角弓反张，不语昏闷。

21327 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】龙脑二分(细研) 麝香一分(细研) 雄黄一两(细研，水飞过) 硫黄一两(细研，水飞过) 朱砂一两(细研，水飞过) 铅霜半两(细研) 天麻二两 防风二两(去芦头) 独活一两 桂心一两 白附子一两(炮裂) 天南星一两(炮裂) 阿胶一两(捣碎，炒令黄燥) 木香一两 人参一两(去芦头) 半夏半两(汤浸七遍去滑) 香墨半两

【用法】上为末，都研令匀，用肥皂荚二斤，去黑皮，以水五升浸软，绞滤取汁，于银锅中慢火熬，稀稠得所，和前药末为丸，如绿豆大。每服十丸，不拘时候，以温酒化下，服后别吃一盏热葱酒，令有汗出。至重者并三五服愈。

【主治】急风，四肢拘急，口眼不正，言语蹇涩。

21328 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】龙脑一分(细研) 雄黄一分(细研) 麝香一分(细研) 朱砂半两(细研，水飞过) 牛黄一分(细研) 乳香半两

(细研) 川乌头一两(去皮脐，生用) 干蝎半两(微炒) 白僵蚕半两(微炒) 天麻一两 天南星一分(炮裂) 羌活一两 踯躅花一分(酒拌，炒干) 白附子三分(炮裂) 附子一两(去皮脐，生用) 白花蛇一两(酒浸，去皮骨，炙令微黄) 麻黄五两(去根节，捣碎，以酒五升，煎取一升，去滓，熬成膏) 安息香半两

【用法】上为末，研入前六味令匀，用麻黄膏为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以温酒送下。

【主治】中风，偏枯不遂，肢节疼痛，行步艰难。

【宜忌】忌生冷、羊血、油腻、毒滑、鱼肉。

21329 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】龙脑三分(细研) 麝香半两(细研) 真珠一分(细研) 琥珀一分(细研) 牛黄半两(细研) 雄黄半两(细研) 犀角屑三分 人参三分(去芦头) 白茯苓一分 羌活三分 白花蛇肉一两半(酒浸，炙令微黄) 膩粉一分 白附子半两(炮裂) 独活半两 晚蚕蛾三分(微炒) 附子半两(炮裂，去皮脐) 蔓荆子半两 防风三分(去芦头) 乌蛇肉一两(酒浸，炙微黄) 麻黄半两(去根节) 白僵蚕半两(微炒) 干蝎一两(微炒) 天麻一两半 芎藭一分 槟榔一分 白蒺藜半分(微炒去刺) 半夏一分(汤洗七遍去滑) 零陵香半两 藿香一分 丁香三两 朱砂一分(细研) 乳香半两(细研) 羚羊角屑半两 沉香半两 木香半两

【用法】上为末，入研了药都研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以温酒送下；薄荷汤送下亦得。

【主治】一切风。

【宜忌】忌猪、鸡肉，毒滑动物风。

21330 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】龙脑一分(细研) 雄黄半两(细研) 朱砂二分(细研) 麝香一分(细研) 阿胶一分(捣碎,炒令黄燥) 丁香一分 天南星一分(炮裂) 好墨半两 牛黄三分(细研) 天竺黄一分(细研)

【用法】上为末,都研令匀,取三月三日,以木蜜和丸,如豇豆大。每服一丸,以热酒研服之。

【主治】一切风。

21331 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】龙脑一分(细研) 麝香一分(细研) 朱砂半两(细研) 天南星一分(炮裂) 白附子一分(炮裂) 半夏一分(汤洗七遍,去滑) 甘草一分(炙微赤,锉) 附子半两(炮裂,去皮脐) 川乌头一分(炮裂,去皮脐)

【用法】上为末,以糯米粥为丸,如绿豆大。每服三丸,以温酒送下。

【主治】一切风。

21332 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】龙脑一分 白芍一两(捣罗为末)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如鸡头子大。常含一丸,咽津。

【主治】咽喉肿痛。

21333 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】龙脑一钱(细研) 牛黄一钱(细研) 朱砂半两(细研,水飞过) 赤茯苓一两 羚羊角屑半两 犀角屑半两 麦门冬一两半(去心,焙)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,不拘时候,以温水送下。

【功用】通津液,利咽喉。

【主治】脾肺壅热,咽喉不利。

【备考】《普济方》有人参一两。

21334 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】龙脑半两 朱砂半两 牛黄半两 硃砂半两 麝香一钱 马牙消一分

【用法】上为细末,用大羊胆一枚,取汁为丸,如梧桐子大,铺于纸上令干,收于瓷器中。如患者,将一丸擘为两片,安在两边鼻内。良久,吐出恶物即愈。

【主治】咽喉风毒,及急喉闭肿痛,汤饮不得下。

21335 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙脑一分(细研) 丁香一分(末) 朱砂一分(细研) 麝香一分(细研) 蟾酥半分(研入) 牛黄一分(细研) 犀角末一分 雄黄一分(细研) 天竺黄一分(细研)

【用法】上为末,用猪胆一枚,别入黄连末一分,入在猪胆内,系却,以浆水一碗,入铫子内煮尽取出,与药末和丸,如黍米大。一二岁儿每次一丸,以温水送下。欲吃,先用一丸研破,吹入鼻内。得嚏为效。

【主治】小儿慢惊风及疳热。

21336 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙脑(细研) 雄黄(细研) 芦荟(细研) 丁香 牛黄(细研) 木香 犀角屑 铅霜(细研) 天浆子 胡黄连 蝎尾(微炒) 白花蛇(酒浸,去皮骨,炙微黄) 各一分 蟾酥半分(研入)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,以桃仁汤研下。

【主治】小儿急惊风,身热口渴,四肢抽搐。

21337 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙脑半分(细研) 朱砂一两(细研,水飞过) 铅霜半两(细研) 铁粉二两(细研) 人参三分(去芦头) 龙齿二两(细研)

【用法】上为末,入研了药,同研令匀,炼

蜜为丸，如麻子大。每服五丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】小儿惊痢烦热，眠卧不安。

21338 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】龙脑一钱（细研） 麝香半钱（细研） 牛黄一钱（细研） 雄黄一钱（细研） 天竺黄一分（细研） 胡黄连一分 芦荟一钱（细研） 熊胆一钱（研入） 青黛一钱（细研） 膩粉半钱（研入） 蟾酥半钱（研入） 朱砂一分（细研） 蜗牛三七枚（微炒） 雀儿饭瓮一分

【用法】上为末，同研令匀，以水浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服三丸，以薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】小儿惊疳，心神烦躁，体热瘦瘁，眠卧不安。

21339 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】龙脑一钱（细研） 麝香一钱（细研） 蟾酥半钱（研入） 金箔十四片（细研） 膩粉半钱（研入） 天竺黄（细研） 犀角屑 胡黄连 甜葶苈（隔纸炒令黄色） 干蝎（微炒）各半两 牛黄（细研） 雄黄（细研） 熊胆（细研） 芦荟（细研） 天浆子（微炒） 真珠末（研入） 朱砂（细研） 青黛（细研） 田父（炙微黄） 土蜂窠各一分

【用法】上为末，以糯米饭为丸，如绿豆大。每服三丸，以薄荷汤送下，汗出并吐出涎为效。三岁以上加丸服之。

【主治】小儿惊疳，心热搐搦，胸膈多涎，不食。

21340 龙脑丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】龙脑一钱 牛黄一分 麝香一钱 朱砂一分 熊胆一分 芦荟一分 干虾蟆灰一分 雄黄一分 胡黄连末一分

【用法】上为细末，以水化熊胆为丸，如麻

子大。若硬，更入糯米饭同丸。每服三丸，用薄荷温汤送下，一日三次。

【主治】小儿脑疳，羸瘦烦热。

21341 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】龙脑（研） 白花蛇（酒浸，去皮骨，炙） 白附子（炮） 白僵蚕（炒） 半夏（汤浸，生布洗七遍，为末，姜汁作饼，晒） 天麻 干姜（炮裂） 干蝎（酒炒） 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙） 膩粉 麝香（入龙脑、膩粉同研）各半两

【用法】上除研药外，为细末，与研药和匀，酒煎槐胶为丸，如麻子大。每服五丸至十丸，豆淋酒送下，日三夜一，不拘时候。

【主治】中急风。

21342 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】龙脑（研） 丹砂（研） 马牙消（研）各一分 麝香（研）半钱

【用法】上药再同研令匀细，于碟内盛，用羊胆滴汁入药中，旋和成丸，如黑豆大，以净合盛。每用一粒，以芦管吹入鼻中，以手小指送近上，两鼻皆如此。去枕仰卧少时，候药溶入脑，涎唾从喉内出，其病立愈。

【主治】头痛头眩眼花，及喉痹缠喉风等。

21343 龙脑丸

《圣济总录》卷二十八。为《幼幼新书》卷十八引《灵苑方》“龙脑膏”之异名。见该条。

21344 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】龙脑一字 铅白霜（研）一分 甘草（炙，锉）半两 凝水石（用火烧令通赤，研）一分

【用法】上为细末，用烧饭为丸，如梧桐子大。每服含化三丸至五丸。

【主治】热痰，咽干烦渴。

21345 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】龙脑（研）三钱 丹砂（研）一两 白矾（熬令汁枯）半两 半夏（汤洗七遍去

滑，阴干为末）三兩

【用法】上为末，生姜自然汁煮面糊为丸，如豌豆大。每服十五丸，食后、临卧温水送下。

【主治】膈痰结实，咽喉不利。

21346 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】龙脑（细研）一钱 诃黎勒皮半兩 皂荚（炙令黄色，去皮子）一挺

【用法】上药先捣诃黎勒皮、皂荚为细末，次入龙脑同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次七丸，空腹煎贝母汤送下，日二夜一。

【主治】多年上气咳嗽。

21347 龙脑丸

《圣济总录》卷九十三。为原书同卷“青蒿丸”之异名。见该条。

21348 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】白龙脑二兩（用鼎盛水五升，入龙脑并糯米五十粒，以石灰泥固济鼎口，文火煮半日，候冷取出，研如粉） 真珠二兩（先用大纸二张，以皂荚津渍过，为贴盛之，又用帛裹定，入粟糠五斗，安甑中蒸一昼夜后，取捻得破，即研如粉，晒干） 雄黄一两（研如粉） 丹砂二兩（形如芙蓉者，研如粉，并雄黄粉同入银锅中，用醋三升，以文火煮一复时出之，却以温水淘去醋味，晒干） 琥珀二兩（拾得芥子者，捣研如粉）

【用法】上五味，共九兩，和匀，内留三兩，每夜临卧漱口了，揩齿咽津。余六兩再用白面四兩作饼子，纸二张裹，煨熟，取出研细，与前药六兩炼蜜为丸，如梧桐子大。每日空心取两丸含化咽津，后饮温酒三五合。

【功用】长发令黑。

【主治】诸风白屑。

【加减】若年四十以上，更加白龙骨一两，研如粉，以水飞过，晒干，帛裹蒸一饭久，次入桑螵蛸一两，煨熟捣末，并前药末，同以炼蜜为丸。

21349 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】龙脑（研） 升麻 甘草 马牙消（研）各一分 玄明粉（研）三分 麝香（研） 石膏（碎） 大黄（锉） 黄耆（锉）各一分 生地黄二兩（绞取汁）

【用法】上药除地黄汁外，捣罗为末，以地黄汁和，如干，更入炼蜜少许，为丸如小弹子大。用绵裹，含化咽津，一日四五次，不拘时候。

【主治】咽喉连颊颌肿，日数深远，咽津液热，发渴疼痛。

21350 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】龙脑一分 丹砂一钱 芒消半兩 麝香半钱

【用法】上为细末，用鲤鱼胆汁为丸，如绿豆大。鼻两孔各纳一丸。良久，牙关开，涎出愈。

【主治】缠喉风。

21351 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】龙脑 麝香 芦荟 熊胆 膩粉各半钱（研） 胡黄连 使君子 青黛（研）各一钱 香墨半兩（研）

【用法】上药捣罗胡黄连、使君子为末，余研极细，滴水为丸，如梧桐子大。每服二丸，煎金银薄荷汤磨下。经宿取恶物便安。

【主治】小儿慢惊风，潮发。

21352 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】龙脑（研） 麝香（研） 丹砂（研） 牛黄（研） 胡黄连 熊胆（研） 芦荟（研） 丁香 木香 黄连（去须） 大黄（锉） 麒麟竭各一分 蟾酥（研）一钱

【用法】上为细末，再研匀，饭为丸，如绿豆大。每服三九至四九，薄荷汤送下。

【主治】小儿疳渴黄瘦，日夜饮水不足。

21353 龙脑丸

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】龙脑(研)半钱 白矾(铍子内炼沸泣尽汁为度,研) 玄明粉一钱 蝉壳三十枚(去足,炒,研末) 牛黄(研)半字 蛇蛻皮一条(长二尺,铁器上焙焦,研为末)

【用法】上药再一处研细,加沙糖少许为丸,如梧桐子大。冷水化破一丸服之。

【主治】小儿风热,咽喉肿塞生疮,摇头烦闷及虫咬心痛。

21354 龙脑丸

【方源】《续本事》卷二。

【组成】龙脑薄荷五两 真蒲黄一两 麦门冬二两 阿胶一两 甘草一两半 人参一两 川当归一两 黄耆一两半 木通一两 生干地黄三两 柴胡半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸。病上焦,饭后用熟水吞下,微嚼破更好;病下焦,空心服。小儿加减与之。

【主治】胸中郁热,肺热咳嗽,口臭喉腥,脾疸口甘,丈夫吐血,妇人血崩。

【备考】方中生干地黄用量原缺,据《普济方》补。

21355 龙脑丸

【方源】《宣明论》卷四(千顷堂本)。

【异名】当归龙荟丸(《丹溪心法》卷四)、龙荟丸(《医方类聚》卷一九七引《新效方》)。

【组成】当归(焙) 龙胆草 大梔子 黄连 黄柏 黄芩各一两 大黄 芦荟 青黛各半两 木香一分 麝香半钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大,小儿如麻子大。每服二十丸,生姜汤送下,兼服防风通圣散。

【功用】①《宣明论》:常服宣通血气,调顺阴阳。②《中国药典》:泻火通便。

【主治】肝胆实火,头痛而赤,目赤晕眩,胸胁疼痛,惊悸抽搐,甚则躁扰狂越,便秘尿赤,或肝火犯肺之咳嗽。现用于慢性粒细胞性白血病,及胆道蛔虫病。

①《宣明论》:肾水阴虚,风热蕴积,时发惊悸,筋惕搐弱,神志不宁,荣卫壅滞,头目昏眩,肌肉暗瘰,胸高痞塞,咽嗑不利,肠胃燥涩,小便溺闭,筋脉拘奇;肢体痿弱,暗风痼病;小儿急慢惊风。②《医方考》:肝移热于肺,咳嗽而两肋痛,多怒脉弦者。③《景岳全书》:肝经实火,大便秘结,小便涩滞,或胸膈作痛,阴囊肿胀。及一切躁扰狂越,惊悸不宁等证。

【宜忌】①《宣明论》:忌发热诸物。②《医方集解》:非实火者不可轻投。

【方论选录】①《医方考》:《经》曰:狂言为失志;又曰:肾藏志。如斯言之,则肾亦火矣。此一水不胜五火之谓也。故用黄连以泻心,用黄芩以泻肺,青黛、龙胆、芦荟以泻肝,大黄以泻脾,黄柏以泻肾。所以亟亟以泻五脏之火者,几于无水,故泻火以存水耳!用当归者,养五脏之阴于亢火之时;用木香、麝香者,利五脏之气于克伐之际也。咳嗽而两肋痛,多怒,脉弦者,病原于肝也。肝者将军之官,气常有余,气有余便是火,故宜泻之。是方也,芩、连、梔、柏、草龙、青黛、大黄、皆能泻火,而未必入肝;肝气躁,诸药得芦荟、麝香之躁,同气相求,可以入肝而平肝矣。然肝木为生火之本,而诸脏之火不无相扇,诸药虽因芦荟、麝香之引而入肝,然其性各有所属,则能兼五火而治之矣。用当归为君者,以其能和五脏之阴,以木香为佐者,以其能行诸药之滞也。②《医方集解》:此足厥阴、手足少阳药也。肝木为生火之本,肝火盛则诸经之火相因而起,为病不止一端矣。故以龙胆、青黛直入本经而折之;而以大黄、芩、连、梔、柏通平上下三焦之火也。芦荟大苦大寒,气躁入肝,能引诸药同入厥阴,先平其甚者,而诸经之火无不渐平矣。诸药苦寒已甚,当归辛温,能入厥阴,和血而补阴,故以为君。少加木香、麝香者,取其行气通窍也。

【临证举例】①慢性粒细胞型白血病 《四

川中草药通讯》(1972; 3: 25); 报告以本方治疗慢性粒细胞型白血病 31 例, 其中 20 例既往未曾用过化疗, 其余 11 例为化疗后复发病例。治疗结果: 缓解者 17 例, 进步 8 例; 无效 6 例。多数患者服药后至开始发挥疗效的时间约需 1 个月。17 例缓解病例缓解期为 1 个月~1 年以上, 平均 5.6 月。作者认为本病当属实证, 实则泻之, 故用泻肝法。本方常见副作用为腹痛、腹泻、恶心, 但无一例发生血小板下降及骨髓抑制。②癫狂 《中医教育》(1977; 4: 51); 以本方改为汤剂, 并用石菖蒲代替方中麝香, 治疗狂症四例。其中男性 2 例, 女性 2 例。结果均获治愈。作者指出: 本方治实证之狂病有釜底抽薪之妙, 见效甚捷, 但方中均为峻猛寒药, 非实热者不可妄用。临床当以脉象洪实、舌红、苔黄、大便秘结为应用指征。③胆道蛔虫病 《浙江中医杂志》(1965; 7: 20); 以本方加牙皂二钱, 改为汤剂煎服 (其中麝香半分另调服)。治疗胆道蛔虫病 15 例。结果全部治愈。追踪观察 3~8 个月, 无 1 例复发。作者认为本方具有清热燥湿, 通利窍, 行气止痛, 利胆杀虫, 并具有促进虫体排出之作用。

【备考】本方方名, 原书(四库本)作“当归龙胆丸”。

21356 龙脑丸

【方源】《宣明论》卷四。

【组成】龙脑 朱砂 硼砂 牛黄各等分

【用法】上为末, 溶黄蜡为丸, 如米粒大。每服三五丸, 炙甘草、人参汤送下, 不拘时候。

【主治】大小人一切蕴结热毒气不散, 及失瘡、癰疹。

21357 龙脑丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】铅白霜一钱 绛矾一钱半(生) 朱砂(别研) 天南星(姜汁浸三日) 各半钱

【用法】上为细末, 水浸蒸饼为丸, 如梧桐

子大。每服一丸, 薄荷汤送下。一月小儿服半丸。

【功用】坠痰。

【主治】小儿惊风。

21358 龙脑丸

《得效》卷十二。为《直指小儿》卷三“龙胆丸”之异名。见该条。

21359 龙脑丸

【方源】《普济方》卷一六七。

【组成】草龙脑 白矾(烧沸定) 各四两 天南星二两 半夏二两半(水浸, 切作片, 用浆水、雪水一钟半同煎三五沸, 焙干, 各称二两)

【用法】上为细末, 面糊为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食后、临卧腊茶清送下。

【功用】解暴热, 化痰凉膈, 清头目。

【主治】热痰壅膈, 头目眩重; 岭南瘴气, 意思昏闷; 咽喉肿疼, 口舌生疮。

21360 龙脑汤

【方源】《医方类聚》卷一六五引《御医撮要》。

【组成】缩砂八两 甘草六两

【用法】上为细末。每以半钱, 如茶点进。

【功用】醒酒消食。

21361 龙脑饮

《普济方》卷三六四。为《圣济总录》卷一八一“龙胆饮”之异名。见该条。

21362 龙脑饮

《中国医学大辞典》。即《局方》卷六“龙脑饮子”。见该条。

21363 龙脑粉

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】龙脑一钱 粟米粉五两

【用法】上为细末。先用枣叶汤洗, 后用绵搵扑之。

【主治】痒疮痒痛。

21364 龙脑散

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】龙脑一分(细研) 犀角屑半两 羚羊角屑半两 人参一两(去芦头) 防风

半两(去芦头) 白芷半两 独活一两 白僵蚕半两(微炒) 麻黄一两(去根节) 芎藭一两 天麻(锉) 伏神半两 桂心三两 天门冬一两(去心,焙) 牛膝一两(去苗) 藿香半两 桑螵蛸半两(微炒) 甘菊花半两 白附子半两(炮裂) 干蝎半两(微炒) 牛黄一分(细研) 麝香一分(细研) 朱砂半两(细研)

【用法】上为细散,入研了药,更研令匀。每服二钱,以温酒调下。

【主治】一切风。

【宜忌】忌毒滑、动风物。

21365 龙脑散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】龙脑一分(细研) 牛黄一分(细研) 朱砂一分(细研) 天竺黄半两(细研) 赤芍药半两 玄参半两 犀角屑一两 羚羊角屑一两 细辛一分 甘菊花半两 车前子半两 决明子半两 胡黄连半两 柴胡半两(去苗) 川升麻半两 川大黄一两(锉碎,微炒) 甘草三分(炙微赤,锉)

【用法】上为细散,都研令匀。每服一钱,食后煎竹叶汤调下。

【主治】肝脏风热,眼目赤烂肿痛。

【宜忌】忌炙燥、热面、毒滑、鱼肉。

21366 龙脑散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】龙脑一钱 川朴消半两

【用法】上为细末。每以铜箸取如黄豆大点眼。

【主治】眼生花翳。

21367 龙脑散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】龙脑一分 石膏二两(细研,水飞) 滑石半两 朱砂一分 礞砂一分

【用法】上为细散。每服半钱,不拘时候,以新汲水调下。绵裹含咽津亦得。

【主治】咽喉闭塞疼痛。

21368 龙脑散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】龙脑一分(细研) 朱砂三分(细研) 犀角屑三分 真珠末半两(研) 白药二分 马牙消一两(细研) 黄耆半两(锉) 甘草半两(生,锉)

【用法】上为细散,都研令匀。每服二钱,不拘时候,以新汲水调下。

【主治】咽喉内卒肿痛。

21369 龙脑散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】白龙脑(细研) 牛黄(细研) 犀角屑 羚羊角屑 马牙消(细研) 玄参 沉香 朱砂(细研) 甘草(炙微赤,锉) 各一分 川升麻半两 礞砂一钱(细研)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加竹叶七片,煎至六分,去滓,入马牙消一钱,搅令匀,细细含咽。

【主治】马喉痹,颊肿咽痛。

21370 龙脑散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】龙脑一钱(细研) 膩粉一钱 寒水石半两 白茅根半两(锉) 黄连半两(去须) 马牙消半两 滑石半两 木通半两(锉) 伏龙肝半两(细研)

【用法】上为细散。每服一钱,煎竹叶汤调下,如人行十里再服。

【主治】血淋,心神烦躁,水道中涩痛,不得眠卧。

21371 龙脑散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】龙脑三分 牛黄三分 雄黄三分 铅霜三分 铁粉一两 朱砂一两 麝香三分(以上并细研) 天南星半两(炮裂) 天麻一两 麻黄一两(去根节) 莽草二分 白僵蚕半两(微炒) 干蝎半两(微炒) 白附子半两(炮裂) 桂心半两 乌蛇肉一两(酒拌,炒令黄) 防风半两(去芦头) 柏子仁半两 蝉壳半两(微炒) 独活半两 白胶香半两 仙灵脾半两 天雄半两(炮裂,去

皮脐) 桑螵蛸半两(微炒) 羚羊角屑半两 阿胶三分(捣碎,炒令黄燥) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为细散,入研了药令匀。每服一钱,不拘时候,以薄荷酒下。

【主治】妇人中风,身强口噤,四肢不利,言语蹇涩,心神昏愤。

21372 龙脑散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】白龙脑一分(研入) 河黎勒皮半两 人参一两(去芦头) 丁香半两 肉豆蔻半两(去壳) 藿香半两 茅香花半两 沉香三分 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为细散,研入龙脑令匀。每服一钱,不拘时候,以温酒调下;生姜粥饮下亦得。

【主治】妇人脾胃虚弱,胸膈气滞,吐逆不止。

21373 龙脑散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】龙脑(细研) 膩粉 干蝎(微炒) 白矾灰各一分 天麻 天雄(炮裂,去皮脐) 天南星(用酒一升,微火煮令酒尽,取出,切,晒干) 天竺黄各一两

【用法】上为末,都入乳钵中,再研令匀。每服一钱,不拘时候,以暖酒调下。

【主治】产后中风口噤,身体如角弓反张,迷闷。

21374 龙脑散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】龙脑一钱(细研) 牛黄一钱(细研) 黄连一分(去须) 犀角屑 羚羊角屑 琥珀末 甘草(炙微赤,锉) 真珠末 铁粉(细研) 各半两

【用法】上为细散。每服半钱,用蜜水调下。

【主治】小儿壮热,心神烦躁,夜卧狂语。

21375 龙脑散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙脑半钱(细研) 麝香半钱(细

研) 甘草一分(炙微赤,锉) 牛蒡子一分(微炒) 梔子仁一分 牛黄半分(细研) 马牙消一分(细研) 郁金一分

【用法】上为细散。每服半钱,不拘时候,以温薄荷汤调下。

【主治】小儿惊热,心烦不得睡卧。

21376 龙脑散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】龙脑半两(细研) 雄黄一分(细研) 麝香一分(细研) 芦荟一分(细研) 胡黄连一分 青黛一分(细研) 木香一分 丁香一分 牛黄一分(细研) 天竺黄一分(细研) 熊胆一分 犀角屑一分 干蝎一分(生用) 膩粉一分 朱砂一分(细研)

【用法】上为细散,同研令匀。每服半钱,不拘时候,薄荷汤调下。

【主治】小儿慢惊风,心胸痰涎上攻,咽喉如哑,身体壮热,筋脉拘急,或时发渴抽掣。

21377 龙脑散

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】龙脑(细研) 黄连(去须) 蚬蛸(微炒) 天麻 熊胆(研入) 麝香(细研) 牛黄(细研) 蜗牛(炒令微黄) 蚺蛇胆(研入) 蓝叶 川大黄(锉,微炒) 雄黄(细研) 五灵脂 马兜铃 朱砂(细研) 各一分

【用法】上为细散,入研了药令匀。每服半钱,以温水调下。

【主治】小儿风疳,日渐羸瘦,多睡壮热,面色青黄,或时吐乳。

21378 龙脑散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】龙脑一两(细研) 梔子仁 黄芩 麦门冬(去心,焙) 地骨皮 川升麻 犀角屑各半两 牛黄一分(细研) 川大黄一两(锉,微炒) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为细散。每服半钱,食后以温水调下。五岁以下可服一字。

【主治】小儿肝脏壅热，两眼赤痛。

21379 龙脑散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】龙脑半钱（细研） 瓜蒂十四枚 赤小豆三十粒 黄连二大茎（去须）

【用法】上为散，入龙脑研令匀。每夜临卧时，以绿豆大吹入鼻中。每用有少许清水出为效。

【主治】小儿鼻痈，不闻香臭。

21380 龙脑散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】龙脑（研） 马牙消各半钱 绿豆粉一钱

【用法】上为极细末。用灯心粘药点眼，一日四五次。

【主治】睛漏疮，目大眦出脓汁，有窍。

21381 龙脑散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】龙脑（研）一分 蔓荆实 细辛（去苗叶） 升麻各一两

【用法】上药捣三味为细散，入龙脑拌匀。每用半钱匕，揩牙良久，以温汤漱口。

【功效】去口气，辟风冷。

【主治】牙齿疼痛，龈间出血。

21382 龙脑散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】龙脑（研）一钱 鸡苏（去梗，焙干） 荆芥穗一两半 白豆蔻（去皮）一分 甘草（炙，锉）一两

【用法】上为细散。每用半钱匕，温水调下。合时且各自贮之，临用旋合和，气味尤全。

【主治】喉热干燥，津液不足。

21383 龙脑散

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】龙脑（研）半钱 马牙消一分（入合子内固济，火煨通赤，先掘一地坑子，甘草水泼冷，湿纸衬药入坑子内，荫一宿，取研） 丹砂（研）一钱 干蝎（微炒，研）七枚

【用法】上为细散。每服半钱匕或一字，煎

人参、茯苓汤调下。惊热者，冷水下；热甚者，冷水研生地龙汁调下。

【主治】小儿壮热不解，及惊热风热。

21384 龙脑散

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】龙脑 牛黄 丹砂 地龙（去土取末） 麝香 乳香 雄黄各一钱（研） 鯪鲤甲五片（烧灰） 紫草半两 甘草（生，锉）二两 木猴梨五十枚（切，焙）

【用法】上为散，用猪尾上血拌匀，入在竹筒子内，用油单封裹，线缠定，于深坑子内，调稀猪粪浸二七日，取出净洗。每服一皂子大，龙脑水化下。并三服见效。

【主治】小儿出疮子不透，旋出旋焦者。

21385 龙脑散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】龙脑（研） 麝香（研） 白附子（微炮） 牛黄（研） 天麻 白僵蚕（直者，炒） 干蝎（炒） 乌蛇肉（酒浸，焙）各一分 麻黄（去节）半两 天南星（微炒）二钱

【用法】上药除龙脑、麝香、牛黄同研令匀外，余捣碎不罗，用新水一盞浸一复时，冬月浸两复时，生绢滤药汁，和寒食白面为丸，如大皂子大，阴干，捣罗为散，入前三味，再同研匀。每服一字匕，薄荷汤调下。

【功用】化涎解热。

【主治】小儿胎风，及慢惊眼涩多睡。

21386 龙脑散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】龙脑 芦荟 麝香 青黛（各别研） 黄连（去须，捣末） 羊子肝（切，焙，捣末）各等分

【用法】上为细末和匀。每服半钱或一字，吹鼻中及涂口中。

【主治】小儿干疳瘦瘁，鼻痒口疮。

21387 龙脑散

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】龙脑半钱 铅霜 滑石各一分

【用法】上各研为细末，和匀。每用一字掺疮上。吐涎愈。

【主治】乳石发动，口舌生疮。

21388 龙脑散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】大黄（蒸） 甘草 半夏（汤洗，薄切，用姜汁浸一宿，焙干，炒） 金星石 禹余粮 不灰木 青蛤粉 银星石 寒水石 各等分

【用法】上为细末，研入龙脑一字，再研匀。每服一字至五分，新水调下。

【功用】通解诸毒。

【主治】小儿急慢惊风。

【加减】治药毒吐血，加甘松枝三两，藿香叶末一钱，金芽石一分，减大黄一半。

21389 龙脑散

【方源】《卫生总微》卷二十。

【组成】龙脑一分（研） 黄柏半两（末） 白面二两 腊茶一两（研末）

【用法】上拌匀。每以新绵温药扑上，破者敷之。

【主治】痈疮。

21390 龙脑散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】鲫鱼一条（破开去肠肚，入谷精草，填满，烧存性）

【用法】上为细末。入脑子并蜜调敷之。

【主治】痔疮热痛。

21391 龙脑散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】龙脑薄荷 僵蚕（直者，炒去丝） 川芎 防风（去芦） 甘草（炙）各半两 细辛半钱

【用法】上为细末。每服半钱，米饮调下。临时看病，随证用汤使。

【主治】小儿一切风热。

21392 龙脑散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】硼砂 脑子 朱砂各一分 滑石（细末）半两 石膏（水飞）二两 甘草（生

取末，炒）半钱

【用法】上为细末。每服半钱，用新汲水调下；或干掺，咽津亦得。

【主治】咽喉肿痛。因风热在于脾肺，邪毒蕴滞，胸膈不利，故发疼痛及急喉痹，闭塞肿痛，粥饮难咽。

21393 龙脑散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《烟霞圣效方》。

【组成】寒水石半两 胆矾一钱 朱砂一钱 乌鱼骨二钱 龙骨二钱 密佗僧三钱 麝香少许 乳香一钱 脑子少许 黄丹一钱（飞）

【用法】上为细末。淡浆水洗过，淹干上药。

【主治】一切疳漏恶疮。

21394 龙脑散

【方源】《普济方》卷六十二引《仁存方》。

【组成】朴消一两 甘草 龙脑 薄荷各半两

【用法】上为末。咽中生疮，竹筒吹入；口疮，用井花水调漱。

【主治】咽喉肿，颊舌生疮。

21395 龙脑散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】辰砂六分 龙脑三分 雄黄六分 青黛 黄连 黄柏各五分 硼砂 玄明粉各七分 人中白（煨）一钱 牛黄三分

【用法】上为极细末。掺之。

【主治】口破烂。

21396 龙脑散

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】龙脑一字 轻粉一钱半 密佗僧二钱 麝香少许 黄丹一两

【用法】上为细末。每用干掺上，用青布贴之，留一孔去毒气。

【主治】杖疮热毒疼痛。

21397 龙脑散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】薄荷 山豆根各五钱 青黛（飞净）三钱 硼砂一钱五分 儿茶一钱

【用法】上为细末。每一钱加冰片一分，吹之。立消。

【主治】喉痹。

21398 龙脑散

【方源】《续名家方选》。

【组成】石膏四铢 寒水石六铢 滑石四铢 白矾二铢 真珠一分 焰消二铢 麝香一铢 龙脑一铢

【用法】上为极细末。点入眼中。

【主治】诸眼痛。

21399 龙脑煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】白龙脑半两 乳香一分 朱砂一分 细辛一分 黄连一分（去须）

【用法】上药先将细辛、黄连捣罗为散，以水一大盏，浸一复时，用蜜五两，并药水同煎至四分，去滓，研龙脑、乳香、朱砂，入水药内，用瓷瓶子盛。点眼，一日四五次。

【主治】眼平生翳膜。

21400 龙脑煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】龙脑一钱 腻粉一钱 马牙消秦皮 防风（去芦头） 黄连（去须）各一两

【用法】上药先捣马牙消、秦皮、防风、黄连令碎，用新汲井水两碗浸药两复时，缓煎取一小盏，用绵滤去滓，澄清，却于瓷瓶内盛之，然后入龙脑、腻粉，候一宿。每用点眼。

【主治】眼中生肤翳，垂生珠管。

21401 龙脑煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】龙脑 雄黄 蕤仁（汤浸，去赤皮） 铜绿 青盐 腻粉各一分 黄丹半两

【用法】上药都研三两日再用，然后取白蜜半斤，搅令匀，纳于一细长项瓷瓶内，以重汤煮一饭时，候冷取出。再以铜箸取药，如绿豆大，每一只眼内点三点，相次用热盐汤洗掠之。

【主治】眼眵昏暗，赤涩怕日，泪出难开。

21402 龙脑煎

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】龙脑一分 盐绿半两 蕤仁一分（汤浸，去皮）

【用法】上为末，以蜜调似面脂。每日三两次点眼。

【主治】小儿眼胎赤。

21403 龙脑煎

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】龙脑半分 川芒消一分 腻粉半分 蜜三两 黄丹一分

【用法】上药同入竹筒内，以重汤煮一日，以绵滤过，于瓷瓶内盛。点眼，每日三四次。

【主治】小儿风热，致目生疮赤痛。

21404 龙脑煎

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】龙脑（研） 蝎梢（炒） 水银（研） 麝香（研） 腻粉（研） 丹砂（研） 天南星（薄荷汁浸一宿，切，炒） 白附子（炮裂）各等分

【用法】上为末，用石脑油和为煎。每服一皂子大，食后、临卧薄荷汤化下。

【主治】惊风心膈生涎。

21405 龙脑煎

【方源】《秘传眼科龙木论》卷五。

【组成】龙脑一分 秦皮 防风 细辛 甘草 宣黄连各一两半

【用法】上为末，以水一大碗，浸药末三日三夜，用银铤子煎至七分，以束绵滤去滓，加入蜜四两，煎至五七沸，入瓷瓶子内盛，勿令泄气。每用点眼。

【主治】天行后赤眼外障。

21406 龙脑膏

【方源】《幼幼新书》卷八引《仙人水鉴》。

【组成】生白龙脑半钱 腻粉一分 石脑油少许 水银一分（好酥一块如枣大，同研细） 白附子（炮）一钱 天南星（炮）二钱

【用法】上为末，面糊少许，研令熟，瓷器

盛，不透风，为丸如绿豆大。一二岁每服一丸，金银薄荷汤送下；乳香汤亦得。

【主治】小儿惊风搐搦。

21407 龙脑膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】龙脑一分（细研） 麝香一分（细研） 膩粉一分 郁李仁一分（汤浸，去皮） 蕤仁一分（汤浸，去皮） 黄连一分（去须） 古字钱三文 消石一分

【用法】上为细散，都研令匀，以白蜜四两，同入在一瓷瓶中，密封头，于炊饭甑内蒸，饭熟为度。如患者，以铜箸点眼，不拘时候。

【主治】眼风赤冷泪，翳膜。

21408 龙脑膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】白龙脑一钱（细研） 蕤仁一分（去赤皮） 杏仁七枚（汤浸，去皮尖双仁）

【用法】上研如膏，同人乳汁调和令匀，瓷盒中盛。每以铜箸点少许，着目眦头，一日两三次。

【主治】①《圣惠》：胎赤眼。②《普济方》：眼胎赤及生疮，怕见风日。

21409 龙脑膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】龙脑半分（细研） 马牙消一分（细研）

【用法】以羊胆一枚，纳入龙脑等，浸二复时，于瓷盒内摘破，研匀成膏。点眼，每日三次。

【主治】风毒攻眼，昏暗赤热肿痛。

21410 龙脑膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】龙脑半钱（细研） 空青半分（细研） 马牙消一分（细研） 川大黄半两（捣末） 黄连三分（去须，为末） 野驼脂三分（炼去滓） 鹅脂半两（炼去滓） 熊胆一分（细研）

【用法】先将马牙消、黄连、大黄三味末，纳入脂中，于微火上煎五七沸，滤去滓，次

将龙脑、熊胆、空青末研令极细，入前脂中，搅和令匀，纳瓷瓶中盛。每用铜箸取如黍米大，点目眦头，一日两三次。

【主治】近年风赤眼烂及热毒等。

21411 龙脑膏

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】龙脑一分 雄雀粪一分

【用法】上为细末。以人乳汁一合相和，调匀成膏。每以铜箸取少许点眼。

【主治】眼赤痛，卒生浮白膜。

21412 龙脑膏

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】龙脑半钱 麝香半钱 膩粉二钱 黄连末半两 蕤仁一两（汤浸，去赤皮，研细） 井盐一钱（细研）

【用法】上为细末，先以野驼脂二两，于瓷碗内煨令消，滤过，以前药合研如膏。每以铜箸取米粒大点眼。

【主治】眼生花翳涩痛。

21413 龙脑膏

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】龙脑（细研） 麝香（细研） 膩粉 蕤仁（汤浸，去皮） 黄连（去须） 各半两 马牙消半两

【用法】上为细散，都研令匀，入白蜜四两，同入在一瓷瓶中，密封，于炊饭甑内蒸，饭熟为度。以铜箸取少许点眼，每日三四次。

【主治】小儿眼赤，生翳膜。

21414 龙脑膏

【方源】《博济》卷四。

【组成】龙脑半钱 白矾一分（铍子内炼过，煎却矾汁，沥干为度） 蝉壳三十个（去足，研末，炒） 牛黄（研）半字 蛇退皮一条（长二尺，铁器上焙焦为度，除下黑者，生者再焙焦，研为末） 元明粉一钱

【用法】上一处烂研，加沙糖少许为丸，如梧桐子大。每服一丸，冷水化下。

【主治】小儿风热，咽喉肿痛，塞闷生疮，搔头躁闷，及虫咬心痛。

21415 龙脑膏

【方源】《医方类聚》卷六十七引《神巧万全方》。

【组成】白龙脑一钱(细研) 蕤仁一分(去皮) 杏仁七枚(去皮尖双仁) 马牙消半分(研) 膩粉一钱

【用法】上药都研如膏,用生男妇人乳汁调和令匀,入瓷合贮之。每点时以角篦点粟米粒大,着目眦头。

【主治】胎赤风赤眼。

21416 龙脑膏

【方源】《医部全录》卷一六二引《局方》。

【组成】缩砂五粒 薄荷叶一斤 甘草三两 防风 川芎 桔梗各二两 焰消一两 片脑一钱 白豆蔻三十粒

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。噙化咽下。

【主治】喉痹肿痛。

21417 龙脑膏

【方源】《幼幼新书》卷十八引《灵苑方》。

【异名】龙脑膏子(《活人书》卷二十一)、龙脑丸(《圣济总录》卷二十八)。

【组成】龙脑(细研)

【用法】上滴猪心血为丸,如鸡头子大。每服一丸,紫草汤化下。少时心神便定得睡,疮疹发透,依常将息。

【主治】时疾发豌豆,及赤疮子未透,心烦狂躁,气喘妄语,或见鬼神。

【备考】《活人书》本方用法:若疮子陷伏者,用温酒化下。《赤水玄珠》:昏昏不醒者,并花水下。

21418 龙脑膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】龙脑 沉香 白檀香 苏合香 鸡舌香 零陵香 丁香 甘松 木香 藿香 白芷 白附子 细辛 当归 芎藭 天雄 辛夷 甘菊花 乌喙 防风 蔓荆实 杏仁(汤浸,去皮尖) 秦椒(去目及闭口者)各一两 乌麻油五斤

【用法】上药除油外,并锉细,以新绵裹,纳锅中入油同煎,候白芷黄色药成,去滓,以瓷盒收。旋取以手摩头顶发际。

【功用】长发令黑。

【主治】头风痒白屑。

21419 龙脑膏

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】龙脑少许(研细) 黄连(去须)一两(净洗,为极细末) 麝香少许(研细)

【用法】以蜜调黄连为饼子,涂在白瓦器上,用艾四两,烧烟熏,取末刮下,入脑、麝,以瓷盒盛。用时如皂子大,以新汲水调点之。

【主治】一切暴赤眼。

21420 龙脑膏

《圣济总录》卷一三七。为《圣惠》卷六十五“硫黄散”之异名。见该条。

21421 龙脑膏

【方源】《卫生总微》卷二十。

【组成】龙脑一字 麝香一字 砒一字 白藜一字

【用法】上为细末,用猪胆汁调药,适稀稠。以纸任帛涂上。即愈。

【主治】走马急疳蚀口鼻。

21422 龙脑膏

《普济方》卷三七四引《全婴方》。为《博济》卷四“神效龙脑膏”之异名。见该条。

21423 龙脑膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】龙脑一钱二分(研) 椒目半两 杏仁二钱半(浸,去皮尖双仁)

【用法】上为末,研杏仁膏,和如枣核大。绵裹塞耳中,一日换二次。

【主治】卒聋。

21424 龙脑膏

【方源】《普济方》卷八十六引《仁存方》。

【组成】龙脑(研)一钱 杏仁(去皮,用纸罩去油)二钱半

【用法】上共成细膏,用饭泔、乳汁调匀,瓷器中盛。每以铜箸点少许入眦头,一日二

三次。

【主治】眼赤，眶险赤烂。

21425 龙脑膏

《普济方》卷七十四。即《圣济总录》卷一〇三“点眼龙脑膏”。见该条。

21426 龙脑膏

《普济方》卷八十。即《圣惠》卷三十三“明目龙脑膏”。见该条。

21427 龙脑膏

《普济方》卷八十。即《朱氏集验方》卷九“龙胆膏”。见该条。

21428 龙脑膏

【方源】《简明医轍》卷四。

【组成】薄荷叶四两 甘草 桔梗 连翘 各二两半 百药煎二两（如无，用五倍子） 川芎一两半 诃子（皮） 砂仁 大黄（酒蒸熟）各一两

【用法】上为末，鸡子清和。临睡噙化。

【主治】讴歌叫伤及痰火等诸般失音。

21429 龙脑膏

《痘科类编》卷三。为《痘疹心法》卷二十三“龙脑安神丸”之异名。见该条。

21430 龙脑膏

【方源】《诚书》卷六。

【组成】虾蟆胆 冰片（上好者）

【用法】同捣为膏，收瓷瓶内，黄蜡封口。临用以银器挑出，抹入儿口，将灯心汤送下。

【主治】脐风。

21431 龙脑膏

【方源】《诚书》卷十一。

【组成】龙脑一字 朱砂一钱 赤茯苓 人参 钩藤 甘草（炙）各一钱五分

【用法】上为末，蜜为丸。米汤送下。

【主治】肺疳，鼻下赤烂痒极，发焦指眼，下血痢。

21432 龙烟汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】生麦门冬（去心）一两半 木通一两 熟干地黄（焙）三两 旋覆花 大青 茯苓（去木）各一两 黄连（去须）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，加芒消半钱匕，搅匀，食前温服，食后再服。

【主治】眼疹涩，并针刺血痛昏暗。

21433 龙消散

【方源】《经验良方》。

【组成】龙脑 消石各等分

【用法】上为末。每服一分，一日三四次。

【功用】发汗。

【主治】疮疡焮肿。

21434 龙粉丸

《小儿药证直诀》卷下。为《圣惠》卷八十七“龙胆丸”之异名。见该条。

21435 龙粉散

【方源】《普济方》卷四十八。

【组成】干地龙

【用法】上为细末。加轻粉，麻油调敷之。

【主治】白秃疮。

21436 龙黄散

《医学纲目》卷三十九引汤氏方。为《圣惠》卷八十九“白矾散”之异名。见该条。

21437 龙眼汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】龙眼 丹参 人参 远志 麦冬 茯神 黄耆 甘草 升麻 柴胡

【主治】健忘，上虚下盛者。

21438 龙眼酒

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】龙眼不拘多少

【用法】入上好烧酒内浸百日，常饮数杯。

【功用】温补脾胃，助精神，壮颜色。

21439 龙眼膏

《医学碎金录》。为《随息居饮食谱》“玉灵膏”之异名。见该条。

21440 龙蛎丸

《医学入门》卷七。为《普济方》卷三十三引《卫生家宝》“龙骨丸”之异名。见该条。

21441 龙蛇丸

《元戎》卷十。即原书同卷“龙蛇散”改为丸剂。见该条。

21442 龙蛇散

【方源】《元戎》卷十。

【组成】白花蛇(去骨,焙) 乌梢蛇(去骨,炒) 蕲藓 天麻 金毛狗脊 自然铜 黄香 骨碎补 枫香(研) 地龙(去土) 草乌头(盐水浸)各一两 乳香 没药各三钱 麝香二钱

【用法】上为细末,酒调送下。亦可酒糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食后酒送下,名龙蛇丸。

【主治】风虚顽麻,遍身白癩紫癩,风癰痒痛者。

21443 龙蛇散

【方源】《普济方》卷三五七。

【组成】蛇蜕皮

【用法】上药入罐子内,盐泥固济,烧存性,为细末。每服二钱,榆白皮煎汤调下。凡产不顺,手足先见者,温酒送服一钱,仍用敷儿手足即顺。

【主治】横生逆产,吹乳。

21444 龙衔膏

《肘后方》卷八。即原书同卷“蛇衔膏”加龙衔藤一两。见该条。

21445 龙旋散

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】青皮 干姜 官桂 玄胡索(醋炒) 丁香 豆蔻 砂仁 枳壳 槟榔 厚朴 香附 山楂 艾叶

【功用】调理脾胃。

【主治】小儿因脾胃有伤,渐成疳积,以致面色萎黄,时作潮热,眼泡浮肿,肚腹绞痛。

21446 龙液膏

【方源】《本草纲目》卷三十七引《积善堂方》。

【组成】白茯苓(坚实者,去皮,焙,研)

【用法】取清溪流水,浸去筋膜,复焙,入瓷罐内,以好蜜和匀,又铜釜内重汤桑柴炭煮一日,取出收之。每服二三匙,空心白汤送下

【功用】解烦郁燥渴。

【主治】一切下部诸疾。

21447 龙葱散

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】韭菜地中蚯蚓粪二钱 葱子一钱

【用法】上为细末。醋调敷上,干即易之。三次即愈。

【主治】乳吹。

21448 龙葵散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】龙葵(俗名天茄子) 景天(俗名慎火草) 黄连(去须) 天灵盖各一两 龙骨 乳香 木鳖子 黄蜀葵花各半两

【用法】上为散。看疮大小,入膩粉少许,蜜调,摊纸上贴之。

【主治】诸恶疮,多出脓水不干者。

21449 龙葵散

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】龙葵根一握(净洗,细切) 乳香(研)三两三 杏仁(去皮尖双仁)六十枚 黄连(去须)三两

【用法】上为细末。其疮作头未旁攻者,即须作饼,厚如三四钱许,可疮大小敷之,疮若觉冷微痒者,即易之,痒不可忍,切不得搔动,直候一炊久,即看疮中,似石榴子溃溃著,然后去药,时时以甘草汤微温洗之,洗了即以蜡帛贴之。疮若旁攻作穴,即纳药于穴中,以满为度。

【主治】因乳石发动,黑疮肿焮。

【加减】疮若赤色者,即是热肉面所为,不用龙葵根,以蔓菁根代之。

【宜忌】黑疮愈后,只得食猪、鱼、葱、蒜,终身更不得食羊血,食即再发。

21450 龙葵膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】龙葵根半两 莨菪子半两 胡燕窠半两 独颗蒜半两 胡荽子半两 鼠粪半两 杏仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 豉半两

【用法】用酱饭相和烂捣。醋调封之,每日

一换。经五次愈。

【主治】恶刺。

21451 龙蛤散

【方源】《卫生总微》卷八。

【组成】龙胆草(去芦) 蛤粉各等分

【用法】上为细末。每服二钱，猪肝半两，薄批，掺药在中，以线缠定，用米泔于银沙铫内炭火慢慢煮，至肝熟为度，食后少顷食之，以汁送下，一日三次。须先以清凉饮子利动，再以此方与兔肝丸同服。

【主治】疮疹入眼，初觉肿痛者。

21452 龙游串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】银花一钱五分 寒水石五分 黄柏一钱五分 甘石一钱 青黛五分 百草霜五分

【用法】上为末。作二服。

【主治】一切疮毒瘰癧。

21453 龙翔饮

【方源】《产论》卷一。

【组成】麻黄一钱 大枣一钱 苍术一钱 石膏三钱半 甘草一分 生姜一钱

【用法】以水二合半，煮取一合半服。

【主治】妊娠烦躁口渴，浮肿有热而大便秘，或麻痺者。

21454 龙犀丸

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】犀角尖 川连 白矾各二钱

【用法】上为细末，用龙眼肉四两为丸，如梧桐子大。每服一钱，开水送下。

【主治】痔疮。

21455 龙礞丹

【方源】《痘疹仁端录》卷七。

【组成】礞砂 青黛 山豆根各五分 冰片五厘

【用法】上为末。吹喉。

【主治】痘后咽喉肿痛。

21456 龙礞散

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】牡黄牛屎尖(煨) 明矾五分 冰

片一分五厘 朴消一钱 礞砂二钱

【用法】上为末。以鹅管盛末，吹患处。

【主治】麻疹后口疮。

21457 龙睛丹

【方源】《梅氏验方新编》六集。

【组成】桂圆核(炒，去亮黑皮)

【用法】磨细掺之。

【主治】金刃等伤，血出不止。

21458 龙蛻散

【方源】《得效》卷十四。

【异名】催生龙蛻散(《明医指掌》卷九)。

【组成】蝉退一两(烧存性) 大蛇蛻(火烧存性) 一条 滑石半两 葵子一两(微炒)

【用法】上为末。每服一钱，顺流水微温暖调下。不可使热汤。

【功用】催生。

21459 龙腾饮

【方源】《产论》卷一。

【组成】芎藭 黄芩 黄连各一钱 大黄五分

【用法】上以麻沸汤一合渍之，须臾绞去滓，顿服。

【主治】妊娠盛怒而气暴逆，吐血衄血，或突然胸痛者。

21460 龙蟠饮

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】人参 当归 枳壳 白豆蔻 丁香 木香 官桂 青皮 半夏 山楂 三棱 二蚕砂 厚朴

【用法】上用生姜、酒煎服。

【主治】小儿心中刺痛未愈，而痘随出，多因气逆或寒积所致。

21461 龙葵丸

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】礞砂 朱砂 粉霜 膩粉各六钱 白矾(飞) 黄丹(生用)各半两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如龙眼核大。大人每服一两丸，临卧陈米饮送下，不嚼；小儿半丸。此药有积则化，无积不动。

【功用】化百日儿及初生儿一切虚中积。

【主治】虚积不下，日渐肌瘦。

21462 龙鳞丸

【方源】《普济方》卷一〇〇。

【组成】青州白丸子末一两 大青鱼鳞(糯米炒黄，研为末)一两

【用法】上和匀，以姜汁糊丸，如梧桐子大。每服五十丸，姜汤送下，不拘时候。

【主治】风痫频作。

21463 龙鳞散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】鲤鱼皮 血余各八分 黄虫 水蛭 川山甲各四分 墨二分 猪牙皂角二分(已上入瓶子内，泥固济，烧通赤，放冷，细研如粉) 蒲黄四分 麒麟竭 没药各二两 麝香一分 琥珀二分

【用法】上为细末。每服一钱，以童便送下，不拘时候。产后才觉恶心头旋，多涕唾，身如在车中者，速服之。

【主治】产后血晕，烦闷不知人事，或狂言乱语，气喘欲绝者。

21464 龙麝丹

【方源】《普济方》卷六十。

【组成】白矾(飞过) 雄蛇蜕一两(火煨过用) 硼砂半两(研) 麝香半两(另研)

【用法】上研匀，用牛蒡子自然汁为饼子，如钱大，以红绵包，噙化。如牛蒡子汁稀，入糊少许。

【主治】缠喉风。

21465 龙麝散

【方源】《普济方》卷一八九。

【组成】伏龙肝半两 麝香一钱 羊胫炭皮(拍碎，炒令通赤)一两

【用法】上为细末。每服二钱，冷水调下，或研小蓴汁调下亦得。

【主治】鼻衄。

21466 龙麝散

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】钱子地龙一个(揩去上面泥土)

麝香当门子各等分

【用法】上为末。平分两服，用无灰酒调下。

【主治】小肠气。

21467 龙花蕊散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】龙花蕊二两(出安南者) 川升麻 郁李根(切) 生干地黄 地骨皮 白蒺藜 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)各一两 细辛半两 龙脑半钱(细研) 麝香半钱(细研)

【用法】上为细散，入研了药令匀。每欲贴时，先以柳枝净揩齿，以新汲水漱口，更以盐花于齿龈内外揩之，有涎即吐却，不要漱口，便取白薄纸剪作片子，阔如蕤叶，以水蘸纸，掺药末少许，贴齿龈上，便闭口勿语，有药汁咽之。

【主治】齿黄黑。

21468 龙花蕊散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】龙花蕊二两 升麻 黄芩(去黑心) 白蒺藜(炒) 郁李仁根(刮去皮，切) 地柏(炙，切) 地骨皮(锉碎，微炒) 吴蓝(去根)各一两 龙脑(别研)半钱 麝香(别研)半钱

【用法】上药除脑、麝外，捣罗为散，次入脑、麝细研。每欲贴时，先以柳枝揩齿，以新汲水漱口，更以盐花于齿龈内外揩之，有涎唾即吐，不要漱口，便取白薄纸剪作片子，阔如蕤叶，以水蘸纸，掺药末少许，贴齿龈上，咽津亦得。

【主治】齿黄黑。

21469 龙花蕊散

《普济方》卷七十。为《圣惠》卷三十四“揩齿龙花蕊散”之异名。见该条。

21470 龙尾神针

【方源】《青囊秘传》。

【组成】麝香 肉桂 乳香(炙) 没药(炙) 朱砂 雄黄 白蒺藜 川乌 草乌

川芎 良姜 苍术 独活 威灵仙 白芷 天麻 羌活 细辛 藁本 白花蛇各等分

【用法】上为末。将纸一张，艾绒铺遍，将药铺艾上，卷紧如管大，外用乌金纸贴好，以火燃着，隔布熨于患处。

【主治】寒湿气痛。

21471 龙骨皮丸

《普济方》卷二九八。为《圣济总录》卷一四三“龙骨丸”之异名。见该条。

21472 龙骨饮子

【方源】《幼幼新书》(人卫本)卷二十九引《吉氏家传》。

【组成】龙骨根草半两 甘草节 当归 芍药 大黄(蒸) 连翘 栝楼根 山慈姑各一分

【用法】上为细末，不用罗。每用三大钱，水二盏，煎取一小盏，去滓，作饮子服。

【主治】小儿血痢，及身上生痈疔，面赤壮热。

【备考】本方方名，原书古籍本作“龙骨饮”。

21473 龙骨饼子

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】龙骨 乌贼鱼骨(去甲)各等分

【用法】上为末。每服一钱匕，加鸡子清一枚，用白面同和，捏作饼子三枚，焙火内煨熟，空心食前细嚼，用温米饮送下。

【主治】脏毒，便血不止。

21474 龙骨粉膏

【方源】方出《千金》卷二十二，名见《普济方》卷二八七。

【组成】大虾蟆一枚(自死者) 乱发一块(鸡子大) 猪脂一斤

【用法】上药纳脂中煎之，二物略消尽，下待冷，更纳盐一合搅和之。末龙骨，粉疮四面，厚二分，以膏着疮中，每日换二次。

【主治】久痈疮，败坏成骨疽。

21475 龙胆饮子

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】龙脑饮子(《卫生宝鉴》卷十)、升

麻龙胆草饮子(《原机启微》卷下)、消翳散(《医学纲目》卷十三)。

【组成】谷精草 川郁金 蛇退皮 炙甘草 各五分 麻黄一钱五分 升麻二钱 青蛤粉 草龙胆 黄芩(炒) 羌活各三钱

【用法】上为细末。每服二钱，食后温茶清调下。

【主治】湿热为病，疳眼流脓，生疳翳。

【备考】方中蛇退皮，《医学纲目》作“蝉退”。

21476 龙胆饮子

【方源】《保婴撮要》卷四。

【异名】龙胆饮(《诚书》卷七)。

【组成】青蛤粉五钱 羌活 草龙胆各三钱 炒黄芩二钱 蛇蜕五分 麻黄二钱五分 谷精草五分

【用法】上为末。每服二钱，茶清调下。

【主治】湿热为病，疳眼流脓生翳。

21477 龙胆草丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【异名】龙胆丸(《局方》卷十续添诸局经验秘方)。

【组成】龙胆草 黄连 使君子肉 青皮等分

【用法】上为末，猪胆汁为丸，如麻子大。每服十丸，食后熟水送下。

【主治】疳热。

21478 龙胆草汤

【方源】方出《外台》卷二十五引《集验方》，名见《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】草龙胆一握

【用法】上切。以水五升，煮二升半，分五服。如不愈，更服。

【主治】①《外台》引《集验方》：卒然下血不止。②《杂病源流犀烛》：卒然尿血不止。

21479 龙胆草汤

【方源】《痘科类编》卷三。

【组成】龙胆草五分 菊花 蒺藜 白芷各三分 防风二分 蝉蜕一分 黄连二分

木贼(去节)一分

【用法】水半茶钟,煎两沸,温服。

【主治】①《痘科类编》:邪热之见于目者。

②《眼科阐微》:痘后翳膜遮睛,泪出羞明。

21480 龙胆草汤

《证治宝鉴》卷十。为《卫生宝鉴》卷十二“龙胆泻肝汤”之异名。见该条。

21481 龙胆草饮

【方源】《普济方》卷七十二。

【组成】龙胆草 芍药各一两 防风 荆芥 椿实子各半两 蝉蜕三钱 芍药(炙)二钱半 黄连

【用法】上为末。每服二三钱,用灯草、淡竹叶汤调,食后、临卧温服。

【主治】风热眼。

【备考】方中黄连用量原缺。

21482 龙胆草散

【方源】《医方类聚》卷五十四引《神巧万全方》。

【组成】龙胆草一两 大青一两 柴胡一两 枳实一两(麸炒令黄) 栝楼一两 黄芩一两 梔子仁一两 茵陈一两 川大黄一两(微炒) 甘草半两(微炒)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓,不拘时候温服。

【主治】伤寒壮热,骨节烦疼,连心两肋气胀急硬痛,不能食,变为黄。

21483 龙胆草散

《普济方》卷七十四。即《局方》卷七(续添诸局经验秘方)“草龙胆散”。见该条。

21484 龙胆草散

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】龙胆草 防风各一两

【用法】上咬咀,白水煎服。或为细末,炼蜜为丸,咽化下。

【主治】小儿身热不除。

21485 龙胆草散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】川芎 香附子各四两 龙胆草 甘草 草决明(炒) 木贼 净菊花各二两

【用法】上为细末。每服二钱,麦门冬、薄荷汤加沙糖一匙同调,食后、临卧服。

【主治】上焦风热,目赤羞明,近风多泪,努肉攀睛,瘀肉隐痛。

21486 龙胆草散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】龙胆草五分 菊花 蒺藜(炒,去刺) 白芷各三分 防风 黄连 蝉蜕(去泥) 木贼(去节) 梔子各二分

【用法】水煎服。

【主治】痘毒入眼,生翳障。

21487 龙胆煎散

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】龙胆 细辛(去苗叶) 人参 防风(去叉)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕;水一盏,加沙糖少许,同煎至六分,温服。

【主治】头风注目昏暗。

21488 龙脑双丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】天南星(汤浸洗,切,焙) 半夏(汤洗七遍去滑,切,焙)各半两 干蝎(酒拌炒) 白僵蚕(酒炒)各一分(四味同为末) 胡粉 腻粉各一钱匕,麝香 龙脑各一分(四味同研)

【用法】上药一处研匀,稀糯米糊为丸,如皂子大。每服一丸或二丸,嚼破,温酒送下。如急风口噤,用青葱筒子灌于鼻内。

【主治】一切风。

21489 龙脑饮子

【方源】《局方》卷六。

【组成】缩砂仁 瓜蒌根各三两 藿香叶二两四钱 石膏四两 甘草(蜜炒)十六两 大梔子仁(微炒)十二两

【用法】上为末。每服一钱至二钱,用新水入蜜调下。又治伤寒余毒,潮热虚汗,用药二钱,水一盏,加竹叶五六片,煎至七分,食后温服。

【主治】大人、小儿蕴积邪热,咽喉肿痛,

赤眼口疮,心烦鼻衄,咽干多渴,睡卧不宁,及痰热咳嗽,中暑烦躁,一切风壅。或伤寒余毒,潮热虚汗。

【备考】本方方名,《中国医学大辞典》引作“龙脑饮”。

21490 龙脑饮子

《卫生宝鉴》卷十。为《兰室秘藏》卷上“龙胆饮子”之异名。见该条。

21491 龙脑膏子

【方源】方出《圣惠》卷三十二,名见《普济方》卷七十四。

【组成】龙脑半钱 秦皮(锉) 黄连(去须) 甘草(生,锉) 马牙消(炼过,细研)各半两

【用法】上为末。用水一大盏,浸药一宿,以银铤子煎五分,用新绵滤过,入龙脑,搅令匀,瓷器中盛。以铜箸点眼。

【主治】风毒暴赤眼,肿涩痛。

21492 龙脑膏子

《类证活人书》卷二十一。为《幼幼新书》卷十八引《灵苑方》“龙脑膏”之异名。见该条。

21493 龙眼肉粥

【方源】《药粥疗法》引《老老恒言》。

【组成】龙眼肉 15 克 红枣 3~5 枚 粳米二两

【用法】一同煮粥,如爱好食甜病者,可加白糖少许。

【功用】养心安神,健脾补血。

【主治】心血不足之心悸、心慌、失眠、健忘、贫血,脾虚腹泻,浮肿,体质虚羸,以及神经衰弱,自汗盗汗。

【宜忌】龙眼粥每次用量不宜过大,根据各人食量,每天早晚可各服一二饭碗,并须热服,量过了会引起中满气壅。凡风寒感冒,恶寒发热,或舌苔厚腻者忌用。

21494 龙葵根散

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】龙葵根(锉)一两 麝香(研)一分

【用法】先将龙葵根捣罗为末,入麝香同研令匀,水调涂于疮上。

【主治】发背成疮。

21495 龙蛻饼子

【方源】《续易简方》卷五。

【异名】消毒饼子。

【组成】蛇蛻一条(用麻油点灯,烧存性)

【用法】上为细末,以砂糖拌为饼子。嚼下。

【主治】小儿痘疮,余毒上攻咽喉,语声不出。

21496 龙马自来丹

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】马钱子八两 地龙八条(去土,焙干为末) 香油一斤。

【用法】将香油入锅内熬滚,入马钱子炸之,待马钱子微有响爆之声,拿一个用刀切两半,看其内以紫红色为度,研为细末;再入前地龙末和匀,面糊为丸,如绿豆大。每服三四分,临卧以盐水送下。若五六岁小儿,服二分,红糖水送下。如不为丸,面子亦可服。治痼症,每晚先服黄耆赤风汤一服,临卧服丸药一服,吃一月后,不必服汤药,净吃丸药,久而自愈,愈后将丸药再吃一二年。

【主治】痼症。

【加减】如吃斋人,去地龙亦可。

21497 龙牙清魂散

《一盘珠》卷七。为《女科万金方》“龙齿清魂散”之异名。见该条。

21498 龙火拔毒散

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】阳起石(煨) 伏龙肝各三钱

【用法】新水扫之。

【主治】缠喉急症。

21499 龙芽一醉饮

【方源】《回春》卷八。

【组成】龙芽草(五月五日端午采收,阴干)

【用法】将好酒浸,捣取汁。量加乳香、没药、绿豆粉,入汁内同饮,将滓敷疮上。

【主治】疔疮。

【宜忌】此日不许吃一些茶水，只可饮酒，亦不可用水洗面。

21500 龙牡复脉汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】吉林参一钱 陈阿胶一钱半 鸡子黄一枚（包煎） 生龟版 生牡蛎各八钱 花龙骨二钱 生鳖甲四钱 真玳瑁一钱半 生白芍三钱 麦冬三钱 大生地四钱 炙甘草一钱半 大坎炆一条（酒洗）

【用法】水两碗，煎至半碗服。若痰塞喉间，欲吐无力，药不能下者，用真猴枣末四分煎鲜石菖蒲汤先服。

【功用】固扶元气，敛阴益液，摄纳真阴，镇潜虚阳。

【主治】阴虚人，病伤寒温热，误用刚燥汗下药过量，缠绵日久，以致真阴虚极于下，致无根之火仓猝飞腾，气壅痰升，上蒙清窍，忽然痉厥，舌红短，面青，目合口开，手不握固，音嘶气促，甚则冷汗淋漓，手足逆冷，二便自遗，气息俱微，脉沉伏不见，或微弱无神，或不应指者。

【加减】若肢冷脉伏，自汗头汗，汗出如油者，则阴亡而阳亦随亡，吉林参易别直参二钱，加淡附片一钱半。

21501 龙牡菟韭丸

【方源】方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷七。

【组成】生龙骨（水飞） 生牡蛎（水飞） 生菟丝粉 生韭菜子粉各等分

【用法】不见火，研末，生干面、冷水调浆为丸。每服一钱，或至三钱，晚上陈酒下，清晨服亦可。

【主治】色欲过度，精浊白浊，小水长而无痛者，并治妇人虚寒，淋、带、崩漏。

21502 龙肝凤髓丸

《普济方》卷一七六。即《得效》卷七“龙风丸”改为丸剂。见该条。

21503 龙齿牛膝散

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】龙齿二两（酥炙黄） 牛膝一两（酒浸，细切，焙干） 藿香一两（拣净，洗） 虎下颌骨三两（连齿者，酥炙） 自然铜（醋焙） 防风 骨碎补（火炙去毛） 海桐皮 狼毒（炒） 官桂 黑附子（炮，去皮脐） 白附子 天南星（去脐，炮） 半夏（酒浸七遍去滑） 麻黄（去节） 肉苁蓉（酒浸，炙） 天麻（酒浸，切片，焙干） 干蝎（微炒） 各一两 白花蛇 乌蛇 各一两（酒浸，去骨） 川升麻一两 亚麻子（净拣） 一两 蝉壳一两（去粗） 当归（去芦头） 香白芷（炒） 川乌头（炮，去皮脐） 羌活 川芎各一两 密陀僧（研） 雄黄半两（细研） 没药半两（研） 龙脑一分（研） 麝香三两（研）

【用法】上药除合研者外，一处捣罗为散，同拌和匀。每服一钱，丈夫、妇人一切筋骨热疼不可忍者，及四肢不遂，用温乳香酒调下，一日三次，四十服见效。血风，三十服见效。

【主治】风毒脚气痹着，四肢或肿或痹，疼痛，脚膝倾衰，状如瘫痪，手足不举。

【备考】方中密陀僧用量原缺。

21504 龙齿壮胆汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参 竹茹各三钱 五味子 远志各一钱 生枣仁一两 白芍八钱 当归五钱 龙齿（醋淬，研末）五分

【用法】水煎调服。二剂即安。

【主治】胆气怯弱，怔忡，心常怦怦不安，常若有官事未了，人欲来捕之状。

21505 龙齿安神丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参 麦冬各一两 黄连二钱 柏子仁三钱 龙齿（火煨，酥淬，为末）一钱 炒枣仁三钱 甘草五分 北五味子一钱

【用法】水煎服。

【主治】用心太过，思虑终宵，以至精神恍惚，语言倦怠，忽忽若有所失，腰脚沉重，肢

体困惫。

21506 龙齿补心汤

【方源】《直指》卷十。

【组成】龙齿(煨,别研) 人参 当归(酒浸一宿,焙) 熟地黄(洗,焙) 北梗(焙) 酸枣仁(炒) 白茯苓 白茯神(去木) 远志(水浸,取肉,晒,姜汁淹,焙) 枳壳(去瓢,麸炒) 麦门冬(去心) 半夏曲 白术 甘草(炙)各半两 肉桂二钱半 绵黄耆七钱半(蜜炙)

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盞半,加生姜五片,梗米一小撮,同煎,不时服,临卧服。

【主治】诸虚不足,虚热潮来,心神惊惕,睡卧不宁,小便油浊。

21507 龙齿补心汤

【方源】《济阳纲目》卷五十七。

【组成】龙齿(煨) 人参 熟地(砂仁炒) 当归(酒洗) 茯神 白茯苓 麦冬(去心) 黄耆 酸枣仁(炒去油) 远志(甘草水煮,去骨) 白术各一钱 甘草五分

【用法】上作一服。水煎,空腹服。

【主治】诸虚潮热,心惊不寐,小便白浊。

21508 龙齿清魂散

【方源】《女科万金方》。

【异名】龙牙清魂散(《一盘珠》卷七)。

【组成】龙齿 远志 官桂 人参 当归 茯苓 细辛 门冬 甘草 玄胡

【用法】加生姜五片,大枣三枚,入金银器内煎百沸汤,加麝香一匙,不拘时候服。

【主治】妇人败血冲心,或歌舞、谈笑、怒骂,坐卧苦者,踰垣上屋,口咬打拳,神名佛号,无有不能,似祸祟之状。

21509 龙齿清魂散

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】龙齿三两 人参一两半 归身三两 远志一两半 麦冬三两(去心) 桂心五钱 茯神二两(去木) 细辛三钱

【用法】上为散。每服三钱,加生姜一片,

红枣三枚,煎汤调下。

【主治】惊悸,脉弦细涩者。

【方论选录】心气大虚,寒凝内沃,而心血不足,不能荣心,故惊悸不已焉。人参大补心气,当归营养心血以雄心,麦冬清心润肺以宁心,细辛通心气、搜涤痰涎,茯神渗湿气、清彻神明,远志交通心肾,龙齿定魄安魂,为散、姜、枣汤下,使心血内充,则心气雄壮,而寒凝自化,神志并宁,何惊悸之不瘳哉!此补养温经之剂,为心寒惊悸易惊之专方。

21510 龙齿琥珀散

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】茯神一两 人参 龙齿 琥珀 赤芍 黄耆 牛膝(去芦)各三分 麦门冬(去心) 生地各一两半 当归半两

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盞半,煎六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产前产后血虚,心神恍惚,语言失度,睡卧不安。

21511 龙齿犀角汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】龙齿 犀角(镑) 前胡(去芦头)各一两 牛黄一钱半

【用法】将三味为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,加牛黄少许,不拘时候温服。

【主治】伤寒刚症,通身壮热。

21512 龙齿镇心丹

【方源】《局方》卷五(续添诸局经验秘方)。

【组成】龙齿(水飞) 远志(去心,炒) 天门冬(去心) 熟地黄 山药各六两(炒) 茯神 麦门冬(去心) 车前子(炒) 白茯苓 桂心 地骨皮 五味子各五两

【用法】上为末,蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸至五十丸,空心温酒、米汤任下。

【功用】《普济方》:益精髓,养血气,明视

听，悦色驻颜。

【主治】心肾气不足，惊悸健忘，梦寐不安，遗精，面少色，足胫痠疼。

21513 龙虎二仙丹

《喉证指南》卷四。为《时疫白喉捷要》“龙虎二仙汤”之异名。见该条。

21514 龙虎二仙汤

【方源】《时疫白喉捷要》。

【异名】龙虎二仙丹（《喉证指南》卷四）。

【组成】龙胆草二钱 大生地一两 生石膏一两 川黄连三钱 真犀角八钱 黑梔仁三钱 板蓝根四钱 鼠粘子四钱 知母四钱 僵蚕五钱 木通四钱 元参四钱 甘草一钱 黄芩五钱 马勃四钱（用绢包煎） 大青叶五钱

【用法】粳米二合为引，日服三四剂。

【主治】白喉极险者。

21515 龙虎二汁饮

【方源】《疫喉浅论》卷下。

【组成】青橄榄肉 生白萝卜各等分

【用法】二味取自然汁。隔水顿温，频饮，或漱喉亦可。

【主治】疫喉乍起，已破未破者。

21516 龙虎卫生膏

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】当归一两 黄连二两 黄耆 黄芩 枳壳 乌药 大风子各一两 防风二两 草乌二两 血余二两 青藤 木通 木鳖子 苦参 香附子 桑皮各一两五钱（上为粗片，入麻油二斤，炒焦枯，滤去药片，入后药） 松香四两 虎骨（酥炙为末）二两 龙骨一两五钱 朱砂二钱 赤石脂一两五钱 蜜陀僧二两五钱。

【用法】上为细末，入油内，再加黄蜡三两，入油内搅匀，又加乳香、没药、轻粉末各五钱，孩儿茶末一两，再搅，慢火熬至滴水成珠为度，取起摊膏。贴之。

【主治】一切恶疮，顽癣，痔漏多年，病久不能料理者。

21517 龙虎小还丹

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】鹿角胶 虎掌（酒炙，虎胫尤妙） 川草薢（酒洗） 肉苁蓉各四两 熟地八两（牛膝三两拌蒸） 金钗石斛一斤 川续断 破故纸（研碎，拌胡桃肉蒸，炒） 龟版（酥炙） 茯苓（人乳拌蒸） 山萸肉 山药各四两 天冬（去心）三两 巴戟肉三两 沉香五钱 枸杞六两

【用法】上为末，将石斛用酒、水煎膏，入鹿角胶调化，加神曲六两，为糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，早晚淡盐汤或酒送下。

【功用】种子延年。

【主治】一切手足拘挛，血气凝滞，阳事不举，齿豁目昏，心神散乱。

【加减】如精薄，加龟胶四两；如男妇同服，加当归四两。

21518 龙虎太一丹

《博济》卷五。为原书同卷“银黄丹”之异名。见该条。

21519 龙虎止疳散

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】屋上白猫屎 煨石膏各等分

【用法】上为末，加入蜈蚣一条（炙灰），冰片少许，共为极细末。吹之，再服清火解毒之剂。

【主治】痘后牙疳，极凶危者，及走马牙疳。

21520 龙虎化毒丹

【方源】《全国中药成药处方集》（杭州方）。

【组成】西牛黄 珍珠粉各一两六钱五分 当门子一两八钱五分 梅冰片二两四钱一分 银消四两五钱 飞腰黄十两七钱 飞月石四两六钱三分 炉甘石五两六钱

【用法】先用斑蝥念四只，去头足，童便十四两，浸三日，取出斑蝥，将腰黄浸七日，然后风干，先研腰黄，次和甘石，渐次加入诸药，研和极匀极细为度。疯狗毒蛇咬者，点二眼角及舌尖上，宜连点七日，兼敷患处，并内服半分，重则连服数日；伤寒中风，昏迷

惊风，痰厥急症，皆点舌上，并内服半分；危急痧症，点舌并吹鼻孔。

【功用】清血解毒。

【主治】疯犬、毒蛇咬伤，及伤寒中风，疮痍惊风，诸种危急痧症。

【宜忌】孕妇酌用，不宜吞服。

21521 龙虎双降散

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】大黄 天花粉各六两 元参十两 麦冬（去心） 滑石各五两 银柴胡 荆芥 丹参各二两 白芍 石膏各三两

【用法】上为净末，和匀。每服八钱，地浆煎服。

【主治】时行瘟疫，失心癫狂，一切火热蕴结重症。

21522 龙虎交加散

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】楠木香（锉碎，用纸垫锅，焙干，研为细末） 罂粟壳（去顶瓤筋，锉，焙干，为细末） 甘草（用湿纸裹煨，焙干，为细末） 吴白芷（面裹煨，去面，焙干，为细末） 川芎（湿纸裹煨，焙干，为细末）

【用法】上为末，各另包收。看疮加减用之：若疮势红肿热大，先服如神托里散一帖，卧盖取微汗；如红晕大，肿高，疮头有似碎米大白脓点者，可进交加散一帖，用木香四分、罂粟壳二钱二分、甘草六分、白芷一钱四分、川芎一钱半，共为一帖，用水七分，生白酒三分，共一碗，用银器煎八分，如无银器，新瓷器亦好，不用铜铁旧器，于炭火边先滚五七滚，用细绢将水湿扭干，滤去滓，食后服，以干盐菜压之，滓敷疮，四围用襁绢帕包之；如恶心呕吐，即服护心散一帖止呕，次服前药；若胸腹膨满，或大小便闭涩，可服当归连翘散一帖，行五七次，用温米粥汤补止；如疮已成，溃脓不寒不热，止是烂开疼痛，木香三分、甘草六钱、川芎一钱半、白芷一钱四分、粟壳二钱，水五分，酒五分，合煎八分服；如红晕不退，每日于晚进药一帖，吃

交加散四五帖，可服当归连翘散一帖，要行，加大黄，只有热，腹不胀，不用大黄；如疮患要将好，腐肉不脱，可用针刺破皮，令随脓出，将水红花根煎汤洗之，用生肌散掺上，每日洗一次。

【主治】发背，痈疽，发脑，发鬓，发髻；又治脑虚头晕，风湿之症。

【宜忌】忌酸辣、酱面、发气并生冷之物。

21523 龙虎如意丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】硃砂三钱 朱砂四钱 麝香一钱 雄精一钱 冰片二钱 蟾酥四钱 白降丹二钱 五倍子四钱 玄参三钱 乳香（去油） 没药（去油） 雌黄各四钱 前胡三钱 胆矾三钱 轻粉五钱 寒水石三钱 明矾三钱 紫草五钱

【用法】上为末。外用。

【功用】拔毒除腐。

【主治】痈疽发背，对口脑疽，无名肿毒，湿痰流注，附骨疽。

21524 龙虎寿生丹

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】全蝎（去毒，炒）十四个 天麻（煨）二钱 僵蚕（去嘴，炒） 辰砂（水飞） 胆南星 白附子（炮） 白花蛇肉（酒浸，去骨）各一钱 防风二钱 代赭石（醋煨七次） 铁华粉各半钱 龙脑一字 麝香一字

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，金箔为衣。用薄荷煎汤研化，不拘时候服。

【主治】小儿急慢惊风。

21525 龙虎济阴丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】黄柏半斤 知母三两 龟版四两 熟地 陈皮 白芍各二两 锁阳一两半 虎骨一两 龙骨五钱

【用法】上为末，蜜和猪脊髓为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心盐汤送下，干物压之。

【主治】遗精。

【加减】冬，加干姜五钱。

21526 龙虎救生丹

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】水银半两 硫黄一两（二味同研细，至无星为度） 丁香半两 半夏曲一两 人参（去芦）一分 天南星半两（炮） 白附子一分（炮裂）

【用法】上为末，生姜汁煮糊为丸，如萝卜子大。每服一二十丸，煎藿香汤送下；伏热吐者，煎莲子心汤送下。

【主治】一切吐逆不下食，及妊娠恶阻。

21527 龙虎续断丸

【方源】《惠直堂方》卷二。

【异名】龙骨续断丸（《全国中药成药处方集》沈阳方）。

【组成】地龙（醋水养，去泥）七钱五分（用火焙干） 虎前脚骨（酒炙） 续断（酒浸一宿） 萆薢各一两 乳香 穿山甲（炙）各五钱 没药（炙）二钱五分 茴香 狗脊 当归 砂仁（炒） 鹿茸（炙）各一两 杜仲二两 青盐（去土）七钱五分 菟丝四两

【用法】上为末，酒打米粉糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心盐汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：壮筋骨，通经络，活血助肾。

【主治】少年色欲过度，中年不复保养，肾损腰痛难舒。

21528 龙骨远志丸

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】龙骨 朱砂 远志 茯神 茯苓 石菖蒲 人参

【主治】心肾虚弱，不梦而遗。

【备考】《医学集成》本方用法：蜜为丸，朱砂为衣。

21529 龙骨牡蛎汤

《广嗣纪要》卷二。为《金匱》卷上“桂枝加龙骨牡蛎汤”之异名。见该条。

21530 龙骨阿胶散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】龙骨 赤石脂 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 楮皮（炙，锉） 地榆（炙，锉） 阿胶（炙令燥）各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，陈米饮调下，一日三次。

【主治】赤白痢，冷热相攻，腹中疴刺疼痛。

21531 龙骨厚朴汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】厚朴 当归 龙骨 白术各半两 熟艾一分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】诸肠胃阴阳二气不和，水谷气冷，口干肚痛，或则泄泻。

21532 龙骨韭子汤

【方源】方出《证类本草》卷十六引《梅师方》，名见《医学实在易》卷七。

【组成】白龙骨四分 韭子五合

【用法】上为散。每服方寸匕，空心酒调下。

【主治】失精，暂睡即泄。

21533 龙骨海蛤散

【方源】《秘传外科方》引《李防御五痔方》。

【组成】茺莢一两 龙骨一分 海蛤一分（煨） 密陀僧半分

【用法】上为末。先掺，次用贴痔膏贴，一日一次。

【主治】痔疮。

21534 龙骨黄连丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】龙骨 黄连（去须） 白石脂各一两半 胡粉（炒黄） 白矾（熬令汁枯）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下，一日三次。

【主治】赤白痢。

21535 龙骨黄连汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】龙骨(碎)一两 黄连(去须,炒)三分 当归(切,焙) 干姜(炮) 甘草(炙,锉)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,食前温服,一日二次。

【主治】大便滑泄,色如鹬溲。

21536 龙骨救逆汤

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】龙骨二两 桂心一两 甘草一两(炙微赤,锉) 茯神一两 人参一两(去芦头) 麦门冬二两(去心,焙) 牡蛎二两(烧为粉) 蜀漆一两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盞,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】伤寒脉浮,医以火劫,汗出太过必亡阳,心生狂热,起卧不安。

21537 龙骨续断丸

《全国中药成药处方集》(沈阳方)。为《惠直堂方》卷二“龙虎续断丸”之异名。见该条。

21538 龙香犀角丸

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】熟地黄一两(酒浸,捣极细) 生地黄一两(酒浸) 山药一两 天门冬一两(去心) 麦门冬一两(去心) 犀角一两 真京墨一两(煨存性) 牡丹皮一两 五味子一两 鳖甲一两(酒制) 胡黄连一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心白滚汤送下。

【主治】吐血癆症。

21539 龙胆四物汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地黄羌活各一钱 防风 防己各五分 黄连(酒浸一宿)三分 龙胆草(酒浸一宿)五分

【用法】上咬咀。水二钟,煎一钟,空腹温服。

【主治】眼赤暴发作云翳,疼痛。

【备考】方中白芍药、熟地黄,《济阳纲目》作“赤芍药、生地黄”。

21540 龙胆安神丸

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】全当归二钱 龙胆草二钱 黄连二钱 全蝎七只 石菖蒲一钱五分 茯苓一钱五分

【用法】上为末,加猪心血,米糊为丸,如麻子大,朱砂为衣。灯心汤送下。

【主治】小儿痧癆,邪热不清,久嗽不止,肌肉瘦削。

21541 龙胆芦荟丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】芦荟 胡黄连(炒) 龙胆草各一两 川芎 羌活各六钱 当归身 白芍药各一两半 木香八钱 甘草(炙)五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸。每服匀作十丸,用白滚汤化下。

【主治】三焦及肝胆二经积染风热,以致目生云翳,或结癰痈,耳内生疮,发寒作痛,或虚火内烧,肌体羸瘦,发热作渴,饮食少进,肚腹不调,皮干,腹膨胀,口内有疮,牙龈溃烂,或牙齿蚀落,腮颊腐烂,下部生疮者。

【方论选录】是方以白芍药和血补脾胃,当归养血脉为君;芦荟去疳清热,胡黄连疗骨蒸劳热为臣;龙胆草治诸目疾,羌活杀疳虫,逐五内邪气,川芎提清气上升为佐;木香调气,甘草和诸药为使。

21542 龙胆苦参丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】龙胆草一两 苦参三两

【用法】牛胆汁为丸,如梧桐子大。每服五丸,食前以生大麦苗汁,或麦饮送下,一日三次,不减稍增。

【主治】谷疸,劳疸。

【加减】劳疸,加龙胆一两、山梔子三七枚。

21543 龙胆泻火汤

【方源】《点点经》卷四。

【组成】胆草 升麻 柴胡各二钱 黄柏

山梔 黄芩 青黛 苍耳子 羌活 川芎
白芷各一钱五分 甘草三分 生石膏三钱
(引)

【主治】五阳冲头，肺气猖越天精湖，鼻流臭水，口疮破裂，咽喉肿痛，并齿痛脑崩。

21544 龙胆泻肝丸

【北京市中药成方选集】。即《医方集解》引《局方》“龙胆泻肝汤”改为丸剂。见该条。

21545 龙胆泻肝丸

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】龙胆草二两 柴胡四钱 当归八钱 泽泻八钱 木通六钱 蝉蜕三钱 车前子五钱 栀子七钱 黄芩七钱 生地一两 甘草四钱

【用法】水为丸。每服三钱。

【主治】蟹睛症（虹膜凸出）、鱼子石榴症（滤泡性结膜炎）。

21546 龙胆泻肝丸

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）。

【组成】龙胆草二两 栀子三两 胡连一两六钱 木通二两 泽泻三两 熟军一两六钱 甘草二两 车前子三两 当归三两 生地三两 柴胡一两五钱

【用法】上为细末，水打小丸。每次服三钱重，白开水送下，每日早晚各一次。

【功用】泻肝胆之热，清肠胃，利便，助消化。

【宜忌】孕妇忌服。

21547 龙胆泻肝汤

【方源】《医方集解》引《局方》。

【异名】泻肝汤（《类证治裁》卷四）。

【组成】龙胆草（酒炒） 黄芩（炒） 栀子（酒炒） 泽泻 木通 车前子 当归（酒洗） 生地黄（酒炒） 柴胡 甘草（生用）

【功用】《方剂学》：泻肝胆实火，清下焦湿热。

【主治】肝胆火盛之胁痛，口苦目赤，耳肿耳聋；肝胆湿热下注之阴肿阴痒，小便淋浊，

尿血，带下等。

①《医方集解》引《局方》：肝胆经实火、湿热，胁痛耳聋，胆溢口苦，筋痿阴汗，阴肿阴痛，白浊溲血。②《疡科心得集》：鱼口下疳，囊痈。③《中风斟论》：阴湿热痒，疮疡溲血，脉弦劲者。

【方论选录】①《医方集解》：此足厥阴、少阳药也。龙胆泻厥阴之热，柴胡平少阳之热，黄芩、栀子清肺与三焦之热以佐之，泽泻泻肾经之湿，木通、车前泻小肠、膀胱之湿以佐之，然皆苦寒下泻之药，故用归、地以养血而补肝，用甘草以缓中而不伤肠胃，为臣使也。②《重订通俗伤寒论》：肝为风木之脏，内寄胆府相火，凡肝气有余，发生胆火者，症多口苦胁痛，耳聋耳肿，阴湿阴痒，尿血赤淋，甚则筋痿阴痛。故以胆、通、栀、芩纯苦泻肝为君；然火旺者阴必虚，故又臣以鲜地、生甘，甘凉润燥，救肝阴以缓肝急；妙在佐以柴胡轻清疏气，归须辛润舒络；使以泽泻、车前咸润达下，引肝胆实火从小便而去。此为凉肝泻火，导赤救阴之良方。然惟肝胆实火炽盛，阴液未涸，脉弦数，舌紫赤，苔黄腻者，始为恰合。③《金鉴》：胁痛口苦，耳聋耳肿，乃胆经之为病也；筋痿阴湿，热痒阴肿，白浊溲血，乃肝经之为病也。故用龙胆草泻肝胆之火，以柴胡为肝使，以甘草缓肝急，佐以芩、栀、通、泽、车前导大利前阴，使诸湿热有所从出也。然皆泻肝之品，若使病尽去，恐肝亦伤矣，故又加当归、生地补血以养肝。盖肝为藏血之脏，补血即所以补肝也。而妙在泻肝之剂，反作补肝之药，寓有战胜抚绥之义矣。④《成方便读》：夫相火寄于肝胆，其性易动，动则猖狂莫制，挟身中素有之湿浊，扰攘下焦，则为种种诸证。或其人肝阴不足，相火素强，正值六淫湿火司令之时，内外相引，其气并居，则肝胆所过之经界，所主之筋脉，亦皆为患矣。故以龙胆草大苦大寒，大泻肝胆之湿火；肝胆属木，木喜条达，邪火抑郁，则木不舒，故以

柴胡疏肝胆之气,更以黄芩清上,山梔导下,佐之以木通、车前、泽泻,引邪热从小肠、膀胱而出;古人治病,泻邪必兼顾正,否则邪去正伤,恐犯药过病所之弊,故以归、地养肝血,甘草缓中气,且协和各药,使苦寒之性不伤胃气耳。⑤《谦斋医学讲稿》:本方以龙胆为君,配合黄芩、山梔泻肝胆实火;木通、车前、泽泻清热利湿,用生地、当归防其火盛伤阴,再用甘草和中解毒,柴胡引经疏气,总的功能是苦寒直折,泻肝火而清利下焦湿热。故治胁痛、口苦、目赤、耳聋等肝火上逆,亦治小便淋沥,阴肿阴痒等湿热下注之证。

【临证举例】①腿缝肿痛 《得心集医案》:胡塘生,初起寒热交作,次日右胯腿缝肿胀,状如腰子,痛闷难忍,自疑痼毒,延外科治。疡医云外须用药烂开,内服解毒之剂。塘生母子惶惑,不敢用伊敷药,惟服其败毒之方,是夜彻痛非常。次早邀视,余晓以横痃之疾,乃酒醉入房,忍精不泄之因,以致精血凝结,挟有肝经郁火而成,决非毒也。授以龙胆泻肝汤,加山甲、桃仁、肉桂,连服数剂乃消。此症若淹缠日久,用药外敷,不为解散,内结必成鱼口便毒矣。②肝炎 《新医药学杂志》(1978;10:529):用本方去当归、生地,加田基黄为基本方加减,治疗32例肝炎病,临床治愈27例,显效4例,无效1例。其中31例有效病例经3个月~6年的随访,27例已正常工作,4例因过劳或感冒复发。加减法:胁痛甚加川楝子、元胡,腹胀加枳壳、陈皮、川朴、佛手,呕逆加法夏、陈皮、竹茹、藿香,腹泻加白术、茯苓、湿重于热者加薏仁、草果、藿香、茵陈、滑石、苡仁,有血瘀症者加丹参、红花、桃仁等。每日一剂,水煎分二次服,1个月为一疗程。③多囊卵巢综合征 《上海中医药杂志》(1982;12:16):以本方治疗20例,8例基本痊愈,12例好转。处方:龙胆草6~9克,炒黄芩9克,焦山梔9克,泽泻9克,木通3克,车前子9克,当归9克,柴胡6克,生甘草1.5~3

克,生地黄6~12克,每日一帖。或用龙胆泻肝丸,每日9克,分二次吞服。大便秘结加大黄、芒消,或改用当归龙荟丸,经期停服,连续治疗三个月以上。④脂溢性皮炎 《中医杂志》(1985;4:266):以本方治疗50例,治愈10例,显效21例,有效10例,无效9例,总有效率82%。加减法:红斑较盛者加防风、荆芥,继发感染加银花、菊花,痒剧加苦参、白鲜皮,皮损局限于下半身加牛膝、黄柏。每日1剂,3剂为一疗程,有效病例共服药1~4个疗程。有效患者经1年余随访,治愈者无一例复发,显效者未见皮损加重情况。

【现代研究】《中成药研究》(1984;2:21):龙胆泻肝汤能增加幼鼠胸腺重量,产生不同类型的T细胞,从而释放巨噬细胞活化因子,并使巨噬细胞吞噬功能显著加强,致使激活的巨噬细胞又可释放淋巴激活因子,刺激淋巴细胞转化后调节抗体产生,这样有利于疾病的治愈。

【备考】本方改为丸剂,名“龙胆泻肝丸”(见《北京市中药成方选集》)。

21548 龙胆泻肝汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】七味龙胆泻肝汤(《景岳全书》卷五十七)、龙胆汤(《幼幼集成》卷四)。

【组成】柴胡梢 泽泻各一钱 车前子 木通各五分 生地黄 当归梢 草龙胆各三分

【用法】上锉,如麻豆大,都作一服。用水三盏,煎至一盏,去滓,空心稍热服,便以美膳压之。

【主治】肝经湿热,阴痒肿痛,小便赤涩,遗精白浊。

①《兰室秘藏》:阴部时复热痒及臊臭。②《景岳全书》:肝火内炎,上为喉口热疮,下为小便涩痛者。③《济阳纲目》:阴囊肿痛,或溃烂作痛,或睾丸悬挂,及一切湿痒臊臭者。④《医编》:肝经湿热,甚者茎中作痛,

或挺纵不收，白物如精，随尿而下，此筋疝也。

【方论选录】此药柴胡入肝为引；用泽泻、车前子、木通淡渗之味利小便，亦除臊气，是病在下者，引而竭之；生地黄、草龙胆之苦寒泻酒湿热，更兼车前子之类以撤肝中邪气；肝主血，用当归以滋肝中血不足也。

21549 龙胆泻肝汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【异名】龙胆汤（《奇效良方》卷六十）、龙胆清肝汤（《明医杂著》卷六）、龙胆草汤（《证治宝鉴》卷十）。

【组成】黄芩七分 柴胡一钱 甘草（生）人参 天门冬 黄连 知母 龙胆草 山梔子 麦门冬各五分 五味子十个

【用法】上咬咀，作一服。水二盏，煎至一盞，去滓，空腹温服。

【主治】肝经湿热，口苦生疮，筋痿爪枯，小便赤涩。

①《卫生宝鉴》：因怒或热盛，胆汁上溢，口苦，名曰胆瘴。②《明医杂著》：肝经湿热，小便赤涩，或寒热，胁胀，痰咳等，凡肝经有余之症。③《医方考》：肝气热，色青爪枯口苦，筋膜干而挛急者，名曰筋痿。

【宜忌】忌辛热物。

【方论选录】《医方考》：肝主谋虑，胆主决断，谋虑则火起于肝，不决则火起于胆。柴胡性温味苦而气薄，故入厥阴、少阳；黄芩、黄连、龙胆草、山梔子得柴胡以君之，则入肝胆而平之矣；制肝者惟金，故用无、麦门冬、五味、知母以益肺；畏肝者惟土，故用人参、甘草以益脾。肝者，东方木也；色青者，肝病而色自见也；肝主筋，爪者筋之余，肝热故令爪枯也；口苦者，胆为肝之府，咽为之使，胆热则胆汁上溢于咽，故令口苦也；肝主筋膜，筋膜干则燥而挛急，挛急则手足不用，故曰筋痿。是方也，黄芩、黄连、山梔、胆草，皆足以泻肝火；君之以柴胡，则能条达乎肝胆矣；木盛而兼燥金之化，故令挛急，

天麦门冬、知母、五味，味厚而润者也，故足以养筋而润燥；若生甘草、人参者，所以养乎阳气也，《经》曰：阳气者，精则养神，柔则养筋，是故用之。

21550 龙胆泻肝汤

《校注妇人良方》卷二十四。为《外科发挥》卷六“加减龙胆泻肝汤”之异名。见该条。

21551 龙胆泻肝汤

【方源】《医统》卷六十。

【组成】龙胆草八分 升麻 柴胡各三分 羌活根 酒黄柏各一钱 防风根 麻黄根各二钱 苍术五分 猪苓 泽泻各三分 藁本 红花 当归各二分 黄芩五分 炙甘草三分

【用法】上咬咀，作一服。水二盏煎，稍热服。

【主治】尿黄，臊臭淋漓，两丸如水，汗浸两胯，阴头亦冷。

【宜忌】忌酒、面。

21552 龙胆泻肝汤

【方源】《东医宝鉴》卷四引《入门》。

【组成】龙胆草 柴胡 泽泻各一钱 木通 车前子 赤茯苓 生地黄 当归 酒拌山梔仁 黄芩 甘草各五分

【用法】上锉，作一帖。水煎，空心服。

【主治】肝脏湿热，男子阴挺肿胀，妇人阴挺疮疡，或阴茎湿痒，出脓水，此因酒得之。

21553 龙胆泻肝汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】龙胆草 连翘 生地黄 泽泻各一钱 车前子 木通 归尾 山梔 甘草 黄连 黄芩各五分

【用法】水二钟，煎八分，食前服。

【主治】①《外科正宗》：肝经湿热，玉茎患疮，或便毒、悬痈，小便赤涩，或久溃烂不愈；又治阴囊肿痛，红热甚者。②《金鉴》：肝心二经风火，缠腰火丹，色红赤，形如云片，上起风粟，作痒发热。

【加减】便秘，加大黄二钱。

21554 龙胆泻肝汤

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】柴胡 青皮 龙胆草 山梔 大黄 白芍药 木通 连翘 黄连 滑石各等分

【用法】水煎服。

【主治】肝经湿热，或囊痈便毒，下疳悬痈，肿焮作痛，小便涩滞，或妇人阴疮痒痛，或男子阴挺肿胀，或出脓水；湿热下疳，肿痛尿涩，及茎缩纵，痒痛，出白津。

21555 龙胆泻肝汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】龙胆草 知母 川连 人参 麦冬 天门冬 山梔 黄芩 甘草 柴胡

【主治】肝热舌音不清，身热口渴，面色多红，二便赤涩，神智昏沉，语言不便，脉左关弦数；肝火刑金，肺热身肿，喘咳烦满，不得仰卧，喘息倚肩，身首皆肿，小便赤涩；木火乘脾，积热痠软，四肢烦疼，时或重滞，手足心时冷时热，或发热如疟，时或清爽，时或倦怠，时或身重，如负重物，小便黄赤，大便乍难乍易，脉多弦数；燥火腹痛，目黄便赤，痛连小腹；热积腹痛，脉左关洪数。

21556 龙胆泻肝汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】龙胆草 柴胡 黄芩 川黄连 山梔 知母 麦冬 甘草

【主治】外感齿痛，身发寒热，痛连头目，甚则攻注牙龈，肿痛作脓，属肝经积热者。

【加减】元气虚，加人参；血虚，加当归、白芍药；大便结，加大黄；气结，加青皮。

21557 龙胆泻肝汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】胆草 柴胡 黄芩 山梔 连翘 知母 麦冬 川连 人参 甘草

【主治】肝火腹胀，目睛黄，两胁痛，小腹胀急，或攻刺作痛，或左边胀甚，小便赤，夜不得寐，脉左关弦数。

21558 龙胆泻肝汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】黄连 山梔 黄芩 柴胡 青皮 龙胆草 木通 甘草 丹皮 生地 当归 白芍药

【主治】积热泄泻，发热口渴，肚腹皮热，时或疼痛，小便赤涩，泻下黄沫，肛门重滞，时结时泻，脉左关数。

21559 龙胆泻肝汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】柴胡 黄芩 山梔 知母 麦冬 黄连 人参 胆草 甘草 大黄

【主治】肝火五更泄泻，胁肋常痛，痛连小腹，夜多不寐，脉左关洪大。

21560 龙胆泻肝汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】龙胆草 连翘 生地 黄芩 黄连 山梔 归尾 甘草 泽泻 车前子 木通 大黄

【主治】水疝，皮色光亮，状如水晶，脉来弦数者。

21561 龙胆泻肝汤

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】胆草 柴胡 黄芩 山梔 川连 知母 麦冬 人参 甘草

【主治】肝经血室伏火，而施泄下血。

21562 龙胆泻肝汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】龙胆草 柴胡 黄芩 川黄连 麦门冬 陈胆星 知母 甘草 真青黛 山梔

【主治】肝胆有火，目不能合；胆涎沃心，目不得瞑。

21563 龙胆泻肝汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】龙胆草 归尾各二钱 银花 花粉 连翘 黄芩各一钱半 丹皮 防风 木通 知母 甘草各一钱

【用法】水煎服。

【功用】马培之注：泻肝火，解毒。

【主治】①《外科全生集》：牙痛。②《外科证治全书》：肝经湿热，小便赤涩，或囊痈

下疳，便毒杨梅。

21564 龙胆泻肝汤

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】龙胆草一钱 软柴胡五分 小青皮一钱半(炒) 怀生地五钱 车前子三钱(炒) 全当归二钱 黑山栀一钱半(炒) 鲜生姜一片

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】肝胆火逆，面肿连颐，脉数者。

【方论选录】恼怒伤肝，肝胆火逆，而湿热不消，循经彻络，故面肿漫连两颐焉。生地滋阴以降胆火，胆草直折以平肝火，青皮破气平逆，柴胡泄热疏肝，山栀降屈曲之火，车前子利湿热之气，当归活血养肝，生姜散郁退肿焉。水煎温服，使火降气平，则湿热自化，而面肿连颐无不退矣。此清热利水之剂，为肝胆火逆颐肿之专方。

21565 龙胆泻肝汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】龙胆草(酒炒) 天冬 麦冬 甘草 黄连各一钱 黄芩一钱半 柴胡一钱半 山栀 知母各一钱 五味三分

【用法】水煎，热服。

【主治】肝经湿热阴挺；肾本不虚，而肝经湿热，火旺筋缩，茎中或痛或痒，或挺纵不收，白物如精，随尿而下者，此筋疝也。

21566 龙胆泻肝汤

【方源】《羊毛瘟证论》。

【组成】龙胆草三钱 黄芩二钱 山栀子二钱 木通一钱 车前一钱 银柴胡一钱 甘草一钱 当归二钱 生地黄五钱

【用法】水煎，去滓，下黄蜜三钱，和匀，温服。

【主治】温邪病退，余毒留于肝肾，胁痛耳聋，口苦咽干，筋痿阴汗，阴囊肿痛，白浊便血，忽寒忽热。

【加减】如伏邪未尽，加蝉蜕七枚、僵蚕二钱。

21567 龙胆泻肝汤

【方源】《医钞类编》卷二十二。

【组成】胆草 连翘 生地 泽泻一钱 车前仁 木通 黄芩 当归 梔仁 甘草(生)五分 大黄(生用)二钱

【用法】水煎，食前服。

【主治】缠腰火丹，色红赤者。

【备考】方中甘草以上药物用量原缺。

21568 龙胆泻肝汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】胆草 山栀(炒) 知母(盐水炒) 黄连(酒炒) 甘草 柴胡 牛蒡 天冬 黄芩 麦冬 元参

【功用】泻肝化痰。

【主治】疹后余毒蕴蓄于肝，又因跌打惊恐，致令热盛生风，风痰壅聚，发搐，目直口噤，身热口渴，发过面色如常，良久复作，此急惊风，属肝木风邪有余之证。

21569 龙胆泻肝汤

【方源】《温热经解》。

【组成】龙胆草一钱半 酒芩一钱 泽泻一钱 生地六钱 北柴胡三分 车前子一钱 青皮七分 黑山栀一钱 甘草一钱

【主治】火邪伤人，耳聋目瞑者。

21570 龙胆泻肝汤

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】龙胆草(酒炒) 归尾各一钱半 黄芩(酒炒) 泽泻 木通 车前子 生地(酒炒) 生甘草各一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝胆经实火、湿热，胁痛、耳聋。

21571 龙胆泻肝汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】胆草 赤芍 归尾 川芎 蒙花 黄芩 决明 蝉蜕 荆芥 甘草

【主治】肝火，目赤痛。

21572 龙胆泻肝汤

【方源】《竹林女科证治》卷三。

【组成】龙胆草(酒炒) 人参 天冬(去心) 甘草 黄连(炒) 梔子(炒) 知母各五分 黄芩七分 柴胡一钱 五味子三

分

【用法】水煎。温服。

【主治】暴怒伤肝而动火，产户不闭者。

21573 龙胆泻毒汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】柴胡 龙胆草 山梔各一钱 大黄 黄连 滑石 木通各一钱五分 甘草五分

【用法】加灯心三十茎，水煎，食前服。

【主治】一切下疳。

21574 龙胆草擦剂

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】胆草十斤

【用法】水煎，第一次加水 20 升，开锅后煮 1 小时；第二次加水 10 升，开锅后煮 40 分钟。两次药液合并，过滤，浓缩为 9600 毫升，装瓶。涂于患处。

【功用】清热解毒，止痒止痛。

【主治】急性亚急性湿疹，过敏性皮炎，日光性皮炎，小儿痱子，丘疹性荨麻疹，急性荨麻疹，毛囊炎等。

21575 龙胆茯神丸

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】龙胆草 茯神 胡黄连各三钱 石菖蒲 远志肉 香附 陈神曲 芦荟各三钱 人参 朱砂各二钱 地骨皮 干蟾各五钱（一方有麦芽三钱）

【用法】蒸饼为丸，如米大，朱砂为衣。每服三十丸，荆芥汤送下。

【主治】小儿心疳，一名惊疳，面黄颊赤，身体壮热，唇红鼻燥，口舌生疮，胸膈烦闷，小水短赤，五心烦热，口渴引饮。

21576 龙胆清肝汤

《明医杂著》卷六。为《卫生宝鉴》卷十二“龙胆泻肝汤”之异名。见该条。

21577 龙胆清肝饮

【方源】《顾松园医镜》卷六。

【组成】龙胆草 黄芩 黄连各一二钱 瓜蒌一枚 麦冬五钱至一两 玄参二三钱 知母三五钱 芍药三钱 羚羊角三五钱

【主治】热邪传入厥阴，烦满囊缩，消渴，气上冲气，心中痛热，饥不欲食，食则吐蛔者。

【加减】吐蛔，加乌梅；如误下，利不止者，去瓜、麦、玄参、知母，倍芍药。

21578 龙胆清肝散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】龙胆草 柴胡 丹皮 焦梔 黄芩 知母 川连 红花 连翘 赤芍 生地 当归 川芎 香附 青皮

【功用】清肝火，疏肝气，调性情，和营卫。

【主治】经闭。

【方论选录】是方龙胆苦寒，清肝火为君；柴、丹、梔、香、青皮疏肝气为臣；芩、连、知、翘清上中下三焦伏火为佐；而四物之加红花、赤芍和血行血，为肝家之正药也。

21579 龙宫救苦丹

【方源】《痘疹仁端录》卷十一。

【组成】升麻 白芍 香附 黑姜 荆芥 橘红 蝉蜕 人参 黄耆

【用法】酒煎服。

【主治】妇人经行出痘。

21580 龙莲芡实丸

【方源】方出《种福堂方》卷二，名见《医学实在易》卷七。

【组成】龙骨 莲须 芡实 乌梅肉各等分

【用法】上为末，用山药为丸，如小豆大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】精气虚，滑遗不禁。

21581 龙蚝理痰汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】清半夏四钱 生龙骨六钱（捣细） 生牡蛎六钱（捣细） 生赭石三钱（轧细） 朴消二钱 黑脂麻三钱（炒，捣） 柏子仁三钱（炒，捣） 生杭芍三钱 陈皮二钱 茯苓二钱

【主治】因思虑生痰，因痰生热，神志不宁。

【方论选录】此方，即理痰汤以龙骨、牡蛎代芡实，又加赭石、朴消也。其所以如此加

减者,因此方所主之痰,乃虚而兼实之痰。实痰宜开,礞石滚痰丸之用消、黄者是也;虚痰宜补,肾虚泛作痰,当用肾气丸以逐之者是也。至虚而兼实之痰,则必一药之中,能开痰亦能补虚,其药乃为对证,若此方之龙骨、牡蛎是也。盖人之心肾,原相助为理。肾虚则水精不能上输以镇心,而心易生热,是由肾而病及心也;心因思虑过度生热,必暗吸肾之真阴以自救,则肾易亏耗,是由心而病及肾也。于是心肾交病,思虑愈多,热液凝,痰涎壅滞矣。惟龙骨、牡蛎能宁心固肾,安神清热,而二药并用,陈修园又称为治痰之神品,诚为见到之言,故方中用之以代芡实,而犹恐痰涎过盛,消之不能尽消,故又加赭石、朴消以引之下行也。

21582 龙射破棺散

【方源】《普济方》卷二八七。

【组成】藿香 地丁 瓜蒌 红藤 甘草 紫草各一两 黄耆五钱 当归五钱

【用法】上为细末。每服二钱,水调下。

【主治】一切痼疽、发背、肿恶。

21583 龙脑川芎丸

《御药院方》卷一。为原书同卷“加减薄荷煎丸”之异名。见该条。

21584 龙脑川芎丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】桔梗二钱半 片脑六分 砂仁二分 白豆蔻(去壳)五分 薄荷一钱三分 川芎 防风 炙草 酒芩 连翘各一钱

【用法】炼蜜为丸,每两作二十丸。每服一二丸,茶清化下。

【功用】消风化滞,除热清痰,通利七窍。

21585 龙脑天麻煎

【方源】《局方》卷一。

【组成】甜瓜子(汤洗令净) 浮萍草(拣,洗净) 川乌(炮,去皮脐) 地榆(去苗,刮削令净) 黑参(洗净,焙)各五十两 天麻(去苗)一百两(上六味为细末,用雪水、白沙蜜各一十五斤零一十两同化开,用绢袋

子滤过,银、石器内慢火熬成稠膏) 生龙脑(研)八两 麝香(研)四两

【用法】上为细末,除龙、麝外,用天麻乌头膏和搜令匀,放冷,入龙、麝再搜令匀,入白内捣,搓为挺子。每服一皂荚子大,与薄荷同嚼,茶、酒任下,不拘时候。治瘫痪风,并服见效;如破伤风,黑豆淋酒送下;要发汗,用煨葱、热酒并服三服,常服亦得。

【主治】一切风及瘫痪风,半身不随,口眼喎斜,语涩涎盛,精神昏愤;或筋脉拘挛,遍身麻痹,百节疼痛,手足颤掉;及肾脏风毒上攻,头面虚肿,耳鸣重听,鼻塞口干,痰涎不利,下注腰腿,脚膝缓弱,肿痛生疮,又治妇人血风攻注,身体疼痛,面浮肌瘦,口苦舌干,头旋目眩,昏困多睡;或皮肤瘙痒,瘾疹生疮;暗风、夹脑风、偏正头痛。

21586 龙脑牛黄丸

【方源】《传家秘宝》卷三。

【组成】真槐胶一分(须是真好,通明光净者) 真阿胶一分(微炙令肥黄) 牛黄一分(别研) 膩粉一分(后入) 水银一分(用枣肉同研无星用) 蟾蜍一分(去足,微用真酥酒炒) 白花蛇肉一分(炙令黄色) 铅白霜半两(别研) 生龙脑一分(别研) 真麝香一分(别研) 真阿魏半分(面裹,烧令面热,不用面)

【用法】先将槐胶、阿胶、蟾蜍、蛇等为细末,然后依次第细研,令诸药匀,炼白沙蜜为丸,如皂子大。若是新得病者,每用一丸,细嚼,以生姜汤送下,更用酒少许冲。秋冬在房内将养,须是四面不透风,遮闭门户,床前著火。服药后,但是病处有汗出,恶气息也,不病处无汗,上膈涎痰出,又暴自利一两行,腹中鸣,三服后便见减退,后三日吃一服,服药后未得出门,候三服毕。

【主治】急中风,或潮涎稍退,风缠四肢,变为瘫痪,手足不随,口眼喎斜。

21587 龙脑丹砂丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【异名】含化龙脑丸(《医方类聚》卷七十五引《御医撮要》)。

【组成】龙脑(研)一钱 丹砂(研)半两 人参 白茯苓(去黑皮)各一两 羚羊角(镑) 犀角(镑) 甘草(炙, 锉) 升麻 恶实(炒)各半两 麦门冬(去心, 焙)一两半 马牙消(研) 黄药各一分

【用法】上为末和匀, 炼蜜为丸, 如鸡头子大。每服一丸, 食后、临卧含化咽津。

【主治】咽喉肿痛, 连舌颊、牙根赤肿, 心烦, 咽干多渴, 眠睡不稳。

21588 龙脑水银丸

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】龙脑(研) 麝香(研)各一字 猪牙皂荚(炙) 甘遂各一分 膩粉(研)一钱 青黛(研) 水银(结沙子)各二钱 巴豆(去皮心膜, 研)七粒(不出油)

【用法】上为末, 面糊为丸, 如麻子大。一岁一丸, 用薄荷汤送下。

【功用】宣转风热。

【主治】小儿急惊。

21589 龙脑玉壶丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】人参 防风(去叉)各二钱 赤茯苓(去黑皮)一钱半 干蝎(去土, 炒)半钱 白僵蚕(炒) 硼砂(研)各一钱 白附子(炮) 天麻 麝香(研) 天南星(炮) 玄明粉(研)各一分 甘草(炙, 锉) 龙脑(研)各半两 凝水石(煨通赤, 水浸, 出火毒, 后研)十两(七两入药, 三两为衣)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如鸡头子大, 用凝水石粉为衣。每服一丸, 食后细嚼, 以荆芥汤送下; 茶清亦得。

【主治】一切风热。

21590 龙脑甘露丸

【方源】《证类本草》卷四引《集验方》。

【组成】寒水石半斤(烧半日, 净地坑内, 盆合四面, 湿土壅起, 候经宿取出) 甘草

末 天竺黄各二两 龙脑二分

【用法】糯米膏为丸, 如弹子大。蜜水磨下。

【主治】①《证类本草》引《集验方》: 风热心躁, 口干狂言, 浑身壮热, 及中诸毒。②《普济方》引《广南四时摄生论》: 一切风热伤寒热病。

【备考】《普济方》引《广南四时摄生论》本方用法: 生姜蜜水磨下半丸。如中药毒, 入板蓝根汁同服。小儿一丸分为四服, 更少入膩粉。

21591 龙脑地黄膏

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】川大黄(别捣) 甘草(横纹者, 别捣) 麝香一钱(别研) 雄黄(水窟者)一分(别研) 生脑子一钱(别研)

【用法】上五味, 各修制了, 再入乳钵内同研细, 炼蜜为膏, 油单裹。用时旋丸如皂子大, 煎薄荷汤化下; 如小儿、大人睡惊, 及心神恍惚, 煎金银汤下一丸; 常服, 新汲水下。

【功用】解暑毒。

【主治】小儿急慢惊风, 涎痰上潮心胸, 天吊惊, 缠喉风; 小儿胸膈不利, 一切热毒。

【加减】如有大人阳毒伤寒, 加轻粉二厘子、龙脑少许, 水化下一丸, 如杏核大。

21592 龙脑芎辛丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】芎藭二两 细辛(去苗叶) 甘草(炙)各半两 龙脑(研)一分 天南星(炮) 秦艽(去苗土) 丹砂(研)各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如樱桃大。每服一丸, 食后嚼, 以茶清或荆芥汤送下。

【主治】风热头痛, 痰涎壅闷, 眩晕昏倦。

21593 龙脑芎犀丸

【方源】《局方》卷一。

【组成】石膏(细研) 川芎各四两 生龙脑(别研) 生犀角 山梔子(去皮)各一两 朱砂(研, 飞)四两(内一两为衣) 人参(去芦) 茯苓(去皮, 用白者) 细辛(去苗) 甘草(炙)各二两 阿胶(碎,

炒)一两半 麦门冬(去心)三两

【用法】上除别研后入外,并为细末,炼蜜为丸。每服一九至二丸,食后细嚼,茶、酒任下。

【功用】消风化痰,除心肺邪热,去头面诸风。

【主治】偏正头痛,心怔烦郁,面热目眵,鼻塞脑昏,痰热咳嗽,咽膈不利。

21594 龙脑安神丸

【方源】《御药院方》卷一。

【异名】安神丸(《痘疹传心录》卷十七)。

【组成】茯神(去粗皮,取末) 人参(去芦头) 麦门冬(去心) 乌犀(取末) 朱砂各二两 真地骨皮 甘草(取末) 桑白皮(取末)各一两 马牙消(别研)一钱 龙脑(别研) 牛黄(别研) 麝香(别研)各三钱 金箔三十五箔

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大,金箔为衣。如有风痼病多岁,冬月用温水化下,夏月凉水化下,不拘时候,多岁病服如二三年病,日进三服,小儿一九二三次服。治男子妇人虚劳发热喘嗽,新汲水一盞化开。男子妇人语涩舌强,日进三服,食后,温凉水化下。

【主治】男子、妇人、小儿五积癰瘤,无问远年近日,发作无时;及男子、妇人虚劳发热喘嗽,语涩舌强。

21595 龙脑安神丸

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【异名】龙脑膏(《痘科类编》卷三)

【组成】大辰砂一钱 龙脑五厘 牛黄五厘

【用法】上为细末,取猪心中血、小猪尾尖血为丸,如绿豆大。每服一丸,新汲水化下,灯心煎汤亦可。

【主治】痘中昏闷谵妄。

【备考】本方原名龙胆安神丸,但方中无龙胆而有龙脑,据《景岳全书》改。

21596 龙脑鸡苏丸

【方源】《局方》卷六。

【异名】鸡苏丸(《普济方》卷五十八引《如宜方》)。

【组成】柴胡(要真银州者)二两(锉,同木通以沸汤大半升浸一二宿,绞汁后入膏) 木通(锉,同柴胡浸) 阿胶(炒微燥) 蒲黄(真者,微炒) 人参各二两 麦门冬(汤洗,去心,焙干)四两 黄耆(去芦)一两 鸡苏(净叶)一斤(即龙脑薄荷也) 甘草(炙)一两半 生干地黄末六两(后入膏)

【用法】上除别研药后入外,并为细末,将好蜜二斤先炼一二沸,然后下生干地黄末,不住手搅,时时入绞下前木通、柴胡汁,慢慢熬成膏,勿令焦,然后将其余药末同和为丸,如豌豆大。每服二十丸,嚼破,热水送下,不嚼亦得。虚劳烦热,消渴惊悸,煎人参汤送下;咳嗽唾血,鼻衄吐血,将麦门冬(汤浸,去心)煎汤送下,并食后、临卧服之;惟血崩下血,诸淋疾,皆空心食前服;治淋,用车前子汤送下。

【功用】①《局方》:除烦解劳,消谷下气,散胸中郁热,凉上膈,解酒毒,常服聪耳明目,开心益智。②《医方集解》:清热理血。

【主治】肺热咳嗽,鼻衄吐血,血崩下血,血淋,热淋,劳淋,气淋,消渴,惊悸,胃热口臭,肺热喉腥,脾疸口甜,胆疸口苦。

【方论选录】《医方集解》:此手足太阴、少阳药也。肺本清肃,或受心之邪焰,或受肝之亢害,故见诸证。薄荷辛凉,轻扬升发,泻肺搜肝,散热理血,故以为君;生地黄凉血,炒蒲黄止血,以疗诸血;柴胡平肝解肝热,木通利水降心火,麦冬、阿胶润燥清肺,参、耆、甘草泻火和脾。此亦为热而涉虚者设,故少佐参、耆也。

21597 龙脑鸡苏丸

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】龙脑(研)一分 鸡苏 甘草(炙) 乌梅(用肉) 紫苏叶各一两 麦门

冬(去心,焙) 白梅(用肉) 人参各半两 天门冬(去心,焙)半分 麝香(研) 甜消(研)各一钱

【用法】上为末,再同研匀,炼沙糖为丸,如鸡头子大。每服一丸,食后人参汤嚼下。

【主治】上膈虚热,咽干。

21598 龙脑鸡苏丸

【方源】《元戎》卷五。

【组成】鸡苏叶(龙脑薄荷是也) 黄耆二两 麦门冬(去心)四两 甘草一两半 黄连一两 干地黄六两(为末) 人参二两 木通二两 新蒲黄二两 阿胶(炒焦)二两 柴胡(银州鼠尾红色者)二两(锉,同木通沸汤半升,浸一日夜,绞取汁)

【用法】上为细末,用西路好蜜二斤余,先炼一二沸,然后下生地黄末,不住手搅,时时入绞下者木通、柴胡汁,慢火熬成膏,勿令火紧,焦了;然后将余药末为丸,如豌豆大。每服二十丸,白汤送下。虚劳烦热,梔子汤送下;肺热,黄芩汤送下;心热悸动恍惚,人参汤送下;唾咯衄血,去心麦门冬汤送下;脾胃热,赤芍药、生甘草汤送下;肝热,防风汤送下;肾热,黄柏汤送下。以上诸证,并食后、临卧服。治五淋及妇人血崩漏下,车前子汤送下;茎中痛,蒲黄、滑石各一钱,温水调下;室女虚劳,寒热潮作,煎柴胡、人参汤送下;痰嗽者,生姜汤送下;气逆者,橘皮汤送下。

【功用】除劳解热,下气散郁,清神爽气,润肺开心,益志滋肝,补肾,令人身强体轻,耳目聪明,利膈,化热痰,去膀胱中积热。

【主治】肺热咳血,心热惊悸,脾胃热口甘吐血,肝胆热气出口苦,肾热神志不定,上而酒毒、膈热、消渴,下而血痢、五淋、血崩。

【备考】《兰台轨范》有黄芩,无黄耆。

21599 龙脑青金丸

《魏氏家藏方》卷十。为《幼幼新书》卷十九引《庄氏家传》“龙脑青金丸”之异名。见该条。

21600 龙脑青金散

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】青黛 硼砂各一钱 柏末 枯矾 雄黄各五分 飞丹 冰片各一分 铜绿三分

【用法】上为细末。井花水调,敷口中。

【主治】鹅口疳,走马疳,锁口疳。

21601 龙脑青箱丸

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】龙脑半两(细研) 青箱子 人参(去芦头) 车前子 白茯苓 芎藭 羌活 细辛 天麻 防风(去芦头) 石决明(捣细,研,水飞过) 黄耆(锉)各一两 牛黄半两(细研) 旋覆花三分 麝香一分(细研) 曾青半两(烧过,细研)

【用法】上为末,入研了药,都研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食后煎羌活汤嚼下。

【主治】肝脏风虚,时多冷泪,眼目昏暗。

21602 龙脑金水膏

【方源】《医方类聚》卷六十九引《必用全书》。

【组成】葵仁十个(纸裹,研去油,如霜极细) 朱砂二钱(光明者,另研极细) 硼砂一钱(光净者,另研极细) 干胭脂一钱(好者,研为细末) 龙脑一钱(片子者,另研极细) 麝香半钱(真者,另研极细)

【用法】上药各为极细末,用好蜜六两,重罗或重纱滤过,将六味药乳钵中同研,渐渐下蜜四两,匀,用瓷器封合,用度点眼。

【功用】驱风凉血,明目通神。

【主治】风热上壅,赤目翳障,两眼筋膜胗肉攀睛,迎风多泪,视物昏花,倒睫拳毛,热泪不止。

21603 龙脑破毒散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】盆消(研细)四两 白僵蚕(微炒,去嘴,为末)八钱 甘草(生,为末)八钱 青黛八钱 马勃(末)三钱 蒲黄半两 脑子一钱 麝香一钱

【用法】上为细末,用瓷合子收。如有病证,

每用药一钱，用新汲水少半盏调匀，细细呷咽。若是诸般舌胀，用药半钱，以指蘸药，擦在舌上下，咽津如是。小儿一钱作四五服，亦如前法用，并不拘时候。

【主治】急慢喉痹，咽喉肿塞不通。

21604 龙脑破毒散

【方源】《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）。

【组成】僵蚕八分（微炒，去嘴） 青黛八分 甘草八分 生蒲黄五分 马勃三分 冰片二分 麝香一分 西瓜霜四钱

【用法】上为极细末，绢罗筛过，玻璃瓶封藏。纸筒或苇管吹喉。

【功用】止痛，消肿，去腐。

【主治】喉症。

【宜忌】忌食腥、辣。白喉忌用。

21605 龙脑润肌散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】黄丹一两 密陀僧半两 轻粉一钱半 麝香半两 龙脑一字

【用法】上为细末。掺药在疮上，用青帛涂之，内留一眼子。

【主治】杖疮，热毒疼痛。

21606 龙脑黄连膏

《原机启微》卷下。为《圣济总录》卷一〇四“黄连膏”之异名。见该条。

21607 龙脑黄连膏

【方源】《全国中药成药处方集》（杭州方）。

【异名】光明眼药。

【组成】梅冰片二钱五分 淡硃砂一钱

【用法】上为细末，用黄连膏四两调匀。每日早、晚点入眼角。

【主治】肝热上升，目红难开，畏光羞明，热痛多泪，睛沿赤烂，障翳遮睛。

【宜忌】忌葱、酒、大蒜发物。

21608 龙脑清膈汤

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】黍粘子六两（拣净，炒） 荆芥穗四两 鸡苏叶一两半（去土） 甘草（锉，炒赤色） 瓜蒌根 桔梗（炒黄色） 紫苏子

（炒）各二两 龙脑二钱

【用法】上为细末。每服一二钱，食后或临睡白汤点服。

【功用】治风热，化痰，利咽喉，清头目，消疮疹。

21609 龙脑硼砂散

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】龙脑半两 南硼砂一两

【用法】上为极细末。每用少许，两鼻内搐之。

【主治】头目风热。

21610 龙蛭救逆汤

《类证治裁》卷二。为《伤寒论》“桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤”之异名。见该条。

21611 龙蛇换骨丹

【方源】《愈后方》。

【组成】生草乌半斤（去皮尖，切片） 生姜半斤（切片）

【用法】共入锅内，焙炒干，为细末，加麝二分，加白荆皮研末，与前药等分平对。每服六分，酒调下。如伤风寒，不对白荆皮末，每服三分，俱卧时酒调下。忌风取汗为度。

【主治】半身不遂，风瘫骨痛，麻痺不仁。

21612 龙蛭宣痹丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】干地龙（酒炒）一两 虻螂 全蝎 川甲（俱用酒炒）各五钱 露蜂房（炒） 制川乌各三钱 明乳香二钱 麝香三分

【用法】用酒煮黑大豆汁泛为丸。每服一钱，陈酒送下。

【主治】周痹。

21613 龙麝青金丸

【方源】《幼幼新书》卷十九引《庄氏家传》。

【异名】龙脑青金丸（《魏氏家藏方》卷十）。

【组成】脑 麝各一字 青黛 雄黄 朱砂 胡黄连 芦荟 膩粉各一分

【用法】上为末，猪胆蒸饼为丸，如绿豆大，

晒干，瓷器收。每服二三丸，一切惊悸、体热、疮疥，薄荷汤送下；一切疳气、泻痢、蛔虫，米饮送下。常服百病不生。

【功用】镇心压惊，安五脏，益颜色，长肌肤。

【主治】潮热盗汗，疳蛔腹大，泻痢，疮疥。

21614 龙麝追毒丹

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】龙麝追毒散（《普济方》卷二七五）。

【组成】龙脑三分 麝香一分 轻粉 粉霜 雄黄各五分 乳香 砒黄各一字 巴豆十四个（去皮心膜）

【用法】上为极细末，面糊为丸，如麦粒大。每用之，先以针捻疮口，入药，量轻重上药。后一两时辰，肿痛尽足应。如患下疳疮，蚀茎或半或尽者，用浆磨一两粒搽之。

【功用】《普济方》：去死肉，生肌。

【主治】一切恶疮内毒气未出尽者；箭头、针刺、痈疖、恶疮，内有毒气不着骨者；破伤风，恶疮不痛者。

21615 龙麝追毒散

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】龙脑三钱 轻粉 粉霜 雄黄各半钱 乳香 没药各一字 血竭半钱 硫黄半字 麝香半字 巴豆十四个（去皮心，出油）

【用法】上为细末，调生面糊为丸，锭子如麦粒大小。如用时，先用针破疮，入药，量轻重者，一二丸可得也，上药后一两时辰，疮肿尽足应也。如患下疳疮，蚀茎或半或尽者，用温浆水磨药二丸，搽之。

【主治】恶疮，毒气未出尽者；箭头、针刺、痈疖、恶疮，内有毒气，在内不着骨者；破伤风恶不痛者。

21616 龙麝追毒散

《普济方》卷二七五。为《卫生宝鉴》卷十三“龙麝追毒丹”之异名。见该条。

21617 龙麝紫芝煎

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】何首乌 天麻（去苗） 吴白芷 防风（去苗） 羌活（去苗） 甘草（炙） 黑附子（炮） 甘松 胡椒 良姜 零陵香 藿香叶 肉桂 川姜（炮）各一两 白檀半两 麻黄（去节）一两 龙脑二分半 麝香二分半

【用法】上为细末，炒米粉四两，黄色糯米粥汁，入白蜜二两和就，作锭子，一寸半长。每服一锭，细嚼，茶酒送下。如病重，每服三锭子，一日三次。

【主治】一切诸风，半身不随，口眼喎斜，头旋耳鸣，鼻塞咽干，四肢麻木疼痛，痰毒下注，腰膝沉重，筋挛骨冷，皮肤瘙痒，昏迷困倦，饮食进退，行步少力。

21618 龙麝紫芝煎

【方源】《永乐大典》卷一三八七九引《风科集验》。

【组成】附子一两（炮，去皮脐） 川乌（炮，去皮脐） 草乌头（锉，炒） 桂心 细辛（去苗） 干姜各一两（炮） 白芷 零陵香 藿香叶 白茯苓（去皮） 香附子（炒） 桂花 白附子（炮） 丁香 木香各一两半 甘草（炙） 细墨各二两（烧去烟） 麻黄八两（去节） 胡椒二钱 脑子（另研） 麝香各一钱（研） 甘松二两半（去土） 米粉四两（炒紫色） 糯米一升

【用法】上为细末，用糯米粥为膏，捏为锭，约筋样大。每服一寸，细嚼，好酒送下；茶清亦得，每日进二服，病重者二寸。

【主治】诸中风痹，痲痲痲痲，语言謇涩，痰涎壅塞。

【宜忌】忌食猪、鱼、杂肉、动风之物。

21619 龙麝紫芝煎

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】香白芷四两 麻黄（去根节） 藿香叶（去土） 天麻（去苗） 甘草（炙） 羌活（去芦头）各一两 细辛（去叶土） 藁本（去土） 全蝎（去毒，炒） 川芎 雄

黄(别研) 白附子(炮)各半两 脑子一钱(别研) 麝香半钱(别研)

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每一两作一十丸。每服一丸，细嚼，薄荷茶下，不拘时候。

【功用】清利头目，消风壅。

【备考】本方方名，《普济方》引作“麝香螭蟠丸”。

21620 龙麝聚圣丹

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】川芎一两 生地黄 犀角屑 羚羊角 南琥珀(研) 南玄参 桔梗 连翘各半两 马牙消(研) 人参 赤茯苓(去皮) 升麻 牛黄(研) 麝香(研) 脑子(研)各三钱 南硼砂(研)一两 铅白霜(研)一钱 朱砂(水飞)半两 金箔(为衣)五十片

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作十五丸，用金箔为衣。每服一丸，用薄荷汤化下，或新水化服亦得，更或细嚼服，并噙化咽津，皆可，食后、临卧服，一日三二次。

【主治】心脾客热，毒气攻冲，咽喉亦肿痛，或成喉疳，或结硬不消，愈而复发，经久不愈，或舌本肿胀，满口生疮，饮食难咽。

21621 龙胆羚羊角汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】龙胆草三钱 黄芩二钱 干地黄三钱 羚羊角(磨汁冲服)一钱 茯神三钱 丹参一钱 前仁二钱

【用法】水煎，微温服。

【功用】清热平肝，养血息风。

【主治】子痫偏于风热者，未发之前，头痛甚剧，面色发红，头昏眼花，脘腹疼痛，大便秘结，或有呕吐；病发后抽搐神昏，舌质红，脉弦滑而数。

【加减】痰涎壅盛，加竹沥三十滴，亦可加天竺黄二钱。

21622 龙脑麝香锭子

【方源】《普济方》卷二八三。

【组成】龙脑三钱 麝香二钱 轻粉半钱 粉霜三钱 雄黄半钱 乳香一钱 雌黄半钱 巴豆十四个(去皮尖)

【用法】上为细末，干饭为丸，如小麦大。任在疮上。贴治瘡疮，研在疮内。

【功用】追毒回疮，止痛生肌。

【宜忌】忌冷水。

戊

21623 戊己丸

《幼幼新书》卷二十六引《养生必用》。为原书同卷“苦散”之异名。见该条。

21624 戊己丸

【方源】《续本事》卷一。

【组成】茴香三两(拣净) 甘草一两(炙) 胡椒五两(拣净) 人参一两 白术二两 朱砂半两 白茯苓三两 香附子半两

【用法】上为细末，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心白汤送下，一日二次。

【功用】《续本事》：护脾开胃，进饮食，长肌肉，生气血，化精益髓，全胃气，丹田不竭，肾经不虚。

【主治】①《续本事》：丈夫、妇人禀赋怯弱，饮食无味，气血衰败，肌肉不生，项背拘紧，腰脚无力，胸膈膨胀，多睡少寤，终日昏蒙，夜多异梦，及积年脾虚时下，恶心噫酸吐水，小儿吐乳，大人翻胃。②《济阴纲目》：新婚男子女人，素禀虚寒滑泄。

21625 戊己丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】真吴茱萸(川中者，汤洗三两次) 黄连(去须，好酒浸)各等分

【用法】米糊为丸。每次三十丸，空心服。赤痢，当归、黄连、甘草汤送下；白痢，茱萸、生姜汤送下。

【主治】赤白痢。

21626 戊己丸

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】甘草 木香 罂粟壳 乌梅 赤芍药各等分

【用法】上为末。每服二钱，空心米饮送下。

【主治】肠胃虚滑，下痢无度，脓血相杂。

【备考】本方方名，据剂型，当作“戊己散”。

21627 戊己丸

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】熟地八两(杵膏) 黄肉三两 当归 麦冬(去心) 苡仁 牛膝各二两 白芥子 元参各一两 丹参一两五钱 北五味五钱

【用法】各取净末，用生姜六两取汁，和炼蜜，同熟地杵膏为丸。每服二钱，渐加至三四钱，老米三钱，煎汤调下。

【主治】反胃，膈噎。

21628 戊己汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【异名】黄连戊己汤(原书卷四)。

【组成】白芍药 甘草 川黄连

【用法】煎汤服。

【功用】清肝脾血分之火。

【主治】脾家有热，不能分清降浊，水液偏渗大肠，泄泻不止，水谷不分，腹中漉漉有声，或痛或不痛，小水全无，及脾热身肿者。

【备考】方中药物用量原缺，黄连戊己汤用川连一钱，白芍药五钱，甘草一钱。

21629 戊己汤

《症因脉治》卷四。为《伤寒论》“芍药甘草汤”之异名。见该条。

21630 戊己散

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】干牛粪

【用法】烧灰研细。生油调涂。

【主治】火烧疮。

21631 戊戌丸

【方源】《本草纲目》卷五十引《乾坤秘韞》。

【组成】黄童子狗一只 地骨皮一斤 前胡 黄耆 肉苁蓉 当归末各四两 莲肉

苍术末各一斤 厚朴 橘皮末各十两 甘草末八两

【用法】将黄童子狗去皮毛、肠肚同外肾，于砂锅内用酒、醋八分，水二升，入地骨皮，前胡、黄耆、肉苁蓉同煮一日。去药，再煮一夜。去骨，再煮肉如泥，搗滤。入当归末、莲肉、苍术末、厚朴末、橘皮末、甘草末八两，和杵为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心盐酒送下。

【主治】男妇诸虚不足，骨蒸潮热。

21632 戊戌酒

【方源】《本草纲目》卷五十引《养老方》。

【组成】黄犬肉一只

【用法】煮一伏时，捣如泥，和汁拌炊糯米三斗，入曲，如常酿酒。候熟，每旦空心饮之。

【功用】大补元气。

【主治】《医学入门》：阳虚。

21633 戊字化毒丸

【方源】《疮疡经验全书》卷十三。

【组成】牛黄四分 升麻 生生乳各一钱 木香 朱砂 雄黄 川山甲 白藜皮 乳香各一钱五分(炙用) 制大黄二钱(用酒九浸、九蒸、九晒) 威灵仙 没药 血竭 贝母各一钱八分

【用法】上药各为末，用神曲末五钱打稠糊，入药捣匀，丸如梧桐子大，另研朱砂为衣。每早空心服十五丸，每晚空心服十丸，人参汤送下。奇良汤亦可，病去药减，如余毒未尽，药不可彻。

【主治】霉疮脾经内外前后形证。

【宜忌】忌一切恼怒焦躁。茶、酒止可用十分之三。

可

21634 可保立苏汤

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆一两五钱(生) 党参三钱 白术二钱 甘草二钱 当归二钱 白芍二钱

枣仁二钱(炒) 山萸一钱 枸杞子二钱 故纸一钱 核桃一个(连皮打碎)

【用法】水煎服。

【主治】小儿因伤寒、瘟疫，或痘疹、吐泻等症，病久气虚，四肢抽搐，项背后反，两目天吊，口流涎沫，昏沉不省人事。

【备考】此方分两，指四岁小儿而言。若两岁，分两可以减半；若一岁，分两可用三分之一；若两三个月，分两可用四分之一，又不必拘于付数。

归

21635 归元汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】熟地二两 附子八钱 当归 人参 焦术 故纸 苡仁各五钱 芡实 山药 杜仲各三钱 炮姜二钱 防风一钱

【主治】老年耳聋。

21636 归元散

【方源】《回春》卷四。

【组成】人参(去芦) 白术(去芦) 茯苓(去皮) 远志(去心) 酸枣仁(炒) 麦门冬(去心) 黄柏(童便炒) 知母(童便炒) 芡实 莲花须 枸杞子 陈皮 川芎各等分 升麻减半 甘草减半

【用法】上锉一剂。加莲肉三个，枣子一枚，水煎，空心服。

【功用】升提肾气以归原。

【主治】梦遗日久，气下陷者。

21637 归牛散

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】肉桂 牵牛各五钱 当归 大黃 桃仁各二钱半 全蝎一钱

【用法】每服一钱，入蜜煎服。利后，以青皮、陈皮、茯苓、木香、砂仁、甘草、生姜煎服和胃。

【功用】疏利。

【主治】疝气便闭，阴核肿硬沉坠，小腹阴囊牵引痛甚，夜啼。

21638 归气汤

【方源】《永类铃方》卷十二引《简易方》。

【组成】沉香 木香 丁香 白姜(炮) 川楝子肉(炒) 肉桂 净陈皮 当归 甘草(炙) 附子二个(六钱者，炮) 砂仁 益智仁(炒) 胡芦巴(炒) 白术 舶上茴香(炒) 肉豆蔻(煨) 各一两

【用法】上哎咀。每服二钱，水一盞，加紫苏三叶，木瓜四片，盐少许，煎服。

【主治】气不升降，胸膈痞满，心腹刺痛，不进饮食。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“归气散”。

21639 归气汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】麦冬三两 北五味三钱 熟地三两 白术二两

【用法】水煎服。

【主治】久嗽伤肺后，忽然大喘不止，痰出如泉，身汗如油。

21640 归气饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地三五钱 茯苓二钱 扁豆二钱 干姜(炮) 丁香 陈皮各一钱 藿香一钱五分 炙甘草八分

【用法】水一钟半，煎七分，食远温服。

【主治】气逆不顺，呃逆呕吐；或寒中脾肾。

【加减】中气寒甚者，加制附子；肝肾寒者，加吴茱萸、肉桂，或加当归。

21641 归气散

《医方类聚》卷八十八。即《永类铃方》卷十二引《简易方》“归气汤”。见该条。

21642 归艾丸。

【方源】《朱氏集验方》卷十引蔡相药方。

【组成】生地黄一斤(净洗) 生姜一斤(净洗，各用砂盆研烂，如交加散法淹一宿，银器各炒干，入后药) 白芍药 白茯苓 延胡索 当归(去芦，浸) 各二两 熟艾二两(醋调面成饼，甑上蒸熟，焙干)

【用法】上除艾叶外，各焙干为末，入前件

地黄,生姜作一处,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心酒送下,一日三次。

【主治】妇人平生无子。

21643 归艾饮

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】当归 川芎 艾叶 茯苓 白术 白芍 杜仲 陈皮 香附 木香 砂仁 乌药 防风 紫苏 甘草

【主治】胞络宿有风冷,受娠之后血不通,冷与血相搏,少腹痛,甚则胎动不安。

【方论选录】是方芎、归、艾、术、杜、芍固胎,乌、木、砂、陈以能蠲冷气,防、苏祛风。

21644 归术汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】当归 白术(炒) 地骨皮 白芍(炒) 丹皮 沙参 黄耆 陈皮 甘草(或加人参)

【用法】水煎服。

【主治】久热症,或因病后失调,或过伤药饵,体瘦干枯。

21645 归术散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】当归八两 白术一两

【用法】上为末。每服二钱,沸汤点服。

【主治】心脾疼痛。

21646 归龙酒

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】菊花 当归各半斤 枸杞一斤 龙眼肉三斤

【用法】火酒三十斤,南酒二十斤,泡二十一日。饮之。

【功用】补脾养胃,祛风明目。

21647 归芍汤

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】当归三钱 白芍(半生半炒)二钱 莱菔子(炒,研)二钱 广木香八分 槟榔七分 枳壳八分 甘草五分 净车前一钱五分 山楂(砂糖炒)一钱五分

【用法】白痢加生姜,红痢加白糖,水煎服。

【主治】妊娠下痢赤白,腹中疼痛,心上急满者。

21648 归芍汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归二钱 白芍钱半 黄芩 黄连 陈皮各一钱 广香三分

【用法】水煎,空心服。

【主治】妊娠腹痛下痢,里急后重,脉洪有力,证属热者。

【加减】如痛甚则下,加大黄一钱半。

21649 归芍汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】当归二钱 桔梗一钱五分 枳壳(面煨,去瓢)六分 生白芍三钱 木香(湿纸包煨) 槟榔各一钱 炙草七分

【用法】加生姜三片,水煎服。

【主治】痢疾。

【加减】如白痢,加苍术七分、砂仁四分;红痢,则加山楂炭一钱。

21650 归芍汤

【方源】《新急腹症学》。

【组成】当归八钱 大黄三钱 川朴八钱 枳壳四钱 槟榔三钱 芒消三钱 黄芩三钱 黄连二钱 丹皮三钱 公英五钱 没药三钱

【主治】麻痹性动力性肠梗阻。

21651 归芍汤

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】当归 25 克 白芍 25 克 柴胡 6 克 川朴 6 克 枳壳 6 克 槟榔 6 克 芒消 10 克 丹皮 10 克 黄芩 6 克 黄连 6 克 公英 18 克 没药 6 克 阿胶 10 克 三仙各 10 克

【用法】水煎服,每日一至二剂,口服或胃管注入。

【功用】理气消胀,清热通便,凉血消肿。

【主治】腹腔感染所致的麻痹性肠梗阻,腹部手术后肠麻痹。

【加减】腹胀重,大便秘结,加大黄,重用芒消;腹腔感染重,发烧者,加金银花、连

翘、白花蛇舌草。

【方论选录】当归润肠通便，芒消软坚通便，柴胡、川朴、枳壳、槟榔理气消胀，黄芩、黄连、丹皮、公英凉血消肿，三仙助消导，阿胶滋阴补血，没药、白芍活血养血止痛。

21652 归芍饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 白芍 川芎各一钱 白术 人参 生地 香附 陈皮各一钱五分。

【用法】加大枣二枚，水煎，食前服。

【主治】妇人临经并经后作痛。

21653 归芍饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】人参 白术 白芍 白茯苓 诃子肉各五分 乌梅半个 黄连 厚朴 肉豆蔻 柴胡各六分

【用法】加黑枣二枚，水煎，空心服。

【主治】小儿痢疾，久不肯住。

21654 归芍饮

【方源】《医学集成》卷一。

【组成】白芍 当归 莱菔 枳壳 槟榔 甘草

【用法】先进百顺丸，次用痛痢饮。随进本方。

【功用】凉下。

【主治】痢疾烦渴身热，小水短赤，少腹胀痛而里急后重，年力强壮而形气有余，其脉数而洪滑有力者。

21655 归芍散

【方源】《普济方》卷二一五。

【组成】当归 白芍药 鹿茸 熟地黄

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，阿胶汤送下。

【主治】劳淋。小腹疼痛，小便不利。

21656 归芍煎

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】当归 白芍 滑石 槟榔 枳壳 广香 甘草 薤子

【主治】痢疾下后。

【加减】赤痢，加红米；白痢，加炮姜。

21657 归芎丸

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】陈皮 当归各三两 元胡索一两

【用法】上为细末，糊为丸。每服五十丸。米饮送下。

【主治】妇人月候不通。

21658 归芎汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】当归一钱五分 川芎一钱 防风 荆芥 菊花 生地(酒洗)各八分 玄参七分

【用法】水煎服。

【主治】瘦人眼症，血少兼热者。

21659 归芎汤

《医学心悟》卷五。为《张文仲方》引徐王方(见《外台》卷三十三)“神验胎动方”之异名。见该条。

21660 归血散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】荆芥(锉碎)一合 大麦一合(生) 黑豆一合(生) 甘草二钱(生)

【用法】上拌匀。用水一盂半，煎至一盂，去滓，食后、临卧作两次温服。

【主治】男子、妇人、老幼小便溺血。

21661 归花汤

【方源】《眼科全书》卷三。

【异名】归杞汤。

【组成】当归 密蒙花 黄连 熟地 楮实子 覆盆子 枸杞子 玄参 连翘 防风 石斛草 陈皮 白芍

【用法】水煎，食后服。

【主治】惊振内障者，或因被人打着，或撞着，或从高处跌下低处，致眼昏暗二三年者，一时内障形状，阴看能大，阳看能小，不辨三光；或后生人患云翳小小，阴看不大，阳看不小，不见三光；五风变五色，不离头痛，或因酒色过度，内伤肾气而致青风内障，不痒不痛，渐失其明，眼目俱不伤损，故无所见，日积月累，瞳仁开大，渐渐变青色。

21662 归杞汤

《眼科全书》卷三。为原书同卷“归花汤”之异名。见该条。

21663 归连丸

【方源】《女科百问》卷下。

【组成】阿胶(捣碎,炒如珠)三两(以醋四升煮成膏) 黄连 当归各三两 干姜二两 木香一两五钱

【用法】上为末,用阿胶膏为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前米饮送下。

【主治】一切下痢,无以新久,及冷热脓血,肠滑里急,日夜无度,脐腹绞痛不可忍。

21664 归连丸

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】黄连四分 黄柏 当归 黄芩各二两 阿胶二两(炙) 熟艾一两

【用法】上为散。以醇醋二升。煮胶烊,下药煮;为丸,如大豆大。每服七八分,饮送下,日二夜一服。

【功用】《医略六书》:清热养阴。

【主治】①《普济方》:痢,无问冷热;及五色痢。②《医略六书》:阴虚五色痢;孕妇赤痢,腹痛,胎下堕,脉虚数者。

【加减】若产妇痢,加蒲黄一两,蜜和为丸。

【方论选录】《医略六书》:当归养血脉以养胎,阿胶养阴血以止痢,黄连清心脾之火,黄芩清肺肠之火,黄柏清肾火,存五液也;佐以艾炭,温经止痛定痢;复以苦酒收之,米饮和之,使经腑肃清,则脏损复完,而胃气自能输化,五液各有所归。

21665 归连汤

【方源】《普济方》卷七十四引《经验良方》。

【组成】当归尾(极细者) 黄连 赤芍药 防风各等分 杏仁七粒(去皮尖,男孩乳汁蒸过)

【用法】以水半盏同煮。乘热洗眼,冷则再热,又洗。

【主治】眼暴赤。

21666 归连汤

【方源】《诚书》卷十五。

【组成】升麻 黄连 大黄 川芎 羚羊角 红花 归尾 甘草各二两 黄芩 金银花各三两

【用法】水煎服。余者可纳芒消再煎,涂肿处。

【主治】丹毒初发,血热毒盛。

21667 归连汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】当归 黄连 黄芩各一钱 铜绿 皮消 白矾各七分

【用法】以绢袋盛,煎汤洗。

【主治】火盛生痰,痰积久,胸膈不利,浊气上升于目,轻则昏花,重则云翳。

21668 归连散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《施圆端效方》。

【组成】黄连(拣净) 黄柏 当归 干姜(炮)各等分

【用法】上哎咀。每服四钱,水二小盏,加乌梅一个(切碎),同煎至一盞,去滓,食前温凉随意服。

【主治】冷热不调,下痢脓血频并,后重,腹内疝痛,饮食不下,以至危困。

21669 归肠汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】玄参一两 石膏三钱 熟地一两 丹皮三钱 当归三钱 地榆三钱 槐花二钱 荆芥(炒黑)三钱

【用法】水煎服。

【功用】胃肾同治,清大肠之火。

【主治】大肠之火奔迫而出,不大便而脱肛,疼痛非常。

21670 归肠散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】橡斗子半两(蜜炙黄) 木贼半两(烧灰留性)

【用法】上为细末。每服一钱,乳食前陈米饮调下。

【主治】小儿肠虚脱肛。

21671 归灵汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】归灵内托散(《外科大成》卷四)、归灵散(《验方新编》卷七)。

【组成】川芎 当归 白芍 熟地 米仁 木瓜 防己 天花粉 金银花 白鲜皮 人参 白术各一钱 甘草五分 威灵仙六分 牛膝(下部加)五分 土茯苓二两

【用法】水三钟,煎二钟,量病上下,分二次食前后服之,滓再煎八分服。

【主治】杨梅疮不论新久,但元气虚弱者。

21672 归灵散

《验方新编》卷七。为《外科正宗》卷三“归灵汤”之异名。见该条。

21673 归尾丸

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】槟榔 秦艽 归尾 延胡索 姜炭 木香 桃仁 丹皮

【主治】内结经闭腹痛;月经下血块。

21674 归附丸

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】香附子八两(一半醋浸一宿,砂锅内煮干,切,焙;一半童便浸一宿,依前者焙) 当归四两

【用法】上为细末,米醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心淡醋汤送下。

【功用】顺气调经。

【主治】月经不调。

21675 归附丸

【方源】《济阴纲目》卷六。

【组成】香附子(大者,砂罐内醋煮极熟,水洗,焙干为末)一斤 当归(大者,去芦梢,用身,酒洗,切片,焙干为末)十两 鹿角(大者,刮去粗皮,镑末二三两,绵纸垫铁锅内,文火炒,为细末)二两

【用法】上和匀,醋糊为丸,如梧桐子大。每服三钱,早起,临睡各一服,白滚汤送下。一月,经后入房即孕。

【功用】种子。

【主治】①《济阴纲目》:小产、产后诸证。

②《医略六书》:年久无子,脉细涩者。

【方论选录】《医略六书》:冲任亏损,血气不调,致生阳不振,不能媾精,而年久无子焉。香附和血调气;当归养血荣经;鹿角黑炒,力能扶冲任之阳,以燥子宫之寒湿也。醋丸酒下,使子宫温暖,则生阳振发,而经脉滋荣,血气无不调之患,年久无不孕之虞矣。

21676 归附丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】归身 香附(醋制) 陈皮 山楂

【用法】醋和为丸服。

【主治】胃气不调而经停,貌本壮实,饮食减少者。

【宜忌】咳嗽者禁用。

21677 归附丸

【方源】《女科切要》卷一。

【组成】当归 附子

【主治】妇人女子血寒,经水过期而来。

21678 归附汤

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】当归半两(去芦) 附子一两(炮,去皮脐)

【用法】上㕮咀。每服三钱,水一盂半,加生姜五片,煎七分,去滓,食前温服。

【主治】大便下血。

21679 归表汤

【方源】《医方类聚》卷一二九引《经验良方》。

【组成】羌活二钱半 青皮半两(炒) 黑牵牛(头末)一两

【用法】上用末。每服一钱,以樟柳根、绿豆、桑白皮煎汤调下。

【主治】水气,四肢虚肿。

21680 归苓散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】当归 茯苓 芍药 生甘草梢 木通 陈皮 白术 灯心各等分

【用法】上㕮咀。水煎熟,食前温服。

【主治】产后小便不通。

21681 归苓散

【方源】《女科秘旨》卷四。

【组成】当归 川芎 茯苓各三钱 厚朴一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】临产卒然心痛。

21682 归肾丸

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地八两 山药四两 山茱萸肉四两 茯苓四两 当归三两 枸杞四两 杜仲(盐水炒)四两 菟丝子(制)四两

【用法】炼蜜同熟地膏为丸，如梧桐子大。每服百余丸，饥时或滚水，或淡盐汤送下。

【主治】肾水真阴不足，精衰血少，腰痠脚软，形容憔悴，遗泄阳衰。

21683 归命丸

《圣济总录》卷六。为《幼幼新书》卷十引《灵苑方》“归命丹”之异名。见该条。

21684 归命丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】青橘皮(汤浸，去白，焙) 桂(去粗皮) 半夏(洗七遍去滑，焙) 乌头(去皮脐) 附子(去皮脐) 干姜 硫黄(舶上者)各半两 槟榔(锉)二枚 胡椒四十九粒 肉豆蔻(去壳)二枚

【用法】上并生为末，唯硫黄别研极细为度，入众药末中令匀，以米醋、面糊，更入盐少许，同为丸，如绿豆大。每服十五丸，空心温酒送下；疾甚不可救者，煎盐艾汤送下二十九。

【主治】元脏冷气，脐腹疼痛冲心，及久泻痢诸药不愈者。

21685 归命丹

《圣惠》卷二十五。为原书同卷页“灵宝丹”之异名。见该条。

21686 归命丹

【方源】《幼幼新书》卷十引《灵苑方》。

【异名】神穴丹(原书同卷)、归命丸、神穴丸(《圣济总录》卷六)。

【组成】蛇黄四两(紫色者佳，用火煨令通

赤，取出以纸衬地上出火毒，一宿杵罗为末，更入乳钵研如面) 朱砂半两 铁粉一两 猪粪二两(野放小硬干者，用饼子固济，烧烟尽为度，勿令白过，恐药少力，候冷，研令细) 麝一钱(研)

【用法】上药都入乳钵内同研极细，糯米粥为丸，如芡实大，挑漆盘于日内晒之。一切风，薄荷酒磨下一丸，小儿半丸；疳热，用冷水磨下一丸，分作四服；大人、小儿中风口噤，反张涎满者，灌下一丸，立醒；小儿被惊及发热，并以薄荷磨少许便安。端午及甲午日合；急用不拘。

【主治】感厥急风，心邪痼疾，小儿天钓、惊风及疳热。

21687 归命丹

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《谭氏殊圣》。

【组成】丁香 藿香各一分 生犀(末) 牛黄各半分 猪、鲫、狗、蟾、熊、胆 鱼胆各等分(共半两，或多些无妨)

【用法】上为末，为丸如绿豆大。一岁以下煎苦楝汤研下二丸。

【主治】小儿夹惊，呕吐不止，昼夜不停，吐出绿水黄胆汁、虫及乳食。

21688 归命丹

【方源】《普济方》卷三七二。

【组成】水银一分(以小枣肉研，令星尽) 牛黄 麝香各半分 锡各脂一两(细研，水淘黑水令尽)

【用法】上为细末，用软粳米饭为丸，如黍米大。每服二丸，以新汲水送下，不拘时候。

【主治】小儿天钓多涎，及搐搦不定。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“保命丹。”

21689 归命散

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】荆芥穗半两 白术(去芦)二钱半 人参(去芦)三钱 净苍术(锉，炒)二两 白茯苓(去皮)二钱 石膏半两 甘草二钱

半(炙)

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，同煎至八分，去滓，乳母多宜服之，小儿任意服，不拘时候。

【主治】小儿伤风，身壮热，气粗，咳嗽；或传疹。

21690 归命膏

【方源】《百一》卷十六。

【组成】野生茄子(熟黑者，取子)不拘多少

【用法】烂研取汁，以绢滤滓，入大银盂内，慢火熬成稀膏，以细青竹枝子(去叶)五七茎扎聚，不住手搅，候成稀面糊，收之。如无头无异色，或热不热，一发从外敷，渐渐敷入；如有赤脉有头，先从赤脉敷之，渐渐敷出，一日上三四度，不可轻易。

【主治】发背，或赤不赤，有头无头，或痒或痛。

21691 归沫汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】熟地二两 山萸肉 玄参各一两 天冬 女贞子 生地 百合各三钱 款冬花一钱

【用法】水煎服。

【主治】肾热火沸，吐痰纯是白沫，咳嗽不已，日轻夜重。

21692 归宗汤

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】大黄 生地黄 赤芍药 东山楂 青皮 木通 荆芥穗 牛蒡子(炒)

【用法】灯心为引，水煎服。

【功用】峻攻火毒。

【主治】①《金鉴》：痘证毒火太盛，形气壮实，无风寒表邪，壮热不已，爪甲青紫，四肢厥冷，恶热，头汗出，通身蒸蒸汗出，谵语，烦躁狂乱，大渴引饮，唇口焦裂，舌生芒刺，大小便闭，吐血，小便尿血。②《卫生鸿宝》：痘热发苗，毒火炽盛，诸阳证迭见；并恶痘抱鬓托腮，聚背囊腰，蛇皮蚕种，肉

肿疮不肿，紫陷黑陷。

21693 归承汤

【方源】《正体类要》卷下。

【组成】桃仁承气汤(大黄更量虚实)加当归

【用法】水煎服。

【主治】伤损血滞于内作痛，或发热、发狂。

21694 归参丸

《北京市中药成方选集》。即《古今医鉴》卷九“参归丸”。见该条。

21695 归参丸

【方源】《全国中药成药处方集》(青岛方)。

【组成】当归 苦参 玄参 连翘 栀子 花粉 桔梗 生地 黄芩 桑叶各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸服。

【主治】肿胀，淋浊。

21696 归参汤

【方源】《杏苑》卷七引张元素方

【组成】人参一钱 当归二钱 川芎七分 生地黄七分 白芍一钱 薄荷七分 荆芥一钱 条黄芩一钱 升麻一钱

【用法】上咬咀。水二钟，煎一钟，食前温服。

【功用】益血清热提气。

【主治】阴血亏败，无以羁承肠脏，以致湿热下流，肛门下脱者。

21697 归参汤

【方源】《诚书》卷七。

【组成】当归 玄参 瓜蒌根 连翘 黄芩 石膏 黄柏(盐酒炒) 山梔各等分

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】齿肿痛应首。

21698 归荆汤

【方源】《普济方》卷五十九引《指南方》。

【组成】当归(或以川芎代) 荆芥穗各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，酒少许，煎七分，灌下；如牙关紧，用铜匙斡开，以鸡羽蘸药入口；或用童尿调下。

【主治】风痉昏迷，吐沫抽掣，背脊强直；

产后中痉。

21699 归荆散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】当归 荆芥穗 川升麻 川郁金 细辛 白芷 草茺各等分

【用法】上为末。每用半钱，搯痛处，良久盐汤灌漱。

【主治】齿痛。

21700 归茸丸

【方源】《医方大成》卷四引《济察方》。

【组成】当归(酒洗) 鹿茸(盐酒炙) 北黄耆(盐水炙) 沉香 灵砂三两 北五味子(炒) 远志肉 酸枣仁 吴茺萸 茴香(炒) 破故纸(炒) 牡蛎(煨) 熟地黄 人参 龙骨(煨) 附子(炮) 巴戟各一两

【用法】上煨制如法，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【功用】补诸虚。

【主治】《医方类聚》：便浊。

【临证举例】白浊《医方类聚》：曾省斋白浊耳鸣，以茯苓末下震灵丹之类，如石投水，服分清饮，虽暂觉小便清，而未免又浊，竟取效此药。

21701 归茸丸

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《仙传济阴方》。

【组成】当归一两 牡丹皮三钱 鹿茸三钱 附子一个 地黄 人参各三钱

【用法】上为末，糊为丸。阿胶汤送下。

【主治】月候不干。

21702 归茸丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】鹿茸(酒蒸) 当归(酒浸)各等分

【用法】上为细末，用乌梅水煮去核，和前末捣匀为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心米饮送下。

【主治】精血枯竭，面色黧黑，耳聋目暗，

口干多渴，腰痛脚弱，小便白浊，上燥下寒，不受峻补。

21703 归茸丸

《寿世保元》卷四。为《得效》卷八“增益归茸丸”之异名。见该条。

21704 归茸汤

《回春》卷七。为《古今医鉴》卷十四“归茸酒”之异名。见该条。

21705 归茸酒

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【异名】归茸汤(《回春》卷七)。

【组成】嫩鹿茸(酥炙) 当归身(酒洗)

【用法】上锉。每服五钱，好酒煎，温服。

【主治】痘疮已成，内虚，出齐而难胀，或已胀齐而难靨者；或气血大虚，痘既出，灰白色，及顶平不起，或陷伏者。

21706 归茸散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】鹿茸一两

【用法】以好酒瓦瓶煮令皮脱，取出将酒滤过，留用其茸，再煮皮烂为度，以布滤，揉烂，皮化在酒内，其毛去之，再将骨炙为末；用当归五钱煎汤，调酒胶及末，渐服。

【主治】痘疮血虚不能成浆。

21707 归须汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十九。

【组成】生杜仲一两 归须 穿山甲各二钱 干地龙 小茴各一钱 北细辛三分

【主治】腿骨麻疼，邪留于阴，痛在右腿，深入筋骨，肌肉不肿，夜分惊笃。

21708 归姜汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【异名】归姜枣汤(《产科心法》卷下)。

【组成】当归三钱 黑姜七分 枣仁(炒)一钱五分 大枣五枚(去核)

【用法】水煎服。

【主治】产后心慌自汗。

【加减】若服后自汗仍多，心慌无主，恐其晕脱，加人参二钱、熟附子一钱。

21709 归神丸

《袖珍》卷三。为《百一》卷一“归神丹”之异名。见该条。

21710 归神丹

【方源】《普济方》卷二二四引《孟氏洗洗方》。

【组成】辰朱砂二两（捶作小粒，不可成粗粉）猪心（大者）一枚（去筋膜，略批开，朱砂布于内，再合）

【用法】猪心用灯心遍缠合用，密以麻线缚定，入银石铛内，用酒同米醋二味各一升同煮令干，即取去灯心，缓缓收下朱砂，微炒干，乳钵内研令极细，将所煮余酒醋打清面糊为丸，如梧桐子大。每服九丸，同北枣煎汤吞下，半空心服。一法加茯苓二两为丸，每服十八丸。

【功用】引神归舍。

【主治】丈夫思虑过多，役损心气，致神不守舍，不能管摄，精气之失无常，精滑冷，遗白浊。

21711 归神丹

【方源】《百一》卷一。

【异名】归神丸（《袖珍方》卷三）。

【组成】颗块朱砂二两 猪心二个 灯心三两

【用法】上将猪心切开，入朱砂、灯心在内，麻线系合，于银石器内煮一伏时，取出，不用猪心及灯心，只将朱砂研极细，用真茯神末二两，酒煮薄糊，和朱砂为丸，如梧桐子大。每服九丸至十五丸，加至二十一丸，用去心麦门冬煎汤送下；癫痫至甚者，乳香、人参汤送下；夜寝不安或多乱梦，炒酸枣仁汤送下。

【功用】《慈禧光绪医方选义》：养心安神。

【主治】一切惊忧思虑，或夜寝不安，梦思恍惚，作事多忘；心气不足，癫痫狂乱。

【方论选录】《慈禧光绪医方选义》：朱砂质重性寒，寒可清热，重可镇怯，功能安神定惊，可治心悸怔忡，失眠惊痫；灯心可清心热；茯神养心安神，诸药合用，养心安神之

力甚强。用猪心者，取中医以脏补脏之法。

【临证举例】惊悸 《慈禧光绪医方选义》：光绪帝亲政之后，劳心惊忧，耗气伤神。御医们进呈此补心镇静之药，甚当。

21712 归神丹

【方源】《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》。

【组成】丹参 人参（去芦） 石菖蒲各五钱 远志（去心，焙） 酸枣仁（炒）各六钱 柏子仁六钱半 天门冬（去心，焙） 麦门冬（去心，焙）各一两 熟地黄（焙） 干山药各三钱 生地黄三钱半 当归（酒洗，焙）四钱半 茯神 粉草各七钱 辰砂 地骨皮 五味子（焙）各五钱 白茯苓七钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼肉大。每服一二丸，临卧嚥化。

【主治】一切惊忧思虑，作事多忘，怔忡恐怖；一切心气不足。

【加减】加金箔五片尤佳。

21713 归神丹

【方源】《得效》卷八。

【异名】大归神丹（《丹溪心法附余》卷十九）。

【组成】颗块大朱砂二两（入猪心内，灯心缠缚，用无灰酒蒸二炊久，取出另研） 金箔二十片（另研） 真银箔十片（别研） 深红琥珀一两（别研） 酸枣仁（去壳）二两大远志（取净皮，姜汁拌炒）一两 白茯神（去木）二两 罗参二两 大当归（去尾）二两 龙齿一两

【用法】上为末，酒煮稀糊为丸，如梧桐子大。每服二九丸至三九丸，去心麦门冬汤送下；癫痫至甚者，乳香人参汤送下；夜寝不寐或多乱梦，炒枣仁汤送下。

【功用】①《得效》：养神思，益眼力。②《臞仙活人心方》：安神宁心，闭精气，固元气。

【主治】一切惊忧，思虑恍惚，作事多忘，心气不足，癫痫狂乱；及大病后心虚，神不守舍。

21714 归神汤

【方源】《医统》卷八十二引《集验》。

【组成】人参 白术 白茯苓 当归身各一钱 酸枣仁 陈皮各八分 龙眼肉七个(去核) 甘草 羚羊角末 琥珀末各五分

【用法】上羚羊、琥珀二味不煎，余药煎熟，去滓，入二末和匀，食前服。

【主治】妇人梦交，盗汗，心神恍惚，四肢乏力，饮食减少。

21715 归神汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参五钱 白术一两 巴戟天一两 茯神五钱 紫河车一具 半夏三钱 陈皮一钱 甘草一钱 丹砂一钱 菖蒲一钱 麦冬五钱 柏子仁三钱(不去油) 白芥子三钱

【用法】上各为末，先将紫河车净水煮熟，不可去血丝，捣烂，将各药末再捣为丸。每服五钱，白滚水送下，连服数日。

【主治】思虑过度，耗损心血，遂致失志之癖，或哭或笑，或裸体而走，或闭户自言，喃喃不已。

21716 归真散

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】木香 附子 青皮 草豆蔻 牡蛎 甘草 乌药 沉香 白术 藿香 厚朴 桂各半两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，大枣一个，同煎至七分，去滓，空心服。

【主治】脾元气滞，攻注腹胁，时复刺痛，下注偏坠，发作不定；肾气奔豚，膀胱疝气，服众药不效者。

21717 归善汤

【方源】《医方类聚》卷一七五引《修月鲁般经》。

【组成】黄耆 当归 瓜蒌 甘草 皂角刺各一两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞半，煎

至八分，去滓，入乳香酒，再煎服。

【主治】痈疽无头，但肿痛。

21718 归善汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】当归一钱 黄耆五钱

【用法】水煎服。

【主治】虚火上攻头目，浑身胸背发热。

21719 归善汤

【方源】《活幼心法》卷终。

【组成】当归身五钱 蜜炙黄耆三钱 酸枣仁(炒，研)二钱

【用法】水煎服。

【主治】痘疮浆足，身凉而汗不止者。

21720 归善汤

【方源】《济阴纲目》卷九。

【组成】黄耆 当归(焙)各一两 糯米一合

【用法】上切细。分四服，水煎服。

【主治】妊娠下痢腹痛，小便涩滞。

21721 归善汤

【方源】《诚书》卷十一。

【组成】黄耆(炙)一两 当归(酒焙) 白芍药 川芎各五钱 甘草(炙)三钱

【用法】水煎服。

【主治】伤食，痿黄，洞泄，并痘后目。

21722 归善汤

【方源】《种痘新书》卷八。

【组成】黄耆(炙)二钱 当归 枣仁各一钱 炙草四分 麦曲 白术 茯苓各八分

【功用】固肌秘腠。

【主治】痘疹当靨之时，身凉而汗不止属表虚者。

21723 归善汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】当归一两 黄耆五钱 川芎三钱 益母草二钱 枳壳(麸炒)一钱

【用法】水一钟半，煎七分服。

【功用】《竹林女科》：保产。

【主治】难产。

21724 归善饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【异名】四神汤（《疡医大全》卷二十三）、回毒金银花汤（《医林纂要》卷十）、四仙饮（《成方切用》卷十一）。

【组成】当归八钱 绵黄耆（生） 金银花（净）各五钱 甘草（生）三钱

【用法】水、酒各一碗半，煎至二碗，分三次热服，一日令尽。

【主治】①《张氏医通》：脑疽背痈，毒盛焮肿；及虚人肛门发毒。②《医林纂要》：疮疡作痛隐隐，气虚不能焮发，而色变紫黑者。

【加减】在上者，加升麻三分；在下者，加牛膝三钱。

【备考】《成方切用》无酒。

21725 归原散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【异名】复元汤（《古今医鉴》卷十二）。

【组成】人参 甘草 川芎 当归 芍药 丁香各半两 白茯苓 白术 陈皮各一两半 桔梗（炒） 枳壳（炒）各二钱半 半夏（洗七次，炒黄）一两

【用法】上咬咀。每服三钱，加生姜五片，大枣一枚，水煎服。

【主治】妊娠恶阻，呕吐不止，头痛，全不入食，服诸药无效者。

21726 归柴饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归一两 柴胡五钱 炙甘草八分

【用法】水一钟半，煎服。

【主治】营虚不能作汗；及真阴不足，外感寒邪难解者。

【加减】或加生姜三五片；或加陈皮一钱；或加人参；大便多滞者，以冬术代当归。

【临证举例】瘧症 《仿寓意草》：友人宣东州，一日忽诣予曰：予堂兄豫川，病已不治，惟望兄诊定死期，代办后事耳。及至其家，问其病，乃患瘧症，单热不寒，已经两月，从未有汗，每日壮热六时许，形销骨立，实已

危殆，诊其六脉弦数，全无和柔之意，而按尚有根。予知其素来好内，肝肾俱亏，加以大热伤阴，阴不化汗，邪无出路，乃用景岳归柴饮：柴胡钱半，当归一两 甘草一钱，加大生地二两，同浓煎与服，服后进热米饮一碗，不过一帖，大汗而解。

21727 归圆酒

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】当归二两 圆眼（即龙眼）一斤（剥取肉）

【用法】浸酒十斤。临卧随意随量温服数杯。

【功用】补暖下元，滋养气血，温暖子宫。

【主治】男妇血气衰弱者。

【备考】妇人服此尤易受孕。

21728 归圆酒

【方源】《医级》卷八。

【组成】黄耆（炙）三两 当归二两 忍冬藤二两 甘草五钱 桂圆四两 川断一两 香附五钱

【用法】用酒五六斤，和药入瓷瓶内，重汤煮三炷香，出火，日随饮。

【功用】补气养血，宣畅百络。

21729 归胶饮

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】阿胶 炙甘草 当归 葱白

【主治】气壅攻腰肋痛。

21730 归梢汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】归梢 赤芍 莪术 桃仁 红花

【主治】瘀证有死血者。

21731 归黄散

【方源】《普济方》卷七十三引《海上方》。

【组成】当归 生地黄 轻粉 黄连 赤芍药各少许 杏仁三枚（去皮尖）

【用法】上咬咀。用绢袋裹，用水一盏，煎热熏眼；却以别物裹药，闭眼熨之。

【主治】目赤烂。

21732 归黄膏

【方源】《易简方便》卷四。

【组成】当归二两 生地二两

【用法】用小磨香油六两，以小铜锅熬滚，将药切片放入，淬黑去滓，再入白蜡四两成膏。贴患处。

【主治】大疮，已破未破。

21733 归葛饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】归葛煎（《医级》卷七）。

【组成】当归三五钱 干葛二三钱

【用法】水二钟，煎一钟，以冷水浸凉，徐徐服之。得汗即解。

【主治】阳明温暑时证，大热大渴，津液枯竭，阴虚不能作汗。

21734 归葛煎

《医级》卷七。为《景岳全书》卷五十一“归葛饮”之异名。见该条。

21735 归葵汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】连翘饮子（原书同卷）、连翘饮（《内科摘要》卷下）。

【组成】柴胡二分 生甘草 蔓荆子 连翘 生地黄 当归身 红葵花 人参各三分 黄耆 酒黄芩 防风 羌活各五分 升麻一钱

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】目中溜火，恶日与火，隐涩难开，小角紧，视物昏花，迎风有泪。

21736 归脾丸

【方源】《医学六要·治法汇》卷七。

【组成】黄耆 龙眼肉 酸枣仁（炒） 人参各一钱 木香二分 甘草（炙）二分半

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】思伤脾，神不归于脾而健忘怔忡。

21737 归脾汤

《丸散膏丹集成》。即《正体类要》卷下“归脾汤”改作丸剂。见该条。

21738 归脾汤

【方源】《济生》卷四。

【组成】白术 茯苓（去木） 黄耆（去

芦） 龙眼肉 酸枣仁（炒，去壳）各一两 人参 木香（不见火）各半两 甘草（炙）二钱半

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】《便览》：解郁，养脾阴。

【主治】思虑伤脾。健忘怔忡，吐血下血。

①《济生》：思虑过度，劳伤心脾，健忘怔忡。②《得效》：思虑伤脾，心多健忘，为脾不能统摄血，以致妄行，或吐血下血。③《杂病源流犀烛》：思虑伤脾而成劳淋。

【方论选录】《医编》：脾气虚寒，不能运血归经，故用参、耆、术、草以补脾，又用木香引之；气虚则易散，故用枣仁以敛肝；血不归经则心失所养而不宁，故用龙眼肉、茯神以补心。

21739 归脾汤

【方源】《正体类要》卷下。

【异名】归脾散（《古今医鉴》卷八）、加味归脾汤（《古今医鉴》卷十一）、归脾饮（《痘学真传》卷七）、归脾养营汤（《疡科心得集》卷上）。

【组成】白术 当归 白茯苓 黄耆（炒） 龙眼肉 远志 酸枣仁（炒）各一钱 木香五分 甘草（炙）各三分 人参一钱

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【功用】养血安神，补心益脾，调经。

①《兰台轨范》：心脾同治，生血调经。②《古今医彻》：益心神，调荣血。③《医镜》：养血安神。

【主治】思虑伤脾，发热体倦，失眠少食，怔忡惊悸，自汗盗汗，吐血下血，妇女月经不调，赤白带下，以及虚劳、中风、厥逆、癲狂、眩暈等见有心脾血虚者。现代临床常用于血小板减少性紫癜、神经衰弱、脑外伤综合征、子宫功能性出血等属于心脾血虚者。

①《口齿类要》：思虑伤脾，血耗唇皱；及气郁生疮，咽喉不利，发热便血，盗汗暗热。

②《正体类要》：跌扑等症，气血损伤；或思虑伤脾，血虚火动，寤而不寐；或心脾作痛，怠惰嗜卧，怔忡惊悸，自汗，大便不调；或血上下妄行。③《内科摘要》：思虑伤脾，健忘少食，肢体重痛，月经不调，赤白带下，疟痢。④《病疡机要》：忧思伤脾，身发赤痕，或搔破成疮，咳吐痰血。⑤《医方考》：饮食太饱伤脾，脾伤则面黄善卧。⑥《证治汇补》：喜恐惊劳，气散于内，房劳后着气，厥逆不省，少顷复醒，而脉虚细者。⑦《金鉴》：虚劳烦热，时时恍惚。忧思伤脾，脾不摄血，经断复来。痘色灰白陷下而便血者。乳房结核坚硬，大者如梅，小者如李，按之不移，推之不动，时时隐痛，皮色如常。⑧《杂症会心录》：中风，脾肾大败。湿饮不行，则痰起于脾，头重眼花，脑转眩冒，食饮不甘，脉象缓者。⑨《兰台轨范》：乳母脾经气郁，致儿为患。⑩《杂病源流犀烛》：因思虑过度，而致癫狂。虚损劳瘵，而见泄泻。疟痢。⑪《会约》：思虑伤脾，不思饮食；或少食即胀；或火不生土，而时食时吐，脾虚生痰，其痰易来，或满口痰水，或夜间更甚。思虑惊恐而阳萎者。

【方论选录】①《医方考》：《内经》曰：五味入口，甘先入脾。参、耆、苓、术、甘草，皆甘物也，故用之以补脾；虚则补其母，龙眼肉、酸枣仁、远志，所以养心而补母；脾气喜快，故用木香；脾苦亡血，故用当归。②《古今名医方论》罗东逸：方中龙眼、枣仁、当归，所以补心也；参、耆、术、苓、草，所以补脾也。立斋加入远志，又以肾药之通乎心者补之，是两经兼肾合治矣。其药一滋心阴，一养脾阳，取乎健者，以壮子益母；然恐脾郁之久，伤之特甚，故有取木香之辛且散者，以闳气醒脾，使能急通脾气，以上行心阴，脾之所归，正在斯耳。③《古方选注》：归脾者，调四脏之神志魂魄，皆归向于脾也。参、术、神、草四君子汤以健脾胃，佐以木香醒脾气，桂圆和脾血，先为调剂中州；

复以黄耆走肺固魄，枣仁走心敛神，安固膈上二脏；当归入肝，芳以悦其魂；远志入肾，辛以通其志，通调膈下二脏，四脏安和，其神志魂魄自然归向于脾，而脾亦能受水谷之气，灌溉四旁，营养气血矣。独是药性各走一脏，足经方杂用手经药者，以黄耆与当归、枣仁与远志有相须之理，且黄耆味入脾而气走肺，枣仁味入肝而色走心，故借用不悖。四君子汤用茯苓，改用茯神者，以苓为死气，而神得松之生气耳。④《医林纂要》：此方主于滋血，故以人参为君，参、耆、甘、术，皆补脾为滋血之主，脾厚而不生湿则生血矣；龙眼甘补滋润，所以为生血之佐；木香、远志则又能升肾水，以由肝而达之心脾；当归以厚肝之脏；枣仁以节心之用，茯神以止心之妄。⑤《续名医类案》：归脾汤兼补心脾，而意专治脾，观其于甘温补养药中加木香醒脾行气可以见矣。龙眼、远志虽曰补火，实以培土，盖欲使心火下通脾土，而脾益治，五脏受气以其所生也，故曰归脾。⑥《会约》：凡治血症，须按三经用药，以心主血，脾统血，肝藏血。此方三经之主也。远志、枣仁，补肝以生心火；茯神、龙眼，补心以生脾土；参、耆、术、草，补脾以固肺气。土患燥，当归以润之；土患滞，广香以疏之，总欲使血归于脾也。⑦《成方便读》：夫心为生血之脏而藏神，劳即气散，阳气外张，而神不宁，故用枣仁之酸以收之，茯神之静以宁之，远志泄心热而宁心神，思则脾气结，故用木香行气滞、舒脾郁，流利上中二焦，清宫除道，然后参、耆、术、草、龙眼等大队补益心脾之品以成厥功，继之以当归，引诸血各归其所当归之经也。

【临证举例】①心悸怔忡 《南雅堂医案》：用心过度，阴血必受损耗，怔忡健忘，皆心血不足之故，生血者心，统血者脾，当握要以图之。归脾汤。《续名医类案》：马元仪治一人患心悸症，肢体倦怠，或以阴虚治之不效。诊其脉浮虚无力，盖得之焦劳思虑伤心

也。心之下脾位，脾受心病，郁而生涎，精液不生，清阳不布，故四肢无气以动而倦怠也。法宜大补心脾，乃与归脾汤二十剂，即以此方作丸，服之痊愈。②心痛《南雅堂医案》：诊得脉细小，右寸涩，心下悸，痛甚喜按，得食少愈，大小便俱见清利，系虚痛之候，用归脾汤加石菖蒲治之。《脉诀汇辨》：邑宰章生公，南都应试，时八月初五日，心痛甚，饮食皆废。诊其两寸，涩而无力，与大剂归脾汤加入人参三钱、官桂二钱，煎服之。不逾时痛减，续进一剂，痛竟止。③失眠《中医杂志》(1955; 2: 30)：患者是四十一岁男子，曾患肺结核及肋膜炎。现因工作繁重，思虑过度以致失眠，最近日益严重，有时夜间只能睡一二小时，身体疲倦，记忆力减退，食欲不佳，经常头痛眩晕。查体格中等，稍羸瘦，颜色苍白，脉搏稍弱。投与归脾汤，重用酸枣仁四钱，连服三剂，诸症好转。《内蒙古中医药》(1984; 1: 44)：刘某，女，五十一岁。平素多忧多虑，起初入睡困难，多梦易醒，反复发作，遂致彻夜不能入睡，随之月经失调，淋漓不断已二年。近日面浮，午后潮热，双下肢浮肿，面色白黄无华，舌体胖，苔白中厚，脉象二寸关大而无力，尺脉沉弱。此证系劳伤心脾，气血生化之源不足，脾虚血失统摄，治当健脾益气，养心宁神，归脾汤去当归，加真珠母 15 克，白芍 12 克，水煎，服 6 剂。服药后自觉症状稍有减轻，继用上方加味，后服归脾丸调养而愈。④痿证《山东中医学院学报》(1977; 4: 62) 于某，男，17 岁。因下肢肌肉活动无力，双手指不能伸握 20 天就诊。症见面色无华，神疲乏力，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。给予归脾汤加伸筋草一两、活血藤一两治疗。服六剂后，双手指已能握伸，下肢活动明显有力，又服三剂。再诊手指及下肢活动已恢复正常，又给归脾丸一盒以巩固疗效。⑤便血《清代名医医案大全·曹仁伯医案》：便血之前，先见盗汗，盗汗之来，由于寒热，寒热

虽已，而盗汗便血之证不除，脉小而数，气阴两虚之病也。归脾汤去桂圆，加丹皮、山梔、地榆、桑叶。⑥紫癜《北京中医》(1953; 5: 13)：朱敏珍，女，23 岁。素无其他疾患，惟月经有时不调。一九五〇年秋即觉心动悸，胃纳不佳，关节酸痛，精神疲倦，下肢皮肤时常出血，有紫斑点，乃住院，以西药治疗四个月病况无甚转变。现面色苍白，萎靡倦怠，月经不调，食欲不佳，声低微，心动悸，四肢无力，睡眠不佳，关节酸痛，下肢有紫斑点如环状，大小不一，躯干及上肢较少。乃处以归脾汤作煎剂，每日一服，诸症减轻。继续进剂至三星期，诸症若失，已照常工作。⑦项疽《得心集医案》：黄荣青，项外结喉之间，忽生硬疽。延医调治，与疏风化痰之剂，疽形渐长，按之坚而不痛，不寒不热，不痒不疼。由于思虑郁结，营卫留滞，以致气结不行，当进益气和营之药，不治而治也。连服归脾数十剂，其核疽自化而消。⑧崩漏《清代名医医案精华》：产后百脉空虚，气血俱伤，冲任不振，半月血来甚涌，所谓冲伤血崩是也。寒热，乳房作胀，五心烦热，诸虚迭见，日以益甚，脉来弦数无神，先从太阴阳明主治，冀其胃开进食，诸虚可复。归脾汤去木香，加枸杞子。《江西中医药》(1959; 3: 14)：治疗崩漏 20 例，其中 11 例属脾虚型，用本方治疗，皆获痊愈。一般服药 3~9 剂出血全部停止，兼症逐步消失。有 1 例出血已三个月之久，用本方 3 剂后症状减轻，出血减少，服至 12 剂后获愈。⑨带下《山东中医学院学报》(1977; 4: 60)：马某，女，33 岁。近一年来白带多，蹲下时白带滴流而下，质清稀，无臭味。就诊时面色无华，全身无力，背寒肢麻，舌质淡，苔薄白，脉细弱。诊断为脾气虚弱，寒湿带下，方用归脾汤治疗，三剂后，白带即止。⑩脑外伤后综合症《新医药学杂志》(1977; 9: 21)：用本方加减治脑外伤后遗综合症 88 例，均为脑震荡、脑挫伤等闭合性颅脑损伤，治疗后仍有头痛、头

晕、昏胀、健忘、失眠、耳鸣、注意力不集中、疲乏无力、食欲不振、苔白脉细等症状者。以本方加减，辅以西药谷维素、 γ -氨基酪酸等。效果：痊愈 41 例 (45.5%)、显效 30 例 (34%)、好转 17 例 (20.5%)。多数病例服药在 30 剂以下。

【备考】《口齿类要》无姜、枣。改为丸剂，名“归脾丸”（见《丸散膏丹集成》）、“人参归脾丸”（见《北京市中药成方选集》）、“白归脾丸”（见《全国中药成药处方集》福州方）。

21740 归脾汤

【方源】《胎产指南》卷七。

【组成】橘红 胆星 茯神 杏仁 人参 当归 甘草 半夏 枳实 川芎 柏子仁 五味子 白术 圆眼

【主治】产后身热感风，痰结胸膈，心经蓄热，以致遍身麻痺，手足牵搐，口喎痰盛，言语无伦。

21741 归脾汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】人参三钱 茯神三钱 炒枣仁五钱 远志一钱 麦冬三钱 山药三钱 当归三钱 广木香（末）三分 黄耆二钱 甘草三分

【用法】水煎服。

【功用】补心。

【主治】心包膈中之火炽甚，口干舌燥，面红目赤，易喜易笑者。

21742 归脾汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】人参 白术 茯神 黄耆 地骨皮各一钱二分 甘草三分 木香五分 远志（去心） 枣仁各一钱

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】女子闭经，血海干涸，适产出痘。

【加减】本方加柴胡、出梔，名“加味归脾汤”。

21743 归脾汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】人参 当归身二钱 黄耆（蜜炒） 白术 茯神各一钱半 枣仁（炒，研）一钱 远志六分 炙草八分 陈皮七分

【用法】桂圆肉、莲肉为引，水煎服。

【主治】产后心血虚损，心无所主而觉痛。

21744 归脾汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】人参 石斛（盐水炒） 远志肉（甘草汤浸，焙） 茯神 枣仁（炒熟，研） 白术（土炒）各一钱 炮姜 木香 石菖蒲各五分 柴胡 炙甘草各三分 当归身七分 桂圆肉五枚

【用法】水煎服。

【主治】中气不足，思虑过度，饥饱失时，劳役不节，而致中脘痛。

【加减】脾疼者，脉见软弱，中气已虚，去当归、耆、术，少加柴胡。

21745 归脾散

《痘学真传》卷七。为《正体类要》卷下“归脾汤”之异名。见该条。

21746 归脾散

《古今医鉴》卷八。为《正体类要》卷下“归脾汤”之异名。见该条。

21747 归魂丸

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】金箔十五片（研） 丹砂（研） 膩粉（研） 牛黄（研） 青黛（研） 白僵蚕（炒） 蝉壳（去土） 白附子（炮） 干蝎（全者，炒） 防风（去叉） 犀角（镑） 天南星（炮）各一分 天麻半两 棘刚子十二枚

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，薄荷汤化下，奶食后临睡服。

【主治】小儿慢惊风，摇头闭目。

21748 归魂丸

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】使君子两枚（以面裹，于慢火中煨，候面黄为度，去面不用） 水银（结砂子） 香墨 芦荟 熊胆（研） 腊茶（研） 乳香

〔研〕 龙脑〔研〕各一钱 蝎梢三七枚
〔炒〕天竺黄〔研〕 青黛〔研〕 丹砂
〔研〕各半钱 轻粉二钱 寒食面一钱半

【用法】上为细末，滴水为丸，如绿豆大。每服一丸，薄荷蜜水化下；如小儿稍觉惊着，化半丸与吃。

【主治】小儿惊痫搐搦，涎潮昏塞。

21749 归魂饮

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】白芍二两 人参五钱 贝母 香附各三钱 郁金一钱

【用法】水煎服。

【主治】终日思想情人，杳不可见，心肝之气郁，以致梦魂交接，日日相思，宵宵成梦，忽忽如失，遂觉身分为两，能知户外之事。

21750 归魂散

【方源】《博济》卷三。

【异名】矾茶散（《卫生总微》卷十七）、矾灰散（《三因》卷十）。

【组成】白矾一两 草茶一两

【用法】上为细末，作一服。以新汲水调之，连服之，必并服两服尽，五更初一服，如人行三五里再进一服。

【主治】①《博济》：中药毒，烦躁吐血，腹内如锥刺者。②《岭南卫生方》：初中蛊毒在膈上者。

【宜忌】忌油腻毒物。

【备考】此药入口，其味甘甜，不觉苦味者，是中药毒也。

21751 归魂散

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】石膏八两 寒水石四两 阳起石三两（以上三味捣细，研为末，和入新罐内火煨一复时取出，纸铺地上出火毒，入后药） 附子（炮裂，去皮脐）三两 干姜（炮） 麻黄（去节）各一两 杏仁二七枚（去皮尖双仁，炒，研）

【用法】上为细末，瓷盒盛。每服二钱匕，冷水调下。

【主治】阴阳二毒，不省人事。

21752 归魂散

【方源】《幼幼新书》卷十一引《家宝》。

【组成】蝎梢一钱半（炒） 蜈蚣（赤脚者）半条（炙） 水银粉 麝脑各一字 花蛇肉（酒浸，炙黄色）一钱 天南星（切碎，用生姜自然汁浸一宿，令为末）半钱 川乌头尖七个（生）

【用法】上为末。每服婴孩半字或一字，二三岁一字以上，四五岁半钱，金银薄荷汤调下。

【主治】①《幼幼新书》：婴孩小儿惊、痫、忤，手足瘰癧，头项强直，状似角弓。②《卫生总微》：中风，腰背反折，如角弓之状。

21753 归魂散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】石菖蒲一两（米泔浸洗，切，焙） 当归一两（酒浸一宿，火炙）

【用法】上为末。每服二钱，热酒调下。

【主治】妇人血气垂死，并败血不尽。

21754 归榆汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】当归 甘草 地榆 枳壳 荆芥 薄荷 柏叶

【用法】熏洗产门。

【主治】产后阴蚀。

【宜忌】玉门闭后，疮已合，方可用之。

【方论选录】归、榆凉血养血，荆、薄去风散浮热，柏叶、甘草清火，苍术燥湿，作汤熏洗，则风火清，湿热降，气血充足，而阴蚀之症自愈矣。

21755 归睛散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】防风一两（去芦头） 青箱子一两 细辛半两 决明子一两 独活一两 芎藭半两 赤茯苓三分 车前子一两 黄连一两（去须） 地肤子一两 蕤仁一两（汤浸，去赤皮） 赤芍药半两 甘菊花半两 羌蔚子半两 生干地黄半两 槐子半两 甘草半两

(炙微赤, 锉)

【用法】上为细散。每服一钱, 食后以竹叶汤调下, 临卧再服之。

【主治】眼偏视。

21756 归源汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】故纸 杜仲 赤石 车前子 茯苓 麦冬各一钱半 青盐 淮膝 橘皮各一钱 当归二钱 白芍五分 甘草三分

【用法】韭子(炒, 研)三分为引, 水煎服。

【主治】酒病成淋, 小便不利, 红肿作痛, 脓浆常渗。

21757 归源汤

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】大附子(生者)一枚(去皮脐, 切作大片, 用白蜜涂, 炙令透老黄色为度)

【用法】上收贮。临用取如晒一粒, 口含, 咽津。

【主治】格阳喉痹, 顷刻暴痛。

21758 归竭丸

【方源】《简明医彙》卷七。

【组成】当归 血竭 蓬术(煨) 白芍(酒炒)二两 五灵脂四两

【用法】上为末, 醋糊为丸, 如梧桐子大。每服六十丸, 空心酒送下。

【主治】产后血积, 腹中成块。

21759 归漆丸

【方源】《济阴纲目》卷一。

【组成】当归四钱 干漆三钱(炒令烟尽)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十五丸, 温酒送下。

【主治】月经不利, 脐下憋逆, 气胀满。

21760 归鲤饮

【方源】《医级》卷八。

【组成】当归三五钱 熟地四钱 川芎 乌药各一钱 红花五七分 女贞子 钩藤各三钱 全蝎二个 鲤鱼头一个

【用法】水、酒各半煎, 调指甲灰服。

【主治】血虚挟风成痉, 或厥气肝风眩暈, 及破损经风。

21761 归姜枣汤

《产科心法》卷下。为《医学心悟》卷五“归姜汤”之异名。见该条。

21762 归气定喘汤

【方源】《医钞类编》卷六。

【组成】人参 牛膝 熟地 麦冬 枣皮 五味 枸杞 胡桃 故纸

【用法】水煎服。

【主治】短气微息, 似喘非喘。

21763 归气救产汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】人参三钱 熟地五钱 白芍二钱 茯苓一钱 山药五钱 白术五钱 柴胡三分 砂仁一粒

【用法】水煎服。

【主治】妇人产子之后, 肝肾两虚, 阴不能入于阳, 四肢浮肿, 寒热往来, 气喘咳嗽, 胸膈不利, 口吐酸水, 两胁疼痛。

21764 归术降胞汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】当归二两 白术二两 柴胡一钱 牛膝三钱 丹皮三钱 红花五钱 荆芥三钱 益母草五钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人气结不行, 产数日而胎不下, 服催生药皆不效者。

21765 归术保产汤

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归(酒洗)一钱五分 川芎一钱 白芍(酒洗)一钱 熟地黄(酒蒸)一钱 白术(去芦, 炒)一钱 甘草(炙)三分 白茯苓(去皮)一钱 陈皮八分 干姜(炒黑)八分 香附米(童便炒)一钱

【用法】上锉一剂。加生姜三片, 大枣一枚, 水煎, 温服。

【功用】大补气血。

【主治】产后气血虚损, 脾胃怯弱, 或恶露不行, 或去血过多, 或饮食失节, 或怒气相冲, 以致发热恶寒, 自汗口干, 心烦喘急, 心腹疼痛, 头眩眼黑, 耳鸣, 及不语昏愤, 不

省人事。

【加减】气虚，加人参七分；去血过多，倍芎、归、干姜；胸膈胀满，加枳实（麸炒）、砂仁、厚朴（姜炒）、山楂肉；两胁肋痛，加青皮、上肉桂；小腹阵疼，加元胡索、桃仁、红花、苏木，甚者加三棱、莪术（俱煨醋炒）；有汗，加黄耆（蜜水炒）、酸枣仁（炒）；口干苦，加麦门冬（去心）；身不发热，小腹痛不可忍，用桃仁（去皮捣烂）五钱、韭菜汁和酒送下；恶露不行、加益母、牡丹皮、桃仁，入童便同酒服；吐痰，加半夏、贝母；咳嗽不止，加北五味、桑白皮；气恼，加乌药；昏愤，口噤不语，加荆芥穗。

21766 归术破瘀汤

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【异名】归术破瘀汤（《寿世保元》卷七）。

【组成】归尾（酒洗）一钱 赤芍一钱 白芍一钱 青皮一钱 乌药七分 香附（醋炒）一钱半 三棱一钱 莪术（醋煮）一钱 官桂五分 苏木五分 红花五分

【用法】上锉一剂。水煎，入酒一钟，空心服。

【主治】妇人经水不通，腹中积块疼痛。

21767 归术破瘀汤

《寿世保元》卷七。为《古今医鉴》卷十一“归术破瘀汤”之异名。见该条。

21768 归母苦参丸

《医方类聚》卷二二一。即《金匱》卷下“当归贝母苦参丸”。见该条。

21769 归地阿胶汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】归身 熟地 阿胶（蛤粉炒）各一钱半 炙草 砂仁各七分 竹茹三钱

【用法】水煎服。

【主治】入房触动胎气不安者。

【宜忌】切禁房事。

21770 归地参术汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】当归二钱 熟地三钱 阿胶珠二钱 桑寄生五钱 泡参四钱 白术三钱 茯

神四钱 炙甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】补血扶气。

【主治】白带偏于血虚，面色苍白，皮肤干燥，形容枯瘦，心悸寐少，腰疲乏力，带下白色，脉虚细。

21771 归地养荣汤

【方源】《简明医彙》卷二。

【异名】归地养营汤（《伤寒广要》）。

【组成】当归 生地（怀庆，极大） 鳖甲（醋炙，研细） 麦冬各五分 芍药 青蒿 阿胶各三钱 五味子一钱五分 枇杷叶五片（去毛，蜜炙） 灯心二十支

【用法】上煎成，烱化阿胶服，一日二三剂。

【主治】伤寒坏证，身热口渴，舌苔及舌如煨熟猪腰子。

【加减】甚者，人中黄、人中白（研细）各一钱调服；加知母、地骨皮、苦参亦可；虚人，加人参、黄耆、炙甘草。

21772 归地养营汤

《伤寒广要》。为《简明医彙》卷二“归地养荣汤”之异名。见该条。

21773 归地滋血汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】秦归四钱 熟地 鹿角霜 香附各三钱 泡参四钱 白术三钱 桑寄生四钱 枸杞 萸肉各三钱

【用法】水煎，空腹服。

【功用】滋阴补血。

【主治】月经后期属单纯血虚者。经行量少，色淡质薄，精神短少，头晕心悸，腰痠腿软，舌淡脉弱。

21774 归地滋阴汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】当归 熟地各三五钱 白芍（酒炒）一钱半 川芎一钱 干姜（炒透）六七分 甘草（炙）一钱 荆芥穗六分

【用法】水煎服。

【主治】产后阴虚阳燥，头痛不止。

21775 归芍二陈汤

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】当归 白芍(炒) 广皮 茯苓各一钱 炙甘草五分 法制半夏三钱

【用法】加生姜一片,大枣二枚为引,食远服。

【主治】痰饮呕恶,风寒咳嗽;或头眩心悸,或中脘不快,或吃生冷,饮酒过多,脾胃不和。

21776 归芍二黄汤

【方源】《女科旨要》卷四。

【组成】黄耆一钱五分 白术 苍术 当归 白芍 陈皮各一钱 熟地五钱 生地炙甘草各三钱 柴胡二钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人漏下不止,其色鲜红,先由劳役,脾胃虚损,气短气逆,自汗不止,身体发热,大便泄泻,四肢无力,不思饮食。

21777 归芍大黄汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归身 白芍药 川大黄 丹皮

【主治】眩晕,左手脉数,爆火伤血者。

21778 归芍天地煎

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】天门冬 生地 当归 白芍药 丹皮 山梔

【用法】玄武胶收厚膏服。

【主治】房劳竭精,肾火刑金,而致内伤嗽血。

21779 归芍六君丸

《饲鹤亭集方》。即《笔花医镜》卷二“归芍六君子汤”改为丸剂。见该条。

21780 归芍六君汤

《成方便读》卷一。为《笔花医镜》卷二“归芍六君子汤”之异名。见该条。

21781 归芍六味丸

《饲鹤亭集方》。即《症因脉治》卷二“归芍地黄汤”改为丸剂。见该条。

21782 归芍甘麦汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】当归二钱 杭芍四钱 白术三钱 柴胡二钱 茯神三钱 甘草一钱 小麦一两(或麦芽六钱) 大枣三枚

【用法】水煎,不拘时温服。

【功用】舒肝解郁。

【主治】产后乳汁自出,面色苍黄,间有潮红,心烦易怒,头晕胁胀,舌黄,脉弦数。

21783 归芍地黄汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】生地 归身 白芍药 枸杞 丹皮 知母 人参 甘草 地骨皮

【功用】补血。

【主治】血虚咳嗽

21784 归芍地黄汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【异名】六味归芍汤(《证因方论集要》卷一)

【组成】当归 白芍 生地 丹皮 茯苓 山药 山茱萸 泽泻

【主治】①《症因脉治》:外感吐血,失血太多,脉芤而涩者。②《外科证治全书》:肝肾真阴不足,不能滋养荣卫,眼花耳鸣,口燥舌干,津液枯竭。

【备考】本方改为丸剂,名“归芍六味丸”。(见《饲鹤亭集方》)

21785 归芍异功汤

【方源】《金鉴》卷六十六。

【异名】归芍异功散(《类证治裁》卷七)。

【组成】人参 白术(土炒) 广陈皮 白芍(酒炒) 当归身各一钱 白茯苓二钱 甘草(炙)五分

【用法】加灯心五十寸,水煎,空心服。

【功用】扶脾,健胃,止泻。

【主治】舌疳,痢疾、便血属脾虚者。

①《金鉴》:舌疳便溏者。②《类证治裁》:脾虚便血。③《疡科心得集》:痢疾脾胃虚弱,饮食少,血虚作痛。

21786 归芍异功散

《类证治裁》卷七。为《金鉴》卷六十六

“归芍异功汤”之异名。见该条。

21787 归芍红花散

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】当归 大黄 栀子仁 黄芩 红花(以上俱酒洗,微炒) 赤芍药 甘草 白芷 防风 生地黄 连翘各等分

【用法】上为末。每服三钱,水煎,食远服。

【主治】眼胞肿硬,内生疮瘡。

21788 归芍连壳饮

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】川芎一钱五分 当归三钱 白芍(酒炒) 茯苓各一钱 黄连六分(姜汁炒) 枳壳五分(麸炒) 甘草四分 木香三分

【用法】水煎服。

【主治】产后半月外,患赤痢后重。

21789 归芍利导汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】油当归七钱 枳壳(面煨,去瓢) 萝卜子 槟榔各一钱 生白芍五钱 车前一钱五分 细甘草一钱

【主治】痢,日夜数十次,欲下不下,逐点而来者。

【加减】如实热,加槐花一钱五分;虚寒人,加泡吴萸六分,干姜六七分或一钱,甘草(蜜炙)。

【备考】服药后,大便渐通,色变黄,即不可再服。

21790 归芍香连丸

【方源】《慈幼心传》。

【组成】当归二两五钱 芍药二两 苍术一两 地榆一两 神曲 厚朴各七钱 槟榔 黄连各六钱 黄芩八钱 甘草四钱 木香三钱 山楂一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,炒米汤化下。

【主治】赤痢。

21791 归芍活血散

《麻疹全书》卷三。为原书同卷“归芍调血汤”之异名。见该条。

21792 归芍柴胡汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】当归三钱 白芍药三钱 柴胡三钱 黄芩五钱 广皮二钱 甘草五钱

【主治】肝经血虚,发热。

21793 归芍柴胡汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 广皮 甘草 当归 白芍药 牡丹皮 地骨皮

【主治】热入血室,迫血妄行,下血谵语而头汗者。

21794 归芍柴胡汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】归身 白芍 柴胡 生地 丹皮 地骨皮 秦艽 黄芩 广皮 甘草

【功用】凉血养血。

【主治】血虚夜发热,热入血室,阴虚骨蒸。

21795 归芍润燥汤

【方源】《医钞类编》卷十。

【组成】当归三钱 白芍 生地各一钱五分 桃仁 红花 大黄(酒制) 枳壳各一钱

【用法】加韭汁半杯,水煎服。

【主治】服通利药过多,津液耗而喘者。

21796 归芍调血汤

【方源】《麻疹全书》卷三。

【异名】归芍活血散。

【组成】当归(酒焙)五钱 酒赤芍三钱 酒白芍五钱 川芎五钱 紫草五钱 红花五钱 木香二钱 血竭二钱

【用法】上为末。每五岁者服一钱,十岁以上者服二钱,酒送下。

【主治】麻色淡白。

21797 归芍理中丸

【方源】《全国中药成药处方集》(昆明方)。

【组成】潞党参五两 漂于术四两 炮姜三两 炙草二两 当归五两 炒杭芍三两

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服一丸,开水送下。

【功用】安胎,止盗汗。

【主治】吐血,鼻衄,肠红。

【宜忌】忌生冷。

21798 归芍葛芩汤

【方源】《镐京直指》卷二。

【组成】当归四钱 白芍三钱 延胡索三钱 山楂(炒)二钱 广木香一钱(炙) 葛根二钱 黄芩(炒)一钱半 川连(炒)六分 川朴一钱 枳壳(炙)三钱

【功用】消导荡涤。

【主治】湿热胶固肠胃,伤于气血而致赤白痢疾,腹痛,里急后重。

21799 归血凉荣汤

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】丹皮 地黄 芍药(炒) 麦冬(去心) 蒲黄 甘草 黄芩(炒) 茅根

【用法】水二钟,煎七分服;滓再煎服。

【主治】吐血、衄血、咯血、郁血。

21800 归麦榆草汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】生甘草二两 当归一两 麦冬一两 地榆五钱

【用法】水煎服。

【主治】一时短见,服盐卤之毒,口咸作渴,腹中疼痛,身踈脚缩而死。

21801 归芍参附汤

【方源】《女科秘旨》卷二。

【组成】当归三钱五分 川芎一钱七分 茯苓 人参 生地 香附子各二钱 白术一钱五分 黄芩七分 麦冬一钱五分

【用法】生姜,大枣为引,水煎服。

【主治】妊娠恶阻渐退。

21802 归连石斛汤

【方源】《湿温时疫治疗法》引《沈樾亭验方传信》。

【组成】油当归五钱 小川连七分 鲜石斛三钱 炒枳壳一钱 鲜荷叶一角(拌炒) 长须生谷芽四钱

【功用】润肠祛积,开胃运气。

【主治】妊妇及体虚之人赤痢、白痢、赤白痢。

21803 归身生地汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】归身五钱(生) 生地五钱 知母一钱 黄芩一钱 柴胡二钱 羌活二钱 葛根二钱 浮萍一钱半

【主治】疹证欲出不出,方出骤回,泻痢,喘促,谵妄等疹初诸实证。

【加减】若热势上冲,咽喉肿痛;热郁于胃,大渴引饮,呕吐不食,胸腹胀痛,坚硬拒按,加酒浸大黄三钱下之。

【方论选录】归身滋阴生血,补而不滞;生地滋阴清热,凉而不寒;加以柴、葛、羌活托里而兼解表。

21804 归灵内托散

《外科大成》卷四。为《外科正宗》卷三“归灵汤”之异名。见该条。

21805 归尾牛膝汤

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】当归尾二钱 川牛膝五钱(酒洗) 木通五钱 滑石四钱 冬葵子二钱半

【用法】水煎,连服二剂。

【主治】胎衣不下。

21806 归尾泽兰汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】归尾 泽兰 牛膝 红花 延胡索 桃仁各一钱

【主治】产后儿枕腹痛,并恶露不下。

21807 归附地黄丸

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归(酒洗)三两 川芎一两 白芍(酒炒)二两 熟地黄(酒蒸)一两 香附子(童便浸,炒)二两 陈皮一两半 黄柏(去皮,童便浸三日;晒干)一两半 知母(去毛)一两半(酒浸,晒干) 五味子一两半 苍术(米泔浸,炒)二两 牡蛎(煅)五钱 椿根皮(酒炒)二两半(一方有白葵花;一方有山茱萸,酒蒸,去核,无五味)

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心淡盐汤下,后用干物压之。

【主治】妇女赤白带下。

【加减】人虚，加人参、白术。

【宜忌】忌葱白、萝卜、胡椒、煎炒、发热之物。

21808 归经两安汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】人参三钱 当归五钱 白芍五钱 熟地五钱 山茱萸二钱 巴戟天一钱 白术五钱 麦冬五钱 荆芥(炒黑)三钱 升麻四分

【用法】水煎服。

【主治】妇人经入大肠，行经之前一日大便出血。

21809 归经佛手散

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】当归一两 川芎 白术各五钱 荆芥三钱 炒黑干姜一钱 甘草一钱 人参三钱 熟地一两

【用法】水煎服。

【主治】妊妇大怒之后，血不归经，忽然腹痛，因而堕胎；及胎堕之后仍然腹痛者。

21810 归荆安枕汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】当归五钱 丹皮一钱 荆芥三钱 山楂十粒

【用法】水煎服。

【主治】妇人产后瘀血成团未散，小腹疼痛，甚则结成一块，手按之益痛，此名儿枕痛。

21811 归养心肾丸

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】生地 熟地 黄耆 白术 山药 芡实 茯神 枣仁 归身 萸肉 五味 甘草

【用法】陈蜜为丸。每服三钱，空心白汤送下。

【主治】虚劳。

【加减】气虚，加人参；久遗，加杞子、金樱；漏滑，加莲须、芡实；心火盛，加石莲；

寒精自出，加苡蓉、鹿茸、沙苑、菟丝；泄泻，加泽泻、莲肉；腰膝软弱，艰于步履，加牛膝、杜仲、龟鹿胶。

【方论选录】二地滋阴，当归养血，茯神、枣仁补心，耆、术、药、草调气补中，五味，芡实固精滋肾。

21812 归养心脾汤

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】人参 黄耆 白朮 芡实 北五味 甘草 生地 枣仁 茯神 当归身 山药

【主治】梦遗滑精。

【加减】遗甚，加萸肉、莲须；思虑过度，加莲肉；不禁，加石莲、金樱膏；足痿，加牛膝、杜仲、龟版胶。

【方论选录】参固气，气固则精有摄而不遗；生地滋阴，阴滋则火有制而不浮越；当归养血；芡实固肾；茯神、枣仁安神宁志；耆、术、药、草补气调中。气旺神昌，则精固而病自愈。

21813 归姜羊肉汤

【方源】《类证治裁》卷八。

【组成】羊肉一斤 当归五两 生姜六两 黄耆四两

【用法】先以水煮羊肉取汁，下后三味，分四服，煮食。

【主治】产后下焦虚，脏寒腹痛。

【加减】有恶露，加桂心三两。

21814 归活温经汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】当归 羌活 独活 防风 川芎 丹参 青皮 香附 乌药 川断

【功用】补血温经，兼祛外邪。

【主治】妇人经行，遍体作痛，下血多，筋失其养，痛如行痹。

【方论选录】是方羌活、独活、防风、川芎散风寒，青皮、乌药、香附行气止痛，加以当归、丹参温补营血，厚朴和胃温中，川断利周身筋脉。风寒去，经血行，而体痛自除。

矣。

21815 归神定志丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】川归七分 茯神一两 人参五钱 远志一两(去心) 酸枣仁五钱 龙齿五钱 辰砂三钱 琥珀三钱 金银箔各十张 真珠三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大，金银箔为衣。每服一丸，麦冬汤化下，不拘时候。

【主治】男妇癫痫；或用心过度，神驰出舍，怔忡失志。

21816 归桂化逆汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】当归二钱 白芍一钱五分(酒炒) 肉桂五分 青皮一钱 茯苓二钱 蒺藜四钱 郁金二钱 合欢花二钱 木香五分 牛膝二钱 玫瑰花五分 红枣五枚 降香五分

【功用】解郁和中。

【主治】①《医醇剩义》：肝气犯胃，食入作吐。②《谦斋医学讲稿》：血虚，肝气郁结成膈。

21817 归善止血汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】当归 黄耆 蒲黄(半生半炒) 香附 桂心 熟艾 白术 地榆(炒黑) 黄芩(炒黑) 炙草 川芎

【功用】祛客寒，温经血。

【主治】妇人因感风冷，余经留滞血海，经行后已止五六日，忽然暴崩。

【方论选录】是方耆、术以补气，芎、归以补血，蒲、芩、地榆皆黑以止血，香附、桂、艾温经散寒，炙草和中益气，崩下自止。

21818 归圆杞菊酒

《摄生秘剖》卷四。为原书同卷“养生主”之异名。见该条。

21819 归凉节命散

《胎产秘书》。为《袖珍》卷四引《济生》“归凉接命散”之异名。见该条。

21820 归凉节命散

《郑氏家传女科万金方》卷二。为《袖珍》卷四引《济生》“归凉接命散”之异名。见该条。

21821 归凉接命散

【方源】《袖珍》卷四引《济生》。

【异名】归凉节命散(《郑氏家传女科万金方》卷二)、归凉节命饮(《胎产秘书》)。

【组成】川芎 芩根 白芍药 麦门冬(去心) 当归(去芦，酒浸) 白术各一两 糯米半合 甘草(炙)半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠面赤，口苦，心烦，腹胀。

21822 归脾养荣汤

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 茯苓 陈皮 甘草 麦冬 升麻 山梔 桔梗 黄耆 白术 防风 黄连 黄柏 知母 牡丹皮 小柴胡

【主治】茧唇久不愈者。

【加减】妇人，加泽兰、香附、玄胡索。

21823 归脾养营汤

《疡科心得集·方汇》卷上。为《正体类要》卷下“归脾汤”之异名。见该条。

21824 归掌地黄丸

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】归掌(即归身) 生地 熟地 天冬 麦冬 枸杞子 黑大豆(酒煨) 何首乌各二两 山药 茯神 黄耆(炙) 白术各一两 石决明(童便浸，煨) 草决明 蜜蒙花 谷精草(只取花用) 木贼(去节) 甘菊(去蒂) 丹皮 川芎各五钱

【用法】上为细末，羊肝二个，不落水煮熟，捣烂为丸，如梧桐子大。每服三钱，淡盐汤送下。

【主治】内障昏花，瞳神散大，或缩小不明；青盲黑暗，虚翳遮睛；及血少阴虚而微热者。

【加减】热甚，加知母、黄柏各一两，肉桂二钱；虚寒，加菟丝子(酒浸，炒)、补骨脂

各一两。

21825 归芍六君子丸

《中药成方配本》。即《笔花医镜》卷二“归芍六君子汤”改为丸剂。见该条。

21826 归芍六君子汤

【方源】《笔花医镜》卷二。

【异名】归芍六君汤（《成方便读》卷一）。

【组成】归身 白芍各二钱 人参 白术 茯苓各一钱五分 陈皮 半夏各一钱 炙草五分

【功用】《饲鹤亭集方》：补气血。

【主治】脾胃不健，气血两亏所致之咳嗽，纳少，神疲，膨胀腹满，呕吐，下血，妊娠痢疾及妇人经水不调。

①《笔花医镜》：脾阴虚弱下血。②《古方汇精》：妊娠痢疾，服祛邪化滞煎未止者。③《饲鹤亭集方》：脾胃虚弱。饮食不思，膨胀腹满，呕吐痰水，气郁困倦。④《中药成方配本》：脾胃不健、气血两亏，咳嗽痰多，纳少神疲。⑤《成方便读》：妇人经水不调，色淡而晦，由脾虚湿盛所致。

【方论选录】《成方便读》：以六君子为君，加当归和其血，使瘀者去而新者得有所归；白芍通补奇经，护营敛液，有安脾御木之能，且可济半夏、陈皮之燥性耳。

【备考】本方改为丸剂，名“归芍六君子丸”（见《饲鹤亭集方》），“归芍六君子丸”（见《中药成方配本》）。

21827 归来轩毡道人风药

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】红曲半斤 苍术 乌药 天花粉 何首乌 白芷 陈皮 蝉壳 川楝子 补骨脂 天南星(炮) 苏木 藁本 鹭鸶藤 黑牵牛 僵蚕 五灵脂 地龙 宣木瓜 香附子 荆芥 川芎 当归 细辛 草薢 蚕砂 赤芍药 防风各半斤 草乌二十二斤 川乌五斤 乳香四两

【用法】上为末，面糊为丸，如黄豆大。每服二丸，早饭后、临卧各一服，嚼碎，茶送

下；酒亦得。

【主治】男子、妇人左瘫右痪，口眼喎斜，八种头风，五种腰疼，筋骨缩疼，半身不遂，手足麻木，血气燥痒，疮癣疥癩，眼流冷泪，一切风疾。

【宜忌】孕妇勿服。

北

21828 北艾汤

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】北艾一把

【用法】煎汤，密室中洗，仍以白胶烧烟熏之，续贴膏药。仍多服排脓内补散、加味不换金正气散。

【主治】痈疽，疮口冷滞，脓血少，肉色白，久不合。

21829 北枣丹

【方源】方出《幼幼新书》卷二十五引《张氏家传》，名见《医统》卷六十四。

【异名】金枣散（《疡科纲要》卷下）。

【组成】北枣一枚 真砒一黑豆大

【用法】大枣去核，纳真砒于枣内，外面纸裹，泥固，火烧存灰，研极细，鸡毛扫病处。

【主治】走马牙疳。

21830 北枣散

【方源】《医方大成》卷十引《幼幼方》。

【组成】北枣一枚（去核，入鸭嘴胆矾一片在内，纸裹火煨通红，出火毒）。

【用法】上为细末。敷牙左右。

【主治】小儿走马疳。

21831 北亭丸

【方源】《养老奉亲》。

【组成】北亭二两（去除砂石） 阿魏半两（同硝砂研令细，醋化，去砂石） 川当归（净洗，去苗梢用） 厚朴（去皮，姜汁炙令黄色） 陈橘皮（去瓤用红） 官桂（去皮称） 干姜（炮） 甘草（炙） 川芎 胡椒（拣好者） 缩砂（去皮用） 大附子（炮，去皮脐）各四两 茯苓二两 青盐二两

(与硃砂、阿魏同醋研，去沙土) 白术(米泔水浸一宿，切作片子，焙干) 五味子(去沙土用之) 各一两半

【用法】上药依法修事为末，将硃砂、阿魏、醋入面看多少，同煎稀糊，下药，更炼好蜜，同搜和为丸，如酸枣大。每服一丸，嚼破，空心盐汤、茶、酒任下。

【功用】壮元，补血，健胃，暖脾，止痰逆，消饮食。

【主治】妇人、男子久积虚败，妇人一切病患。

21832 北亭丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】缩砂仁 胡椒 肉桂(去粗皮) 厚朴(去粗皮，姜汁炙) 附子(炮，去皮脐) 川芎 当归(去芦、锉碎) 陈皮(去白) 干姜(炮) 甘草(炙) 各四两 青盐(别研) 北亭(即硃砂，醋淘去砂石，别研) 各二两 白术(别研) 三两 五味子(拣) 一两半 阿魏(醋化，去砂石) 半两

【用法】上为末，用银、石锅，纳入好酒、醋五升，白沙蜜十两，先下北亭、阿魏、青盐三味，并好头面一升，同煎稠粘，便下药末半斤以来，更煎如稀面糊，渐渐入药末煎得所，离火取出，更以干药末和搜成剂为丸，如梧桐子大。每服十五丸，微嚼破，空心生姜盐汤送下；温酒亦得。

【主治】脾元气弱，久积阴冷，心腹肋肋胀满刺痛，面色青黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，食少多伤，噎气吞酸，逆逆恶心，腹中虚鸣，大便泄利，胸膈痞塞，饮食不下，呕逆霍乱，体冷转筋，及五膈五噎，痞癖瘕聚，翻胃吐食，久痛久痢。

【宜忌】忌羊血、豉汁。

21833 北亭丸

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】北亭一钱(末) 朱砂一钱(末) 腻粉 牙消一钱 巴豆二十一个(取霜)

【用法】上为细末，用蒸饼剂裹药煨熟，去

焦硬者，取中心软处，近药润者，用药和剂，如硬，滴入水得所，为丸如绿豆大。每一岁儿一丸，乳食前荆芥汤送下。

【主治】一切积癖，黄瘦吐食。

21834 北亭散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】白矾(别研) 乳香(别研) 黄连(去须) 各一两(取末) 硃砂半两(别研) 全蝎一钱(取末)

【用法】上药用大鲫鱼一枚，去肠并鳞，入药末在内，湿纸裹，麻皮缠，盐泥固济，文武火煨熟，去泥纸，却用慢火炙焦，同为细末。每服二钱，空心粟米饮调下。

【主治】肠风痔漏，积年脓血不干。

21835 北庭丸

【方源】《普济方》卷二十九。

【组成】北庭半两(飞过，煎成霜) 附子一两(研为末)

【用法】上药以生薯蓣于砂盆内研，调前药为丸，如梧桐子大。仍用禹余粮、盐等分，入瓶内固济，煨通赤，放冷研细。以末一钱，空心汤点下十五丸。

【主治】凡梦鬼交者，盖由肾气虚，为客邪所乘，入于脏则喜梦，肾既虚不能制于精，因梦感而动泄，久不止，则令人枯瘁不泽，少力。

21836 北庭丹

《金鉴》卷六十六。为原书同卷“清溪秘传北庭丹”之异名。见该条。

21837 北梗散

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】北梗 天花粉 干葛 川升麻 川芎 赤芍药 独活 柴胡 甘草

【用法】上锉散。每用一钱，加生姜二片，井水煎服。

【主治】热毒与血相击，而风乘之，而致赤游肿者。

21838 北地太守酒

【方源】《千金》卷二十四。

【组成】乌头 甘草 芍药 黄芩 桂心

藜芦 附子各四两 白薇 桔梗 半夏 柏子仁 前胡 麦门冬各六两

【用法】用七月曲十斤，秫米一斛，如酤酒法。吹咀上药，以绢袋盛之，沉于瓮底，酒熟去糟，还取药滓，青布袋盛之，沉着酒底，泥头，秋七日，夏五日，冬十日。空肚服一合，一日三次，以知为度。药有毒，故以青布盛之，服勿中止，二十日大有病出，其状如漆，五十日病悉愈。

【主治】万病蛊毒，风气寒热。

【方论选录】《千金方衍义》：方中调和血气之品居多，惟乌、附祛风、藜芦利窍，而《本经》有蛊毒之治，佐以白薇、桔梗、半夏以助破结开痰之势，得力全在酿酒，通行经络，方能兼疗方后诸病，不独治蛊之用也。

【临证举例】①积聚 有妇人年五十，被病连年，腹中积聚，冷热不调，时时切痛，绕脐绞急，上气胸满，二十余年。服药二七日，所下三四升即愈。②偏枯、不孕 一妇女病偏枯绝产，服二十日，吐黑物大如刀带，长三尺许，即愈，其年生子。③癰病 一女人小得癰病，服十八日，出血二升半愈。④跌打损伤 有人被杖，崩血内瘀，卧着九年，服药十三日，出黑血二三升愈。⑤耳聋 有人耳聋十七年，服药三十五日，鼻中出血一升，耳中出黄水五升，便愈。

21839 北味吴萸汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】肉蔻霜一钱 北味六分 吴萸(泡)五分 白术(净炒)一钱五分 炙甘草五分

【主治】肾泄，五更即溲泻，经年不愈。

21840 北京盐水錠

《外科方外奇方》卷一。为《良朋汇集》卷三“观音救苦錠”之异名。见该条。

21841 北平太守八味散

【方源】《千金》卷十四。

【组成】天门冬六分 干地黄四分 桂心茯苓各一两 菖蒲 五味子 远志 石韦各

三分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，食后酒、水任服。服三十日力倍，六十日气力强，志意足。

【功用】《普济方》：养命，开心益智。

【主治】好忘。

叶

21842 叶灵神丹

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】荷叶炭十斤 生地 杭芍 当归 川芎各四两

【用法】上为细末，炼蜜为大丸，重二钱五分。

【主治】血症。

21843 叶氏痢症丸

【方源】《痘学真传》卷七。

【组成】西牛黄一钱 琥珀三钱 羚羊角三钱 降香二钱 犀角尖三钱 麝香二分 朱砂四钱(水飞) 天竺黄四钱 雄黄四钱(水飞) 半夏曲四钱 僵蚕二钱(去头足，炒) 冰片三分 沉香二钱 全蝎二钱(甘草水浸，去头足) 羌活二钱 青礞石三钱(火煨) 石菖蒲二钱 真金箔三十张 白附子三钱 明天麻二钱(湿纸包，煨) 胆星四钱

【用法】预选道地药品精制，为末，照方称准分量合和，再研，用雄猪心血一具，和甘草汁为大丸。每岁丸重二分，十岁以外者二钱。

【主治】痢症。

叭

21844 叭啞杏仁粉

【方源】《全国中药成药处方集》(福州方)。

【组成】甜杏四两 白冰十六两

【用法】研和为粉。开水冲粘，当茶点服用。

【功用】润肺化痰，清金降火。

21845 叭哒润嗽膏

【方源】《同寿录》卷二。

【组成】叭哒扁杏仁四两(泡,去皮尖。药杏仁不用)

【用法】研如糊,加真正山东柿霜一两,上白蜜二两,同研烂成膏,饭锅上蒸透。每用二三匙,放舌上润下。立愈。

【主治】嗽。

卢

21846 卢同散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】款冬花 井泉石 鹅管石 钟乳石 官桂 甘草 白矾 佛耳草各等分

【用法】上为末。每服一钱,竹筒子吸吃,一日三次。

【主治】男子妇人一切咳嗽喘急。

21847 卢氏元菟丹

《痧疹辑要》卷一。为《赤水玄珠》卷十“玄菟丹”之异名。见该条。

21848 卢氏感应丸

《得效》卷四。为《局方》卷三(新添诸局经验秘方)“卢氏异方感应丸”之异名。见该条。

21849 卢氏异方感应丸

【方源】《局方》卷三(新添诸局经验秘方)。

【异名】卢氏感应丸(《得效》卷四)、如神木香丸(《得效》卷四)。

【组成】黄蜡(真者)十两 巴豆一百粒(去皮,研为粉,用纸数重裹捶,油透再易纸,至油尽成白霜为妙) 乳香(锉,研)三钱 杏仁七十枚(去皮尖,研细,依巴豆法去油) 丁香(怀干) 木香(湿纸裹,煨) 干姜(炮) 肉豆蔻(面裹,煨) 革澄茄 槟榔 青皮(汤洗,去瓢,炒) 百草霜(筛细) 片子姜黄各一两

【用法】上除巴豆粉、百草霜、杏仁、乳香外,余并为细末,却同前四味拌和研匀,先将上项黄蜡十两,于银、石器内熔化作汁,用

重绵滤去滓,以无灰好酒一升,于银、石器内煮蜡熔,数滚取起,候冷,其蜡自浮于酒上,去酒不用,春夏修合,用清麻油一两,秋冬用油一两半,于大银器内熬令香熟,次下酒煮蜡,同化作汁,乘热拌和前项药末,十分均匀了,候稍凝,分作剂子,用罐子盛之,半月后方可服。如服,旋丸如萝卜子大,任意服之,二三十丸至五十丸,临睡时常服之;若欲治病,不拘时候。

【功用】健脾进食,消磨积滞。

【主治】①《局方》(新添诸局经验秘方):寒热泻痢,酒食醉饱。②《得效》:虚弱人久积。

21850 卢祖师解毒辟瘟丹

《卫生鸿宝》卷一。为《良方集腋》卷上“太乙救苦辟瘟丹”之异名。见该条。

占

21851 占斯散

《千金翼》卷二十四。为《鬼遗》卷四“木占斯散”之异名。见该条。

21852 占斯散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】占斯一两 甘草一两(炙微赤,锉) 细辛一两 栝楼根一两 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 防风一两(去芦头) 川大黄一两(生用) 人参一两(去芦头) 桔梗一两(去芦头) 败酱一两

【用法】上为细散。每服二钱,食前以温粥饮调下。

【主治】肠痢。

21853 占斯散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】占斯半两 黄耆半两(锉) 细辛一分 木香一分 连翘二分 桔梗一分(去芦头) 芎藭二分 甘草一分(炙微赤,锉) 白芍药一分 续断一分 人参二分(去芦头) 独活一分 熟干地黄半两

【用法】上为细散。每服二钱,食前以粥饮

调下。

【功用】生肌内补。

【主治】久痢，及风毒气留积穿穴，久出脓水，疼痛不止。

只

21854 只金丹

【方源】《普济方》卷二四七引《得效》。

【组成】小茴香二两 湿生虫(阴干)二两

【用法】上为末。酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心茴香汤送下。

【主治】男子疝气，小肠虚损。

出

21855 出毛丸

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】雄黄 大蒜 杏仁各一两

【用法】上除雄黄外，先捣如泥，入乳钵内与雄黄同研匀，日内晒，候可丸，即丸如梧桐子大。每服二十一丸，凌晨空心清米饮送下。

【主治】肺疼久嗽，梦见先亡，或梦中饮食，亡精失血，多怒少睡，饮食不入，渐渐羸瘦；及骨蒸虚劳，传染鬼气。

【宜忌】服毕不得洗手，频看十指甲中有毛出，逐旋拭了，至辰时候方得洗手。

21856 出虫丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】朱砂一分(细研) 麝香一分 牛黄一分 蟾酥半钱 熊胆一分 蜗牛子一分(炒微黄) 夜明沙一分(微炒)

【用法】上为细末，以面糊和丸，如绿豆大。每服三丸，以温水送下；更别以水研一丸，滴向鼻中，得嚏五七声，良久当有虫随汁出。

【主治】小儿五疳久不愈，羸瘦极甚。

21857 出虫膏

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】自死虾蟆一枚 头发一把

【用法】以猪膏一斤半，纳二物煎之，消尽

下之，欲冷，纳盐一合搅和。以膏着疮中，日一易。

【主治】痈疽败证及骨疽。

21858 出声散

《普济方》卷二十六。为《圣济总录》卷四十八“三味丸”之异名。见该条。

21859 出虫芦荟散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】芦荟半两(细研) 胡黄连半两 雄黄一分(细研) 熊胆半两(研入) 朱砂半两(细研) 代赭一分 麝香半分(细研) 干蟾一枚(涂酥，炙微焦黄)

【用法】上为细散。先用桃柳汤浴儿，后以粥饮调下半钱，然后用青衣盖覆。

【主治】小儿五疳，烦热干瘦；或渴，不欲乳食。

21860 出声消肺散

【方源】《观聚方要补》卷七引《经验秘方》。

【组成】人参 茯苓 半夏曲 甘草 橘红 干葛 黄芩 桔梗 薄荷 五味子 杏仁 连翘 犀角屑

【用法】水煎，加蜜二钱服。

【主治】咽喉病，疳腮，梅核气。

21861 出牙齿乌头散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】川乌头一分 巴豆一七枚(去皮) 大礞砂一字 硃砂一字 大蜘蛛一枚(炙干) 膩粉半钱

【用法】上为细散，研入巴豆令匀。每用少许著牙根，一食间牙即自出。

【主治】牙齿动摇，终不牢固者。

田

21862 田父丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】田父一枚(涂酥炙) 蛇蛻皮一条 母丁香二十枚 夜明沙一分(微炒) 干漆半两(捣碎，炒令烟出) 朱砂半两(细研) 麝香一分(细研)

【用法】上为末。先取半两，用醋一中盏，熬成膏，后入余药，为丸如黍米大。每服三九，以粥饮送下。

【主治】小儿一切疳。

21863 田父丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】田父三分(炙微黄) 夜明沙半两(微炒) 蛇蛻皮半两(烧灰) 胡黄连三分 牛黄一钱(细研) 白矾灰一分 朱砂一钱(细研) 麝香一钱(细研) 莨菪子一分(水淘去浮者，炒令黄黑色)。

【用法】上为末，都研令匀，以糯米饭为丸，如绿豆大。三岁儿每服三九，空心以熟水送下。服药后，用桃柳汤洗浴了，以青衣复盖，良久，当有虫子出，黄白赤者易治，黑色者难医。

【主治】小儿五疳，下痢羸瘦，鼻痒。

21864 田季散

【方源】《苏沈良方》卷十。

【异名】二气散(《小儿药证直诀》卷下)、二圣散(《扁鹊心书·神方》)。

【组成】好硫黄半两(细研) 水银一分(与硫黄再研无星)

【用法】同研如黑煤色。每服三钱，生姜四两取汁，酒一盏，同姜汁煎熟调药，空心服。衣被盖覆，当自足指间汗出，迤邐遍身，汗出即愈。治小儿诸吐亦用此药，量儿长少，服一钱至一字，冷水调下。吐立定。此散极浮难调，须先滴少水，以至缓缓研杀，稍稍增汤，使令调和，若顿入汤酒，尽浮泛，不可服。

【主治】久患翻胃，及小儿惊吐，诸吐。

【临证举例】反胃 有人病反胃，食辄吐出，午后即发，经三年不愈，国医如孙兆辈，皆治疗百端无验，消羸殆尽，枯黑骨立。有守库卒季吉者见之曰：此易治也，一服药可愈，如法服之，汗出皆如胶，腥秽不可近，当日更不复吐，遂愈。

21865 田姜散

【方源】《串雅补》卷四。

【组成】生香附(去毛，晒干)

【用法】上为细末。每症用一钱，小儿五分，白汤送下；外伤用此人乳调敷；疡肿初起，用醋调敷。

【主治】诸气，诸郁，诸痛，男女大小，内外不拘，岚瘴痧毒疮疡，跌闷，禽兽蛇虫伤螫。

21866 田螺水

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】大田螺一枚

【用法】用冰片五厘研末，以针挑起螺盖，将冰片入内，平放片时，待螺渗出浆水。用鸡毛蘸搽患处，勤勤扫之。其肿痛自然消散。

【主治】痔疮坚硬作痛，及脱肛肿泛不收者。

21867 田螺饮

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】田螺(活者)一升

【用法】以水一斗，煮至二升，不问食前后，稍稍饮汁。一方用螺五升，水一斗半，浸之经宿，渴即饮浸螺汁，每日一度易水并螺。

【主治】卒患消渴，小便利数。

21868 田螺散

【方源】《朱氏集验方》卷十五。

【组成】大田螺二个。

【用法】各起掩，入巴豆一粒，去壳取肉在螺内，仍掩住，须臾尽化成水，却去掩挟置胸下，令水贴在肉上。须臾狐气上冲，恶心想吐，却以感应丸一帖并神保丸三九，同用温汤送下，令泻即愈，两服断根。

【主治】狐臭。

【备考】《医统》引《经验方》本方用大田螺一枚，清水养之，俟厝开，以巴豆肉一粒，针挑纳螺口中，即放盏内，夏日过宿，冬月五七宿，自然成水。治体气，取水搽腋下，永绝其根。

21869 田螺膏

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷四引《种杏仙方》。

【组成】好大田螺八个。

【用法】针破顶盖，入白矾末少许，置地上，尖底埋土中，其顶盖仰天。经一宿，次日取盖，上水汁，以鸡羽涂痔上。五七日即消。

【主治】痔疮肿痛，坐卧不得，诸药不效。

21870 田螺膏

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】田螺七枚（去壳） 撮地金钱多枚 生地黄根 田茶菊叶各等分

【用法】上同捣烂，贴太阳穴及眼泡。

【主治】眼睛肿胀突出，及赤眼生翳膜。

【备考】方中生地黄根，田茶菊叶用量原缺，据《中国医学大辞典》补。

21871 田螺捻子

【方源】《血证论》卷八。

【组成】田螺三枚 冰片五分 白矾五分 硃砂一钱

【用法】捣和，米糊为捻子。

【功用】化腐，去瘀肉，枯血瘀。

21872 田单火牛汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】人参 黄耆 附子各二钱 藜子（同穿山甲炒）五分 当归二钱 官桂二分 甘草三分 橘红八分

【用法】水煎服。

【主治】痘发六七朝，色白平塌，状似吐铁壳，更兼寒战。

21873 田螺解胀敷脐方

【方源】《寿世新编》。

【组成】大田螺一个 雄黄一钱 甘遂末一钱 麝香一分

【用法】先将药末和田螺捣如泥，以麝置脐，放药脐上，以物覆之束好。待小便大通去之。重者再用一料，小便大通，病即除矣。

【主治】一切腹胀，肚饱发胀，小便不通。

21874 田螺解胀敷脐方

【方源】《寿世新编》。

【组成】大田螺四个 大蒜五个（去皮） 车前子三钱（为末）

【用法】共研为饼。以一饼贴入脐中，用手

帕缚之。贴药后少顷，水从小便出，一二饼即愈。

【主治】一切腹胀，肚饱发胀，小便不通。

申

21875 申药

【方源】《咽喉秘集》。

【组成】元明粉一两 雄精一钱

【功用】去痰消肿。

【宜忌】孕妇及虚弱人，病势沉重者，皆不可用。

甲

21876 甲乙饼

【方源】《三因》卷十二。

【组成】青黛一分 牡蛎粉二钱匕 杏仁七粒（去皮尖，研）

【用法】上为末，入黄蜡一两，熔搜为丸，如弹子大，压扁如饼。每用中日柿一个（去核），入药在内，湿纸裹煨，约药熔，方取出，去火毒。细嚼，糯米饮送下。

【主治】①《三因》：咳出血片，兼涎内有血条，不问年久月深，但声在。②《寿亲养老》：痰喘咳嗽。

21877 甲牛酒

《经验广集》卷四。为《仙拈集》卷四“甲胶煎”之异名。见该条。

21878 甲灰丸

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】手指甲（小儿父母者）

【用法】烧灰研细，面糊为丸，如麻子大。每服一丸，并花水化下，不拘时候。

【主治】小儿生下便喜多惊。

21879 甲字丸

【方源】《名家方选》。

【组成】黄芩 黄柏 大黄 轻粉各三分 鹿角霜六分

【用法】糊为丸，辰砂为衣。每日服五分或三分。

【主治】梅毒毒。

21880 甲香散

【方源】《圣惠》卷五十七。

【异名】犀角散(《圣济总录》卷一四九)。

【组成】甲香 犀角屑 射干 木香 熏陆香 丁香 黄连 川升麻 鳖甲(涂醋炙令黄,去裙襕) 牡蛎(烧为粉) 羚羊角屑 甘草(炙微赤,锉) 黄芩各一两 黄柏一两(锉) 吴茱萸一分(汤浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上为细散。中射工毒及诸毒,每服一钱,水送下,一日三次。兼以鸡子白调散涂之。

【主治】射工毒肿生疮。

21881 甲胶煎

【方源】《仙拈集》卷四。

【异名】甲牛酒(《经验广集》卷四)。

【组成】川山甲四片 牛皮胶四两(各烧存性)

【用法】上为末。黄酒冲服。

【主治】肿毒初起。

21882 甲丸 2号

【方源】《古今名方》引湖南省中医药研究所方。

【组成】夏枯草 旱莲草 紫丹参 怀山药各十五克 煅龙骨 煅牡蛎各三十克

【用法】上药为一日量,依法制成冲服剂,或制片,或作汤剂水煎服。

【功用】益气养阴,软坚散结。

【主治】甲状腺机能亢进症。头昏失眠,心悸怔忡,心烦易怒,四肢颤动,纳亢善饥,甲状腺肿大,突眼,脉细数。

【加减】肝肾阴虚,舌红苔黄,头昏耳鸣,五心烦热,宜加炒枣仁、夜交藤、知母、黄柏、珍珠母;肝火旺盛,怕热多汗,口苦咽干,心烦易怒,宜加生地、栀子、百合、竹茹、龙胆草;肝郁气滞,胸闷不畅,精神抑郁,加柴胡、白芍、陈皮、钩藤、全栝楼;痰湿凝聚,神疲乏力,恶心呕吐,苔腻,脉濡滑者,宜加薏苡仁、陈皮、贝母;气阴两虚。

四肢痿软,倦怠乏力,心悸心烦,自汗少寐,宜加太子参、生黄耆、酸枣仁等。

21883 甲煎口脂

【方源】《千金》卷六。

【组成】沉香 甲香 丁香 麝香 檀香 苏合香 熏陆香 零陵香 白胶香 藿香 甘松香 泽兰各六两

【用法】用胡麻油五升。先煎油令熟,乃下白胶香、藿香、甘松、泽兰,少时下火,绵滤,纳瓷瓶中。余八种香捣作末,以蜜和,勿过湿,纳着一小瓷瓶中令满,以绵幕口,作十字络之,以小瓶覆大瓶上,两口相合,密泥泥之,乃掘地埋油瓶,令口与地平,乃聚干牛粪烧之七日七夜,不须急,满十二日烧之弥佳,待冷出之即成,其瓶并须熟泥匀厚一寸晒干,乃可用。一方用糠火烧之。

【主治】唇白无血色及口臭。

21884 甲煎唇脂

【方源】《千金》卷六。

【组成】甘松香五两 艾纳香 苜蓿香 茅香各一两 藿香三两 零陵香四两

【用法】先以酒一升,水五升,相和作汤,洗香令净,切之;又以酒、水各一升浸一宿,明旦纳于一斗五升乌麻油中,微火煎之,三上三下,去滓,纳上件一口瓶中,令少许不满,然后取;上色沉香三斤,雀头香三两,苏合香三两,白胶香五两,白檀五两,丁香一两,麝香一两,甲香一两。上八味,先酒、水相和作汤,洗香令净,各各别捣碎,不用绝细,以蜜二升、酒一升和香,纳上件瓷瓶中令实满,以绵裹瓶口,又以竹篾交横约之,勿令香出。先掘地埋上件油瓶,令口与地平,以香瓶合覆油瓶上,令两口相当。以麻捣泥泥两瓶口际,令牢密,可厚半寸许,用糠壅瓶上,厚五寸,烧之,火欲尽,即加糠,三日三夜,勿令火绝,计糠十二石讫,停三日,令冷出之。别炼蜡八斤,煮数沸,纳紫草十二两,煎之数十沸,取一茎紫草向爪甲上研看,紫草骨白,出之,又以绵滤过,与前煎相和

令调，乃纳朱砂粉六两，搅令相得，少冷未凝之间，倾竹筒中，纸裹筒上，麻缠之，待凝冷解之，任意用之，计此可得五十挺。

【主治】唇裂口臭。

【备考】方中瓶的制法：先以麻捣泥，泥两口好瓷瓶，容一斗以上，各厚半寸，晒令干。

21885 甲乙化土汤

【方源】《血证论》卷七。

【组成】白芍五钱 甘草三钱

【用法】水煎服。

【主治】出血后，脾阴虚，脉数身热，咽痛声哑等。

21886 甲乙归藏汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】真珠母八钱 龙齿二钱 柴胡一钱（醋炒） 薄荷一钱 生地六钱 归身二钱 白芍一钱五分（酒炒） 丹参二钱 柏子仁二钱 夜合花二钱 沉香五分 红枣十枚 夜交藤四钱（切）

【主治】身无他苦，饮食如常，惟彻夜不寐，间日轻重，如发疟然，起伏而又延久不愈，左关独弦数，余部平平者。

21887 甲字化毒丸

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】升麻二钱 牛黄四分 生生乳（配矾石，用佐药炼百日而成） 雄黄（须择旧坑所产透明不臭者）各一钱 朱砂 乳香各一钱七分 月月红 白僵蚕 川山甲 白鲜皮（各取头末）各一钱五分 广木香 熟大黄 牡丹皮各二钱五分

【用法】上为末，用神曲末五钱打稠糊为丸，如梧桐子大，另研朱砂为衣。每早空心服十三丸，每晚空腹服九丸，人参汤送下；炒米汤亦可。病重者逢三六九日加服三丸，元弱者不必加，病去药减，如余邪未尽，药不可撤。

【主治】疮疡，肝经内外前后形症；梅毒。

【宜忌】忌恼怒焦躁、茶、酒。

21888 甲字提毒药捻

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白血竭花四钱 京红粉一两 麝香五钱 朱砂 冰片各一钱五分 琥珀一钱 轻粉一两

【用法】制成药捻。按需要长度剪成小段，用镊子夹持插入疮口内，于疮口外留约 0.5 ~ 1 厘米长度为宜。

【功用】化腐提毒生肌。

【主治】瘰管，窦道，痈疽溃后脓未净者。

电

21889 电制膏

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】宣黄连四钱 大艾叶二钱

【用法】上药火烧作灰，以细生绢作筛于盏上，新汲水滤过如淋灰汁状，候得一中盏许，除去滓，以清澄药用水用铜盏坐热汤中，通手洗，临卧点两眦。

【主治】眼疾。

四

21890 四七汤

《易简》。为《金匱》卷下“半夏厚朴汤”之异名。见该条。

21891 四七汤

【方源】《百一》卷四。

【组成】人参 茯苓各二两 半夏二两（生） 厚朴（姜汁制）三两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞半，加生姜七片，大枣一个，煎六分，食前服。

【主治】七种气。

21892 四七汤

【方源】《普济方》卷三二一引《瑞竹堂方》。

【组成】半夏一两（汤泡七次） 厚朴（姜制） 赤茯苓各五钱 紫苏叶二钱 甘草二钱 香附子五钱

【用法】上咬咀。分作四服，每服水二盞，加生姜五片，煎至七分，去滓，加琥珀末一钱

调服。

【主治】妇人女子，小便不顺，甚者阴户疼痛。

21893 四七汤

《内科摘要》卷下。为《千金》卷十七“七气汤”之异名。见该条。

21894 四七汤

【方源】《国医宗旨》卷二。

【组成】紫苏二钱 厚朴三钱（姜汁炒）白茯苓四钱 半夏（姜制）五钱 槟榔（坚实，内白花者）二钱

【用法】加生姜七片，乌梅一个，水煎，细嚼沉香温服。

【主治】七情所感，喉间梅核气，心腹痛。

21895 四七汤

【方源】《治痧要略》。

【组成】桃仁 银花 红花 五灵脂 香附 山楂各一钱 木通五分

【用法】水煎，微温服。

【主治】痧因血滞而痛者。

21896 四七汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【异名】四七气汤（《喉科枕秘》）。

【组成】苏叶 半夏 厚朴 赤茯苓 陈皮 枳实 南星 砂仁 神曲各一钱 青皮七分 薏仁六分 槟榔 益智仁各三分

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】梅核气。

21897 四七饮

《杏苑》卷四。为《金匱》卷下“半夏厚朴汤”之异名。见该条。

21898 四川丸

【方源】《得效》卷十。

【异名】鹤顶丹。

【组成】大川乌一个（生，去皮脐） 川白芷 川细辛（去叶） 大川芎各一两

【用法】上为末，韭叶自然汁为丸，黄丹为衣。每服一九，细嚼，葱白、淡茶清送下。

【主治】头痛如破。

21899 四川散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】羌活一钱 川膝 川瓜 川椒 桂枝 秦艽 苍术 虎骨各一钱五分 天雄八分 甘葛三钱 苏叶一钱 甘草三分

【用法】生姜为引。

【功用】取汗。

【主治】酒伤脚痛，不拘上下左右。

21900 四五汤

【方源】《得效》卷七。

【组成】生料四君子汤 生料五积散

【用法】上和匀。每服二钱，灯心一握，水一盏，煎服。

【主治】小儿白浊。

21901 四牙散

《痘疹传心录》卷十五。为《医学入门》卷八“四齿散”之异名。见该条。

21902 四仁汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】叭啞杏仁 火麻仁 松子仁 柏子仁各三钱（各研末）

【用法】滚水冲，盖，俟温，当茶饮。

【主治】①《外科全生集》：大便燥结。②《仙拈集》：老年大便秘结，或患痢毒。

【加减】若热重，加甘蔗汁半酒杯。

21903 四仁膏

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】桃仁四个（去皮尖） 杏仁四个（去皮尖） 蕤仁五个（去皮尖） 郁李仁五个（去皮尖） 芫荽五个（取肉） 海螵蛸（取中心，末），半钱 北亭小豆大一块，（即硃砂）

【用法】上为极细末，将白蜜看多少搅匀，绢或绵滤过，别入龙脑细末、轻粉细末各少许。点之。

【主治】①《卫生总微》：毒气障眼及疳眼。②《普济方》：小儿风热，疳气攻眼赤痛，内外障眼。

21904 四分散

【方源】《集选奇效简便良方》卷三。

【组成】苍术（米泔浸，陈土炒焦）三两 杏

仁(去皮尖,去油)二两 生甘草(炒)一两五钱 羌活二两(炒) 川乌(去皮,面包煨透)一两五钱 生大黄一两(炒) 熟大黄一两(炒)

【用法】上为细末。每服四分,赤痢,加灯心三十寸,煎浓汤调下;白痢,加生姜三片,煎浓汤调下;赤白痢,加灯心三十寸,生姜三片,同煎浓汤调下;水泻,米汤调下;重者,五服愈。

【主治】痢疾。

【宜忌】孕妇忌服,小儿减半。

21905 四片金

【方源】《救急选方》卷上引《卫生家宝》。

【异名】吴茱萸汤(《普济方》卷二〇一引《卫生宝鉴》)、茱萸食盐汤(《杏苑》卷四)。

【组成】吴茱萸 木瓜 食盐各半两

【用法】上药同炒令焦,先用瓷瓶盛水三升,煮令百沸,入三味炒药,同煎至二升已下,倾一盞,冷热当随病人意,与服药,入咽喉即止。

【主治】霍乱上吐下利,心下懊恼,其证因形寒饮冷,饥饱乘舟车露走,动伤胃气,头旋,手足转筋,四肢逆冷。须臾不救,命在顷刻。

【方论选录】《医略六书》:吴茱萸温中气以散寒,善平逆气;木瓜醒脾气以舒筋,兼除暑湿;食盐润下,以上荣肝木也。水煎温服,使寒化气调,则脾胃健运,而津液四布,筋得滋荣,腹痛无不痊矣。此温经平肝之剂,为霍乱转筋腹痛之专方。

21906 四斤丸

【方源】《局方》卷一(绍兴续添方)。

【异名】虎骨四斤丸(《准绳·类方》卷四)、虎骨木瓜丸(《重订通俗伤寒论》)。

【组成】宣州木瓜(去瓢) 牛膝(去芦,锉) 天麻(去芦,细锉) 苡蓉(洗净,切,各焙干,秤) 各一斤

上药用无灰酒五升浸,春、秋各五日,夏三日,冬十日足,取出焙干。再入:

附子(炮,去皮脐) 虎骨(涂酥炙) 各二两

【用法】上为细末,用浸前药酒打面糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,空心煎木瓜酒送下;或盐汤吞下亦得。

【功用】补虚除湿,大壮筋骨。

【主治】①《局方》(绍兴续添方):肾经不足,下攻腰脚,腿膝肿痒,不能屈伸,脚弱少力,不能踏地,脚心隐痛,行步喘乏,筋脉拘挛,腰膝不利,及风寒湿痹,脚气缓弱。②《金匱翼》:风寒湿毒,与气相搏,筋骨缓弱,四肢痠疼痒痹。

21907 四斤丸

【方源】《医方类聚》卷九十八引《经验秘方》。

【组成】川乌三两(炮) 乳香 五灵脂(去石) 天麻(灰炮) 各三两 自然铜三两(火煅,醋淬三次) 虎骨三两(米醋慢火炙) 木瓜六两 松香六两 木鳖子(去壳) 没药各二两 猴姜(灰炮) 苍术(米泔浸洗) 各六两

【用法】上为丸,酒糊为丸,如梧桐子大。每服二钱,空心温酒、盐汤任下。

【功用】舒筋去肿,逐湿定痛。

【主治】寒湿脚气,筋寒骨痛,腿脚无力。

21908 四斤丸

【方源】《医方类聚》卷九十八引《经验秘方》。

【组成】天麻(去苗) 牛膝(酒浸,洗净) 宣州干木瓜各半斤 川乌头(生用,带尖) 干蝎各一两半

【用法】上药用酒浸三日,焙干为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前温酒送下。

【主治】①《医方类聚》引《经验秘方》:脚气。②《永乐大典》引《经验普济加减方》:风虚寒湿合成冷痹,脚重或疼或不仁;脚气,肾衰久冷,四肢肿。

21909 四斤丸

【方源】《普济方》卷九十五。

【组成】苻蓉 天麻 牛膝各一斤(共酒五升,浸一宿) 木瓜(去瓢)一斤

【用法】上为细末,炼前浸药酒如膏为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心汤、酒任下。如浸药酒少和不尽,更添酒炼之。愈后常令服,永不发。

【功用】补,治风,强腰膝。

【主治】干湿脚气。

21910 四斤丸

【方源】《正体类要》卷下。

【组成】肉苻蓉(酒浸) 牛膝(酒洗) 天麻 干木瓜 鹿茸(炙) 熟地黄(生者自制) 菟丝子(酒浸煮,杵) 五味子各等分

【用法】上为末,用地黄膏为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心温酒送下。

【主治】肝肾精血不足,筋无所养,挛缩不能步履,或邪淫于内,筋骨痿软。

21911 四斤丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】木瓜 天麻 苻蓉 牛膝(上四味制度焙干)各一两六钱

用无灰酒浸,春、秋五日,夏三日,冬十日,取出晒干。再入:

乳香(另研) 黑附子(炮) 虎骨(酥炙) 没药(另研)各五钱

【用法】上为末,用浸药酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心木瓜汤送下。

【主治】脚气肾虚腰腿软弱。

21912 四斤丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】木瓜(去瓢) 苻蓉(煮) 牛膝各四两 虎胫一对(酥炙) 川乌(炮,去皮) 天麻各一两 乳香 没药各五钱(去油) (一方加熟地、菟丝、鹿茸、五味,无乳香、没药、胫、乌四味)

【用法】上为末,将木瓜、苻蓉捣膏入末,加酒捶为丸,如梧桐子大。每服六七十丸,空

心温酒或盐汤送下。

【主治】肝肾气血不足,足膝痠痛,步履不遂,或感风寒湿三气之毒,以致脚气者。

21913 四乌汤

【方源】《普济方》卷二四五引《仁存方》。

【组成】大黄 枳实 皂角(去皮弦子) 黑牵牛(生)各等分

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前饭汤下。

【主治】脚气,大便不通,疼痛行步不得,及胸满痞塞喘急。

【备考】本方方名,据剂型,当作“四乌丸”。

21914 四乌汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】四物汤加乌药、香附、甘草

【主治】血中气滞,小腹急痛。

【方论选录】《成方便读》:以四物汤之养血活血能补能宣者以之为君;而以乌药、香附通行十二经之气,上下表里,无所不到,引领四物,为之先声;用甘草者,缓其急而和其中,使气血各复其常也。

21915 四乌汤

【方源】《女科切要》卷一。

【组成】乌药 当归 三棱 文术 赤芍 红花 桃仁 官桂 益母 香附

【主治】妇人经水运行,气血涩滞而小腹作痛。

21916 四六丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】阴丹四分 阳丹六分 硼砂六厘 白矾(生)二厘

【用法】加麝香三厘,片脑一分,同研匀。点眼。

【主治】翳膜遮睛。

21917 四六汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】苍耳子四两 苍术四两 薏仁四两 茯苓四两 熟地四两 元参四两

【用法】上为末,炼蜜为丸。每日吞用一两。

【功用】补肾健脾，散风去湿。

【主治】感痹而成大麻风，外症皮红生点，须眉尽落，遍体腐烂，臭气不可闻，人不肯近。

【宜忌】忌房事。

21918 四方散

【方源】《外伤科学》。

【组成】生南星 生半夏 生川乌 生草乌 野芋头各等分

【用法】上为细末。水、酒煮热，外敷。

【功用】温经通络，祛湿止痛。

【主治】损伤旧患及风寒湿之关节疼痛。

21919 四平散

【方源】《良方合璧》卷下。

【组成】黄柏 血丹 胆矾 烟胶(在牛圈内买带黑色者)各等分

【用法】上为极细末。先剃头发，后用麻油调和末药敷上，三四次即愈；疮干者，用湿药；疮湿者，用干药。

【主治】髻髻头并耳内脓水。

21920 四正丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】藿香三两 茯苓三两 法半夏三两 橘皮三两 厚朴三两 大腹皮三两 桔梗三两 香薷三两 甘草三两 白术(炒)三两 白芷三两 苏叶三两 枳壳(炒)三两 木瓜三两 扁豆三两 神曲(炒)三两 山楂(炒)一两 麦芽(炒)一两 槟榔一两 檀香一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱，朱砂为衣。每服二丸，温开水送下，姜汤亦可，一日二次。

【功用】散寒祛暑，利湿消胀。

【主治】感冒风寒，夏令受暑，头晕身倦，憎寒壮热，呕吐恶心，腹胀泄泻。

21921 四正汤

《圣济总录》卷一六二。为原书卷三十八“干姜汤”之异名。见该条。

21922 四正散

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】藿香一钱五分 茅术 厚朴 砂仁各一钱 茯苓二钱 广皮 半夏各一钱 神曲三钱 淡竹茹八分 姜汁二小匙(冲服)

【主治】暑月饮食不节，外感不正之气，呕吐。

21923 四石丸

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】滑石 井泉石(研) 白石英(研) 寒水石(研) 硃砂(研细，水和作饼子，用湿面四两裹药饼，烧紫色，去面)各二钱 白丁香半两 续随子仁二钱

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，生姜汤送下；第一日三服，第二日四服，第三日五服。以利为度，利已，用木香丸补之。

【主治】十种水气。

21924 四石汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】紫石英 白石英 石膏 赤石脂各三两 独活 生姜各六两 葛根四两 桂心 芎藭 甘草 芍药 黄芩各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升，煮取三升半，去滓，分五服，日三夜二。

【主治】产后卒中风，发疾口噤，痙痲闷满，不知人；并缓急诸风毒痹，身体痙强；及挟胎中风，妇人百病。

21925 四龙丹

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】煅石膏五两 淡黄丹 乳香(去油) 没药(去油)各五钱

【用法】上为细末。

【功用】止血生肌。

【加减】夏令，加冰片少许。

21926 四仙丸

【方源】《普济方》卷三二九。

【组成】桃仁(去皮尖) 当归 大黄(醋浸，炙) 水蛭(石灰炒)各一两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，空心醋汤送下。瘀血去后，与鹤顶丸。

【主治】崩中，内有瘀血，小腹急满痛者。

21927 四仙丹

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】杞（春甲乙采杞叶，夏丙丁采花，秋庚辛采子，冬壬癸采根皮）

【用法】上为末，以桑椹汁为丸。每服五十丸，茶清、酒任下。

【功用】《普济方》：乌髭驻颜，明目延年。

【主治】诸风疾。

21928 四仙丹

【方源】《点点经》卷三。

【组成】小麦一升 皂矾四两

【用法】合煮，晒干，磨粉，捣枣肉为丸，朱砂为衣。每服三四钱，开水送下。以肿消为度。

【主治】酒伤发黄浮肿，不问身热身凉。

【宜忌】忌生盐冷物。

21929 四仙丹

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】牛黄一钱 番木鳖四十九枚（去皮，麻油一斤煎木鳖子三沉三浮，以金色为度，捞起放地上存性为末） 朱砂一钱 雄黄一钱五分 麝香五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如萝卜子大。初日服一厘，二日服二厘，至十日服一分，十一日仍服一厘至一分止，三白酒送下，宜清晨服。

【主治】大麻等疯三十六证。

【宜忌】忌风戒色欲荤腥。

【备考】如患者大肉已去者，不治。

21930 四仙丹

【方源】《女科指南》。

【组成】密陀僧二两 白矾一两 蛤粉五钱 龙脑香一钱 龙眼核一两

【用法】上为极细末。每用药一钱许，以人乳调抹患处，夏天三四日一抹，冬天八九日一抹。凡用药，先将皂荚水洗净为妙。

【主治】狐腋，体气。

21931 四仙汤

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】淫羊藿 陈皮 天门冬 甘草 生姜三片 大枣三枚

【用法】水一钟，煎七分服。

【主治】痘疮。

【备考】此为痘疮之主宰，而君臣佐使，出入加减，全在慧心。

21932 四仙汤

【方源】《观聚方要补》卷八。

【组成】土茯苓四两 牛膝肉 皂角刺各六分 五加皮八分

【用法】上为一服，水三碗，煎至二碗，食远服；滓并水一碗半，煎至七分服。十服见效。

【主治】痲痺不能起止，并梅毒见痲症。

【宜忌】忌牛肉、茶、醋、烧酒、麻油。

21933 四仙饮

《成方切用》卷十一。为《张氏医通》卷十五“归耆饮”之异名。见该条。

21934 四仙散

【方源】《回春》卷六。

【组成】苍术一两（酒浸，去黑皮，炒干） 白芷 川芎 大附子（面包煨，去皮脐）各五钱

【用法】上为末。每服五分，空心好酒调下。

【主治】①《回春》：妇人白带。②《郑氏家传女科万金方》：经水过期而白带者。

21935 四仙散

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】甘草 紫草 通草 黄连 连翘 石莲

【用法】共炒，为末。空心砂糖调服。

【主治】痘起遍身俱是黑色。

【备考】化痲汤浴之于外，内服四仙散。

21936 四仙散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】花椒 枯矾各五钱 盐三钱 羊蹄根六钱

【用法】共捣烂，米醋六钱调匀。夏布包扎，每日刮破擦二三次。

【主治】癣。

21937 四生丸

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】半夏半斤 天南星五两 白附子四两 大附子二两

【用法】上四味，捣罗为末，净乳钵内用水一斗半浸，逐日换水，春、夏三日，秋、冬七日，频尝，以不麻人即去水，于笊箕内以厚纸澄干，再研细，以糯米糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，茶、酒任下。更入少龙、麝尤佳。

【主治】风痰壅盛，胸膈不利，及诸般风疾。

21938 四生丸

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】草乌头半两 白僵蚕 苦参 黑牵牛各一两（并生用）

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，温酒送下，一日三次。

【主治】皮肤风痒，疮癣，痛麻冷痹，热毒痈疔。

21939 四生丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】乌头（生，去皮脐） 木鳖子（去壳，研） 狗脊（去毛）各半两 苦参一两

【用法】上为末，烂研猪肾，入少许面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】肾脏风毒攻注，腰脚生疮。

21940 四生丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】草薢 防风（去叉） 狗脊（去毛） 乌头（去皮脐，生用）各等分

【用法】先以河水浸乌头七日七夜，切作片，每乌头一两，即用盐半两同炒黄，次与诸药同为细末，用米醋面糊为丸，如梧桐子大。每日服十丸，渐加至三十丸，空心温酒

或盐汤送下。

【功用】壮元气。

【主治】一切筋骨疼痛。

21941 四生丸

《普济方》卷一八八引《十便良方》。为《杨氏家藏方》卷二十“四味丸”之异名。见该条。

21942 四生丸

【方源】《百一》卷三。

【组成】五灵脂 当归 骨碎补 川乌头（去皮尖）各等分

【用法】上为细末，用无灰酒面糊为丸，如梧桐子大。每服七丸，渐加至十九、十五丸，温酒送下。

【主治】左瘫右痪，口眼歪斜，中风涎急，半身不遂，不能举者。

【宜忌】忌服灵宝丹，恐药无效。

21943 四生丸

《宣明论·目录》卷四。为原书卷四“软金丸”之异名。见该条。

21944 四生丸

【方源】《妇人良方》卷四。

【组成】白僵蚕（炒去丝） 地龙（去土） 白附子（生） 五灵脂 草乌（去皮尖）各等分

【用法】上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，茶、酒任下；或作末，酒调半钱亦可。

【功用】《金鉴》：活血祛风，通络止痛。

【主治】血风骨节疼痛，抬举臂不起，行履不得，并浑身麻痹。

21945 四生丸

【方源】《医方类聚》卷二一二引《施圆端效方》。

【组成】白附子 干姜（炮） 舶上硫黄 半夏（姜制）各一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如小豆大。每服十丸至十五丸，空心艾汤送下，一日二次。

【主治】妇人沉痼久冷，赤白崩漏，脐腹疔

痛,窘迫后重,大便冷秘涩闭。

21946 四生丸

【方源】《普济方》卷二四一引《海南四时摄生论方》。

【组成】川狼毒 黑附子 海桐皮 天南星各等分

【用法】上生用为末,头醋煮糊为丸,如绿豆大。每服十丸,盐汤或冷酒送下。

【主治】脚膝骨节毒风,行履不得。

21947 四生丸

【方源】《普济方》卷一〇四。

【组成】生半夏 生南星 生白矾 南康蚌粉各一两

【用法】上为末,用糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后生姜汤送下。

【功用】治风顺气,化痰逐饮。

21948 四生饮

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】生地黄汁三合 生藕汁二合 生刺蓊汁一合 生姜汁半合 白药子一分(为末)

【用法】上药和匀,于银石器中微温过,食后分二服。

【主治】伤寒衄血,心胸烦满。

21949 四生饮

《观聚方要补》卷一。即《易简》“三生饮”去木香,加人参。见该条。

21950 四生散

【方源】《苏沈良方》卷二。

【组成】白附子(下注脚生疮,用黑附子) 肾形沙苑蒺藜 羌活 黄耆各等分

【用法】上药生为末。每服二钱,空腹盐酒调下;猪肾中煨服尤善。

【主治】肝肾风毒,上攻下注,目赤痒痛,羞明多泪,鼻赤口疮,脚膝生疮,遍身风癣。

①《苏沈良方》:肾脏风,眼病,癣。②《局方》(绍兴续添方):男子妇人肝肾风毒上攻,眼赤痒痛,不时羞明多泪;下注脚膝生疮,及遍身风癣,服药不验,尿常多,觉两耳中痒。③《卫生总微》:恶疮。④《三因》:

癫风上攻下注,耳鸣目痒,鼻赤齿浮,或作口疮,下注阴湿,四肢痒痒,遍体生疮,及妇女血风疮。

【临证举例】①目赤 《苏沈良方》:予为河北察访使时,病赤目四十余日,黑睛旁黯赤成疮,昼夜痛楚,百疗不瘥。郎官邱革相见,问予病目如此,曾耳中痒否?若耳中痒,即是肾家风。有四生散疗肾风,每作二三服即愈,间里号为圣散子。予传其方,合服之,午时一服,临卧一服,目反大痛;至二鼓时,乃能眠;及觉,目赤稍散,不复痛矣。更进三四服,遂平安如常。《续名医类案》:薛立斋治一男子,眼赤痒痛,时或羞明下泪,耳内作痒,服诸药不效,气血日虚,饮食日减,而痒亦盛,此脾肾风热上攻也。以四生散,酒调四服而愈。②癣 《苏沈良方》:予之门人徐某,构病癣,久不愈,服四生散,数日都除。

21951 四生散

【方源】《得效》卷十二。

【组成】罂粟壳(去萼蒂赤颊,半生半炙) 黑豆一合(半生半炙) 甘草(半生半炙) 生姜(半生半炙)

【用法】上挫散。每服二钱,熟煎温服。

【主治】①《得效》:下痢。②《普济方》:赤痢,因大肠停积,热毒得之,或点滴鲜血。

【加减】如呕,食不入,加人参少许。

21952 四生散

【方源】《医方易简》卷五。

【组成】黄丹六两 明松香六两 生半夏六两 石膏生三两熟三两

【用法】上为末。敷之。

【主治】跌打损伤。

21953 四生散

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】生川草乌各二钱 竹子青五钱 防风三钱 红花二钱 续断三钱 骨碎补三钱 赤芍三钱 生半夏一钱五分 生南星一钱五分(炒) 红曲二钱五分 川柏三钱 生地一两 灰面五钱(炒黑)

【用法】葱汁和灰面、红曲熬汁调服；淬敷。

【功用】接骨。

21954 四白丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】白石脂二两 白矾二两（烧灰）
白龙骨二两 胡粉三两（炒）

【用法】上为末，用粳米饭和捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】水谷痢，脐腹冷痛，日夜数行。

21955 四白丹

【方源】《保命集》卷中。

【组成】白术半两 白芷一两 白茯苓半两
白檀一两半 人参半两 知母三钱 缩砂仁半两
羌活二钱半 薄荷三钱半 独活二钱半
防风 川芎各五钱 细辛二钱 甘草五钱
甜竹叶一两 香附子五钱（炒） 龙脑半钱（另研）
麝香一字（另研） 牛黄半钱 藿香一钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸。临卧服一丸，分五七次嚼之。

【功用】上清肺气，养魄，下强骨髓。

【主治】中风昏冒，气不清利。

【方论选录】《法律》：此方颇能清肺养魄。方中牛黄可用，而脑、麝在所不取，以其耗散真气，治虚风大非所宜。然本方以四君子汤作主，用之不为大害。今更定牛黄仍用五分，龙脑、麝香各用二分，取其所长，节其所短，庶几可也。

21956 四白头

【方源】《普济方》卷三十三引《仁存方》。

【异名】玉华白丹。

【组成】焰硝二两（研细） 白矾三两（研细）
石膏四两（研细） 砒霜一两（研细）

【用法】用一火鼎子，先以火炙，用生姜自然汁涂内外数遍，炙干，先下砒末半两，次以焰硝末半两，和焰硝末一两按实；又以焰硝末一两，和矾末按实；又以白矾末一两半，和石膏二两按实，却以石膏末二两紧按在上，用

圆瓦片盖合口上，围簇炭五斤，发顶火煨烟尽为度，去火候冷，取药刮净，研如细粉，再加好白石脂（煨）一两，研细，和前药滴水为丸，如鸡头子大，候干；再入新锅内，用瓦盖定置砖上，簇炭一斤，一煨通红为度，用铃铃出，倾丹在厚瓷盆内，乘热搅动，候丹冷，出火毒。每服三粒，用冷水吞下，以干物压之。

【功用】壮胃，清上实下。

【主治】虚寒，饮食作痰喘嗽；妇人白带，男子白浊遗精。

【宜忌】忌热物。

21957 四白汤

《云岐子脉诀》。为原书同卷“生姜枣汤”之异名。见该条。

21958 四白汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】白术 白芍 白茯苓 扁豆 人参 黄耆各一钱 甘草五分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《医学入门》：色疸。②《杏苑》：色疸，房事过伤，发黄，小腹连脐下痛，神思倦怠，头目昏重，自汗。

21959 四白散

【方源】《博济》卷五。

【组成】白花蛇一两半（酒浸一宿，去皮骨秤） 新罗白附子 白僵蚕（微炒） 白蒺藜（微炒，去刺）各一两

【用法】上为末。每服二钱，早、晚、空心温酒调下。

【主治】①《博济》：肾脏风毒攻注四肢，头面生疮，遍身瘙痒。②《圣济总录》：蛊风。

21960 四白散

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】蒺藜子（炒去角） 白芷 白附子（炮） 白僵蚕（炒）各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，茶清或酒调下，不拘时候。

【主治】伤寒头痛身热，百节疼痛。

21961 四白散

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】龙骨 白石脂 胡粉(蒸令黄) 白矾(烧成灰)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，米饮调下。

【主治】冷痢。

21962 四白散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】黄耆 厚朴 益智仁 藿香 白术 白扁豆 陈皮各一两 半夏 白茯苓 人参 乌药 甘草 白豆蔻仁各半两 芍药 一两半 檀香 沉香各二钱半

【用法】上为细末。每服三钱，加生姜三片，大枣一个，水煎服。

【主治】男子妇人，血虚发热，夜多盗汗，羸瘦，脚痛不能行。

21963 四白散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】糯米三百五十粒 巴豆(取肉)五个

【用法】用夏布包之扎之，取石灰鹅卵大一块，冲滚水一碗泡化，以水煮米包成饭，取出，乘热加硃砂末一钱，杵匀，仍加灰水，研如糊，瓷罐收之，听用。

【功用】点痣去斑。

21964 四汁饮

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】蒲萄(自然汁) 蜜 生藕(自然汁) 生地黄(自然汁)各五合

【用法】上药和匀。每服七分，水一盞，银石器内慢火煎沸，温服，不拘时候。

【主治】热淋，小便赤涩疼痛。

21965 四汁饮

《永类铃方》卷十七。为方出《圣惠》卷七十名见《云岐子保命集》“五神汤”之异名。见该条。

21966 四汁饮

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】韭汁 姜汁各半碗 牛乳一碗 竹沥半盞

【用法】和匀，煎热温服，每日二次。

【主治】反胃噎膈，大便燥结。

21967 四汁饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】竹沥 梨汁 萝卜汁各二瓢 鲜石菖蒲汁二匙

【用法】重汤燉，温服。

【功用】肃清痰火以醒神。

【主治】风寒夹痰，痰涎虽吐，而神识时清时昏者。

21968 四汁散

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】天花粉一斤

【用法】用梨汁、姜汁、萝卜汁、竹沥各一钟，次第拌，晒干为末。每服一钱，好茶调下。

【主治】痰火。

21969 四汁煎

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】生藕汁 生葛汁 木瓜汁各一合 生姜汁半合

【用法】银器中慢火熬如饬。每服两匙头许，含化，徐徐咽津。

【主治】霍乱吐呕。

21970 四汁膏

【方源】方出《丹溪心法》卷三，名见《医统》卷五十二。

【异名】乳汁膏(《杏苑》卷五)、藕汁膏(《东医宝鉴·杂病篇》卷六)、人乳膏(《明医指掌》卷七)、连花乳散(《医林纂要》卷四)。

【组成】黄连末 天花粉末 人乳汁(又云牛乳) 藕汁 生地黄汁

【用法】以后二味汁为膏，入前三味搜和，佐以姜汁和蜜为膏。徐徐留舌上，以白汤少许送下。

【功用】养肺降火生血。

【主治】三消。

【加减】能食者，加软石膏、瓜蒌根。

【方论选录】《医林纂要》：天花粉甘酸微

苦，补肺敛气，泄逆宁心，此治上焦气分之热；黄连苦以泻火，此治中焦心脾血分之热；黄连亦入血分，且能厚肠胃；生地黄汁苦寒而浊，以治下焦肾命之火，清其本也；藕汁甘咸涩，敛阴散热，交心肾，济水火；牛乳甘咸，润肠胃，解热结，滋阴血，而引之上行；蜂蜜润燥去热，通利三焦，加姜汁为反佐，以行之。

【备考】《医林纂要》本方用法：研黄连、天花粉为末，以二汁及乳调之，加姜汁、蜂蜜少许和服。

21971 四汁膏

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】雪梨 甘蔗 泥藕 萝卜 薄荷各等分

【用法】捣碎滤汁，入铜锅内慢火熬膏。饮之。

【功用】清痰降火，下气止血。

【主治】《东医宝鉴·杂病篇》：咳嗽。

21972 四汁膏

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】梨汁一钟 姜汁 白蜜各半钟 薄荷三两（研末）

【用法】和匀，重汤煮十余沸，任意服。

【功用】降痰。

【主治】痰壅盛。

21973 四玄散

【方源】《直指附遗》卷二十六。

【组成】绿矾 赤小豆 猪牙皂角（不蛀者，去皮弦，炙） 明矾二钱 葱管藜芦五钱

【用法】上为细末。每服半钱或一二钱，浆水调下。如牙关紧闭，斡开灌之。

【主治】中风痰迷心窍，癫狂烦乱，人事昏沉，痰涎壅盛，及五痫心风。

【备考】方中绿矾、赤小豆、猪牙皂角用量原缺。

21974 四加丸

【方源】《种痘新书》卷三。

【组成】白术（土炒） 猪苓各八钱 木通八钱 赤茯苓六钱 车前 牛蒡各五钱 黄芩（炒） 黄连（炒）各三钱

【用法】上为末，为丸，滑石为衣。

【功用】分阴阳，利水道，清内热，解大小肠之郁火。

【主治】痘疮热泻，小便短赤而粪黄臭，粪远射而有声音者。

【加减】弱者，加肉桂；肚痛而积泻者，兼消平散。

21975 四圣丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】乌头（去皮脐） 地龙（去皮） 赤小豆 乌药各一两

【用法】上药并生为末，醋煮面糊为丸，如小豆大。每服二十丸，盐汤送下。

【主治】肾脏风毒下注及五劳七伤，遍身疼痛，兼女人血风劳缓弱。

21976 四圣丸

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】干蝎（去土，炒）一两 胡椒 木香 青橘皮（汤浸去白，焙）各一分

【用法】上为细末，研饭为丸，如绿豆大。每服五七丸，姜、橘汤或温酒送下，不拘时候。

【主治】心腹虚胀。

21977 四圣丸

《圣济总录》卷一八七。为《普济方》卷二二一引《圣惠》“大效四神丸”之异名。见该条。

21978 四圣丸

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】白豆蔻 肉豆蔻（面裹，煨去油） 草豆蔻（去皮） 干姜（炮） 良姜 藿香叶（去土） 丁香枝杖各等分

【用法】上为末，醋糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，煎人参或白术汤送下；如止泻，米饮送下，不拘时候。

【主治】霍乱吐逆不止，翻胃及沉积赤白恶痢。

【备考】服双金丸毕，须候两时辰，不得与乳食，候大便过一两次再服本方。

21979 四圣丸

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】川黎椒（去合口者并黑子，不须去白，自罗不下，于土铫内熬令得所，铺纸一张于地上，顿椒出火毒）干熟地黄 枸杞子 荆芥穗各等分

【用法】上为细末，炼白沙蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至二十丸，空心盐汤送下。

【主治】近年近日，风赤翳膜，攀睛倒睫等眼疾。

21980 四圣丸

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】何首乌一两 蔓荆子一两 苦参一两 荆芥穗一两

【用法】上药生为末，用酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，温酒送下。

【主治】热毒风疮。

21981 四圣丸

《普济方》卷三十八。为《朱氏集验方》卷六“四神丸”之异名。见该条。

21982 四圣丸

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】黑牵牛末三两 大黄三两 皂角（去皮）三两 朴硝半两 萝卜二斤（煮软，去皮用汁）

【用法】上为末，萝卜汁打糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，茶送下。

【主治】男子妇人酒食所伤。

21983 四圣丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】穿山甲（去筋膜，灰炒胖）一两半 鸡骨常山 乌梅（去核，焙） 槟榔各一两

【用法】上为末，糯米糊为丸，黄丹为衣。随人大小，每服二十五丸至三十丸，临发日五更面东，温酒送下。

【主治】疟。

21984 四圣丸

【方源】《玉案》卷六。

【组成】珍珠三分 莞豆四十九粒 男发（煨灰存性）一钱 雄黄六分 冰片一分

【用法】上为末。以紫草二两，麻油熬膏，调点。

【主治】痘疹七日外有疔。

21985 四圣丸

【方源】《何氏虚劳心传》。

【组成】紫河车胶十二两 龟甲胶八两 麋角胶四两（上三味名三益膏） 人参十二两（为细末，人乳拌蒸，或晒、烘干，拌重至二十四两为度。若肺间有火，咳甚痰多者，不宜用参，可以茯苓代之，制亦如上法）

【用法】浓麦冬汤入三益膏，隔汤煮烱，捣匀为丸，如梧桐子大。每服四五钱，空心白汤送下。或竟三益膏中加茯苓，乳粉拌匀，麦冬汤化服亦可。

【功用】峻补精血。

【主治】虚损。

【加减】若已成虚劳内热骨蒸等症者，更宜参入壮水滋阴除蒸之品，如二地、二冬、青蒿、鳖甲、骨皮、女贞子之类。

21986 四圣丸

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】兔粪四两 家菊花二两 白蒺藜甘草各一两

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，菊花茶送下。

【主治】痘后翳膜。

21987 四圣丹

【方源】《普济方》卷九十八引《大全集》。

【异名】地黄丸（《普济方》卷九十八）。

【组成】熟地黄（洗，锉，焙） 当归（洗，锉，焙） 玄参（洗，锉，焙） 羌活（洗，锉，焙，拣节重者）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心或温酒或盐汤食前送下。良久仍进饮食。

【主治】走注风及风气，四肢倦怠，不思饮食。

【宜忌】忌猪、鸡、羊、热面、萝卜、猪、羊血。

21988 四圣丹

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【异名】四圣挑疔散(《医方考》)、四圣膏(《痘疹传心录》卷十九)。

【组成】珍珠 豌豆(烧灰存性) 血余(烧灰存性) 二灰等分 冰片五厘

【用法】上为细末,用油脂调成膏。先将银簪拨开疔口,以药填入,即变红活。

【主治】痘疔。

【方论选录】《医方考》:珍珠能出毒止痛,二灰能烂毒化血,胭脂能利血拔毒,冰片能利窍行滞。

【备考】方中珍珠用量原缺。

21989 四圣丹

【方源】《丹溪心法附余》卷二十三。

【异名】四圣散(《本草纲目》卷二十四)、四圣膏(《赤水玄珠》卷二十八)、四宝丹(《疡医大全》卷三十三)。

【组成】珍珠三五粒(犁尖铁器上煨微黄色,研) 豌豆四十九粒(烧灰存性) 头发(烧灰存性)

【用法】上为细末,用搽面油脂调成膏子,将儿在漫煨处安存,忌风寒秽气,先用簪尖平拨开疔口,将药填入疔内,即时变为红白色,余疮皆起。又尝见疔痘者,但挑破出其黑血即愈,或挑开用口啐去黑血,或用绵裹指甲掐其黑血展去亦可,盖自疔破而毒气得散也。

【主治】①《丹溪心法附余》:疔毒,即痘疮中长大紫色者。②《良朋汇集》:痘疮疔黑紫,头黑烂臭不可闻。

21990 四圣丹

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】牛黄一钱二分 朱砂八分 珍珠二分 儿茶一钱七分

【用法】上为末,用口嚼胭脂点之,均点上。内服保元汤加芎、桂。

【主治】疔毒。

21991 四圣丹

《济阳纲目》卷七十二。为《古今医鉴》卷十“四圣散”之异名。见该条。

21992 四圣丹

【方源】《济阳纲目》卷七十二。

【组成】槟榔一钱 大黄 牵牛各五分 甘草(炙)四分

【用法】上为末。加艾叶七片,水煎,入好醋少许服。

【功用】下虫。

【主治】心疼。

21993 四圣丹

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】蜂房一个(净,全用,去虫,将食盐填于孔内,阴阳瓦焙干,为末) 地龙(去泥尽,阴阳瓦焙干,为末) 五钱 蛻螂(取米头者佳,阴阳瓦火焙干,为末) 三钱 广木香末三钱 象牙三钱 乳香(去油) 三钱 瓜儿血竭(净末) 五钱 飞矾末三钱 槐子(炒黄为末) 三钱 没药三钱 提净黄蜡八两(滚化)

【用法】用黄蜡烱化,入前药和匀为丸。每服三钱,清晨酒送下;如不能饮,清汤送下。

【主治】痔漏。

21994 四圣丹

《痘麻紺珠》卷十八。为《痘疹心法》卷二十二“四圣散”之异名。见该条。

21995 四圣丹

【方源】《痘麻紺珠》卷十八。

【组成】绿豆 豌豆 赤小豆(各烧存性) 珍珠(研细) 二分

【用法】内服夺命散,外以本方涂之。

【主治】痘疮干燥,其根焦黑。

21996 四圣汤

《鸡峰》卷二十四。为《斑疹备急》“紫草散”之异名。见该条。

21997 四圣汤

《活幼口议》卷二十。为《圣济总录》卷八十“白术汤”之异名。见该条。

21998 四圣汤

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】白芍药 升麻各一两 甘草 紫草各五钱 干葛一两 木通五钱(去皮节)

【用法】上锉散。每服二钱，水一中盏，加生姜二片，葱白二根，山楂子根三寸，同煎热服。

【主治】身热如火，头痛颊赤，面红呵欠，鼻疮，疮疹已出未出时。

【加减】壮热心烦，加人参、赤茯苓、石膏、麦门冬(去心)。

21999 四圣汤

《赤水玄珠》卷二十五。为《直指》卷二十三“四圣散”之异名。见该条。

22000 四圣汤

《痘科类编》卷三。为《准绳·幼科》卷六“四圣散”之异名。见该条。

22001 四圣汤

《叶氏女科》卷二。为《医统》卷八十五“四圣散”之异名。见该条。

22002 四圣串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】槟榔四两 雷丸二两 茺萸二两 黑丑头末三两 生大黄二两

【用法】上为末。每服大人二钱，小儿一钱半，沙糖汤送下。重者二三次即止。

【功用】追虫打积。

【主治】九种心痛。

22003 四圣饮

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】何首乌 白芷 青皮 陈皮

【用法】水煎，空心服。

【主治】久疟。

22004 四圣饮

【方源】《产科发蒙》。

【组成】藿香 良姜 陈皮 莪术各等分

【用法】每服三钱，热汤浸，去滓用。

【主治】气攻呕吐，诸药不效者。

22005 四圣散

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【组成】晋盐 葛根 槐花子 山梔子各

等分

【用法】上吹咀。水二盏，加乌梅、甘草少许，煎至一盏，去滓，通口食后服。

【主治】①《袖珍方》引《圣惠》：咳嗽有失声音。②《袖珍方》引《经验方》：咳嗽有血。

22006 四圣散

【方源】《普济方》卷十四引《博济》。

【组成】白附子(炮) 白蒺藜(酒炒) 羌活(去芦头) 黄耆(锉)各等分

【用法】上为细末。每服二钱，用羊腰子一对，去筋膜，切开入药，用线缠，水一盏，入粟米一匙头，同煮，候米熟食之。

【功用】壮筋骨，明耳目。

【主治】①《普济方》引《博济》：肝脏虚冷，肾脏风攻注。②《宣明论》：一切痹。

22007 四圣散

【方源】《普济方》卷一〇五引《博济》。

【组成】半夏(汤洗七次) 桑白皮(酥炙令黄) 荆芥穗 陈橘皮(去瓢)各等分

【用法】上为末。每服一大钱，加生姜一小块子，水一盏，同煎至七分，温服。

【主治】风气壅滞，心胸不利，精神不爽，痰涎并多，头项紧急。

22008 四圣散

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】槟榔(鸡心者，半生半炒)一两 青橘皮(汤浸去白，焙)一两 桑根白皮(锉，炒)三分 木香半两

【用法】上为散。每服二钱匕，热酒调下；气实者，三钱匕，不拘时候。

【功用】定喘行气。

【主治】脚气上攻，心胸痞闷。

22009 四圣散

《阎氏小儿方论》。为《斑疹备急》“紫草散”之异名。见该条。

22010 四圣散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】天浆子一枚(去壳) 朱砂二豆许(研，水飞) 全蝎一枚 麝香一小豆大

【用法】上同研膏。每服少许，薄荷温水化下，不拘时候。

【主治】一岁至五六岁儿，急惊潮搐。

22011 四圣散

【方源】《三因》卷十五。

【组成】海藻(洗) 石决明(煨) 羌活 瞿麦穗各等分

【用法】上为末。每服二钱，米汤调下，一日三次，下清水尽为妙。

【主治】瘰癧，用花蛇散取转后。

22012 四圣散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】白矾 川甜消 盆消 寒水石各等分

【用法】上件入坩锅子内，揭口，用炭火煨令烟尽，取出候冷，为细末。每服一钱，食后新汲水调下，一日三次。

【主治】心经蕴蓄，惊热成痢，潮作热盛，膈实涎多，大便秘涩，及寻常上焦壅盛，膈热痰多。

22013 四圣散

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】川乌(炮制) 生白矾各一钱 红娘子三个 斑蝥十个

【用法】炼蜜为丸，如皂子大。绵裹坐之。

【主治】妇人赤白带下。

22014 四圣散

【方源】《直指》卷二十三。

【异名】神效瓜蒌散(《普济方》卷二八六)、四圣汤(《赤水玄珠》卷二十五)、神效四圣散(《医钞类编》卷二十一)。

【组成】生黄瓜蒌一枚(去皮。干瓜蒌则用两枚) 粉草末四钱 没药末三钱 乳香末一钱

【用法】好红酒二大碗，慢火煎至一碗，分作两服，两日服尽，大便顺导恶物妙。

【主治】肠痈，痢疽，便毒。

22015 四圣散

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】全蝎七个 白僵蚕十四个 大南

星七钱半 真川乌三钱三分(并生用)

【用法】上将南星为末，水调作饼，裹蚕、蝎、川乌，外用湿纸重包，放火灰中煨令赤色，顿地上一伏时，为末。每服一字，煎金银汤，点好茶清少许调下。若有窠视、搐搦证状，以少许用管吹入鼻中。

【主治】慢惊，痰滞虚热。

22016 四圣散

【方源】《医方类聚》卷七十引《施圆端效方》。

【组成】当归一两 甘草四两 芍药二两 黄连三两

【用法】上为细末。水煎，洗目并吃。

【主治】赤眼。

22017 四圣散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】灯心 黄连 秦皮 木贼 枣子(和核)各半两

【用法】上吹咀。每服二钱，水一盏，煎七分，澄清去滓，无时频洗，两目自开。

【功用】《金鉴》：清热解毒。

【主治】①《活幼心书》：嬰孩胎受热毒，生下两目不开。②《金鉴》：孕母受惊，传袭子胎，婴儿新生之后，周岁上忽两眼胞红晕，面色青黯，烦热夜啼，或面如胭脂，此属伏热在内，散发于面，状如水痘，根脚微红，时出时隐，延及颈项，继发丹毒。

22018 四圣散

【方源】《普济方》卷二四七引《瑞竹堂方》。

【组成】川楝子(炒黄) 胡椒 茴香(炒) 全蝎(炒)各半两

【用法】上为末。每服二钱，空心热酒调下。

【主治】小肠膀胱疝气，痛不可忍。

22019 四圣散

【方源】《得效》卷十八。

【组成】花蕊石散 黑神散 大圣散 蒲黄散 当归(煨) 牛膝 川芎(米水炒) 白芷(醋炒) 苏木 大黄各半两 莲子肉

(酒煮)半两

【用法】上为末，为丸，童子小便调服；或木通汤亦可。恶血立下。

【功用】打血，利大小便。

【主治】伤重烦闷欲死者。

22020 四圣散

【方源】《医方类聚》卷九十一引《急救仙方》。

【组成】茴香(炒) 川山甲(炒) 全蝎(炒) 南木香各等分

【用法】上为末。每服二钱，酒调服。一服痛住。

【主治】疝气，外肾肿胀。

22021 四圣散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《烟霞圣效方》。

【组成】御米壳四两(蜜炒黄色) 甘草二两 陈皮二两 干姜一两(炮裂)

【用法】上为细末。每服三钱，水一大盏，煎三五沸，食前温服。

【主治】赤白痢。

22022 四圣散

【方源】《普济方》卷六十引《德生堂方》。

【组成】荆芥穗 牛蒡子(炒，碾细) 紫河车各三钱 大黄六钱(半)

【用法】上药治下筛。每服五钱，水一盞，煎八分，食后临卧时，先漱后咽。

【主治】咽喉口齿，喉闭，乳蛾。

【加减】大实者，大黄再加用。

22023 四圣散

《普济方》卷三十七。为《圣济总录》卷一四三“四金散”之异名。见该条。

22024 四圣散

【方源】《痢疽验方》。

【组成】槐花(炒) 龟甲(童便炙)各四两 铁锈三钱 大黄(如泻不用) 川山甲(炮)一两 五灵脂(炒，炙)一两

【用法】上为末，每服三钱，酒调下。

【功用】清凉降火，攻毒。

【主治】热毒，及疔疮。

【加减】如疔疮，加紫河车根三钱。

【宜忌】非积热阳证，脓未成者，恐不宜用。

22025 四圣散

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】紫草 木通 黄耆 甘草 枳壳各等分

【用法】上锉散。煎服。得痘焮却住服。

【功用】发痘。

【主治】小儿痘子已透，皮肤未透。

22026 四圣散

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】四圣珍珠散(《痘疹全书》卷下)、四圣膏(《金鉴》卷五十七)、四圣丹(《痘麻绀珠》卷十八)。

【组成】绿豆 豌豆(俱烧存性)各四十九粒 珍珠一分 油头发(烧存性)一分

【用法】上为末，胭脂汁调，先以银簪拨开黑疮，此涂之。

【主治】痘疗，痘不起发，变异而痛者。

22027 四圣散

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】牛黄二钱 麝香三钱 胆矾四钱 明矾五钱

【用法】上为末，香油调。如上身病重，以二分擦手心，一分擦足心，下身重反是，每度以四次均擦。三四日则吐出臭黑水。二七日以雄鸡约一斤半重一只，煮熟酱拌食之，其汁煮饭吃，三七日用防风、荆芥、苍术、石斛、蛇床、羌活、白芷煎汤洗浴，四七日服蜡矾丸半升，病愈。

【主治】大麻风。

【宜忌】七日不可吃盐荤。

22028 四圣散

【方源】《医统》卷八十五。

【异名】四圣汤(《叶氏女科》卷二)。

【组成】条芩 白术 砂仁 阿胶各等分

【用法】上为细末。每服二钱，艾汤调下。

【主治】①《医统》：漏胎下血。②《竹林女科》：胎动属脾虚而血热者。

22029 四圣散

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】黄芩 白术 白芍药各一两 砂仁五钱

【用法】水一钟半，煎七分服，不时用一帖。

【主治】妊娠不能饮食，冲心欲死，遍身疼痛。

22030 四圣散

【方源】《古今医鉴》卷十。

【异名】四圣丹（《济阳纲目》卷七十二）。

【组成】五灵脂（炒出烟） 桃仁（面炒黄色，去皮尖） 草乌（水泡，一日一换，浸七日，去皮尖，切作片，用新瓦焙干）各一两 青黛二钱入药，八钱为末

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸或十七丸，用艾叶七片（炒出烟），陈酒一钟，入锅去艾，温艾汤送下。

【主治】心痛肚腹痛，阴证绞肠痧。

22031 四圣散

《本草纲目》卷二十四。为《丹溪心法附余》卷二十三“四圣丹”之异名。见该条。

22032 四圣散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】四圣汤（《痘科类编》卷三）。

【组成】紫草 黄耆 甘草 木通

【用法】水煎服。

【主治】痘疮黑陷，倒靥不起，发不红活，小便不利。

【加减】热甚色紫，倍加紫草、芩、连、红花；大便秘，加枳壳；如常，加糯米。

22033 四圣散

【方源】《济阳纲目》卷九十九。

【组成】人言 轻粉各一钱 巴豆十个（去壳） 白矾（枯）一两 黄丹少许

【用法】上为细末。每用少许擦患处，如擦时先用冷水洗之。

【主治】体气。

22034 四圣散

《救偏琐言·备用良方》。为《御药院方》卷十一“无价散”之异名。见该条。

22035 四圣散

【方源】《李氏医鉴》卷八。

【组成】白芷二钱 枳壳二钱 冬葵子 木通各二钱

【用法】水煎服。

【功用】催生。

22036 四圣散

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】宫粉 黄丹 松香 白矾（飞）各等分

【用法】上为细末。疮湿干用，干则油调。

【功用】①《全国中药成药处方集》（兰州方）：渗湿消毒，杀菌止痒。②《全国中药成药处方集》（天津方）：收敛生肌。

【主治】①《良朋汇集》：黄水疮，小儿肥疮胎毒。②《全国中药成药处方集》（天津方）：皮肤湿痒，薄皮疮，浸淫疮。

【备考】《全国中药成药处方集》（天津方）本方用法：用花椒油调敷患处，脓水过多者干敷。

22037 四圣散

【方源】《痘学真传》卷七。

【组成】紫草 白芍药 黄耆 木通各等分

【用法】为散服。

【主治】痘在七八期，盛浆未足，火毒未解者。

【方论选录】紫草凉血以解毒，白芍实腠以养血，黄耆补气以助浆，恐气血滞而不行，再用木通流走关节，令心家之火泄于小肠。

22038 四圣散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】番木鳖（即马钱子，去壳荚，炒至黑色）一两 雄黄 朱砂 甘草各一钱

【用法】上为细末。每服四分，其症将发，预先吃饭一碗，将药酒水调服。被盖卧即愈。

【主治】疟疾不问新久虚实寒热。

22039 四圣散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】生白矾一两 蓖麻子七粒 乌梅

五个 麝香少许

【用法】上为末，丝绵裹，塞鼻内。息肉自消。

【主治】鼻痔。

22040 四圣散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】苍术 白术 牛膝 木瓜各等分

【用法】上为末。每服一两，酒煎数滚，食前热服。得汗即愈。

【主治】脚气。

22041 四圣散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】蜈蚣一条（去头足） 山甲（炒）各五钱 全蝎（炒，去毒）十四个 火消三分

【用法】上为末。每服一钱，黄酒调下，随嚼核桃肉二枚。服完一料愈。

【主治】鼠疮未破者。

22042 四圣散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】雄黄 枯矾 松香（一方作定粉）五倍子各等分

【用法】上为末。香油调搽。

【主治】秃疮，肥疮，黄水疮，旋耳疮。

22043 四圣散

【方源】《纲目拾遗》卷四引《王安采药方》。

【组成】山海螺（一名白河车） 紫河车 红石膏 白石膏

【主治】肠痈、便毒、脏毒、乳痈疽。

22044 四圣散

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】珍珠 明雄黄 冰片 豌豆 发灰 紫草茸

【用法】点用。

【主治】黑痘、疗痘。

22045 四圣散

【方源】《风劳腋膈》。

【组成】白术 川连 陈皮 甘草

【用法】为散服。

【主治】嘈杂，心膈痛而呕。

22046 四圣散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】草乌 白芷 山奈 当归各等分

【用法】上为末。每服量人强弱，或八分，或一钱，酒调下。

【主治】跌打疼痛。

【宜忌】慎毋多服。

22047 四圣散

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】松香 铜绿 章丹 枯矾各等分

【用法】上为细末，用绢罗筛之二三次。敷于患处，用消毒药布包好。

【功用】利湿解毒，止痒消肿，杀菌化腐。

【主治】风火毒疮，黄水疮，湿毒瘙痒，皮肤诸疮。

【宜忌】有毒，不可入口。

22048 四圣膏

【方源】方出《百一》卷十六，名见《普济方》卷二八〇。

【组成】鹿梨根（捣取皮）不以多少 生姜半之 白矾随意用 吴茱萸看多少入

【用法】上药同于砂盆内，入米醋烂研，以净器盛之，候白醭生，方可用。遇浴时，以代皂角，不过一两次即安，若遍身生者，尤宜用之。

【主治】疥疮。

22049 四圣膏

【方源】《医方类聚》卷七十引《烟霞圣效方》。

【组成】诃子一对（去核） 黄丹四两（水飞，细罗） 蜜四两

【用法】上为细末，蜜著水一瓯化开，文武火同熬，细柳枝一握不住勤搅，颠倒使用，约成膏子，滴水不散。用时温水化开便洗。

【主治】远年近日，赤眼暴发，一切病眼。

22050 四圣膏

【方源】《普济方》卷一一二。

【组成】川当归 没药 大川乌各等分

【用法】上为末，用不蛀皂角二十四个，捶

碎，水煎数沸，去滓，入锅内熬成膏，入前药搅匀。贴于患处。

【主治】鹤膝风及诸风疾。

22051 四圣膏

【方源】《普济方》卷二七九。

【组成】清油半斤 巴豆（去皮）三钱 当归半两 轻粉一钱

【用法】将油慢火熬，次下巴豆、当归，熬至黑焦，去滓，又下黄蜡、轻粉，熔开，冷定，盆子盛。每用量疮搽之。

【主治】风疳疥癣，或痛经年不效者，及一切恶疮。

22052 四圣膏

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】姜汁 葱汁各二碗 线胶四两

【用法】同煎炼，再入草乌末四两为膏；如无葱汁，须加火酒，再入乳、没各一两。摊在纸上贴之。渐渐痛止伸直。

【主治】手背挛曲不舒，节间疼痛。

22053 四圣膏

【方源】《医统》卷三十四引《经验方》。

【组成】薤叶 独蒜 盐 川山甲

【用法】上以好醋成饼。量疮大小贴之，两炷香为度。痞化为脓水，从大便出。

【主治】痞块。

22054 四圣膏

《赤水玄珠》卷二十八。为《丹溪心法附余》卷二十三“四圣丹”之异名。见该条。

22055 四圣膏

《痘疹传心录》卷十九。为《万氏家抄方》卷六“四圣丹”之异名。见该条。

22056 四圣膏

《金鉴》卷五十七。为《痘疹心法》卷二十二“四圣散”之异名。见该条。

22057 四圣膏

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】银朱二钱 铜绿一钱半 松香 杭粉各三钱

【用法】上为末。桐油调搽，作隔纸膏贴之，三五日愈。

【主治】疔疮。

22058 四皮汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】槐白皮 柳白皮 桑白皮 桃白皮各等分

【用法】上细锉。每用四两，以浆水一斗，煎至七升，去滓。熏洗下部。

【主治】伤寒狐惑，毒攻下部，肛内生疮。

22059 四皮汤

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】陈皮 青皮 石榴皮 椿根白皮各二钱

【用法】用水一钟，煎至七分，温服。

【主治】水痢疾。

【加减】红痢，加甘草一钱；白痢，加干姜一钱。

22060 四皮饮

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷十一。

【组成】绿豆 黑豆 赤小豆（水浸取皮）各半钱 新采桑白皮一钱

【用法】上锉。煎水调下蝉菊散。

【主治】痘后眼目生翳。

22061 四灰散

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】粉霜 艾人灰稍多 矾石灰 铅灰（无即用胡粉、密陀僧代之）各等分

【用法】上为极细末。先以醋浆水洗，拭干，即敷之。不过三五上，永除臭气。如要试，但敷药蒜上，良久自无臭。

【主治】腋气；兼治脚汗。

22062 四灰散

【方源】《种痘新书》卷十。

【组成】旧棕 老杉树皮 胎发 脐带

【用法】俱烧灰存性。调酒服。

【主治】女子经行出痘。

22063 四虫丹

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】芙蓉叶 紫地丁各一斤 千金子十两（去油壳） 桑虫二两（炙干） 活桑

一两(晒干或炙干) 姜汁 蒜汁各半斤 葱汁五两

【用法】上用阴阳水四斤,煎至半斤,去滓,再用红站三两,麝香三钱,雄黄一两(研),蜈蚣一两(研),烧酒三两,盛倾银罐内,将铁油盏盖定,炭火升过,候酒尽即起;再用烧酒一斤,并后五味入药内,熬成膏子,用瓷器收贮。临用时将井水化开,围患处,如火之热,其毒即时消退,可收下再治后人。如不煎膏,将前药晒干,洒烧酒,再晒再洒,酒尽为度,作末收藏。临用时筛细,以井水调围亦妙。

【主治】诸般疔疮发背,一应恶疮。

22064 四血散

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】益元散加当归 井泉石

【用法】米汤调下。

【主治】衄血、吐血、便血。

【加减】淋者,加梔子;茎中痛,加蒲黄;水泻,加车前子。

22065 四合汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】熟地五钱 人参一钱半 白术一钱半(炒) 茯苓一钱半 当归三钱 白芍一钱半(酒炒) 黄耆三钱(蜜炙) 川芎八分 柴胡八分 半夏一钱半(蜜炙) 黄芩一钱半(酒炒) 炙草五分

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】产后发热,脉数软弦者。

【方论选录】产后气血两亏,湿热不化,而抑遏于中,正气不足以拒之,故发热不止焉。人参扶元补气,足御虚邪之不解;熟地补阴滋血,能资经脉之有亏;黄耆补气,益卫阳;当归养营,益血脉;白术健脾燥湿;茯苓渗湿和中;川芎入血海,专调营血;白芍敛营阴,善退虚热;柴胡解表疏邪;黄芩清里泻热;半夏醒脾燥湿以化痰;炙草益胃缓中,以和脾也。水煎温服,使气血内充,则湿热自化而邪无不解,何发热不止之有哉?

22066 四合汤

《杂病源流犀烛》卷二十八。为《古今医鉴》卷十“四合饮”之异名。见该条。

22067 四合饮

【方源】《古今医鉴》卷十。

【异名】四合汤(《杂病源流犀烛》卷二十八)。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 紫苏 厚朴 香附 枳壳 郁金 甘草各等分

【用法】上锉一剂。加生姜,水煎服。

【主治】痰积气滞腹痛。

22068 四色丸

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】硫黄 厚朴(去粗皮,生姜制)各等分

【用法】上为细末,糊为丸,如黍米大。每服五十丸,米饮送下,不拘时候。

【主治】泄泻青色。

22069 四色散

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】黄连 黄柏各三两 赤小豆 绿豆粉各一两 紫草 寒水石 漏芦各七钱

【用法】上为末。香油调搽,一日三次。

【主治】热疮,遍身发,出脓血,赤烂,或火丹,或如火烧。

22070 四米汤

【方源】《寿亲养老》卷四。

【组成】粱米 稻米 黍米各三合 蜡如半弹丸大

【用法】上以东流水二升,煮粱米三沸,绞去滓;以汁煮稻米三沸,去滓;用汁煮黍米三沸,绞去滓;置蜡于汁中,待蜡消。每服半合,空心午后各一。

【主治】小儿泄注。

22071 四阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地二三钱 麦冬二钱 白芍药二钱 百合二钱 沙参二钱 生甘草一钱 茯苓一钱半

【用法】水二钟,煎七分,食远服。

【功用】保肺清金。

【主治】阴虚劳损，相火炽盛，津枯烦渴，咳嗽，吐衄，多热。

【加减】如夜热盗汗，加地骨皮一二钱；如痰多气盛，加贝母二三钱，阿胶一二钱，天花粉亦可；如金水不能相滋而干燥喘嗽者，加熟地三五钱；如多汗不眠，神魂不宁，加枣仁二钱；如多汗兼渴，加北五味十四粒；如热甚者，加黄柏一二钱（盐水炒用），或玄参亦可，但分上下用之；如血燥经迟，枯涩不至者，加牛膝二钱；如血热吐衄，加茜草根二钱；如多火便秘，或肺干咳嗽者，加天门冬二钱，或加童便亦可；如火载血上者，去甘草，加炒梔子一二钱。

【方论选录】《成方便读》：生地滋肾水；参、麦养肺阴；白芍之色白微酸，能入肺而助其收敛；百合之甘寒且苦，能益金而兼可清神；茯苓以降其浊痰；甘草以散其虚热。名曰四阴者，取其地四生金也。

22072 四红丸

【方源】《医方易简》卷二。

【组成】蒲黄 泽泻 阿胶 当归各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，如血崩不止，用陈棕炭、莲蓬壳灰，水煎服，或棉花子灰，黄酒冲服；有黑血块者，以旧马尾罗底三个（烧灰），筱面二合，黄酒冲服。

【主治】妇人血崩，并失血、便血、衄血。

22073 四红丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】当归 阿胶各四两 蒲黄 血余各二两

【用法】阿胶烔化，为丸服。

【功用】《中药成方配本》：和血，止血。

【主治】崩漏下血不止，血败带淋，面黄肌瘦，饮食不思，骨节痠痛，及诸血症。

22074 四红丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归炭十六两 蒲黄炭十六两 大黄炭十六两 槐花炭十六两 阿胶珠十六

两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，一日二次，温开水送下。

【功用】清热止血，引血归经。

【主治】肺热急怒，吐血衄血，便血溺血，妇女崩漏下血。

22075 四红丹

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】当归（生、炭各半） 地榆炭 大黄（生、炭各半） 槐花炭（存性）各十斤

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，白开水送下。

【主治】吐血，衄血，便血。

【宜忌】忌辛辣等有刺激性之食物。

22076 四红丹

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】大黄 红花 芥穗 香附 槐花 当归 阿胶各二两

【用法】诸药俱用黄酒炒黑，为极细末，炼蜜为丸，二钱重。每服二钱，白开水送下。

【功用】消瘀化滞，调经理血。

【主治】妇人经血淋漓，崩漏下血，大便下血，小便尿血。

【宜忌】忌食辛辣及有刺激性之物。

22077 四时散

【方源】《医心方》卷三引《耆婆方》。

【组成】秦艽 独活 茯神 薯蓣春各四分，夏各二分，秋各八分，冬各十二分

【用法】上为散。以酒服一方寸匕，一日二次。

【主治】风气，风眩，头面病。

22078 四应膏

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】桐油二两 黄蜡七钱 煅石膏七钱 生大黄七钱

【用法】先以桐油、黄蜡煎化，入石膏、大黄，搅匀开膏。每用此膏一日一换，不用水洗，不见风处贴；如脓水干及肉满，再不必

换药，上用原膏贴老皮；若四弦作痒，用生姜自然汁或搽痒处，或入膏药；如脓疮，用姜、葱煎汤洗后方贴。

【主治】脓疮、裙襦、杖疮、松皮烂等疮。

22079 四疔散

【方源】《类证治裁》卷八。

【组成】土蜂窠（有子者）一两 蛇蜕一条（泥裹，火煨存性）

【用法】上为末，研和。每用二钱，白汤调下。少刻大痛，可救。

【主治】疔毒走黄，发肿神昏。

22080 四补丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】柏子仁（生绢袋盛）何首乌（切作小片）肉苁蓉（切作小片）牛膝（细切，生绢袋盛）各三两

【用法】上药用酒三升，春、夏浸七日，秋冬浸二七日，取牛膝、柏子仁先捣如泥，次将何首乌、苁蓉同杵为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心温酒送下。

【功用】益气血，补元脏，悦颜色。

22081 四补丹

【方源】《普济方》卷二十九。

【组成】何首乌（泔浸，春、秋五日，夏三日，冬七日）苍术（去皮，制度同上）甘州枸杞（酒浸一宿）小茴香（盐炒令热）各等分

【用法】上为细末，酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至四十丸，空心好酒送下。

【主治】肾虚。

22082 四灵丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【异名】大蟾丸（《医部全录》卷四四五）。

【组成】大蟾一枚（去却四足，劈开腹，去肠肚，入胡黄末一两在腹内，以线缝合，用湿纸三两重裹，以泥四面固济，令干，微火出阴气，便以炭火三斤烧令通赤即住，待冷去泥及纸灰，捣细罗为末）芦荟 麝香 熊胆各一分

【用法】上为细末，以面糊为丸，如麻子大。每服三丸，以粥饮或奶汁送下，一日三次。三岁以上加丸服之。

【主治】小儿五疳，头大项细，心腹胀满，皮肤干皴，毛发焦黄，鼻下赤烂，口舌生疮，泻利不止，日渐羸瘦。

22083 四灵丸

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】巨胜子 生干地黄（焙）麦门冬（去心，焙）各一两 白茯苓（去黑皮）三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎枣汤送下；水饮亦得。服至百日自觉有异。

【功用】还元保命，壮气除风。

【主治】肾虚。

22084 四灵丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】黄丹 水银 钢铁（锉末） 硼砂各二两

【用法】上为细末，入瓷盒中固济，令干，安于灰炉中，盒上灰厚三寸，常以一斤火养一百日，日足，以十斤火煨，任火自消，放冷取出，细研，以浓甘草汤拌，于饭上蒸一炊久，出火毒，细研为末，以水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三丸，空心以温酒送下。

【功用】驻颜补益。

22085 四灵丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】硼砂三两 水银一两 朱砂一两 硫黄三两

【用法】上件药，将硼砂、硫黄同研如面，于瓷盒中盛之，如法固济，令干，入灰炉中，其上灰厚三寸，以火三两，养一七日，开取药，入水银、朱砂各一分同研，以水银星尽为度，依前入盒，养一七日，如此四度，计二十八日开取，细研，以水飞过，入竹筒中，密封头，于饭上蒸两炊久，及热取出，于地上以纸衬，盆合一周时，出火毒了，用粟米饭为丸，如绿豆大。每日三丸，空心以温酒

送下。十日后加至五丸。

【主治】筋有风，角弓风，肾脏风，热毒风，皮肤风，大风，感厥风。

【宜忌】忌羊血。

22086 四灵丹

《医方类聚》卷二〇三。即《圣惠》卷九十四“四虚丹”。见该条。

22087 四灵散

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】白附子(炮) 牛膝(酒浸一宿，切，焙) 巴戟天(去心) 黄耆(锉) 各一两

【用法】上为散。每服用猪肾一只，批破去筋膜，掺药一钱匕，并椒、盐、苧蓍各少许在内，用湿纸裹，煨熟为度。早晨空心细嚼，温酒下。

【主治】肾脏风毒，上攻下注，行步艰难。

22088 四灵散

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】瓜蒂一钱 人参芦二钱 赤小豆甘草各一钱

【用法】上为细末。每服一二钱，或少至半钱，量情与之，食后薑汁调下。

【主治】中风痰迷心窍，癫狂烦乱，人事昏沉，痰涎壅盛，及五疳心风。

22089 四灵散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】生地二钱 朴消一两 没药五分

【用法】上为末。酒调下。

【主治】血灌瞳人。

22090 四君丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】生干地黄 熟干地黄 当归 木瓜各等分

【用法】酒糊为丸。温酒送下。

【功用】顺气血。

【主治】风。

【备考】本方方名，《普济方》引作“四君子丸”。

22091 四君汤

《文堂集验方》卷四。为《圣济总录》卷八十“白术汤”之异名。见该条。

22092 四陈汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】陈皮(去白) 陈香橼(去穰) 陈枳壳(去穰，面炒) 陈茶叶各等分

【用法】上为末。每服三钱，开水点服。

【主治】干霍乱，欲吐不得吐，欲泻不得泻，变在须臾者。

22093 四陈散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】陈岷茶 陈薄荷 陈皮 陈紫苏各二钱

【用法】加生姜十片，煎熟温服。

【主治】痰哮喘。

22094 四妙丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】肉豆蔻一两(用盐酒浸，破故纸同炒干燥，不用故纸) 山药一两(酒浸，北五味子同炒干燥，不用五味子) 厚朴二两(去粗皮，青盐一两同炒，青盐不见烟为度，不用盐) 大半夏一两(每个切作两块，木猪苓亦作片，水浸，炒燥，不用猪苓)

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，辰砂一分，沉香一分，作二次上为衣，阴干。每服五七十丸，空心盐酒或米饮或盐汤送下。

【功用】实脾土，下痰顺气。

【主治】脾胃虚弱，脾土不能化，痰成窠斗，停于胸臆，饮食既少复迟。

【备考】本方方名，《普济方》引作“四妙丸”。

22095 四妙丸

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】苍术二两 白芍 龟板(好酒炙酥) 各二两五钱 黄柏五钱(盐、酒拌炒)

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，当归汤送下；酒亦可。

【主治】鹤膝风。

【加减】严寒，加附子二钱。

22096 四妙丸

【方源】《玉案》卷五。

【组成】韭菜子(炒) 菟丝子各四两 牡蛎(煨, 人乳淬) 龙骨(煨)各二两

【用法】上为末, 荷叶煎汤为丸。每服三钱, 空心盐汤送下。

【主治】精不固。

22097 四妙丸

【方源】《疡科心得集》卷下。

【组成】苍术 黄柏 当归 细生地

【主治】湿热在经, 筋骨疼痛, 疮疡遍体, 而兼血虚者。

【加减】若湿热甚者, 细生地、当归或易草薢、苡仁亦可。

22098 四妙丸

【方源】《成方便读》卷三。

【组成】二妙丸加牛膝 苡仁

【主治】痿证。

【方论选录】二妙丸治湿热盛于下焦而成痿证者。加牛膝, 为三妙丸, 牛膝补肝肾强筋骨, 领苍术、黄柏入下焦而祛湿热也; 再加苡仁, 为四妙丸, 因《内经》有云: 治痿独取阳明。阳明者主润宗筋, 宗筋主束筋骨而利机关也。苡仁独入阳明, 祛湿热而利筋络。故四味合而用之, 为治痿之妙药也。

22099 四妙丹

《普济方》卷三十三。为《普济方》卷二二六引《十便良方》“固真丹”之异名。见该条。

22100 四妙汤

《圣济总录》卷一六九。为《活人书》卷二十一“化毒汤”之异名。见该条。

22101 四妙汤

《医宗说约》卷六。为《局方》卷八(宝庆新增方)“神效托里散”之异名。见该条。

22102 四妙散

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】白及 白蔹 木鳖子 桑螵蛸各半两

【用法】上为散, 汤磨乳香, 调令稀稠得所, 摊故帛上。贴之, 次日连皮拆下, 更无疮瘢。

【主治】莲花痔瘻及鸡冠痔。

22103 四妙散

【方源】《永类铃方》卷二十二引《集验》。

【组成】骨碎补 制生姜 乳香 当归

【用法】搗酒热服。

【主治】打破跌损内伤。

【加减】接骨, 加自然铜。

22104 四妙散

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】威灵仙(酒浸)五钱 羊角灰三钱 白芥子一钱 苍耳一钱半(一云苍术)

【用法】上为末。每服一钱, 加生姜一大片, 搗汁入汤调服。又, 二妙散同调服。

【主治】痛风走注。

22105 四妙散

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】当归二钱 川芎 白术(蜜炙) 黄芩各一钱

【用法】水煎, 食远服。

【功用】和血凉血, 健脾安胎。

【主治】胎漏。母气壮盛, 身无所苦, 而月经如常漏下者。

【加减】如未效, 加阿胶(炒珠)一钱。

22106 四妙散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】花粉 苦参各五钱 皂刺四十九个(炒黄) 土茯苓三斤

【用法】共煎汤, 当茶饮。

【主治】痲核, 不拘久近, 已破或未破者。

【宜忌】忌牛肉。

22107 四妙散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】雄黄 生矾 川椒 硫黄各等分

【用法】上为末。鸡蛋黄炒油调搽。

【主治】遍身疥癩。

22108 四妙散

【方源】《活人方》卷六。

【组成】川黄柏 茅山苍术(先以泔水润透, 切片, 晒干) 向东桑皮(三种各分为二份, 以一份用童便, 以一份用酒, 各浸透,

晒干,炒微黄色) 陈胆星各等分

【用法】上为细末。每服二三钱,早、晚空心以药酒吞服。

【主治】湿痰,风痹,筋骨拘挛,气虚体肥,经络酸麻疼痛。

22109 四妙煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】槐花子 桃核仁 细茶叶 芝麻各五钱

【用法】瓦罐盛药,用水六七碗,熬折一半,热服。

【主治】肩臂筋骨疼痛。

22110 四妙膏

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】狼毒一两 黄耆二两

【用法】醋浸一宿,入猪油五两,微火煎熬,取二两,绞去滓,退火气。以封患口,日易三次。毒消口敛。

【主治】甲疽。

22111 四苓丸

《全国中药成药处方集》(南京方)。即《奇效良方》卷三十五“四苓散”改为丸剂。见该条。

22112 四苓汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】白术(炒) 赤茯苓 泽泻 猪苓 白芍药(酒炒) 酒芩 酒连

【用法】水煎服。

【主治】热泻,小水短少,腹中作疼。

22113 四苓汤

【方源】《医部全录》卷四九二引《幼科全书》。

【组成】理中汤加猪苓 泽泻

【主治】痘后泄泻。

22114 四苓汤

【方源】《瘟疫论》卷下。

【异名】茯苓汤(《治疫全书》卷三)。

【组成】茯苓二钱 泽泻一钱五分 猪苓一钱五分 陈皮一钱

【用法】长流水煎服。

【主治】①《瘟疫论》:瘟疫停饮,烦渴思饮,引饮过多,自觉水停心下。②《会约》:瘟疫水停心下,饱闷痞胀,胸胁滞塞。

22115 四苓汤

《金鉴》卷五十二。为《丹溪心法》卷二“四苓散”之异名。见该条。

22116 四苓散

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】四苓汤(《金鉴》卷五十二)。

【组成】白术 猪苓 茯苓各一两半 泽泻二两半

【功用】①《痘疹金镜录》:利小便。②《全国中药成药处方集》:健脾止泻,利水除湿。

【主治】脾虚湿胜,水泻,小便不利;小儿阴囊肿痛。

①《丹溪心法》:泄泻。②《痘疹金镜录》:痘内热。③《医方考》:湿生于内,水泻,小便不利。④《寿世保元》:麻疹已出,泄泻不止。⑤《证治汇补》:湿气在中,清浊混乱,小便短少,大便溏泻。⑥《张氏医通》:小便赤涩胀痛,及温热时行烦渴。⑦《文堂集验方》:小儿阴囊忽肿痛。⑧《杂病源流犀烛》:伏暑浊病。⑨《幼科释谜》:风寒湿邪不解,烦渴欲饮者。⑩《笔花医镜》:伏暑小便不通。

【加减】湿,加苍术,甚者,苍白二术同加(炒用);火,加木通、黄芩。

【方论选录】《医方考》:湿胜则濡泻。故湿生于内者,令人水泻;湿并于大肠,故小便不利。白术燥而淡,燥则能健脾,淡则能利湿;茯苓甘而淡。甘则能补中,而淡亦渗湿矣;猪苓苦而淡,泽泻咸而淡,苦者有渗利而无补益,咸者直能润下而兼渗利。丹溪曰:治湿不利小便,非其治也。

【临证举例】腹痛泄泻 《临证指南医案》:薛某,腹满下至少腹,三阴都已受伤,而周身疥疮,数年不断,脉络中必有湿热,就腹痛泄泻,腑阳不通,不独偏热偏寒之治,常用四苓散,猪苓三钱,茯苓三钱,泽泻一钱

半，生于术一钱，椒目五分。

【备考】本方改为丸剂，名“四苓丸”（见《全国中药成药处方集》）。《痘疹金镜录》以本方加木通，东流水煎服；或为末，白汤调下。《寿世保元》：水煎服。《文堂集验方》：灯心汤调服。

22117 四苓散

【方源】《回春》卷三。

【组成】茯苓 白术 猪苓 泽泻 苍术（炒） 山药 芍药 山梔（炒） 陈皮各一钱 甘草五分 乌梅一个

【用法】上锉一剂。加灯草一团，水煎，温服。

【主治】火泻，热泻。

【加减】饱闷，加厚朴、砂仁，去山药；腹痛，加厚朴、砂仁、木香 茴香，去白术；呕哕恶心，加藿香、乌梅、莲肉、砂仁、人参；小水短赤，加木通、车前，去泽泻；口燥烦渴，加黄连、麦芽、莲肉、乌梅、干葛，去泽泻、苍术；泻多元气虚脱，昏倦，加人参、黄耆，去泽泻、苍术；夏月暑泻，加香薷、扁豆；泻多烦躁，加炒黄连、人参、辰砂、乌梅，去苍术、泽泻；泻多不止，加肉蔻、乌梅、人参，去泽泻、山梔；发热脉数，加柴胡、炒黄芩、乌梅。

22118 四苓散

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】赤茯苓（去皮） 猪苓 泽泻各一钱二分 白术八分 木通 车前子（炒）各五分

【用法】水煎候温，调益元散二三匙服。

【主治】小儿伏暑吐泻。

22119 四苓散

【方源】《会约》卷二十。

【组成】猪苓 茯苓 泽泻 木通

【主治】一切湿症。

22120 四奇汤

【方源】《医方类聚》卷一六五引《吴氏集验方》。

【组成】草果二两（去皮） 生姜三两（切） 陈皮二两（去白） 甘草一两半（炙）

【用法】上捣碎，淹一宿，焙干，为末。盐点服。

【功用】快脾消酒。

22121 四齿散

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】四牙散（《痘疹传心录》卷十五）、四牙无价散（《痘疹仁端录》卷十四）。

【组成】人齿 猫齿 狗齿 猪齿各二钱半

【用法】砂锅固济，火煨通红，候冷，为末。每服五分，热酒调服。

【主治】痘不红，不起发，色灰白，或黑陷而焦。

【备考】本方方名，《古今医鉴》引作“无价散”。

22122 四虎饮

【方源】《疫痧草》。

【组成】大黄 黄连 犀角 石膏 知母 玄参 生地 青黛 马勃

【用法】水煎服。

【主治】痧点虽透，喉烂极盛，脉象弦数，目赤便闭，神烦舌绛，疫火盛者。

22123 四虎散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】天南星 草乌头 半夏（生） 狼毒各等分

【用法】上为细末。醋蜜调敷，留头出毒气。

【主治】发疽肿硬，厚如牛皮，按之方痛。

【备考】《外科正宗》本方用猪脑同捣，遍敷疮上，留正顶出气。

22124 四虎散

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】附子（生，去皮）一两 天南星 半夏 狼毒各半两

【用法】上为末，热酒调成膏。摊上肿处，以熟绢压定。觉患处如火烧，不妨。

【主治】发背初生，筋脉紧急不舒。

22125 四虎散

【方源】《全国中药成药处方集》(武汉方)。

【组成】生南星一两 生白附子一两 生草乌一两 生川乌一两

【用法】上为细末，成净粉 80~85% 即得。视患处大小，取药用醋或酒调敷。

【主治】跌打损伤之郁血部位红肿疼痛。

【宜忌】切勿入口。

22126 四贤串

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】雷丸一两 青皮五钱 三棱三分 黑丑(头末)五钱

【用法】上为末。每服三钱，早空心沙糖调服。莫吃饭，恐虫头向内，候腹内疼即下矣；后下鱼冻，再下虫二三次，用粥饮汤止之。若治痞块，用陈酒送下，块即降消，不必用全虫等类。

【主治】食积痞劳，翻胃噎膈，五臟十胀，虫积痞块。

22127 四贤散

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】枯矾 松香 五倍子 雄黄各等分

【用法】上为末。麻油调敷。

【主治】痢疮并肥疮。

22128 四明丸

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】芎藭 天麻(用水煮过，切，焙) 半夏(水煮，洗去涎，切，焙) 桑螵蛸(大者，锉，炒) 旋覆花 羌活(去芦头) 藁本(择粗者，洗，焙干) 天南星(炮) 青橘皮(汤浸，去白，焙) 附子(炮裂，去皮脐) 各一两

【用法】上为末，用生牵牛三两，熟牵牛三两，杵取末二两，与前药末拌匀，生姜汁煮，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十九至三十九，空心、临卧盐汤或米饮送下。

【主治】风毒气上，眼目昏暗，及偏正头疼，

两目渐觉细小；及有夹脑风疼，目风眼寒。

22129 四明饮

【方源】《回春》卷五。

【组成】大黄 葛花 泽泻 石决明各等分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】一切眼目肿。

22130 四味丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】独活(去芦头) 干姜(炮) 山茱萸(洗，焙) 桂(去粗皮) 各四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下。渐加至三十丸。

【功用】耐寒暑，益气血。

【主治】骨节风冷。

22131 四味丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】蜀椒(去目及闭口，炒出汗) 茴香子(炒) 附子(炮裂，去皮脐) 肉苁蓉(酒浸，切，焙) 各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心温酒送下。

【主治】久积奔豚气，时攻膀胱切痛。

22132 四味丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】熟干地黄(焙) 天门冬(去心，焙) 白茯苓(去黑皮) 远志(去心) 各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【功用】补益精髓。

【主治】五劳七伤。

22133 四味丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】四生丸(《普济方》卷一八八引《十便良方》)。

【组成】荷叶 艾叶 柏叶 生地黄各等分

【用法】捣烂为丸，如鸡子大。每服一丸，

水三盏,煎至一盏,去滓温服,不拘时候。

【功用】《饲鹤亭集方》:补阴凉血,散瘀理气。

【主治】阴虚内热,血热妄行所致之吐血、衄血、呕血、便血及妇人崩漏,产后出血。

①《杨氏家藏方》:吐血。②《普济方》:阳乘于阴,血热妄行,呕血、吐血、衄血。③《饲鹤亭集方》:便血。

【方论选录】①《古今名医方论》引柯琴:心肾不交,则五脏齐损;阴虚而阳无所附,则火炎上焦;阳盛则阳络伤,故血上溢于口鼻也。凡草木之性,生者凉,而熟之则温;熟者补,而生者泻。四味皆清寒之品,尽取其生者,而捣烂为丸,所以全其水气,不经火煮,更远处火令矣。生地多膏,清心肾而通血脉之源;柏叶西指,清肺金而调营卫之气;艾叶芳香,入脾胃而和生血之司;荷叶法震,入肝家而和藏血之室。五脏安堵,则水火不相射,阴平阳秘,而血归经矣。是方也,可暂用以遏妄行之热血,如多用则伤营,盖血得寒,则瘀血不散,而新血不生也。设但知清火凉血,而不用归脾、养营等剂以善其后,鲜有不绵连岁月而毙者。非立法之不善,妄用者之过耳。②《成方便读》:凡吐血一证,热伤阳络者,当清其火;劳伤阳络者,当理其虚。有热伏阴分,用寒凉直折其热,而热仍不解者,则必以辛温芳香之品,从血分以宣发其邪,使热自阴出阳。然后清之泄之,乃为得当。如艾叶、荷叶,虽所入脏腑主治各有不同,而性味气质,大都相似,芳香入血,辛苦而温,且其叶皆有解散之机,从此阴中伏热,涣散不留,而以侧柏、生地直清其血,况侧柏之凉,仍寓香燥之意,恐留不尽之邪,生地之凉,乃有安抚之功,防有虚羸之失,皆用汁者,取其新鲜力专之意。

【临证举例】呕血《妇人大全良方》:陈日华云:先公绍兴初游福清灵石寺,主僧留饮食,将竟,侍者赴堂,斋罢来侍立,见桌子不稳,急罄折极之,举首即呕血。盖食饱拗

破肺也。明年再到寺,因问去年呕血者无恙否?其主僧答云:得四生丸服之遂愈。自得此方,屡救人有效。

【备考】本方改为汤剂,名“止血四生汤”(见《外科正宗》)。

22134 四味汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】半夏(生姜汁浸一宿,汤洗,切,焙) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 各一两 赤茯苓(去黑皮) 二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜一枣大(拍碎),煎至六分,去滓,食后温服。

【主治】咽喉中如有物,咽吐不利。

22135 四味汤

《鸡峰》卷二十。为《圣济总录》卷九十四“四味当归汤”之异名。见该条。

22136 四味汤

【方源】《普济方》卷七十二引《海上方》。

【组成】没药 当归 川芎 羌活 甘草 各半两

【用法】上咬咀。每服三钱,水一盏,煎至五分,食后、临卧温服。

【主治】心脏热,眼目昏花。

22137 四味汤

【方源】《妇人良方》卷十八。

【异名】四味散(《医学入门》卷八)。

【组成】当归 延胡索 血竭 没药各等分

【用法】上为细末。每服半钱,用童子小便一盏,煎至六分,通口服。方分烧吃一服尤妙。

【主治】产后一切诸疾。

【加减】心膈烦,加当归半钱;气闷喘急,加延胡索半钱;恶露不快,加血竭半钱;心腹撮痛,加没药半钱。

22138 四味散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】补骨脂(炒) 牵牛子(半生半

炒)各一两 杏仁(去皮尖双仁,炒)一两
郁李仁(去皮)半两

【用法】上为细散。每服一钱匕,茶清调下。

【主治】肾咳。

22139 四味散

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】大蝦(干者,为末) 獐猪干血 恶实 甘草(炙)各等分

【用法】上为散。三岁以下半钱匕,五岁以上一钱匕,煎赤芍药酒调下,不拘时候,日、夜各一服。

【主治】小儿疮疹欲出不快。

22140 四味散

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】石上薜荔二两 地榆一两 甘草节一两 当归一两

【用法】上为末。每服三钱,温酒调下。

【主治】发背。

22141 四味散

《医学入门》卷八。为《妇人良方》卷十八“四味汤”之异名。见该条。

22142 四季丹

【方源】《齐氏医案》卷六。

【组成】麝香二分 乳香(制) 没药(制)各一钱 丁香八分 虫蛻一钱五分 朱砂 明雄各二钱五分 蝉酥一钱四分 毛山苍术二钱五分

【用法】上为末。外感瘴疔,似觉意似不快,取少许搐鼻取嚏,随嚏而散;痧胀、膈症、痢疾、心痛、腹痛等,均用阴阳水少许调服。

【功用】解毒,通关。

【主治】外感寒热瘴疔,紧慢痧胀;及膈症,红白痢疾,九种心疼并腹痛,一切难名之状。

22143 四物丸

【方源】《外台》卷十二引《范汪方》。

【组成】大戟五分(咬咀,熬令色变) 芫花四分(熬) 杏仁一分 巴豆一百枚(去皮心,熬)

【用法】上为细末,以鸡子黄或以蜜为丸,如小豆大。每服一丸,一日三次,日增一丸,

觉勿复益;欲下顿服七丸,下如清漆陈宿水;妇人乳有余疾,留饮者,下水之后养之,勿饮冷水;长壮者服五丸,先食。

【功用】除五脏邪气。

【主治】心腹积聚,食苦不消,胸胁满。

【宜忌】忌野猪肉、芦笋。

22144 四物丸

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】荔枝核 橘子核 茴香各一两 牵牛子半两(黑者)

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空心米饮送下。

【主治】癖。

22145 四物丸

《饲鹤亭集方》。即《理伤续断方》“四物汤”改为丸剂。见该条。

22146 四物方

《普济方》卷三十三。为方出《千金》卷十九,名见《圣济总录》卷五十三“四物汤”之异名。见该条。

22147 四物汤

【方源】《外台》卷三十六引《小品方》。

【组成】桔梗 紫菀各三分 甘草一分(炙) 麦门冬七分(去心)

【用法】上切。以水一升,煮取六合,去滓,分五服。以愈为度。

【主治】小儿十日以上至五十日,卒得暴咳,吐乳呕逆,昼夜不得息。

22148 四物汤

【方源】方出《千金》卷十九,名见《圣济总录》卷五十三。

【异名】四物方(《普济方》卷三十三)。

【组成】葛根汁 生地黄汁 赤蜜各一升 麦门冬汁五合

【用法】上搅调,微火上煎之三四沸,分三服。

【主治】骨实,苦酸疼烦热。

【方论选录】《千金方衍义》:肝只是有余,肾只是不足,若人身中骨实髓充,极为美事,岂有反用药治之理?盖缘风热入于头额眉棱

骨间痠痛烦热，故用葛根专走阳明之经，以祛上盛之邪，兼滋胃中津气，使水升火降于一弹顷；并地黄、麦冬汁，及赤蜜滋培津血，以杜风火之复入也。

22149 四物汤

【方源】《理伤续断方》。

【异名】地髓汤（《圣济总录》卷一六四）、大川芎汤（《鸡峰》卷十六）。

【组成】白芍药 川当归 熟地黄 川芎各等分

【用法】每服三钱，水一盏半，煎至七分，空心热服。

【功用】①《局方》：调益营卫，滋养气血。②《普济方》：活血。

【主治】血虚，面色萎黄，眩晕失眠，唇淡，舌淡脉弱；妇女营血虚滞，月经不调，痛经，闭经，崩漏；妊娠胎动不安，产后恶露不下；以及各科疾病属于血虚或血行不畅者。

①《理伤续断方》：伤重，肠内有瘀血者。②《局方》：冲任虚损，月水不调，脐腹疼痛，崩中漏下，血瘦块硬，发歇疼痛；妊娠宿冷，将理失宜，胎动不安，血下不止；及产后乘虚，风寒内搏，恶露不下，结生痼聚，少腹坚痛，时作寒热。③《圣济总录》：产后亡阴，血虚汗出不止。④《鸡峰》：妊娠至产前腹痛不可堪忍，及月事或多或少或前或后疼痛。⑤《传信适用方》：赤眼。⑥《朱氏集验方》：休息痢。⑦《得效》：产后血干，痞闷心烦；产育艰难，或一岁一产。⑧《丹溪心法》：荣中有热，及肺壅鼻衄生疮，一切丹毒。⑨《普济方》：禀气不足，齿久不生；小儿行疮痘发热，已出未出，或出不快，及疮斑余毒。⑩《玉机微义》：头痛。⑪《明医杂著》：血虚发热，或寒热往来，或日晡发热，头目不清，或烦躁不寐，胸膈作胀，或胁作痛。⑫《口齿类要》：血虚发热，口舌生疮，或牙龈肿溃，或日晡发热，烦躁不安，或因怒而致。⑬《医方考》：痘根淡，血弱者。⑭《寿世保元》：麻疹前后有潮热不退等症，并为血虚血

热者；妊娠不语。麻疹既出，已过三月不能没，属内有虚热者。⑮《简明医彙》：失血发厥。⑯《医方集解》：一切血虚，及妇人经痛。⑰《证治汇补》：血虚，风中血脉，及偏枯在左者；阴虚血弱耳聋；血虚火动咽痛。⑱《金鉴》：一切血虚，血热、血燥诸证。伤损出血。⑲《叶氏女科》：妊娠血少无以养胎，遍身痠懒，面色青黄，不思饮食，精神困倦，形容枯槁。⑳《文堂集验方》：子宫不收。㉑《杂病源流犀烛》：近视，血虚症，筋惕，皮痒。㉒《会约》：伤寒左手脉弱，面白唇淡，口干舌燥，血虚躁扰如狂者。

【宜忌】①《医方考》：若上下失血太多，气息几微之际，则四物禁勿与之。②《张氏医通》：肥盛多湿痰，及呕逆、少食、便溏者，禁用。

【方论选录】①《元戎》：熟地黄补血，如脐下痛，非此不能除，乃通于肾经之药也；川芎治风，泄肝木也，如血虚头痛，非此不能除，乃通肝经之药也；芍药和血理脾，如腹中虚痛，非此不能除，乃通脾经之药也；当归和血，如血刺痛，非此不能除，乃通肾经之药也。②《医方集解》引《玉机微义》：川芎，血中之气药也，通肝经，性味辛散，能行血滞于气也；地黄，血中血药也，通肾经，性味甘寒，能生真阴之虚也；当归，血中主药也，通肝经，性味辛温，分三治，全用活血，各归其经也；芍药，阴分药也，通脾经，性味酸寒，能和血，治血虚腹痛也。此特血病而求血药之属者也。③《医方考》：气、血，人身之二仪也。天地之道，阳常有余，阴常不足。人与天地相似，故阴血难成而易亏。是方也，当归、芍药、地黄，味厚者也，味厚为阴中之阴，故能生血；川芎味薄而气清，为阴中之阳，故能行血中之气。然草木无情，何以便能生血？所以谓其生血者，以当归、芍药、地黄能养五脏之阴，川芎能调营中之气。五脏和而血自生耳。若曰四物便能生血，则未也。当归辛温能活血，芍药酸寒能敛血，熟

地甘濡能补血。又曰：当归入心脾，芍药入肝，熟地入肾，乃川芎者，彻上彻下而行血中之气者也。此四物汤所以为妇人之要药，而调月者必以之为主也。④《审视瑶函》：是方治血分之圣药也。用当归引血归肝经，川芎引血归肺经，芍药引血归脾经，地黄引血归肾经。惟心生血，肝纳血，脾统血，肺行血，肾藏血，男子化而为精，女子化而为月水。血有形之物，属于阴，故名曰四物汤。⑤《古今名医方论》柯韵伯：是方乃肝经调血之专剂，非心经生血之主方也。当归甘温和血，川芎辛温活血，芍药酸寒敛血，地黄甘平补血。四物具生长收藏之用，故能使营气安行经隧也。若血虚加参、耆，血结加桃仁、红花；血闭加大黄、芒消，血寒加桂、附，血热加芩、连；欲行血去芍，欲止血去芎，随所利而行之，则又不必拘泥于四矣。若妇人数脱其血，故用以调经种子。如遇血崩、血晕等症，四物不能骤补，而反助其滑脱，则又当补气生血，助阳生阴长之理。盖此方能补有形之血于平时，不能生无形之血于仓卒；能调阴中之血，而不能培真阴之本。为血分立法，不专为妇科套剂也。⑥《医方集解》：此手少阴、足太阴、厥阴药也。心生血，脾统血，肝藏血。当归辛苦甘温入心脾生血为君，生地甘寒入肾滋血为臣，芍药酸寒入肝脾敛阴为佐，芎藭辛温通上下而行血中之气为使也。⑦《古方选注》：四物汤，物，类也。四者相类而仍各具一性，各建一功，并行不悖。芎、归入少阳主升，芍、地入厥阴主降。芎藭郁者达之，当归虚者补之，芍药实者泻之，地黄急者缓之。能使肝胆血调，阴阳气畅，故为妇人专剂。⑧《成方便读》：补血者，当求之肝肾。地黄入肾，壮水补阴；白芍入肝，敛阴益血，二味为补血之正药。然血虚多滞，经脉隧道，不能滑利通畅，又恐地、芍纯阴之性，无温养流动之机，故必加以当归、川芎辛香温润，能养血而行血中之气者，以流动之。总之，此方乃调理一切血证，是其所长，

若纯属阴虚血少，宜静不宜动者，则归、芎之走窜行散，又非所宜也。⑨《谦斋医学讲稿》：这是补血、和血的通用方，不限于肝病。因为肝主藏血，比较多用，成为补肝的主方。本方的配合，熟地、白芍是血中的血药，当归、川芎是血中的气药，阴阳动静相配，故能补血，又能和血。

【临证举例】①痛经 《江苏中医》(1956; 2: 40): 作者用本方治疗痛经，疗效较佳。寒型痛经：症见月经错后、经行少腹作痛，或呈痉挛性发作，舌苔薄白或质淡无苔，脉细涩或细弱，用本方加川楝子、吴茱萸。热型痛经：症见月经超前，经量较多，色鲜红，有小血块，少腹隐痛，腰腿痠胀，舌净，脉细弱者，用本方加丹皮、地骨皮。②血管神经性水肿 《上海中医药杂志》(1964; 2: 26): 数年遇慢性血管性水肿 5 例，经其他疗法治疗均未见效，用四物汤治疗后，疗效满意。随访多年，未见再发。一例，男，32 岁，反复发作 5 年，时伴发荨麻疹，严重时伴有偏头痛、上腹痛。双侧扁桃体肿大，皮肤划痕试验阳性，实验室查嗜酸球直接检查计数 6611 立方毫米。曾试用 10% 葡萄糖酸钙静注、奴佛卡因静脉封闭、自血疗法、口服苯海拉明、冬眠灵、利血平及组织疗法、针灸疗法，并转五官科做扁桃体切除，均无效。患者已失信心，又经反复发作一年后，因一次严重发作伴剧烈头痛就诊，给予四物汤治疗，经服 2 剂后，疼痛显著好转，6 剂后停止再发。随访 4 年，未见复发。③荨麻疹 《上海中医药杂志》(1965; 8: 28): 运用四物汤（熟地改为生地），治疗各种荨麻疹 51 例，一般服药 3 剂见效，连服 10 剂无效者改用其他方法治疗。其中慢性荨麻疹 42 例，显效 23 例，进步 5 例，有效 3 例，无效 10 例，加重 1 例；急性荨麻疹 3 例，均服药 2~4 剂后消退；固定性荨麻疹 2 例，服药 3~4 剂后均消退；人工荨麻疹 4 例，进步 2 例，有效 1 例，无效 1 例。

【现代研究】①抗贫血作用 《中医研究通

讯》(1963; 8; 3): 本方能促进急性贫血时动物血细胞的再生, 主要表现为网织红细胞的转变成熟。《陕西中医学院学报》(1986; 2: 40): 对放血所致的小鼠急性失血性贫血, 给以本方后, 经粒细胞、红细胞比例、有核细胞百分率的骨髓象观察及骨髓染色形态和数量的观察, 发现本方可使骨髓造血机能改善, 从而促进贫血的恢复。②对免疫机能的作用 《江苏中医杂志》(1980; 2: 32): 通过对人外周血淋巴细胞转化及活性花瓣的体外实验, 发现本方有显著的促进作用, 提示既能增多淋巴细胞的数目, 又能促进其功能, 对细胞免疫有促进作用。《中医药研究参考》(1957; 1: 24): 本方可显著抑制特异性体液免疫。实验发现, 本方对羊红细胞致敏之小鼠脾脏之溶血空斑数, 即抗体形成细胞数以及血凝素的效价, 能显著降低。③抗放射线损伤作用《国外医学·中医中药分册》(1984; 5: 305): 对于全身软X线2000拉德(rad)照射小鼠30天生存率的实验表明, 以四物汤甲醇提取物2g/kg在照射前5分钟给药, 可以显著延长动物的生存时间, 水提物0.25g/kg也有显著效果。拆方单味药实验表明, 除川芎有以上显著效果外, 余之药均无此作用。④对子宫的作用 日本《东洋医学会志》(1972; 1: 66): 四物汤加紫草能使子宫呈高度兴奋状态; 加芸苔子可迅速使子宫收缩, 以至呈痉挛状态。

【备考】《妇人良方》: 此药不知起于何代, 或云始自魏·华佗。今《产宝方》乃宋梁时节度巡官咎殷所撰, 其中有四物散, 国朝太平兴国中修入《圣惠方》者数方。自后医者易散为汤, 虽无杰特之功, 但善用者若驭良马, 以意驱策之, 则随意无所不至, 自可珍也。自皇朝以来, 名医于此四物中增损品味, 随意虚实寒燥, 无不得其效者, 然亦非止妇人疾之可用而已。按: 本方改为丸剂, 名“四物丸”(见《饲鹤亭集方》)。

22150 四物汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】甘草(炙, 锉) 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙)各二两 葱白(锉)二七茎 赤小豆(拣)三合

【用法】上锉, 如麻豆大。以水五盏, 煎至二盏半, 去滓, 分温三服, 空心早晚食前服尽。

【主治】脚气冲心。

22151 四物汤

《圣济总录》卷一七四。为《千金》卷五“芍药四物解肌汤”之异名。见该条。

22152 四物汤

【方源】《丹溪心法》卷二引《保命集》。

【组成】川芎 当归 白芍 生地 槐花 黄连 御米壳各等分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】下痢纯血。

22153 四物汤

【方源】《症因脉治》卷二引王海藏方。

【组成】熟地 白芍药 牡丹皮 当归

【功用】补血。

【主治】血虚咳嗽; 肝阴不足, 小便不利。

22154 四物汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】当归 赤芍 丹皮 玄胡索 官桂(又方用山楂)

【用法】煎浓汤服。

【主治】产后余血不尽, 小腹痛。

22155 四物汤

【方源】《普济方》卷三二四。

【组成】当归 玄胡索 威灵仙 官桂各等分

【用法】上为末。每服三钱, 空心酒调服。

【主治】癥瘕积聚。

22156 四物汤

【方源】《普济方》卷三五三。

【组成】当归 人参 芍药 川芎各等分

【用法】加乌梅, 水煎服。

【主治】产母荣卫大虚, 血气未定, 或内积虚损, 外伤燥热, 饮食甘辛, 令口干痞满者。

22157 四物汤

《玉机微义》卷十三。为《元戎》“大黄六合汤”之异名。见该条。

22158 四物汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】赤芍药 羌活 蝉蜕 木贼 黄芩 大黄 蒙花 粉草 桔梗 蒺藜 郁金 当归 防风 龙胆草 独活 川芎 石膏 川椒 菊花 草决明 车前子 谷精草 黄连 苍术 荆芥

【用法】加灯心十根，水煎，温服。

【主治】小儿斑疮入眼，眼赤者。

22159 四物汤

《济阴纲目》卷三。即《元戎》“附子六合汤”。见该条。

22160 四物汤

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】人参 白术 黄耆各三钱 干姜(炮) 附子(炮) 甘草(炙) 陈皮 当归各二钱 柴胡 升麻各五分

【用法】酒、水煎服。

【主治】脾肾虚寒，疮属纯阴，或药损元气，不肿痛，不腐溃，或腹痛，泄泻，呕吐，厥逆，及阳气脱陷。

【加减】如不应，倍加姜、附。

22161 四物汤

【方源】《医灯续焰》卷十四。

【组成】贝母(去心) 紫菀(去苗土) 桔梗(炒) 各一两 甘草(炙) 半两

【用法】上为末。每服三钱，水一盞，煎五七沸，去滓稍冷服，不拘时候。

【主治】肺病吐脓，五心烦热，壅闷咳嗽。

【加减】如咳嗽甚，加去皮尖杏仁三枚同煎。

22162 四物汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】当归九钱 白芍三钱 川芎一钱 熟地九钱 五味子一钱 麦冬三钱

【用法】水煎服。

【功用】补血，养肺金。

【主治】中暑伤气。

【方论选录】中暑伤气，而调治之法，不可以治气为先，当以补血为主。盖阳伤则阴血亦耗也。此方全是阴经之药，又加之麦冬、五味，以养肺金，金即旺，可以制木之克脾，则四物生肝而安于无事之福也。

22163 四物汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】当归一钱 白芍三钱 川芎一钱 熟地四钱 白果五个 何首乌三钱 桑叶七片

【用法】水煎服。

【功用】补血。

【主治】血脉不足之症，任督阴阳各跻经络不足，或毛发之干枯，发鬓之凋落，或色泽之不润，或相貌之憔悴。

【方论选录】此方妙在用白果以引至唇齿，用桑叶以引至皮毛，用何首乌以引至发鬓，则色泽自然生华，而相貌自然发彩矣。

22164 四物汤

【方源】《医部全录》卷四一三。

【组成】当归 川芎 芍药 山梔 熟地黄各一钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿烦解，鼻衄，颊间色赤。

22165 四物汤

【方源】《白喉全生集》。

【组成】生地黄三钱 僵蚕(姜汁炒) 川芎各二钱 白芍 银花各一钱五分 当归 粉草各一钱 青果一粒

【用法】水煎服。

【主治】白喉虚热，虚阳上浮，白见于关内外，色稍不润，喉内红肿，下午痛甚，口干不渴，舌苔虽黄而滑，小便略赤而长，饮食稍碍，心烦不眠。

22166 四物饮

【方源】《验方新编》卷十二。

【组成】赤沙糖一斤 生甘草一斤 川贝母一两(去心研细) 老姜四两

【用法】先用鸦片灰五钱，熬膏，再入前药，同熬去滓。如一钱瘾者，食药五钱，逐日减少，并以赤沙糖冲水代茶，即断；如瘾极重者，取已煎之汁，重煎之十杯，煎成一杯，再服必效。

【功用】戒鸦片烟瘾。

22167 四物散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】粉霜 麝香 石灰 铅丹（炒紫色）各一分

【用法】上四味，先研前三味细为散，后入铅丹，再研匀，如桃花红。用鸡翎扫之。

【主治】小儿走马疳。

22168 四和汤

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】白面一斤（炒） 芝麻一斤（炒） 茴香二两（炒） 盐一两（炒）

【用法】上为末。空心白汤点服。

【主治】腹内冷痛，脾胃不和。

22169 四和汤

【方源】《仙拈集》卷三引危未功方。

【组成】当归五钱

【用法】水一碗，煎半碗，倒出，加麻油、好酒、白蜜各一杯，和匀，吃下即生。

【主治】妇人水浆已破，过时不产。

22170 四和膏

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】麻油 松脂各二两 黄蜡 桂（去粗皮，为末）各一两

【用法】同熬成膏。涂之。

【主治】漆疮遍身，焮赤疼痛。

22171 四制丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】制苍术二两（干木瓜一两，好酒一升，煮干） 苍术二两（干木瓜一两，水一升，入盐二两，煮干） 制苍术二两（干木瓜一两，好醋一升，煮干） 苍术二两（干木瓜一两，水一升，川椒一两，煮干）

【用法】上用瓦器煮，焙干为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心温酒送下；

妇人醋汤送下。

【主治】脚气。

22172 四制丸

《摄生众妙方》卷四。为《万氏家抄方》卷一“四制柏术丸”之异名。见该条。

22173 四制丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】半夏四斤（泡，去脐，分作四份。一份生姜、黄连各四两，水二碗，同煮干；一份知母、贝母各四两，水二碗，同煮干；一份人参、杏仁各四两，水二碗，同煮干；一份桔梗、桑皮各四两，水二碗，同煮干）

【用法】只用制过半夏，切片，晒干，为细末，水法为丸。每服二钱，空心姜汤送下。

【功用】化痰清热。

【主治】阴虚咳嗽。

22174 四金丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】肉苁蓉（酒浸一宿，焙） 牛膝（酒浸一宿，焙） 天麻 青盐（细研）各三两

【用法】上药除盐外，捣罗为末，与盐和匀，用木瓜一枚，除心蒸烂去皮，入臼中与四味药同捣为丸，如梧桐子大；若干，少少入酒丸。每服五十丸，空心、夜卧暖酒吞下。

【功用】平补五脏，壮筋骨，益颜色，美饮食。

22175 四金丸

【方源】《普济方》卷二四四引《如宜方》。

【组成】草乌 生姜半斤（研姜，同草乌一处交盛一宿） 葱六两（同研苍术，交盛一宿） 苍术（制）

【用法】上为末，糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心服。

【主治】湿气留滞，脚腿肿浮，早轻晚重。

22176 四金丹

【方源】《普济方》卷一六五引《卫生家宝》。

【组成】桔梗（炒） 防风 白矾（枯）各一两 雄黄半两（研）

【用法】上为末，水浸蒸饼为丸，如鸡头子大。每服一粒，绵裹含化。

【主治】风痰壅，咳嗽不止。

22177 四金散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【异名】四圣散（《普济方》卷三十七）。

【组成】贯众 荆芥穗 白矾（飞过） 猪牙皂荚（醋炙）各一两

【用法】上同烧存性，为散。每服一钱匕，空心、食前温米饮调下，一日三次。

【主治】肠风。

22178 四金刚

《申雅内编》卷二。为《局方》卷八（宝庆新增方）“神效托里散”之异名。见该条。

22179 四疳散

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】熟地二两 白术一两 甘草一钱 山茱萸一两 人参五钱 白芥子三钱 柴胡三分 荆芥一钱（炒黑）

【用法】水煎服。

【主治】四日两发之疳。发疳之时，寒热俱盛，腰痛脊强，口渴，寒从下起，先脚冷，后由脚冷至脐，由脐冷至手而止，其颈以上则不冷。

22180 四炒丸

【方源】《医方大战》卷七引《简易方》。

【异名】四炒枳壳丸（《得效》卷六）、四制枳壳丸（《医统》卷四十一）。

【组成】枳壳四两（去瓢，切作两指面大块，分四处。一两用苍术一两同炒黄，去苍术；一两用萝卜子一两炒黄，去萝卜子；一两用干漆一两炒黄，去干漆；一两用茴香一两同炒，去茴香）

【用法】只用枳壳为细末，同水二碗，煎至一碗，去滓，煮面糊丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后米饮送下。

【功用】《医方类聚》引《臞仙活人方》：宽中快气，消导进食。

【主治】气血凝滞，腹内盘胀。

22181 四炒丸

《普济方》卷二十三。即《瑞竹堂方》卷二“四炒丸”。见该条。

22182 四炒丸

【方源】《赤水玄珠》卷五。

【组成】木香 槟榔各一两五钱（二味锉如芡实大，四制。一份用莱菔子一两同炒深黄色，去莱菔子不用；一份用干漆一两炒烟尽，去漆；一份用茴香一两炒深黄色，去茴香；一份用莪术一两炒黄色，去术）

【用法】上只留木香、槟榔为末，以四味同炒药煎汤，打糊为丸，如绿豆大。每服七八十丸，米饮送下。

【主治】年高入患鼓胀，独只腹胀，肢体如柴，举动乏力。

22183 四炒丹

《医方类聚》卷八十八引《简易方》。为《普济方》卷二二六引《十便良方》“固真丹”之异名。见该条。

22184 四治汤

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】白砂糖五钱

【用法】伤寒，用生姜汤调服；伤食，用山楂汤调服；伤热，用新汲水调服；妇人血崩，用百草霜汤调服。

【主治】伤寒，伤食，伤热，妇人血崩。

22185 四宝丸

【方源】《普济方》卷一六三引《仁存方》。

【组成】知母 贝母 款冬花 白矾（枯）各等分

【用法】上为末，以稀糊为丸，如梧桐子大，甑上蒸过。每服二十丸，食后姜汤送下。

【功用】化痰。

【主治】咳嗽。

22186 四宝丹

【方源】《疡医大全》卷十四引《汤氏方》。

【组成】雄黄三钱 硼砂二钱 甘草一钱 冰片三分五厘

【用法】上为末。蜜水调涂，或干掺。

【主治】鹅口疮。

22187 四宝丹

【方源】《医方类聚》卷二十三引《经验良方》。

【组成】金毛狗脊(盐泥固济,火煨红,去皮,用肉,出火气,锉) 草薢 苏木节 川乌(生用) 各等分

【用法】上为细末,米醋糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒或盐汤送下。病在上,食后服;病在下,空心服。

【主治】男子、妇人一切风疾。

22188 四宝丹

【方源】《回春》卷三。

【组成】使君子肉二两 槟榔 南星各二两(姜汁制)

【用法】上为末。黄病吃生米者,用麦芽一斤(炒);吃茶叶者,用茶叶一斤(炒);吃黄泥者,用壁土一斤(炒);吃黑炭者,用黑炭一斤(炒),与上药共为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,清早砂糖水送下。

【主治】黄病吃生米、茶叶、黄泥、黑炭者。

22189 四宝丹

《疡医大全》卷三十三。为《丹溪心法附余》卷二十三“四圣丹”之异名。见该条。

22190 四宝丹

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】丁子一钱 胡黄连三钱 巴豆霜一钱

【用法】上为细末,老米饭捣烂为丸,如菜菔子大。每旦服十二粒,不知渐加至二十粒,小儿五六粒。

【主治】痢疾。

【备考】本方宜与龙飞丸旦暮兼用。

22191 四宝丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】黄柏 赤石脂 大贝母 青黛各等分

【用法】上为细末。掺之。

【主治】疔疮。

22192 四宝汤

【方源】《疡医大全》卷十六。

【组成】当归 生地黄 升麻 赤芍药各三钱

【用法】水二钟,煎一钟,服一半;留一半漱口,吐去。

【主治】牙痛。

22193 四宝顶

《串雅内编》卷三。为《杨氏颐真堂方》引丁丹崖方(见《本草纲目》卷五十)“狗宝丸”之异名。见该条。

22194 四参汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】玄参一两 麦冬 生地各五钱 天门冬 人参 沙参各三钱 丹参 茯苓各二钱 黄连五分 北五味一钱

【用法】水煎服。

【主治】梦遗之后,身体狼狽,加之行役太劳,或行房太甚,遂致盗汗淋漓。

22195 四珍丸

【方源】《不居集·下集》卷八。

【组成】黄芩 黄连 香附 苍术各等分

【用法】上为末,瓜蒌瓤为丸。

【主治】湿痰发热。

22196 四珍丹

【方源】《幼幼新书》卷二十六引张涣方。

【组成】干大蟾一枚(去四足,纳胡黄连半两在腹内,线缝,湿纸裹,泥固烧赤) 芦荟半两 麝一分

【用法】研白面糊为丸,如黍米大。每服五七粒,粥饮送下。

【主治】诸疳羸瘦,毛发焦黄,口鼻生疮。

22197 四珍膏

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】人参一两 蜜四两 乳汁 梨汁

【用法】同熬,加制过紫河车,酒服两匙。

【主治】患疟之后,寒热消烁,肌肉渐瘦,或乍愈而痘出,或带疟而患痘。

【备考】本方原名“八珍膏”,与方中用药之数不符,据《医部全录》改。

22198 四柱丸

【方源】《鸡峰》卷四。

【异名】长生丹。

【组成】何首乌 石菖蒲 牛膝各四两

【用法】上为粗末，以酒三升，入瓷锅内慢火煮令干，更用川乌头四两（炮，细锉），同上药为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐、酒任下。

【功用】添精补髓，长筋力，缩小便，大壮筋骨，黑发生齿。

22199 四柱饮

《张氏医通》卷十四。为《圣济总录》卷一八六“四神汤”之异名。见该条。

22200 四柱散

《局方》卷三（绍兴续添方）。为《圣济总录》卷一八六“四神汤”之异名。见该条。

22201 四柱散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】天台乌药（好酒浸两宿） 高良姜（炒） 青皮（去瓢，炒） 舶上茴香（炒） 各等分

【用法】上为末。每服二钱，炒生姜、童子小便调下；或炒生姜酒亦得；妇人血气甚者，煎当归酒调下，不拘时候。

【主治】伏气筑塞，小肠气、肾气、膀胱肿大、疝气等疾。

22202 四草饮

【方源】《医级》卷八。

【组成】荷包草 平地蘑 三白草 神仙对坐草

【用法】水煎服。

【主治】酒浆过度，发黄肿胀，湿热侵脾，大小便不利。

22203 四骨散

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】龙骨 虎骨 豹骨 穿山甲各等分 乳香 没药各少许

【用法】上为细末。用黄米面糊摊在细布上，药末掺上。先将折处料理齐整，却用药贴在患处，用火烤湿缠一匝，又用竹篦四下篦住，后用带子或细索拴牢。三五日看有不到处，从头再捏遍其药贴上，即时不疼，十

数日接住。

【主治】一切折伤腿胳膊骨节。

22204 四香汤

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】莎草根一两 黑狗脊半两 甘松 黄熟香（上好极香者）各一分

【用法】上为粗末。每用五钱匕，水一碗，煎五七沸，盛在深盆中，便令患者于上面坐，围衣被熏之，勿透气，候下得手，便淋渌患处，直候药冷即止，不得揩拭，便盖覆卧一时许，若渌了，临卧将被以火焰稍暖更妙。

【主治】丈夫、妇人患痔，不论有疮无疮。

22205 四香饮

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】丁香 木香 沉香（锉） 乳香 青橘皮（汤浸，去白，焙）各一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）半两 枳实（去瓢，麸炒）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎三四沸，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】气痢，结核未破者。

22206 四香散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】地龙粪（火煨通红，新瓦盆盖覆，出火气）五两 寒水石（火煨通红，依前出火气）三两 龙骨 木香 槟榔 黄柏（去皮） 降真香 枫香（研）各一两 牡蛎三两（烧） 乳香（别研） 雄黄（研）各半两

【用法】上为细末。先用荆芥汤洗，次将帛子挹干，干掺或麻油调敷。

【主治】疔疮。

22207 四香散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】木香 沉香 乳香 甘草各一分 川芎 胡椒 陈皮 人参 白矾各五钱 桂心 干姜 砂仁 茴香各一两 大茄（焙）五两

【用法】上为末。每服二钱，陈米饮调服。

【主治】脾气、血气、血蛊、气蛊、水蛊、石蛊。

【宜忌】忌羊肉。

22208 四香散

【方源】《寿世新编》卷下。

【组成】茴香四分 广木香五分 沉香五分 香附(制)四钱

【用法】上为末。滚水酒冲服。

【主治】一切气痛及孕妇气痛者。

22209 四顺丸

【方源】《医方类聚》卷五十七引《伤寒指掌图》。

【组成】理中丸加甘草一倍

【主治】①《医方类聚》引《伤寒指掌图》：少阴十余日，下利不止，手足微冷。②《医学入门》：伤寒身无热，脉沉苦烦，默默不欲见光，腹痛下痢，或无脉可诊。

【备考】本方改为汤剂，名“四顺汤”(见《证治要诀类方》)。

22210 四顺汤

《肘后方》卷二。为《伤寒论》“四逆加人参汤”之异名。见该条。

22211 四顺汤

【方源】《医心方》卷十一引《范汪方》。

【组成】甘草三两 人参二两 当归二两 附子一两 干姜三两

【用法】以水七升，煮取二升半，分三服。

【主治】寒冷饮食不调，下利。

22212 四顺汤

【方源】《养老奉亲》。

【组成】神曲四两(入生姜四两去皮，一处作饼子，焙干) 大麦蘖子二两(炒香熟) 草豆蔻一两半(先炮熟，去皮细锉用) 甘草一两半(炙黄)

【用法】上为末。每服一钱，盐点之。

【主治】老人百疾。

22213 四顺汤

【方源】《圣济总录》卷五十。

【异名】四顺散(《外科发挥》卷四)。

【组成】贝母(去心) 桔梗(炒) 紫菀

(去苗土) 各一两 甘草(炙，锉) 半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎五七沸，去滓，稍冷服，不拘时候。

【主治】肺癰吐脓，五心烦热，壅闷咳嗽。

【加减】如咳嗽甚，入去皮尖杏仁三枚同煎。

22214 四顺汤

《证治要诀类方》卷一。即《医方类聚》卷五十七引《伤寒指掌图》“四顺丸”改为汤剂。见该条。

22215 四顺汤

【方源】《诚书》卷八。

【组成】大黄 甘草(炙) 当归 薄荷 芍药

【用法】加灯心，水煎服。

【功用】《治疹全书》开下窍，透上窍。

【主治】①《诚书》：腑胀痰食。②《治疹全书》：疹子头面无点由于火郁者。

【宜忌】元气虚者忌服。

22216 四顺饮

《易简》。为《伤寒论》“四逆加人参汤”之异名。见该条。

22217 四顺饮

《易简》。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

22218 四顺饮

【方源】《普济方》卷七十一。

【组成】大黄一两半 川芎 山梔仁 赤芍药 朴消各一两 当归 枳壳 甘草(炙) 各一两

【用法】上咬咀。每服二钱，加生地黄三寸煎。

【主治】远年眼目赤肿，大便不通。

【加减】兼气，加香附；痛，加乳香、没药。

22219 四顺饮

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】当归 大黄 熟地黄 白芍药 柴胡各二两 川芎四两

【用法】上为末。每服三岁用一钱，水半盞，煎三分，不拘时候服。

【主治】小儿头热身凉，并五心热。

22220 四顺饮

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归 大黄 白芍药 怀生地

【主治】燥火腹痛，大便秘结。

22221 四顺饮

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】大黄 川芎 枝炭 赤芍 没药 当归 枳壳 生地 香附 甘草

【主治】麻疹，目有白膜。

22222 四顺散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】麻黄（去节） 杏仁（去皮）

荆芥穗（炙） 甘草（炙）各等分

【用法】上为末。每服一钱，入盐汤点，热服。

【主治】老人四时伤寒。

22223 四顺散

《活人书》卷二十。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

22224 四顺散

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】决明子（蜜炙） 甘菊花各一两 附子（炮裂，去皮脐） 防风（去叉） 蒺藜子（炒去角） 羌活（去芦头） 黄芩（去黑心） 梔子仁 黄连（去须）各一分

【用法】上为细散。每服二钱匕，用米泔水调下，早、晚各一眼。服药后即卧少时。

【功用】利胸膈。

【主治】肝脏实热壅盛。

22225 四顺散

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】干姜（炮裂） 甘草（炙，锉） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒，别研）各等分

【用法】上四味，除杏仁外余为末，入杏仁再研匀。每服一钱匕，空心、食前以沸汤点服，一日三次。

【主治】肺寒久嗽。

22226 四顺散

【方源】《幼幼新书》卷十九引《张氏家传》。

【组成】银州柴胡（去芦） 真地骨皮 白桔梗各三钱 甘草（炙）一钱半

【用法】上药焙干，为末。每服一钱或半钱，大小加减，水三分，煎一分半，温温服。

【主治】小儿风热，肌瘦，五心烦热，不长肌肉，面黄痿瘦，夜卧不安，时发虚汗；或脏腑泄泻变痢，难服凉药。

22227 四顺散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】麻黄 杏仁 干姜各半两 甘草二钱半

【用法】上为细末。每服一大钱，水一盞，入盐煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】嗽。

22228 四顺散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】川黄连（酒炒） 当归 芍药各二钱 御米壳（去隔膜，醋炒）二钱

【用法】加生姜七片，水煎，食前热服。

【主治】中暑，冷热不调，大便下赤白脓。

22229 四顺散

《奇效良方》卷六十三。为《苏沈良方》卷五引《灵苑方》“四神散”之异名。见该条。

22230 四顺散

《外科发挥》卷四。为《圣济总录》卷五十“四顺汤”之异名。见该条。

22231 四顺煎

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】当归 赤芍 羌活 防风 连翘 炒梔 大黄 甘草 灯心

【主治】寒火冲耳。

22232 四胆丸

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】象胆半两 鲤鱼胆七枚 熊胆一分 牛胆半两 石决明（捣，研）一两 麝香（研）一钱

【用法】上为末。面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶清送下。

【主治】偃月内障，翳如凝脂，一边厚，一边薄，状如偃月，针后；及内障枣花翳针后。

22233 四胆丸

《圣济总录》卷一七三。为《圣惠》卷八十六“五胆丸”之异名。见该条。

22234 四胜丸

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】代赭 干姜(炮) 龙骨各一两 附子(炮裂，去皮脐)三分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心，食前米饮送下。

【主治】产后水泻不止。

22235 四胜饮

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】生料五苓散 不换金正气散 小柴胡汤 草果散

【用法】上药共和令匀，不问男女、孩童大小，皆可加減煎服。如大人，但作四服，水一盞半，加生姜五片，肥枣一枚，煎至一盞，空心热服，合滓再煎两次，不拘时候。

【主治】疟疾。初患疟疾未上十次者，不可便截，皆因暑邪入于脾经，生冷伤于中脘，或先寒后热，或先热后寒，或独作，或连日并发，或日一发，寒则肢体颤掉，热则满身如烧，头疼恶心，烦渴引饮，口苦咽干，背脊痠痛，其阴阳未分，胸膈停痰，肠鸣腹痛，里急后重，欲作痢疾。

【宜忌】忌生冷一切毒物，及忌一月饥饱风寒，免至再发。

22236 四胜散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大黄三两 蛇床子三两 熟虎三两 黄柏一两

【用法】上为末。小青油调搽。

【主治】一切湿毒瘰癧。

22237 四逆汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】甘草二两(炙) 干姜一两半 附子一枚(生用，去皮，破八片)

【用法】以水三升，煮取一升二合，去滓，

分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

【功用】温中祛寒，回阳救逆。

①《伤寒明理论》：发阳气，散阴寒，温经暖肌。②《伤寒溯源集》：散下焦寒邪，助清阳升发。③《金鉴》：逐阴回阳。

【主治】伤寒太阳病误汗伤阳，及阳明、太阴、少阴、厥阴病、霍乱病等症见四肢厥逆，恶寒踡卧，呕吐不渴，腹痛下利，神衰欲寐，舌苔白滑，脉微欲绝者，以及瘟疫、疟疾、厥证、脱证、痛证见有上述症状，属阴证者。现常用于心肌梗塞、心衰、急慢性胃肠炎吐泻过多，各种高热大汗所致之虚脱，各种因素所致的休克等属于阳衰阴盛者。

①《伤寒论》：伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝欲攻其表，此误也，得之得厥，若重发汗，复加烧针者；伤寒医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者；太阳病，发热头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛；阳明病，脉浮而迟，表热里寒，下利清谷；少阴病，脉沉者；少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐，始得之，手足寒，脉弦迟，若膈上有寒饮，干呕者；厥阴病，大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，下利，厥逆而恶寒者；霍乱病，既吐且利，小便复利，而大汗出，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝。②《金匱》：呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者。③《肘后》：霍乱心腹胀痛，烦满短气，未得吐下。④《圣惠》：两感伤寒，阴阳二毒交并，身体手足厥逆，心中热闷，强语，三部脉微细。⑤《济生》：五脏中寒，口噤，四肢强直，失音不语，或卒然晕闷，手足厥冷。⑥《此事难知》：肝症，令人色苍苍然，太息，其状若死者。⑦《得效》：冷证呕吐，胃中虚，四肢厥冷，食即呕吐，或因冷食伤胃，或累经汗下致虚胃气，但脉弱，小便多得利，身有微热见厥者。⑧《卫生宝鉴》：伤寒自利不渴，呕哕不止，或吐利俱发，小便或涩或利，或汗出过多，脉微欲绝，腹痛胀满，手足逆冷及一切虚寒逆

冷。⑨《医林集要》：伤寒阴证，唇青面黑，身背强痛，四肢厥冷及诸虚伤寒。⑩《回春》：伤寒太阴病自利不渴，及三阴证脉微欲绝，手足厥冷；阴证，身静而重，语言无声，气少难以喘息，目睛不了了，口鼻气冷，水浆不下，大小便不禁，面上恶寒有如刀刮者。⑪《伤寒大白》：阴症呃逆，四肢厥冷。⑫《杂病源流犀烛》：湿病浊邪。⑬《会约》：瘟疫，胃寒呃逆。

【宜忌】《中药方剂近代研究及临床应用》：血虚寒滞之厥逆非本方所宜，热厥禁用。

【方论选录】①《伤寒明理论》：此汤申发阳气，却散阴寒，温经暖肌，是以四逆名之。甘草味甘平，《内经》曰：寒淫于内，治以甘热。却阴扶阳，必以甘为主，是以甘草为君；干姜味辛热，《内经》曰：寒淫所胜，平以辛热。逐寒正气，必先辛热，是以干姜为臣；附子味辛大热，《内经》曰：辛以润之。开发腠理，致津液通气也。暖肌温经，必凭大热，是以附子为使，此奇制之大剂也。四逆属少阴，少阴者，肾也，肾肝位远，非大剂则不能达，《内经》曰：远而奇偶，制大其服。此之谓也。②《伤寒论集注》张志聪：夫元气发原于下，从中上而达于四肢。脉沉乃生气不能从下而中，故用下焦之附子配中焦之炙甘草、干姜；若中焦为病而生原无恙者，止用理中丸而不必附子矣。后人附子无干姜则不热，得甘草则性缓之说。此撰不经之语而贻误后昆者也。如当急用附子而先以桂枝试之者，亦误事匪浅。③《医方集解》：此足少阴药也。寒淫于内，治以甘热，故以姜、附大热之剂，伸发阳气，表散寒邪（附子生用亦能发表）。甘草亦补中散寒之品，又以缓姜附之上僭也（甘草为君，干姜为臣，附子为使）。必冷服者，寒盛于中，热饮则格拒不纳，经所谓热因寒用，又曰治寒以热，凉而行之是也。④《千金方衍义》：四肢为诸阳之本，故能运动不息，今因阳气乖离，所以四肢厥冷。用黑附子温补下焦之真阳，干姜温散中焦之寒逆，甘草温养三焦

之元气，为直中阴寒之专药。⑤《古方选注》：以生附子、生干姜彻上彻下，开辟群阴，迎阳归舍，交接于十二经。反复以炙甘草监之者，亡阳不至于大汗，则阳未必尽亡，故可缓制留中，而为外召阳气之良法。⑥《金鉴》：方名四逆者，主治少阴中外皆寒，四肢厥逆也。君以炙甘草之甘温，温养阳气；臣以姜附之辛温，助阳胜寒；甘草得姜、附，鼓肾阳，温中寒，有水中暖土之功；姜、附得甘草，通关节，走四肢，有逐阴回阳之力。肾阳鼓，寒阴消，则阳气外达而脉升，手足温矣。⑦《寒温条辨》：此方通治三阴脉沉，恶寒，手足厥逆之证，故用附子之生者，上行头顶，外彻肌表，以温经散寒；干姜亦用生者，以内温脏腑；甘草独用炙者，以外温荣卫，内补中焦也。⑧《衷中参西》：干姜为温暖脾胃之主药，伍以甘草，能化其猛烈之性使之和平，更能留其温暖之力使之常久也。然脾胃之温暖，恒赖相火之壮旺，附子色黑入肾，其非常之热力，实能补助肾中之相火，以厚脾胃温暖之本源也。方名四逆者，诚以脾主四肢，脾胃虚寒者，其四肢常觉逆冷，服此药后，而四肢之厥逆可回也。

【临证举例】①少阴病 《南雅堂医案》：少阴为病，内寒外热，腹痛下利清谷，四肢厥冷，恶寒不渴，拟用四逆汤主治。附子一枚（生用）、干姜一钱五分、炙甘草三钱。《伤寒论汇要分析》：苏某妻，30余岁。月经期间不慎冲水，夜间或发寒战，继即沉沉而睡，人事不省，脉微细欲绝，手足厥逆。当即刺人中、十宣出血，一度苏醒，但不久仍呼呼入睡。此乃阴寒太盛，阳气大衰，气血凝滞之故，拟大剂四逆汤：炮附子25克，北干姜12克，炙甘草12克，水煎，分四次温服，每半小时灌服一次。此为重药缓服办法，如一剂顿服，恐有“脉暴击”之变。服全剂未完，四肢转温，脉回，清醒如初。②虚寒下利 《全国名医验案类编》（续编）：强陆氏，年廿余岁，因夏秋伏阴在内，复纳凉食冷，致寒热

伤脾而致腹痛下痢, 经旬不愈, 有时痛欲汗出, 恶寒拘急, 四肢厥冷, 脉微弦而迟, 此寒伤三阴, 宜遵仲师温脏散寒法, 以四逆汤加味。淡附子一钱、炮姜六分、清炒甘草六分、桂枝六分, 一服即效, 二服痊愈。对症发药, 虽仅数味, 功效立见, 用药如用兵, 贵精不贵多, 信然。《浙江中医》(1964; 8: 14): 徐某某, 男, 7 个月。1963 年 8 月 7 日初诊。因母乳不足, 每日喂米糊 3 次, 两月前喂米糊过饱, 腹胀吐泻, 发高烧。西医治后, 热退, 腹泻昼夜达 10 多次, 继续服用西药 6 天无效, 改中医治疗 8 天, 腹泻减至每日 4~5 次, 因小儿服药不便而停药。两天前因受凉腹泻加重, 每日 7~8 次, 粪稀薄如蛋花汤, 精神萎靡, 夜间啼哭不宁, 来门诊治疗。当时舌苔白而少津, 四肢逆冷。断为脾肾虚寒, 邪热留连胃肠。予以本方煎剂(先将制附子 1.5 克、干姜、甘草各 9 克, 加水 350 毫升, 微火煎至 150 毫升, 再加入黄连 9 克, 仍用微火煎至 80 毫升, 过滤后, 加入砂糖适量, 煮沸后备用), 每次 8 毫升, 4 小时 1 次。次日复诊: 精神好转, 大便次数减至 4~5 次, 四肢已温, 续服 3 天而愈。最近患儿感冒来所治疗, 据家长告知: 前次腹泻愈后, 迄今未患过泄泻。③心肌梗塞 《伤寒论汤证论治》: 赵某某, 男, 58 岁, 农民。胸闷气短年余, 服冠心苏合丸可缓解。突然心痛难忍, 心神不安, 冷汗出, 四肢冰冷, 神昏欲睡, 面色赤, 唇紫甲青, 四肢逆冷, 冷汗不止, 下利, 臭味不浓, 舌质淡, 脉微欲绝。西医诊为急性心肌梗塞伴休克, 中医诊为少阴病, 当即针人中、内关, 神渐有爽。急以回阳救逆: 制附子 18 克, 干姜 10 克, 炙甘草 25 克, 肉桂 3 克, 急煎, 冷服。良久, 四肢渐温, 冷汗消, 面色已复常态, 口语已利, 脉复渐有神。《天津医药通讯》(1972; 11: 1): 在治疗的 105 例急性心肌梗塞患者中, 有 23 例并发休克, 经治无一例死亡。其中亡阳型用四逆汤治疗。认为本方有升压、强心

作用, 如与生脉散等合用, 可解决较长时间用升压药以后停药血压下降的问题。④休克 《中医资料选编》(四川省军区后勤部): 李某, 女, 69 岁。因患肺心病、肺炎、中毒性休克、脱水而住院。神志清, 颜面苍白, 肺部有湿性罗音, 心率 92 次/分, 血压 80/50 毫米汞柱。经静脉注射四逆注射液 2 毫升, 2 分钟后上升至 90/60 毫米汞柱。20 分钟后血压上升至 100/60 毫米汞柱。6 小时后血压仍维持在 90/50 毫米汞柱, 并持续 2~3 小时。在升压同时心跳强有力。《上海中医药杂志》(1960; 1: 14): 抢救麻疹严重病例 136 例, 均属重、逆、险、凶、危、弱之证, 西医属于感染性休克, 用本方治疗后, 仅死亡 7 例, 大大提高了治愈率。⑤胃下垂 《云南医学杂志》(1964; 3: 44): 用本方加减, 治疗胃下垂 7 例, 服药日数从 14~43 日不等, 患者腹痛、腹胀、嗝气等主要症状均显著减轻或消失, 腹部压痛及 X 线所见之胃张力和胃大弯位置亦有部分改善。加减法: 腹痛, 加肉桂、樟木子、吴茱萸; 腹胀, 加枳实、木香、厚朴; 嗝气, 加山楂、麦芽; 恶心, 加砂仁, 法半夏。⑥高血压 《广西中医药》(1980; 1: 30): 刘某, 女, 55 岁, 高血压病十余年, 服滋潜清降药反剧。精神萎靡, 步态蹒跚, 面赤颧红, 彻夜难寐, 口干不渴, 身着棉衣, 四肢逆冷, 大汗淋漓, 舌质淡, 苔薄白, 脉沉细欲绝。血压 20.0/14.7kPa。证属阴盛格阳。拟四逆汤加味: 熟附子 9 克, 干姜 6 克, 炙甘草 6 克, 党参 12 克, 龙骨 12 克。一剂后手足转温, 仍心烦难寐。上方加黄连 3 克, 服 3 剂, 诸症悉除, 渐能入睡, 血压 18.7/12.0kPa。⑦便秘 《上海中医药杂志》(1964; 6: 41): 郝某, 男, 35 岁。患便秘 10 月多, 初因头目眩晕, 曾多次服用黄连、川军等泻火药, 眩晕未愈, 渐至食少便难, 形衰体羸, 每隔十数日大便一次, 燥矢停滞, 便时十分困难, 便后气促神疲, 辗转疼痛, 半日始安。又经多种通便治疗, 愈通愈涩。用

四逆汤三剂,感觉大便稍松,服至10剂,食多神健,眩晕亦愈。后以金匱肾气丸善后。

【现代研究】①升压、强心、抗休克作用 《中成药研究》(1983; 2: 26):以麻醉家兔的低血压状态为模型,观察四逆汤及其各单味成分所具有的效应。结果:单味附子虽有一定的强心升压效应,但其作用不如四逆汤,且可致异位性心律失常;单味甘草不能增加心脏收缩幅度,但有升压效应;单味干姜未能显示任何有意义的生理效应。由三药合方的四逆汤,其强心升压效果优于各单位药物组,且能减慢窦性心率,避免单味附子所产生的异位心律失常,提示该复方组方的合理性,也体现了中医“附子无干姜不热,得甘草则性缓”之说的科学性。《新医药学杂志》(1974; 3: 21):经观察,四逆汤注射液肌肉或静脉注射有以下作用:1. 改善休克状态。当心源性休克收缩压在80~60毫米汞柱时,经注射后1~20分钟,血压即上升至90~110/60~90毫米汞柱,其特点是作用温和,当血压恢复正常后就不再上升;严重休克血压降至零,可先用西药升压,继以四逆汤维持之。2. 改善微循环。对四肢厥冷,唇部及皮肤灰白或青紫的患者,药后先是四肢转暖,预示可能系内脏血流灌注在质量上和动力学上得到改善。心率一般不减少,但力量加强,心音有力,脉搏有力。3. 预防休克发生。四逆汤注射液实践证明有此作用,强心效应明显。总之,认为四逆汤注射液的作用不是单纯的升压问题,还能改善微循环,具有强心和镇静作用。《中成药研究》(1985; 9: 24):本方对动物失血性休克、纯缺氧性休克、橄榄油引起的栓塞性休克,冠状动脉结扎所造成的心源性休克,皆有显著的对抗作用。并还有显著的强心作用,能增加冠脉流量,对缺氧所致的异常心电图有一定的改善作用。还能兴奋垂体-肾上腺皮质功能,又有中枢性镇痛、镇静作用,并且该方毒性不大。《中医杂志》(1982; 11: 73):用四逆汤煎剂进

行肠道灌注,对原发性小肠缺血损伤的肠系膜上动脉闭塞性休克和继发性小肠缺血损伤的晚期失血性休克的家兔有治疗作用。②毒性研究 《药学报》(1966; 5: 35):研究表明,甘草、干姜和熟附子同煮,降低了附子的毒性。单味熟附子的鼠腹腔注射的半数致死量为 3.56 ± 0.409 克/kg,口服为 17.42 ± 10.24 克/kg,而按传统比例组成四逆汤,其半数致死量的附子量分别为 5.821 ± 0.599 克/kg和 71.78 ± 6.84 克/kg,差异显著。单味附子中毒心电图的改变与乌头碱中毒相似,而同剂量的附子组成四逆汤时,心电图则无异常改变。又以离体蟾酥心脏进行研究,表明附子毒性效应在四逆汤中降低了30倍。③制菌作用 《中医杂志》(1962; 10: 18):实验证明,四逆汤不仅无制菌作用,反能促进菌簇的生长。但是,用本方加黄耆、党参等配合输血、输液等措施治疗属阳虚型的金黄色葡萄球菌败血症,却取得良好效果。为此,强调治病必先“辨证”。

22238 四逆汤

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【组成】山茱萸 细辛 干姜(炙)各一两 甘草三两(炙) 麦门冬一升(去心)

【用法】上切。以水七升,煮取二升,分为四服。

【主治】卒中风不能言,厥逆无脉,手足拘急。

【禁忌】忌海藻、菘菜、生葱、韭菜。

22239 四逆汤

《千金》卷二十。为《伤寒论》“当归四逆加吴茱萸生姜汤”之异名。见该条。

22240 四逆汤

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】干姜(炮裂,锉) 附子(炮裂,去皮脐) 桂心 甘草(炙微赤,锉) 白术 当归(锉,微炒)各半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,稍热频服之,不拘时候。

【主治】阴毒伤寒，脉候沉细，四肢逆冷，烦躁头痛。

22241 四逆汤

【方源】《普济方》卷一四一引《十便良方》。

【组成】干姜三分（炮裂，锉） 附子（炮裂，去皮脐） 桂心各一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓热服，不拘时候。良久吃热粥，以助药力，汗出为度。

【主治】两感伤寒，阴阳二毒交并，身体手足厥逆，心中热闷，强语，三部脉微细。

22242 四逆散

【方源】《伤寒论》。

【组成】甘草（炙） 枳实（破，水渍，炙干） 柴胡 芍药各十分

【用法】上为末。每服方寸匕，白饮和服，一日三次。

【功用】透解郁热，疏肝理脾。

①《注解伤寒论》：散传阴之热。②《伤寒大白》：疏通肝胆血脉，调和胃家中气，清热。③《伤寒贯珠集》：辅正逐邪，和解表里。④《谦斋医学讲稿》：疏肝理脾，调气去滞。

【主治】少阴病，寒邪变热传里，腹中痛，小便不利，泄利下重，四肢厥逆；及肝脾不和，胸腹疼痛，泄利下重等。现常用于急慢性肝炎、急性慢性胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫症、慢性胃炎、胃溃疡、胃肠神经官能症、胰腺炎、阑尾炎、肋间神经痛及妇女月经不调、痛经、盆腔炎等属于肝郁气滞，肝脾失调者。

①《伤寒论》：少阴病，四逆，其人或咳、或悸、或小便不利、或腹中痛、或泄利下重。②《玉机微义》：寒邪变热传里，小便不利，腹中痛或泄利。③《明医指掌》：阳邪传里腹痛。阳厥轻者。④《景岳全书》：阳气亢极，四肢厥逆，在臂、胫之下。⑤《证治汇补》：热郁腹痛。⑥《类聚方广义》：痢疾累日，下利不止，胸胁苦满，心下痞塞，腹中结实而

痛，里急后重者。

【宜忌】①《景岳全书》：阴证厥逆上过于肘，下过于膝，乃不当用。②《福建中医药》（1983；4：15）：如属寒厥的四肢不温不宜用，肝阴虚或中气虚寒者亦不宜用。

【加减】悸者，加桂枝五分；腹中痛者，加附子一枚（炮令坼）；泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升，煮取三升，去滓，以散三方寸匕，纳汤中，煮取一升半，分温再服。

【方论选录】①《注解伤寒论》：四逆散以散传阴之热也。《内经》曰：热淫于内，佐以甘苦，以酸收之，以苦发之。枳实、甘草之甘苦，以泄里热；芍药之酸，以收阴气；柴胡之苦，以发表热。②《金镜内台方义》：四逆为传经之邪，自阳热已退，邪气不散，将若传阴而未入也。此只属阳，故与凉剂以治之。用甘草为君，以和其中，而行其四末；以枳实为臣，而行结滞；以芍药为佐，而行荣气；以柴胡为使，而通散表里之邪也。③《医学入门》：以邪渐入深，则手足渐冷，是以枳实之苦，佐甘草以泻里热；芍药之酸，以收阴气；柴胡之苦，以发表热。经曰：热淫之内，以酸收之，以苦发之是也。如咳者，肺寒气逆，下痢者，肺与大肠为表里，加五味子以收逆气，干姜以散肺寒；悸者，气虚而不能通行，心下筑筑然悸动，加桂枝以通阳气；小便不利，加茯苓以淡渗之；里虚腹痛，加附子以补虚；泄利后重，下焦气滞也，加薤白以泄气滞。④《医方考》：此阳邪传至少阴，里有结热，则阳气不能交接于四末，故四逆而不温。用枳实，所以破结气而除里热；用柴胡，所以升发真阳而回四逆；甘草和其不调之气；芍药收其失位之阴。⑤《张氏医通》：柴胡为来路之引经，亦藉以为去路之向导；用枳实者，扫除中道，以修整正气复回之路也。夫阴为阳扰，阳被阴埋，舍和别无良法，故又需芍药以和其营，甘草以和其胃，胃气和而真阳敷布，假证愈而厥逆自除。⑥《伤寒论三注》周扬俊：少阴至于四逆，热深

而厥亦深矣。热邪内入，欲其散，非苦寒如柴胡不足以升散也；欲其泄，非苦降如枳实不足以下泄也。且阳邪入则必至于劫阴，故欲其收，非酸寒如白芍不足以收之也；合甘草以和中。仍是二味祛邪，二味辅正，无偏多偏少于其间者，邪正各为治也。⑦《伤寒大白》：本是阳症，因热邪内传阴经而厥冷，故以柴胡、白芍药疏通肝胆，伸阳气外达，则肝主四末而四肢自暖。又以枳实、甘草疏通阳明里气，伸胃阳外布，则胃主手足而手足自温。⑧《成方便读》：以柴胡自阴而达阳，邪自表而里者，仍自里而出表，使无形之邪，以此解散。然邪既自表而里，未免有形之痰食留恋。其邪结不开，邪终不能尽彻。故以枳实破结除痰，与柴胡一表一里，各得其宜。而以芍药甘草，护阴和中，相需相济，自然邪散厥回耳。

【临证举例】①热厥 《医学入门》：祝某，始周身骨节疼，胸腹胀满，目闭肢厥，爪甲青紫，医以伤寒治之，七日昏沉弗效。此得之怒火与痰相搏，予四逆散加芩、连泻三焦火而愈。《伤寒论译释》：诊得六脉举之有似沉细，按之数大有力，察其面青肢冷，爪甲鲜红，此火极似水，真阳证也。暂拟四逆散一服，继以大剂寒凉为合法也。春柴胡三钱，赤芍一钱五分，麸炒枳实一钱，甘草一钱。《广东医学》(1965; 2: 25): 龚某某，女，83岁。发热5天，头昏痛，口干苦，渴饮，大便3天未行，小便色红而短，昏眩不能起床，四肢冰冷，体温38.3℃，苔白厚，脉弦有力。属热厥。年事虽高，仍须解郁泄热，使邪去正复，厥逆自回。方用四逆散加味：柴胡二钱，白芍二钱，枳实二钱，甘草二钱，甘菊花四钱，黄芩三钱。翌晨来诊，体温已正常(36.8℃)。②热厥腹痛 《广西中医药》(1984; 4: 33): 梁某，女，22岁。1965年6月20日初诊：腹痛急暴，喜按，面色青，手足欠温，怕冷，脘腹胀满，嗝气、矢气则痛减，肠鸣，便溏，小便清利，舌苔薄白，脉

沉细略弦。此为肝气不疏，气滞则血凝，气血不行，故面青、肢冷；气机不畅，则脘腹胀满，暴痛；因无食滞痞块，故喜按。治宜疏肝理气。处方：柴胡4.5克，白芍12克、枳实9克、炙甘草4.5克、木香(后下)3克、砂仁4.5克。连服二剂，腹痛消除。③慢性阑尾炎 《伤寒论临床研究》：果某某，女性，44岁，家庭妇女，1962年9月19日初诊。自二月前发现右下腹髂窝处作痛，每于过劳或紧张时疼痛发作，曾于某某医院诊为“慢性阑尾炎”。此次疼痛发作两天，呈交替性胀痛与牵引疼，已两天未能缓解，但无恶心呕吐。食欲睡眠二便均可，既往无其他病史。舌质正常，苔白，脉沉弦。心肺无异常。下腹回盲部明显压痛，但无抵抗紧张。证属肝气郁结，阳郁于里，不能宣达，拟舒肝和胃为治，用四逆散倍芍药。柴胡12克、枳壳6克、芍药18克、甘草6克。服下首剂之后，于右髂窝处有痛热感，翌日疼痛减轻大半，服药二剂疼痛消失，劳动亦未再发，惟偶而稍有似痛非痛之感，服药三剂后，疼痛消失未发，脉象弦消失转弱，嘱将前方隔日服一剂，服用七剂，以巩固疗效。至10月4日复查，诸自觉症状消失未复发，脉沉而缓和，遂将前方七剂共为细末，早、晚各服10克，为善后处理。④胆道蛔虫症 《福建中医药》(1962; 2: 37): 用本方加乌梅、川楝治疗胆道蛔虫51例，全部治愈出院。作者指出，本方用于木郁土壅之四肢厥逆，咳、悸、小便不利，腹中痛，泄利下重的少阴证，取柴胡升阳达表，疏肝利胆，冀其奥狄氏括约肌松弛；得芍药之酸甘能柔肝缓急而止痛；更配梅、楝之酸苦驱退蛔虫；又助枳实宽中下气，使蛔虫从大便排出。⑤咳嗽 《福建医药杂志》(1979; 2: 57): 王某某，女，25岁，工人，于1978年8月20日就诊。患者咳嗽一个月未愈，呈阵咳无痰，伴心烦少寐，时有欲呕、吐酸水，纳食正常，小溲赤，舌质红，苔薄黄，脉左弦。此乃肝失疏达，郁而化火，上逆于肺

(木火刑金),肺失肃清,胃失和降所致。宜疏肝解郁,佐以清肺止咳。毛柴胡5克、白芍9克、绿枳壳5克、郁金9克、枯黄芩9克、胆南星5克、粉甘草5克。上方服一剂诸症锐减,续服二剂痊愈。⑥慢性胆囊炎 《山东中医杂志》(1985;4:19):栾某,女,50岁。反复发作性右肋下疼痛1年余,某医院诊断为“慢性胆囊炎”。两天前因恼怒而引发,右肋胀痛,寒热往来,暖气泛恶,咽干口苦,痛处拒按,舌质红,苔薄黄,脉弦数。证属肝胃不和。治宜疏肝理气,和胃止痛。处方:柴胡9克,白芍9克,枳实6克,黄芩6克,半夏9克,生甘草6克。三剂后肋痛减轻,寒热消失。原方去黄芩继服三剂,疼痛缓解,饮食正常。⑦肠神经官能症 《新医药学杂志》(1975;7:43):王某,女,30岁。大便溏泻已数年,腹胀肠鸣,里急后重,常因心情不畅而加重,多次大便培养阴性,无痢疾史。医诊为肠神经官能症。慢性病容,舌偏红,苔微黄,脉弦滑,为热阻气滞证,方用四逆散加薤白。柴胡6克、白芍6克、枳实4.5克、薤白3克、甘草3克,两剂好转,共服八剂愈。《河南中医》(1983;1:83):周某某,男,35岁,农民。右上腹疼痛,反复发作年余,发时发热畏冷,恶心欲吐,痛势牵及胸胁,医院诊为胆囊炎、胆结石。刻下右上腹胀痛不舒,食后更甚,便结尿黄,巩膜无黄染,脉弦数,舌苔薄白,边稍黄。肝木不条,郁而化火。治宜疏肝清热。柴胡9克,炒枳实6克、赤芍9克、甘草3克、川楝子6克、玄胡索6克、左金丸6克(吞)、蒲公英12克。十剂后胀痛已解,续用原方加减,服至三十余剂。迄今八个月,未见复发。⑧慢性肝炎 《福建中医药》(1983;4:14):王某某,男,25岁。1975年5月10日诊。患者于1970年在建瓯县插队时,传染得肝炎,回榕治疗。经某某医院检查,诊为慢性肝炎,服药两个多月,肝区仍不时作痛,转氨酶仍未降低,食纳不佳,舌苔薄白,脉象弦细。法用疏肝理脾为主,以

四逆散加味治之。毛柴胡6克,白芍药9克,绿枳壳6克,生甘草3克,麦谷芽各20克,板蓝根9克,鸡内金6克,川楝子9克,广郁金6克。水煎服。并以玉米须、糯稻根各15克,水煎,代茶饮。上方连服十余剂后,肝区痛除,转氨酶恢复正常,食量渐增。⑨胃溃疡 《和汉医药学会志》(日文)(1986;3:344):用四逆散提取剂治疗胃溃疡28例。8周后显效9例(32%);有效11例(39%)。有效率为71%。其中17例活动期胃溃疡呈瘢痕化,疼痛的改善度为93%,100%自觉症状减轻。此外发现,转氨酶呈有意义的降低,嗜酸性白细胞增加。⑩乳痈 《广西中医药》(1978;4:34):本方加味(柴胡9克,枳实9克,青皮9克,白芍9克,炙甘草6克)治疗乳痈15例,全部获愈。其中一天治愈者4例,两天治愈者10例,三天治愈者1例。⑪阳萎 《湖北中医杂志》(1986;3:21):本方加味治疗阳萎25例。年龄最小者25岁,最大者47岁;病程3个月至2年。结果:痊愈18例,显效4例,无效3例。处方:柴胡9~12克,枳实6~9克,白芍15~30克,炙甘草9~12克,蜈蚣3条。加减:两肋胀痛加川楝子12克;口苦咽干加栀子9克,丹皮12克;失眠多梦加炒枣仁12克,熟地黄15克,远志9克,夜交藤12克;四肢厥冷,少腹冷痛,腰膝酸软加枸杞20克,益智仁30克,紫河车粉10克(冲服),巴戟天12克;胸闷烦躁易怒加瓜蒌15克,生枣仁30克;头晕胀痛加白菊花、天麻各9克。

【现代研究】①对心脏功能的影响 《仲景学说研究与临床》(1985;1:35):本方对麻醉猫有显著的升压作用,对心脏泵功能的影响,主要是通过增加心室舒张时心肌纤维收缩成份延长的最大速度和增加后负荷来实现的,与去甲肾上腺素作用类似,但强度较弱,作用持续时间较长。《仲景学说研究与临床》(1985;1:40):四逆散水醇沉液的抗心律失常作用及其对心电图的影响:小鼠静注

1.5 克/千克, 可明显延长 P—R 间期; 2.0 克/千克使心率减慢, 并能对抗乌头碱诱发的大鼠心律失常; 4.0 克/千克引起 I°房室传导阻滞; 4.5 克/千克可致 T 波高耸显著 ($P < 0.05$)。腹腔注射四逆散水醇沉液 15 克/千克, 也能降低氯仿诱发的小鼠室颤率。②对免疫功能的影响 《仲景学说研究与临床》(1985; 1: 52): 本方水醇沉液对小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬机能较有明显的促进作用。认为其所以能治疗阑尾脓肿和急性胆囊炎, 可能与其增加机体防御机能有关。③解痉作用 《仲景学说研究与临床》(1985; 1: 52): 本方水醇沉液对离体兔肠呈抑制作用, 临床用于治疗急腹症及消化道疾病, 可能与其解痉作用有关。此外, 还有对抗乙酰胆碱及氯化钡所致的肠痉挛作用。④毒性试验 《辽宁中医杂志》(1986; 7: 41): 静脉连续注射四逆散水醇沉液, 研究对实验动物心脏的毒性作用。在低浓度时抗休克、升压和抗心律失常作用均显著, 对心、肝、肾、脾、肺皆无毒性作用。但随浓度的升高 (7.0 克/千克), 家兔不仅出现房室传导阻滞, 同时心率减慢, S—T 段下移。认为对伴有传导阻滞的休克病人应慎用, 并密切观察心电图的改变。

22243 四逆散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】甘草 (炙微赤, 锉) 附子 (炮裂, 去皮脐) 桂心各一两 干姜半两 (炮制, 锉)

【用法】上为粗散。每服四钱, 水一中盏, 加大枣三枚, 煎至六分, 去滓, 稍热频服, 不拘时候。

【主治】伤寒, 霍乱吐利, 发热恶寒, 四肢拘急, 手足厥冷。

22244 四逆散

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】太阴玄精石三分 (末) 硫黄一两不灰木 盆消各一分 (一方去不灰木加附子)

【用法】上为细末, 入在铤子内, 以盏子盖, 周回用湿纸闭缝, 安火上, 纸干为度, 取出细研, 入龙脑半钱, 干姜末半两, 拌匀。每服半钱匕, 冷艾汤调下。肌体暖是验。

【主治】阴毒伤寒, 手足厥, 身冷, 脉细。

22245 四神丸

【方源】《外台》卷六引《必效方》。

【异名】备急四神丸 (《圣济总录》卷五十七)。

【组成】干姜一两 桂心一两 附子一两 (炮) 巴豆六十枚 (制)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如小豆大。饮服二丸。取快下; 不下, 又服一丸。

【主治】①《外台》引《必效》: 霍乱, 冷实不除, 及痰饮百病。②《圣济总录》: 腹满, 胁肋痛不可忍。

【宜忌】忌生葱、野猪肉、芦笋。

22246 四神丸

【方源】《赤水玄珠》卷八引东坡方。

【组成】肉豆蔻 (生) 二两 破故纸 (炒) 四两 木香半两 茴香 (炒) 一两

【用法】上为细末, 生姜煮枣肉为丸, 如梧桐子大。盐汤送下。

【主治】①《赤水玄珠》引东坡方: 肾泄, 下元虚。②《永类铃方》引《澹寮》: 肾泄、脾泄。

22247 四神丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】当归 (切, 焙) 半两 乌梅七枚 (去核) 黄连 (去须, 微炒) 一两 龙骨半两

【用法】上为细末, 以薤白细研为丸, 如梧桐子大。每日十五丸至二十丸, 空心以温浆水送下。

【主治】多年休息痢疾。

22248 四神丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】附子 (炮, 去皮脐) 一两 肉豆蔻 (面裹煨香) 三分 诃子 (煨, 去核) 半两 干

姜(炮)半两

【用法】上为细末，蒸枣肉搜和为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前陈米饮送下。

【主治】脾胃受湿，肠虚下痢，频并不止。

22249 四神丸

【方源】《直指》卷十八。

【组成】吴茱萸(拣净)一两(一半用老酒浸一宿，一半用米醋浸一宿，各焙干) 大香附(杵净)一两 革澄茄 青木香各半两

【用法】上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前盐汤送下；或乳香、葱白煎汤送下。

【主治】肾冷，疝气胀痛。

22250 四神丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【异名】四圣丸(《普济方》卷三十八)。

【组成】香白芷 枳壳(烧存性) 川百药煎(烧) 乌梅(并烧存性)各等分

【用法】上为末，糊为丸。每服五十丸，空心米饮送下；熟水亦得。

【主治】一切大便下血。

22251 四神丸

【方源】《医方类聚》卷一四二引《澹寮方》。

【组成】破故纸 肉豆蔻 神曲 麦蘖

【用法】上为末，生姜煮枣肉为丸服。

【主治】脾肾虚，食不化，频次登溲。

22252 四神丸

【方源】《普济方》卷三十九引《如宜方》。

【组成】破故纸(炒)四两 肉豆蔻(制)二两 木香一两 附子(炮)一两半

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下。

【主治】老人脾肾久虚，夜作气泄无度。

22253 四神丸

【方源】《普济方》卷二二一引《瑞竹堂方》。

【组成】枸杞子一斤(甘州者，择去枝梗青者，分作四份，先用好酒一盏润过，不然，空炒过药性也。四两用川椒一两炒，去椒；四

两用青盐一两炒，去盐；四两用小茴香一两炒，去茴香；四两用芝麻一合炒，去芝麻止用杞子)

【用法】上炒过，加地黄、白术、白茯苓各一两，同杞子为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心温酒送下。

【功用】补虚益损。

【主治】肾经虚损，眼目昏花，及两眼云膜遮睛。

22254 四神丸

【方源】《得效》卷十三。

【异名】四神丹(《医学入门》卷七)。

【组成】大天麻 天南星(各汤洗净) 防风(去芦)各一两 薄荷叶半两

【用法】上为末，酒煮薄荷面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，荆芥、生姜煎汤送下。

【主治】手足顽麻，痰涎壅盛，头目昏眩，肩背拘急。

22255 四神丸

【方源】《普济方》卷二九一。

【组成】荆芥 白僵蚕(炒) 生甘草 黑牵牛各一两

【用法】上为细末，好醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，临卧、食后滑石汤送下。

【主治】瘰癧，无论浅深已破未破。

22256 四神丸

《医统》卷七十三引《医林集要》。为《奇效良方》卷三十五“肉苁蓉丸”之异名。见该条。

22257 四神丸

【方源】《内科摘要》卷下。

【异名】久泻丸(《全国中药成药处方集》(昆明方))、故纸四神丸(《全国中药成药处方集》(吉林，哈尔滨))。

【组成】肉豆蔻 补骨脂 五味子 吴茱萸

【用法】上为末，用水一碗，煮生姜四两，红枣五十枚，水干，取枣肉为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、食前服。

【功用】温肾暖脾，涩肠止泻。

①《医方集解》：大补下焦元阳。②《古今名医方论》引程郊倩：暖肾温中。③《古方选注》：通癸水，保戊土，散虚寒，固真阴。

【主治】命门火衰，脾肾虚寒，纳差便溏，五更泄泻，肚腹作痛。

①《内科摘要》：脾胃虚弱，大便不实，饮食不思。②《准绳·幼科》：脾虚胃弱，大便不实，饮食不思，或泄痢腹痛。③《准绳·疡医》：小腹作痛或产后泄泻，肚腹作痛。④《济阴纲目》：五更作泄。⑤《金鉴》：脾胃双虚，子后作泻，不思食，不化食；泄泻日久，肠滑不禁。⑥《胎产心法》：肾虚肝气逆，不能消克，腹胀泄泻。⑦《叶氏女科》：妊娠五更泄泻属脾肾虚弱者。

【方论选录】①《古今名医方论》引程郊倩：命门无火，不能为中宫腐熟水谷，脏寒在肾，谁复司其闭藏？故木气才萌，不疏泄而亦疏泄，虽是木邪行土，实肾之脾胃虚也。此际补脾不如补肾。补骨脂有温中暖下之能，五味子有酸收固涩之性，吴茱萸散邪补土，肉豆蔻涩精益脾。暖肾而使气蒸，破滞而使气壮，补肾乃是补脾矣。②《古方名医方论》引柯琴：夫鸡鸣至平旦，天之阴，阴中之阳也。因阳气当至而不至，虚邪得以留而不去，故作泻于黎明，其由有四：一为脾虚不能制水，一为肾虚不能行水，故二神丸君补骨脂之辛燥者，入肾以制水；佐肉豆蔻之辛温者，入脾以暖土；丸以枣肉，又辛甘发散为阳也。一为命门火衰不能生土，一为少阳气虚无以发陈，故五味子散君五味子之酸温以收坎宫耗散之火，少火生气以培土也；佐吴茱萸之辛温，以顺肝木欲散之势，为水气开滋生之路，以奉春生也。此四者病因虽异而见证则同，皆水亢为害。二神丸是承制之剂，五味散是化生之剂也。二方理不同而用则同，故可互用以助效，亦可合用以建功。合为四神丸，是制生之剂也，制生则化，久泻自瘳矣。称曰四神丸，比理中、八味二丸较速欤！③《医

方集解》：此足少阴药也，破故纸辛苦大温，能补相火以通君火，火旺乃能生土，故以为君；肉蔻辛温能行气消食，暖胃固肠；五味咸能补肾，酸能涩精；吴茱萸辛热除湿燥脾，能入少阴、厥阴气分而补火；生姜暖胃，大枣补土。所以防水，盖久泻皆由肾命火衰，不能专责脾胃，故大补下焦元阳，使火旺土强，则能制水而不复妄行矣。④《古方选注》：四神者，四种之药，治肾泄有神功也。补骨脂通癸水之真阳，肉豆蔻保戊土之真气，俾戊癸化火以运谷气；吴茱萸远肝邪而散虚寒；五味子摄肾气而固真阴；姜、枣和营卫，辛酸相辅，助阳强阴，则肾关自健固矣。

【临证举例】①五更泻 《南雅堂医案》：脾肾虚寒，饮食不思，五更必作泻，法宜温补肾元，用四神丸加减治之。吴茱萸一两（盐汤浸炒），五味子二两（炒），破故纸四两（酒浸炒），白茯苓三两，人参一两五钱，炒白术三两，罂粟壳一两，干姜八钱，生姜八两，红枣百枚，先将姜、枣煮熟，去姜，取枣肉和药捣丸，如梧桐子，临卧用米汤或姜汤送下四钱。②过敏性结肠炎 《上海中医杂志》：（1965；10：13）：患者9年多经常腹泻，大便溏薄不成形，每日泻3~5次，无脓血便及里急后重症，曾经中西药治疗未效。实验检查：大便有脓球少许。X线钡剂灌肠透视和摄片所见：结肠充盈良好，但结肠外形较细，结肠袋较浅，尤以乙状结肠、降结肠和横结肠为明显。诊为过敏性结肠炎。入院后先用参苓白术散治疗，虽有一定效果，但不巩固；后考虑到久病入肾，可能为肾泻，故改用四神丸，每天三次，每次6克。药后泄泻即渐减少，服药20天后，大便已成形，每天1~2次；又续服10天，大便正常，腹痛已止。停药观察一个月，疗效巩固。③积痕 《南雅堂医案》：阳气式微，清晨泄泻，病在肾经，小腹积痕有年，亦是阴邪瘤冷之疾，宜温补下焦元阳为本原之治法。破故纸四两（酒浸炒），五味子三两（炒），肉豆蔻二两

(面裹煨), 生姜八两(切片), 吴茱萸一两(盐汤泡), 大枣百枚, 先以姜、枣同煎候烂, 去姜, 取枣肉和诸药捣丸, 每服二钱, 临卧盐汤送下。④遗尿 《中医杂志》(1984; 5: 80): 患者赵某某, 男, 16岁, 学生, 自幼遗尿, 每夜至少2次, 常因天寒、劳累加重, 经多方医治效果不佳。查其舌淡, 苔薄白, 六脉沉迟, 此乃肾阳不足, 膀胱气化不利, 以四神丸加味施治。补骨脂9克, 吴茱萸6克, 五味子9克, 肉豆蔻7克, 益智仁9克, 肉桂2克, 石菖蒲6克, 乌药9克, 猪脬一个。将以上中药装入猪脬内, 并将其口扎好, 用粗针头将猪脬刺数孔, 放入盆内, 加水1.5公斤, 煮沸后1小时左右, 去渣及汤液, 取猪脬切片食之。1次食完, 两剂告愈, 随访半年未发。

【现代研究】对小肠运动的影响 《中成药研究》(1981; 9: 31): 四神丸及其组成二神丸、五味子散和单味药物五味子、吴茱萸, 对家兔离体小肠的自发活动有明显抑制作用, 并能对抗乙酰胆碱引起的痉挛; 亦能对抗氯化钡引起的肠痉挛。四神丸与肾上腺素抑制肠管作用的比较表明, 本方的抑制作用并非通过OC—受体而起作用。

【备考】《小儿痘疹方论》薛己附方四神丸用肉豆蔻二两, 补骨脂四两, 五味子二两, 吴茱萸(浸, 炒)一两, 生姜八两, 红枣五十枚。

22258 四神丸

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】香附米八两(酒、醋、童便各浸二两, 浸三日, 炒) 砂仁二两(炒) 苍术二两(米泔水浸, 牡蛎粉炒) 椿根白皮二两(蜜水炒)

【用法】上为末, 黄米煮饭为丸, 如梧桐子大。每服五六十丸, 空心黄酒送下。

【主治】白带。

【方论选录】《医略六书》: 湿袭冲任, 经气滯涩, 故带脉不能收引, 带下淫溢焉。苍术

燥湿强肝, 香附调气解郁, 砂仁醒脾化气, 椿皮涩脱以固带下也。饭以丸之, 酒以下之。务使肝胃调和, 则湿化气行, 而冲任完复, 带脉收引, 何带下淫溢不已哉!

22259 四神丸

【方源】《古方选注》卷中。

【组成】甘枸杞子(拣红润者, 煮酒一杯, 清水一杯和匀, 以杞子浸三时, 漉出, 晒干, 分成四份。以二两用川椒三钱拌, 焙燥, 拣去川椒; 以二两用小茴香三钱拌, 焙燥, 拣去茴香; 以二两同黑芝麻四钱拌, 焙燥, 不拣去芝麻; 以二两同方解青盐研末四钱, 同焙燥, 不拣去青盐。焙法: 以绳挂铜盆, 悬火三四寸, 不住手将铜盆浴转, 焙至燥, 要枸杞子仍是大红, 焙焦则不灵。各研细) 黄甘菊(去蒂, 晒)一两五钱 当归头(酒拌, 晒)九钱 熟地(白水制)一两五钱 茯苓九钱 女贞子(淘漂蒸至极黑, 酒浸六时, 布袋擦去皮)九钱

【用法】上为末, 炼蜜为丸。每服三钱, 开水送下。

【主治】目昏云翳。

【加减】目有赤脉者, 加白蒺藜。

【方论选录】四神丸, 奇方也。本草言: 枸杞子味甘气平, 退虚热, 补精髓, 治目昏云翳。按孙思邈、王焘、西河女子所载服食之法, 惟服枸杞子经岁不辍, 能延年耐老, 岂非奇用而有此神效乎? 今名之曰四神者, 借椒、茴之香以和阳, 芝、盐之润以和阴, 得乎四者, 制法之神耳。服之精髓生则火自退, 阴液充则目自明, 若服两经之药, 分杀其势, 则力有所不专, 推原记者之心, 惟恐泄真方之秘, 故为溷乱以炫人耳! 然独用一味, 后贤必以此为不全之方, 余因删去背谬之药, 复以相须相使之品, 减其钱数, 俾枸杞得行专政, 以建奇功, 惟后贤临用, 斟酌去就可也。

22260 四神丸

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】橘红二两 玄胡索(醋制) 当归

(酒炒)各一两 川郁金五钱

【用法】上为末，酒糊为丸。每服一百丸，艾醋汤送下。

【主治】室女经闭劳嗽。室女思虑过多，劳损而月经先闭，此由心病不能养脾，故不嗜食；脾虚则金亏，故咳嗽发热。

22261 四神丸

《玉钥》卷上。为原书同卷“镇惊丸”之异名。见该条。

22262 四神丸

【方源】《齐氏医案》卷四。

【组成】甘枸五斤（去蒂，分四制：一分黑芝麻五两同炒，去芝麻；一分小茴香五两同炒，去小茴香；一分川椒五两去子同炒，去川椒；一分独炒）茯苓 白菊各二十两 熟地一斤（极干） 嫩血茸八两

【用法】上为末，炼蜜为丸服。

【功用】大补虚损，明目广嗣。

22263 四神丸

《医方简义》。为《苏沈良方》卷二“四神丹”之异名。见该条。

22264 四神丹

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】礞砂二两 阳起石二两 白矾五两 太阴玄精六两

【用法】上为末，入瓷瓶子内，以纸筋盐泥固济，候干，先以小火逼令热彻，后以火一称烧之，待火耗，即取罐子，候冷取药，于地上铺好黄土，用纸衬盆，合一宿，出火毒了，研如粉，以水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心盐汤送下，酒送下亦得；妇人醋汤送下。

【主治】下元风湿，久患腰痛。

22265 四神丹

【方源】《苏沈良方》卷二。

【异名】草还丹（原书同卷）、四神丸（《医方简义》）。

【组成】熟干地黄 元参 当归 羌活各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

空心酒送下，丸数随宜。

【功用】补虚益血。

【主治】①《苏沈良方》：风气。②《丹溪心法》：大风。

22266 四神丹

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】丹砂 雄黄 雌黄 硫黄各一钱

【用法】上为细末，入银锅子内歇口，炭火熔化，滴入水中，令成丸子，如绿豆大。每服二丸，空心温酒送下。

【功用】大补益，济水火。

【主治】①《圣济总录》：诸虚。②《扁鹊心书》：虚证，怔忡，惊悸，诸般大病。

22267 四神丹

《普济方》卷二二三引《卫生家宝》。为原书同卷“何仙姑庆世丹”之异名。见该条。

22268 四神丹

【方源】《局方》卷五（吴直阁增诸家名方）。

【组成】雄黄 雌黄 硫黄 朱砂各五两

【用法】上为细末，入瓷盒内，将马鞭草为末，盐泥固济，慢火四围烧煨，一日一夜取出，再研细末，以糯米粽研为糊，丸如豆大。每服一粒，绝早空心新汲水吞下。

【功用】活血实髓，安魂定魄，悦泽颜色，轻身保寿。治百病，补五脏，远疫病，却岚瘴，除尸疰蛊毒，辟鬼魅邪气。

【主治】男子妇人真元虚损，精髓耗伤，形羸气乏，中满下虚，致水火不交，及阴阳失序，精神困倦，面色枯槁，亡血盗汗，遗溺失精，大便自利，小便滑数，梦寐惊恐，阳事不举，腰腿沉重，筋脉拘挛；及一切沉寒痼冷，痲痹痼痼，脐腹绞痛，久泻久痢，伤寒阴证，脉候沉微，身凉自汗，四肢厥冷；妇人百病，胎脏久冷，绝孕无子，赤白带下，月候不调，服诸药久不瘥。

【宜忌】妊妇不可服。忌羊血、葵菜。

22269 四神丹

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】净黄连一两三钱 黄柏(去粗皮)七钱 白姜 当归(酒洗,焙干)各七钱半

【用法】上锉,或晒,或焙,为末,用乌犀丸内制饭糊为丸,如麻子大;儿小者,圆粟米大。每服三十九至五十九,空心乌梅煎汤送下。

【主治】水泻,赤白痢。

22270 四神丹

《医学入门》卷七。为《得效》卷十三“四神丸”之异名。见该条。

22271 四神丹

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】苦花子(又名毛连子,又名小叶金鸡舌,梗叶俱用) 土木香(根名青木香,梗名天仙藤,花名马兜铃) 仙人薯(用根,新鲜生者为妙,干者次之) 各二两 晚蚕砂一两

【用法】上铡碎,搗,水和煮粽汁,冷服。次服劫痒消毒散。

【主治】因剥割瘴死牛、马、猪、羊、不避其气,以中其毒;或因食瘴死牛、马、猪、羊之肉者,或手足各处发疗毒,或起紫泡,或起堆核,初则创人,次渐肿大,疼痛不可忍,瞽闷发热,口渴心烦,四肢强痛,头目昏花,及一切瘴毒。

22272 四神汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】独活(去芦头)六两 石膏四两(碎) 枳实(去瓢,麸炒) 麻黄(去根节,先煮,掠去沫,焙)各三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏,酒半盏,同煎至一盏,去滓温服,一日三次。

【主治】风头眩运,倒仆不定。

22273 四神汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】麻黄(去根节,汤浸去沫)一两 杏仁(去皮尖双仁,麸炒)二十五枚 甘草(炙)半两 五味子一两

【用法】上咬咀,如麻豆大。每服五钱匕,水

二盏,煎至一盏,去滓温服。仰卧片时。

【主治】肺喘。

22274 四神汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】木香(湿纸裹煨) 人参 白茯苓(去黑皮) 附子(炮裂,去皮脐)各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盏,煎五七沸,去滓,空心、早、晚食前、夜卧各一服。服三日后,服麝香丸取药;或天色阴晦,不宜服之,俟晴明,即服取药;凡来日五更初,欲服取传尸劳药,于本夜一更至二更尽,各服天灵盖丸。

【主治】传尸劳瘵。

22275 四神汤

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【异名】四柱散(《局方》卷三绍兴续添方)、四柱饮(《张氏医通》卷十四)、补虚四柱饮(《医钞类编》卷七引戴氏方)。

【组成】附子(炮裂,去皮脐) 木香(炮)各一两 白茯苓(去黑皮) 人参各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盏,加生姜二片,大枣二枚,葱白二寸,同煎至七分,去滓,早、晚各一服。

【功用】调顺经络,生精补气,强力益志。

【主治】①《圣济总录》:一切冷气。②《局方》(绍兴续添方):脏气虚弱者及丈夫元脏气虚,真阳衰败,两耳常鸣,脐腹冷痛,头旋目晕,四肢怠倦,小便滑数,泄泻不止。

22276 四神汤

【方源】《传信适用方》卷四。

【组成】生姜一斤(切片,晒干) 草果半斤(去壳并白皮) 甘草四两(炒) 缩砂四两

【用法】上为末。入盐如常服。

【主治】《魏氏家藏方》:脾胃虚弱,不思饮食,吐逆满闷,胸膈不利,心腹刺痛。

22277 四神汤

【方源】《普济方》卷九十一引《卫生家

宝》。

【组成】附子一两(去皮尖,生用) 木香一两 五灵脂二钱半 真麝香一钱(别研,后入)

【用法】上锉。每服二大钱,水二盏,加生姜二十片,煎至七分,去滓,放温,斡开口灌。一服定省,未知再服,才开口略能言,即不须服,徐徐与粟粥。

【主治】卒中风,牙关紧急,不省人事。

22278 四神汤

《元戎》。为《苏沈良方》卷五引《灵苑方》“四神散”之异名。见该条。

22279 四神汤

《医方类聚》卷二二引《仙传济阴方》。为原书同卷“异香四神散”之异名。见该条。

22280 四神汤

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】紫苏三钱 核桃五个(打碎) 生姜三片 葱白三寸

【用法】水二钟,煎一钟,热服。出微汗即解。

【主治】风寒两感。

【加减】夏月,去葱不用。

22281 四神汤

《疡医大全》卷二十三。为《张氏医通》卷十五“归香饮”之异名。见该条。

22282 四神饮

【方源】《医统》卷三十七。

【组成】常山二钱 槟榔 柴胡 贝母各一钱

【用法】上咬咀。水二盏,煎加黑豆二七粒,临发前二时空腹服之。

【功用】截诸疟。

22283 四神散

【方源】《苏沈良方》卷五引《灵苑方》。

【异名】当归散(《医方类聚》卷二一八引《吴氏集验方》)、四神汤(《元戎》)、芎归散(《普济方》卷三十四)、当归汤(《普济方》卷三五一)、四顺散(《奇效良方》卷六十三)。

【组成】当归 芍药 川芎各一两 干姜半两(炮)

【用法】每服二钱,暖酒调下。

【主治】妇人血虚心腹痛,产后瘀血腹痛。

①《苏沈良方》:妇人血气心腹痛。②《局方》(续添诸局经验秘方):产后留血不消,积聚作块,急切疼痛,犹如遁尸,及心腹绞痛下利。③《元戎》:妇人血虚,心腹疼痛不可忍者。④《症因脉治》:血分有寒。⑤《医钞类编》:瘀血,血从委中出。⑥《不居集》:血出不止,及妇人产后血虚。

【方论选录】①《胎产心法》:予谓白芍治血虚腹痛则可,若治瘀血作痛未必然也。今炒透而与炮姜合用,故血虚瘀痛兼治之。②《医林纂要》:辛以补肝而主气分,盖当归补肝血之虚,川芎以行血中之气,芍药以敛津液而萃之,而干姜则亦能随三物以去血中所挟之寒耳。谓干姜能引血药入血分,则亦非也。此治血分之挟寒者,以挟寒故去生地而易用干姜,然虚寒亦可通治。四神之名,则未知所谓。

22284 四神散

【方源】《苏沈良方》卷八。

【异名】四等散(《鸡峰》卷十四)、胜金散(《医方类聚》卷一三九引《简易》)。

【组成】干姜 黄连 当归 黄柏(皆炒)各等分

【用法】上为末。每服二大钱,加乌梅一个煎汤调下。

【主治】痢疾。

【加减】水泻,各等分;赤痢,加黄柏;白痢,加姜;后重肠痛,加黄连;腹中痛,加当归,并空心食前服。

【宜忌】宜食酸苦,忌甘咸。

22285 四神散

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】干蝎 瓜蒂 赤小豆 雄黄(通明者)各半两

【用法】上为末。每服二钱，温水调下。以吐为度。

【主治】卒中风，痰壅盛，不记人事，并中恶等疾。

22286 四神散

【方源】《医方类聚》卷六十七引《神巧万全方》。

【组成】黄连 黄柏各半两 胆矾 朴消各一分

【用法】上以矾、消一处于铤内熬过令枯，却同连、柏同杵细，罗为末。每用一字，于净盏内汤投澄清洗。

【主治】一切热毒眼。

【加减】赤烂，加膩粉、麝香；障翳，加龙脑、硃砂各少许。

22287 四神散

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】附子一枚（炮裂，去皮脐） 干姜（炮）半两 桂（去粗皮）一分 甘草半两（半生半炙）

【用法】上为散，拌匀。以热酒一升投之，旋旋温服令尽，可均作一日服；如饮酒不得，用沸汤服之亦得。

【主治】漏风汗出不止。

22288 四神散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】地龙（去土，炒） 干虾蟆（烧灰存性）各一钱 藜芦半钱 龙脑（研）少许

【用法】上药除龙脑外为细散，再研匀。每用半字许，先满口含水，男左女右，嚥半字入鼻内。揉痛处，良久痛定。

【主治】偏头痛。

22289 四神散

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】款冬花（去梗） 贝母（去心） 白薇 百部各一两半

【用法】上为散。每服三钱匕，食后以蜜汤调下。

【主治】肺气不和，上气咳嗽。

22290 四神散

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】甜葶苈一两（汤浸，炒令紫色） 海藻一两（洗去咸味） 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干，微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去瓢，焙）

【用法】上为末。每服一钱匕，水一盞，加生姜半枣大（擘破），同煎至六分，和滓温服。

【功用】行风顺气。

【主治】酒毒发，四肢黄肿，积聚成块。

22291 四神散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】虾蟆一枚（炙） 黄连（去须，为末） 铅丹（炒）各半两 麝香半分

【用法】上为散。每服半钱匕，陈米饮调下。

【主治】小儿无辜疳泻。

22292 四神散

【方源】《妇人良方》卷四引《九篇卫生方》。

【组成】菊花 当归 旋覆花 荆芥穗各等分

【用法】上为细末。每服一钱，水一盞，加葱白三寸，茶末一钱，煎至七分，通口服。良久，去枕仰卧少时。

【主治】妇人血风，眩晕头痛。

22293 四神散

【方源】《百一》卷十。

【组成】雄黄 雌黄 硫黄 白矾（半透明者）各等分

【用法】上为末。每用时先浴，令遍身汗出，次以生姜蘸药擦患处，良久以热汤淋洗。当日色淡，五日除根。

【主治】紫、白癫风。

22294 四神散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】白芍药 良姜（煨） 甘草（炙）各一两 香附子一两半（炒）

【用法】上为末。每服二钱，酒调服，煎亦好。水泻，紫苏、生姜煎；赤白痢，米饮调下。

【主治】男子、妇人一切气痛不可忍者、及水泻，赤白痢。

22295 四神散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】胡椒四粒 血柏树根(嫩者)一两 甘草半两 细叶禾甌根一两

【用法】上吹咀。每服二钱，酒煎三沸，通口服。

【主治】妇人血崩。

【宜忌】大忌鸡、鸭子及一切毒物。

22296 四神散

【方源】《医方类聚》卷一七九引《施圆端效方》。

【组成】川大黄 寒水石各一两 牛蒡子 芒消各半两

【用法】上为细末，新水调涂肿上；咽喉肿塞，生蜜调，时时含化咽津。

【主治】丹毒及咽喉肿塞。

22297 四神散

《普济方》卷三十八。为方出《圣惠》卷三十七，名见《圣济总录》卷九十七“阿胶芍药汤”之异名。见该条。

22298 四神散

【方源】《医方类聚》卷一六九引《备预百要方》。

【组成】膩粉 硫黄 铅丹各一两 信砒一目

【用法】上为末，以银器略烧，稍歇，更细研。用绢裹之，纳井花水中，有顷出，拭疮上，经三日洗浴。拭之勿伤肌肤。

【主治】紫白痢。

22299 四神散

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】苍耳 草乌 针砂各四两 甘遂二两

【用法】上为末。每用五钱，葱白捣汁和成饼，约径一寸半，贴在患处手足心上，绢帛缠定，用麻黄、紫苏煎汤，将贴药手足浸汤内。待满身麻木，出汗为度，半月再一次。

【主治】麻木并癩。

22300 四神散

【方源】《医统》卷六十三。

【组成】雄黄 食盐(炒) 川椒各一钱 独子皂角子一枚(烧灰)

【用法】上为末。吹在大牙根上。

【主治】噤口风，牙关不开。

22301 四神散

【方源】《赤水玄珠》卷三十。

【组成】大黄 木鳖子 僵蚕 贝母各二钱半

【用法】用酒、水各一钟，煎至一钟，食前热服。若得汗、下为妙。

【主治】便毒初起，寒热，欲成痈疽。

22302 四神散

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】常山二钱五分(虚人量减) 白茯苓 槟榔各一钱五分 甘草一钱二分

【用法】上吹咀。隔夜先用好酒一小盏拌一宿，临发日早入水煎，五更时服。

【主治】痰疟三日一发者，及虚疟。

【加减】若痰嗽，加半夏一钱，生姜五片。

22303 四神散

【方源】《易氏医案》。

【组成】香附一钱 乌药一钱 苏梗五分 甘草三分 抚芎三分 白芷五分 当归二分 白术三分 神曲三分

【用法】水煎服。

【主治】气郁崩漏，昼夜十数次，用止血药，血愈甚，羸瘦食少，面青爪黑，气促痰喘，心脉平和，肝脉弦大，时一结，肺脉沉而大且有力，脾胃脉沉涩，两尺沉而无力者。

【方论选录】此方香附能行气，以之为君；乌药助香附行气，以之为臣；苏梗通十二经之关窍，白芷化腐血，生新血，用之为佐；当归引气入心，而生新血；抚芎引气入肝，舒肝之郁，而去旧纳新；神曲引气入脾，畅脾结而统心血；白术健脾胃而和中气，用之为使。以行气药为主，活血药辅之，此治血先调气之法也。

22304 四神散

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】铜绿 明矾 海螵蛸(煎过用)各一钱 硼砂二钱

【用法】灯龙果浆为丸,如芡实大。每用时水浸化,蒸熟,取清水洗拭。

【主治】难产转侧差迟,血气儿首,灌注入眼,生下不见瞳仁,外胞赤肿,上下弦烂。

22305 四神散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三两 血竭三两 没药三两 延胡一两半(酒炒)

【用法】上为散。每服三钱,童便煎,去滓温服。

【主治】产后血晕,脉濡涩滞者。

【方论选录】产后血亏,瘀滞上犯心包,故昏晕不醒,不知人事焉。当归养血以荣经,延胡活血以调经,没药散瘀降血,血竭去瘀生新。为散,童便煎,使瘀血去,而新血生,则心包清肃,神明有主,安有昏晕之患乎!

22306 四神散

【方源】《一盘珠》卷七。

【组成】当归 白术 白苓 白芍 泽泻 川芎各一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后浮肿。

22307 四神散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】明矾 雄黄各一钱 黄柏 轻粉各五分

【用法】上为末。入猪油捣匀敷。

【主治】坐板疮。

22308 四神煎

《普济方》卷三十三引《博济》。为原书同卷“七珍丸”之异名。见该条。

22309 四神煎

《仙拈集》卷一。为《伤寒论》“吴茱萸汤”之异名。见该条。

22310 四神煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】生黄耆半斤 远志肉 牛膝各三两 石斛四两

【用法】用水十碗,煎二碗,再入金银花一两,煎一碗,一气服之。服后觉两腿如火之热,即盖暖睡,汗如涌泉,待汗散后,徐徐去被。一服病去大半,再服除根,不分久暂。

【主治】鹤膝风。

22311 四神膏

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】姜汁 红糟 猪脂 食盐各等分

【用法】上研烂熟,炒,擦入腠折内,一时锥痛,少顷便皮软腠合,三二次用擦即安。

【主治】手足皲裂如蒸梨,虽春夏亦如此。

22312 四神膏

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】皂荚 芫荇 雄黄 青盐各等分

【用法】上为末,和匀蜜调。涂咬处,频易。

【主治】蜘蛛咬痛。

22313 四退散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】蝉退 蛇退(醋煮) 猪蹄退(炒) 蚕退 荆芥各二钱半 川乌(炮) 穿山甲(烧) 粉草各半两(又方加防风、石决明、草决明各五钱)

【用法】上为末。每服一钱,淡盐汤调下。

【主治】倒睫卷毛。

22314 四根散

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】桑木根节心 松木根节心 柏木根节心 杉木根节心(并细锉,炒黑)各一两 肉苁蓉(酒浸,切,焙)二两 乳香(研) 没药 五灵脂 石龙芮(炒)各一两 麝香(研)半两 天雄(炮裂,去皮脐)二两 木香 紫檀香(锉) 地龙(炒)各一两

【用法】上药除研者外,捣罗为散,再同研匀。每服二钱匕,浸木瓜酒调下,早晚食后近夜服。

【主治】干湿脚气。

22315 四真丸

【方源】《普济方》卷二一九。

【组成】当归（焙干称） 干地黄（焙干称）各二两 北五味子一两 人参一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮吞下。

【功用】内补脏腑，外充百脉，资血平气，调筋强力，进食养精。

22316 四倍丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】木香一两 硫黄二两（柳木椎研，频以甘草水洒） 附子三两（炮裂，去皮脐） 茴香子（微炒）四两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心盐汤或温酒送下。

【功用】补虚益气。

22317 四倍丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】蜀椒（去目并合口，炒出汗）一两 菟丝子（酒浸三宿，别捣）二两 草薢（洗，焙）四两 牛膝（酒浸二宿，切，焙）八两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十至五十丸，早、晚温酒、盐汤任下。

【功用】补益，壮腰脚。

22318 四倍丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】白术四两 橘皮三两 半夏二两 木香一两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食后临卧服。

【功用】下痰饮，和脾胃。

22319 四倍丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】人参（去芦头）一两 甘草二两（炙） 干姜四两（炮） 白术八两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心、食前温米饮送下。

【功用】壮脾胃，去寒湿，美进饮食。

【主治】泄泻，吐逆，心腹痛。

22320 四倍丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】杜仲四两（瓦器内炒黄色，去丝） 破故纸四两（瓦器内炒黄色） 甘草四两 胡桃仁四两（去皮油）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心用甘草末调汤送下。

【主治】腰膝疼痛。

22321 四倍汤

【方源】《普济方》卷三二一。

【组成】人参 牡蛎半两（盐泥煨） 赤石脂一两（醋浸七次） 菖蒲三两

【用法】上为细末。每服一钱，食前姜汤调下。

【主治】小便频数。

【备考】方中人参用量原缺。

22322 四倍散

【方源】《博济》卷二。

【组成】诃子一两（煨） 人参二两 白茯苓四两（去皮） 白术半斤

【用法】上为细末。每服二钱，水一盂，加生姜、大枣，同煎至六分，去滓，空心、食前温服。如早晨常服，有大功效。

【功用】补虚健脾。

①《博济》：大补虚损。②《局方》（绍兴续添方）：补虚进食。③《鸡峰》：大补脾肾。

【主治】①《博济》：脾元气不和。②《普济方》：胃气不和，干呕恶心。

22323 四效散

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】密陀僧二钱 麝香 片脑各半钱 铜绿一字

【用法】上为末。先用浆水洗拭，干敷。

【主治】鼠乳痔漏。

22324 四症丸

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】清瘟解毒丸面 藿香正气丸面各四两 檀香一两 冰片一钱

【用法】炼蜜为丸，朱砂为衣，重二钱，金

衣,蜡皮封固。

【主治】时感。

22325 四消丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】牙皂 香附 五灵脂 黑白丑各等分

【用法】为丸服。

【功用】《全国中药成药处方集》(北京方):消积理气,行水止痛。

【主治】气、血、痰、食积滞,胸腹胀闷疼痛,呕吐。

①《饲鹤亭集方》:一切气积、血积、食积、痰积致成胸腹满闷,呕吐疼痛。②《丸散膏丹集成》:饱闷胀满,呕吐,憎寒壮热。③《全国中药成药处方集》(北京方):气滞停水,胃脘作痛,胸腹胀满,便秘瘀阻,咽喉肿痛,风虫牙痛及风痢。

22326 四消丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】生黑丑四钱 生白丑四钱 五灵脂四钱 制香附四钱 沉香一钱

【用法】上为细末,用醋三钱和冷开水为丸,如绿豆大,约成丸一两三钱。每服一钱五分,开水吞服,小儿减半。

【功用】消水,消痰,消食,消气。

【主治】水、痰、食、气互阻,胸膈饱闷,腹大胀满,癥瘕积聚,呕吐作痛。

【宜忌】孕妇忌服。

22327 四消丸

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】生大黄二斤 黑白丑二斤 五灵脂二斤 香附二斤

【用法】上为细末,水泛为丸。每服二钱,白开水送下。十岁小儿每服一钱。

【功用】消酒,消气,消痰,消食。

【宜忌】孕妇忌用。

22328 四润煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】火麻仁一盞(研,浸取汁) 芝麻

半盞(研,水浸取汁) 桃仁(去皮尖) 荆芥穗(炒)各一两

【用法】入盐少许,同煎服。

【主治】老年大便闭涩不通。

22329 四调膏

《普济方》卷二八三。为原书同卷“追毒散”之异名。见该条。

22330 四扇散

《圣惠》卷九十四。为《医心方》卷二十六引《太清经》“黄帝四扇散”之异名。见该条。

22331 四通汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】桔梗(炒) 大黄(锉,炒)各半两 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 紫菀(去苗土)各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水八分,煎至四分,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】小儿痰壅结实。

22332 四黄丸

【方源】《永类铃方》卷二。

【组成】宣连 大黄 山梔仁 黄芩

【用法】略炒,为末,炼蜜为丸。噙化。

【主治】酒毒,肺热咳红。

22333 四黄丸

【方源】《婴童类萃》卷下。

【组成】黄连 黄芩 大黄(酒煨) 胡连 山梔 银柴胡各五钱 青黛 甘草 香附(醋炒)各三钱

【用法】上为末,猪胆汁为丸,如菜子大。每服一百丸,姜汤送下,一日三次。

【主治】肺热龟胸。

22334 四黄汤

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】人参一钱 黄耆八分 当归一钱 川芎六分 生地黄一钱 黄芩二钱 黄连二钱 槐花三分 枳壳一钱 升麻七分

【用法】水二钟,煎一钟,不拘时服。

【功用】补气调血,清理湿热。

【主治】气虚不能拘摄湿热,以致下流大肠而作热症。

22335 四黄散

【方源】《卫生总微》卷十七。

【组成】蒲黄 大黄 黄芩各十铢 黄连(去须) 十二铢 麦门冬十铢 甘草八铢 芒消七铢(后入)

【用法】上㕮咀。以水二升,煮取一升,去滓,内消令烊,看大小分服。大小便血即愈。

【主治】小儿落床坠地,瘀血在腹,阴阴寒热,不乳啼哭。

【宜忌】羸瘦者忌冷食。

22336 四黄散

【方源】《普济方》卷二七七引《卫生家宝》。

【组成】大黄 黄连 黄柏 黄芩 白及各等分

【用法】上为末,水调成膏。用鸡翎涂疮上。

【主治】汤泼火烧,热疮肿痛。

22337 四黄散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】净黄连 黄柏 黄芩 大黄 滑石各半两 五倍子(去虫屑)二钱半

【用法】锉晒为末。用清油入桐油和调二钱至三钱,涂搽患处。仍服四顺饮、消毒饮。

【主治】小儿身上一切热毒疮疾,燥痒抓破,有汁不干。

22338 四黄散

《仙传外科集验方》。为原书“洪宝丹”之异名。见该条。

22339 四黄散

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】赤芍药 黄芩 黄连 黄柏各一钱 大黄三钱七分 防风 当归身尾一钱五分 木鳖子一个(去壳) 金银花 苦参各一钱二分

【用法】用水一钟,酒一钟,煎至一钟后,下大黄煎四沸,露一宿,五更服。

【主治】风癣脓滚疥疮及诸疮毒。

【加减】若肠风脏毒下血,去木鳖子,加槐花一钱。

22340 四黄散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】荆芥 山梔 大力 黄连 黄芩 连翘 薄荷 木通 蒲黄各一钱 灯心一撮 甘草四分

【用法】上为细末。擦患处。

【主治】口舌之症。

22341 四黄散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】大黄一两 黄柏一两 黄芩一两 川连五钱 尖槟榔一两 老松香一两 熟石膏三两 厚朴一两 寒水石二两

【用法】上为细末。香油调搽。

【主治】一切白泡痛疮、湿疮、坐板疮、烫火疮。

22342 四黄散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】雄黄 雌黄 石硫黄 白附子 川槿皮各等分

【用法】上为细末。生姜蘸搽。

【主治】紫、白癰风作痒。

22343 四黄散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄连 31 克 黄柏 31 克 黄芩 31 克 大黄 31 克 寒水石 31 克 生地榆 31 克

【用法】上为细末,以香油(炸开后放冷再用)调和成泥膏;或以 40% 药粉配 60% 麻油,调成糊状。先以 1% 冰片液(冰片 0.3 克,冷开水加至 100 毫升)浸渍创面三至五分钟后,涂药膏。暴露创面。

【主治】烫火伤。

22344 四黄散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】大黄末 15 克 黄柏末 15 克 雄黄末 15 克 硫黄末 15 克

【用法】上为细末。麻油调搽。

【功用】清热解毒消肿。

【主治】发际疮(毛囊炎)、疖肿、脓疱疮。

22345 四黄散

【方源】《中医外科学》。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 大黄 乳香 没药各等分

【用法】上为细末；或加凡士林调为膏。散剂以水或银花露调敷患处，膏剂将油膏摊纱布上敷患处。

【功用】清热解毒，活血消肿。

【主治】阳证疮疡。

22346 四黄煎

【方源】《产科发蒙》卷一。

【组成】黄连 黄芩 大黄 地黄各等分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠鼻衄。

22347 四黄膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】黄连 黄芩 土大黄 黄柏 芙蓉叶 泽兰叶各 30 克

【用法】上为细末。另用麻油 500 毫升入锅加温，加入黄蜡 125 克熔化，离火再加入上述药末，调和成膏。用纱布块涂药一层，贴肿块上，胶布固定。

【功用】清热解毒消肿。

【主治】一切肿毒。

22348 四虚丹

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】鸿光(云母粉) 千秋(卷柏) 万岁(泽泻) 慈墨实(菟丝子)

【用法】上为末，以白松脂为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【功用】延年益寿

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“四灵丹”。

22349 四蛻丹

《简明医彙》卷六。为《赤水玄珠》卷二十七“四蛻丹”之异名。见该条。

22350 四兽汤

《易简方》。为《三因》卷六“四兽饮”之异名。见该条。

22351 四兽饮

【方源】《三因》卷六。

【异名】四兽汤(《易简方》)、白术汤

(《嵩崖尊生》卷九)。

【组成】半夏(汤去滑) 茯苓 人参 草果 陈皮 甘草 乌梅肉 白术 生姜 大枣各等分

【用法】上锉散，加盐少许，淹食顷，厚皮纸裹，水淹入，慢火煨香熟，焙干。每服半两，水二盏，煎至七分，去滓，未发前，并进三服。

【功用】和胃消痰，温中舒郁。

①《易简方》：和胃消痰。②《婴童百问》：温中快膈。③《杏苑》：补中气，舒郁豁痰。

【主治】气虚致症及久症气虚，面黄肌瘦；以及生冷不节，饱食伤胃而成下利。

①《三因》：五脏气虚，喜怒不节，劳逸兼并，致阴阳相胜，结聚涎饮，与卫气相得，发为疟疾；兼治瘧疾。②《易简方》：食症、诸症。③《杏苑》：中气亏败，津液郁聚成痰，阻塞经隧，以至荣卫不清而成症；以及疟疾未止，因生冷不节，饱食伤胃，变成下痢。④《慈航集》：久症气虚，面黄肌瘦，缠绵不止。

【方论选录】①《杏苑》：人参、白术、茯苓、甘草、大枣诸甘温以补中益气，橘红、生姜、草果仁等诸辛温之剂以疏豁郁滞，助乌梅、半夏以豁痰。②《医林纂要》：人参、白术、茯苓、甘草、半夏达阳于阴中而通其阻滞；陈皮行肝气之郁滞，破肺淫之阻塞；草果补肝泻肺，暖胃和脾，去积行痰，比常山为和顺；乌梅补肺泻肝，敛阴和胃，去瘀消湿，平内外上下之争；生姜以协半夏驱外闭之邪；大枣助四君子以和中气。此治症之乘于内伤者，故四君子君人参以补中也，半夏以滑之，陈皮以宣之。虽有七情之郁，亦可使通而无滞。二陈以除痰，痰因气阻，加乌梅、草果而谓之四兽。助以姜、枣，所以大畅其阳，使由中而达外也。③《成方便读》：草果入脾，助阳散寒；乌梅入肝，存阴敛液；加于六君中，助正气而和阴阳。因虚久症，岂有不愈者哉！

22352 四续丸

【方源】《千金》卷十五。

【异名】蜡煎丸。

【组成】云实五合(熬令香) 龙骨三两 附子 女萎各二两 白术二两半

【用法】上为末，以蜡煎烊为丸，如梧桐子大。每服五丸，一日三次。

【主治】三十年注痢，骨立痿黄，肠滑不愈。

【方论选录】《千金方衍义》：“四续”者，痢止而气血津液续复也。方中云实除泄痢肠癖，附子破痼坚积聚，白术健脾气运积，龙骨摄泄利脓血，女萎治泄利肠鸣。丸用蜜蜡，取其味淡入胃本经，专主下痢脓血，故又名“蜡煎丸”。

22353 四维散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参一两 制附子二钱 干姜(炒黄)二钱 炙甘草一二钱 乌梅五分或一钱(酌其味之微甚，随病人之意而用之)

【用法】上为末，和匀，用水拌湿，蒸一饭顷，取起烘干，再为末。每服一二钱，温汤调下。

【主治】脾肾虚寒滑脱之甚，或泄痢不能止，或气虚下陷，二阴血脱不能禁者。

【方论选录】《退思集类方歌注》：参、附、姜、甘，温补脾胃，加乌梅酸收，以固滑脱也。

22354 四雄丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】雄雀肝十具(微炙) 雄鸡肝三具(微炙) 雄蚕蛾五十枚(微炙) 天雄二两(炮裂，去皮脐) 龙脑一两(细研) 白矾一两(烧令汁尽) 木香半两 白马茎二两(涂酥，炙令微黄) 硃砂一两(细研) 吴茱萸半两(汤浸七遍，焙干，微炒) 苒蓂子一两(水淘去浮者，水煮芽出，候干，炒令黄黑色)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】肾脏虚损，阳气萎弱。

22355 四等丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】川大黄一两(锉碎，微炒) 诃梨勒皮一两 槟榔一两 木香一两

【用法】上为细末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前生姜、橘皮汤送下。温酒下亦得。

【主治】妇人瘀滞气，心腹冷痛，饮食不消。

22356 四等散

《鸡峰》卷十四。为《苏沈良方》卷八“四神散”之异名。见该条。

22357 四皓饮

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】大黄 川芎 甘草 荆芥各等分

【用法】上哎咀。水煎去滓，量儿大小加减服之。

【主治】小儿伤寒，头疼发热，心躁。

22358 四粪散

《医学纲目》卷三十七。即《御药院方》卷十一“无价散”。见该条。

22359 四温丹

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】上瑶桂(去粗皮)二两 北细辛(去净泥垢)一两 干姜八钱 公丁香五钱

【用法】上为粗末。小证各用二三分，上用温热薄贴盖之；大证别用三五钱，调入温煦薄贴料中摊贴，再加麝一分许。

【主治】痈疽初起，不论深浅、大小。

【宜忌】阳发风火热毒禁用。

22360 四温汤

《普济方》卷一八七。为《圣济总录》卷六十一“四温散”之异名。见该条。

22361 四温散

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【异名】四温汤(《普济方》卷一八七)。

【组成】附子(炮裂，去皮脐) 蓬莪术(煨，锉)各一两 胡椒 枳实(麸炒)各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，热酒调下。

【主治】寒气客在胸中，郁而不散，坚满痞

急,病名胸痺。

22362 四蒸丸

《魏氏家藏方》卷八。为《三因》卷三“四蒸木瓜丸”之异名。见该条。

22363 四蛻丹

【方源】《赤水玄珠》卷二十七。

【异名】四脱丹(《简明医彙》卷六)。

【组成】蝉蛻 蛇蛻 凤凰蛻(即孵出鸡子壳) 神仙蛻(即父母爪甲)各等分

【用法】焙为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服一钱,每年除夜服,服三年。

【功用】稀痘。

22364 四蛻散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】乌鸡子壳(已抱出鸡儿者) 蛇蛻各半两(烧灰) 乌贼鱼骨(去硬皮)一两 龙骨一分

【用法】上为细末。每用入膩粉少许,湿即干掺,干即油调敷之。

【主治】臈疮。

22365 四满丸

【方源】《外台》卷九引《深师方》。

【组成】干姜 桂心 踯躅花 芎藭 紫菀 芫花根皮各二分 人参 细辛 甘草(炙) 半夏(洗) 鬼督邮各一分 蜈蚣一枚(去头足,炙)

【用法】上为末。炼蜜和,每服如大豆五丸,米饮送下,一日三次。不知,加之至七八丸。

【主治】①《外台》引《深师方》:上气嗽,饮嗽,燥嗽,冷嗽,邪嗽。②《妇人良方》:劳嗽。

【宜忌】忌羊肉、饴、生葱、生菜、海藻、菰菜。

22366 四满丸

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】蜈蚣二枚(炙) 芫花根五分(熬) 踯躅花四分 干姜 芎藭 桂心各四分 人参 细辛各二分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如大豆大。每服五丸,米饮送下,一日三次;稍加至十丸。

【主治】五嗽。一为气嗽,二为痒嗽,三为燥嗽,四为邪嗽,五为冷嗽。

【宜忌】忌生葱、生菜。

22367 四箍散

【方源】《疮疡经验全书》卷九。

【组成】黄柏 川乌 赤小豆各一两 石精黄一钱五分

【用法】上为细末。和匀水调,冬天用蜜调。

【主治】痘毒。

22368 四精丸

【方源】《医统》卷七十二引《济生》。

【组成】鹿茸(制) 肉苁蓉(制) 山药 白茯苓各等分

【用法】上为细末,米糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,大枣汤送下。

【主治】白浊烦渴。

22369 四精丸

【方源】《医方大成》卷四引《经验方》。

【组成】茯苓 秋石各四两 莲肉(去壳皮心) 水鸡头(粉红花在上结子垂下)各二两

【用法】上为末,以蒸枣肉为丸,如梧桐子大。每服三十丸,盐酒、盐汤送下。

【功用】《医方类聚》引《经验良方》:补益精髓,驻颜悦色。

【主治】①《医方大成》引《经验方》:思虑色欲过多,损伤心气,遗精,小便频数。②《万氏家抄方》:肾虚盗汗腰痛。

22370 四精膏

【方源】《扶寿精方》。

【组成】蜂蜜(花之精) 羯羊胆(草之精) 青鱼胆(水之精) 人乳(人之精)各等分

【用法】瓷杯盛,蒸熟,入瓷瓶中,油纸黄蜡封固,悬井中七日取起。点眼,以匙抄少许,入口咽下亦可。

【主治】眼目赤障热痛。

22371 四精膏

【方源】《不居集》上集卷二。

【组成】童便 白蜜 人乳 酒酿

【用法】上熬膏。不拘时挑服。

【主治】虚损羸瘦不足。

22372 四精膏

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】蜂蜜 熊胆 人乳 青鱼胆各等分

【用法】入铜勺熬成膏，加冰片少许，入瓷器收贮。点眼。

【主治】风热时眼。

22373 四精膏

【方源】《女科切要》卷八。

【组成】人乳 象精 白蜜 藕汁各等分

【用法】熬膏，加苏合油调匀。浴后满身涂之。一月之内，遍体嫩滑香润。

【主治】妇人身湿不滑。

22374 四磨汤

【方源】《济生》卷二。

【异名】四磨饮（《证治要诀类方》卷二）。

【组成】人参 槟榔 沉香 天台乌药

【用法】上各浓磨水，和作七分盏，煎三五沸，放温服。或下养正丹尤佳。

【功用】①《中医方剂学讲义》：破滞降逆，兼以扶正。②《医方发挥》：顺气降逆，宽中补虚。

【主治】七情郁滞，痰气交阻，上气喘急，胸膈痞闷。

①《济生》：七情伤感，上气喘急，妨闷不食。②《普济方》：七情郁滞，痰气上壅，喘急声促。③《杏苑》：水肿。④《张氏医通》：一切气塞，痞闷不舒，不时暴发。

【方论选录】①《医方集解》：此手太阴药也。气上宜降之，故用槟榔、沉香，槟榔性如针石，沉香入水独沉，故皆能下气；气逆宜顺之，故用乌药；加人参者，降中有升，泻中带补，恐伤其气也。②《金鉴》：七情随所感皆能为病，然壮者气行而愈，弱者气著为病。愚者不察，一遇上气喘急，满闷不食，谓是实者宜泻，辄投破耗等药，得药非不暂快，初投之而应，投之久而不应矣。若正气既衰，

即欲消坚破滞，则邪气难伏，法当用人参先补正气，沉香纳之于肾，而后以槟榔、乌药从而导之，所谓实必顾虚，泻必先补也。四品气味俱厚，磨则取其气味俱足，煎则取其气味纯和，气味齐到，效如桴鼓也。③《成方便读》：以槟榔、沉香之破气快膈峻利之品，可升可降者，以之为君；而以乌药之宣行十二经气分者助之；其所以致气之逆者，虚也。若元气充足，经脉流行，何有前证？故以人参辅其不逮，否则气暂降而郁暂开，不久又闭矣，是以古人每相需而行也。若纯实无虚者，即可去参加枳壳。④《历代名医良方注释》：此方乃醒气、散气、降气、纳气，而又维护正气之方也。气喘分两大纲，一在上为实，乃肺气不通调；一在下为虚，乃肾气不归根。本方证治，兼而有之。盖七情感伤，郁滞菀结，气喘而急，上而不下，留滞膈间空膜之地，形成气膈。方制槟榔以开之，乌药以异之，沉香以降之纳之。又用人参之大力者，主持其间，俾气有统摄，不致散漫耗蚀，上下循环，营周不休，以归复于生理正常。尤妙在四药皆磨，既取其气味之全，又取其缓缓斡旋，不过攻过补，致令转变气滞反应之嫌。一本磨上三药，倍人参煎汤，入盐调下，对于虚甚不能运药，义求人参补力之早达，未为不可。然煎则补住气痰，恐诸气药反难以奏功。观喻嘉言《寓意草》，治痰喘夹虚，用人参切则效，人参用煎则不效，其意殊耐深思。要之须恰符病窍病机，斯可耳。

【临证举例】①胃脘痛《新中医》(1983; 7: 11): 许某，男，39岁，教师。罹患胃脘疼痛反复发作已三年之久。自感胃部胀痛满闷，按之则舒，攻冲季肋，噎气频作，纳呆，舌质正常，苔薄白，脉沉弦。经钡餐造影诊断为“浅表性胃炎”，证属肝疏失调，横犯中州之木侮土。拟降逆解郁，益举中气，处方：乌药、沉香（另冲）、炒槟榔、党参、枳壳各10克，炒赤芍、软柴胡各6克，四剂，水煎日

服二次。服药后胀痛略减,冲气已平,嗝气仍作,继以原方减槟榔、柴胡消导升疏之品,加半夏降逆醒脾。连进四剂,诸证均减。原方改散剂续进两料善后,未再复发。②梅核气《新中医》(1983;7:12):郭某,女,44岁,干部。患者咽喉似有异物感,已有年余,咽之不下,吐之不出,如物梗咽,但进食吞咽正常,曾经多方治疗不显,患者疑为恶变,情绪紧张,精神淡漠,不思饮食,胸中不适,夜不成寐,舌尖红,苔薄白,脉弦细。良由七情郁结,气机不畅,津液失于输布以致痰气交阻而成梅核气证,法宜开郁散结,调理气机为主。方用:乌药、沉香、海藻、槟榔、生甘草、浙贝母各10克,参须4.5克,石斛15克,生麦芽30克。四剂后咽部稍感舒适,饮食猛增,夜已入睡,效不更法,连进13剂,患者喜告病已衰其大半,其效之速,出余所料,后改为丸剂,并嘱其注意饮食起居,经远期随访未再发。

22375 四磨汤

【得效】卷六。为《观聚方要补》卷三引《卫生家宝》“沉香四磨汤”之异名。见该条。

22376 四磨饮

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】槟榔 木香 枳壳 乌药

【用法】用姜汤各磨服。

【功用】行气行痰。

【主治】天吊,风痰壅滞发惊。

22377 四磨汤

《症因脉治》卷二。为《医统》卷四十一引《易简方》“四磨饮”之异名。见该条。

22378 四磨饮

【方源】《医统》卷四十一引《易简方》。

【异名】四磨汤(《症因脉治》卷二)。

【组成】沉香 乌药 枳实 槟榔各等分。

【用法】白汤磨服。

【功用】《医略六书》:导滞降逆。

【主治】气滞喘逆。

①《医统》引《易简方》:诸气。②《症因

脉治》:伤损喘逆。③《医略六书》:气结于中,滞逆不降,脉沉。

【方论选录】《医略六书》:怒逆于中,气结不降,此肝胃受病,故胀满气喘不止。槟榔导逆气,枳壳泻滞气,乌药、沉香下气以平喘胀也,俾滞化气行,则结伏自解,而逆气无不平,何喘胀之有?虚人去枳壳加人参,非专补气,乃使槟榔、沉香、乌药得人参之力,则下气更速耳。

【临证举例】痰喘《续名医类案》:柴屿青治程别驾尊人,高年忽患痰喘,不进饮食,诊其脉有根,决无意外事。用四磨汤内加人参一两,一服而愈。

22379 四磨饮

《证治要诀类方》卷二。为《济生》卷二“四磨汤”之异名。见该条。

22380 四霜丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】巴豆霜半钱匕 百草二钱匕 粉霜一钱匕 砒霜半钱匕 乳香末二钱匕

【用法】上为细末,用黄蜡半两熔汁为丸。如绿豆大。每服一丸,新汲水送下,食前服。

【主治】休息痢久不愈。

22381 四魔丹

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】败龟板(煅白) 番木鳖(麻油煮,三沉三浮) 闹羊花(酒拌,九蒸晒)各二两 苍耳子一斤(炒) 白蜜一斤

【用法】上为末,炼蜜和匀,入竹筒内,挂当风处。七日后,初次服五分,三四日服六分,渐加至一钱,空心烧酒送下。

【主治】痹曳,颠风,蛊风,瘫痪委顿。

22382 四魔粉

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】硝砂 斑蝥 江子 银油

【用法】上为细末。凡风症高肿,紫黑成块坚硬者,将楮叶擦损苦皮,以药擦上,贴膏即烂去。

【主治】麻风。

22383 四七气汤

《保婴撮要》卷五。为《千金》卷十七“七气汤”之异名。见该条。

22384 四七气汤

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】白芷 防风 陈皮 连翘 人参 香附 川芎 当归 玄参 枳壳 甘草 桔梗 天花粉 小柴胡 鼠粘子 山梔仁

【主治】热毒入于心经脾经之伤寒喉闭。

22385 四七气汤

《喉科枕秘》。为《杂病源流犀烛》卷二十四“四七汤”之异名。见该条。

22386 四圣金丹

【方源】《摄生众妙方》卷三。

【组成】牙皂(去皮子) 细辛(去芦) 荆芥穗(去子) 槐角(炒黄色)各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，临卧细嚼清茶送下。

【主治】左瘫右痪，口眼喎斜，半身不遂，语言謇涩，中风欲倒，不识人。

【宜忌】避风寒冷物。

22387 四时药茶

【方源】《寿世新编》。

【组成】川羌活一两五钱 法半夏三两三北杏仁二两(去皮尖，炒) 漂茅术二两 紫川朴二两 尖川贝二两 软秦艽二两 明玉竹三两 陈建曲三两 正川芎二两 广陈皮一两五钱 霍香叶一两 煨天麻一两五钱 芽桔梗二两 苏扁豆三两 香白芷一两五钱 陈枳壳一两六钱 苏薄荷一两 北防风二两 结云苓三两 薏苡仁三两 白归身三两 京赤芍二两 飞滑石三两

【用法】外加淡姜片二两，大红枣五十个，同煎，除姜、枣，须选道地咀片，照戥依制，将大铜锅煮取浓汁，铁锅亦可用，仍须擦净油；再将红茶叶五六斤或七八斤裹入炒匀，取起另烘干，庶免伤火，候冷，瓷罐收贮，封紧勿走药性，如走药性或兼受霉，恐不应验。临用时再取大撮，开水泡服。汗若出透，不可再进，病自痊愈。

【功用】祛风逐湿，清热散寒，宽胸导滞，和氣化痰，汗不伤元，攻不克正。

【主治】风寒外感，发热恶寒，头目胀疼，腰脚痠痛，伤风咳嗽，鼻涕流清；以及食积痰滞，呕吐泄泻，饮食无味，似疟非疟，汗出不彻，一切四时不正之气。

【宜忌】孕妇虚人亦可用之，但病久化热，唇焦舌赤，汗大出，口大渴者，则不可服。

22388 四君子丸

【方源】《洪氏集验方》卷五。

【组成】缩砂仁 乌梅肉(焙干称) 陈橘皮(去瓢，取仁) 诃子(纸裹煨，去核，取皮用)各一两

【用法】上为末，煮好大枣，取肉为丸，如麻子大。每服三十九至五十丸，枣汤、熟水任下，不拘时候。

【功用】消化食滞，进美饮食，厚肠胃，充肌体，悦颜色，退黄。

【主治】脾虚，受食不克化，停积中脘，吐逆恶心，脏腑泄泻。

22389 四君子丸

《普济方》卷一〇五。即《朱氏集验方》卷一“四君丸”。见该条。

22390 四君子丸

《丸散膏丹集成》。即《圣济总录》卷八十“白术汤”改为丸剂。见该条。

22391 四君子汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】白术 人参 黄耆 茯苓各等分

【用法】上为粗末。每服五六钱七钱，水一盞，煎至七分，去滓，食远温服。

【功用】益气。

【主治】真气虚弱，肺损气短，或吐泻转筋，脉长而弱。

①《保命集》：肺损而皮聚毛落。②《奇效良方》：吐泻转筋，身热脉长。③《准绳·类方》：真气虚弱，短气脉弱。

22392 四君子汤

《局方》卷三(新添诸局经验秘方)。为《圣济总录》卷八十“白术汤”之异名。见该

条。

22393 四君子汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草各一两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一枚，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】和胃进食。

【主治】①《鸡峰》：脾胃病。②《成方便读》：脾肺气虚，中土衰弱，食少便溏，体瘦神倦，或气短息微，皮聚毛落。

【方论选录】《成方便读》：人参大补肺脾元气，为君；白术补脾燥湿，为臣。以脾喜温燥，土旺可以生金，故肺脾两虚者，尤当以补脾为急，脾为后天之源，四脏皆赖其荫庇，不独肺也。而又佐以茯苓，渗脾脾之湿浊下行，然后参、术之功，益彰其效，此亦犹六味丸补泻兼行之意；然必施之以甘草，而能两协其平；引以姜、枣，大和营卫，各呈其妙，是以谓之君子也。

22394 四君子汤

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】人参 白术 陈皮 甘草 滑石 白茯苓 白芍（酒炒） 泽泻 车前子

【主治】痘疮光壮，中虚作泄。

【加减】如火甚当解不解，加黄芩（酒炒）、黄连（酒炒）。

22395 四君子汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】人参（去芦） 白术（去芦）一钱三分 茯苓（去皮） 陈皮 厚朴（姜汁炒） 砂仁 苏子 桑白皮各六分 当归八分 沉香 木香各五分（另磨水） 甘草（炙）一钱

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣二枚水煎，磨沉香调服。

【主治】短气。

【备考】方中人参用量原缺。

22396 四君子汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】人参（去芦） 白术（去芦） 砂仁 茯苓（去皮） 陈皮 厚朴（姜汁炒） 当归 甘草各等分

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣二枚，水煎，不拘时服。

【主治】气虚。

【加减】气虚甚，加黄耆。

22397 四君子汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】人参（去芦） 白术（去芦） 茯苓（去皮） 黄耆（蜜炒） 川芎 陈皮 半夏（姜制） 天麻 桔梗（去芦） 白芷 当归各等分 甘草减半

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣一枚，水煎，温服。

【主治】气虚湿痰头眩。

22398 四味紫丸

《杏苑》卷七。为《千金》卷五“紫丸”之异名。见该条。

22399 四金匱丸

【方源】《产科心法》下集附方。

【组成】香附六两（用黄柏、山梔各三两同浸，炒） 川芎四两 续断四两 白术四两 茯苓四两 当归四两 山药四两 白芍四两（俱酒洗，炒） 青皮四两（炒） 砂仁四两（炒） 白薇四两（酒洗） 条芩四两（酒炒） 生地四两（酒洗）

【用法】上为末，山药淡醋汤糊为丸。醋汤送下。

【功用】安胎；调经种子。

22400 四宝花散

【方源】《治痧要略》。

【组成】郁金一钱 细辛 降香各三钱 荆芥四钱

【用法】上为细末。每服三匙，清茶稍冷调服。

【主治】痧症。

22401 四面楚歌

【方源】《得效》卷十九。

【组成】荆芥(和根锉碎) 赤芍药 大柏皮 土当归 山大黄 土白芷 天南星 赤小豆 商陆干(即中榕根, 锉片子, 焙) 白及 赤敛 白敛 草乌 寒水石(煨或炒)各等分

【用法】上为末。生地黄自然汁调涂角四畔, 或苦齏根汁调; 肿用商陆根研汁, 未溃则满体涂上, 或有尖起处, 则留出疮口。

【主治】诸般疽发肿赤, 痛不可忍。

22402 四顺饮子

《鸡峰》卷十三。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

22403 四顺饮子

【方源】《卫生总微》卷三。

【组成】地骨皮(去骨) 防风(去芦并叉枝) 山梔子(去壳取仁) 连翘各等分

【用法】上为细末。每用一钱或二钱, 水一小盏, 用灯心、竹叶少许, 煎至五分盏, 放冷服, 不拘时候。

【主治】小儿诸热。

22404 四将军汤

【方源】《证治汇补》卷三。

【组成】甘遂 大戟 苦葶苈 大黄

【用法】水煎服。

【功用】《明医指掌》: 通便逐水。

【主治】人壮病实, 便秘可下者。

22405 四将军饮

【方源】《医方大成》卷三引《澹寮》。

【组成】附子 诃子 陈皮 甘草

【用法】上咬咀。为四服, 每服水一盏半, 加生姜七片, 大枣七枚, 煎取一半, 令热, 灌病者。

【主治】疟疾作后仆倒, 手足俱冷, 昏不知人。

22406 四将军散

【方源】《瘡痍选要》。

【组成】大黄 槟榔 葶苈 牵牛

【用法】各味论儿之大小轻重施之。

【主治】瘡后马脾风。

22407 四柴胡饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】柴胡一二三钱 炙甘草一钱 生姜三五七片 当归二三钱(泻者少用) 人参二三钱或五七钱(酌而用之)

【用法】水二钟, 煎七八分, 温服。

【功用】培助元气, 兼之解散。

【主治】凡人元气不足, 或忍饥劳倦而外感风寒, 或六脉紧数微细, 正不胜邪。

【加减】如胸膈滞闷者, 加陈皮一钱。

【方论选录】《退思集类方歌注》: 此为小柴胡变局, 去黄芩、半夏而加当归、陈皮。本方虽治从气分, 而略兼营分, 盖气虚者, 营血必不足, 故补气亦必兼补血也。

22408 四症神方

【方源】《伤科补要》卷四。

【组成】乳香 没药 苏木 降香 松节 各一两 川乌五钱 自然铜一两(煨) 地龙五钱 水蛭五钱 血竭五钱 生龙骨五钱 土狗十个

【用法】上为细末。每服五钱, 陈酒调下, 随症上下, 食前后服。

【主治】跌打损伤。

22409 四磨饮子

【方源】《普济方》卷一八二引《简易》。

【组成】沉香 乌药 南木香(火略煨) 枳壳(去瓢, 麸炒)各等分

【用法】上用温汤水磨服; 锉碎水煎亦可。

【功用】温中下气。

22410 四二五合方

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】当归三钱 白芍三钱 川芎一钱 熟地四钱 覆盆子三钱 菟丝子三钱 五味子三钱 车前子三钱 牛膝四钱 枸杞子五钱 仙茅三钱 仙灵脾四钱

【功用】养血益阴, 补肾生精。

【主治】血虚肾亏所引起的经闭, 或席汉氏综合症。

【方论选录】本方用五子衍宗丸补肾气, 其中菟丝子苦平补肾, 益精髓; 覆盆子甘酸辛

温,固肾涩精;枸杞子甘酸化阴,能补肾阴;五味子五味俱备,入五脏大补五脏之气,因其入肾,故补肾之力更强;车前子性寒有下降利窍之功,且能泻肾浊补肾阴而生津液。配合仙茅、仙灵脾以补肾壮阳。五子与二仙合用的目的就是既补肾阳又补肾阴。补肾阳能鼓动肾气,补肾阴能增加精液。肾气充实,肾精丰满,则可使毛发生长,阴道分泌物增多,性欲增加,月经复来。另外,与四物汤合方以加强养血益阴之效,再加牛膝能补肾通经。本方的功用不在于通而在于补。肾气充,肾精足,经水有源,则月经自复。

22411 四七益气汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】姜半夏一钱五分 厚朴一钱五分 茯苓三钱 苏叶一钱 人参随虚实酌用 当归三钱 川芎一钱 广木香八分 腹子五分 炮姜六分

【用法】加鸡内金一具,水煎服。

【主治】产后腹满而胀,兼治肿症。

【加减】挟食伤,加麦芽三钱,神曲二钱;挟瘀,加蓬术、香附各一钱;挟湿,加通草二钱;挟气,加陈皮一钱;挟寒,加淡附子二钱;如受风湿而肿者,倍紫苏一钱,加防风一钱五分,车前一钱(炒)。

22412 四七调气汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】紫苏一钱五分 厚朴(姜汁炒)一钱五分 茯苓一钱五分 半夏一钱五分 枳实(炒)一钱半 砂仁一钱五分 苏子(炒)一钱五分 陈皮一钱五分 甘草五分

【用法】上锉。加生姜三片,水煎服。

【主治】七情四气,以致膈噎翻胃。

22413 四子明目散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】黑豆半斤 冬瓜子四两 蒺藜子五两 菠菜子二两

【用法】俱用盐炒,为末。每服三钱,一日二次。

【功用】明目。

【主治】瞳孔缩小症。两眼瞳孔小如粟米,不疼不痒,视物昏蒙。

【备考】初期本方有效,久则无效。

22414 四子调中汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】青皮(麸炒)五分 陈皮五分 枳实(麸炒)一钱 香附(炒)一钱 黄连(姜汁炒)七分 半夏(制)二钱 瓜蒌仁(炒)一钱 苏子(炒)一钱 沉香五分 茯苓五分 桃仁(去皮尖)一钱半 白芥子(炒)一钱 木通五分 芒消五分

【用法】上锉一剂。加生姜五片,水煎,稍热服。

【主治】翻胃,或大小便闭,及痰气壅盛。

22415 四五培元粉

【方源】《医学碎金录》。

【组成】百合一斤 山药 菟丝 莲肉 茯苓各半斤 谷芽 麦芽 神曲 砂仁 荷叶各四两 芡实六两 米仁十二两 扁豆 于术各五两 粳米 糯米各二斤

【用法】百合煮捣,菟丝、砂仁生研,余均炒香为末,混合晒干磨粉。

【功用】养胃生肺。

【主治】肺病。

22416 四牙无价散

《痘疹仁端录》卷十四。为《医学入门》卷八“四齿散”之异名。见该条。

22417 四六神遗散

【方源】《袖珍小儿》卷九。

【组成】猪苓 泽泻 白术各六分 赤茯苓 肉桂一分 枳壳(去白)五分 大腹皮(酒洗,炒)一钱 桑白皮一钱 杏仁(去皮尖)七分

【用法】上切片。加生姜一片,灯心一团,水煎,温服。

【主治】小儿喘胀。

【备考】方中赤茯苓用量原缺。

22418 四号否象方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧胀玉

衡》卷下“藿香汤”之异名。见该条。

22419 四仙求志膏

《遵生八笺》卷十三。即原书同卷“九转长生神鼎玉液膏”之四转方。见该条。

22420 四生化痰丸

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】人参 半夏 杏仁各一两 白矾六钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每食后服五十丸，用浆水煮三五沸，澄清出药，用煮药汁候温送下。

【主治】近年近日一切咳嗽不止者。

【宜忌】忌湿面、鱼腥、生冷物。

22421 四生地黄汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鲜生地五钱 生侧柏叶 焦山栀 元参心各三钱 广郁金二钱 黑丹皮 丹参各一钱半 广三七八分 生艾叶二分 生荷叶汁 陈京墨汁 童便各一瓢（冲）

【功用】止血。

【主治】夹血伤寒，呕血吐血，表邪虽解，血尚不止者。

22422 四白灭癍散

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【组成】白芷 白附子 白姜蚕 鹰矢白密陀僧各等分

【用法】上为极细末。以水调擦面黥。

【主治】痘疮痂落后，其面癍或赤或黑。

【备考】《准绳·幼科》本方用法：临睡以清蜜调水搽面上，至晓以水涤去之，自然白莹。

22423 四白烧肝散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《医林方》。

【组成】桔梗 香白芷 白术各一两 白芍药三两 缩砂仁二钱

【用法】上为细末。每服五钱，用白羊肝四两，去了膜，用竹刀子刮为泥，用盐少许，葱白三根锉碎，与肝、药末同和，荷叶裹，纸封数重，用泥固济了，灰火内烧令肝熟，取

出细嚼，米饮汤送下。

【主治】久虚饮食不进，泻痢不止。

22424 四主二佐丸

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】乳香 没药 桃仁 滑石 木香 槟榔

【用法】神曲糊为丸。每服百粒，米汤送下。

【主治】痢疾久不止，下清涕，有紫黑血丝，脉沉细弦促。

【加减】欲下，加大黄。

22425 四加生化汤

【方源】《女科秘要》卷六。

【组成】川芎二钱 当归四钱 甘草四分 桃仁十粒 茯苓一钱 陈皮五分 木香三分

【用法】水煎熟去滓，送香连丸三十粒。

【主治】产后七日内患赤白痢，后重频仍者。

22426 四圣不老丹

【方源】《扶寿精方》。

【组成】透明松脂一斤（放砂锅内入无灰酒，桑柴火煮数沸，竹枝搅稠粘，住火，以瓷器盛水，倾入水内结块，复以酒蒸九遍，一日煮讫，次日亦如是，三日通计三九二十七遍，其脂莹然如玉，不苦不涩乃止。为细末，净用十二两。凡煮不宜酒少，少则易干，煮之三分之二，即倾水内）白茯苓（去皮，净用）半斤 黄菊花（家园味甘者） 柏子仁（纸包，捶去油）半斤

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十二丸，空心好酒送下。

【功用】①《摄生众妙方》：振精力，健胃气，增饮食，补养延年。②《本草纲目》：强筋补益。

22427 四圣化毒汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】木通 归尾 赤芍 官桂 防风

【用法】水煎服。

【主治】痘疮至成浆时，其人清爽，痒痒不住，视其形体壮实，曾无吐泻者。

22428 四圣快斑汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】黄耆 人中黄 红花(酒炒) 紫草茸 麻黄(酒炒焦黑) 木通 牛蒡子 丝瓜(连蒂,烧存性) 连翘 辰砂 烧人尿(丝瓜、辰砂、人尿另研入药)

【用法】水煎服。

【功用】《幼幼集成》:托里解毒。

【主治】①《万氏家抄方》:痘疗烦躁,腹胀喘渴,变黑,血枯闭塞者。②《幼幼集成》:痘疮黑陷。

【备考】本方改为散剂,名“四圣快斑散”(见《幼幼集成》卷五)。

22429 四圣快斑散

《幼幼集成》卷五。即《万氏家抄方》卷六“四圣快斑汤”改为散剂。见该条。

22430 四圣珍珠散

《痘疹全书》卷下。为《痘疹心法》卷二十二“四圣散”之异名。见该条。

22431 四圣挑疔丹

【方源】《同寿录》卷三。

【组成】珍珠十四粒 豌豆四十九粒(烧存性) 乱发二钱(酒洗净,烧存性) 干胭脂不拘多少。

【用法】上为细末。点疔内。

【主治】痘疗。

22432 四圣挑疔散

《医方考》卷六。为《万氏家抄方》卷六“四圣丹”之异名。见该条。

22433 四圣保命丹

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】大黄半两 黄柏半斤 苦参 荆芥各四两 虾蟆一个(烧灰)

【用法】上为末,蜜和匀,分作一百二十丸。每服一丸,食远温酒送下,一日三次。

【主治】疔风。

【宜忌】忌肉蓐。

22434 四圣保命丹

【方源】《赤水玄珠》卷三十。

【组成】大黄五钱 黄柏八两 苦参 荆

芥各四两 干蟾一只(煨) 栝楼根 防风各五钱 轻粉二钱

【用法】上为末。每服一钱,茶清一盏调下,空心、日午、临卧各一服。服五七日后,先于牙缝内出臭黄涎,浑身疼痛,次后便利脓血,病根悉去。

【主治】疔风。

22435 四圣旋丁散

【方源】《外科精义》卷下引《名医秘传经验方》。

【组成】巴豆仁五分 白僵蚕 轻粉 硃砂各二钱五分

【用法】上为细末。先以好醋调药涂上,以纸封之。次服内托里之药,其疔自旋出根。

【主治】①《外科精义》:疔疮生于四肢,其势微者。②《杂病源流犀烛》:恶血留结内外,荣卫不通,两肩生疔疽。

22436 四圣朝元丹

【方源】《济阳纲目》卷六十四。

【组成】人参 熟地(砂仁炒) 肉桂各一两 川椒(去目炒) 小茴香(炒)各四两 茯苓 何首乌(黑豆蒸) 牛膝(酒浸) 干山药 杜仲(酥炙) 枸杞子 当归(酒洗)各一两 沉香 木香(不见火)各五钱 苍术一斤(酒、醋、盐、水各浸四两,春五、夏三、秋七、冬十日,焙干)

【用法】上各为细末,用好酒糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温酒送下;如不饮酒,淡盐汤送下。

【功用】益精神,补元阳,清耳目,去下焦湿。

【主治】诸虚不足,下元亏损,腿脚无力,脾胃虚弱,头目昏眩,四肢倦怠。

22437 四圣紫金丹

【方源】《普济方》卷九十三引《瑞竹堂方》。

【组成】槐实子(文武火麸炒黄色) 荆芥穗(择净生用) 甘菊花(炒) 猪牙皂角(酥炙黄色,去子)各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。病重者每服一丸，细嚼，茶清送下；病轻临时加減。微汗出为验。如汗后体热难忍，嚼甘草解之。

【主治】男子妇人左瘫右痪，口眼喎斜，中风疾病。

22438 四圣解毒汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】紫草 木通 枳壳 黄耆 桂枝 大黄（酒炒）

【用法】水煎服。

【主治】痘疮发热，及养浆而作痒者；及能饮食而大便坚者。

22439 四色断痢丸

【方源】《幼科发挥》卷一。

【组成】黄连五钱 飞朱砂二钱五分 胆星一钱 白甘遂三分

【用法】上为末，藕猪心血杵匀，粟米糊为丸，如芡实大。每服一丸，灯草煎汤化下，夜服三次，日服一次。

【主治】小儿痢证初期发搐，或一月一发，或一月再发。

22440 四时贴护方

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】春以柳絮 夏以竹膜 秋以新绵 冬以兔毛

【用法】上各随时贴疮上。

【主治】灸疮未着痂，及出脓久不合者。

22441 四灵无价散

《治痘全书》卷十四。为《御药院方》卷十一“无价散”之异名。见该条。

22442 四君归芍汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术（蜜炙） 茯苓 炙甘草 当归 白芍（炒） 各一钱

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】妊娠血少，不能养胎，腹痛喜按，脉无力。

22443 四君加味汤

【方源】《证因方论集要》卷三。

【组成】人参 茯苓 白术（土炒） 甘草（炙） 炮姜 附子（制） 厚朴（姜汁炙）

【功用】和胃健脾，温散寒邪。

【主治】霍乱，中气弱者。

【方论选录】参、苓、术、草，四君子也，益胃健脾；复以姜、附者，温暖真阳；更加厚朴和胃调中。

22444 四君加味汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】党参（去芦，饭蒸）三钱 天麻 茯苓 钩藤各一钱五分 白术二钱 炙草一钱

【用法】加生姜汁半酒杯，冲药服。

【主治】中风闭证，脾虚者。

【加減】有痰，加竹沥水半酒杯；如仓猝无竹沥水，即加天竹黄一钱五分。

22445 四君芎归汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术（蜜炙） 茯苓 当归 川芎 砂仁 炙甘草各一钱

【用法】加生姜三片，葱白三茎，水煎服。

【主治】妊娠四五月，胎气不和，逆上心胸，胀满疼痛，名子悬，脾虚而不安者。

22446 四君防风汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】党参（去芦，米炒）二钱 白术（饭蒸）一钱五分 防风 茯苓 荆芥各一钱 炙草七分

【用法】加生姜一片，红枣二枚，水煎服。

【主治】劳倦内伤，外感者。

22447 四君快斑汤

《赤水玄珠》卷二十八。为《万氏家抄方》卷六“四君子快斑汤”之异名。见该条。

22448 四妙勇安汤

【方源】方出《验方新编》卷二，名见《中医杂志》（1956；8：409）。

【组成】金银花 元参各三两 当归二两 甘草一两

【用法】水煎服。一连十剂，永无后患。药味不可减少，减则不效。

【功用】《方剂学》：清热解毒，活血止痛。

【主治】脱疽。此症生手足各指，或云生手足第四指者是。或生指头，或生指节指缝，初生或白色痛极，或如粟米起一黄泡，其皮或如煮熟红枣，黑色不退，久则溃烂，节节脱落，延至手足背腐烂黑陷，痛不可忍。

【方论选录】①《方剂学》：银花甘寒入心，善于清热解毒，故重用为主药，当归活血散瘀，玄参泻火解毒，甘草清解百毒，配银花以加强清热解毒之力，用量亦不轻，共为辅佐。四药合用，既能清热解毒，又能活血散瘀，是治疗脱疽的良方。②《中医方剂临床手册》：本方重用银花清热解毒为主药；玄参滋阴清热为辅药；当归和血和营为佐药；甘草和中解毒为使药。本方特点，药味少，效用专。治疗脱疽溃烂，热毒正盛，而阴血耗伤者，甚为合适。

【临证举例】①血栓闭塞性脉管炎 《中医杂志》(1956; 8: 409)：沧县专区第一人民医院老中医释宝山，自1955年7月至10月，用本方治疗动脉栓塞性坏疽症34例，一般服药5~20剂即大体痊愈。如：患者杨瑞芬，1954年3月患病，曾经20多位医师治疗，未见好转。1955年10月来诊治时，左脚已成青紫色，脚趾开始溃烂，瘙痒钻心，疼痛，已决定截肢。服本方4剂后，疼痛即止；服10剂后，脚趾开始脱落，不久伤口长出新肉而愈。《天津医药杂志》(1960; 1: 1)：用四妙勇安汤治疗血栓闭塞性脉管炎30例。其中部分有明显皮冷、苍白的患者，加用附子二钱、赤芍五钱、桂枝钱半、牛膝三钱。结果除2例在服药半月及1个月仍未收效又行肾上腺切除及交感神经切除术外，其余均收到近期满意疗效，治疗后患肢疼痛及凉麻感觉均减轻或消失。短者服药5剂，长者服药30剂。②静脉炎 《吉林中医药》(1986; 4: 18)：支某，女，31岁，因宫外孕大出血休克，行下肢静脉剖开自体输血及输液，7日后腹部切口愈合拆线，左下肢静脉剖开及大隐静脉所

经处红肿硬痛，腹股沟淋巴结肿大。行局部湿敷，理疗，肌注青、链霉素，口服消炎药治疗二周无效，体温39℃，白细胞15000/mm³，精神不振，食欲减退，下肢活动受限。拟清热通经，活血散瘀，方用四妙勇安汤：金银花100克、玄参100克、当归60克，甘草30克，水煎服。三剂后，热退，局部疼痛及浮肿明显减轻，食欲倍增。原方药量各减半，继服三剂，诸症俱除。一周后痊愈出院。③下肢溃疡 《福建医科大学报》(1973; 2: 45)：本方加减治疗2例下肢慢性溃疡，获得良好效果。举例：男性，56岁。小腿慢性溃疡已30年，经各种抗菌素及换药等治疗均无效。右小腿外下方及左小腿中前方各有一鸡蛋大小的慢性溃疡，周围皮肤伴有色素沉着及轻度浮肿。入院后溃疡面用霉夫奴尔溶液清洁换药，内服本方，经治月余而愈。④坐骨神经痛 《湖北中医杂志》(1982; 3: 19)：用四妙勇安汤加味治疗坐骨神经痛30例。基本方：玄参、当归、银花各30克，甘草15克，灵仙、年健各10克，五加皮、川牛膝各12克。每日一剂。湿热偏重者，加黄柏、地龙；寒湿偏重者，加附子、细辛；气虚者，加党参、黄耆；兼血瘀者，加桃仁、红花、土鳖；腰痛者加杜仲、寄生；筋脉拘挛者及肌肉萎缩者，加白芍、玉竹、伸筋草；剧痛者倍用玄参、当归、银花。结果治愈21人，显效8人，无效1人。有4例复发后再经治疗，同样收到显效。治疗后疼痛消失，最短1天，最长45天。⑤红斑性肢痛症 《中医杂志》(1979; 12: 34)：本方加紫花地丁、连翘治疗红斑性肢痛症4例，均获痊愈。典型病例：证见两足自踝关节以下均呈弥漫性肿胀，剧痛，痛时两足焮红而热，遇热则甚，得凉则安，苔黄舌红，口干渴。用上方并配合乳香、没药、红花、当归泡洗患肢，共治两月余，病情稳定，痊愈出院。作者认为，红斑性肢痛与血栓闭塞性脉管炎蕴热期同属“热痛”范畴，本方加紫衣地丁、连翘两味则效果更好。增加

中药药洗患足，活血通络，通则不痛，能提高疗效。

【现代研究】对血栓闭塞性脉管炎血液流变学特性的观察 《山东中医学院学报》(1979; 4: 38): 用本方对血栓闭塞性脉管炎湿热型和血瘀型病人治疗前后的血液流变学特性进行观察，认为本病患者血浆粘度比正常人高，红细胞电泳时间延长，血沉快，血液处于粘度高、易聚的状态。用本法治后，湿热型病人血浆粘度降低，红细胞电泳时间变快；血瘀型病人治疗前血粘度比正常人高，治疗后则下降，红细胞和血小板电泳变快。此结果与本病患者不正常之血液流变学特征相对应，提示了活血化瘀治疗可使血液粘聚状态好转或消除，临床症状得以改善。

22449 四妙健脾散

【方源】《普济方》卷二十五引《十便良方》。

【组成】苍术四两(麸炒) 干姜四两(灰炒) 甘草五两半(砂炒) 乌头六两(以江水浸七日，取出切片，以盐四钱炒干；或先切片子，以江水浸两日，同姜炒黄为度，取出合诸药)

【用法】上为细末。入盐点吃，不拘时候。

【功用】进食。

22450 四苓五皮汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷六引《辨疑》。

【组成】桑白皮 陈皮 地骨皮 茯苓皮 生姜皮 大腹皮 苍术 白术 泽泻 猪苓 青皮 车前子(炒) 各一两

【用法】上锉，作一贴。水煎服。

【主治】浮肿。

22451 四苓五皮饮

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 麦冬 黄芩 大腹皮 桑白皮 生姜皮 茯苓皮 陈皮 猪苓 泽泻 木通 滑石 木香

【用法】水煎服。

【主治】痘后浮肿。

22452 四苓五皮散

【方源】《便览》卷二。

【组成】白术 泽泻 猪苓 苍术 木通 茯苓皮 五加皮 大腹皮 地骨皮 桑白皮 青皮

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】病后虚肿，不服水土者尤宜。

【加减】如气胀，加木通磨入；不欲食，加砂仁、麦芽；心下闷，加槟榔、青皮，再加生姜皮尤好。

22453 四苓六一散

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】赤苓 猪苓 泽泻 江壳 滑石 甘草 车前

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】水入脾胃，白沫泄泻。

22454 四苓解毒汤

【方源】《婴童类萃》卷中。

【组成】白术一钱 茯苓一钱 猪苓一钱 泽泻一钱 干葛二钱 黄连一钱五分 甘草一钱 灯心二十寸

【用法】水煎，候冷，频频当水灌之。

【主治】中火酒毒，兼治热泄痢疾。

【加减】热甚，加香薷、柴胡、黄芩、木通；痰甚，加贝母、麦冬、花粉、黄芩。

22455 四苓新加汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】猪苓 泽泻 赤茯苓 木通 滑石 灯心 连翘 甘草梢 淡竹叶

【用法】水煎服。

【主治】痘疮起发之后，小水赤少者。

【备考】方中赤茯苓，《片玉痘疹》作赤芍。

22456 四奇种子丸

《外治寿世方》卷四。为《宁坤秘籍》卷下“四奇毓麟丸”之异名。见该条。

22457 四奇毓麟丸

【方源】《宁坤秘籍》卷下。

【异名】四奇种子丸(《外治寿世方》卷四)。

【组成】粉龙骨(用五色者,阴阳瓦煨)一钱 阳起石(见太阳飞动者真)三钱 白芷(用铜器焙干,黄者佳)三钱 蓖麻子(去壳用子,去浮油)四十九粒 黄春季桂(干,研极细末)五钱 砂仁(去壳干炒,酒洗净,焙)一钱 闹杨花(焙,研末)一钱 参芦(研细末)五钱 枸杞子(去核,净肉炒干)射香(晒干,研末)一钱 紫梢花(色润紫者佳)一钱 北细辛(水泡一夜,炒干,研末)三钱 肉苁蓉(红色者佳,焙干,研末)一钱 真肉桂(去皮,研细)二钱 旱地浮萍(肥大者佳,用净叶)三钱 吴茱萸(醋浸一夜,炒干)二钱 石榴皮(阴阳瓦焙干,研细末)一钱 川椒(开口者佳,研末)一钱 真鸦片膏一钱 锁阳(醋洗净)三钱 象皮(研末,一钱)

【用法】上药各为极细末,称足,用半生蜜为丸,如龙眼核大,外用丁香油为衣,再加蜡壳。每遇红尽之日,去壳将丸放入户内,约一顿饭时,药化可行。无不灵验。

【功用】种子。

22458 四味人参汤

《卫生总微》卷七。为《伤寒论》“干姜黄芩黄连人参汤”之异名。见该条。

22459 四味大黄汤

【方源】《幼幼新书》卷十一引《婴童方》。

【组成】大黄四分 芍药 当归 甘草(炙)各二分

【用法】一月儿服一杏核许,百日二杏核大小,以此为率,水三升,煮一升,一日三次,日夜可四服。服汤令母抱之,令小汗出;病甚者,令大汗出,汗后温粉粉之;下痢者,勿令出汗也。

【主治】少小众痢,乳哺不时,发温壮,吐利惊掣,胎寒腹痛,一十五痢。

【加减】发热,加麻黄(去节)二分,先煮去沫,纳诸药;反折戴眼掣缩者,加细辛四分;乳哺不消,壮热有实者,倍大黄,用刀劈破,勿令有碎末,无其疾不须增益;下痢

者,减大黄三分之一。

22460 四味升葛汤

《疡医大全》卷三十三。为《局方》卷二“升麻葛根汤”之异名。见该条。

22461 四味乌沉汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】乌药 香附 砂仁 沉香各等分

【用法】加生姜;水煎服。

【主治】心脾刺痛。

22462 四味白术汤

《景岳全书》卷六十一。为《普济方》卷三三七引《十便良方》“白术散”之异名。见该条。

22463 四味半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】半夏(生用)四两 白矾(生用)三两 牵牛子(生捣取粉)二两 粉霜(研)半两

【用法】上药各为末,合研令匀,生姜自然汁煮面糊为丸,如梧桐子大,以丹砂为衣。每服七丸至十丸,食后、临卧温生姜汤送下。

【功用】宽利胸膈

【主治】膈痰结实,咽喉不利。

22464 四味地黄丸

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】熟干地黄(焙) 白术 白茯苓(去黑皮) 菟丝子(酒浸两宿,别捣)各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空腹温酒送下,一日二次。

【功用】补腰膝,填骨髓,令人悦泽。

【主治】虚劳,腹内冷气。

22465 四味地榆散

《景岳全书》卷五十七。为《杨氏家藏方》卷三“泼火散”之异名。见该条。

22466 四味芍药散

【方源】《史载之方》卷上。

【组成】吴白术 芍药 桔梗 香白芷各等分。

【用法】上为末。每服三钱匕,水一盞,加

生姜三片，大枣二个同煎，取八分服。

【功用】温肺。

【主治】肺金之胜，寒中鹜溏，少腹痛，中清，胁肋痛，六脉毛而微，不浮，足泽沉而小击。

22467 四味当归汤

【方源】《外台》卷七引《范汪方》。

【组成】当归 桂心 干姜各三两 甘草二两(炙)

【用法】上切。以水八升，煮取三升，每服一升，一日三次。

【主治】寒腹痛。

【宜忌】忌海藻、菰菜、生葱。

【加减】虚冷激痛甚者，加黄耆、芍药各二两。

22468 四味当归汤

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【异名】四味汤(《鸡峰》卷二十)。

【组成】当归(焙) 生姜 芍药各二两 羊肉(切，去脂膜)半斤

【用法】上四味，将三味细锉，先以水五升，煮羊肉烂熟去肉，以汁煮药，候熟，去滓澄清，每温服一盞，不拘时候。

【主治】卒疝，腹痛里急。

22469 四味回阳饮

《景岳全书》卷五十一。为《圣济总录》卷三十八“干姜汤”之异名。见该条。

22470 四味回阳饮

《伤寒瘟疫条辨》卷四。为《伤寒论》“四逆加人参汤”之异名。见该条。

22471 四味防风散

【方源】《外台》卷十五引《深师方》。

【组成】防风五分 泽泻 牡蛎(熬) 桂心各三分

【用法】上为散。每服方寸匕，先食酒送服，一日二次。

【主治】多汗恶风。

【宜忌】忌生葱。

22472 四味如圣汤

【方源】《普济方》卷六十三。

【组成】桔梗 枳壳 麦门冬 甘草各等分。

【用法】上吹咀。每服三钱，水一盞半，煎至八分，去滓温服。

【主治】咽喉肿痛。

【加减】加荆芥、防风各一钱尤妙。

22473 四味异功散

【方源】《疡医大全》卷三十。

【组成】松香(炼老) 生矾 枯矾 银粉各等分。

【用法】上为细末。先将得猪汤或米泔水熬洗，去净疮腐，拭干秽水，干则麻油调搽，湿则干掺。

【主治】黄水疮。

22474 四味连香丸

《玉案》卷三。为《医学入门》卷七“四味香连丸”之异名。见该条。

22475 四味补心丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】当归(酒洗，焙干)二两 朱砂一两(别研) 肉苁蓉(酒浸一宿，焙干)二两 杏仁一百五十枚(汤泡，去皮尖，研成膏)

【用法】上为细末，以杏仁膏同和，如干，以浸药酒煮薄糊添和，杵千余下为丸，如绿豆大。每服三十丸，用米饮或温酒送下，不拘时候。

【功用】益血补心，安神定志。

【主治】怔忡惊悸，恍惚健忘。

22476 四味阿胶丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】黄连四两 茯苓二两 白芍药三两 阿胶一两(炒，为末)

【用法】上将前三味为细末，以好醋熬阿胶成稀膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】下痢赤黄，烦躁口渴，脐腹疼痛，脉虚大而数。

①《鸡峰》：泻后成痢。②《袖珍》引《仁

存方》：协热下痢，其色黄，烦躁多渴，脐腹疼痛，小便不利。③《校注妇人良方》：胃经虚热，津液不分，并于大肠，下痢赤黄，米谷不化，作渴呕逆，脉虚大而数。

22477 四味阿魏丸

《张氏医通》卷十三。为《丹溪心法》卷三“阿魏丸”之异名。见该条。

22478 四味拔毒散

【方源】《经验方》卷上。

【组成】滑石五两 铅粉二两 炉甘石一两（入煅银罐内烧透，以黄连汁煅淬数次）

【用法】上为细末，陈菜油调敷。

【主治】热疔初起，及一切湿毒、胎毒。

22479 四味肥儿丸

《小儿痘疹方论》。为《幼幼新书》卷二十五引《朱氏家传》“肥儿丸”之异名。见该条。

22480 四味承气汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】大黄（细锉，醋炒）二两 枳壳（去瓢，麸炒）一两半 朴消二两 甘草（炙，锉）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空腹温服。

【主治】伤寒四日以后，腹胀满痛，喘粗壮热。

22481 四味枳实散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】枳实一两 人参 川芎 芍药各五钱

【用法】上为末。每服二钱，生姜，大枣汤调服。

【主治】肝气不足，两胁疼。

22482 四味茴香散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】乌药（酒浸一宿，焙） 良姜 小茴 青皮各一两

【用法】上为末。每服二钱，发时热酒调服。

【主治】风寒伤肝，囊茎抽痛，俗名小肠气，痛不可忍。

22483 四味茶连丸

【方源】《保婴撮要》卷十。

【异名】四味黄连丸（《准绳·幼科》卷三）。

【组成】吴茱萸（炒） 黄连（炒） 神曲 荷叶各等分。

【用法】上为末，水煮神曲糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，白汤送下。黄连当量病微甚，或炒黑炒黄用之。

【主治】腹胀噎气吞酸，食不能化。

22484 四味茶连丸

《医钞类编》卷十。为《医学入门》卷七“四味黄连丸”之异名。见该条。

22485 四味茯苓汤

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】宣黄连五两 藿香叶二两 阿胶（粉炒）一两 白茯苓一两半（去皮）

【用法】上为饮子。每服四钱，水一盏半，煎七分，去滓，早、晚食前温服。

【主治】伏暑泻痢，不进饮食，赤痢腹痛。

22486 四味香连丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】四味连香丸（《玉案》卷三）。

【组成】黄连（炒）十两 大黄（酒煨）四两 木香二两 槟榔一两

【用法】上为末，糊为丸，如绿豆大。每服七十九，空心米饮送下，一日二次；如下痢色黑用大黄，色紫用地榆，色红用黄芩，色淡用生姜，色白用肉桂，色黄用山楂，水泄用粟壳，痛甚用木香、山梔，各煎汤送下。

【主治】痢初起，不问赤白。

22487 四味香薷饮

《医方集解》。为《苏沈良方》卷四引《五脏论》“神圣香薷散”之异名。见该条。

22488 四味换肠丸

【方源】《女科百问》卷下。

【异名】白术止痢丸。

【组成】白术三分 诃子（炮，去核取肉）三分 肉豆蔻三分 钟乳粉一两

【用法】上为细末，入钟乳粉拌面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心熟水送下。

【主治】因多思或寒气积滞而成下痢，便下觉脏腑疼痛，泻痢，饮食不美。

22489 四味消毒饮

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】人参 炙甘草 黄连 牛蒡子各等分

【用法】上为粗末。每服一钱，加生姜一片，水一盞，煎四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痘疮热盛，毒气壅遏。

22490 四味理中丸

【方源】《百一》卷十一。

【组成】理中丸去人参，增红曲。

【用法】每服二钱，白汤点服；蜜丸亦得，空心服。

【主治】脚气。

22491 四味萸连丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】四味茱连丸（《医钞类编》卷十）。

【组成】黄连一两 吴萸一钱 桃仁二十四枚 陈皮五钱 半夏一两半

【用法】上为末，神曲糊丸，如绿豆大。每服一百丸，生姜汤送下。

【主治】痰火挟瘀，吞酸。

22492 四味萸连丸

《准绳·幼科》卷三。为《保婴撮要》卷十“四味茱连丸”之异名。见该条。

22493 四味黄芩汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】黄芩（去黑心） 当归各一两 黑豆半合 茅根半两

【用法】上各锉细，分作三服。每服水一盞半，煎至八分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】肠黄，心中闷绝，肠内疼痛，状如刀刺。

22494 四味排脓散

《景岳全书》卷六十四。为《得效》卷十九“排脓散”之异名。见该条。

22495 四味鹿茸丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】鹿茸（酥炙，另捣成泥） 五味子

当归身各一两 熟地黄二两

【用法】上为细末，酒和为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空腹温酒送下。

【主治】肝肾督脉皆虚，咳嗽吐血，脉虚无力，上热下寒。

22496 四味散惊丸

【方源】《幼幼新书》卷九引《庄氏家传》。

【组成】膩粉 滑石 青黛 乳香各等分

【用法】上为细末，滴水为丸，如麻子大。一岁一丸，金银薄荷汤送下。

【主治】急慢惊风。

22497 四味萸根汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】冬萸根一握（洗去土，冬即用子）车前子 木通（细锉）各三两 阿胶（炙令燥）二两

【用法】上为粗末。每服七钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠小便不通，脐下满痛。

22498 四味舒筋汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】独活 当归 苍术 黄柏各等分

【用法】水煎服。

【主治】外感筋挛，湿热伤于太阳者；或腿足肿痛，脚筋挛缩。

22499 四味舒筋汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】秦艽 木瓜 苍术 黄柏

【主治】阳明经湿热筋挛。

22500 四味梁米汤

《圣济总录》卷一九〇。为《千金》卷十五“四物梁米汤”之异名。见该条。

22501 四味截疟汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】何首乌五钱 羌活二钱五分 山楂肉一钱二分 青皮七分

【用法】上合煎，露一夜，临发时五更温好服之。

【主治】疟症。

22502 四味藿叶汤

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】四味藿香汤（《济阳纲目》卷十八）。

【组成】藿香 人参 橘皮 半夏各等分

【用法】加生姜，水煎，温服。

【主治】胃寒呕吐。

22503 四味藿香汤

《济阳纲目》卷十八。为《医学入门》卷七“四味藿香汤”之异名。见该条。

22504 四物一黄散

【方源】《医学正传》卷七引《良方》。

【组成】当归（炒） 川芎（炒） 熟地黄 白芍药（炒）各半两 蒲黄（炒）二钱半

【用法】上为细末。每服二钱，空心酒温调下。

【主治】产后腹中血块作痛。

22505 四物二连汤

《元戎》（《东垣十书》本）卷二十。即同书（按萃本）“二连四物汤”。见该条。

22506 四物二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷三十七。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地黄 陈皮 半夏 茯苓 甘草 桔梗 瓜蒌

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】血虚挟火，遇劳则发，心下不快。

22507 四物二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷七十一。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地（砂仁炒） 陈皮（去白） 半夏 白茯苓 片苓（酒炒）各一钱 薄荷 甘草（炙）各五分

【用法】上锉。水煎，加竹沥、姜汁、童便服。

【主治】体瘦血虚而痰火兼盛者。

22508 四物二妙丸

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】苍术 黄柏 羌活 白芍药 威灵仙 陈皮

【主治】外感痹症，风热攻走作痛。

22509 四物三补丸

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】四物汤加黄芩 黄连 黄柏 山梔 香附 荆芥穗 龟板（炙）

【用法】上为末，炼蜜为丸服。

【功用】调经。

【主治】经事先期。

22510 四物三黄汤

【方源】《医便》卷三。

【组成】当归 川芎 芍药 生地黄各一钱 羌活 防风 黄芩 龙胆草 甘菊花 黄连各八分 玄参 薄荷各五分

【用法】上用水一盅半，煎八分，食后通口服。

【主治】目赤暴发，云翳赤肿，痛不可忍。

22511 四物干姜汤

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】当归 干地黄 芍药各三钱 川芎 干姜各一钱五分 大枣五枚

【主治】产后肝虚胁痛。

22512 四物大黄汤

【方源】《元戎》。

【组成】当归 川芎 熟地黄 芍药 生地黄 酒浸大黄

【用法】上为粗末，水煎服。

【主治】妊娠伤寒蓄血。

22513 四物五子丸

【方源】《普济方》卷七十二引《澹寮》。

【组成】菟丝子（制） 地肤子 枸杞子（酒蒸） 覆盆子（酒浸） 车前子（酒浸） 酸枣仁（去壳） 薏苡仁（炒） 柏子仁（炒） 鹿茸 苁蓉 当归 熟地黄 沉香 茯苓 川芎 白芍药各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸。空心温酒送下。

【主治】肝肾不足，体弱眼昏，内障生花，不计远近。

22514 四物五子丸

【方源】《医方类聚》卷六十八引《澹寮》。

【组成】当归（去芦，酒浸） 川芎 熟地黄（酒蒸，焙） 白芍药 覆盆子（酒浸） 枸杞子 地肤子 菟丝子（酒淘净，浸蒸，别研） 车前子（酒蒸）分两以虚实斟酌

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三十丸，盐汤吞下。

【功用】《金鉴》：滋阴养水，略带抑火。

【主治】①《医方类聚》引《澹寮》：心肾不足，眼目昏暗。②《金鉴》：或因嗜酒恣欲，或劳瞻竭视，或思虑太过，肝肾俱伤，目觉干涩不爽，视物昏花。

22515 四物五苓散

【方源】《保命歌括》卷八。

【组成】四物用赤芍、生地黄，合五苓散，去桂。

【功用】泻膀胱之火。

【主治】小便自溺孔中出，涩数作痛，或杂溺而出者。

22516 四物止经汤

【方源】《女科切要》卷八。

【组成】熟地 白芍 当归 川芎 柏叶 茯苓 香附 阿胶 蒲黄 白术 枣仁 陈皮 人参 甘草

【功用】和血理气。

【主治】产后气血大虚，脾胃又弱，营卫衰弱，忽然下血成片，如崩状。

22517 四物止痛汤

【方源】《中医伤科学》。

【组成】当归 9 克 川芎 6 克 白芍 9 克 生地黄 12 克 乳香 6 克 没药 6 克

【用法】水煎服。

【功用】活血止痛。

【主治】各部损伤之瘀血疼痛。

22518 四物内托饮

【方源】《卫生鸿宝》卷四。

【组成】当归（酒洗） 生地（酒洗） 白芍（酒洗） 川芎 防风 生耆 山甲（乳炙） 麦冬 皂角刺 元参 桔梗 甘草 荔枝壳 晚米一撮

【用法】水煎服。

【主治】痘疮六七朝，血燥气郁而毒不化浆者。

【方论选录】四物以凉血活血，防风佐生

耆，又得甲、刺以攻气中之毒，则气之郁者自开，玄参以滋水源，甘、桔以利肺气，荔枝壳温宣以起峻，晚米清润以生浆，为凉托至稳之剂。

22519 四物化郁汤

【方源】《类证治裁》卷三。

【组成】地 芍 归 芎 桃仁 红花 香附 青黛

【主治】血郁，脉涩而芤。

22520 四物化毒汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】归身 川芎 生地 甘草 白芍 麦冬 牛蒡 官桂 木通

【用法】水煎服。

【主治】痘疮血不足，起发之后，窠囊浮肿，中含清水，如水泡之状者。

22521 四物羌活汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】当归 白芍药 川芎 生地 秦艽 独活

【主治】血虚内伤腰痛。

【加减】气滞，加沉香、砂仁。

22522 四物甘草汤

《千金方衍义》卷九。为《伤寒论》“麻黄杏仁甘草石膏汤”之异名。见该条。

22523 四物龙胆汤

【方源】《元戎》。

【异名】龙胆汤（《赤水玄珠》卷三）。

【组成】四物汤各半两 羌活 防风各三钱 草龙胆 防己各二钱

【用法】水煎服。

【主治】①《元戎》：目赤暴发作云翳，疼痛不可忍。②《杂病源流犀烛》：肝火盛，目赤涩痛。

22524 四物白通汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】生地四钱 当归五钱（酒洗） 川芎三钱 赤芍二钱 白芷一钱 生香附二钱

【用法】加葱管三茎，水、酒各半煎服。或加通草三钱。

【主治】乳汁不通。

22525 四物瓜藤散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 木瓜 钩藤 川断 丹皮 防风

【功用】养血温经，祛风舒络。

【主治】产后气血虚，风寒客于皮肤，入于经络，致顽痹不仁，甚则拘挛，筋节不能自如。

【方论选录】产后元气虚，胃气未复，饮食未充，新血不能骤长，筋脉拘挛故其常也。医不知峻补阴血而以祛风发表为主，是虚其虚矣。是方以四物养血为主，而佐以钩、瓜、川断，舒筋祛风，通周身关节，丹皮祛血中游风伏火，防风通行十二经，处方之平易近人也。

22526 四物玄明饮

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】四物汤加车前子 木通

【用法】水煎，调玄明粉二三钱，饥服。一剂即止，后以八珍汤调理。

【主治】血尿不止，须臾一二碗。

22527 四物玄胡汤

【方源】《医统》卷八十一。

【组成】当归一钱 川芎 芍药 生地黄各一分 玄胡索一钱 桃仁 红花 牛膝各七分

【用法】上咬咀，作一服。水煎，空心服。

【主治】瘀血肠痛。

【加减】大便秘结者，加大黄。

22528 四物玄胡汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】熟地黄 当归 白芍 川芎各七钱五分 玄胡索一两 沉香五钱

【用法】每服三钱，水煎服。

【主治】经来胁内有一块，如杯作痛，其血淡黑色。

22529 四物加曲汤

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】四物汤加神曲(炒)八分 砂仁八

分

【主治】麻疹愈后，脾胃虚热不能食者。

【方论选录】四物以养阴，而平其虚热；神曲、砂仁以化气，而复其元阳。

22530 四物加味汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】四物汤一两 人参二钱 吴茱五分(醋泡，炒黑) 赤石脂三钱(醋炒) 炮姜五分

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】崩漏，脉虚者。

【方论选录】血室虚寒，阳气不能统运，故蓄泄无权，腹痛崩漏焉。四物汤以滋培血室，吴茱、炮姜以温中逐冷，更用人参扶元补气，石脂涩脱定崩漏也。水煮温服，俾血室既充，则寒邪无不化，而冲任蓄泄有权，经行自然如度，何患腹痛不退，崩漏不除乎！

22531 四物加味汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】熟地四钱 当归二钱 白芍(酒炒) 羌活 独活各一钱五分 牛膝(盐水炒) 川芎各一钱 炙草七分

【用法】水煎服。

【主治】鹤膝风阴虚者。

【加减】如有寒，加肉桂四分，制附子六七分或一钱。

22532 四物加桂汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】川芎 当归(洗，焙) 芍药 地黄(焙) 桂心各等分

【用法】上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】妇人忽然寒热。

22533 四物加桂汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】四物汤(芍药用赤)加肉桂 乌药 陈皮 防风 香附 红花 延胡 生姜

【主治】产后冷水浣衣发热。

【加减】寒月，加羌活。

【方论选录】产妇气血俱虚，手试冷水，寒气深入腠理，气滞不行，内有余血未下，即便凝结成块，憎寒发热，头疼恶心，胸满腹痛，久则不治，必成癥瘕积聚诸症。治宜速解外寒，略从汗散，不可过剂，仍用辛热之药，助命门，暖丹田，温补脾胃，使营卫和，腠理固，则病自愈。是方四物补血，延胡索、红花行血，防风佐桂、姜达表散寒，乌药、陈皮、香附行气散滞，使经络无瘀血、无留寒、无壅气，所温经逐寒，病自愈矣。

22534 四物加减汤

【方源】方出《元戎》，名见《医学纲目》卷五。

【组成】四物汤加地骨皮 牡丹皮

【主治】妇人骨蒸。

【方论选录】《医学纲目》：当归、白芍、川芎、地黄补血；地骨皮泻肾火；牡丹皮泻包络火。

22535 四物地榆汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十五。

【组成】川芎 当归 白芍 地榆

【主治】痢疾，伤血分。

22536 四物当归汤

【方源】《医心方》卷九引《范汪方》。

【组成】当归 人参各二两 半夏一升 白蜜一升

【用法】上咬咀。以水二斗，合蜜扬百三十过，纳药铜器中煎，得六升，分二次服，加至一时复服尽。

【主治】胃反不受食，食已呕出。

22537 四物当归汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】当归（切，焙）一两 桂（去粗皮） 甘草（炙，锉） 干姜（炮裂）各一两半

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服，空心、日午、临卧各一。

【主治】寒中腹痛。

22538 四物安神汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归（酒洗） 白芍（酒洗） 生地（酒洗） 熟地黄 人参（去芦） 白术（去芦） 茯神（去皮木） 酸枣仁（炒） 黄连（姜炒） 梔子（炒） 麦门冬（去心） 竹茹 乌梅一个 辰砂（研末，临服调入）

【用法】上锉一剂。加大枣二枚，炒米一撮，水煎，食远服。兼服辰砂安神丸。

【主治】心中无血养，怔忡。

22539 四物安神汤

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】地黄 当归 白芍 丹皮 枣仁 茯神 龙齿 远志

【主治】小儿善惊易悸，属心虚血少者。

22540 四物导赤散

【方源】《保命歌括》卷八。

【组成】四物用生地、赤芍，合导赤散，加条芩、山梔。

【主治】溺血不痛者。

22541 四物导痰汤

【方源】《女科指南》。

【组成】当归 川芎 地黄 芍药 甘草 半夏 杏仁 瓜蒌仁 橘红 茯苓 南星 黑枳实 黄芩 黄连 香附

【用法】水煎服。

【主治】痰火怔忡，及心胃嘈杂，眩晕。

22542 四物红花汤

【方源】《眼科菁华录》卷下。

【组成】四物汤加红花 苏木 木香 没药 麝虫

【主治】苗叶刺伤眼目。

22543 四物芩连汤

《赤水玄珠》卷二十一。为方出《保命集》卷下，名见《万氏女科》卷一“四物加芩连汤”之异名。见该条。

22544 四物坎离丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】生地一两半 熟地三两（同酒浸，捣膏） 当归二两 芍药一两半（同酒炒） 知母一两 黄柏二两（同酒浸，炒） 侧柏

叶 槐子各一两(同炒) 连翘六钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，用瓷盘盛之，以绵纸糊口，凉地下放七八日，去火毒，晒干收之。每服三四十九至五六十丸，白汤或酒送下。

【功用】善乌须发。

【主治】①《医学入门》：肠风。②《医部全录》：脾湿下流于肾，与相火合为湿热，迫经下漏，紫黑臭腐。

22545 四物连附汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】当归尾 赤芍 香附(童便制) 黄连 丹皮 甘草

【用法】水煎，食前服。

【主治】经来色紫属热者。

【备考】《胎产新书》本方用归尾、赤芍、香附各二钱，黄连、丹皮、甘草各一钱。

22546 四物快斑汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】川芎 赤芍 当归 生地 升麻 葛根 荆芥 牛蒡 连翘 紫草 地骨

【用法】水煎，和烧过人粪服。

【功用】退火凉血。

【主治】火盛而血不足，痘疮出而虽红鲜，反干燥而不充肥者。

22547 四物补心汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】当归 川芎 生地 白芍 茯神 半夏 桔梗 白术各五钱 陈皮二钱 甘草三钱

【用法】分六帖。加生姜，水煎，空心服。

【主治】产后血耗气虚，言语颠倒错乱，坐卧不安。

22548 四物补心汤

【方源】《医略六书》卷三十一。

【组成】生地五钱 白芍一钱半(炒) 川芎一钱 当归三钱 白术一钱半(炒) 枣仁三钱(炒) 远志一钱半 半夏一钱半(制) 茯神二钱(去木) 炙草六分

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后恍惚颠倒，脉虚弦者。

【方论选录】产后血亏痰滞，迷惑心窍，故心神恍惚，语言颠倒。生地壮水以滋心血，枣仁养心以宁心，白芍敛阴和心脉，当归养血荣心经，川芎行血海，白术健脾元，半夏化痰燥湿，远志通肾交心，茯神安神定心，炙草缓中益胃。水煎温服，使脾胃调和，则痰湿自化，而心血内充，心神得养，安有语言颠倒神情恍惚之患乎？

22549 四物补血汤

《眼科阐微》卷三。为《审视瑶函》“四物补肝散”之异名。见该条。

22550 四物补肝汤

《金鉴》卷七十八。为《审视瑶函》“四物补肝散”之异名，见该条。

22551 四物补肝散

【方源】《审视瑶函》。

【异名】四物补血汤(《眼科阐微》卷三)、四物补肝汤(《金鉴》卷七十八)。

【组成】熟地黄(焙干)二两 香附子(酒制) 川芎 白芍(酒洗，炒) 当归身(酒洗，炒) 夏枯草各八钱 甘草四分

【用法】上为细末。每服二三钱，食后滚白汤送下。

【主治】①《审视瑶函》：妇人产后，午后至夜昏花不明。②《疡医大全》：雀目初起，头旋，常见五色不定，目中困倦，时暗时明。

【方论选录】以熟地黄补血、当归养血为君；夏枯草入厥阴，补养血脉为臣；甘草益元气补脾胃，白芍补脾和血为佐；川芎助清阳之气上升，香附理气血，故为使耳。

22552 四物补经汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】当归 白术 香附 川芎 熟地黄 黄耆 陈皮 白茯苓各三钱 人参 阿胶 沉香(另磨) 小茴香 茱萸各二钱 粉草一钱

【用法】分八帖。加生姜三片，水煎服。兼

乌鸡丸调理。

【主治】妇人二十五六岁，血气虚冷，经脉不调，或乍痛，或下白带如鱼脑髓，或似米泔，不分信期，每来淋漓不止，面色萎黄，四肢无力，头昏目眩。

22553 四物补经汤

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】香附 当归 白芍(酒炒)各六分 熟地黄 川芎各五分 黄耆(蜜炙) 白茯苓(去皮) 白术(去芦) 黄芩 玄胡索 陈皮各四分 砂仁 小茴(酒炒) 人参 阿胶(炒)各三分 沉香(另研)三分 吴茱萸三分 粉草三分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，空心热服。

【主治】妇人二十五六岁，血海虚冷，经水不调，或时小腹疼痛，或下白带如鱼脑髓，或似米泔，不分信期，每日淋漓不止，面色萎黄，四肢无力，头昏眼花目眩。

22554 四物补经汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】当归 白鸡冠花各五钱 侧柏叶 白芍 香附各四钱 熟地 白术 人参 白茯苓 川芎 枣仁 陈皮(去白)各二钱 蒲黄(炒) 甘草各一钱

【用法】分六帖，加生姜三片，水煎服。

【主治】气血大亏，脾胃亦弱，营卫俱衰，致产后忽然下血成片似崩。

22555 四物阿胶汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】川芎 当归 芍药 地黄 乌梅 甘草 地榆 黄连 阿胶

【用法】水煎，磨墨温服。

【主治】下利脓血。

【加减】身热，加软柴胡；口渴，加干葛；脉弱，加人参；胃弱，加白术；血不止，加椿皮；脓血不止，加阿胶。

22556 四物附子汤

《外台》卷十九引《深师方》。为《伤寒

论》“甘草附子汤”之异名。见该条。

22557 四物驱风汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】当归一两 川芎五钱 白芍二钱 熟地一两 肉桂一钱 秦艽二钱 枳壳一钱半 红花一钱半 冬葵子一钱半 车前子一钱半 生芝麻三钱

【主治】孕妇平日不善调养，肝脾二经受伤，肝脾虚而风邪乘之，临产忽然口噤目翻者。

【方论选录】口噤、目翻，虚风之症现矣。若胎不下，而反上逼则危在须臾。然过于补虚，又恐留而不产，反为害事。是方四物补血，秦艽祛风，肉桂、红花行血，冬葵、车前滑窍，枳壳宽肠。胎下则气不上壅，血不逆行，虚风之症，可以渐退矣。

22558 四物青黛汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】四物汤加青黛

【用法】同煎，冲竹沥、童便服。

【主治】阴火喘逆。

22559 四物苦楝汤

《医学纲目》卷二十二。为《保命集》卷下“玄胡六合汤”之异名。见该条。

22560 四物苦楝汤

【方源】《保命歌括》卷三十一。

【组成】四物汤六钱加川楝肉 玄胡索各三钱半 吴茱萸 青皮各五分

【用法】上咬咀。加生姜三片，水二盏，煎一盏，食前温服。

【主治】脐下虚冷腹痛。

22561 四物益头散

【方源】《外台》卷十三引《小品方》。

【组成】东海益头(是由跋根) 黄牙石(又名金牙) 莨菪 防葵各一分

【用法】上药治下筛，每服方寸匕，以酒送服。

【主治】鬼魅。

【宜忌】防葵、莨菪并令人迷惑，恍惚如狂，不可多服。

【方论选录】《千金方衍义》：盖头即由跋，乃虎掌之细者，专主风毒痰肿结热；防葵治癰痈惊邪狂走；莨菪疗内痹拘急癰狂；金牙辟瘴病毒风恶气。四味皆瞑眩之药，而防葵、莨菪性禀阴毒，用者尤为切慎。

22562 四物知柏汤

《症因脉治》卷二。为《直指·附遗》卷十五“六物汤”之异名。见该条。

22563 四物和真汤

【方源】《宋氏女科秘书》。

【组成】川芎 当归 芍药 生地 白术 陈皮 香附 干姜 炙甘草

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二枚，水煎，空心服。

【主治】产后血虚发热。

22564 四物泻火汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 黄耆 黄柏 黄连

【主治】内火甚，反振慄恶寒。

22565 四物柏皮汤

【方源】《保命歌括》卷二十二。

【组成】当归梢七分 赤芍药 川芎各五分 黄柏三钱 黄连二钱 生地黄 黄芩各一钱

【用法】上㕮咀，作二服。每服水一大盏，煎七分，去滓，调益元散一钱服。

【主治】血痢暴下。

22566 四物茶调散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】薄荷 川芎 羌活 甘草 荆芥 白芷 细辛 防风 合四物汤

【主治】左偏头风。

22567 四物钩藤汤

【方源】《一盘珠》卷八。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 钩藤

【主治】急惊，目动筋挛，木旺血虚者。

22568 四物香附丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沙市方)。

【组成】干地黄四两 川芎(酒炒)三两

白芍(炒)四两 全当归四两 香附(制)八两

【用法】上为细末，用冷开水叠为丸。每服三钱，空腹温开水送下，一日二次。

【主治】妇女月经不调，气滞腹胀。

【宜忌】贫血而腹不胀者忌服。

22569 四物香薷饮

《成方便读》卷三。为《苏沈良方》卷四引《五脏论》“神圣香薷散”之异名。见该条。

22570 四物保元汤

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】白芍(酒炒) 川芎各钱半 生地 台党 生耆各五钱 当归二钱 炙草一钱

【用法】水煎服。

【主治】①《验方新编》：痼毒。②《中国医学大辞典》：营卫气血虚热不足。

22571 四物绛覆汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】细生地四钱(酒洗) 生白芍钱半(酒炒) 真新绛钱半 广橘络一钱 全当归二钱(酒洗) 川芎五分(蜜炙) 旋覆花三钱(包煎) 青葱管三寸(切，冲)

【功用】滋阴濡络。

【主治】血虚脉络郁滞，血郁化火，致郁结伤中，腕胁串痛，甚则络松血溢，色多紫暗。

【加减】痛甚者，加桃仁七粒，蜜炙延胡一钱半，活血止痛；挟火者，加川楝子一钱半，丹皮一钱半，苦辛泄热。

【方论选录】以生地、归、芍养血滋阴为君；臣以绛、覆、川芎辛润通络；佐以橘络舒络中之气；使以葱管通络中之瘀。此为轻清滋阴，辛润活络之良方。

22572 四物桂枝汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】桂(去粗皮) 麻黄(去根节)各三分 附子(炮制，去皮脐)一两 干姜(炮)一分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，用水一盞半，入生姜半分(切)，大枣三枚

(拍),同煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒阴盛。

22573 四物桔梗汤

【方源】方出《万氏家抄方》卷二,名见《医统》卷四十四。

【组成】当归 芍药 熟地 桔梗 黄柏(炒) 川芎

【用法】水二盏,煎八分,加竹沥,通口服。

【主治】干咳嗽,痰郁火邪在肺。不得志者有此疾。

22574 四物桃仁汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】当归尾 赤芍药 川芎 怀生地 桃仁 独活 香附

【主治】内伤腰痛,瘀血停滞。

【加减】有寒者,加桂枝;有热者,加大黄。

22575 四物逍遥散

【方源】《疡科心得集》卷上。

【组成】柴胡 当归 白芍 茯苓 白术 炙甘草 川芎 生地 生姜 薄荷

【主治】妇人患茧唇,阴血衰少者。

22576 四物胶薄贴

【方源】《外台》卷三十四引《集验方》。

【组成】胶(炙) 大黄 莽草 细辛各等分

【用法】上为末,以鸡子白和涂纸上。贴肿,频易,昼夜贴之。割纸穿如钱大,出肿头。

【主治】乳痈。

22577 四物益母丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】川当归(酒洗) 熟地黄(制)各四两 川芎 白芍药(炒)各二两 益母草(不犯铁器,为末)半斤 香附子(制)半斤 吴茱萸(汤泡)二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,空心酒化下。如不喜化,只作小丸吞服亦可。

【主治】妇人经水不调,小腹有块,时痛。

22578 四物益母丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】当归一两五钱 川芎 赤芍 木香各一两

【用法】上为末,益母膏为丸,每重二钱五分。

【主治】妇人经水不调,或经闭不通,干血内热,气滞腹痛;产后瘀露未尽,血块作痛之症。

22579 四物益母丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】炒当归三两 白芍二两 川芎一两五钱 生地三两 益母膏四两

【用法】上为细末,将益母膏化水泛丸,如赤豆大,约成丸九两五钱。每服二钱,开水吞服,一日二次。

【功用】养血调经。

【主治】妇女血亏,月经不调。

【备考】本方改为膏剂,名“四物益母膏”(见《全国中药成药处方集》沙市方)。

22580 四物益母膏

《全国中药成药处方集》(沙市方)。即《中药成方配本》“四物益母丸”改为膏剂。见该条。

22581 四物凉膈散

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】归身 川芎 赤芍 生地 黄芩(酒炒) 黄连(酒炒) 山梔(炒黑) 连翘 桔梗各一钱 生草 薄荷叶各五分 淡竹叶十皮

【主治】经闭发热,咽燥唇干,血实形盛,脉有力者。

22582 四物消风汤

【方源】《外伤科学》。

【组成】当归三钱 川芎二钱 赤芍四钱 干地黄五钱 防风二钱 荆芥穗二钱 白鲜皮五钱 生薏苡仁六钱

【用法】水煎服。

【功用】养血祛风。

【主治】慢性湿疹,神经性皮炎,荨麻疹。

22583 四物消风饮

【方源】《金鉴》卷七十三。

【异名】四物消风散(《医钞类编》卷二十二)。

【组成】生地三钱 当归二钱 荆芥 防风各一钱五分 赤芍 川芎 白鲜皮 蝉蜕 薄荷各一钱 独活 柴胡各七分

【用法】加红枣肉二枚,水二钟,煎八分,去滓服。

【功用】调荣滋血消风。

【主治】赤白游风,滞于血分发赤色者。

22584 四物消风饮

【方源】《外科证治全书》卷五。

【组成】生地黄四钱 归身 赤芍各二钱 荆芥 薄荷 蝉蜕各一钱五分 柴胡 川芎 黄芩各一钱二分 生甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】血虚风热,皮肤游风,瘾疹瘙痒等证;及劳伤冒风,身热口燥。

22585 四物消风散

《医钞类编》卷二十二。为《金鉴》卷七十三“四物消风饮”之异名。见该条。

22586 四物消风散

【方源】《外科真铨》卷下。

【组成】生地三钱 当归一钱 白芍一钱五分 川芎一钱 防风一钱 荆芥一钱 鲜皮一钱 虫退一钱 薄荷五分 甘草七分

【主治】赤游风。

22587 四物润导汤

【方源】《医学碎金录》。

【组成】生地四钱 油当归四钱 白芍二钱 川芎一钱 松子仁五钱 柏子仁五钱 肉苁蓉四钱 甘杞子三钱 人乳一杯(冲)

【用法】水煎服。

【主治】男子精血不足,妇人气血干枯,大肠失润,便结不行。

22588 四物调经汤

【方源】《女科万金方》。

【异名】四物调经散(《郑氏家传女科万金方》卷二)。

【组成】香附 川芎 当归 白芍 熟地 柴胡 陈皮 三棱 小茴香 莪术 白芷

黄芩 青皮 砂仁 肉桂 甘草各二钱五分

【用法】分为四帖。每帖加生姜三片,葱三根,红花三分,水二钟,煎一钟,空心热服。

【主治】女子十五六岁时,误食生冷,经脉不通,日夜乍生寒热,手足麻痹,饮食少进,头痛,恶心呕吐,腹中忽结一块,冲痛。

22589 四物调经散

《郑氏家传女科万金方》卷二。为《女科万金方》“四物调经汤”之异名。见该条。

22590 四物排风散

【方源】《女科旨要》卷三。

【组成】南星 半夏各一钱 防风 人参 羌活 防己 牛膝 杏仁 五味 当归各五钱 川芎 白芍各八分 茯苓 枣仁 白术 瞿麦各六分 枳实 白芷 天麻各四分 甘草二钱 熟地七钱

【用法】分三帖。加生姜三片,水煎,空心服。

【主治】产后忽然中风不语。因胎前先染风邪未发,以致产后中风,或兼产难,失于调理,感冒转成此症。

【加减】如泄泻,去枳实,加豆蔻、粟壳各三钱;热,加黄芩、柴胡各五钱;怕寒有汗,加黄芪、桂枝各四钱;气急,加沉香五分(磨);腹胀不思饮食,加砂仁、香附各四钱。

22591 四物麻仁丸

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归 白芍药 生地黄 川芎 麻仁 生何首乌

【主治】久病伤阴,血枯便秘,脉细而数。

22592 四物麻仁丸

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】熟地五两 当归三两 白芍两半(酒炒) 川芎一两 麻仁三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,每服三五钱,百沸汤送下。

【主治】大便燥结,脉涩者。

【方论选录】中风解后,津液不足,无以下润肠胃,故大便燥结,便秘不通矣。熟地补

阴滋血，当归养血荣经，川芎活血中之气，白芍敛血中之阴，麻仁润燥以通虚闭也。蜜丸以缓之，沸汤以下之，使阴血内充，则津液自润，而肠胃融和，大便无燥结之患矣。

22593 四物麻仁汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地 干姜 麻仁 附子 桂 皂荚

【主治】阴结，不大便。

22594 四物鹿胶汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】当归 鹿胶各一钱五分 杜仲(盐水炒)一钱 补骨脂(盐水炒) 白芍(酒炒) 川芎 丝饼 川续断各一钱 熟地二钱

【功用】温补。

【主治】屡患堕胎。

22595 四物清肺汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】大熟地五钱 当归尾三钱 川芎二钱 赤芍三钱 梔子三钱 银花三钱 胡黄连三钱 石决明四钱 槐实三钱 甘草一钱 冬虫草五分

【用法】水煎服。

【主治】迎风流热泪。

22596 四物葵花汤

【方源】方出《保命集》卷下，名见《何氏济生论》卷七。

【组成】四物汤加熟地黄、当归各一两

【主治】经水少而血色和者。

22597 四物款冬丸

【方源】《外台》卷三十六引《小品方》。

【异名】款冬花丸(《卫生总微》卷十四)。

【组成】款冬花 紫菀各一两半 伏龙肝一分 桂心二分

【用法】上药治下筛，蜜和如泥。取如枣核大，涂乳头，令儿饮之，一日三次。

【主治】少小咳嗽，昼愈夜甚，初不得息，不能复啼。

【方论选录】《千金方衍义》：咳嗽昼愈夜

甚，在少年当责之阴虚，在老人当责之血燥，在小儿当责脾胃虚冷，故用桂心、伏龙肝之辛温实脾，以助款冬、紫菀温肺之力。

22598 四物滋阴汤

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】当归二钱 生地黄一钱(勿用熟) 芍药一钱 川芎五分(宜少用) 牛蒡子八分(咽痛者加重用) 连翘八分(舌生疮者加重用) 干葛八分(热迫下泻者重用) 黄芩八分(口气出热者加重用) 红花五分 柴胡一钱 赤桂柳三茎

【用法】水煎服。

【功用】养阴。

【主治】麻疹暗黑焦枯，热盛不退，阴血受伤。

22599 四物解肌汤

《普济方》卷三六九。为《千金》卷五“芍药四物解肌汤”之异名。见该条。

22600 四物解毒汤

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】当归 白芍(酒炒) 生地 元参 梔子(炒) 川芎 生甘草 黄连(酒炒) 黄柏(酒炒) 黄芩(酒炒)

【用法】水煎服。

【主治】女子出痘，或遇经行，过期不止，乃毒热乘入血室。

22601 四物解毒汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】枳壳 白术 槐角 秦艽各等分

【用法】水煎服。

【主治】痔头向上，是大肠热甚，收缩而上者。

22602 四物解毒汤

《痘疹会通》卷四。为方出《保命集》卷下，名见《万氏女科》卷一“四物加芩连汤”之异名。见该条。

22603 四物梁米汤

【方源】《千金》卷十五。

【异名】梁米汤(《圣济总录》卷一七九)、四味梁米汤(《圣济总录》卷一九〇)。

【组成】梁米 稻米 黍米各三升 蜡(如弹丸大)

【用法】以水五升,煮梁米三沸,去滓;复以汁煮稻米三沸,去滓;复以汁煮黍米三沸,去滓;以蜡纳汁中和之,蜡消取以饮之。

【主治】①《千金》:小儿泄注。②《医方考》:心劳吐衄,久服寒凉之剂,因坏脾胃。

【方论选录】①《医方考》:心是脾之母,脾是心之子,脾因寒凉而坏,则必盗母气以自养,而心益病矣,求其不殆得乎?故宜调脾益胃。调脾者,莫如谷气,故用稻、梁、黍米;复用蜡者,取其厚肠胃云尔。②《千金方衍义》:安谷者昌。脾伤不能安谷,所以萃聚诸谷兼以至淡之蜡,略无苦味之物,以清肠胃之滞,专为婴儿畏药计也。

22604 四物澄波散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】胆矾(走水,洗去沙土)四钱 干姜(炮裂)半两 滑石(研) 秦皮(去粗皮)各一两

【用法】上为散。每用半钱匕,以沸汤浸,澄清洗之。

【主治】眼连睑赤烂,涩痛羞明。

22605 四和丁香散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】肉豆蔻一两(分作四份,一份入陈米炒过,去米不用;一份入丁香二钱,梗米一合,和炒裂,去米;一份面煨,去面;一份生用) 甘草三两(半蜜炙,半生用) 沉香二钱(生用,不见火) 干姜二两(炮)

【用法】上为细末。每服二钱,食前米饮调下;或地榆、诃子煎汤调下亦得。

【功用】壮气,固肠胃,生津液,止泻。

【主治】年高脾胃不和,饮食不化,频频洞泄,四肢无力,行步艰辛。

22606 四制川楝丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】川楝子(去核)一斤(分四份:一盐炒,去盐;一破故纸一两炒,俱用;一斑

蝥一个去翅足炒,去斑蝥;一小茴香六钱,同盐炒,去盐,并用茴香)

【用法】面糊为丸,如梧桐子大。每服六十丸,用川芎、当归、生地黄、白芍药、小茴香(盐水炒)、破故纸(炒)、杜仲(炒去丝)、海藻各等分水煎,与丸药间服。

【主治】疝。

22607 四制化痰丸

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】半夏一斤(分作四份,勿切碎。一份用生姜、黄连各一两,水二碗同煮干,去姜、连;一份用知母、贝母各一两,水二碗同煮干,去二母;一份用人参、杏仁去皮尖各一两,水二碗同煮干,去参、杏;一份用桔梗、桑皮各一两,水二碗同煮干,去桑、桔)

【用法】拣出半夏,切碎晒干,为末,水糊为丸。每服四五十丸,生姜汤送下。

【主治】①《万氏家抄方》:男妇虚火咳嗽,哮喘吐痰,胸膈饱胀暖气,一切痰症。②《医略六书》:肥人嗜酒好味,胃口生痰生火,脉数者。

【方论选录】《医略六书》:湿热生痰,滞于胃口,故痞满不消,恶心不止焉。半夏一味,功为燥湿化痰,煮以黄连,清火燥湿,生姜解郁散痰,知母清热润燥,贝母解热清痰,人参扶元益胃气,杏仁降气豁痰涎,桑皮肃金泻湿热,桔梗清咽利胸痞。使湿热消化,则脾胃清和,而痞满无不解,何恶心之不止哉!

22608 四制乌附丸

《竹林女科》卷一。为《万氏女科》卷一“四制香附丸”之异名。见该条。

22609 四制白术丸

【方源】《何氏济生论》卷四。

【组成】白术十两(分四处,用故纸、吴萸、小茴、肉蔻四味各同一份,浸一夜,炒干,拣出白术用) 人参一两 山药一两(炒) 陈皮五钱 茯苓 白芍(酒煨) 木香五钱 砂仁五钱 干姜五钱 老莲肉(炒)四两

【用法】米饮为丸。每服百十丸，米饮送下。

【主治】脾虚久泻。

22610 四制白术散

【方源】方出《丹溪心法》卷三，名见《医学正传》卷五。

【异名】四制仙术散（《纲目拾遗》卷三）。

【组成】白术四两（分作四份：一份用黄耆同炒，一份用石斛同炒，一份用牡蛎同炒，一份用麸皮同炒）

【用法】上各炒微黄色，去余药，只用白术研细。每服三钱，粟米汤调下。

【主治】盗汗。

【备考】本方方名，《赤水玄珠》引作“白术汤”。

22611 四制白术散

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】白术八两（分作四份，一份砂仁炒，一份糯米炒，一份麸皮炒，一份壁土炒）

【用法】拣净，为末。量大小，乳酒调服。

【功用】调脾。

【主治】饮食不能樽节，暑湿不能护养，肚腹伤坏，泄泻频仍，饮食懒进，肢体羸瘦，愈未几而痘随出。

22612 四制白术散

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】白术一斤（米泔水浸软，咀片，分作四份，一份用白豆蔻仁炒，一份用破故纸炒，一份用五味子炒，俱以炒干为度，拣去同炒药）

【用法】将白术研极细，用陈仓米、莲子作粉，打糊为丸，如梧桐子大。量服。

【主治】脾泄。

【备考】本方方名，据剂型，当作“四制白术丸”。

22613 四制仙术散

《纲目拾遗》卷三。为方出《丹溪心法》卷三，名见《医学正传》卷五“四制白术散”之异名。见该条。

22614 四制苍术丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】苍术（分作四份制：一份用破故纸、小茴香同炒；一份用川楝子同炒；一份用川椒同炒；一份用青盐同炒）

【用法】上药同炒毕，余药不用，只用苍术为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【功用】燥脾土，固真养胃。

【主治】痰饮。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“固真丹”。

22615 四制苍术丸

【方源】《普济方》卷二二四引《德生堂方》。

【组成】苍术一斤（分四处，一份酒浸，一份童子小便浸，一份泔水浸，一份盐水浸；春五、夏三、秋五、冬七日）川椒（去目，炒）小茴香 破故纸（酒浸，炒）川楝肉（炒）何首乌 白茯苓各四两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五六十九，空心酒或盐汤送下。

【功用】上明眼目，中暖水脏，下补丹田，疏风顺气，乌髭发。

【主治】凡病愈后，气体不得复元者。

22616 四制苍柏丸

《医学入门》卷七。为《万氏家抄方》卷一“四制柏术丸”之异名。见该条。

22617 四制良姜丸

【方源】《医统》卷五十六。

【组成】良姜四两（分作四份制，一份用陈壁土同炒黄，去土；一份用斑蝥三十四个炒黄，去斑蝥；一份用巴豆三十四个去壳，同炒黄，去豆；一份用陈仓米四合同炒黄，去米）吴茱萸一两（拣净，酒浸一宿）

【用法】上将吴茱萸同制良姜再炒，为细末，用浸茱萸酒煮，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，更看病人腹中冷热加減，空心生姜汤送下。

【主治】冷气心痛。

22618 四制抱龙丸

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】天竺黄五钱 辰砂二钱 胆星一两 雄黄二钱 麝香一分半

【用法】上为极细末，另用麻黄、款冬花、甘草各五钱，煎汤去滓，慢火熬成膏，合药末为丸，如芡实大。每服一丸，薄荷汤化下。

【主治】阳痢，痰涎壅盛者。

22619 四制枳壳丸

《医统》卷四十一。为《医方大成》卷七引《简易》“四妙丸”之异名。见该条。

22620 四制柏术丸

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【异名】四制丸（《摄生众妙方》卷四）、二妙丸（《医统》卷九十三）、四制苍柏丸（《医学入门》卷七）。

【组成】黄柏（去皮，净）四斤（一斤酥炙十三次，一斤乳汁浸十三次，一斤童便浸十三次，一斤米泔浸十三次） 无油苍术（去皮，净）一斤（川椒炒四两，破故纸炒四两，五味子炒四两，川芎炒四两）

【用法】去四味同炒之药，只用苍术、黄柏为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，早酒下，午茶下，晚白汤下。

【功用】滋阴降火，开胃进食，尽除周身之湿。

【主治】①《万氏家抄方》：湿病。②《医学入门》：湿热痿证。

22621 四制茱萸丸

《医学入门》卷七。为《局方》卷八（吴直阁增诸家名方）“夺命丹”之异名。见该条。

22622 四制香附丸

【方源】《万氏女科》卷一。

【异名】四制乌附丸（《竹林女科》卷一）。

【组成】香附（净）一斤（杵，分四制，酒、醋、盐水、童便各浸三日，焙研） 乌药八两

【用法】上为末，醋糊为丸。白汤送下。

【主治】因抑郁而致经闭者。

22623 四制香附丸

【方源】《摄生众妙方》卷十一。

【组成】香附米一斤（四两酒浸，四两盐汤浸，四两童便浸，四两醋浸，各三日，滤干，炒） 当归四两（酒浸） 川芎四两 熟地炭四两（姜汁炒） 白芍药四两（酒炒） 白术二两 陈皮二两 泽兰叶二两 黄柏一两（酒炒） 甘草一两（酒炒）

【用法】上为末，酒糊为丸。每服七十丸，空心白汤送下。

【功用】调经养血，顺气健脾。

【主治】①《摄生众妙方》：不孕。②《饲鹤亭集方》：妇女经水不调，赤白带下，腹痛胞闭，阴虚气滞，不能生育。

【宜忌】《饲鹤亭集方》：忌食牛肉 莱菔、生冷诸物。

22624 四制香附丸

《医学入门》卷八。为《普济方》卷三三二引《瑞竹堂方》“四制醋附丸”之异名。见该条。

22625 四制香附丸

《墨宝斋集验方》卷上。为方出《女科万金方》，名见《墨宝斋集验方》卷上“妇宝丸”之异名。见该条。

22626 四制香附丸

【方源】《穷乡便方》。

【组成】香附米（分作四份：用苏木一两煎汤浸一份，红花一两煎汤浸一份，桃仁去皮尖一两煎汤浸一份，泽兰草一两煎汤浸一份。各浸三日）

【用法】单用附米为丸。每服二钱一分，空心米汤饮下。

【主治】年少妇人经水或来或止。

22627 四制香附丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】香附子（杵，去皮毛，净子）八两（分作四份，酒、醋、童便、盐水煮，晒，炒） 黄柏（酒炒） 熟地黄各一两（酒水煮烂捣膏） 泽兰叶（净叶） 川芎（酒洗，炒） 白芍药（酒洗，炒） 当归（炒） 各一两半 益母草四两（勿犯铁器）

【用法】除地黄膏另入，余共为细末，铺地一宿，去其火性，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三钱，空心滚白汤送下；或食远亦可。

【主治】妇人产后崩漏，亡血过多，致睛珠疼痛，经水不调。

22628 四制香附丸

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】香附一斤（作四份，童便、酒、醋、米泔各浸一份，春三日，夏一日，冬五日，取起晒干为末）当归（酒洗）八两（为末）

【用法】水泛为丸。每服三钱，白汤送下。

【功用】调经养血，顺气。

【主治】无子。

22629 四制香附丸

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】香附二斤（分四处，一童便、一米泔、一米醋、一盐水，各浸七日，一日一换，取出炒黄，勿焦）当归（酒洗）一斤 熟地（艾叶二两煎汤拌蒸）川芎 白芍 条芩（炒）各八两

【用法】上为末，炼蜜为丸。空心清汤送下。

【功用】种子。

【加减】血热，加生地八两。

22630 四制香附丸

【方源】《会约》卷十四。

【组成】净香附片一斤（用酒、醋、童便、盐水各浸四两，三日，焙，研）山药八两（研末）

【用法】开水泡糊为丸。白汤送下。

【主治】气结经闭，脉实体旺者。

【宜忌】非脉实体旺者禁之，以性辛燥也。

22631 四制香附丸

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】香附四两 当归三两 广艾绒二两 白芍 黄芩 丹参各二两 生地四两 川芎一两五钱 甘草 广皮 砂仁各一两

【主治】妇人经水不调，赤白带下，气血凝滞，腹痛经闭，或气块血块，两胁胀满，及呕吐恶心，胎前产后一切等证。

【方论选录】妇人之病，首重调经，经调则诸病易愈。即胎前产后，亦当观其气血之盛衰寒热而调之，调之之法固不同，而总不外乎先理其气，使气顺则血调之意。此方以丹参四物和血调经，必假香附之善行气分者，为之先道，故以为君。然所以资生血气者，又在于脾，若脾虚气滞，则经血亦为之不调，故以甘草、陈、砂补脾疏滞。于是观其病之偏于寒者，则用广艾绒以温之；偏于热者，则用黄芩以清之。是以医不执方，加减在乎人用耳。

22632 四制香附丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】香附（炙）一百六十两 当归六十四两 白芍三十二两 熟地四十八两 白术（炒）三十二两 川芎十六两 橘皮三十二两 黄芩三十二两 砂仁八两 木香四两

【用法】上为细末，用黄酒八十两，加冷开水泛为小丸。每服二钱，一日二次，温开水送下。

【功用】调经养血，舒郁和肝。

【主治】气逆结滞，经水不调，血块腹痛，久不孕育。

22633 四制益母丸

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】益母草三十二两 当归十六两 川芎八两 木香八两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，三钱重，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下。

【主治】行经腹痛，腹胀胁满。

22634 四制益母丸

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】坤草半斤 当归 赤芍 木香各二两 人参

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱，蜡皮封固。

【主治】经带病。

【备考】方中人参用量原缺。

22635 四制益母丸

【方源】《全国中药成药处方集》(福州方)。

【组成】炙甘草一两半 川抚芎一两半 漂白术三两 九蒸地黄八两 酒白芍三两 广木香一两 益母草四两 艾叶四两 炒阿胶一两 茯苓三两 香附四两 当归四两 缩砂仁二两 京丹参二两 陈皮二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每粒重一钱五分，黄蜡封固。

【功用】未孕调经，即孕安胎，调和经脉，祛散风邪。

【主治】妇人胎前产后诸般病症。

22636 四制益母丸

【方源】《全国中药成药处方集》(青岛方)。

【组成】坤草一斤半 橘红五两 白芍五两 白术五两 当归五钱 沉香五钱 川芎五两 砂仁二钱五分 生地十两 木香二两五钱 茯苓五两 牛膝二两五钱 乌药五两 甘草二两 人参二两 琥珀二两五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱五分，蜡皮封固。

【主治】经带病。

22637 四制黄芩丸

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】枯黄芩六两(泡，刮去皮，取净四两，分作四处，荆芥穗五钱煎汁浸一两，薄荷四钱煎汁浸一两，丹皮八钱煎汁浸一两，郁金五钱煎汁浸一两；各浸二日)

【用法】并汁煮干，为末，以粉葛二两煎汤打糊为丸，如绿豆大。每服一钱，食后茶清送下。

【主治】赤鼻，面上酒疮，酒渣。

22638 四制黄柏丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】黄柏一斤(分作四份，一份酒浸，一份蜜炒，一份童便浸，一份盐水炒) 知母一斤(去毛，切碎)

【用法】先以黄柏研成末，用知母煎熬成膏为丸，如梧桐子大。每服七十丸，白汤送下。

【主治】上盛下虚，水火偏胜，消中。

22639 四制黄柏丸

【方源】《赤水玄珠》卷一。

【组成】黄柏(去粗皮，净)四斤(一斤以好酒浸，一斤米泔水浸，一斤蜜糖水浸)

【用法】上俱用瓷器浸之，三味俱要没二指为度，冬月浸七日，夏浸三日；春秋五日，滤出晒干，仍存余汁待后用；再将黄柏一斤切作五寸长，用真酥油半斤，以瓷碗盛之，先将铜铤将水熬滚，再将酥油连碗入水溶化，将黄柏以微火炒热，用棕刷蘸酥徐徐刷上，且刷且炙，各使透彻，切忌焦黑，炙毕放于冷地上，以瓷碗复之二日，去火毒。并前共为细末，以前存原汁和为丸；如汁不敷，再加蜜酒兑匀和之为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心及临卧酒吞下，徐以干物压之。

【功用】滋肾降火化痰。

【主治】吐血，遗精。

【加减】如相火周身疼痛，减黄柏二斤，加犀角一两为末，入前丸中。

22640 四制揀实丸

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】葫芦巴 楝子二斤三两四钱 青木香一斤十四两 橘核二斤八两 巴戟一斤十四两 吴萸一斤十四两 青皮 茴香 柴胡 木通各一斤十四两 川乌一斤

【用法】上为细末，水泛小丸。

【主治】气滞积聚。

【备考】方中葫芦巴用量原缺。

22641 四制醋附丸

【方源】《普济方》卷三三二引《瑞竹堂方》。

【异名】四制香附丸(《医学入门》卷八)。

【组成】香附子一斤(带毛，分作四份，一份盐水浸七日，一份米醋浸七日，一份小便浸，一份酒浸；各焙干)

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前温酒送下。

【主治】妇女经候不调。

【加减】瘦人，加泽兰叶、赤茯苓各二两。

【方论选录】《丹溪心法附余》：香附子血中之气药也，妇人血用事，今用香附子开郁行气，盖气行而血亦行矣，何病之不瘳哉！

22642 四制鳖蛭丸

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】归尾五钱 大黄 荆芥 桔梗 乳香（炙） 没药（炙）各二钱 黄芩 连翘各三钱 防风 羌活各二钱半 全蝎一钱 蝉蜕二十个（去头） 僵蚕二十五个 牛皮胶一两（土炒） 雄黄七分 金头蜈蚣四条（去头足，分作四样法制：一条用姜汁搽，焙干；一条用香油搽，焙干；一条用醋搽，焙干；一条用酥搽，炙） 穿山甲四两（亦作四制：一两用红花五钱煎汤煮，焙干；一两用牙皂五钱煎汤煮，焙干；一两用紫草节五钱煎汤煮，焙干；一两用苏木五钱煎汤煮，焙干）

【用法】上为细末，真米醋打糊为丸，每丸重一钱二分，朱砂一钱五分共为衣，瓷瓶收贮，瓶内放麝香五分以养之。每服一丸，滚酒送下。

【主治】一切无名肿毒，瘰癧。

22643 四季三黄丸

《北京市中药成方选集》。为《千金》卷二十一引巴郡太守“三黄丸”之异名。见该条。

22644 四季侧柏散

【方源】《奇效良方》卷五十一。

【组成】侧柏（烧存性。春采东，夏采南，秋采西，冬采北）

【用法】上为细末。每服二钱，糯米饮调下。

【主治】肠风脏毒，下血不止。

【备考】一方用侧柏叶一斤（洗，炙），为末。每服二钱，食前枳壳汤调下。

22645 四炒川楝丸

《医学入门》卷七。为《百一》卷十五“川楝子丸”之异名。见该条。

22646 四炒固真丹

《医学入门》卷七。为《普济方》卷二二六引《十便良方》“固真丹”之异名。见该条。

22647 四炒枳壳丸

《得效》卷六。为《医方大成》卷七引《简易》“四炒丸”之异名。见该条。

22648 四炒枳壳丸

【方源】《回春》卷三。

【组成】枳壳四两（米泔浸，去瓢，分四处炒之：一份苍术一两同煮干，炒黄色，去苍术；一份萝卜子一两水同煮干，炒黄，去萝卜子；一份小茴香一两水同煮干，炒黄色，去茴香；一份干漆一两水同煮干，炒黄色，去干漆） 香附二两 槟榔一两 玄胡索一两（微炒） 三棱二两（同莪术法制） 莪术一两（棱、莪二味，用童便一钟浸一宿，次日用完巴豆仁去壳三十粒，同水煮干，炒黄色，去豆不用）

【用法】上为细末，用苍术、茴香、萝卜子、干漆煮汁，好醋一碗，同面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，清米汤送下。

【功用】宽中快膈快气，消导饮食。

【主治】气血凝滞，腹内鼓胀积聚。

22649 四炒健脾散

【方源】《奇效良方》卷十七。

【组成】苍术四两（麸炒） 干姜四两（灰炒） 乌头六两（以江水浸七日，取出切片，以盐四两炒干；或先切片子，以江水浸两日，炒黄为度，同盐取出） 甘草五两半（炒）

【用法】上为细末。每服一钱，食前用白汤入盐调服。

【功用】进食。

22650 四炒楝实丸

《回春》卷五。为《百一》卷十五“川楝子丸”之异名。见该条。

22651 四治黄连丸

【方源】《本草纲目》卷十三引《韩氏医通》。

【组成】连珠黄连一斤（分作四份：一份用酒浸炒，一份用自然姜汁炒，一份用吴茱萸汤浸炒，一份用益智仁同炒，去益智，研末） 白芍药（酒煮，切，焙）四两 使君子仁（焙）四两 广木香二两

【用法】上为末，蒸饼为丸，如绿豆大。每服三十丸，食前米饮送下，一日三次。

【主治】五疳八痢。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

22652 四宝大神丹

【方源】《纲目拾遗》卷八引《家宝方》。

【组成】马料豆五升（用混堂油制九次）黄耆八两（人乳制七次）白当归（酒洗）四两 金樱子二斗（去内子与毛，外去刺，淘净熬膏，临收时，加童便一二盏）

【用法】前三味和金樱膏为丸，如梧桐子大。每服三钱，桂圆汤送下。

【主治】五劳七伤。

【宜忌】忌腥臭、发物、房事。

22653 四草定痛汤

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】山薄荷 宝塔草 矮金屯叶 皱面藤叶

【用法】上药生采叶，搗酒服；根、梗煎酒服。

【主治】打扑跌堕压磕等伤肿痛。

22654 四炭阿胶汤

【方源】方出《时病论》卷三，名见《湿温时疫治疗法》。

【组成】银花 生地 白芍 黄芩（四者均炒为炭） 阿胶（炒珠） 山药（炒黄） 陈皮 石莲

【主治】阴虚之体患五色痢。

【临证举例】五色痢 鄂渚余某之甥，患痢两月余矣，憔悴不堪，夜不成寐，渴饮不食，脉数苔无，取观所下之痢，五色杂见。丰曰：此五色痢也，乃凶症耳。石顽有云：痢下五色，脓血稠粘，滑泄无度，多属阴虚。今此证分明久痢伤肾，下焦不摄，即先哲所谓阴虚痢是也。斯时即有湿证所彰，亦不能投之渗利。当用本方，连尝三四服，遂中肯矣。登圆略减数遭，惟口渴寐少，脉转小数，欠力欠神，此气血津液，皆亏损也。照前方除去枯芩，加入东参、炙草、夜交藤，服数剂更

为合拍。后用六味合四君为主，调治月余，始得痊愈。

【备考】《湿温时疫治疗法》本方用银花炭、条芩炭、白芍炭各一钱半，生地炭三钱，真阿胶一钱半，炒黄淮药三钱，广陈皮、甜石莲各一钱半。

22655 四香三米饮

【方源】《普济方》卷三八三。

【组成】木香 丁香 檀香各等分 藿香叶加两倍 早米 晚米（或陈仓米尤妙）糯米各等分（上三味炒熟）

【用法】每服米药三钱重，水一盞煎，不拘时候服。

【主治】小儿疳伤，紧泻遗粪，带馊酸臭，气秽至二三尺远。

22656 四顺附子汤

【方源】《妇人良方》卷八。

【组成】生附子（去皮脐） 白姜（炮） 甘草 人参各一两

【用法】上咀咀。每服四钱，水二盞，煎至七分，去滓，空心服。

【功用】峻补。

【主治】①《妇人良方》：下痢纯白，状如鱼脑，脐腹冷痛，日夜无度，手足逆冷；或有呕逆，全不入食，饮食欲温而恶冷，六脉微细；甚者，四肢逆冷，六脉沉绝。②《奇效良方》：吐泻过多，手足逆冷，六脉沉细，气少不语；及霍乱转筋，肉冷汗出，呕呃。

【宜忌】凡痢疾虽体寒，手足逆冷，冷汗自出，六脉沉伏，不宜轻用附子。

【加减】吐泻、腹痛，加桂半两；小便不利者，加茯苓半两。

22657 四顺制痢汤

【方源】《痘科辨要》卷八。

【组成】当归 芍药 大黄（酒炒） 鹧鸪菜各大 甘草减半 乌梅 地丁各中 胡黄连 雄黄各少许

【用法】水煎，温服，临欲饮时，加雄黄末。

【主治】痘已见至三四日，火热未解，内有

蛔虫，下唇纯红如石榴花，腹肚时痛，大便未通，小水赤涩，动气冲胸肋者。

22658 四顺凉肝散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】荆芥 川芎 当归 防风 赤芍药 甘草 汉防己各等分

【用法】水煎，温服。

【主治】视物不明，如纱遮睛者。

22659 四顺理中丸

《千金》卷三。为《伤寒论》“理中丸”之异名。见该条。

22660 四顺理中丸

【方源】《医方类聚》卷二二引《仙传济阴方》。

【组成】黑豆一升（炒熟，去皮） 香附子末四两半 干姜（炮） 生干地黄各一两

【用法】上为末。炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以米饮吞下。

【主治】新产五指暴露，羸弱少气，体常自汗。

【备考】本方改为汤剂，名“四顺理中汤”（见《宋氏女科》）。

22661 四顺理中汤

《东医宝鉴·杂病篇》卷二。即《伤寒论》“理中汤”加甘草一倍。见该条。

22662 四顺理中汤

《宋氏女科》。即《医方类聚》卷二二引《仙传济阴方》“四顺理中丸”改为汤剂。见该条。

22663 四顺清凉饮

《得效》卷八。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

22664 四顺清凉饮

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】大黄（米上蒸，晒干） 赤芍药 当归 甘草（微炙） 青皮 枳壳各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一钟，煎至五分，不拘时候。

【主治】小儿热证腹痛，血热蕴结壅滞。

22665 四顺清凉饮

【方源】《幼科发挥》。

【组成】白芍 当归 生地 甘草 柴胡

【主治】①《幼科发挥》：中焦热。②《痘疹一贯》：中焦热，津液少而便秘。

22666 四顺清凉饮

《外科正宗》卷四。为《婴童百问》卷四“清凉饮子”之异名。见该条。

22667 四顺清凉饮

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】当归 酒芍 瓜蒌 熟军 甘草 丹参

【主治】大便秘结，火壅血燥，而耗津液。

22668 四顺清凉散

【方源】《异授眼科》。

【组成】大黄（酒炒） 川芎 山栀 赤芍 没药（制去油） 归身 枳壳 香附（醋炒） 生地 甘草各等分

【用法】上为末。米汤下。

【主治】白膜遮睛。

22669 四顺清凉膏

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】芍药 当归（酒洗） 黄连（姜炒）各五钱 生地（酒洗） 甘草 大黄（酒蒸九次） 黄芩（炒）各三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，白汤送下。

【主治】小儿热结，大便不通。

22670 四将军饮子

【方源】《医说》卷五引《类编》。

【组成】大附一枚（炮，去皮脐，四分之一） 诃子四个（炮，去核） 陈皮四个（全者，洗净，不去白） 甘草四两（炙）

【用法】上切，为四服。用水二盏，加生姜七片，大枣七枚，煎去五之三，药成持饮。

【主治】病痞临发，因中心抑郁，阴阳交战至于厥厥。

22671 四逆双解散

【方源】《点点经》卷三。

【异名】养阳双解散。

【组成】四逆理中汤加大黄二钱 芒消二

钱

【主治】脉来缓浮，呕恶，手足逆冷，大便不通，小便自利，或泄泻硬胀。

22672 四逆承气汤

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】淡附片二钱 干姜一钱 炙甘草五分 厚朴一钱五分 麸炒枳实二钱 玄明粉三钱 酒蒸大黄六钱 乌梅一枚 川连一钱(酒炒) 川椒三十粒(炒去汗)

【用法】水煎服。

【主治】干霍乱。

22673 四逆茱萸汤

《圣济总录》卷三十八。为《伤寒论》“当归四逆加吴茱萸生姜汤”之异名。见该条。

22674 四逆茱萸汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】甘草(炙)二钱 干姜(炮)三钱 附子三钱(或生用) 吴茱萸二钱(开水泡，一次用) 生姜一钱半 大枣四枚

【用法】水煎，冷服。

【主治】阴证厥逆，脉弱囊缩者。

【加减】加人参更妙；如腹痛，加白芍二钱。

22675 四逆姜萸汤

《杏苑》卷七。为《伤寒论》“当归四逆加吴茱萸生姜汤”之异名。见该条。

22676 四逆理中汤

【方源】《点点经》卷三。

【组成】条参 白术 秦艽 川芎 羊藿 白茯苓 干葛 桂心 附子 姜炭 甘草

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】酒伤脾胃，四肢逆冷，冷汗常作，发肤焦枯，饮食不思，脉来沉，寸部迟细，尺部洪数。

22677 四神附子丹

《普济方》卷二二五。为《幼幼新书》卷九引李安仁方“酒煎附子四神丹”之异名。见该条。

22678 四神附子煎

《传信适用方》卷二。为《幼幼新书》卷九引李安仁方“酒煎附子四神丹”之异名。见

该条。

22679 四神治痢丸

【方源】年氏《集验良方》卷三。

【组成】川连八两(吴萸同炒) 木香 槟榔 川大黄(蒸)各二两 吴萸(汤泡，炒连)一两 (一方加炒过石莲肉更妙)

【用法】醋糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心服。

【主治】一切痢疾初起，腹痛后重。

22680 四神消积丸

【方源】《慈幼新书》卷十。

【组成】陈皮三两 川厚朴二两 青皮二两(醋炒) 广木香五钱 枳实二两(蒸) 京三棱一两(煨，切) 槟榔二两 蓬莪术二两(煨，切) 山楂肉二两 半夏曲二两 麦芽二两 吴茱萸一两 神曲二两(炒) 香附米二两(炒) 砂仁一两(炒) 白芥子五钱(炒)

【用法】萝卜汤送丸。食远白汤下。

【主治】食积伤生冷硬，不能克化，心腹满痛。

22681 四配清中饮

《疡医大全》卷三十三。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

22682 四海舒郁丸

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】青木香五钱 陈皮 海蛤粉各三钱 海带 海藻 昆布 海螵蛸各二两(俱用滚水泡去盐)

【用法】上为细末。每服三钱，不拘酒、水，一日三次；滓沉在碗底内者，敷气颈上。

【主治】因七情抑郁不伸，肝脾气郁不舒致气颈，结喉之间，气结如胞，随喜怒消长，甚则饮食噎碍。

【临证举例】气颈(甲状腺肿大) 《江苏中医》(1958; 9: 29): 曾治疗4例女性患者，肿大的甲状腺均渐变软、变小，其他伴随症状减轻或消失。作者认为：气颈多属气郁痰阻所致，治用四海舒郁丸理气化痰，软坚散

结,一般在服药1~1.5个月后,颈间肿大之甲状腺都能变软、变小,连服2~3个月,可以消散。所有眼突、心悸、失眠、手颤等现象,亦能逐渐消失。

【备考】愈后用黄药子四两,生酒三大壶,煮三炷香,窖一七去火毒,早、晚任饮数杯。

22683 四黄夺命丹

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】大黄 黄芩 黄连 黄柏(上俱酒炒) 胆星 焦梔 知母 甘草 枯矾(斟酌用之) 竹叶(或加砂仁)

【功用】急下降火救阴。

【主治】妊娠心脾二经伏火上炎,舌肿痛,或木舌,重舌,唇如涂朱,舌晕煤黑,舌长齿唇之外不收,水谷难以咽,胎上逼心,烦闷欲死,危在旦夕。

【方论选录】是方黄芩清上,黄连清中,黄柏清下,大黄直驱涤肠胃之热邪,釜底抽薪,九死一生之法也;甘、梔、知母佐芩、连、柏导上中下三焦屈曲之火,引之下行;枯矾之酸涩、胆星之苦寒、辰砂之重镇,皆所以为佐使也。

22684 四黄涤痰丸

【方源】方出《鸡鸣录》,名见《重订通俗伤寒论》。

【组成】川大黄四两(用竹沥一两,姜汁一钱,朴消三钱拌蒸三次) 菱仁(去油) 蛤壳(煨,飞) 橘红(炒)各四两 茯苓 陈胆星(姜制,蒸) 茅术(炒)各三两 天麻(煨) 浮石(煨,飞) 蓬术(酒炒) 白芥子(炒) 各二两 薄荷叶一两六钱 石菖蒲 沉香 青黛(飞)各一两 制半夏(竹沥、姜汁炒)六钱 川黄连(姜汁炒)五钱 天竹黄三钱 白蔻仁三钱 冰片一钱

【用法】上为细末,以竹沥九分,姜汁一分为丸,如绿豆大,再用煨石膏五钱,牛黄二钱,辰砂一钱三味研细为衣。每服一二钱,开水送下。

【功用】化痰。

【主治】胸膈迷闷,气逆咳呛,及哮喘中痰。

22685 四蒸木瓜丸

【方源】《三因》卷四。

【异名】四蒸丸(《魏氏家藏方》卷八)。

【组成】威灵仙(苦苧苳同入) 黄耆(续断同入) 苍术(橘皮同入) 乌药(去木,与黄松节同入)各半两

【用法】以大木瓜四个切盖去瓢,入前件药,仍用盖簪定,酒酒蒸熟,三蒸三晒,取药出,焙干为末,研瓜为膏,搜和捣千杵为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温酒、盐汤任下。

【主治】①《三因》:肝肾脾三经气虚,为风寒湿搏着,流注经络,竭日旷岁,治疗不痊,凡遇六气更变,七情不宁,必至发动,或肿满,或顽痹,憎寒壮热,呕吐自汗。②《魏氏家藏方》:新旧脚气,不论干湿。

22686 四壁樞朱砂

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】针砂一斤 硫黄四两 朱砂三两 白矾七两 盐一两

【用法】上以浓醋一斗五升,煮针砂、硫黄二味令干,以火煨之,待鬼焰出尽后,放冷再研。别入硫黄二两,又用醋一斗五升更煮,候干,依前煨之,鬼焰尽即止,放冷,以水淘取紫汁,去其针砂,澄紫汁极清,去其清水尽,阴干,即入白矾、盐同研,纳瓷瓶中,四面下火煨之,候瓶内沸定即止,待冷出之,细研,以醋拌为樞,先用药一半,入铅桶中筑实,即以金箔两重、朱砂入樞上,又以余樞盖之,筑实,以四两火养三七日,即换入铜桶中,密固济,用六两火养三七日足,即用十斤火煨之,住火自消,寒炉出药,朱砂已伏,于湿地薄摊,盆合一复时,出火毒了,细研,以枣肉为丸,如麻子大。每服五粒,空腹以温水送下。

【功用】除风冷,温暖骨髓,悦泽颜色,延年益寿。

【宜忌】忌羊血。

22687 四十号蛊象方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧胀玉衡》卷下“射干兜铃汤”之异名。见该条。

22688 四加减正气散

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】藿香梗三钱 厚朴二钱 茯苓三钱 广皮一钱五分 草果一钱 楂肉(炒)五钱 神曲二钱

【用法】水五杯，煮取二杯，渣再煮一杯，三次服。

【主治】秽湿着里，邪阻气分，舌白滑，脉右缓。

22689 四君子加味汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】党参(米炒，去芦) 白术(净炒)各一钱 藿香 木香各六分 茯苓七分 炙草四分 煨姜一片

【主治】寒滞腹痛。

22690 四君子快斑汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【异名】四君快斑汤(《赤水玄珠》卷二十八)。

【组成】人参 黄耆 白术 茯苓 甘草 官桂 白芷 荆芥穗 防风 陈皮 白芍

【用法】水煎服。

【主治】痘疹充肥，湿盛而气不足。

22691 四君加姜附汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】白术一两 茯苓五钱 附子一钱 人参五钱 甘草一钱 干姜一钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒四五日后，腹痛，小便不利，手足沉重而疼，或咳，或呕。

22692 四苓合苓芍汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】苍术二钱 猪苓二钱 茯苓二钱 泽泻二钱 白芍二钱 黄芩二钱 广皮一钱五分 厚朴二钱 木香一钱

【用法】水五杯，煮取二杯，分二次温服。

【主治】自利不爽，欲作滞下，腹中拘急，

小便短者。

【宜忌】久痢不宜用之。

【方论选录】四苓散分阑门，通膀胱，开支河，使邪不直注大肠；合苓芍法宣气分，清积滞，预夺其滞下之路也。此乃初起之方。久痢阴伤，不可分利，故方后云：久利不宜用之。

22693 四味土木香散

【方源】《中国药典》。

【组成】土木香 200 克 苦参(去粗皮) 200 克 珍珠杆(去粗皮心) 100 克 山奈 50 克

【用法】上为粗末，过筛混匀，即得。每服 2.5~3.6 克，水煎服，一日 2~3 次。

【功用】清瘟解表。

【主治】瘟病初期，发冷发热，头痛咳嗽，咽喉肿痛，胸胁作痛。

22694 四味大黄饮子

《普济方》卷四〇五。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

22695 四味万两金丹

《疮疡经验全书》卷八。为《御药院方》卷十一“无价散”之异名。见该条。

22696 四味石钟乳散

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【异名】吸散(《千金》卷十八)、钟乳七星散(《千金》卷十八)、钟乳散(《圣惠》卷四十六)。

【组成】钟乳(碎研) 白礞石(炼) 款冬花 桂心各一分

【用法】上药治下筛，以筒吸之，如大豆许一匕聚，先食，一日三次。不知稍增之。

【主治】寒冷咳嗽，上气胸满，唾腥脓血。

【宜忌】忌生葱。

【方论选录】《千金方衍义》：七星之名聚，其聚形以示灵验之意。方用钟乳温肺为主，礞石涤痰，款冬下气，桂心散结利关节也。

22697 四味肉苁蓉丸

《景岳全书》卷五十九。为《奇效良方》卷三十五“肉苁蓉丸”之异名。见该条。

22698 四味鼠粘子汤

【方源】《疮疡经验全书》卷八。

【异名】鼠粘子汤（《幼幼集成》卷六）。

【组成】鼠粘子二两（炒） 甘草（炙） 升麻各一钱五分 射干二钱五分

【用法】上咬咀。每服三钱，水一大盏，煎六分，温服。

【主治】《幼幼集成》：麻疹咽喉疼痛，饮食艰难。

【备考】《幼幼集成》本方用法：灯心为引，水煎热服。

22699 四制川楝子丸

《景岳全书》卷六十。为《百一》卷十五“川楝子丸”之异名。见该条。

22700 四物龙胆草汤

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】当归 川芎 白芍 生地各一钱 防己 防风 胆草 羌活各七分

【用法】水煎，食后温服。

【主治】目痛，暴作云翳，痛不可忍。

22701 四物加二活汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】四物（芍用赤）加羌活 独活 延胡索 红花 青皮 香附 乌药 山楂 黑小豆

【主治】产后沐浴后受风发热。

【方论选录】玉门进风，风自下焦而入，浴后受风，外则皮毛，下则产户，表里皆可受病。故以防风、二活祛在表之风，以黑小豆祛在里之风，玄胡、青皮、红花、山楂祛其余血，香附、乌药行其结气也。气行则血自散，血行则风自灭，理本一贯也。

22702 四物加人参汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】人参 归身 川芎 白芍 生地 香附（童便炒） 炙草各一钱

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】瘦人血虚少而经水来少。

22703 四物加大黄汤

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】四物汤加大黄

【主治】产后不大便数日，而小腹疼痛者。

22704 四物加地榆汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地炭五钱 小川芎一钱 白芍一钱半（醋炒） 当归身三钱（醋炒） 地榆炭三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后血崩，脉涩数者。

【加减】脾虚，加焦术；气虚，加人参。

【方论选录】产后血室空虚，冲任失守，不能操蓄泄之权，而经血妄行，故血崩不止焉。生地凉血止血，地榆涩血定崩，小川芎行血海以升阳，白芍药敛阴血以固下，当归身养血以引血归经也。水煎温服，使经血内充，则冲任融和，而蓄泄有权，血无妄行之患，安有血崩之不止乎！脾虚加白术，气虚加人参，是因病制方，无不各有绳墨。

22705 四物加竹沥汤

《医林纂要》卷五。为方出《丹溪心法》卷一，名见《医方考》卷一“四物汤加桃仁红花竹沥姜汁方”之异名。见该条。

22706 四物加芩术汤

【方源】《医方集解》。

【异名】温六合汤。

【组成】四物汤加芩 术

【主治】经水过多。

22707 四物加芩连汤

【方源】方出《保命集》卷下，名见《万氏女科》卷一。

【异名】芩连四物汤（《医统》卷八十八）、四物芩连汤（《赤水玄珠》卷二十一）、四物加黄芩黄连汤（《准绳·女科》卷一）、四物解毒汤（《痘疹会通》卷四）。

【组成】四物汤加黄芩 黄连各一两

【主治】血热而月经先期，经水色黑；及痘疹血虚。

①《保命集》：经水如黑豆汁。②《万氏女科》：形瘦素无他疾，月经不及期而经先行，由于血热者。③《痘疹会通》：痘疹血虚，红

赤顶陷，不成浆，只生清水。

【备考】《万氏女科》本方用四物（用赤芍、芩、连（俱炒）各一钱，生草五分。水煎，食前服。《赤水玄珠》本方用法：为末，醋糊为丸服。

22708 四物加芩连汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【异名】四物加芩连知柏汤（《医钞类编》卷十六）。

【组成】归身 白芍 知母 生地 条芩 黄连各一钱 川芎 熟地各五分 黄柏七分

【主治】经水来太多，属于热者。

22709 四物加泽兰汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】泽兰 熟地各二钱 当归三钱 白芍（酒炒） 川芎各一钱五分 桃仁（去皮尖，研） 七粒 红花一钱

【功用】散血兼补。

【主治】产后瘀血凝滞，身痛，以手按而更痛者。

22710 四物加参术汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】党参（去芦，米炒） 白芍（酒炒） 白术（净） 川芎各一钱五分 当归 熟地各二钱 炮姜一钱

【功用】热补。

【主治】产后血虚身痛，喜按者。

22711 四物加荆防汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】当归 川芎 赤芍 生地 荆芥 防风 陈皮 甘草 香附 泽兰 山楂 红花 葱白 生姜

【主治】产后外感风邪发热。

【方论选录】是方四物补血行血，荆芥、泽兰祛风，红花、山楂散未尽之瘀，陈皮、香附、甘草行久结之气，葱白、生姜引邪外达。热退之后，四物、六君或加柴、葛培养气血，升发胃气可也。

22712 四物加柴胡汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】归身 川芎 白芍 生地 柴胡 人参 条芩 生草 黄连

【用法】水煎服。

【主治】性急多怒伤肝，以动冲任之脉，一月而经再行者。

22713 四物加通草汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】当归一钱半 川芎一钱 赤芍一钱 生地二钱 通草五分 桔梗五分 丹皮一钱二分 玄参一钱 青皮一钱 香附一钱 枳壳一钱 葱白五寸

【主治】产后三日外，蒸乳发热。

【加减】气虚体肥，加耆、芷。

【方论选录】是方四物补血，加丹皮、玄参凉血清热，陈皮、香附、青皮行气，桔梗、枳壳、通草、葱白疏肝通窍，开结下乳。不必过服峻补之药，阻塞厥阴（乳头属肝）、阳明（乳房属胃）二经之气，反致孤阳无阴，为害不浅。

22714 四物加黄芩汤

【方源】《医学纲目》卷三十四引王海藏方。

【组成】四物汤四两加黄芩

【主治】经暴下。

【加减】如腹痛，加黄连一两。

22715 四物加葵花汤

【方源】方出《元戎》，名见《济阴纲目》卷一。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地黄 葵花（一方加红花 血见愁）

【用法】水煎服。

【主治】经水涩少。

22716 四物加黑姜汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】熟地三钱 当归二钱 白芍（酒炒） 川芎各一钱五分 炮姜一钱

【主治】产后阴血暴伤，阳无所附，夜热展退。

22717 四物合二陈汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】归须 赤芍 川芎 生地 陈皮

法夏 茯苓 甘草 海藻 红花 香附 丹皮

【功用】导痰行血。

【主治】积痰而经水不通。

【方论选录】四物汤养血，归用尾，芍用赤，兼行血；二陈汤导痰，兼祛湿；海藻、香附佐二陈，丹皮、红花佐四物；痰去则血行，即所以通经也。

22718 四物合匀气散

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】当归身 川芎莪 京赤芍 怀生地 南木香 京楂肉 炙甘草

【用法】水煎，不拘时服。

【功用】妇女经水疏通之后，以此调气血。

22719 四物合导赤散

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】全当归 正川芎 杭白芍 怀生地 川木通 怀熟地 炙甘草

【用法】加灯心十根，水煎，热服。

【主治】妇女经后出痘，热入血室，神识不清，谵妄。

22720 四物黄连薄贴

【方源】《外台》卷二十四引《删繁方》。

【组成】黄连 黄柏 地榆 白芷各一两

【用法】上药治下筛，鸡子白和涂布。薄痂上，对疮口，穿布出痈气，令疏气。

【主治】痈肿已溃。

22721 四物清凉饮子

《卫生总微》卷三。为《圣惠》卷八十八“加减四味饮子”之异名。见该条。

22722 四顺清凉饮子

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】当归身 龙胆草(酒洗，炒) 黄芩 桑皮(蜜制) 车前子 生地黄 赤芍 枳壳各八分 炙甘草三分 熟大黄 防风 川芎 川黄连(炒) 木贼草 羌活 柴胡各六分

【用法】上锉一剂。水二钟，煎至八分，去滓，食远服。

【主治】凝脂翳症。

22723 四逆加人参汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】四顺汤(《肘后方》卷二)、人参四顺汤(《鸡峰》卷五)、四顺饮(《易简方》)、回阳饮(《医学集成》卷一)、人参四逆汤(《古方选注》卷上)、四味回阳饮(《伤寒温疫条辨》卷四)。

【组成】甘草二两(炙) 附子一枚(生，去皮，破八片) 干姜一两半 人参一两

【用法】以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。

【主治】阳虚血脱。吐利之后，汗多恶寒，四肢厥逆，脉微；或吐利未止，见上述诸证者。

①《伤寒论》：霍乱，恶寒，脉微而复利，利止，亡血也。②《肘后方》：霍乱吐下，腹痛干呕，手足冷不止。③《千金》：霍乱转筋，肉冷，汗出，呕呃者。④《鸡峰》：表里俱虚，伤冒寒冷，腹胁胀满，呕逆痰涎；及邪中阴经，手足厥冷，既吐且利，小便频数，里寒，身体疼痛，脉细微，下利清谷，头痛恶寒，亡阳自汗。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菰菜、猪肉。

【方论选录】①《注解伤寒论》：恶寒脉微而利者，阳虚阴胜也。与四逆汤温经助阳，加人参生津液益血。②《伤寒绪论》：亡血本不宜用姜，附以损阴，阴虚又不当用归、芍以助阳。此以利后恶寒不止，阳气下脱已甚，故用四逆以复阳为急也。其所以用人参者，不特护持津液，兼阳药得之，愈加得力耳。设误用阴药，必腹满不食，或重加泄利呕逆，转成下脱矣。③《千金方衍义》：直中阴寒用姜、附，温经而救四肢逆冷，因病以立名也；霍乱加人参，助姜、附回阳而使四肢温顺，勒名以彰实也。与当归四逆加生姜吴茱萸助力回阳一义，④《古方选注》：四逆加人参，治亡阴利止之方。盖阴亡则阳气亦与之俱去，故不当独治其阴，而以干姜、附子温经助阳，人参、甘草生津和阴。

【临证举例】①伤寒虚阳外浮《寓意草》：徐国桢伤寒六七日，身热目赤，索水到前，复置不饮，异常大躁，将门牖洞启，身卧地上，辗转不快，更求入井。一医洵洵，急以承气与服。余诊其脉，洪大无伦，重按无力。谓曰：此用人参、附子、干姜之证，奈何以为下证耶？于是以附子、干姜各五钱，人参三钱，甘草二钱，煎成冷服。服后寒战。戛齿有声，以重绵和头覆之，缩手不肯与诊，阳微之状如著，再与前药一剂，微汗热退而安。②心动过缓《伤寒解感论》：张某某，女，中年。胸中满闷，手足发凉，脉沉迟。西医诊为心动过缓症。为处四逆加人参汤方，五六剂痊愈，后未再发。③急性胃肠炎《伤寒论临床实验录》：裴某，男，58岁。夏令因饮食不节，患急性胃肠炎。初起发热恶寒，头痛腕闷，继则吐利交作，腹疼，烦躁不安；曾服导滞分利止呕药两剂，而吐利不止，渐至四肢厥逆，心烦身出冷汗，口干舌燥，饮食不思，脉象微细欲绝。此乃吐利之后中气大伤，心阳衰竭，阴气不继之证。治疗时扶阳救逆固属重要，而补中气生津血，又属刻不容缓。吉林参6克，干姜10克，炮附子10克，甘草18克。服药一剂后，四肢回暖，吐利不作，心不烦躁，能安然入寐。三剂后症状消失，精神安静，食欲渐展，脉象虚缓，后以和胃化滞之剂调理而愈。④吐血《江西中医药》(1959; 5: 30)：黄某某，男，64岁，骤患吐血盈盆，气息奄奄，闭目不语，汗出如珠。诊其脉沉微，肢冷如冰，危在顷刻。此证气随血脱，惟有大剂益气回阳，摄血归经。处方：参须三钱，炙北耆一两，熟附片四钱，炮干姜二钱，炙甘草二钱。翌日复诊，肢温汗敛血止，惟精神疲惫，声音低微，脉息较起，但仍甚微弱。虽有转机，尚未脱险，原方加白术三钱，白芍三钱而愈。

22724 四逆加茯苓散

【方源】方出《伤寒论》，名见《圣济总录》卷二十六。

【组成】甘草(炙) 枳实(去瓤，麸炒) 柴胡(去苗) 芍药各一两 赤茯苓(去黑皮)半两

【用法】上为细散。每服二钱匕，米饮调下，一日三次。

【主治】伤寒少阴证，小便不利。

22725 四逆加猪胆汤

《外台》卷六引《小品方》。为《伤寒论》“通脉四逆加猪胆汁汤”之异名。见该条。

22726 四十一号离象方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧症全书》卷下“土一”之异名。见该条。

22727 四十二号旅象方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧胀玉衡》卷下“清气化痰饮”之异名。见该条。

22728 四十七号讼象方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为方出《痧胀玉衡》卷中，名见《痧症全书》卷下“土七”之异名。见该条。

22729 四十八号同人方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧胀玉衡》卷下“当归枳壳汤”之异名。见该条。

22730 四十八候三黄散

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】麻黄(不去节) 大黄(蒸)各一分 黄芩半分

【用法】上为细末。每服半钱，葱汤调下，一日二次。

【主治】小儿伤寒。

22731 四十九号坤象方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧胀玉衡》卷下“荆芥薄荷汤”之异名。见该条。

22732 四十三号鼎象方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧胀玉衡》卷下“蒲黄饮”之异名。见该条。

22733 四十五号蒙象方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧胀玉衡》卷下“牛黄丸”之异名。见该条。

22734 四十六号涣象方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为方出《痧胀

玉衡》卷中,名见《痧症全书》卷下“土六”之异名。见该条。

22735 四十四号未济方

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧胀玉衡》卷下“木通汤”之异名。见该条。

22736 四时加减柴胡汤

《兰台轨范》卷三。为《金匱》卷下“四时加减柴胡饮子”之异名。见该条。

22737 四君子加竹沥汤

【方源】《医林纂要》卷五。

【组成】白术二钱半 人参二钱 茯苓二钱 甘草(炙)二钱 竹沥半杯 姜汁三匙

【用法】水煎服。

【主治】半身不遂在右者,及痰厥暴死。

22738 四君子加远志汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】人参三钱 白术三钱 茯苓三钱 甘草二钱 远志二钱

【用法】水煎大半杯,温服。

【主治】心气不固而为赤白浊。

22739 四苓散加木瓜汤

【方源】《痘疹活动至宝》卷终。

【组成】赤茯苓 猪苓 泽泻各一钱 木瓜五分 白术六分 木通八分 车前子四分 灯心一团

【用法】水二钟,煎一钟,入盐少许,令药微有咸味,饥时服。小便自利,其泻立业。

【主治】小儿暑月水泻,小便赤涩,或全不小便者。

22740 四味升麻葛根汤

《小儿痘疹方论》。为《局方》卷二“升麻葛根汤”之异名。见该条。

22741 四味调经止痛散

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归 玄胡索 没药 红花各等分

【用法】上为末。每服二钱,醇酒送下。

【主治】妇人月水将来或将尽,前后数日腹痛。

22742 四味紫苏和胎饮

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】苏叶 条芩 白术各一钱半 甘草一钱

【用法】生姜为引,水煎,热服。汗出而解。

【主治】妊娠伤寒,恶寒、头痛、发热者。

【加减】恶寒、头痛、项强、腰脊痛,此病在太阳经,加羌活、藁本、川芎、防风各一钱,连须葱三根。

22743 四物人參知母汤

【方源】《验方新编》卷九。

【组成】归身 白芍 台党 熟地 知母 麦冬各一钱 川芎七分 炙草五分

【用法】生姜、大枣为引,水煎,食前服。更宜常服地黄丸。

【主治】冲任内伤,不及期而经先行,形瘦,素多疾且热者。

22744 四物三黄泻心汤

【方源】《保命歌括》卷八。

【组成】四物汤加黄芩 黄连 大黄(俱用酒制)

【用法】水煎服。

【主治】①《保命歌括》:暴吐血。②《金鉴》:热盛吐血。

22745 四物加黑小豆汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】四物(芍用赤) 荆芥(黑) 延胡 红花 泽兰 防风 秦艽 黑小豆 山楂 干姜

【用法】童便、酒各一盏,临服冲下。

【主治】产后玉门未合,进风发热。

【方论选录】是方以四物补血,童便清心为君,黑豆、荆芥、泽兰、秦艽、防风祛风为臣,干姜、红花、玄胡、山楂祛瘀为佐,入酒为使也。

22746 四物合小乌沉汤

【方源】《保命歌括》卷八。

【组成】乌药一两 香附(醋制)二两 甘草二钱半

【用法】上为末。每服一钱,煎四物汤调服。

【主治】脏毒下血。

22747 四物合小柴胡汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】当归 白芍 熟地 川芎 柴胡 甘草 黄芩 人参 半夏

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】妇人身热如蒸，索汤水无已，经闭不行，咳嗽。

22748 四物汤倍芎归汤

【方源】方出《保命集》卷下，名见《保命歌括》卷三十。

【组成】四物汤四两（倍当归、川芎）加鬼箭 红花 玄胡索各一两（同为末）

【用法】水煎，调没药散服之。

【主治】产后血运、血结，血聚于胸中，或偏于小腹，或连于肋肋。

22749 四物苍术各半汤。

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤一份 苍术一份

【用法】上为粗末。水煎服。

【主治】妊娠四肢肿痛，不能举重。

22750 四物理中各半汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤一份 理中汤一份

【用法】上为粗末。水煎服。

【功用】流湿润燥。

22751 四物黄柏知母汤

【方源】《内外科百病验方大全》卷一。

【组成】归身 赤芍 生地 黄柏（炒）知母 木通各一钱 川芎七分 生甘草五分

【用法】水煎，食前服。

【主治】月经超前，误服辛热暖宫之药，致冲任伏火者。

22752 四制茱萸香壳丹

《奇效良方》卷四十七。为《普济方》卷二四八引《德生堂方》“四制茱萸香壳丹”之异名。见该条。

22753 四制茱萸香壳丹

【方源】《普济方》卷二四八引《德生堂方》。

【异名】四制茱萸香壳丹（《奇效良方》卷四十七）。

【组成】吴茱萸一两（分作四份，一份装带尿猪尿胞，酒浸者；一份醋浸；一份童子小便浸；一份盐炒）泽泻四两 川楝子四十九个（巴豆二十个炒黄，去巴豆）枳壳（去瓢，炒）木香 陈皮 青皮 茴香（盐炒）石菖蒲（炒）槟榔 三棱（煨）桃仁（去皮，炒）萆薢 蓬莪术（煨）官桂 白茯苓 乳香各三两（别研）荔枝核四十九枚

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤或酒送下。

【主治】肾经虚寒，下元虚冷，小肠疝气，阳事衰败。

22754 四季三黄泻心丸

《审视瑶函》卷六。为《千金》卷二十一引巴郡太守“三黄丸”之异名。见该条。

22755 四季加减百解散

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】柴胡（去芦头并土）升麻 干葛 白芍药 白术 防风（去苗）甘草（炙）羌活 独活 藁本（去芦）半夏（汤洗十次，姜汁浸）苍术（米泔水浸，麸炒）人参（去芦）藿香（去梗，以上各修事了称）各一两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏半，加生姜三大片，大枣二个，煎至一盏，去滓热服，不拘时候。

【功用】调中顺气，祛逐寒邪，调顺三焦，扶表救里，温润肺经，升降阴阳，进美饮食，和解发散，凉汗清肌，退热固表。春常服，免瘟疫之疾；夏常服，不中暑喝；秋服，无疟痢之疾；冬服，不感寒毒。

【主治】伤寒在表，未传入经，发热恶寒，腰脊强痛；已传经络，胸满气逆，肢体烦疼，目睛痛，耳聋，口燥咽干；或渴不渴，手足自温；或肢厥自利；或不自利，小便反快；首会感风，风伤腠理，头痛项强；表重伤风，憎

寒头痛,鼻流清涕,咳嗽涎痰;及风湿相搏,失节烦疼,一身尽重,加之恶风,时自汗出;伤风、伤寒、中暑、中喝,食蒸头痛,气逆胸满,失饥,吐逆,眩晕,及已经汗之不解,下之不当,吐不中病。

【加减】立春以后不加减;立夏以后,加柴胡一分,赤茯苓、当归各半两;立秋以后,减柴胡一分,当归、赤茯苓各半两,只加麻黄(去节)半两,干姜(炮)、官桂各一分;立冬以后,并无加减;如要表散,加葱三寸,淡豉三十粒,煎服,衣被盖覆。

22756 四季理脾肥儿丸

【方源】《穷乡便方》。

【组成】怀山药 山楂肉 使君子 神曲 白茯苓各三钱 仁米四钱 白术一钱 莲肉(去皮心)五钱 粉草二钱 诃皮(末)一两

【用法】上为末,早糯米糊为丸。米汤吞下。

【功用】理脾。

22757 四逆加吴茱萸汤

《中国医学大辞典》。为《伤寒全生集》卷二“茱萸四逆汤”之异名。见该条。

22758 四逆加猪胆汁汤

《普济方》卷三一八。为《伤寒论》“通脉四逆加猪胆汁汤”之异名。见该条。

22759 四逆汤加生薑方

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】甘草(炙,锉)一两 干姜(炮)三分 附子(炮裂,去皮脐)半枚 生姜(切,焙)一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盂半,煎至八分,去滓,温服。

【主治】伤寒少阴证呃逆者。

22760 四十八候贴项药方

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【组成】川乌头 白芷 地龙 五灵脂 赤小豆各等分

【用法】上为末。生姜自然汁与酒同调,贴在项上,更服竹茹散。

【主治】小儿五软。

22761 四乌鲂骨一藟茹丸

【方源】《素问》卷十一。

【异名】乌贼鱼骨丸(《圣济总录》卷一五三)、乌鱼骨丸(《宣明论》卷一)、枯骨丸(《普济方》卷一八九引《指南方》)、乌贼丸(《医学入门》卷八)、乌贼藟茹丸(《杏苑》卷八)、乌鲂骨丸(《古方选注》卷下)、女科乌贼丸(《全国中药成药处方集》(福州方))、四乌贼一藟茹二妙丸(《全国中药成药处方集》(杭州方))。

【组成】四乌鲂骨四份 藟茹一份

【用法】二物并合,以雀卵为丸,如小豆大。每服五丸,饭前以鲍鱼汁送下。

【功用】①《类经》:通血脉,补肝。②《全国中药成药处方集》(福州方):补奇经八脉。

【主治】女子血枯经闭、赤白带下,男子阴痿精伤。

①《素问》:年少时大脱血致血枯,胸胁支满,妨于食,病至则先闻腥臊臭,出清液,先唾血,四肢清,目眩,时时前后血;或醉入房中,气竭伤肝,月事衰少不来。②《医学入门》:男子精竭,阳事痿弱,面无精彩。③《全国中药成药处方集》(福州方):妇人气血虚弱,赤白带下,肢体羸瘦,恐成癆瘵。

【宜忌】《张氏医通》:惟金水二脏,阴虚阳扰,喘嗽失血,强中滑精者,禁用;以其专主温散,而无涵养真阴之泽也。

【方论选录】①《素问》王冰注:饭后药先,谓之后饭。按古《本草经》云:乌鲂鱼骨、藟茹等并不治血枯,然经法用之,是攻其所生所起尔。夫醉劳力以入房,则肾中精气耗竭;月事衰少不至,则中有恶血淹留;精气耗竭,则阴萎不起而无精;恶血淹留,则血痹着中而不散,故先兹四药,用入房焉。古《本草经》曰:乌鲂鱼骨味咸,冷平无毒,主治女子血闭;藟茹味辛,寒平有小毒,主散恶血;雀卵味甘,温平无毒,主治男子阴萎不起,强之令热,多精有子;鲍鱼味辛臭,温平无毒,主治瘀血血痹在四肢不散者。寻文会意,方

义如此而处治之也。②《类经》：乌鲔，即乌贼也。骨名海螵蛸，其气味咸温下行，故主女子赤白漏下及血闭血枯，其性涩，故亦能令人有子。蒹茹，亦名茹蒹，即茜草也。气味甘寒无毒，能止血治崩，又能益精气，活血通经脉。雀，即麻雀也。雀卵气味甘温，能补益精血，主男子阴萎不起，故可使多精有子，及女子带下，便溺不利。鲍鱼，即今之淡干鱼也。诸鱼皆可为之，惟石首、鲫鱼者为胜，其气味辛温无毒。鱼本水中之物，故其性能入水脏，通血脉，益阴气，煮汁服之，能同诸药通女子血闭也。以上四药皆通血脉，血主于肝，故凡病伤肝者，亦皆可用之。③《张氏医通》：《内经》之方不多见，仅仅数方，世都弃置不讲。尝考本草，乌鲔骨、蒹茹并皆走血，故《内经》以之治气竭伤肝，血枯经闭等证；丸以雀卵，饮以鲍鱼汁者，取异类有情，以暖肾调肝，则虚中留结之干血，渐化黄水而下矣；后饭者，先药后饭，使药力下行也。又问：雀卵以时而生，急需未必可得，奈何？答曰：大匠在乎绳墨，不拘物料，皆可成器，雀卵功专暖肾，如无，雀肉煮捣可代；鸡卵及肝亦可代。鸡属巽而肝主血也。活法在人，可执一哉？④《古方选注》：乌鲔骨丸，皆血肉之品。盖血枯气去，苟非有情之物，焉能留恋气血，而使之生长？乌鲔鱼骨咸温下行，性涩去脱，久服令人有子，可知其固气益精之功矣；茹蒹咸酸入肝，活血通经，疏气行伤；丸以雀卵，壮阳益血；药后即饭，复饮鲍鱼汁，压其药性下行，利肠续绝。每用五丸者，经言：脱血入房肝伤，由于中气竭，故欲其留顿中宫，仍从脾胃转输于下也。

22762 四时加减柴胡饮子

【方源】《金匱》卷下。

【异名】四时加减柴胡汤（《兰台轨范》卷三）。

【组成】柴胡八分 白术八分 大腹槟榔四枚（并皮子用） 陈皮五分 生姜五分 桔

梗七分

【用法】冬三月，加柴胡；春三月，加枳实，减白术；夏三月，加生姜三分，枳实五分，甘草三分；秋三月，加陈皮三分，各咬咀。分为三贴，一贴以水三升，煮取二升，分温三服，如人行四五里进一服。

【主治】五脏虚热。

【加减】如四体壅，添甘草少许，每贴分作三小贴，每小贴以水一升，煮取七合，温服；再合滓为一服，重煮，都成四服。

22763 四君合四神加减方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参一钱 于术一钱（土炒） 补骨脂一钱半（炒） 茯苓一钱 肉蔻八分（煨，去油） 吴萸四分（炒） 醋柴胡二分 五味子六分（炙）

【用法】上为细末，合枣泥为丸，重一钱五分。每服一九，早、晚姜汤送下。

【功用】温补脾肾，涩肠止泻。

【主治】脾肾虚寒所致的慢性肠炎、肠结核、慢性痢疾。

【方论选录】本方为四君合四神减甘草而成，治久患溲泻，甚为切合。四君子汤补气健脾，自后天入手，纠正消化功能失调、食少乏力、便溲者则可。但对久泄病及于肾者，似嫌力所不及，加四神自肾兼治，可以同时温补脾肾，涩肠止泻。

22764 四苓加厚朴秦皮汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】茅术三钱 厚朴三钱 茯苓块五钱 猪苓四钱 秦皮二钱 泽泻四钱

【用法】水八杯，煮成三杯，分三次服。

【主治】足太阴寒湿，腹胀，小便不利，大便溲而不爽，若欲滞下者。

【方论选录】四苓辛淡渗湿，使膀胱开而出邪，以厚朴泻胀，以秦皮洗肝也。

22765 四物加元胡干姜汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】芎 归 赤芍 生地 元胡 干

姜

【主治】产后瘀血闭而不行，发热。

【加减】热甚，加陈皮、香附、红花、丹皮、生蒲黄、大茴。

【方论选录】是方四物补血，丹皮、干姜退热，元胡、红花、蒲黄、山楂行血破瘀，陈皮、香附行气。气顺血行，阴阳平复，荣卫调和而热自止。

22766 四物加天麻钩藤汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】熟地一钱 当归 天麻 白芍(酒炒)各七分 川芎五分 钩藤一钱

【主治】肝经血虚生风而热。

22767 四物加生姜葱白汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】四物(芍用赤芍) 加干姜 半夏 陈皮 甘草 香附 羌活 防风 泽兰 丹参 川断 葱白 生姜

【主治】产后伤寒发热。

【方论选录】是方羌、防、葱、姜散寒，四物、草、断养血，陈、夏、干姜温胃寒，邪退则热自止。且干姜能入肺利气，入肝能引血药至血分，能除大热，故丹溪每加干姜于补阴药中。

22768 四物加远志石斛汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】四物 远志 石斛 川断 陈皮 香附 山药 麦冬 山楂 生姜 大枣

【主治】产后去血多，劳动太早，体虚发热。

【方论选录】是方四物补血，麦冬、石斛清热滋阴，远志、山药、川断固肾，陈皮、香附、山楂行气开结，姜、枣和营卫，生津液。脾胃之阴旺，则血自充足，久之而热自退矣。

22769 四物加芩连知柏汤

《医钞类编》卷十六。为《万氏女科》卷一“四物加芩连汤”之异名。见该条。

22770 四物加芩连姜夏汤

《大生要旨》。为《医方考》卷六“四物汤加芩连姜夏方”之异名。见该条。

22771 四物加香附黄连汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】归尾 川芎 赤芍 香附 生地 黄连 生草 丹皮各一钱

【主治】经水色紫，属于热者。

22772 四物加香薷厚朴汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】四物(芍用赤芍) 加丹皮 泽兰 厚朴 香薷 陈皮 甘草 丹参 麦冬 赤苓 竹茹

【主治】产后夏月冒暑发热。

【方论选录】是方四物加麦冬、丹皮、丹参养血安神为君，香薷、赤苓、甘草、陈皮、厚朴以解暑气，泽兰凉血利水、行血清热，竹茹清心除烦。暑气清则热自退，一切郁冒汗出诸症皆除矣。

22773 四物加桃仁红花汤

《方症会要》卷二。为《玉机微义》卷三十一引《元戎》“加味四物汤”之异名。见该条。

22774 四物加柴胡丹皮汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】芎 归 赤芍 生地 柴胡 丹皮 骨皮 陈皮 柏子仁 秦艽 泽兰 麦冬 白茯苓

【主治】产后肝虚血燥，阴火上炎发热。

【方论选录】是方四物养血，佐以柏子仁、麦冬之甘寒以滋阴降火，配以柴胡、丹皮、骨皮、秦艽、泽兰退热除蒸，茯苓引心火下行，正地气上升，天气下降也。

22775 四物加黄芩白术汤

《准绳·女科》卷一。即《元戎》“黄芩六合汤”。见该条。

22776 四物加黄芩泽泻汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】当归 泽泻(盐水炒) 熟地各一钱五分 川芎五分 白芍(酒炒) 黄芩各一钱

【主治】妊娠小肠有热，小便不通。

22777 四物加黄芩黄连汤

《准绳·女科》卷一。为方出《保命集》卷

下,名见《万氏女科》卷一“四物加芩连汤”之异名。见该条。

22778 四物加黄耆芍药汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】黄耆(锉) 桂(去粗皮) 干姜(炮) 芍药(锉,炒)各一两 甘草(炙,锉) 当归(切,焙)各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓温服,空心、日午、临卧各一服。

【主治】寒冷腹痛。

22779 四物加熟地当归汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十。

【异名】四物汤加熟地黄当归汤(《准绳·女科》卷一)。

【组成】四物汤四两 熟地 当归各一两

【主治】经水少而色和。

22780 四物合黄连解毒汤

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】当归身 怀生地 杭白芍 正川芎 正雅连 川黄柏 条黄芩 黑梔仁

【用法】净水浓煎,热服。

【功用】《麻症集成》:凉血。

【主治】妇人火盛毒重,痘疹作热,经水不依期而至。

【备考】《麻症集成》有丹参。

22781 四乌贼一藟茹二妙丸

《全国中药成药处方集》(杭州方)。为《素问》卷十一“四乌鲋骨一藟茹丸”之异名。见该条。

22782 四君子加竹沥姜汁方

《明医指掌》卷二。为方出《丹溪心法》卷一,名见《医方考》卷一“四君子汤加竹沥姜汁方”之异名。见该条。

22783 四君子加姜汁竹沥方

《成方切用》卷十二下。为方出《丹溪心法》卷一,名见《医方考》卷一“四君子汤加竹沥姜汁方”之异名。见该条。

22784 四君子加姜附厚朴汤

【方源】《此事难知》。

【组成】四君子四味各一两 生姜 附子厚朴(炮制)各三钱

【用法】水煎服。

【主治】吐泻霍乱,四肢拘急,脉沉而迟者。

22785 四物汤加芩连姜夏方

【方源】《医方考》卷六。

【异名】四物加芩连姜夏汤(《大生要旨》)。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地黄 黄芩 黄连 半夏 生姜

【主治】妊娠子痛,属阴虚火亢,痰气厥逆者。

【方论选录】四物可以养血,芩、连可以降火,姜、夏可以破逆。

【备考】《大生要旨》本方用当归二钱、川芎五分、熟地三钱、白芍一钱半(酒炒)、黄芩一钱(酒炒)、黄连五分(酒炒)、半夏(姜汁炒)一钱、生姜一片。本方方名,《救急选方》引作“芩连四物汤”。

22786 四物柴胡苦楝附子汤

【方源】《医编》卷六。

【组成】四物汤加柴胡 苦楝 附子

【主治】疟。

22787 四逆加吴茱萸生姜汤

《注解伤寒论》卷十。为《伤寒论》“当归四逆加吴茱萸生姜汤”之异名。见该条。

22788 四逆散加五味干姜汤

《医统》卷十四。为方出《伤寒论》,名见《伤寒图歌活人指掌》卷四“四逆散加五味子干姜汤”之异名。见该条。

22789 四君子加芍药高良姜汤

【方源】《此事难知》。

【异名】四君子加白芍药高良姜汤(《准绳·类方》卷三)。

【组成】四君子四味各一两 芍药 良姜各五钱

【用法】水煎服。

【主治】吐泻转筋,腹中痛,体重,脉沉而细者。

22790 四君子汤加竹沥姜汁方

【方源】方出《丹溪心法》卷一,名见《医

方考》卷一。

【异名】四君子加竹沥姜汁方（《明医指掌》卷二）、四君子加姜汁竹沥方（《成方切用》卷十二下）。

【组成】四君子汤加竹沥 姜汁

【主治】半身不遂在右者，属痰有热并气虚。

【方论选录】《医方考》：经曰：左右者，阴阳之道路也。故左属血，而右属气。气虚者，补之以甘，故用人参、白术、茯苓、甘草四件，称其为君子者，谓其甘平，有冲和之德，而无克伐之性也。其加竹沥，谓其行痰；其加姜汁，所以行竹沥之滞，而共成夫伐痰之功耳。

22791 四苓加木瓜厚朴草果汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】生于白术三钱 猪苓一钱五分 泽泻一钱五分 赤苓块五钱 木瓜一钱 厚朴一钱 草果八分 半夏三钱

【用法】水八杯，煮取八分三杯，分三次服。

【主治】足太阴寒湿，四肢乍冷，自利，目黄，舌白滑，甚则灰，神倦不语，邪阻脾窍，舌蹇语重。

【加减】阳素虚者，加附子二钱。

【方论选录】湿以下行为顺，故以四苓散驱湿下行；加木瓜以平木，治其所不胜也；厚朴以温中行滞；草果温太阴独胜之寒，芳香而达窍，补火以生土，驱浊以生清也。

22792 四物加六君山楂神曲汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】归 芎 赤芍 地 参 术 陈半 甘 苓 楂 曲 厚朴 生姜

【主治】产后伤食发热，饮食停滞，胸痞，发热，腹胀。

【方论选录】产妇七日后气血旺者，或恣食肥甘及生冷坚硬等物，停滞中焦，胸膈膈闷，或作痛发热，审知是饮食所伤，当于四物药中加二陈、山楂、神曲、厚朴消食祛滞；虚者加六君。缘宿食能裹瘀血寒痰，若不急治，

便有瘀癖积聚诸症。

22793 四物加苦楝附子柏皮汤

【方源】《痰疟论疏》。

【组成】当归（去芦头，好酒浸一宿，晒干）七钱 芍药（去粗皮一层，蜜水润，蒸晒三次）六钱 干地黄（用砂仁拌蒸一伏时）七钱 芎蒭（东流水润透，锉片，拌青蒿，蒸一炷香，晒干）六钱 苦楝子（柳木火上置瓦焙干，再用好酒拌蒸令透，待皮软去皮核，取肉水煮一伏时，晒干）六钱 附子（取重一两六七钱者，用生熟汤浸半日，勿令气泄，取出以白灰裹之，数易令干，外裹大麦面，于柳木灰中炮令皮拆，待冷，去面去皮，破开）三钱 黄柏（取厚寸许者，去粗皮，每两用蜜三钱和水涂，炙令尽色黄为度）七钱

【用法】以水三升，缓火煮取二升，去滓，再用缓火煎至升半，分温三服，未发、已发、发后各一服。

【主治】疟症。

22794 四物汤加熟地黄当归汤

《准绳·女科》卷一。为《赤水玄珠》卷二十“四物加熟地当归汤”之异名。见该条。

22795 四逆散加五味子干姜汤

【方源】方出《伤寒论》，名见《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【异名】四逆散加五味干姜汤（《医统》卷十四）。

【组成】甘草（炙） 枳实（破，水渍，炙干） 柴胡 芍药各十分 五味子 干姜各五分

【主治】少阴病，四逆，咳或下利。

22796 四君子加白芍药高良姜汤

《准绳·类方》卷三。为《此事难知》“四君子加芍药高良姜汤”之异名。见该条。

22797 四物汤加黄芩黄柏槐花方

【方源】《医方考》卷六。

【组成】当归 芍药 川芎 生地黄 酒黄芩 酒黄柏 炒槐花

【主治】内热痔漏下血。

【方论选录】痔漏，广肠之毒也。一有病根，则劳思便作，饮酒便作，所以然者，内热而血妄行也。是方也，生地、槐花、黄芩、黄柏，清其热也；当归、芍药、川芎，调其血也。

22798 四物加桃仁红花竹沥姜汁方

《明医指掌》卷二。为方出《丹溪心法》卷一，名见《医方考》卷一“四物汤加桃仁红花竹沥姜汁方”之异名。见该条。

22799 四物汤加桃仁红花竹沥姜汁方

【方源】方出《丹溪心法》卷一，名见《医方考》卷一。

【异名】四物加桃仁红花竹沥姜汁方（《明医指掌》卷二）、四物加竹沥汤（《医林纂要》卷五）。

【组成】四物汤加桃仁 红花 竹沥 姜汁

【主治】半身不遂在左属死血瘀血者。

【方论选录】《医方考》：芎、归、芍、地，生血药也，新血生，则瘀血滑而易去；桃仁、红花，消瘀药也，瘀血去，则新血清而易生；然亦加夫竹沥、姜汁者，以痰之为物，靡所不之，盖无分子左右而为患也。

【备考】《医林纂要》本方用当归（酒洗）四钱、川芎二钱、生地三钱、芍药二钱、桃仁七粒、红花一钱、竹沥半杯、姜汁三匙，水煎服。

史

22800 史国公酒

《何氏济生论》卷一。为《万氏家抄方》卷一“史国公万病无忧药酒”之异名。见该条。

22801 史国公药酒

《医方考》卷一。为《万氏家抄方》卷一“史国公万病无忧药酒”之异名。见该条。

22802 史国公药酒丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】甘草三十二两 红豆蔻八两 梔子（炒）十两 青皮（炒）十两 香附（炙）二十四两 红曲六十四两 藿香十六两

细辛六两 川芎十两 砂仁十两 菊花四十八两 白芷十六两 杏仁（去皮，炒）十六两 木香六两 山柰八两 当归十二两 橘皮二十四两 官桂八两 良姜八两 干姜六两 甘松十六两 丁香四两 薄荷十六两 檀香二两

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重三钱。每一丸用白酒四两泡之，每服三钱至五钱。

【功用】通经络，散风湿。

【主治】风寒湿痹，四肢麻木，骨节疼痛，半身不遂。

22803 史国公浸酒良方

《古今医鉴》卷二。为《万氏家抄方》卷一“史国公万病无忧药酒”之异名。见该条。

22804 史国公万病无忧药酒

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【异名】史国公百病无忧药酒（《医便》卷五）、史国公浸酒良方（《古今医鉴》卷二）、史国公药酒（《医方考》卷一）、史国公酒（《何氏济生论》卷一）、万病无忧酒（《集验良方》卷二）。

【组成】防风（去芦）二两 秦艽（去芦）二两 当归三两 草薢三两（酥炙） 羌活三两 鳖甲二两 川牛膝（去芦）二两 虎胫骨二两（酥炙） 白术（去芦）二两 油松节二两（捶碎） 杜仲三两（姜汁拌，炒去丝） 晚蚕沙三两（炒黄色） 苍耳子四两（捶碎） 枸杞子五两（炒） 干茄根八两（饭上煮熟）

【用法】上哎咀，盛布袋中，入大坛内，下好酒三十五斤，封口，浸十四日满，将坛入锅，悬煮一时取起，入土内埋三日去火毒。每日清晨、午后各服五七钟。

【功用】补益。

【主治】①《万氏家抄方》：风疾，半身偏枯，手足拘挛，不堪行步。②《张氏医通》：风湿疼。

【方论选录】《医方考》：是方也，干茄根、

苍耳子、羌活、秦艽、防风、松节、萆薢、蚕沙，可以去风，亦可以去湿，风去则蹇涩、拘挛之证除，湿去则不遂、不仁之患愈；当归、牛膝、杜仲、枸杞，所以养血，亦所以润燥，养血则手得血而能摄，足得血而能步，润燥则筋得血而能舒矣；若虎骨者，用之以驱入骨之风；白术者，用之以致冲和之气；风痹之久，血必留居，鳖甲之用，所以治风邪之固血也。

22805 史国公百病无忧药酒

《医便》卷五。为《万氏家抄方》卷一“史国公万病无忧药酒”之异名。见该条。

代

22806 代刀丸

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】白丁香一钱 蓖麻仁一钱 生白砒三分

【用法】上为末，为丸如黍米大。用一粒放患顶，外以膏封之。次日即能破头。

【主治】一切肿毒，内脓已成，撬开刀者。

22807 代刀散

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】穿山甲 僵蚕 枳壳 姜黄 牵牛 赤石脂 大黄 白芷 贝母各等分

【用法】上为细末。每服五钱，早晨空心用酒调下。行利十余次，用薄粥补之。其脓血从大便中出。

【主治】穿裆发，已成脓者。

22808 代刀散

【方源】《杏苑》卷六

【组成】草乌头 萆薢各一钱五分 川椒细辛各二钱

【用法】生为末。用少许，搽患牙处内外。其牙自落。

【主治】牙疼。

22809 代刀散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】皂角刺 炒黄耆各一两(炒) 生甘草 乳香各五钱

【用法】上各为细末。每服三钱，陈酒送下。

【功用】立穿一切外症。

22810 代刀散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】金顶砒五分 潮脑一钱 螺蛳肉(晒干)二两 轻粉三钱 巴豆仁(去油)五钱

【用法】上为末。用麻油调搽。

【功用】去顽肉。亦可代开刀。

22811 代刀散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】斑蝥一钱 巴豆一钱 白信石一分

【用法】上为末。取大米少许，放患处上，膏药盖之。以代开刀。

【主治】一切流注，痈毒，有脓水。

22812 代杖丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】乳香 没药 无名异 地龙(去土) 木鳖子 丁香 丹皮 肉桂 自然铜(煅，醋淬七次)各等分 (一加苏木)

【用法】上为末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，黄酒化下。

【功用】预服之，受刑可忍，能保血不攻心。

22813 代杖汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】土鳖 苏木 乳香 没药各二钱 木耳 川山甲 丹皮 枳壳 蒲黄 归尾 木通 甘草各一钱

【用法】酒、水煎服，临刑时先服。

【主治】杖伤。

22814 代杖汤

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】当归 生地各三钱 制乳香 制没药 苏木各二钱 川芎 枳壳(面炒) 穿山甲(炙，研) 甘草各一钱

【用法】上用酒、水各半煎服。取微汗。

【主治】杖伤。

【加减】气虚人，加人参、黄耆。

22815 代杖散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】野红花(即小薊)半斤

【用法】烧酒四斤半,浸之晒之,以干为度。含口内,咽其汁。任刑不知痛。

【主治】杖伤。

22816 代针散

《御药院方》卷九。为《圣济总录》卷一二二“绛雪散”之异名。见该条。

22817 代针散

《外科启玄》卷十一。为《瑞竹堂方》卷五“透脓散”之异名。见该条。

22818 代针散

【方源】《济阳纲目》卷一〇六。

【组成】硃砂少许(为君) 白矾皂角子大(为臣) 牙皂七分 消石四两 黄丹五钱 巴豆六个

【用法】上为末。吹喉中。

【主治】咽喉肿痛,气息难通。

22819 代针散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】桑木灰七钱 矿子灰五钱 荞麦楷灰一两 茄科灰一两

【用法】四灰放锅内,水五碗,滚数十滚,用布袋滤去滓,将水从新用铁杓熬至一小酒杯存用。如疮大,将此药画个十字即破,其脓就出;如诸般大疮有疔角腐肉不脱,用此药水洗之即去。

【主治】肿毒数日,内有脓不得自破者;又点面上雀斑黑痣。

【备考】如洗大疮,对水洗,如水一碗,对三五茶匙洗。

22820 代针散

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】木鳖子 川乌

【用法】水磨。以鹅翎扫刷疮上,留豆大一处出脓。如药水干,再刷上。不过一时即穿。

【主治】恶疮肿毒,日久不出头。

22821 代针散

【方源】《囊秘喉书》卷上。

【组成】胆星三分 指甲二三寸 冰片五

厘 朱砂少许

【用法】将指甲用双红纸卷好,灯上烧炭存性,为末,入辰砂、冰片、胆星研和。吹入喉中。少顷即出脓血自愈。

【主治】乳蛾成脓不穿。

22822 代针散

【方源】《外科十三方考》。

【组成】巴豆 信石 明雄各一钱

【用法】上为细末,收瓶备用。若遇皮薄疮疖,不得穿头而畏刀针者,以陈醋调敷患处。约一日间,疮头即自行穿溃。或用黄蜡捻作麦粒大,令其两头有光,每服三粒,黄酒冲服,见汗之后,疮头即穿。如遇皮厚之疮,须用铍针刺开少许,再敷此药。

【主治】痈毒脓成。

【宜忌】如未成脓,则此药不可用。

22823 代针膏

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】枳壳一个(大者,去瓢) 巴豆五钱(去皮)

【用法】上药将豆桩在枳壳内,线缚,罐内盛,醋煮干枳、豆,晒干研细,用丝线蘸湿展药,敷痔根上;津调代针膏,敷疮头尖。败肉自去。

【主治】痔漏。

【宜忌】如顽漏日久不可用。

22824 代针膏

【方源】《外科发挥》卷一。

【组成】乳香二分 白丁香(细直者是) 巴豆(去壳,炒焦) 碱各五分

【用法】上为末。热水调,点疮头上,常以碱水润之,勿令干。

【主治】疮疡脓热不溃。

22825 代谷丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】精羊肉(去筋膜,薄批切)三斤 陈皮三分 小椒二分 葱十根(先以水高肉二指已来,同煮水尽,去陈皮等,只取肉,慢火焙干) 人参(去芦头) 神曲(炒) 大

麦蘖(炒)各二两

【用法】上为细末,用生姜面糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,不拘时候,温酒或米饮送下。

【主治】脾胃久虚,全不思食。

22826 代灸散

《普济方》卷三二七。为《局方》卷九(续添诸局经验秘方)“内灸散”之异名。见该条。

22827 代灸散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】官粉一钱 雄黄一钱 银朱一钱 麝香二分

【用法】上为细末。用槐皮一片,将针密密刺孔,置疮上,上掺药一撮,以炭火炙热,其药气自然透入疮中,痛热为止。甚者换三次,轻者二次全愈。

【主治】瘰癧溃烂,臭不可闻,久不能愈。

【备考】方中银朱,《东医宝鉴·杂病篇》引作“轻粉”。

22828 代灸膏

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】大附子(炮) 木香 吴茱萸(炒) 马蔺子 桂 蛇床子各等分

【用法】上为细末,每用药半匙,白面半匙,以生姜汁同煎成膏,以方圆三寸纸花子上摊。贴在脐下,油纸隔之,绵衣裹。自晚至明,一敷胜百壮。如腰痛,腰上贴之。

【主治】①《御药院方》:腰痛。②《普济方》:风湿痹。

22829 代灸膏

【方源】《普济方》卷二四三。

【组成】南星 半夏 白芷 川乌 川椒 白及 马蔺子各一两 乳香 没药各三钱(另研)

【用法】上为细末。酒调,敷贴疼痛处,干则以热水润湿之,日换二次。

【主治】脚气肿痛,不可忍者。

22830 代灸膏

【方源】《普济方》卷二五〇。

【组成】木香 附子 吴茱萸 蛇床子

马蔺花各等分

【用法】上为细末。姜捣热面摊开,贴痛处。

【主治】肾气。

22831 代参膏

【方源】《本草纲目拾遗》卷三引《杨春涯验方》。

【组成】于术十斤(白米泔水浸三昼夜,洗净浮皮,蒸晒十次,有脂沾手为度)

【用法】切片熬膏,一火收成,滴纸不化;用白茯苓十斤,春末,水飞去浮,只取沉者,蒸晒十次,沾手如胶,与术膏搅匀。每服两许,米汤送下。

【功用】补益。

22832 代参膏

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】嫩黄耆(肚嫩而箭样者,锉片用) 白归身(截去头尾,酒洗净泥)各五钱 肥玉竹一两 化州橘红三钱(如无真者,用新陈皮去净白亦可)

【用法】共入砂锅内,用天泉水熬成膏。每早滚水调服。

【功用】大补气血。

22833 代参膏

《随息居饮食谱》。为原书“玉灵膏”之异名。见该条。

22834 代参膏

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】潞党参 绵黄耆 于潜术 桂园肉各等分

【用法】熬成膏子,加白冰糖收贮。滚水调服。

【功用】补中气,生津液,润肺健脾,开胃进食;常服补诸虚,除百病。

【主治】《中药成方配本》:心脾两亏,气血衰弱,心悸神疲,畏寒自汗。

22835 代茶汤

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】白术一钱五分 麦门冬一钱(去心)

【用法】煎作汤,代茶服。

【功用】夏月服之，健脾止渴。

【方义】夏日吃茶水多，必至泄泻。白术补脾燥湿，麦门冬生津止渴也。

22836 代茶饮

【方源】《治疹全书》卷下引《摄生方》。

【组成】枸杞子 五味子

【用法】上为细末，滚水泡封三日。代茶饮之。

【主治】注夏虚病。

22837 代指膏

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】雄黄 朴消各等分

【用法】用猪胆汁，少加香油调涂。

【主治】代指。生指甲边，焮热肿痛。

22838 代匙散

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】月石 石膏各一钱 脑荷五分 胆矾五分 粉草三分 僵蚕（炒）五分 冰片一分 皂角（炙烟尽）五分

【用法】上为细末。用竹管频吹喉中。加牛黄五分更佳。

【主治】喉痹。

22839 代痛散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】生川乌五钱 乳香一两 没药一两 草乌五钱（生用） 何首乌一两 蟾酥三钱（火酒烊化）

【用法】上为末。用烧酒调敷；或姜汁调亦可。

【功用】敷伤处便觉麻木，其痛可止。

22840 代痛散

【方源】《接骨入骱》。

【组成】蟾酥 生半夏 生南星各一分 芋芩（要生姜地上更佳，打汁为妙，听用）

【用法】上为细末，芋芩汁捣敷。即不痛。

【主治】筋骨折伤疼痛。

22841 代赭丸

【方源】方出《外台》卷三十四引《广济方》，名见《鸡峰》卷十六。

【组成】乱发（烧灰） 阿胶（炙）各二两

代赭 干姜各三两 马蹄一枚（烧） 干地黄四两 牛角觔五两（炙）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每次空心服二十丸，一日二次，加至四十丸，用醋汤下。

【主治】妇人产后血露不绝，崩血不可禁止，腹中绞痛，气息急；蓐病三十六疾。

22842 代赭丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】代赭一两 铁粉一两（细研） 金箔四十片（细研） 朱砂半两（细研） 当归半两 香墨半两 白矾一两（生用）

【用法】上为细末，以水浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服二十丸，不拘时候用温蜜酒下；以蜜汤下之亦得。

【主治】紫癜风。

22843 代赭丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】代赭二两 黄柏二两（涂蜜，炙微赤） 黄耆一两半（锉） 龙骨一两 赤石脂一两（烧赤，投醋中，滤出） 艾叶一两 狗头骨灰一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，不拘时候，以粥饮送下。

【主治】久赤白痢，日夜无数，腹痛不可忍。

22844 代赭丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】代赭一分（细研） 马牙消一分 金箔二十斤（细研） 银箔二十片（细研） 水银一分（以少枣瓤研令星尽） 巴豆七枚（去皮心，研，纸裹，压去油） 膩粉半两（研入） 天浆子三枚（内有物者，炒） 川大黄一分（锉碎，微炒） 蟾酥一钱（研入） 朱砂一分（细研） 蝎梢四十九枚（微炒） 龙脑半两（细研） 麝香半分（细研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍粒大。每服二丸，以薄荷汤送下，一日三次。

【主治】小儿食痢，四肢抽掣，壮热惊悸，

乳食不消，痰涎壅滞，发歇不定。

22845 代赭丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】代赭一分（细研） 赤石脂二分 朱砂一分（细研） 巴豆十枚（去皮心，研，纸裹，压去油） 杏仁二十七枚（铜针穿，灯上燎作声为度，别研）

【用法】上件药，并须新好，入乳钵同研令匀，用饭为丸，如粟米大。每服一丸，以粥饮送下；乳汁亦得。

【主治】小儿食疳，腹胀体瘦，宿食不消，多啼壮热。

22846 代赭丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】代赭（细研） 川大黄（锉，微炒） 桂心 草薢（锉） 朱砂（细研） 当归（锉，微炒） 木香各半两 麝香半分（细研） 巴豆一分（去皮心，研，纸裹，压去油）

【用法】上为末。入研了药令匀，炼蜜为丸，如黄米大。一二岁儿，每服三丸，用粥饮送下；三四岁每服五丸，空心、午后各一服。

【主治】小儿气疳，腹胀时痛，体瘦。

22847 代赭丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】代赭半两（细研） 朱砂半两（细研，水飞过） 川大黄半两（锉碎，微炒） 木香半两 当归一分（锉，微炒） 桂心半两 犀角屑半两 巴豆霜半两（分）

【用法】上为末，入研了药及巴豆霜，更研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。三四岁儿，每服三丸，空心以粥饮送下。以利为度。

【主治】小儿癰瘕，体热瘦瘠，大便坚硬，不能乳食。

22848 代赭丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】代赭半两（细研） 巴豆半两（去皮心，研，纸裹，压去油） 黄连一分（去须） 丁香半两 五灵脂一分 麝香一钱

（细研） 膩粉一钱 芦荟三钱（细研） 桂心一分

【用法】上为末，都研令匀，炼蜜和丸，如绿豆大。三岁儿服二丸，空心以粥饮送下。当取下一切恶物为效。

【主治】小儿食癖，久不消。

22849 代赭丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【异名】进食丸（《局方》卷十）、七味进食丸（《普济方》卷三九一）。

【组成】代赭半两（细研） 当归半两（锉，微炒） 朱砂半两（细研，水飞过） 麝香一分（细研） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 木香半两 巴豆霜半分

【用法】上为末，入研了药，更研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。每服二丸，以粥饮送下。

【功用】①《准绳·幼科》：疏利大便，破结散气。②《东医宝鉴》：消癖积。

【主治】小儿乳食积滞，壮热腹胀，呕吐下痢。

①《圣惠》：小儿宿食不消，壮热腹胀。②《局方》：小儿乳食不消，心腹胀满，壮热喘粗，呕吐痰逆，肠鸣泄泻，水谷不化，或下痢赤白，腹痛后重，及食癖乳癖，瘕气痞结。③《准绳·幼科》：小儿胸膈热实，腹内有留饮，致令荣卫痞塞，脏腑之气不得宣通，其病腹内气结胀满，或壮热。食积，发热羸瘦，肚大青筋；疳积，肚疼哺露。

22850 代赭丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】代赭半两（细研） 川大黄半两（锉碎，微炒） 朱砂半两（细研，水飞过） 木香一分 鳖甲半两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 赤芍药一分 知母一分 杏仁一分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 巴豆霜半分

【用法】上为末，都研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。每服二丸，以粥饮送下，一日二次。以溏利为度。

【主治】小儿丁奚癰瘕，黄瘦发脱。

22851 代赭丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】代赭(研) 木香 桂(去粗皮) 丹砂(研) 各半两 京三棱(煨, 锉) 一两 杏仁(去皮尖双仁, 炒, 研) 一分 槟榔(锉) 三分 巴豆(去皮心膜研, 出尽油) 三十粒

【用法】上为末。以醋煮面糊为丸, 如梧桐子大。每服三丸, 食后温橘皮汤或生姜汤下。

【主治】积聚不消, 心腹满, 疔刺疼痛, 呕逆醋心, 不思饮食。

22852 代赭丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】代赭(煨赤) 干姜(炮) 龙骨 各一两 附子(炮裂, 去皮脐) 三分

【用法】上为末, 研软饭为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心米饮送下, 日午再服。

【主治】水泻肠鸣, 脐腹撮痛。

22853 代赭丸

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】代赭(生用) 半两 铁粉(研) 丹砂(研) 白附子各一钱 麝香(研) 龙脑(研) 各一字

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如樱桃大。量儿大小加减, 薄荷汤化下。

【主治】小儿惊啼, 手足搐搦。

22854 代赭丸

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】代赭(醋淬七遍, 别研) 牡丹皮 芍药 麝香(别研) 各一分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如麻子大。一月及百日儿, 每服三丸, 用薄荷汤下; 半年至一岁儿, 每服五丸, 连夜三四服。

【主治】小儿夜啼, 鸡鸣即止。

22855 代赭丸

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】代赭(捣研) 一两 丹砂(别研) 麝香(别研) 犀角(镑) 各一分 大黄(锉, 炒) 牛黄(研) 各三分 当归(切, 焙) 鳖甲(酥炙, 去裙襕) 巴豆(去皮心,

出尽油, 别研) 枳壳(去瓢麸) 各半两

【用法】上为散。入巴豆再同研匀, 炼蜜和捣一二百杵为丸, 如麻子大。二三岁儿, 空腹熟水下二丸; 四五岁儿以上, 量大小加之。

【主治】小儿惊热腹胀, 宿食不消, 积年瘦弱。

22856 代赭丸

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】代赭石(研细) 川大黄各半两 木香 五灵脂 朱砂 鳖甲(醋炙黄) 桃仁(浸, 去皮, 焙) 辣桂各一分 巴豆肉(去油) 半分

【用法】上为细末, 糕糊为丸, 如麻子大, 风干。每服五丸, 姜汤送下。

【主治】小儿腹中结癖块痛。

22857 代赭散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】代赭半两(研) 旋覆花半两 人参半两(去芦头) 甘草半两(炙微赤, 锉) 半夏三分(汤洗七遍去滑) 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】伤寒, 发汗吐下后, 心腹痞满, 胸膈气不利。

22858 代赭散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】代赭一两(烧, 醋淬三遍) 附子三分(炮裂, 去皮脐) 赤石脂一两 蒲黄半分 鹿茸二两(去毛, 涂酥, 炙微黄) 当归一两(锉, 微炒) 干姜三分(炮裂, 锉) 芎藭半分 熟干地黄一两

【用法】上为细散。每服二钱, 食前以温酒调下。

【主治】妇人漏下, 久虚体弱。

22859 代赭膏

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】代赭石五钱(煨, 醋淬) 朱砂五

钱 人言豆大一粒

【用法】纸包六层，打湿煨干，入麝香少许研末，香油调。用少许涂鼻尖、眉心、手脚心。

【主治】小儿疳，不能进药。

22860 代五宝散

【方源】《霉疔新书》引田安亭方。

【组成】人参 轻粉（烧）各五分 巴豆（霜）一钱 龙脑五厘 辰砂一钱

【用法】上为极细末，糊为丸，如麻子大。每服五丸，土茯苓汤送下，一日三次。

【主治】结毒筋骨疼痛。

22861 代抵当丸

【方源】《准绳·类方》卷三。

【异名】代抵当汤丸（《张氏医通》卷十六）。

【组成】大黄（川产如锦纹者，去皮及黑心）四两 芒消一两（如欲稳，以玄明粉代） 桃仁（麸炒黄，去皮尖，另研如泥）六十枚 当归尾 生地黄 穿山甲（蛤粉炒）各一两 桂三钱或五钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。畜血在上焦，丸如芥子大，临卧去枕仰卧以津咽之，令停留喉下搜逐膈上；中焦食远，下焦空心，俱梧桐子大，以百劳水煎汤下之。

【功用】行瘀血。

【主治】蓄血。

【加减】如血老成积，此药攻之不动，宜去归、地，加广茂（醋浸透，焙干）一两，肉桂七钱。

【方论选录】用归、地者，欲下血而不损血耳，且引诸药至血分也；诸药皆犷悍，而欲以和济之也。

22862 代抵当丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】生地 当归 赤芍各一两 川芎五灵脂各七钱五分 大黄（酒蒸）一两五钱

【用法】砂糖为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】血淋。瘀血停蓄，茎中割痛难忍。

22863 代抵当丸

【方源】《寒温条辨》卷四。

【组成】大黄（酒洗）四两 芒消 穿山甲（蛤粉炒） 夜明砂（淘，焙） 莪术（醋焙） 肉桂（去粗皮） 当归尾（酒蒸）各一两 红花（酒炒）七钱 桃仁（不去皮尖，生用另研七十粒）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，生姜汤送下。

【主治】太阳表证仍在，随经瘀热在里，脉微而沉，反不结胸，其人发狂，以热在下焦，小腹当硬满，小便自利者。

【方论选录】代抵当汤丸，方出《准绳》。盖瘀蓄之血，攻之为难，仲景直用水蛭、虻虫有毒之物，惟恐药不峻利，亦何待攻之不动而后加减乎？后人不敢用此毒物，故作此方以代之。原方生地黄用之无理，归尾必不可减，故于本方中减去生地一味，倍肉桂，加莪术、红花、夜明砂，用之殊觉有效。若温病蓄血，用此方去肉桂，加牡丹皮一两，牛膝一两，或止加干漆五钱。

22864 代抵当汤

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】当归 白芍 熟地各二钱 川芎一钱 山甲二钱 花蕊石一钱

【用法】入童便煎服。

【主治】蓄血。

22865 代抵当汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷五。

【组成】桃仁 蓬术 大黄 芒消 当归 生地

【主治】蓄血。

22866 代抵当汤

【方源】《血证论》卷八。

【组成】大黄一钱（酒炒） 莪术一钱 山甲珠三斤 红花一钱 桃仁三钱 丹皮三钱 当归三钱 牛膝二钱 夜明砂三钱

【主治】蓄血。

【方论选录】山甲攻血，夜明砂能去死血，余药破下，务使瘀血不留。

22867 代茶新饮

【方源】《外台》卷三十一引《近效方》。

【组成】黄耆 通草各二斤 茯苓 干姜 干葛各一斤 桑根白皮一斤 鼠粘根三斤（湿加一斤） 生干地黄 枸杞根（洗） 忍冬（十二月采枝茎叶，阴干，湿加五两） 薏苡仁各十两 葚萸八两 麦门冬（去心） 菱莢各五两

【用法】上药并拣择，取州土坚实上者，刮削如法，然后秤大斤两，各各别捣，以马尾罗筛之，搅令匀调，重筛，务令相入，不令偏，并别取黄白楮皮（白皮根相兼）细切，煮取浓汁，和搜令硬软得所，更於白中捣。别作一竹橐子，围阔二寸半，厚二分以下，临时斟量大小厚薄作之。此亦无定，众手依摸捻成饼子。中心穿孔，日晒干，百余饼为一穿。即以葛蔓为绳贯之，竹作篾亦得，挂之通风阴处妙。若须煮用，以炭火上炙令香熟，勿令焦，白中捣末，任随时取足，煎以代茶，大都浓薄量之，着少盐煮之，频扬之，即滑美；著盐、橘皮、苹拔亦佳。

【功用】除风破气，理丹石，补腰脚，聪耳明目，坚肌长肉，缓筋骨，通腠理，畅腑脏，调摄血脉。

【主治】头脑闭闷，眼睛疼痛，心虚脚弱，不能行步，脚气，肺气，疝气，咳嗽，消中消渴。

【备考】腊月腊日合之，十年不败。

22868 代赭石丸

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】代赭石（煨，醋淬，研） 磁石（煮米醋数沸，蘸七次，研） 白矾（煨） 牡蛎灰 龙骨（研） 蛭皮（炙焦） 皂荚刺（烧） 猪后蹄垂甲（烧，各存性） 赤石脂 川椒（焙） 木贼（焙） 蜂房（炒）各等分

【用法】上为细末，神曲糊为丸，如小豆大。

每服五十丸，食前艾并生姜煎汤送下。漏血处，以热艾揉和血竭塞，一日三换。

【主治】痔变为痿，脓血不止。

22869 代赭石丸

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】丹皮 炮姜 发灰 酒白芍 醋煨代赭石 醋地榆 酒生地。

【主治】产后闪伤。

22870 代赭石汤

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】代赭石（打碎）三两 陈皮一两 桃仁（炒） 桂 吴茱萸（盐炒）各半两

【用法】上各锉碎。每服二两，水三大盏，加生姜三分，同煎至一盏，去滓，食前温服，一日一服。

【主治】逆气上冲，鼻息滞塞不通。

22871 代赭石散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】代赭石（丁头者）不拘多少

【用法】上药用炭火烧赤，醋淬七遍，放湿地上，以物盖，出火毒，捣研为散。患者不拘大人小儿，射破唇上下如针眼子者，先用温浆水漱口，煎好纸作细条子，薄蘸药，于疳断上贴。隔宿即生肌，甚者不过再上。寻常牙齿宣露，亦用药贴之。

【主治】小儿走马疳。

22872 代赭石散

《普济方》卷三七六。为原书同卷“煎金饮”之异名。见该条。

22873 代赭石散

【方源】年氏《集验良方》卷一。

【组成】旋覆花不拘多少 代赭石（为细末）一钱

【用法】调服。

【主治】一切呕吐不止。

22874 代天宣化丸

【方源】《痘疹世医心法》卷十一。

【组成】甘草（甲巳年为君，土） 黄芩（乙庚年为君，金） 黄柏（丙辛年为君，水） 山梔（丁壬年为君，木） 黄连（戊

癸年为君,水) 连翘(佐) 山豆根(佐) 牛蒡子(佐)

【用法】先视其年所属者为君,次四味为臣,君药倍用,臣药减半,佐视臣又减半,共为细末。于冬至日修合,取雪水,煮升麻汁打面糊为丸,辰砂为衣。淡竹叶煎汤送下。

【功用】预防痘疹。

22875 代天宣化丸

【方源】《片玉痘疹》卷五。

【异名】代天宣化丹、五瘟丹、稀豆丹(《痘疹仁端录》卷十三)。

【组成】人中黄(属土,甲巳年为君) 黄芩(属金,乙庚年为君) 黄柏(属水,丙辛年为君) 梔子仁(属木,丁壬年为君) 黄连(属火,戊癸年为君) 苦参(为佐) 荆芥穗(为佐) 防风(去芦,为佐) 连翘(酒洗,去心,为佐) 山豆根(为佐) 牛蒡子(酒淘,炒,为佐) 紫苏叶(为佐)

【用法】冬至之日修合为末,取雪水煮升麻,加竹沥,调神曲为丸,用辰砂、雄黄为衣。每服用竹叶煎汤送下。

【主治】预防痘疹,疫病。

22876 代天宣化丸

《保命歌括》卷六。为原书同卷“五瘟丹”之异名。见该条。

22877 代天宣化丸

【方源】《诚书》卷六。

【组成】白术(炒) 人参各五钱 芦荟 茯苓各三钱 熟地八钱 地骨皮 山药 黄柏 陈皮各四钱 黄连(炒)三钱 当归 甘草(炙)各一钱 白芍药五钱 鹿角胶一两

【用法】上为末,米饮送下;化鹿角胶为丸亦可。

【主治】小儿解颅。

22878 代天宣化丹

《痘疹仁端录》卷十三。为《片玉痘疹》卷五“代天宣化丸”之异名。见该条。

22879 代天宣化丹

《松峰说疫》卷五。为《保命歌括》卷六“五瘟丹”之异名。见该条。

22880 代针透脓散

《青囊秘传》。为《瑞竹堂方》卷五“透脓散”之异名。见该条。

22881 代灸明脐膏

《普济方》卷一三五。为《卫生宝鉴·补遗》“代灸涂脐膏”之异名。见该条。

22882 代灸涂脐膏

【方源】《卫生宝鉴·补遗》。

【异名】代灸明脐膏(《普济方》卷一三五)。

【组成】附子 马蔺子 蛇床子 木香 肉桂 吴茱萸各等分

【用法】上为细末,用面一匙,药一匙,或各半匙,生姜汁和煨成膏。摊纸上,圆三寸许,贴脐下关元、气海。自晓至晚,其火力可代灸百壮,脐痛亦可贴之。

【主治】厥阴经证,烦满囊缩。

22883 代抵当汤丸

《张氏医通》卷十六。为《准绳·类方》卷三“代抵当丸”之异名。见该条。

22884 代赭扶脾汤

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】人参一钱 白术一钱 茯苓一钱 代赭石一钱五分(酒淬七次) 炙甘草三钱 钩藤五钱 天麻一钱 远志一钱(甘草汤煮) 胆星一钱

【用法】加金、银物各一件,河水煎服。

【主治】小儿脾虚,致患天钓,手足抽掣,两目上窜,颧面唇口肌肉皆跳,杯茶时候即止,仍复无恙,哭笑乳卧犹昔,但甚者日夜四五十次。

【备考】先服钩藤散祛其积热,复以本方服之,以扶土镇木。

22885 代赭旋覆汤

《医方集解》。即《伤寒论》“旋覆代赭汤”。见该条。

22886 代赭旋覆汤

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】代赭石三钱 法夏一钱 元参五钱 甘草六钱 旋覆花三钱 生姜三片 红

枣三枚

【主治】酒伤喉闭。

22887 代劳鬼哭饮子

【方源】《奇效良方》卷二十二。

【组成】柴胡 秦艽 阿魏各半两 东引桃枝 青蒿各一握 甘草(炙)半分 槟榔一两(生,研末,分作三服,逐旋用)

【用法】上各锉细。以童子小便二升,浸一宿,至明早煎至一升,去滓,分作三服,每服入前槟榔末和匀,空心温服,人行数十里,又进一服。吃一二服,或吐或泻,即不用服药三次;若未吐,即再进第三服。病在上即吐,病在下即泻出恶物,或异色虫,或如乱丝发。

【主治】劳瘵。

【宜忌】忌面食、肥脂、葱菜等物。

22888 代赭石挨癖丸

【方源】《育婴秘诀》。

【组成】代赭石(火炼醋淬,研极细末) 青皮(去白) 莪术(煨) 木香(不见火) 山棱(煨) 辣桂 川大黄各三钱 巴豆霜一钱

【用法】除巴豆霜外,研末,入巴霜再研匀,醋煮面糊为丸,如麻子大。每服五丸,姜汤送下。

【主治】腹中痞块,或生寒热,或作痛者。

22889 代赭旋覆花汤

【方源】《医方简义》。

【组成】代赭石二钱 旋覆花一钱五分 东洋参二钱 姜半夏一钱五分 赤茯苓三钱 荆芥炭一钱 炙甘草五分

【主治】木犯胃土,噎逆痞满。

【加减】如气实而满者,去参,加牡蛎三四钱。

仙

22890 仙枣

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】大黑枣(去核)二十一枚 胡粉三

分

【用法】将胡粉入枣内,逐个用线扎紧,放小砂罐内,略放水煮熟,露一宿。空心吃三枚,冷茶送下。

【主治】杨梅疮。

22891 仙酒

【方源】《三因》卷二引窦朝议经进方。

【组成】牛蒡根 牛膝各一斤 秦艽 鼠粘子各二两 枸杞子(炒)一斗 苍术(蒸烂)二斤 防风 蚕沙各二两 大麻子(炒,别研去壳)一升 桔梗 羌活各二两

【用法】上锉散,无灰酒二斗,净瓷瓶内浸七日,开时不得对瓶口。日进三服,每服一大盏,温服。

【功用】延年益寿。

【主治】大风及偏风一切风疾。

【宜忌】忌面食并鱼肉动物物。

22892 仙酒

【方源】《扶寿精方》。

【组成】天麻半斤 当归三两 枳壳二两 枸杞二升 牛蒡子半斤 牛蒡根一斤 天麻子一升 牛膝 秦艽 苍术(去皮,米泔浸,瓦器蒸熟) 羌活 防风 桔梗 晚蚕沙各二两

【用法】上为粗末。无灰酒二三斗,瓦罐浸七日,勿令面近酒,恐气触目有伤。每日空心、午、夜各温进一杯。

【主治】手足拘挛,半身不遂。

【宜忌】忌鱼、面三个月。

22893 仙酒

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】苍术二两 枸杞 当归 川芎 白芍 陈皮 天麻各一两 晚蚕沙 五加皮 杜仲 枳壳 半夏 肉桂 防己 牛膝 桔梗 木瓜 白芷各五钱

【用法】酒浸服。

【主治】虚寒筋骨痠痛,腰脚无力。

22894 仙膏

《仙传外科集验方》。为原书“冲和仙膏”之

异名。见该条。

22895 仙人饭

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】黄精

【用法】将瓮去底，釜上安顿，盛黄精令满，密盖蒸之，候气溜，取出晒干，如此九蒸九晒，凡生时有一石，熟有三四斗方好。蒸之不熟，则刺人咽喉，既熟晒干，食之甘美。

【功用】补中益气，安五脏，润心肺，轻身延年。

22896 仙人饮

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】栗壳二钱 青皮三钱 陈皮三钱 白扁豆花四十九朵（无花，豆亦可） 乌梅肉二个 砂仁七粒 葱白五根

【用法】水二钟，加灯草三十寸，煎八分，温服。

【主治】久痢。

22897 仙人散

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】地骨皮二两（酒浸二宿） 青盐一两 黍粘子一两半（炒） 细辛一两（酒浸）

【用法】上为细末，入麝香少许。每用一字，临卧擦牙，茶、酒漱，良久吐出。

【主治】牙痛。

22898 仙人散

【方源】《古今医鉴》卷十六引黄宾江方。

【组成】土鳖（十个，焙干）一钱 土狗（八个，焙干）一钱 仙人骨（即人骨）三分 巴豆（去油）三分

【用法】上为末。每服先一钱，次服五分；二服后去巴豆，又服二次，每次五分；又加巴豆一服，俱用烧酒下。

【功用】接骨止痛。

22899 仙人粥

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【异名】首乌粥（《大众医学》）、何首乌粥（《长寿药粥谱》）。

【组成】何首乌一二斤

【用法】以竹刀刮去皮，不可用铁器，切成细细如菜子面大，每日五钱，用砂锅以白水滚烂，放白米三合，洗净，入内煮粥。每日空心服。

【功用】《长寿药粥谱》：益肾抗老，养肝补血。

【主治】气血两虚，身体羸瘦，面色黄肿，手足疼痛，头昏耳鸣，头发早白，大便干燥。

①《摄生众妙方》：气血不足，面色黄肿，手足疼痛软弱，行履不便，身体羸瘦。②《大众医学》：老年性高血脂，血管硬化，大便干燥。③《长寿药粥谱》：老年人肝肾不足，阴血亏损，头昏耳鸣，头发早白，贫血，神经衰弱。

【备考】《长寿药粥谱》：何首乌粥：先用何首乌 30~60 克，入砂锅煎取浓汁，去滓，与粳米 100 克，大枣二三枚，冰糖适量，同煮为粥。

22900 仙人糗

【方源】《本草纲目》卷十八引《臞仙神隐》。

【组成】干天门冬十斤 杏仁一斤

【用法】上为末，蜜渍。每服方寸匕。

【功用】久服补中益气。

【主治】虚劳绝伤，年老衰损，偏枯不随，风湿不仁，冷痹恶疮，痈疽。

22901 仙子散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】苦参 威灵仙 蔓荆子 何首乌 荆芥各等分

【用法】上为细末，每服二钱，食前酒调服，日二三服。

【主治】遍身疮疥，经年举发者。

【宜忌】忌发风物。

22902 仙乌豆

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】虢丹二两 晋矾二两

【用法】上为末，入一盒子盛，先用蛤粉封口缝，后以盐泥固济，炭火煨通赤，放冷，取出研末。以水一斗，黑豆五升，同药末于锅

中煮至水尽为度，晒干。任意与食，不拘时候。

【主治】因发惊痫之后，心神失守而癡。

22903 仙丹膏

【方源】《四圣心源》卷九。

【组成】地黄八两 当归二两 甘草二两 黄耆二两 丹皮一两 桂枝一两 麻油一斤 黄丹八两

【用法】熬膏，入黄蜡、白蜡、乳香、没药各一两，罐收。疮口洗净贴，一日一换。

【主治】痈疽，脓后溃烂，久不收口。

22904 仙方膏

【方源】《疡医大全》卷七引《经验方》。

【组成】白芷 紫荆皮 独活 石菖蒲 赤芍各二两 高良姜 蜈蚣 刺猬皮 蛇蜕 草麻仁 鳖甲 白僵蚕 甘草 海风藤 连翘 天花粉 白及 牛蒡子 大黄 川黄连 白蔹 当归 千金子 血余 金银花 黄柏 穿山甲 防己 猪牙皂 柴胡 川贝母 桃仁 白附子 巴豆 明天麻 苦参 荆芥穗 红花 黄耆 桔梗 黄芩 牛膝 防风 全蝎 麻黄 草乌 肉桂 乌药 羌活 半夏 大戟 苏木各五钱 桃枝 槐枝 桑枝 柳枝各截一寸长，二十四段

【用法】用大磨真麻油十三斤，将上药入油内泡七日，入铜锅内熬至药枯滤去滓，复将油仍入锅内，熬至滴水成珠，再撒净药脚，下丹。每油一斤，下飞过黄丹八两为则，药已成功，入有铺锡缸内，以槐棍搅冷，再入后末：血竭四钱，乳香（去油），没药（去油）各三钱三分，藿香四钱五分，研末搅匀，又入后药：珍珠、冰片各一钱，沉香（不见火）四钱七分，当门子二钱一分，木香（不见火），松香各五钱四分，檀香（不见火）六钱，雄黄五钱五分，搅匀，入潮脑三钱收功。

【主治】痈疽发背，一切外症，并贴五劳七伤，筋骨疼痛，跌打损伤，妇人癰疽、带下。

22905 仙正散

【方源】《理伤续断方》。

【组成】肉桂一钱（去皮） 当归三钱（去尾） 玄胡索五钱 白芷五钱 苍术一两 赤芍药五钱 防风一两 荆芥四两

【用法】上咬咀。每服五钱，水五升，干荷叶两皮，煎至七分，去滓，于损处断处，及冷水风脚，筋脉拘急不得屈伸，行步难苦，用此药热蒸，用被盖覆，候温淋洗。

【主治】男子、妇人骨断。

22906 仙术丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【异名】平补仙术丸（《普济方》卷二二四）。

【组成】苍术（米泔浸一宿，切，炒，为末）三斤 枸杞子（为末） 生干地黄（切，焙，为末）各一斤

【用法】上药用好酒二升，先调枸杞末成膏，次将苍术、地黄二药同捣三百杵为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心新汲水送下。

【主治】平补。

22907 仙术丸

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】苍术（肥者，米泔浸）不计多少

【用法】夏、秋浸三日，春、冬浸七日，竹刀刮去皮，水洗净，瓦上蒸半日，作片子，焙干，石臼内木杵为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日早晨、日午各服五十丸，酒送下。

【功用】轻身延年。

22908 仙术丸

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】术一斛（净刮去皮，洗摊令浥浥，细锉）

【用法】上为末，纳净瓮中，水二斛，浸一宿，取出纳大釜中，煮令减半，加清酒五斗，煮至一斛，绞去滓；再纳釜中，微火煎之，又入炒大豆黄、天门冬末各二斗，更煎，搅和令匀，候如膏为丸，如弹子大，放干，盛不津器中。每服三丸，细嚼，温水送下，一日三次。

【功用】久服耐风寒，延年不老。

22909 仙术汤

【方源】《局方》卷十。

【组成】苍术(去皮)四十八斤 大枣(去核)二斗四升 干姜(炮)二十四两 杏仁(去皮尖,麸炒,别捣)六斤 甘草(炒)十四斤 盐(炒)二十五斤

【用法】上为细末,入杏仁和匀。每服一钱,食前沸汤点服。

【功用】辟瘟疫,除寒湿,温脾胃,进饮食;常服延年,明目驻颜,轻身不老。

22910 仙术汤

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】苍术一斤(米泔浸三日,竹刀子切片,焙干,为末) 茴香二两(炒,为末) 甘草二两(炒,为末) 白面(炒)一斤 干枣二升(焙干,为末) 盐(炒)四两

【用法】上为末,一同和匀。每日空心白汤点服。

【功用】去一切不正之气,温脾胃,进饮食,辟瘟疫,除寒湿。

22911 仙术饮

【方源】《直指》卷二十。

【异名】仙术散(《准绳·类方》卷七)。

【组成】苍术(童尿浸二宿,洗净,晒干)一两一分 木贼(去节,童尿浸一宿,晒干) 蝉壳(去足) 白蛇皮(皂角水洗,焙) 白蒺藜(炒,去刺) 谷精草 防风 羌活 川芎 杏仁(去皮) 甘草(生,焙)各一分

【用法】上为末。食后每服一钱,蜜汤调下。

【主治】眼中翳膜。

22912 仙术散

【方源】《博济》卷三。

【组成】苍术(米泔浸淘一两宿)一两 木贼一两 蝉蛻(净泥秤)一分 谷精草一分 甘草(炙)一两 黄芩半两 蛇退皮(汤洗焙干,滴油杵)一钱

【用法】上为细末,每服一钱,空心、临卧时冷水调下。

【功用】退翳。

【主治】眼目翳膜,遮障昏暗。

22913 仙术散

【方源】《卫生总微》卷八。

【组成】紫苏一两 苍术(米泔浸一宿,焙)二两 谷精草(去根)一两 青蛤粉一两

【用法】上为末,每用猪猪肝一片批开,掺药三钱在内,麻缕缠定,米泔熟煮。先于气上熏眼,然后食之。

【主治】疮疹入眼,生障膜丁子。

【备考】先用硃砂、水银粉各一钱,粉霜三钱,一处拌匀,入一小砂锅内盛讫,新盎一只盖口,黄土泥缝,炭火烧赤,少时取出,放冷收之。如左眼有病,即取药一豆大,绵裹塞左耳中;右眼有病,塞右耳中,然后服此方。

22914 仙术散

《准绳·类方》卷七。为《直指》卷二十“仙术饮”之异名。见该条。

22915 仙圣散

【方源】《袖珍》卷八。

【组成】紫草 木通 甘草 黄耆(炙) 枳壳(炒)

【用法】上锉散。每服二钱,水半盏同煎;或加人参、茯苓、糯米煎。

【主治】痘疮出不快,倒靥,或小便赤色,余热不除。

22916 仙传方

【方源】《回春》卷七。

【组成】老杉木(烧灰) 膩粉

【用法】清油调敷患处。

【主治】风热所致的外肾焮赤肿痛,日夜啼叫,不数日,退皮如鸡卵壳,愈而复作。

22917 仙传膏

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】乳香一钱五分(去油) 没药(制如上)一钱五分 轻粉三钱 血竭三钱 冰片三分 麝香一分 樟脑二钱

【用法】上为极细末。用猪板油一两二钱,

黄蜡一两，同化调药成膏。贴患处。尽夜流水，即时苏醒。

【主治】打板重伤，死血郁结，呃逆不食，并夹伤肉烂者。

【备考】本方方名，《仙拈集》引作“止痛膏”。

22918 仙传膏

【方源】《疡医大全》卷三十七。

【组成】滑石 大黄 赤石脂各等分

【用法】上为细末。蜜调敷。

【主治】杖后重伤，死血郁结，呃逆不食，并夹伤肉烂。

22919 仙传膏

《串雅内编》卷四。为《本事》卷五“神传剪草膏”之异名。见该条。

22920 仙花散

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】凤仙花叶（捣汁） 马齿苋（捣汁） 黄蜡二两 葱白（捣汁） 松香二两五倍子（为末）一两 乳香二钱

【用法】将凤仙、葱、苋先捣取汁二碗，将黄松香熬膏，入倍子末，摊膏。贴之自愈。

【主治】杖疮。

22921 仙花膏

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】闹羊花八两（酒蒸九次） 苍耳子八两（炒） 败龟版（煅白如霜）二两 番木鳖（醋炙）二两

【用法】上为末，用蜜一斤，熬去水气调之，入竹筒内，挂当风处。初起酒服五分，弱者服一二分；不饮者，沙糖调下。

【主治】大风恶症。

22922 仙饭丸

【方源】《济阳纲目》卷六十八。

【组成】上党胡麻三升（拣净）

【用法】以新白布缝袋，将胡麻盛在内，放清水中浸一时，用手揉袋，去尽油沫，纯是清水为度。取出甑蒸，令气遍，晒干，如此九蒸九晒。蒸之不熟，令人发落。蒸晒去皮，炒香为末，炼蜜或枣膏为丸，如弹子大。每

服一丸，空心用淡酒化下，一日三次。常服为佳。

【功用】服至一月之后，痰火尽去，精气充溢；服至百日，能除一切痼疾，一年身面光泽，不饥，二年白发返黑，三年齿落更生；久服长生。

【宜忌】初服一月内戒房事。

22923 仙灵丸

【方源】《普济方》卷一五四引《余居士选奇方》。

【组成】威灵仙 没药 乳香 玄胡索 黑牵牛 破故纸（炒黄）各一分 陈皮 巴豆（去壳，入蒜内，纸包慢火煨熟，去巴豆用蒜）一粒

【用法】上为末，酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，五更初茶清送下。

【主治】远年近日腰痛。

【备考】方中陈皮用量原缺。

22924 仙灵丸

【方源】《普济方》卷二四〇。

【组成】威灵仙（洗净，阴干）半斤 牛膝（净，去根，酒浸三日）半斤

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心木瓜酒送下。

【主治】脚气久不愈。

22925 仙灵丹

【方源】《四圣心源》卷九。

【组成】斑毛八钱（去头翅，糯米炒黄，去米） 前胡四分（炒） 乳香一钱（去油） 没药一钱（去油） 血竭一钱 元参四分 冰片五分 麝香五分

【用法】上为细末，瓶收。针破疮顶，点药如芥粒，外用膏药贴之。顷刻流滴黄水，半日即消，重者一日一换。

【主治】阳证痈疽初起。

22926 仙灵酒

《寿世保元》卷二。为《圣惠》卷二十一“仙灵脾浸酒”之异名。见该条。

22927 仙灵酒

【方源】《医学启蒙》卷三。

【组成】仙灵脾四两 金樱膏四两 川牛膝一两 当归身二两 川芎一两 巴戟天一两(去心) 菟丝子二两(制) 小茴香一两(炒) 补骨脂二两(炒) 官桂一两 川杜仲一两(姜炒) 沉香五钱

【用法】用细花烧酒二十斤一坛,上药为粗末,绢袋盛,悬胎煮三炷香,放土地上三宿,分作十小瓶,以泥封口。

【功用】壮阳固精,健筋骨,补精髓,广嗣延年。

【主治】血气虚惫,下元痼冷,腰膝无力,临事不举,梦泄遗精。

【备考】仙灵,以其主药而名之也。佐之补益固精以成剂。中年之人宜乎用效,少年而非虚弱者,非所宜也。

22928 仙灵散

【方源】《三因》。

【组成】仙灵脾 威灵仙各等分

【用法】上为末。每服二钱,食后米汤调下。

【主治】斑疮入眼。

22929 仙灵散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】滑兰煨皮(末) 紫贝草(捣)

【用法】上为末。酒调为膏敷;或蜜水调亦好。

【功用】痈疽肿毒。

【主治】收肿敛毒排脓。

【备考】滑兰拔毒,紫贝散血。或单用紫贝草亦效。

22930 仙灵散

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】常山二钱 甘草钱半 槟榔二个 黑豆四十九粒

【用法】上为末。先用酒一小盏煎干后,用水一大盏,煎八分,露一宿,早晨温服。吐不妨。

【主治】一切疟疾。

【宜忌】忌鸡、鱼。

22931 仙灵膏

【方源】《四圣心源》卷九。

【组成】地黄八两 当归二两 甘草二两 黄耆二两 丹皮一两 桂枝一两 麻油一斤 黄丹八两

【用法】熬膏,入黄蜡、白蜡、乳香、没药各一两,罐收。疮口洗净贴,一日一换。

【主治】痈疽,脓后溃烂,久不收口。

22932 仙茅丸

【方源】《博济》卷一。

【组成】仙茅一分 贯众半两 黑附子(去皮)半两 革拔一分 干姜半两 甘草少许 巴豆(去皮心)半两

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。下结胸,每服一丸,生姜、枣汤送下;五七日患者,更打破一丸,用前汤送下;如常伤寒,只用冷浆水送下。

【主治】伤寒结胸,及恶候者。

22933 仙茅丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】仙茅(米泔浸去赤汁,焙) 威灵仙(去土) 羌活(去芦头) 青橘皮(汤浸,去白,焙) 白牵牛(炒) 白茯苓(去黑皮)各一两 姜黄 白术 苍术(米泔浸一宿,竹刀切作片子,焙)各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服十丸,空心盐汤送下。

【主治】风气滞凝,身体疼痛,四肢拘急,腰脚沉重。

22934 仙茅丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】仙茅(切片,刮去皮,米泔浸,晒干) 羌活(去芦头) 白术 狗脊(去毛) 防风(去叉) 白茯苓(去黑皮)一两 姜黄 菖蒲 白牵牛各一两半 威灵仙(去土)二两 何首乌(去黑皮) 苍术(浸,切,焙)各一两

【用法】上药并生用,细捣为末,以生白蜜和为剂,再入白杵三千下为丸,如梧桐子大。每服十五丸至二十丸,冷水送下,不嚼;妇

人月候不通，红花酒送下。

【功用】治风顺气，调三焦，明耳目，益真元，壮筋骨，驻颜色。

22935 仙茅丸

【方源】《本草纲目》卷十二引《圣济总录》。

【组成】仙茅二斤（糯米泔浸五日，去赤水，夏月浸三日，铜刀刮铍，阴干，取一斤） 苍术二斤（米泔浸五日，刮去皮，焙干，取一斤） 枸杞子一斤 车前子十二两 白茯苓（去皮，茴香炒） 柏子仁（去壳）各八两 生地黄（焙） 熟地（焙）各四两。

【用法】上为末，酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒送下，一日二次。

【功用】壮筋骨，益精神，明目，黑髭须。

22936 仙茅丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】仙茅 白茯苓（去皮） 山药 九节蒲各一两

【用法】上件并铍，内仙茅不犯铁器，以法酒拌匀，于饭上蒸，以饭熟为度，晒干、捣罗为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸至一百丸，空心温酒、盐汤任下。

【功用】大补益，壮元阳；久服延年益寿。

22937 仙茅丸

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】仙茅（糯米泔浸一二日，一日一换，取尽赤汁，日干，磨为细末）四两 白茯苓（去皮） 半夏（汤泡七次）各二两 茴香（盐炒，去盐）一两半

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。任意服。

【主治】固精，暖水脏。

22938 仙茅丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】仙茅二斤（糯米泔浸五日，浸去赤水，用铜刀去皮，铜刀铍，取一斤。夏月止浸三日，阴干，不见日） 苍术二斤（米泔浸五日或三日，去皮，焙干一斤） 马兰花

船上茴香各半斤 椒红二斤（醋炒取红，一斤） 熟干地黄一斤（焙干秤半斤） 柏子仁半斤

【用法】上件为细末，醋煮糊为丸，如梧桐子大，酒丸亦得。每服三十丸至四十丸或五十丸，空心、食前温酒送下，一日二服。渐加至七八十丸。

【功用】常服强筋骨，益精神，明目，黑髭发。

【主治】男子真气不足。

22939 仙茅丸

《医便》卷一。为原书同卷“长春丹”之异名。见该条。

22940 仙茅丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】半夏曲一两 鹿角胶四两 人参（去芦）一两 黄耆（蜜水炒）二两 甘枸杞二两（去梗） 山萸肉二两 陈皮一两（去白） 白术三两（酒洗，炒） 白茯苓一两五钱（炒） 川归身二两（酒洗） 甘草七钱 薏苡三两（炒） 仙茅（用川中制过者，不可见铁）一斤

【用法】上为末，用炼蜜二斤四两为丸。日服三次，每六七十丸，盐、酒送下。

【主治】补心神，固肾精。

【宜忌】忌牛、羊肉。

22941 仙茅酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】仙茅（九蒸九晒）

【用法】浸酒饮。

【主治】精气虚寒，阳痿膝弱，腰痛痹缓，诸虚之病。

22942 仙茅酒

【方源】《回春》卷四。

【组成】仙茅（出四川，用米泔水浸去赤水尽，日晒） 淫羊藿（洗尽）四两 南五加皮四两（酒洗净）

【用法】上铍，用黄绢袋盛，悬入无灰酒一中坛内，三七日后取。早、晚饮一二杯。

【主治】男子虚损，阳痿不举。

22943 仙茅酒

【方源】《医学正印》卷上。

【组成】仙茅四两（米泔浸去赤水，晒干）淫羊藿四两（洗净）五加皮四两 龙眼肉百枚（去核）

【用法】上药用无灰好酒十八斤，浸三七日取服。兼服葆真丸，殊有奇效。

【主治】男子虚损，阳痿不举。

22944 仙茅散

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】仙茅（无则以好苍术代之）一两 陈皮 枳壳（炮） 厚朴（制） 官桂 秦艽各一钱 当归 白茯苓 白芍药 白芷 川芎 半夏饼各一钱半 麻黄（不去节）二钱半 没药 甘草 川乌（炮）各半两 白僵蚕 乳香 川独活各二钱 全蝎七个 麝香半钱

【用法】上除桂、芷、麝、没、乳，余并炒转色，却入不炒药，同为细末。每服三大钱，炒大黑豆同木瓜荫酒，旋温调服，不拘时候。

【主治】背膊、手足、头目、筋脉虚掣，一切风证，疼痛不可忍。

22945 仙拈散

【方源】《春脚集》卷三。

【组成】寒水石三两（另研） 飞滑石三两（另研） 蛇床子四两（炒） 鳖甲五两（炙） 白微四两（炒） 地肤子四两（炒） 白芷三两（晒） 白鲜皮三两（炒） 百部三两（生蒸再炒） 樟脑（临用时加入同研）

【用法】上为细末。以麻油调搽，一日一换，不可用水淋洗，不可燥抹，直待结靥退后，方可净洗。一月可愈。如黑影未退，须搽百日，才能断根。

【主治】远年风湿，血风皮蛀，寒湿浸淫，流水发痒，搔之疼痛，两腿肌肤黑肿，似溃未溃，或时热烘麻木。

22946 仙乳丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】伏翼一枚（重五两者。连肠胃，炙燥） 营实（微炒）五两 威灵仙（去土）三两 牵牛子（炒） 苋实各二两 丹砂（研） 雄黄（研） 铅丹各一两 膩粉半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服七丸，食后温木通汤送下。稍增至十五丸。小儿每服三丸。以知为度。

【主治】热结上焦，昼常多眠。

22947 仙炉脂

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】香炉盖上胭脂三钱 黄连二钱 青黛二钱 冰片二分

【用法】上药各为细末。鸡蛋清调；或猪汁调敷。

【主治】小儿天疱疮。

22948 仙药散

【方源】《仙拈集》卷三引《集验方》。

【组成】山药（半生半炒）

【用法】上为末。每服二钱，沙糖滚水调服。

【主治】小儿泄泻不止。

22949 仙砂散

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】川芎 当归 升麻 甘草各六两

【用法】东流水七大碗，煎至二大碗，去滓；用好明净朱砂四两，吸去铁砂，飞净碾碎，细绢袋盛，悬砂锅内，将药水慢煮，至水尽为度，取出焙干为细末；外用糯米半升，淘净、候干，以盐泥为饼，裹米在内，火煨透，取出冷定，拣黄色者，亦为细末。每小儿一岁，朱砂一分，米粉一分，蜜一匙，酒三匙，米汤半酒杯，调匀服之。

【功用】痘疹才觉热者服之不出，见点者服之出必稀，回早者服之复起。

22950 仙胜散

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】人参 木通 紫草 生香 防风 枳壳 甘草

【主治】痘不能出，小便短涩。

22951 仙退散

《医方类聚》卷二六四。即《小儿药证直诀》卷下“羊肝散”。见该条。

22952 仙桃丸

【方源】《得效》卷十三。

【组成】生川乌三两 五灵脂四两 威灵仙五两

【用法】上各烧焙，同研为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服六丸，加至九丸，盐汤吞下；妇人，当归醋汤送下，空心服；病甚者，加至十五丸。

【主治】丈夫、妇人手足麻痹，时发疼痛，腰膝气闭，作痛不止；或冷地冰身，血气不运，打扑闪肭不可忍，及瘫痪等疾。

【宜忌】忌茶。

22953 仙桃散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】防风（去芦头） 桃根节 香白芷 细辛（去叶土）各一两 川椒（去目）半两

【用法】上为细末。每用三钱，水七分，煎至五分，热呷满口，候冷吐去；或每日揩牙，温水漱之。

【主治】风牙疼，有脓血并口气。

22954 仙家酒

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】妇人乳

【用法】每用一吸，即以指塞鼻孔，按唇贴齿而漱孔，与口津相和，然后以鼻内引上吸，使气由明堂入脑，方可徐徐咽下，凡五七次为一度。不漱而服者，何异饮酪止于肠胃耳。

【功用】大能益心气，补脑髓。

【主治】消渴，劳怯及风火症。

【宜忌】老人尤宜。

22955 仙梅丸

【方源】《古今医鉴》卷五引桑双冈方。

【组成】细茶 乌梅（水洗，剥去核，晒干）各一两

【用法】上为末，用生蜜为丸，如弹子大。每服一丸，水冷热随意化下。

【主治】痢疾发热发渴。

22956 仙菊饮

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】菊花根叶二两 生甘草末三钱

【用法】将菊花根叶捣烂，白布绞出汁，再用滚水冲在菊花汁内，用布沥出，调生甘草末饮之。

【主治】金疮痛甚者。

22957 仙雪丸

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】陈石灰（水澄清，去粗渣泥垢）一两 生熟白矾各五钱

【用法】上为末，姜汁为丸，如绿豆大。每服五丸，烧酒送下。

【主治】九种心痛。

22958 仙授散

【方源】《传信适用方》。

【组成】苍术四两（米泔浸一夕，洗净） 麻黄四两（去节） 香附子四两（去皮毛） 杏仁二两（去皮尖，麸炒，别研） 甘草二两（生用）

【用法】上为细末。每服三钱，白汤调下，如人行五里间进三服。服讫避风。如服便有汗，即不必再进。

【主治】三日伤寒。

22959 仙鸾方

【方源】《集验良方》卷五。

【组成】大熟地五钱 白茯苓五钱 香附（便炒）五钱 当归五钱 川芎三钱 乌药三钱 丹皮三钱 陈皮三钱 炒姜灰三钱 白术（土炒）三钱 益母草五钱 炙甘草五分 姜一片 大枣三枚（去核）

【用法】水二碗，煎一碗，空心服，临卧复用滓煎服。

【主治】产后各证。

22960 仙掌丸

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】乌药 白芷各五钱 雄黄 朱砂 没药 乳香各二钱

【用法】上为末，面为丸，如梧桐子大。每服二十丸，烧酒送下。五七日见效。

【主治】鹅掌风。

22961 仙鲜散

【方源】《囊秘喉书》卷上。

【组成】煨食盐六分 蒲黄四分 灯草灰三分 滴乳石三分 青黛二分 儿茶五分 冰片一分

【用法】如碎腐，加牛黄、珍珠、琥珀、龙骨；如虚腐，加人参末、制甘石；如吹药即痛，去煨食盐。

【主治】虚火喉痹。

22962 仙螺胶

【方源】《风劳臑膈四大证治》。

【组成】大田螺四十九枚

【用法】洗净，再以清水养去泥土，倒覆盆内，一宿，次将净川连二两，切片，煎浓汁熬膏一小杯，然后将螺仰置盆内，日中晒干，候腐开，挑入连胶一匙，过一夕，螺化为汁，取螺汁，再用柏叶汁、韭根汁、人乳、牛乳、羊乳、猪乳各一杯，炼蜜一两，入真金一块，砂铤熬成膏，瓷器收藏。每服一二匙，酒送下。

【主治】膈症。

22963 仙螺膏

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】大田螺一个

【用法】将片脑一分，入田螺肉，即化为水。用鹅毛搽疮口，即收。

【主治】痔漏脏毒成三五孔出水者。

【备考】用蝉蜕、白芷捣烂，将孔塞满，再用此方。

22964 仙藤散

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】青木香 藤 陈皮 香附 甘草 乌药 木香 苏叶

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】妊娠三月后，脚肿渐至膝，喘急，症若水肿，甚至足指间有黄水出者，名曰子气。

22965 仙露汤

【方源】《四圣心源》卷四。

【组成】麦冬三钱 五味一钱 贝母二钱 半夏三钱 柏叶三钱 甘草二钱 芍药三钱 杏仁三钱

【用法】煎大半杯，温服。

【主治】火泄金刑之蛆血。

【加减】若上热非盛，而蛆证时作，则全因中下湿寒，当加干姜、茯苓温燥之药；若大蛆之后，气泄阳亡，厥逆寒冷，宜加参、耆、姜、附以续微阳，清润之药切不可用。

【方论】气伤血沸，宜清金敛肺，以回逆流，而必并降胃气，降胃必用半夏，近世误以血证为阴虚，半夏性燥，不宜血家，非通人之论也。

22966 仙露汤

【方源】《医学衷中》上册。

【组成】生石膏（捣细）三两 玄参一两 连翘三钱 梗米五钱

【用法】上药用水五钟，煎至米熟，其汤即成，约可得清汁三钟，先温服一钟。若服完一剂，病犹在者，可仍煎一剂，服之如前。使药力昼夜相继，以病愈为度。然每次临服药，必详细询问病人。若腹中微觉凉，或欲大便者，即停药勿服。候两三点钟，若仍发热未大便者，可少少与服之。若已大便，即非溏泻而热犹在者，亦可少少与服。

【主治】寒温阳明证，表里俱热，心中热，嗜凉水，而不至燥渴，脉象洪滑，而不至甚实，舌苔白厚，或白而微黄，或有时背微恶寒者。

22967 仙露饮

【方源】《玉案》卷四

【组成】生地 蒲黄 黄连各二钱 升麻八分 小蓟 旱莲草 川芎各一钱

【用法】水煎，空心服。

【主治】小便出血。

22968 仙露梅

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】大青梅子三斤 青盐四两 食盐二两 活蜗牛四十个（杵烂）

【用法】共拌匀，隔一夜以后日晒夜收，盐尽为度。瓷器收贮。每取肉少许含咽。

【主治】咽喉大症垂危者。

22969 仙人杖散

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】笋(黑死者)一两(烧灰存性) 甘草(炙为末)三分 麝香(别研)半分

【用法】上为细末。分作六服，每服临卧时温酒调下。

【主治】鼠瘻。

22970 仙人肢丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】人参 沙参 玄参 紫团参 丹参 白术 牡蛎 知母 甘草各二钱 蛤蚧一对(头尾全用，河水洗净，文武火炙黄色)

【用法】上为末，用麻黄十五斤，去根枸杞子三斤，熬成膏，为丸如弹子大，瓷盒子内盛。临卧服一丸，煎生姜自然汁化下。

【主治】远年劳嗽，不问寒热，痰涎喘满。

【备考】先服松花膏，下过，多服此药。

22971 仙术芎散

【方源】《袖珍》卷一引《宣明论》。

【组成】川芎 连翘 黄芩 山梔子 菊花 防风 大黄 当归 芍药 桔梗 藿香叶各五钱 石膏二两 苍术一两 甘草 滑石各三两 荆芥穗 薄荷叶 缩砂仁各二钱半

【用法】上哎咀。每服三钱，水一盞，煎至七分，去滓，通口食后服；细末点服亦得。

【功用】明耳目，消痰饮，清神。

【主治】风热壅塞，头目昏眩。

22972 仙传齿药

《济阳纲目》卷一〇七。为《中藏经·附录》引《湘山野录》“地黄散”之异名。见该条。

22973 仙传药纸

《饲鹤亭集方》。为原书同卷“唾沫膏”之异名。见该条。

22974 仙传药酒

【方源】《回春》卷二。

【组成】茯神(去皮木) 陈皮 枳壳(去瓢) 青皮(去瓢) 牛膝(去芦) 熟地黄 肉苁蓉 白茯苓(去皮) 当归 山药 吴茱萸 防风 人参(去芦) 沉香 广木香 丁香 乳香(去芦) 各七钱 没药 缩砂 小茴 大茴 红豆 白术(去芦) 草果 黄芩 杏仁 甘草 猪苓 黄耆 三棱 莪术 半夏(姜制) 南星(姜制) 牡丹皮 槟榔 青木香 官桂 大腹皮 泽泻 天门冬(去心) 梔子 红曲 白花蛇(砂土炒) 各五钱 荆芥穗 苍术 川乌(火炮) 白芍 桂皮 知母(酒洗) 细辛 贝母(去心) 麻黄(去节) 麦门冬(去心) 草乌(火炮) 各三钱 藿香 山楂 白芷 白附子 软石膏 羌活 薄荷 木瓜 木通 葛根 山茱萸(去核) 独活各四钱 香附 破故纸(炒) 虎胥骨(酥炙) 天麻 枸杞子 川芎六钱 良姜二钱半 川椒二钱

【用法】上药修合一处，将药绢袋装盛，外用蜂蜜、核桃仁、红枣(去核)各一斤，同小黄米烧酒共装入一大坛内，竹叶封固七日，下锅煮三炷香取出，土埋二七去火毒。每早用一小钟。久服有功

【主治】男妇左癱右疾，口眼喎斜，手足顽麻，筋骨疼痛，一切诸风，痔漏，寒湿脚气，疝气，十膈五噎，胎前产后，子宫久冷，赤白带下，不受胎孕，经水不调，气滞痞块。

【宜忌】四十以上者方可用。

22975 仙灵脾丸

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】仙灵脾三分 防风半两(去芦头) 羌活三分 白附子三分(炮裂) 天麻一两 天南星半两(炮裂) 犀角屑三分 木香半两 槟榔半两 羚羊角屑三分 乳香三分(细研) 虎胥骨三分(涂酥，炙令黄) 桂心半两 附子三分(炮裂，去皮脐) 当归三分(锉，微炒) 牛膝三分(去苗) 白

僵蚕半两(微炒) 鹿茸三分(涂酥,炙令黄,去毛) 石斛三分(去根节) 麝香一分(细研) 海桐皮三分(锉) 干蝎半两(微炒) 乌蛇三两(酒浸,炙令黄,去皮骨)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下。

【主治】风湿痹,肢节疼痛,身体手足不遂。
22976 仙灵脾丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】仙灵脾一两 牛膝一两(去苗) 芎藭一两 牛黄一分(细研) 麻黄一两(去根节) 乌蛇肉二两(酒浸,炙微黄) 天麻一两 白附子一两(炮裂) 天雄半两(炮裂,去皮脐) 防风一两 独活一两 当归一两(锉,微炒) 桂心一两 细辛半两 白僵蚕一两(微炒) 莽草一两(微炒) 朱砂半两(细研) 麝香一分(细研)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前以豆淋酒送下。

【主治】风痺曳,手足麻痹,屈伸不得。

【宜忌】忌毒滑、鱼肉、羊肉等。

22977 仙灵脾丸

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】仙灵脾二两 甘菊花 黄芩 车前子 石膏(细研,水飞过) 玄参 决明子 羚羊角屑各一两 蛇蛻皮一分(烧灰)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后以温水送下。

【主治】眼暴热冲上,疼痛赤肿生翳。

22978 仙灵脾丸

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】仙灵脾一两 羚羊角屑三分 独活一两 防风一两(去芦头) 当归一两 桂心一两 牛膝一两(去苗) 薏苡仁一两 附子一两(炮裂,去皮脐) 五加皮三分 草薢一两 虎胥骨一两(涂酥,炙令黄)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下。

【主治】妇人中风偏枯,手足一边不遂,肌骨瘦,皮肤顽痹。

22979 仙灵脾丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】仙灵脾 威灵仙(去土) 赤茯苓(去黑皮) 茯神(去木) 天麻 蔓荆实 香白芷 山梔子仁 大黄(锉,炒) 益智(去皮)各一两 乌头(炮裂,去皮脐)四枚 麝香(研)半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸至五丸,空心温酒送下。

【主治】肾脏壅盛,上攻头目,胸膈咽嗝,痰实不利。

22980 仙灵脾酒

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】仙灵脾六两(锉,鹅脂一两炒) 陈橘皮(汤浸,去白,焙)半两 连皮大腹(锉) 槟榔(锉)各三枚 黑豆皮一合 桂(去粗皮)一分 豉一合 生姜半分 葱白三茎(切)

【用法】上锉,以生绢袋盛,用好酒一斗二升浸,挂药不令到底,煨灰火外煨一伏时,取出候冷。空心、夜卧各一盞。服此酒后,更用紫稍花散浴药淋浴,以壮阳气。

【功用】补精益气。

22981 仙灵脾酒

《医统》卷八。为《圣惠》卷二十一“仙灵脾浸酒”之异名。见该条。

22982 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】仙灵脾一两 威灵仙一两 芎藭一两 桂心一两 苍耳子一两

【用法】上为细散。每服一钱,以温酒调下,不拘时候。

【主治】风走注疼痛,来往不定。

22983 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】仙灵脾一两 附子一两(炮裂,去皮脐) 当归一两(锉,微炒) 草薢一两(锉) 杜仲一两(去粗皮,炙令黄) 木香

一两

【用法】上为细散，每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】风腰脚疼痛冷痹，及四肢缓弱。

22984 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】仙灵脾一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 石斛一两（去根，锉） 天麻一两 牛膝一两（去苗） 麻黄一两（去根节） 芎藭三分 五加皮三分 革薢三分（锉） 丹参三分 桂心三分 当归三分 虎胫骨一两（涂酥，炙令黄） 防风三分（去芦头） 羌活三分 槟榔一两

【用法】上为细散。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】风脚膝软弱，筋骨缓纵，不能行立。

【宜忌】忌生冷、油腻、猪、鸡肉。

22985 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】仙灵脾一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 天麻一两 独活三分 牛膝一两（去苗） 芎藭三分 石斛一两（去根） 肉桂一两半（去粗皮） 茵芋三分 麻黄一两半（去根节） 当归三分 侧子三分（炮裂，去皮脐） 乌蛇肉一两（酥拌，炒令黄） 虎胫骨一两（涂酥，炙令黄） 桑螵蛸三分（微炒） 丹参三分 五加皮三分 海桐皮三分 防风三分（去芦头） 薏苡仁三分 干蝎三分（生用） 牛黄一分（细研） 麝香一分（细研）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】中风，手足不遂，肌肉冷痹，骨节疼痛，缓弱不随。

22986 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】仙灵脾一两 牛膝一两（去苗） 羌活半两 虎胫骨一两（涂酥，炙微黄） 独活半两 羚羊角屑半两 防风半两（去芦

头） 桂心一两 酸枣仁半两（微炒） 当归半两（锉，微炒） 薏苡仁半两 侧子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】腰脚冷痹，筋脉挛急，时有疼痛，行立不得。

22987 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】仙灵脾二两 虎胫骨二两（涂酥，炙令黄） 附子二两（炮裂，去皮脐） 防风二两（去芦头） 蜈蚣花二两（醋拌炒，令干） 牛膝二两（去苗）

【用法】上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】妇人血风，身体骨节疼痛不止。

22988 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】仙灵脾一两 羌活三分 海桐皮三分 牛膝三分（去苗） 当归三分 芎藭三分 骨碎补三分（去毛） 延胡索三分 桂心三分 木香三分 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒令黄） 菴藟子三分 枳壳三分 槟榔一两 蜈蚣半两（微炒） 麝香一分（研入）

【用法】上为细散。每服一钱，食前以豆淋酒调下。

【主治】妇人血气攻注，腰脚疼痛。

22989 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】仙灵脾三分 牛膝三分（去苗） 鬼箭羽半两 当归三分（锉，微炒） 地龙半两（炒令黄） 没药半两 桂心半两 威灵仙半两 骨碎补半两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】产后血气攻刺，腰痛不可忍。

22990 仙灵脾散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】仙灵脾根半两 晚蚕蛾半两(微炒) 射干一分 甘草一分(炙微赤, 锉)

【用法】上为细散。用羊子肝一枚, 切开, 掺药二钱在内, 以线系定, 用黑豆一合、米泔一大盏, 煮熟取出, 分为二服, 以汁下之。

【主治】小儿雀目, 至暮无所见。

22991 仙灵脾散

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】仙灵脾 防风(去叉) 蔓荆子 枳壳(去瓢, 麸炒) 何首乌(去黑皮) 各一两 苦参半两 荆芥穗二两

【用法】上为散。每服二钱匕, 温酒或腊茶清调下。

【主治】肺风。皮肤瘙痒, 生痞瘤。

22992 仙灵脾散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】仙灵脾 射干 晚蚕沙(炒) 恶实(炒) 甘草(炙, 锉) 等分

【用法】上为散。每服一钱匕, 食后良久沙糖水调下, 一日三次。

【主治】风毒冷泪, 隐涩疼痛。

22993 仙灵脾散

【方源】《幼幼新书》卷十八引《谭氏殊圣》。

【组成】仙灵脾 威灵仙

【用法】上为末。每服二钱, 食后米饮调下; 小儿半钱。

【主治】①《幼幼新书》引《谭氏殊圣》: 疮疹入眼。②《幼幼新书》引《赵氏家传》: 食毒, 睛突外。

22994 仙灵脾煎

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】仙灵脾二斤 黑豆二斤(升) 茄子根二斤(以上三味, 细锉, 都以水三斗, 煮至一斗, 去滓, 更煎至五升即止) 桂心一两 羌活一两 芎藭一两 败龟一两(涂酥, 炙令黄) 虎胥骨一两(涂酥, 炙令黄) 防风一两(去芦头) 革薺一两(锉) 当归一两 安息香一两 赤箭一两 附子二两

(炮裂, 去皮脐) 乳香一两

【用法】上为末, 入于前三味汁中, 以慢火煎, 柳木蓖搅, 勿令住手, 可一炊时止, 盛于瓷器中。每服一茶匙, 食前以温酒调下。

【主治】历节风, 疼痛, 手足顽痹, 行步艰难。

【宜忌】忌生冷、油腻、猪、鸡、犬肉。

22995 仙灵脾煎

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】仙灵脾一斤(细锉, 以酒七升, 煮至二升, 滤去滓, 入后药末) 附子二两(炮裂, 去皮脐) 肉桂二两(去皱皮) 赤芍药 牛膝(去苗) 鹿角胶(捣碎, 炒令微燥) 革薺(锉) 五加皮 酸枣仁 石斛(去根, 锉) 当归 木香 乳香各一两

【用法】上为末, 于银锅中入前煎在内, 次入白蜜五合, 下诸药末, 用慢火熬, 以柳木蓖不住手搅, 令稀稠得所, 收于瓷器中。每服一茶匙, 食前以温酒调下。

【主治】一切风。

【宜忌】忌猪、鸡。

22996 仙黄石膏

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】羊躑躅草(三四月间收, 连根捣取自然汁)

【用法】上药煎炼, 加白蜜成膏, 量加麝香、冰片、松香, 收贮瓷瓶。每服一匙, 酒下。昏沉一二时, 醒后自觉爽快。

【主治】风痹麻痛。

22997 仙遗粮丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】土茯苓一斤 防风 木通 薏苡仁 防己 白茯苓 金银花 木瓜 白鲜皮 皂刺各五钱 白芥子四钱 当归身七钱

【用法】上为末, 蜜为丸或浸酒服。

【主治】杨梅疮后肿块成痼。

【宜忌】忌生冷、鱼、鸡、煎炒、茶酒、房室十余日。

【加减】虚弱者, 加人参五钱。

【备考】《外科百效》有木槿皮，无木瓜。

22998 仙遗粮汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】土茯苓一两（干者七钱） 防风 木瓜 木通 薏苡仁 白鲜皮 金银花各五分 皂子四分

【用法】水煎，一日三次分服。

【功用】预防下疳疮。

【主治】杨梅风毒，及误服轻粉，以致瘫痪，筋骨疼痛，不能动履，或坏肌伤骨者。

【加减】气虚，加参、耆；血虚，加芎、归熟地、牛膝；肺热，去土茯苓，倍薏苡仁、金银花。

22999 仙遗粮汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】仙遗粮四两 防风 荆芥 川芎 当归 天花粉 金银花 白蒺藜 薏苡仁 威灵仙各一钱 山梔 黄连 连翘 干葛 白芷 甘草 黄芩各六分

【用法】水三碗，煎二碗，量病上下，食前后服；滓再煎一碗，服后饮酒一杯。

【主治】杨梅结毒，初起筋骨疼痛，已破，肌肉溃烂者。

【宜忌】忌牛肉、火酒、房事等。

【加减】病在下部，加牛膝。

23000 仙遗粮汤

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】川芎 当归 防风 米仁 木瓜 木通 银花 白鲜皮 苍术 威灵仙各一钱 甘草五分 肥皂五个（切片，微炒） 人参（疮久气虚者加） 仙遗粮（即土茯苓，木槿打碎）二两

【用法】水二碗，煎八分，看病上下，食前后服。

【主治】杨梅疮初起，筋骨疼痛，数月延绵不已。及杨梅风毒，误服轻粉，瘫痪骨疼，不能动履。

【宜忌】忌牛、狗、鸡、鹅、火酒、茶、醋等物。

【加减】腿脚之下，加牛膝一钱。

【备考】浅者一月可退，深者百日方痊。此疮欲发，先发下疳，预服此方免发疮也。

23001 仙遗粮汤

《会约》卷七。为《景岳全书》卷六十四“秘方仙遗粮汤”之异名。见该条。

23002 仙遗粮散

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】土茯苓 银花 灵仙 川柏 知母 白菊花 芦荟 胡黄连 羌活 独活 龙胆草 槐花

【用法】陈酒为引，水煎服。

【主治】杨梅疮。

【加减】火毒重者，加芒消、大黄；虚者，加人参。

23003 仙鹤草膏

【方源】《中药成方配本》。

【组成】鲜仙鹤草一百斤

【用法】鲜仙鹤草一百斤（如无鲜者，用干者三十斤），同枣子三斤，一次煎汁，焯一宿，次日取出，榨净去滓，滤清，加白蜜十斤，炼透，滤过收膏，约成膏七斤。每日三次，每次三钱，开水冲服。

【功用】止血。

【主治】吐血、咯血、衄血。

23004 仙人玉壶丸

《千金》卷十二。为《医心方》卷十四引《深师方》“西王母玉壶赤丸”之异名。见该条。

23005 仙人杖浸酒

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】仙人杖根一斤四两（刮，洗去土，皮锉，枸杞根白皮是也）

【用法】上一味，用生绢囊贮，以酒二斗，浸七日。每日温饮一盞至二盞，不拘时。酒欲尽，再入五升，依前浸服。

【功用】柔风，脚膝痿弱；久积风毒上冲，肩膊胸背疼痛；妇人产后中风；及一切热毒风。

23006 仙人炼绛雪

【方源】《外台》卷三十一引《崔氏方》。

【组成】朴硝十斤 升麻三两 大青 桑白皮 槐花各二两 犀角屑 羚羊角屑各一两 苏方木六两 竹叶 诃黎勒 山梔子三十枚 槟榔仁二十颗 朱砂半大两(研)

【用法】以水二斗，渍一宿，煎取一斗，去滓入锅，纳朴消炼烱，搅勿住手，候欲凝，出于盆中搅，入朱砂、麝香讫，雪成，收于瓷器中，密封。有疾量取之，和水服之；产后一切诸病，堕胎，和酒服之。老小量之。

【功用】轻身明目，调适四肢。堕胎。

【主治】一切病，肺气积聚咳逆，呕吐衄血，丹石毒发，天行时气，一切热病，诸黄疽等；心风昏乱，心怯健忘，四肢烦热，头痛眼赤，大小便不通，烦闷不安，骨节疼痛，赤白痢，血痢，热毒痢，宿食不消化，心腹胀满，出气不得，下一切诸毒药，脚气等；饮酒多醉困，久痢不愈，孩子惊痫等；产后一切诸病。

【备考】方中竹叶、诃黎勒用量原缺。

23007 仙人掌草方

【方源】《普济方》卷二九八。

【组成】仙人掌草二斤

【用法】与甘草浸酒服。

【主治】肠风下血。

23008 仙方三补丸

【方源】方出《急救仙方》卷六，名见《医方类聚》卷一五三。

【组成】破故纸三两(隔纸炒令香熟) 白茯苓一两(去皮) 没药一两(无灰酒浸)

【用法】上候酒浸没药如锡糖样，用前二味为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心熟水下。不问老少，有疾皆效。

【主治】诸虚百损。

【方论选录】破故纸补肾，茯苓养心，没药养血。三者既壮，自然身安。

23009 仙方万安散

【方源】《普济方》卷一九四。

【组成】黑牵牛三两(生熟各半，熟黄色，不用焦黄) 雷丸三个(生用) 大黄二两

(生用) 管仲三两 槟榔三两(生用)

【用法】上为细末。每服四钱，重者五钱，用沸汤浸至明晨服。服毕，细嚼生姜三片过药，一时刻取下。四时着病，皆可服之，十岁者，分作二服。老幼衰弱，临时加減。

【主治】男子妇人，不以老幼，一切沉深积块，气蛊，水蛊，食蛊，小肠膀胱奔豚，疝气偏坠，木肾，脚气；十膈五噎，翻胃吐食，脾痛气喘，痰饮咳嗽，肺胀；吐血，咯血，淋血者；诸般疮癣，肠风泻血；妇人赤白带下，经脉不调，或后或前，血崩，积聚。

【宜忌】忌鱼腥三五日。

23010 仙方万金丸

【方源】《医方类聚》卷一七九引《经验秘方》。

【异名】神仙金丸(《普济方》)卷二七三引《经验良方》。

【组成】海浮石半两(用木柴炭火烧通红，却于好醋内蘸过，如此七烧七蘸) 川乌头一两(于文武火内炮制) 乳香一钱(细末) 没药一钱(细末) 巴豆四十九粒(去皮，炒黄色为末)

【用法】上件海浮石与川乌于臼内捣为末，与诸药和匀，醋糊为丸，如梧桐子大。若疮二三日，每服十丸；若疮五六日，每服十三丸。如疮在上，食后；在下，食前。如觉呕吐勿虑，若吐出药时别服。小儿大小加減，病人如觉不动，再服三丸。每服药，先饮冷酒一盏，如泻不止，冷粥押之。

【主治】疔黄，脑背疽等一应恶疮。

【宜忌】服药后，忌冷热物。

23011 仙方内消丸

【方源】《普济方》卷一七二。

【组成】青皮(去白) 陈皮(去白) 苍术(米泔浸) 桂(去皮) 三棱(煨) 蓬术(煨) 干漆(炒出烟) 芫花(醋煮) 草霜 附子 故纸(炒) 皂角各三两 黑牵牛半两(半生半熟) (一方加半夏三两)

【用法】上为末，醋和为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，随汤下。

【主治】酒食过伤脾胃。

23012 仙方化痰丹

【方源】《仙传外科集验方》。

【组成】明矾 迟矾 大半夏（汤洗七次）大南星各二两（一半汤洗七次，一半皂角煮）

【用法】内用南星一半，切作片子，却用不蛀皂角截断七片，各一寸长，用水同南星煮干为度，去了皂角，只用南星焙干，将前药总为细末，水打硬面糊候冷，用浓生姜自然汁在内化开，面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心、临卧用淡姜汤吞下。

【主治】痼疽发背。

23013 仙方牛黄丸

【方源】《普济方》卷三七三。

【异名】牛黄丸（《袖珍小儿》卷三）。

【组成】白花蛇（酒浸，取肉）天麻 全蝎 白附子 真川乌一只（重半两，生者，去皮脐）薄荷叶各半两（以上六味，先为细末，次入）雄黄半两 辰砂三钱 牛黄一钱 麝香一钱 脑子半钱（皆别研）

【用法】上一处和匀，麻黄去根二两，酒一升，煎麻黄至一盞，去麻黄，用酒熬药得所，为丸如芡实大，密器盛之。一丸作五服，煎金钱薄荷汤磨化。

【功用】发散惊邪。

【主治】小儿惊风，中风，五痫天钓，客忤潮涎灌膈。

23014 仙方地黄散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】猪牙皂角 干生姜 升麻 槐角子 生干地黄 木律 华细辛 旱莲 香白芷 干荷叶各二两 青盐（另研）一两

【用法】上锉，于锅内烧，有青烟存性为度，用纱罗子重罗，别研青盐末和匀，同入药内。每用少许刷牙。蘸药刷牙，合口少时，有涎即吐，然后用温水漱口，早晨、临卧用。

【功用】令牙齿莹白，涤除腐气，牙齿坚牢，

龈槽固密，黑髭鬓。

【主治】牙齿黄色不白。

23015 仙方夺命丹

【方源】《普济方》卷六十引《德生堂方》。

【组成】白茯苓 密陀僧（炒黄色）紫河车各一两 白僵蚕（直者）贯众（净）缩砂仁 甘草节各一两 乌鱼骨（去皮）二钱半 麝香一字

【用法】上为细末，却入麝香研匀，同蒸饼，包白面蒸熟四两，和药，汲新井水为丸，如豌豆大，蛤粉为衣，放干十年不坏。每服一丸，用瓦器研碎，新水半盞，浸一茶时化开，用匙挑药，徐徐滴入喉中。勿急用，取药尽为度。

【主治】缠喉风，木舌胀，双单乳蛾，喉闭，或误吞鸡鱼骨刺，竹木签刺，一切咽喉急证。

23016 仙方羊肉丹

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】肉苁蓉（酒洗）枸杞 山药各四两 生干地黄 熟干地黄 远志 石菖蒲 破故纸（盐炒）干木瓜 牛膝各一两（酒浸）木香 五味子 复盆子 沉香 茴香（盐炒）一两 韭子（同）龙骨五钱 鹿茸（酥炙）三两 麝香一钱

【用法】上以羊肾驱肉一斤，去筋膜，银器中用无灰酒入葱白一握，陈皮一两 青盐半两，川椒（去目并合口者）半两，慢火煮肉极烂，去葱白、陈皮不用，研极烂，和前药为丸，以朱砂为衣。每服丸数不以多少，空心酒、汤任下。

【功用】升降阴阳，生气血，通经络，壮元阳，补脏腑，久服明目益肾，润颜色，阳事不倦，老来行步如飞，髭须不白。

【备考】方中木香、五味子、覆盆子、沉香用量原缺。

23017 仙方沉麝丸

《医便》卷三。为《苏沈良方》卷四“沉麝丸”之异名。见该条。

23018 仙方固真丹

【方源】《得效》卷七。

【组成】禹馀粮 石中黄 赤石脂 紫石英 石燕子各一两(炭火煅通红,米醋三升,淬干为度) 白茯苓四两 人参二两 青盐一两

【用法】上以白茯苓四两、人参二两、青盐一两同为末,入无灰酒约量多少打糊,拌和众药为丸,以朱砂为衣,如小指头大。每服二丸至三丸,温酒或盐汤下,空心、临卧服。

【主治】精泄不禁。

【备考】本方方名,《普济方》引作“固真丸”。

23019 仙方刷牙药

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】青盐二两半 坚河子二十个 芝麻粹五两 夏蚕沙七钱 旱莲草一两半 皂角(不蛀者,去皮)二两

【用法】上同为末,醋浆水和丸,如球子大,晒干,用新瓦罐瓶内盛药,用盐泥固,候干,留一小眼子出烟,置一净砖上,用木炭火烧,烟淡药熟之后即出,旋研如常。刷之。如已白者,百日黑;未白者,半月见效,唯频刷尤妙。

【功用】乌髭鬓,牢牙齿,延年迟老。

23020 仙方香壳丸

《济阳纲目》卷四十一。为《济生》卷四“香棱丸”之异名。见该条。

23021 仙方香棱丸

《卫生宝鉴》卷十四。为《济生》卷四“香棱丸”之异名。见该条。

23022 仙方活命饮

《校注妇人良方》卷二十四。为《女科万金方》“神仙活命饮”之异名。见该条。

23023 仙方脑麝丸

【方源】《痧书》卷下。

【组成】黄药子 白药子各三两 天花粉二两 川连一两(用心择过,研末,筛细,只用头末) 广木香三钱 沉香二钱 麝香五分 片脑三分

【用法】猪胆调蒸为丸,每丸一分。瘴气痰渴,老年痰火,临卧噙化三丸;暑路常噙一丸,止渴消暑;如感大热,用五七丸,同好茶一撮,盐梅一个,搗碎,并花水调下;心热头疼目雾,噙化三五丸;赤痢,用茅根汁搗七丸;白痢,用茶梅搗服。

【功用】解茶痰酒渴,除伏暑,退心热,止喉疼,开目雾。

【主治】岚瘴,及赤白痢,一切火症;痧胀,面赤身热,喘急昏迷者。

23024 仙方救命汤

【方源】《外科启玄》卷十一。

【组成】大黄 梔子 牡蛎 金银花 木通 连翘 乳香 牛蒡子 没药 瓜蒌 角刺 地骨皮各等分

【用法】上锉。每剂五钱,酒、水各半煎。一服而愈。

【主治】疔疮走了黄,打滚将死,眼见火光危症。

23025 仙方椒苓丸

【方源】《本草纲目》卷三十二引《邵真人经验方》。

【组成】真川椒一斤(炒去汗) 白茯苓十两(去皮)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心盐汤下。

【功用】补益心肾,明目驻颜,顺气祛风,延年。

【宜忌】忌铁器。

23026 仙方隔纸膏

【方源】《秘传外科方》。

【异名】神应膏。

【组成】黄连 何首乌(去皮) 草乌(去皮) 当归尾 白芷各半两 川乌(去皮)二分半 黄丹(夏用)二两 乳香 没药各半两 血竭半两

【用法】前六味,总为咀咀,用清油五两,同药一处入于铫子内,以文武火熬,待药黑色,用布滤去滓,仍将药油入铫内,下黄丹,用

桃柳枝一把，不住手搅之，又黑色，即将血竭、乳、没细末入内，搅匀略煎，滴在水中，成珠不散，却用瓦碗盛之，沉在冷水中，浸一昼夜出火毒。贴患处。

【主治】发背，痈疽，外疔，下疳，诸般恶毒疮疖。

23027 仙方鯪鲤散

【方源】《赤水玄珠》卷三十。

【组成】穿山甲（活者，大约重十斤为妙，剖开肚，不去肠杂，以真生漆一斤，涂在肚内，阴干七日，用泥包，火煨存性）

【用法】上为极细末。每服三分或五分，火酒调下。用真青布被，上下盖之，出汗臭不可闻，不得见风，待汗干，被上俱是小虫。服十日，眉发复出，身上脓水疮皆愈，一月即脱体除根。

【主治】大麻风。

23028 仙方凝灵膏

《千金翼》卷十三。为《千金》卷二十七“茯苓膏”之异名。见该条。

23029 仙术木瓜丸

【方源】《百一》卷十一。

【组成】宣州大木瓜三个（去皮，切下盖，剝了子，用青盐六两，放在三个木瓜内，于饭甑上蒸三四次，研烂） 苍术二斤（米泔水浸三日取出，黑豆一升，用长流河水高如药面三寸同煮，以干为度，去黑豆不用，将苍术切作片，焙干） 白茯苓六两

【用法】上为细末，以研烂木瓜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒、盐汤送下。

【主治】脚气。

23030 仙术茯苓丸

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】术五斤（净括去皮，洗，控令浥浥，细锉） 白茯苓三斤（去黑皮，捣末）

【用法】上药先将术捣碎，以水三斗，纳釜中煮之，至五升，绞去滓，加茯苓末，搅和令匀如膏，为丸如弹子大，放不津瓷器中。每服一丸，细嚼温水下，一日二次。

【功用】辟谷，活血驻颜，耐风寒，延年不老。

23031 仙术通神散

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】防风通圣散去麻黄、芒消，加藿香、砂仁、甘菊花、苍术。

【主治】风热上壅，头旋目眩，起则欲倒。

【加减】如风热上攻，头目昏眩闷痛，痰喘咳嗽，去藿香、苍术，加人参、寒水石。

23032 仙传三妙膏

【方源】《良方集腋》卷下。

【异名】三妙膏（《膏药方集》）。

【组成】千金子 荆芥穗 金银花 明天麻 川大黄 上肉桂 牛蒡子 白附子 海风藤 川黄连 穿山甲 天花粉 刺猬皮 高良姜 片黄芩 黄柏 红花 细辛 贝母 各五钱 苦参 草乌 甘草 防风 牙皂 连翘 鳖甲 巴豆 牛膝 麻黄 苏木 乌药 僵蚕 草麻 白芨 桃仁 羌活 黄耆 全蝎 防己 血余 当归 半夏 柴胡 大戟 白薇各五钱 蜈蚣三条 蛇蜕一条 紫荆皮 石菖蒲 独活 赤芍 白芷各二两

【用法】上药切片，用香油二百两，入大铜锅内浸七日夜，再入桃、柳、桑、槐枝各二、十一段，每段长寸许，慢火熬至药黑枯色，滤去滓，将锅拭净，再以密绢，仍滤入锅内，务要清洁为美，再用文武火熬至油滴水成珠，大约得净油一百六十两为准，离火，入上好飞丹八十两，以一手持槐木棍，一手下丹，不住手搅匀成膏，再入后药：乳香、没药各八钱（去油）、血竭、雄黄各五钱，此四味另研。先入搅匀，再入后药：木香、沉香、檀香、降香、枫香各五钱、丁香、麝香、藿香、珍珠、冰片各一钱，此十味，徐徐添入，搅匀，再入樟脑五钱，成膏，收贮听用。贴患处。

【主治】①《良方集腋》：无名肿毒，痈疽发背，对口疔疮，湿痰流注，杨梅结毒，瘰癧马刀，妇人乳疽，小儿丹毒，汤火烧灼，蝎

螫蜂叮，金刃所伤，出血不止，或跌扑打损，瘀痛难禁，或风寒湿气，袭入经络，以致骨痛筋挛，或湿热横入脉络，闪腰挫气，动举难伸，并大人小儿之五积六聚，男妇之痞块，癰疽。②《经验奇方》：疮痍日久，内生腐骨，口极细小，时流黄水，诸法不效者；或被狗咬，腐痛不堪。

【备考】①《良方集腋》：此膏贴上未成即消，已成即溃，溃后即敛，故名三妙。②《经验奇方》：疮痍内生腐骨，此膏逐日贴之，其骨自然渐渐显露，以手轻轻拨去，骨尽收功。

23033 仙传万灵膏

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】羌活 独活 山梔 官桂 玄参 大黄 当归 白芷 皂角 白附子 五倍子 赤芍 生地 熟地 防风 天花粉 黄连 川芎 山茨菇 连翘 红牙大戟 桔梗 白及 白蔹 苦参各六钱 川山甲十片 木鳖子二十粒(去壳) 蓖麻子八十粒(去壳) 杏仁四十粒 巴豆三十粒(去壳) 血余四两 槐枝 柳枝 桑枝寸许长者各三十段

【用法】麻油二斤四两，春、秋浸三日，夏浸二日，冬浸五日，熬枯黑色，去滓，再熬至滴水成珠，每油二斤，下飞丹一斤，松香三两，黄蜡二两，桐油二两，熬不老不嫩，稍冷入乳香、没药各六钱，血竭、阿魏、孩儿茶、百草霜、轻粉、马兜膏各三钱，桑枝搅匀。摊贴。痈疽发背痈疮，用火烘手热，摩百余下贴，已出脓者，不必摩；疥癬疮，搔痒贴；风癩，用木鳖子火煨研烂，置肿上贴；无名肿毒，贴患处；跌扑刀斧伤，贴患处；风痰壅塞，贴心上，热手摩百下；痞块，木鳖子研烂，置膏药上贴之，以皮消一两、鸽粪五钱、蒜二个捣匀，用面作一圈围，定在膏药外，熨斗火运药上，令气透；蛊胀，加煨木鳖，贴心下脐上，热手磨百次；瘫痪，湿气痛，加煨木鳖贴患处，手摩百下；月经不调，贴血海穴，手摩百下。

【主治】痈疽发背痈疮，疥癬疮，风癩，无

名肿毒，跌扑刀斧伤，风痰壅塞，痞块，蛊胀，瘫痪，湿气痛，月经不调。

【宜忌】忌用铁锅煎。

23034 仙传化毒汤

《东医宝鉴杂病篇》卷七。即《回春》卷八“吕洞宾仙传化毒汤”。见该条。

23035 仙传化毒汤

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】牡蛎 大黄 山梔 金银花 木通 连翘 乳香 没药 牛蒡子 地骨皮 皂角刺 瓜蒌仁各九分

【用法】水、酒各一碗，煎七分服。

【主治】疔疮走黄，发狂将死者。

【加减】气壮者，加朴消一二钱。

23036 仙传化毒丸

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】鸩鹑一只(用白水煮烂，加酒半斤，阿魏五钱，再煮一滚，捞起，丝内炙干，骨头打碎，炒脆，捣为末) 五色糖阿魏二两二钱(另烱入药) 水红花子十两 神曲一两六钱 白术 当归 陈皮各一两二钱 急性子 芦荟各七钱 蓬术六钱 青皮五钱 甘草四钱 枳壳 雄黄各五钱

【用法】上为末，将鸩鹑汁为丸，如梧桐子大。每服二钱五分。服药后，病在左，睡朝左，病在右，睡朝右。

【主治】痞块。

23037 仙传化毒锭

【方源】《春脚集》卷四。

【组成】枯矾三钱 川连五分 雄黄一钱 川柏一钱 山梔一钱 蛇床子三钱 川乌五分 草乌五分

【用法】上为末，炼蜜合作八丸。每日早服半丸，用桔梗三钱，薄荷三钱，煎汤送下。

【主治】妇女时行下疳证。

23038 仙传午时茶

【方源】《经验奇方》卷上。

【组成】茯苓片八两 柴胡六两 泽泻片 枳壳片 苏叶 防风 扁豆 赤小豆各五两 忍冬藤 枯黄芩 鲜竹茹 花粉各四两 藿

香 生甘草 香薷 麦冬各三两 双钩藤二百一十只 鲜荷叶三十片(切碎) 陈茶叶一百两(均用库平)

【用法】先将荷叶放大铁锅内,加水煎汁去滓;再将茯苓等十七味一并下锅,煎至汁水较浓,滤汁储缸;仍将原药加水再煎多时,滤汁储缸;再加水煎至第三次,滤汁去渣,连同前汁,并入锅内再煎至约汁小半锅为度;再将茶叶放入,随放随拌,将汁渗干,取起摊晒极燥,每服二钱,分装纸袋封口,储大洋铁筒,勿令泄气受蒸。每服一袋,清水煎服。暖睡出汗。重则二剂同煎,小儿减半。

【主治】伤风头痛,冒暑发痧,吐泻。

23039 仙传玉露丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】大黄四两 黄芩八两 菊花二两 白蒺藜(炒)四两 栀子(炒)二两 石决明(煅)三两 蝉退一两 木通二两 桔梗二两 黄柏二两 薄荷一两 玄参(去芦)二两 川芎一两 芒消四两 甘草一两 泄叶四两

【用法】上为细末,过罗,用冷开水泛为小丸,用滑石十两,青黛二钱为衣,闯亮。每服二钱,日服二次,温开水送下。

【功用】平肝清热,明目消肿。

【主治】暴发火眼,目赤红肿,肝热耳鸣,口舌生疮,大便秘结。

【宜忌】孕妇忌服。

23040 仙传生牙丹

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】鼠骨四两(人乳浸一日,阴干为末) 柏子仁(去油) 枸杞 山萸(酒蒸) 血余(少壮者佳,皂角水洗净,入罐,煅成灰) 鹿角霜各八两 远志(甘草水泡,去骨) 菖蒲 灵砂(人乳煮过)各四两

【用法】上为末,鹿角胶四两为丸,如梧桐子大。每服百丸,子时酒送下。

【功用】牙落重生。

23041 仙传夺命膏

【方源】《疡医大全》卷七引《邵氏秘书》。

【组成】驴蹄一个 大鲫鱼 商陆各一斤 山羊角三个 芫花 土木鳖 白及 番木鳖 大戟 露蜂房 白薇 红花 元参 苏木 桃仁 蛇蜕各一两 当归尾 黄牛角腮 巴豆肉 干蟾皮 猪悬蹄甲 南星 半夏 穿山甲各二两 大黄三两 草麻仁 苍耳嫩头各四两 金线吊虾蟆一个

【用法】用麻油四斤,同药熬枯去滓,熬至滴水成珠为度,每熟油一斤,入炒官粉八两收成膏,再下乳香(去油)、没药(去油)、麝香、芸香、轻粉各三钱,研细搅匀收贮。如贴肿毒未破者,用敷肿毒,末药掺上贴;凡贴痞块,用针刺患上三针,如品字样,外用阿魏、蜈蚣、穿山甲、麝香各等分、研为细末,只秤一分,掺于针眼内,余者掺膏上贴;凡贴风气,用闹阳花五钱,烧酒拌,晒干三

次,炒脆为末,麝香三分,乳匀,掺膏上贴。

【主治】发背对口,一切肿毒,痞块,风气。

23042 仙传至宝丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】莪术(炙)二十二两 益智仁九两七钱 橘皮二十二两 三棱(炒)九两七钱 厚朴(炙)十六两 桔梗九两七钱 甘松六两四钱 茯苓三十八两四钱 黄耆三十二两 青皮(炒)十六两 藿香十六两 木香十九两二钱 枳壳(炒)十六两 砂仁十六两 神曲(炒)十六两 白术(炒)四十八两 胆星三十二两 山楂十六两 滑石一百一十两 甘草十八两 南查十六两

【用法】上为细末,过罗,炼蜜为丸,重一钱,朱砂为衣。每服一丸,日服二次,温开水送下,周岁内小儿酌减。

【功用】和胃消食,清热导滞。

【主治】小儿停食停乳,头热身烧,呕吐腹痛,红白痢疾。

23043 仙传延寿丹

【方源】《疡医大全》卷三十引骆潜庵方。

【组成】绵纹大黄十斤

【用法】上切片,先用白酒或黄酒浸两昼夜,入砂锅煮一柱大香取出,铺在板上晒极干,二次三次亦如之;到四制,用藁本煎汁,浸一昼夜,煮晒如前;五制用车前草摘来洗净,洒水捣汁浸,煮晒如前;六制用向东南侧柏叶,清晨揉来水洗捣汁,浸煮晒如前,到后三制仍用酒浸煮透,晒至九次,只晒半干,便入石臼捣烂为丸,或重一分、三分、一钱、二钱、三钱。看儿大小,火证轻重,加減用之。

【主治】小儿胎毒,哑口口噤,脐风,马牙鹅口,重舌木舌,风热脾热,积热骨蒸,壮热夜啼,火眼翳障,一切火证。

23044 仙传草还丹

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】乌梅肉四两 薄荷叶二两(研末)白糖八两 片脑三分

【用法】上药先将乌梅捣烂后,加荷、糖、冰片合为丸。含之。

【功用】添精补髓,清气化痰,常服神清气爽,温疫不侵,视听倍常,步履轻健,须鬓加添,返老还童,延年益寿。

【主治】虚弱劳心。

23045 仙传砂雪丸

《沈氏经验方》卷下。为方出《外科全生集》卷二,名见《仙拈集》卷三“砂雪丸”之异名。见该条。

23046 仙传保命丹

《胎产心法》卷中。为《金匱》卷下“桂枝茯苓丸”之异名。见该条。

23047 仙传急救散

《串雅内编》卷一。为《医便》“仙传救急惊神方”之异名。见该条。

23048 仙传神效方

《良朋汇集》卷三。为《医便》“仙传救急惊神方”之异名。见该条。

23049 仙传桑叶水

【方源】《同寿录》卷二。

【组成】桑叶

【用法】用端午、重阳、立冬日收取桑叶,

每正月初五日、二月初一日、三月初五日、四月初八日、五月初五日、六月初七日、七月初七日、八月初八日、九月二十九日、三十日、十月初十日、十一月初十日、十二月初一日(闰月照前),将桑叶十片,煎汤洗之。

【功用】开瞽复明。

【临证举例】失明 宋元年间,扬州陈太守,年七十岁,双目失明,依方洗之,光明复旧。

23050 仙传黄金丹

【方源】《寿世新编》卷上。

【组成】顶上真川连二两四钱 顶上真川贝六钱(去心) 干姜二两四钱 藿香叶三钱 广陈皮三钱 黄芩二两一钱(酒炒) 丁香三钱 荆芥穗三钱 草拨六钱 砂仁三钱(去壳) 炒麦芽三钱 车前子六钱(播去空壳浮皮,要净)

【用法】上为细末,用鲜荷叶捣汁为丸,勿用蜜,每丸约重八分。一丸可救一人,小儿半丸,开水送下,病虽重,二丸必愈。

【主治】一切寒热暑湿时疫,感触四时不正秽气,及一切腹痛、泄泻、赤白痢,并绞肠、霍乱、斑痧,咳嗽。

【宜忌】服后唯忌鱼半天。

23051 仙传救苦丹

《急救痧症全集》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“救苦丹”之异名。见该条。

23052 仙传救苦汤

【方源】《经验秘方》卷上。

【组成】大黑豆三合(炒熟) 生姜一块(重二三两,切片)

【用法】用水三碗,煎数沸取起,去姜、豆,服汁。避风,待汗出透即愈。

【主治】夏月贪凉,寒气潜入腠里,致男妇中寒阴症。

23053 仙传救命丹

《集成良方三百种》。为《洞天奥旨》卷十四“救命丹”之异名。见该条。

23054 仙传惊风丸

【方源】《经验奇方》卷上。

【组成】雌雄蜘蛛各一百只(须至立冬日向稻田内提取,放瓦片上文火焙干,研细末)麻黄五分 真琥珀五分 顶朱砂三分

【用法】上药各为细末,和匀再研,清水和为丸,每丸约重五分。临用时取一丸,研细末,用钩藤煎汤调送。服下一二丸即愈。

【主治】幼孩各项惊风。

23055 仙传斑龙丸

《万氏家抄方》卷四。为《百一》卷四“斑龙丸”之异名。见该条。

23056 仙传斑龙丸

《医统》卷四十八。为《医学正传》卷三引《青囊集方》“斑龙丸”之异名。见该条。

23057 仙传紫金膏

【方源】《一草亭》。

【组成】真黄丹五两(研细,水飞候干,用厚绵纸盛,锅内炒熟取起,地上候冷,又炒又冷,如此九次,去尽铅气,又研如尘,听用) 川黄连(去芦,净)二两(切碎) 石燕一雌一雄(大者如槟榔,与石蟹等分,捣末水飞听用) 石蟹不拘一个二个(与石燕雌雄等分,捣末水飞) 诃子十二个 真熊胆三钱或五钱(多则效速,试法:尘撒水面,取粟许滴水上,其尘分开方真,此眼药神品) 冬白蜜(滤净)八两

【用法】先将连、诃用井水三碗,煎至一碗半,以蟹、燕为细末,水飞过,调和药汁同蜜,银锅慢火煎三五沸后,入丹再煎,取柳条或桃、槐条不住手顺搅,用水一盆在旁,如沸起,即抬锅放水盆内,待药有丝为度,入熊胆,再旋百余旋。每日点五七九次,不用双点,初点七日,停三五日,又点七日,用灯草撮其翳膜。如重者不过三七日。

【主治】男妇一切眼疾,双目不见十余年者。

23058 仙传黑虎丹

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】苍术(米泔水浸二宿,去皮,切作片) 草乌(洗净,去皮,切作片) 生姜

(洗净,搗碎)各一片 葱(连须叶白,捣碎)半斤

【用法】上药和一处,拌匀烧之,春五日,夏三日,秋七日,冬十日,每日一番拌匀,候日数足晒干。另用五灵脂(洗净)、乳香(研)、没药(研)各五钱,穿山甲(火煨存性)二两,自然铜(火煨醋淬七次)一两,同前药为末,用好醋糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心热酒送下,间日服尤妙;妇人血海虚冷,肚腹疼痛,临卧醋汤下。只服二三十丸,不可多服,但觉麻木为效。

【主治】男子妇人虚弱,血气衰败,筋骨寒冷,外感风湿,传于经络,手足麻木,腰腿疼痛,久则偏枯,左瘫右瘓,口眼喎斜,诸中风气,不能行履者。

【宜忌】服后不可饮冷水冷物。孕妇不可服。

23059 仙传蟠桃丸

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】棉花子(取净仁,干烧,酒拌透,下用黄酒水平对蒸一柱香) 红枣(黄酒煮熟,取净肉)各一斤 归身 牛膝 枸杞(俱用酒浸) 肉苁蓉(酒洗,去泥甲) 山茱萸(酒润,去核) 菟丝子(酒蒸成饼) 白鱼鳔(麸炒成泡) 白茯苓(人乳拌蒸) 破故纸(盐水炒) 熟地(酒煮如饴)各四两(洗净) 巴戟(酒洗,去心)五两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,三钱重。早晚酒、水任意送下。

【功用】补益。

【主治】《纲目拾遗》:诸虚百损。

23060 仙灵脾浸酒

【方源】《圣惠》卷二十一。

【异名】仙灵脾酒(《医统》卷八)、仙灵酒(《寿世保元》卷二)。

【组成】仙灵脾一斤(好者)

【用法】上细锉,以生绢袋盛,于不津器中,用无灰酒二斗浸之,以厚纸重重密封,不得通气,春、夏三日,秋、冬五日后,旋开取。

每日随性暖饮之，常令醺醺，不得大醉。若酒尽，再合服之。

【功用】《寿世保元》：补腰膝，强心力。

【主治】①《圣惠》：偏风，手足不遂，皮肤不仁。②《寿世保元》：一切冷风劳气，丈夫绝阳不起，女子绝阴无子，老人昏耄健忘。

【宜忌】合时切忌鸡、犬见。

【备考】《证类本草》引《食医心镜》：淫羊藿一斤，酒一斗，浸经三日，饮之佳。益丈夫，兴阳，理腿膝冷。

23061 仙灵脾浸酒

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】仙灵脾一两 天麻一两 独活一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 桂心一两半 当归一两 五加皮一两 芎藭一两 石斛一两半（去根） 茵芋一两 草薢一两 狗脊一两 海桐皮一两 虎胫骨二两（涂酥，炙令黄） 鼠粘子一两 苍耳子一两 川椒一两（去闭口及目，微炒去汗）

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用好酒二斗浸之，密封。经七日后，每日不计时候温服一小盏。常令酒气相续，其酒，出一盏，入一盏，以药味薄即止。

【主治】中风半身不遂，肢节疼痛无力。

23062 仙灵脾浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】仙灵脾三两 桂心 防风（去芦头） 虎胫骨（涂酥，炙微黄） 羌活 草薢 芎藭 生干地黄 海桐皮 牛膝（去苗） 骨碎补（去毛） 附子（炮裂，去皮脐）各二两

【用法】上锉细，用生绢袋盛，以清酒二斗，于瓷瓶中浸，密封。经五日后，随性饮之。酒少旋添，候药味薄，即再合，以瘥为度。

【主治】风，腰膝疼痛。

【宜忌】忌生冷、毒滑、鱼肉。

23063 仙灵脾浸酒

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】仙灵脾二两 牛膝二两（去苗） 附子二两（炮裂，去皮脐） 石南叶一两 杜仲二两（去粗皮，微炙）

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用好酒一斗五升浸经七日。每服温饮一小盏。

【主治】妇人风痹，手足不随。

23064 仙灵脾煎丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】仙灵脾五两 威灵仙五两 牛膝五两（去苗） 黑豆一升 桑根白皮五两（以上五味，细锉，以水二斗，煮至一斗，滤去渣，再煎至五升，入后药末） 天雄二两（炮裂，去皮脐） 天麻二两 肉桂三两（去皱皮） 酸枣仁二两（微炒） 当归二两 虎胫骨三两（涂酥，炙令黄） 安息香二两

【用法】上为末，入前煎汁中，以慢火熬令稠，以柳木篦不住手搅，候可丸，即丸如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】风，脚膝软缓，不能履步，骨节无力，时有疼痛。

【宜忌】忌生冷、油腻、猪、鸡肉。

23065 仙茅大益丸

【方源】《李氏医鉴》卷三。

【组成】仙茅（竹刀去皮，切，糯米泔浸，去赤汁出毒用）

【用法】阴干蜜丸。酒服。

【功用】助命火，益阳道，明耳目，补虚劳。

【主治】失溺，无子，心腹冷气，不能食，腰脚冷痹，不能行。

【宜忌】相火盛者忌服；制丸时忌铁；禁食牛乳、牛肉。

23066 仙授灵宝膏

《玉机微义》卷十五引郭氏方。为原书同卷“万灵夺命丹”之异名。见该条。

23067 仙鸾催生方

【方源】年氏《集验良方》卷五。

【组成】全当归八钱 川芎五钱 白芷二钱五分 枳壳四钱

【用法】水一大碗，煎六分，温服。

【功用】催生。

23068 仙露还魂饮

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】白茯苓 黄耆 川黄连 赤芍药 甘草 当归 川芎 防风 陈广皮 金银花 瓜蒌 苍术 白术 黄柏 人参各等分

【用法】水煎服。

【主治】咽喉一切阴疮。

23069 仙方如圣饼子

【方源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】草乌 芎藭 半夏 天花粉 细辛 薄荷 荆芥 何首乌 防风 羌活 苍术 赤小豆 松香 甘松 藿香 晚蚕沙 菊花 白芷 甘草 赤芍药 蔓荆子各等分

【用法】上为细末，用炒面作糊和为饼，赤土为衣。每服一饼，饭后细嚼，茶清送下。

【主治】头痛头风。

23070 仙传一块气丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】补骨脂 干漆 干姜 姜黄（俱炒） 莪术 三棱 玄胡索 木香 沙仁 使君子 五灵脂 人参 白术 茴香 槟榔 肉豆蔻 丁香 丁皮 茯苓 雷丸 大黄 枳壳 巴豆（炒）各一钱一字 萝卜子（炒） 青皮 陈皮各五钱 皂角一片 芫花五分 牵牛 大麦芽各炒一两（为末）

【用法】醋糊为丸，如绿豆大。每服三五丸至十丸，茶、酒任下；取积，陈皮煎汤下十五丸；如伤食，就以所伤之物煎汤下。

【主治】气喘，心气、膈气、胁气、疝气、腰气、脚气、积气、瘕气，及不服水土气；酒食所伤，不思饮食，赤白痢疾，女人干血气，小儿积症；劳瘵。

【备考】不助虚阳，不损真气，又能杀虫。

23071 仙传百草霜丸

【方源】《急救经验良方》。

【组成】百草霜三两 陈墨二两 姜黄一两 桑叶二两 三七一两 连翘一两 灯心

炭一两

【用法】上药各为细末，糯米粥取汁为丸，如粟米大。每服一钱，白温水送下。

【主治】一切吐血，鼻血，及七窍流血，失血怪证。

23072 仙传种子药酒

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】白茯苓（去皮，净）一斤 大红枣（煮，去皮核，取肉）半斤 胡桃肉（去皮，泡去粗皮）六两 白蜂蜜六斤（入锅熬滚，入前三味搅匀，再用微火熬滚，倾入瓷坛内，又加高烧酒三十斤，糯米白酒十斤，共入蜜坛内） 黄耆（蜜炙） 人参 白术（去芦） 川芎 白芍（炒） 生地 熟地 小茴 枸杞子 复盆子 陈皮 沉香 木香 官桂 砂仁 甘草各五钱 乳香 没药 五味子各三钱

【用法】上为细末，共入蜜坛内和匀，笋叶封口，面外固，入锅内，大柴火煮二炷香，取出，埋于土中三日，去火气。每日早、午、晚三时，男女各饮数杯，勿令大醉。

【功用】安魂定魄，改易容颜，添髓驻精，补虚益气，滋阴降火，保元调经，壮筋骨，润肌肤，发白再黑，齿落更生，目视有光，心力无倦，行步如飞，寒暑不侵，能除百病，种子。

23073 仙授神效药纸

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】端午薪艾四五斤 粒子红花四两 油乳香（去油） 没药各八两（研细末） 真象皮末四两 牛皮胶二斤

【用法】艾煎浓汁去滓，入红花煎一炷香，再入乳香、没药煎一炷香，再入象皮煎一炷香，加入牛皮胶煎至胶化汁粘为度，用羊毫排笔蘸药汁，搽刷大红纸上，阴干。津唾润软贴之。

【主治】狗咬虫螫蛇伤，并跌打破皮，及一切烂膀疔。

23074 仙方点白还黑丹

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【异名】点白还黑丹(《医学启蒙》卷三)。

【组成】生地黄(取汁) 桑椹子(取汁) 旱莲草(取汁)

上三汁各用一盂,共放铁锅内熬之,干碾为面,听用;

三膏末一两 母丁香五钱 没石子五钱 真铅粉五钱(炒)

【用法】上为细末,以小瓷罐贮之,塞口,勿令泄气。依后开拔白日期,用小镊子拔去白须,即以黑笔点记,然后用鲜姜汁调前药少许点孔中。六七日,再出黑,永不白。

【功用】乌须发。

【备考】拔白日期:正月甲子日,二月初八日,三月十三日,四月十六日,五月二十五日,六月十四日、十九日,七月二十八日,八月十九日,九月十六日,十月初十、十三日,十一月初十、十二日,十二月初七日。

23075 仙传火龙行气法

《外科百效》卷五。为《跌损妙方》“仙传火龙行气散”之异名。见该条。

23076 仙传火龙行气散

【方源】《跌损妙方》。

【异名】仙传火龙行气法(《外科百效》卷五)。

【组成】生姜 食盐 麻油各四两 大黄牙消各二两 头酒糟 荆芥 泽兰 瑞香草叶各三两

【用法】共捣烂,以麻油炒热。频频熨上。

【主治】折伤。

【备考】方中组成“头酒糟”,原作“头油渣”,据《外科百效》改;《外科百效》有生地二两。

23077 仙传甘露回生丹

【方源】《医方易简》卷四。

【组成】精矾一斤(取光明白矾煅用,以板炭煅地,酒童便于上,取矾布地,以大瓦盆覆之,四面灰拥一日夜,矾飞盆上,扫收之为矾精,每斤明矾只可收矾精三两,底滓不

用) 真雄精五钱(取赤似鸡冠,明彻不臭者,醋浸一宿,用莱菔子五钱,甘草五钱,同煮干汁水,取起研末) 真硼砂一两(研末) 山茨菇一两(去毛壳,研细) 石莲子肉一两(取色鲜者,去净衣壳,研细) 猪牙皂一两(去皮弦子,研细) 真当门子(每十两药末,加麝香三钱二分) 优昙钵一两(研细) 紫背金牛一两(研细)

【用法】如法炮制,共研细末,汾酒打成丸,如莱菔子大,飞净朱砂为衣。一遇时疾、瘟疫,口含一二粒于舌尖下,咽之,银花汤下五粒更妙。大人九粒,小儿三粒;霍乱吐泻,毛疔痧疹,天行时疾,各样痧疹,大头、麻脚瘟疫,阴阳水下;中风、中寒、中暑,阴阳水下,或藿香汤下亦可;转筋肚痛,木瓜汤下;阴阳疟疾,东南桃枝七节煎汤,前一个时辰下;赤白痢疾,呕吐水泻,陈茶下或老米汤下;诸腹膨胀,莱菔子汤下;中气、中痰、中恶,口眼歪斜,筋骨痛,不省人事,暖酒下,姜汁亦可;头风头痛,研贴两太阳上,以薄荷、苏叶汤下;小儿惊风,薄荷汤下;妇人经闭血晕,桃仁汤下;痰迷心窍,陈皮、姜汁汤下;五绝心温,童便送下;跌打损伤,痛疽虫毒,外科一切毒气,银花汤下,以数粒涂患处。

【主治】时行瘟疫,霍乱吐泻,及一切虎狼痧症,并大头瘟,麻脚瘟,赤白痢疾,阴阳疟疾,偶中风寒暑湿,一切天行时疫危险诸症,内伤外感等。

【宜忌】最忌米粥,犯者难治;孕妇勿服。

23078 仙传四急保生丹

【方源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】凤仙子(大红)九十粒(白)四十九粒(另研包好,临时将药秤明分两配入) 龟板一两(麻油涂炙) 通梢牛膝三钱 桃仁钱半 川芎 归身各五钱

【用法】上为末。临盆米饮调服二钱,迟则再服二钱。

【主治】临产交骨不开,难产。

【加减】临产一月内，本方去风仙子，入益母膏二两，每早米饮调服二钱，则临产迅速；产后瘀血变症，或儿枕痛，加炒红曲三钱、酒炒马料豆二合，共为末，童便、陈酒各半杯，调服二三钱。

23079 仙传史国公浸酒

【方源】《医统》卷十一。

【组成】当归 虎胥骨(酥油炙) 川羌活 川草薢 防风各二两 秦艽四两 鳖甲一两(醋炙) 川牛膝(酒浸) 松节 晚蚕沙(炒)各二两 枸杞子五两 干茄根八两(饭上蒸熟) 苍耳子四两(炒，槌碎) (一方加白花蛇一条；一方加寻风藤二两)

【用法】上药用无灰酒一大坛，将绢袋盛药，悬于酒内密封固，候十四日后开坛取酒，取时不可面对坛口，恐药气冲人面目。每饮一盏，毋令药力断绝，饮尽病痊。将药滓晒为末，米糊丸梧桐子大。每服八十丸，空心温酒下。

【主治】诸风五痹，左瘫右痪，口眼喎斜，四肢疼痛，七十二般风，二十四般气。

【宜忌】忌食动风、辛热之物。

23080 仙传珊瑚紫金膏

【方源】《寿世保元》卷六引薛巡兵方。

【异名】珊瑚膏(《疡医大全》卷十一)、珊瑚紫金膏(《中国医学大辞典》引验方)。

【组成】白炉甘石(南方出，名羊脑芦甘，童便浸七日，用灰火消银砂锅内煨，投入童便内共十日，晒干细研)一两 麝香(拣净，去皮，细研)五分 黄丹(高者名国丹，滚水飞过三次，晒干细研为细末)一两 海螵蛸(即乌贼鱼骨剥去皮甲，微火炙过，细研)二钱 乳香(光明者，入砂锅内微火炒出其烟，研细末)二钱 没药(光明者，入砂锅内微火炒出烟，细研)二钱 白硼砂(明净)二钱(细研) 青盐(去泥土，细研)五分 片脑(细研)三分

【用法】上将前七味，各研细末，秤足，合入一处，入钵内再研极细无声，后入麝、片

二味，再研调匀，将蜂蜜用细袋滤过，熬蜜滴水成珠，夏老冬嫩，春、秋酌老嫩之间，用蜜调药，令稀稠得所，瓷器内封固，不可泄气。点眼。

【主治】远年近日内障青盲，云翳推移，火眼暴发，迎风冷泪，怕日羞明，肝肾虚损；及七十二种眼疾，二十年目不明者。

23081 仙传保产无忧散

《卫生鸿宝》卷五。为《增补内经拾遗方论》卷四“无忧散”之异名。见该条。

23082 仙传保产回生丹

《卫生鸿宝》卷五。为《金鉴》卷四十八“回生丹”之异名。见该条。

23083 仙传神秘药肚子

【方源】《不居集》下集卷一。

【组成】雄猪肚一个(不见水，酒洗净) 白马骨一根(粗大者，不见水洗，以布拭净，木槌敲碎，装入肚内令满，密缝)

【用法】以淡砂锅盛之，酒三碗，水五碗，置大锅内，隔水煮之，罐口用厚绵纸三层封固，于纸上置粒米一撮，米烂肚亦熟矣。令病人坐于傍，以闻其香气，若病人欲思食，除肚内药，以铜刀切碎，乘热带汤与食之，不喜食汤，听其所好，或一二次食完亦可。将白马骨悄悄埋土内，勿令人知之，埋后病人即思睡，任其自然。半年者食半个即愈，一年者食一个，二三年照数食之，倘半年喜食一个者，听其所爱，不必执泥。

【功用】养胃清热，补虚透骨祛风。

【主治】脾胃不足。

【备考】患人醒时要大便，解下如泥非泥，似血非血，秽恶异常，当以深坑埋之，勿令人感此恶毒。

23084 仙传神效点眼方

【方源】《异授眼科》。

【组成】上好羊脑炉甘石八两(打如莲子大，一分重为则，用新铜罐盛入童便，浸四十九日，滤去宿童便，再入新童便，煮一炷香，咬咸酸味不必再煮，又不可煮老，研为

细末，用缸片一大块，将药放在上，用硬炭火煨一炷香久，甘石渐渐转如松花色，细心谨慎取起，总秤匀分，作四份，作四法制之：一份用姜汁煮三次，候干，细研筛过，名曰虎液膏，另用瓷罐盛之，不可出气；一份用细辛、荆芥穗、薄荷各一两，煮浓汁大半钟，亦煮三次，如前研细筛过，名曰凤麟膏，另用瓷罐收贮；一份用晚蚕沙三升，炒为灰，滚水淋灰汁大半钟，亦煮三次，候干，研细，名曰青龙膏，另用瓷罐收贮；一份用童便再煮三次，候干，研细，名曰羊脑玉，另用瓷罐收贮。

【用法】以上并要铜锅煮方佳，研极细，各将瓷罐收贮听用。治内障，如迎风冷泪，怕日羞明，昏花等症，用虎液六分、羊脑玉二分、凤麟二分、冰片一分二厘，合匀调点；治内障胥肉扳睛，赤白翳膜烂弦等症，用虎液二分，羊脑玉四分，青龙四分五厘，冰片一分，合匀调点；治时行火眼，用虎液七分，羊脑玉三分，朱砂五厘（细末水飞），合匀调点；治年久云翳遮睛，不能行路，但见人影，如白衣人行，有血根扳睛，可治者，用青龙六分，羊脑玉四分、每日骨簪点四五次，点后闭目，药尽开眼，直点至翳开之后，再用虎液二分，羊脑玉二分，凤麟三分，冰片一分，珍珠五厘（煨，研细末）、琥珀五厘（不用制），细末合匀，如法点。

【主治】目内障，迎风冷泪，怕日羞明，昏花；胥肉扳睛，赤白翳膜烂弦；年久云翳遮睛，不能行路，但见人影，如白衣人行，有血根扳睛者。

23085 仙传神效梅花丸

【方源】《寿世新编》卷下。

【组成】绿萼梅蕊三两（欲开未开时即宜摘下，或烘干，或晒干） 飞滑石五两 丹皮三两 制香附二两（有四制、七制者尤佳） 甘松 蓬莪术各五钱 茯苓四钱 结洋参（饭上蒸透，湿米拌炒，去米不用） 嫩黄耆全当归 西砂仁 益智仁各三钱 远志肉二

钱五分 山药 木香（煨，不见火） 玄胡索 川楝子（去核，虫蛀者不用）各二钱 光桃仁（去皮尖，炒） 芽桔梗各一钱五分 制乳香（去净油） 高良姜 粉甘草各一钱

【用法】上为细末，炼上白蜜十二两，捣丸如桂圆肉大，白腊封固。每服一丸，开水调下。

【主治】心腹肝胃久痛，诸药罔效，或腹有癥瘕，久结不散。

【宜忌】孕妇忌用。

23086 仙传救急惊神方

【方源】《医便》。

【异名】仙传神效方（《良朋汇集》卷三）、急惊散（《仙拈集》卷三）、仙传急惊散（《串雅内编》卷一）。

【组成】生白石膏（研末）十两 辰砂（研末）五钱

【用法】二味和匀。每服大人三钱，小儿一岁至三岁一钱，四岁至七岁一钱五分，八岁至十二岁二钱，十三岁至十六岁二钱五分，用生蜜调下。

【主治】①《医便》：小儿急惊风；及大人中风、中痰。②《良朋汇集》：大人气性风，羊羔风。

23087 仙授立刻回生丹

【方源】《玉案》卷二。

【组成】牛黄（真西者）一两 胆星（制过九次者）一两二钱 铅霜二钱（用出山铅十斤，打寸许方牌，以线穿，悬之于大瓷钵内，下以烧酒六斤，好醋二斤，上另以一钵覆之，外用盐泥封固，炖在锅内热水中，五日取开，扫下即成铅霜矣） 橘红（广皮去白）一两五钱 蛇含石（醋煨七次）五钱 麝香三钱 枳实（用小者，麸炒）一两 沉香一两（忌火） 真金箔三十片 朱砂（研极细）三钱

【用法】上药各为极细末，以竹沥加老姜汁为丸，分作七十二丸，朱砂、金箔为衣，外加蜡封之。每服一丸去腊，姜汤调下。

【主治】一切中风，不拘脏腑，中痰，中气，不省人事，垂危；及一切急慢惊风。

【临证举例】辛未年秋,姚叔祥先生七旬有二,忽然中倒,不省人事,便遗出,痰壅上,声如鼾睡,手撮眼合,投下一丸,少顷即醒。

23088 仙授外伤见血主方

【方源】《梅氏验方新编·伤科》。

【组成】归尾 川芎 地黄 白芍 益母草 蕪本各二钱 乳香(炙) 没药各二钱五分 川续断三钱 苏木一钱五分 白芷一钱 甘草五分 生姜三片

【用法】水煎服。

【主治】外伤见血者。

【加减】头顶伤,加升麻一钱,肉桂二钱;头骨沉陷,加白芷三钱;脑门肿痛,加茯苓、白术各二钱;脑髓出,加香附二钱,白附子、苍耳子、牡蛎各一钱;面青懒食,加柴胡、茯苓各一钱五分,陈皮八分,升麻、半夏、黄耆各一钱;破处生蛀,加细辛、青黛、蝉蜕各一钱,蛀即化为黄水滚出;脑侧近耳边寒热作痛,加丹皮一钱,石枣、泽兰各二钱;目伤出血不止,用人乳饭内蒸过涂之;黑睛脱出,用手掌趁热按进,将绢紧紧包住,三日不开,外用生地捣烂贴退其血,内服方加木贼草、石决明、菊花各一钱;目眶伤损,胥肉脱出,用杏仁去皮尖,嚼细吐于掌上,趁热以绵裹箸头,按胥肉上四五次,送按目内,再用鲜地肤子汁点之自愈,如无鲜者,即浓煎熬膏亦可,后以清水调生半夏末搽六七日,眉毛即生;目伤睛肿,水调生半夏末涂之;耳伤,加磁石一钱;鼻伤,加辛荑二钱,鳖甲三钱;颊伤,加独活、细辛各二钱;唇伤,加升麻、秦艽各二钱,牛膝三钱;舌伤,加石膏二钱,升麻三钱,用黄芩片贴舌上含之,以断其血;齿伤,加独活、细辛、谷精草;血流不止,用灯心紧咬立止;左肩伤,加青皮二钱;右肩伤,加升麻一钱;喉项伤,加羌活、独活、谷精草各一钱;手伤,加桂枝,禹余粮各一钱,姜汁五匙;胸伤,加川贝三钱,柴胡一钱,枳壳二钱;乳伤,加川贝、百合各二钱,漏芦一钱;胸腹伤,强言乱语,加

辰砂、茯神各一钱,远志一钱五分,金银箔十张,盆子二钱为引;吐黄水,加木香、木瓜、扁豆、大茴各一钱,大黄二钱、砂仁十四粒;左胁伤,加北芥子一钱,柴胡一钱五分;右胁伤,加北芥子一钱,升麻二钱;腹伤,加大腹皮二钱;腹破肠出,加黄耆、鹿茸各二钱,其肠将手轻轻按入,不可犯指甲,其伤口用柿饼(众人嚼碎)填塞七日全愈,若不便以手按者,用磁石末、滑石粉各二钱,米饮调服,其肠自入,如不入,将病人卧席上,四角用人拿定举播,其肠自入,或以小麦煎浓汤,待冷,不令病人知,含喂其背,渐渐自入,不令多人相见,并止旁人说话;小腹伤,加小茴一钱,槐花二钱;背伤,加香附、木香各一钱,羌活钱半;腰伤,加木鳖子一个,杜仲、牛蒡子、破故纸、小茴、白芷各一钱、大茴八分、巴戟二钱;臀伤,加白蜡、自然铜各二钱;寒热发搐咬牙,唇口牵动,加天麻,升麻各一钱,柴胡八分;囊肿痛不愈,饮食少思,加人参、白术、柴胡各一钱;两足腿伤,加牛膝二钱,木瓜、苡仁、五加皮、槟榔、石斛、苏梗各一钱;伤口作痒,加干葛一钱,防风、荆芥、连翘壳各一钱五分,赤芍二钱;血出多瘦弱,加人参、麦冬各一钱;烦躁不止,加柴胡五分,丹皮一钱;面黑喘急,加人参五分,苏梗一钱;脓出口噤流涎,加人参三钱,柴胡、升麻各一钱;脓出不干,加滑石、苍术各一钱,白术一钱五分;手足微搐,眉目微动,加钩藤、柴胡各一钱;手撒目闭,汗出如雨,加人参一两,附子五钱;眼开能言,气不相接,加人参、黄耆、白术各一钱。

23089 仙方解毒生肌定痛散

【方源】《秘传外科方》。

【组成】黄连一两 黄柏四两 木贼一两 防风一两 苦参四两 羌活 独活

【用法】上咬咀,大瓦盆盛水,入前药煎汤,以炉甘石十斤,用炭火煨通红,钳出在药汤内,不同石片大小者,皆要以酥、内青色方

好,如石不酥,再将前药滓煎汤,再以石滓酥方了。却将瓦盆盖在地上一昼夜,收火毒,将起候干,研为极细末,此石十斤,用石膏二十斤,别研极细,拌匀,和后药:赤石脂(煨)、谷丹(炒,此二味同前打和)、南木香、血竭、降真节、乳香、没药、白芷、黄连、黄柏、白藜各等分,龙骨(煨)、朱砂、何首乌,上各为细末。与前药拌和用之,敷中间。

【主治】痈疽,发背,乳痈,人面、外疔、金刀诸般恶疮疔肿毒。

【加减】有虫,加轻粉、苦参、百药煎、雄黄;水不干,加蜈蚣(去皮)、无名异(煨)、蓼叶(烧灰)。

【备考】方中羌活、独活用量原缺。

23090 仙传通津救命至灵丹

【方源】《古方汇精》。

【异名】仙传通津救命至灵汤(《集验良方》卷二)。

【组成】桂圆肉六两(去核) 生牛膝梢一两(用酒一杯,浸,捣烂)

【用法】将桂圆肉煎浓汁,冲入牛膝酒内服之,停半日即产。

【主治】裂胞生,及难产数日,血水已干,产户枯涩,命在垂危者。

23091 仙传通津救命至灵汤

《集验良方》卷二。为《古方汇精》“仙传通津救命至灵丹”之异名。见该条。

23092 仙传秋石配合十精五子丸

【方源】《济阳纲目》卷六十八。

【组成】阳炼龙虎石十两 阴炼龙虎石六两 人参 当归(酒洗) 葫芦巴(微炒) 芡实 莲花蕊(微焙) 鹿茸(酒浸,酥炙黄) 仙灵脾叶 苍术(米泔水浸,炒,以上十味十精药) 枸杞子(酒浸,晒干) 菟丝子(酒浸,蒸七次) 巨胜子 车前子(酒浸,炒) 柏子仁(以上五味五子之药) 各二两 沉香 粉草各一两 辰砂五钱(水飞极细,三味升降之药) 白铅一两(即人乳)

【用法】上将众药均对分两,用枣肉加炼蜜捣合为丸,如梧桐子大。每服一百丸,白汤送下,日进三服,服至百日。

【功用】消除百疾,轻身健体。

外

23093 外正膏

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】死猫儿骨一片(长三寸,酒和醋炙) 皂荚(去皮子,醋炙) 一挺 木鳖子(去壳,生用) 二七枚 重粉半钱匕(研)

【用法】上为末。每服三钱匕,用米醋熬成膏。敷之。如一两日未效,即服二钱匕,用温酒调下。服毕衣被盖,出汗即愈。

【主治】鼠瘻。

23094 外伤散

【方源】《外伤科学》

【组成】大黄一斤 扁柏一斤 梔子四两 桃仁四两 泽兰四两 防风五两 薄荷五两 黄芩五两 骨碎补三斤 当归尾三斤 制草乌一两 制川乌一两 天南星一两 制半夏一两 毛麝香一斤 千打捶一斤 血见愁一斤 透骨消一斤 田基黄一斤 入地金牛一斤

【用法】上为细末。水、酒、蜂蜜或凡士林调敷。

【功用】祛瘀,消肿,止痛。

【主治】骨折、伤筋初期肿痛者。

23095 外贡丹

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】铅粉 陶丹 乳香(去油) 没药(去油) 血竭 儿茶各二两 三仙丹五钱

【用法】上为极细末,收贮。搽患处。

【功用】去腐生新,止痛。

【主治】一切疮疡。

23096 外护丹

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】猪胆二个(取汁) 龙胆草三钱(取汁)

【用法】蚯蚓五条捣烂，用二汁淋洗，去蚯蚓，加入冰片末三分，入鸡蛋壳内，套在龟头之上浸之。

【主治】龟头生疳疮。

23097 外灸方

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】良姜 防己各等分

【用法】上为末，捣大蒜和为饼。安痛处，铺艾灸之。以痛至不痛，不痛至痛为度。

【主治】风寒湿气，腰脚疼痛。

23098 外灸膏

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】木香 附子(炮，去皮脐) 蛇床子 吴茱萸 胡椒 川乌头各二钱

【用法】上为细末，每用药末三钱，白面二钱，生姜自然汁打作糊，摊在纸上。当脐上贴之，衣物盖定，用熨斗盛文武火熨之。痢止为度。

【主治】一切虚寒，下痢赤白，或时腹痛，肠滑不禁。

23099 外应散

【方源】《医方大成》卷五引欧阳康叔家传方。

【组成】石楠叶 矮樟叶 西江杉片 藿香 紫金皮 藁本 独活 大蓼 白芷 紫苏 羌活各等分

【用法】上锉碎。加大椒五六十粒，葱一握，用水二斗，煎七分，置盆内，令病者以足加其上，用厚衣盖覆，熏蒸痛处，候温热，可下手时，却令他人淋洗。

【主治】脚气。

23100 外表汤

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】黄耆一两 当归五钱 麦冬五钱 金银花一两 天花粉三钱 木通一钱 泽泻二钱 柴胡二钱 黄芩二钱 生甘草二钱

【用法】水煎服。

【主治】杨梅痘子。

23101 外贴散

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】芸苔子(末)三钱 寒食面一钱半

【用法】上药再同研匀，用新水调如糊，纸上摊。贴乳癖上，频以水润之。

【主治】乳癖。

23102 外食散

【方源】《三因》卷十四。

【组成】白矾(银窝内用瓦盖煨令性尽)一两 好染坯 血竭各一两

【用法】上为细末。用桑浆旋搜为膏，量疮大小贴之。

【功用】消肌长肉。

【主治】痼肿，恶肉不尽，脓水淋漓。

【宜忌】忌鲫鱼、酒、面、毒物等。

23103 外消散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】大黄 牡蛎(用熟黄泥包裹，火煨透，出地上候冷用)各半两 朴消二钱

【用法】上前二味锉焙为末，仍入朴消，乳钵内同杵匀。抄一钱或二钱，取田螺三枚洗净，再以水半碗洗过一宿，去螺用水，调涂肿处。即消。

【主治】婴孩初出，旬日外脐突，或痛或不痛，痛则啼声不已；小儿感温热相搏，致阴器肤囊浮肿。

【备考】治阴器肤囊肿，车前子煎汤调上药敷患处。

23104 外消膏

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】伏龙肝半两 大黄(锉)半两 生姜一分(洗，切，研细)

【用法】上药除姜外，为细末，和匀，用醋调作膏。看大小摊贴病上，早、晚易之。

【主治】产后乳结核，疼痛或肿，欲成痢。

23105 外涂膏

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】鼠屎三两(烧存性) 生地黄半斤(切，焙)

【用法】上为末，猪脂油和。涂患处，一日换三次。

【主治】伤折恶血瘀滞不散。

23106 外痹汤

【方源】方出《医门法律》卷三，名见《医钞类编》卷四

【组成】沙参 羚角 麻黄 杏仁 白蒺藜 丹参 五味 菖蒲 石膏 甘草各等分

【用法】加干姜，水煎服。

【主治】皮痹。皮中状如虫走，腹胁胀满，大肠不利，语言不出。

23107 外敷膏

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】黄连(去须)三分 大黄(生) 鼠粪(炒)各半两

【用法】上为末，用米糊调。敷乳四边，频易之，每易先用热葱汤洗。

【主治】产后乳肿热痛。

23108 外科膏子

【方源】《古方汇精》卷二。

【异名】鸡黄膏(《理渝骈文》)。

【组成】麻油八两 鸡蛋黄一个 头发三钱 朱砂(水飞) 银朱各一钱(水飞) 黄蜡六钱

【用法】先将油入无消硫砂锅内，文火煎，后入蛋黄，熬化尽，再入头发剪寸长，以箸顺搅，化尽，始终文火顺搅，方入朱砂、银朱、再入黄蜡，掇锅安地上一宿后，收用。

【主治】跌打损伤，汤火灼烂。

23109 外鹿髓丸

【方源】《韩氏医通》卷下。

【组成】鹿胫骨髓(不拘猎家、屠市所用)

【用法】煎作油，滤净，每一两加炼蜜二两，又炼相得，瓷器封收。每用和古方摩腰膏、九阳丹之类，老姜汤化少许，以擦摩肾俞。

【主治】骨节痛，属虚寒者。

23110 外敷神膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】川大黄 朴消各四两 麝香一钱

【用法】上为末，每二两，和大蒜捣成膏。敷患处。

【主治】男妇积聚胀满，血蛊。

23111 外敷麻药

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】川乌尖五钱 草乌尖五钱 蟾酥四钱 胡椒一两 生南星五钱 生半夏五钱(一方加革拔五钱，一方加细辛一两)

【用法】上为末。用烧酒调敷。

【功用】敷于毒上，麻木，任割不痛。

23112 外用消毒药

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】黍黏子 葛根 升麻 地骨皮 黄花地丁 甘草 金银花各等分

【用法】上为粗末。每用五钱，水一升，煎十沸，于肿四畔热用，冷则再换。

【主治】诸肿毒，坚硬不消。

23113 外台走马汤

《金匱》卷上(附方)。为《外台》卷七引张仲景“飞尸走马汤”之异名。见该条。

23114 外台茯苓饮

《金匱》卷中(附方)。为《外台秘要》卷八引《延年方》“茯苓饮”之异名。见该条。

23115 外证败毒散

【方源】《治疗汇要》卷下。

【组成】防风 甘草 前胡各一钱 赤芍一钱五分 穿山甲一片(炒) 元参 连翘各二钱 生地 银花各三钱 蒲公英 野菊花根各五钱

【主治】疮疮初起及轻者。

【加减】便实者，加大黄二钱。

23116 外治异功散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【异名】外贴异功散(《喉痧症治概要》)。

【组成】蟹螯四钱 真血竭五分 制乳香五分(去油) 制没药五分(去油) 上麝香三厘 全蝎五分 大元参五分 上梅片三厘。

【用法】班螯去头翅足，糯米拌炒黄后，去糯米。除血竭外，合诸药共研细末，另研血竭拌匀，瓷瓶收储，勿令泄气。凡遇喉证肿痛，取此散少许，置小张膏药上，左肿贴左，右肿贴右，左右俱肿俱均贴在结喉旁边软处，

阅五六时即起水泡，揭去膏药，用银针挑破，搽净毒水，勿使伤口见风。

【功用】消肿止痛。

【主治】喉症肿痛。

【宜忌】孕妇忌用。

【备考】此法从外拔出内毒，药虽峻厉，用法甚妥，真救急之良方也。惟方中有蟹螯、全蝎俱是极毒之药，万不可误入口中。即所去拌炒之糯米，亦必以砖石同包沉在大河底内，免致误食伤生。储药之瓶及纸包上必须随装随写不可入口字样，以防误毒。

23117 外贴异功散

《喉痧症治概要》。为《经验各种秘方辑要》“外治异功散”之异名。见该条。

23118 外科黄连膏

【方源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】黄连一两 大黄 黄柏 黄芩各四两 麻油三斤 黄蜡一斤

【用法】将黄连、大黄、黄柏、黄芩浸入麻油内，浸一天后，用火熬煎至药枯，去滓滤清，加入黄蜡，再用文火徐徐成膏。将膏匀涂纱布上，敷贴患处。

【主治】湿疮。

【宜忌】不可入口。

23119 外科硃砂膏

《全国中药成药处方集》(杭州方)。为《饲鹤亭集方》“硃砂膏”之异名。见该条。

23120 外科清心汤

《景岳全书》卷五十七。为《外科发挥》卷二“清心汤”之异名。见该条。

23121 外科蟾酥锭

【方源】《全国中药成药处方集》(南京方)。

【组成】蟾酥二钱 樟脑一钱 制没药二钱 飞朱砂一钱 制乳香二钱 轻粉五分 明雄黄二钱 麝香三分 巴豆霜二钱

【用法】上为细末，将蟾酥用酒化开，加米糊做锭，每锭重三分。每周一锭，用醋磨敷患处。

【主治】初起之疔疮、痈疡、脑疽。

【宜忌】不可内服。

23122 外染乌云膏

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷四引《种杏》。

【组成】五倍子(制)五钱 铜末(制)二钱 白矾 白盐各一钱半 没石子二个(面炒黄色)

【用法】上为末，浓茶调，重汤煮见黑色。先将皂角水洗净须发，然后涂药，包裹一夜，次早洗去，以胡桃油涂之令润。

【功用】乌须发。

23123 外浴忍冬汤

【方源】《幼幼集成》卷五

【组成】忍冬藤(俗名金银花。春、冬用枝，夏用枝叶)

【用法】上锉碎，以长流水一大釜，煎七分，将三分之一置浴盆内，以手试之，温热得中，先宜服用汤药，然后浴洗，渐渐添汤。以痘起光壮为度，不拘次数。

【主治】痘疮倒陷、黑陷不起。

23124 外痔神消散

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】红梔子(捣碎) 黄柏 胡黄连各一两

【用法】水二碗，煎一碗，二煎、三煎俱煎一碗，共三碗，去滓；入皮消一斤燉化，撇去泥脚，取上清消汁，以文火慢慢炼成消。大田螺十六个，每个入冰片一厘，待螺化成水，将水拌入消内，再加熊胆、儿茶各五钱，研细和入消内拌匀听用。每用，头一次用苦参一两，水三大碗煎成二碗，去滓；入制消末一两，煎二三滚，倾盆内，先熏后洗，每日洗三次；第二日仍用洗剩药汤，再加苦参一两，加水一大碗煎成，加制消末五钱，如上熏洗；第三日照第二日洗法；第四日旧药水俱不用，照第一日换新水煎苦参制消洗之。以三日又换一次，其痔自消，永不再发。

【主治】外痔。

23125 外感祛邪汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】麻黄一钱 桂枝一钱 陈皮五分 柴胡一钱 白芍一钱 当归二钱 茯苓一钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒初起者。

23126 外障皂角丸

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】蛇蛻 蝉蛻 元精石 山甲 当归 生术 茯苓 谷精草 木贼草 白菊花 刺螬皮 胆草 赤芍 连翘各五钱 獐猪爪十枚 人參三钱 川芎一钱五分 牙皂四挺(煨) 淫羊藿四钱

【用法】杏仁、地黄煮汁和丸。早、晚各服一钱五分。

【主治】外障。

【宜忌】忌鲜发。

23127 外敷生肌散

【方源】《救伤秘旨续刻》。

【异名】生肌散。

【组成】炙乳香 炙没药 白芷 赤石脂 儿茶 龙骨 猫头骨 五倍子各一钱

【用法】上为细末。先将手轻轻托入睾丸，以针缝合其皮，用药末涂之。

【主治】外伤肾囊破，睾丸跌出，血筋未断者。

23128 外敷朴消散

【方源】《普济方》卷四〇五。

【组成】天南星 朴消 乳香 秋芙蓉叶 木鳖子 当归 无名异 黄蜀葵花各等分

【用法】上为末。每服用浊酒调敷患处。其痈已熟，即研白丁香少许，津唾调敷绿豆大。其痈自破，宜服排脓托裏之剂。

【主治】痈疮。

23129 外敷接骨散

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】骨碎补 血竭 硼砂 当归 乳香 没药 川断 自然铜 大黄 地鳖虫各等分

【用法】上为细末。怡糖、蜜糖或凡士林调

敷。

【主治】骨折、骨碎及筋络扭伤。

23130 外接回生神膏

【方源】《医钞类编》卷六引《良方》。

【组成】牡蛎(煨) 干姜(炮) 各一钱

【用法】上为细末，男病用女唾调，手内擦热，紧掩二卵上，汗出愈；女病用男唾调，手内擦热，紧掩二乳上。

【主治】阴毒伤寒，及诸阴寒之证。

23131 外科至宝千槌膏

《外科传薪集》。为原书“红膏药”之异名。见该条。

卯

23132 卯药

【方源】《咽喉秘集》。

【组成】梅冰片一钱 雄精二钱 旋花一钱 元明粉二钱 硼砂五钱 粉甘草一钱 川黄连二钱 人中白三钱(煨存性) 铜青五钱(煨) 黄柏二钱(蜜制) 鸡内金一钱 钞纸二张(煨存性) 枯矾一钱 鹿角霜一两

【用法】上为末。吹喉。

【功用】解毒退肿，生肌去腐。

【主治】阴虚喉痹。

23133 卯戌丸

【方源】《普济方》卷八十六引《海上方》。

【组成】菟丝子(去沙，用无灰酒浸一宿，逼干，随饭蒸熟，入白捣三五十下，取起焙干，净取)十两 枸杞子(去枝梗，拣净)十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，冷酒热水茶下。

【主治】眼疾。

令

23134 令行吴官散

【方源】《喉科种福》卷五。

【组成】荆芥二钱(炒黑) 硼砂五钱 冰片二分 制没药一钱 制乳香一钱 胭脂一

钱 黄芩三钱 延胡索一钱半(炒) 薄荷四分

【用法】吹喉。

【功用】调经。

【主治】经水不调，喉痛，证无表里。

孕

23135 孕妇金花丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】梔子(炒)十六两 银花十六两 川芎十六两 黄柏十六两 黄芩十六两 当归十六两 白芍十六两 生地十六两 黄连八两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸。每服二钱，日服二次，温开水送下。

【功用】清热去火，安胎。

【主治】孕妇胎热上攻，头痛眩晕，两目红赤，口干鼻塞。

冬

23136 冬瓜丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】大冬瓜一枚(先于头边切一盖子，取去中间瓢不用。以赤小豆水洗净，倾满冬瓜中，再用盖子合了，用竹签签定，以麻绵系，纸筋、黄泥通身固济，窖干。用糯谷破取糠片两大箩，埋冬瓜在内，以火着糠内煨之，候火尽取出。去泥刮冬瓜令净，薄切作片子，并豆一处焙干)

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，煎冬瓜子汤送下，不拘时候。小便利为验。

【主治】十种水气，浮肿喘满。

23137 冬瓜汤

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《要孺方》。

【组成】冬瓜八合 栝楼十二分 茯苓知母各八分 麦门冬五分 粟米二合半

【用法】水五升，煮一升四合，新布绞，量

与。

【主治】渴利不住。

23138 冬瓜汤

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】常山(细锉)一两 甘草(炙，锉)半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，用冬瓜汁一盏，煎七分，放温，末发前服。

【主治】温症，寒少热多。

23139 冬瓜汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】冬瓜一个(煎水十碗) 白术三两 车前子五钱 肉桂二钱

【用法】上药用冬瓜水煎汤二碗，先用一碗，少倾又一碗。其水从大便而出。

【主治】臌胀。

23140 冬瓜汤

【方源】《寿世新编》

【组成】冬瓜(去皮)

【用法】水煮清汤，候凉任意饮之

【主治】霍乱大渴

【方论选录】冬瓜甘淡微凉，极清暑湿，无论病前病后，用以代饮，妙不可言，即温热病用之亦良。

23141 冬瓜饮

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七八。

【组成】大冬瓜一枚(割开头，去子) 黄连一斤(去须) 炙甘草一两(炙微赤，锉) 童子小便一升 地黄汁五合 蜜五合

【用法】上药捣甘草、黄连，罗为末，都入冬瓜内，即以头却盖之。又以黄土泥封裹，可厚一寸，候干，即以糠火烧之一日，待冷去泥，置於露下一宿，取瓜烂研，生布绞汁。每于食后以清粥饮调下一合。

【主治】消渴烦躁，饮水不止，或成骨蒸之状。

23142 冬瓜饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】冬瓜一枚(重三斤。去皮瓢，分作

十二片) 麦门冬二两(去心) 黄连两半(去须)

【用法】上药以麦冬、黄连粗捣筛,作十二服。每服水三盏,入冬瓜一斤(劈碎),同煎至一盏,去滓温服,日三夜二。

【主治】消渴口干,日夜饮水无度,浑身壮热。

23143 冬瓜饮

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【异名】冬瓜饮子(《卫生宝鉴》卷十二)、黄瓜汤(《普济方》卷一七六引《十便良方》)。

【组成】冬瓜一枚 黄连十两(去须,别捣为细末)

【用法】上药先取冬瓜剖开去瓤净,掺黄连末在瓜内,却用瓜顶盖,于热灰中煨熟,去皮细切烂研,布绞取汁。食前每服一盏至二盏,日三夜二。

【主治】消渴,能食而饮水多,小便如脂麸片,日夜无度。

23144 冬瓜粥

《医统》卷八十七。为《养老奉亲》“冬瓜羹”之异名。见该条。

23145 冬瓜粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】新鲜连皮冬瓜 80~100 克(或冬瓜子干的 10~15 克,新鲜的 30 克) 梗米适量

【用法】先将冬瓜洗净,切成小块,同梗米适量一并煮为稀粥,随意服食。或用冬瓜子煎水,去渣,同米煮粥。

【功效】利小便,消水肿,消热毒,止烦渴。

【主治】水肿胀满,小便不利,包括急慢性肾炎,水肿,肝硬化腹水,脚气浮肿,肥胖症,暑热烦闷,口干作渴,肺热咳嗽,痰喘。

23146 冬瓜羹

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】冬瓜一斤 葱白一握(去须细,切) 冬麻子半升

【用法】捣麻子,以水二大盏,绞取汁,煮冬瓜、葱白作羹。空腹食之。

【主治】热淋,小便疼痛,腹内气壅。

23147 冬瓜羹

【方源】《养老奉亲》。

【异名】冬瓜粥(《医统》卷八十七)。

【组成】冬瓜半斤(去皮) 豉心二合(绵裹) 葱白半握

【用法】上以和煮作羹,下五味调和,空心食之。常作粥佳。

【主治】老人消渴烦热,心神狂乱,躁闷不安。

【备考】《医学入门》本方用法:和米粉煮羹,入盐味,空心食。

23148 冬阴散

《普济方》卷四十三。为《圣济总录》卷五十四“冬除散”之异名。见该条。

23149 冬花烟

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】冬花二两

【用法】于无风处烧之,用芦管吸烟,以食压之。

【主治】久嗽。

23150 冬花散

【方源】《宁坤秘笈》卷上

【组成】冬花蕊 栗壳(蜜炙) 桔梗 枳壳 苏子 紫菀 知母各八分 桑皮(炒) 石膏 杏仁各二钱

【用法】水煎服。

【功用】止嗽下气

【主治】经水从口鼻出,咳嗽气紧。

23151 冬青方

【方源】《普济方》卷七十三引《海上方》。

【组成】新砖二片 冬青叶五斗

【用法】以冬青叶捣自然汁,浸砖数日,令透取出,掘地坑架砖于内,四下空,覆之日久,后砖上粉霜起,取霜,入脑子少许,无亦得。点眼。

【主治】赤眼。

23152 冬青汁

【方源】方出《广笔记》卷三，名见《仙拈集》卷四。

【组成】过冬青（即荔枝草，正名天明精）五六枚

【用法】同鲫鱼入锅煮熟，去草及鱼，饮汁数次，即愈。

【主治】瘰癧。

23153 冬青汤

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】冬青叶 小檗 甘草各等分

【用法】煎汤五升，瓶盛，汤浸三两时必下。

【主治】外肾肿不下。

23154 冬青汤

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】冬青叶

【用法】煎浓汤，入盐热洗之。

【主治】诸害眼。

23155 冬青散

【方源】《百一》卷十六。

【组成】冬青皮（阴干）

【用法】上为细末。挑开疮口敷之。少顷即退。

【主治】驴马涎汗入疮。

23156 冬菜散

【方源】《医学纲目》卷十七。

【组成】夏枯草（烧灰存性）

【用法】上为末。米饮或凉水调下。

【主治】小便出血，及肠风下血。

23157 冬除散

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【异名】冬阴散（《普济方》卷四十三）。

【组成】栝华五两 莎草根（炒，去毛）三两 丹砂（研） 消石（研） 石决明各二两 石膏（碎） 白芍药 夏枯草 黄连（去须）各一两

【用法】上为散。于早、晚食前用沙糖水调下一钱匕，稍增至二钱匕。以知为度。

【主治】中焦热结，目眦赤烂。

23158 冬葵汤

《嵩崖尊生》卷九。为《圣济总录》卷三十

九“冬葵子汤”之异名。见该条。

23159 冬葵散

【方源】《肘后方》卷六。

【异名】冬葵子散（《普济方》卷五十一）。

【组成】冬葵子 柏子仁 茯苓 瓜瓣各一两

【用法】上为散。每服方寸匕，一日三次，食后酒送下。

【功用】《普济方》：令面光白。

【主治】①《肘后方》：面生皴疮，②《普济方》：少年血气甚，面生粉刺。

23160 冬葵散

【方源】方出《圣惠》卷九十二。名见《普济方》卷五八八。

【组成】冬葵子三分 滑石三分（细研） 梁上尘半两 黄芩半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服半钱，煎葱白、灯心汤调下，不拘时候。

【主治】小儿心脏热，或烦躁不安，小便赤涩不通。

23161 冬葵散

《寿世保元》卷十六。为《古今医鉴》卷十二“冬葵子散”之异名。见该条。

23162 冬瓜子汤

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】冬瓜子（微炒，别研）二两 桃仁（汤浸，去皮尖，麸炒令赤色）五十粒 牡丹（去心）二两 芒消半两 大黄（锉碎，炒令熟）三两

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，早晨、日晚各一，如口噤拗开灌之。

【主治】产后血上冲心，运闷，腹胁疼痛不可忍，恶血不下，或成块者。

23163 冬瓜子散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】冬瓜子一两 青箱子 牡荆子 地肤子 蔓青子 决明子 车前子 茺蔚子 白蒺藜（微炒，去刺） 松子仁 桂心 蔓

蕤根 蕤仁(汤浸,去赤皮) 菟丝子(酒浸三日,晒干,别捣为末) 细辛各三分

【用法】上为细散。每服一钱,以温水调下,不拘时候。

【主治】眼昏暗,漠漠不明。

23164 冬瓜子散

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】冬瓜子仁一两(微炒) 柏子仁一两 白茯苓一两 葵子一两(微炒) 梔子仁二两 枳实一两(麸炒微黄)

【用法】上为细散。每服二钱,食后以粥饮调下。

【主治】鼻面酒皴,如麻豆及疼痛,搔之黄水出。

【备考】本方方名,《医方类聚》引作“冬瓜子仁散”。

23165 冬瓜仁丸

【方源】《文堂集验方》卷二。

【组成】老冬瓜仁二升

【用法】以绢袋盛,投三沸汤中,须臾取起晒干,如此三次,又以苦酒渍之二宿,晒干为末,水泛为丸。每服三钱,白汤送下。

【功用】久服悦颜色,延年不老,补肝明目。

【主治】男子五癆七伤。

23166 冬瓜饮子

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】大冬瓜子(去皮,捣烂,取自然汁五大碗) 五苓散(去桂)一两

【用法】上调成饮子。时时吃一盞。吃药时不得与水,不过二料立愈。

【主治】渴疾。

23167 冬瓜饮子

《卫生宝鉴》卷十二。为《圣济总录》卷五十八“冬瓜饮”之异名。见该条。

23168 冬瓜拨刀

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】冬瓜(研取汁)三合 小麦面四两 地黄汁三合

【用法】上药一处搜和如常面,切为拨刀。先将麋肉四两细切,用五味调和煮汁熟,却

滤去肉取汁,下拨刀面煮令熟,不拘多少,任意食之。

【主治】产后血壅消渴,日夜不止。

23169 冬青叶煎

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】冬青叶 小麦 甘草各等分

【用法】煎水洗。

【主治】妇人阴肿,小户嫁痛。

23170 冬青补汁

【方源】《湖南省中成药规范》。

【组成】女贞子(酒蒸)200克 金樱肉200克 红枣200克 桑椹100克 菟丝子50克

【用法】上药酌予碎断,煮提两次,过滤。滤液合并,浓缩成清膏,静置过滤。另取蔗糖500克制成糖浆,加入清膏继续浓缩成800毫升,即得。每次一汤匙,每日三次。

【功用】补肾益精,滋养肝肾。

【主治】阴虚体弱,肾亏目眩,小便频繁,高血压,神经衰弱。

23171 冬青糖浆

【方源】《新医药杂志》(1972;1:39)。

【组成】冬青(四季青)

【用法】取冬青水煎2次,浓缩3~4小时,每毫升相当于2克干生药,加入2倍量之95%乙醇,充分搅拌混合,静置约48~72小时,回收乙醇,使成2克/毫升,然后加入等量的糖浆及矫味剂、防腐剂即成。每次20~30毫升,每日三次。

【功用】抗菌消炎。

【主治】流行性感冒,上呼吸道感染,肺炎,咽喉炎,慢性支气管炎。

23172 冬茄冲剂

【方源】《医学研究》(1977;3:48)。

【组成】霜冻茄秧100斤 白糖3900克 冬凌草20斤 淀粉1.3千克 白糊精1.3千克 菠萝香糊适量

【用法】将霜冻茄秧及冬凌草装袋后,放蒸汽锅内加水浸泡30分钟,煮沸一小时,共三

次，成稠膏放冷，再加2倍量95%乙醇，搅拌后放阴凉处48小时，取上清液回收乙醇，再加2倍水放置48小时后吸取上清液，浓缩成膏状1.3千克，干膏中再加上赋形矫味剂混合均匀，再加适量60%乙醇制成软材，过12目筛，制得颗粒于80~90℃干燥箱中干燥，整粒后，用少许香精喷雾，便成棕黄色均匀颗粒，分成200袋，密封，每袋重35克。每次半袋，每日二次，十天为一个疗程。

【功用】固本消炎。

【主治】用于慢性气管炎。

23173 冬麻子粥

【方源】《医方类聚》卷一三三引《食医心鉴》。

【组成】冬麻子一升（捣，水研滤取汁二升） 米二合

【用法】以冬麻子汁煮粥，著葱白熟煮食之。

【主治】七淋，小便涩少，茎中疼痛。

23174 冬麻子粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】冬麻子半升 白粳米三合 薄荷一握 荆芥一握

【用法】上以水三大盏，煮薄荷等，取汁二盏，去滓；用研麻子，滤取汁，并米煮作粥。空腹食之。

【主治】中风，五脏壅热，言语蹇涩，手足不遂，神情冒昧，大肠涩滞。

23175 冬麻子粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】冬麻子二合 葵子一合 米三合

【用法】上研二味，以水二大盏，淘绞取汁，和米煮粥。浑着葱白，熟煮食之。

【主治】五淋，小便涩少疼痛。

23176 冬麻子粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】冬麻子一合（以水研取汁三升） 葱苡仁一合（捣碎） 粳米二合

【用法】上用冬麻子汁，煮二味作粥。空心

食之。

【功用】益气肥健，利小便。

【主治】产后腹中积血，及中风汗出。

23177 冬麻子粥

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】冬麻子三合（炒令香，捣令细，以水一升同研取汁） 粳米（净淘三合）

【用法】上药取麻子汁煮米为粥。空腹食之。

【主治】脚气。

23178 冬葵子汤

【方源】方出《千金》卷十五，名见《圣济总录》卷九十五。

【组成】冬葵子汁 乳汁等分

【用法】和服。

【主治】①《千金》：大便难。②《圣济总录》：大小便不通。

【备考】《圣济总录》本方用：冬葵子（微炒）一两。粗捣筛，用水二盏，煎至一盏，去滓，入乳汁半合，和匀，空腹顿服。

23179 冬葵子汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【异名】冬葵汤（《嵩崖尊生》卷九）。

【组成】冬葵子 滑石（碎） 香薷（择）各二两 干木瓜（细切，去皮瓤）一枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓温服，日四五服。大小便通利，心中快，立瘥。

【主治】干霍乱，大小便不通，手足心俱热，闷乱。

23180 冬葵子汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】冬葵子二两（微炒） 大黄一两（锉，炒）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠大小便不通。

23181 冬葵子汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】冬葵子三合 黄芩（去黑心）半两

赤茯苓(去黑皮) 芍药 车前子各一两

【用法】上为粗末,每服五钱匕,水一盞半,煎取八分,去滓,空心温服。

【主治】妊娠子淋,小便涩不通,小腹急,水道热痛。

23182 冬葵子汤

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】冬葵子(炒) 牛膝(酒浸,切,焙) 木通(锉)各二两 瞿麦穗一两 桂(去粗皮)二两

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓温服。以下为度。

【主治】妊娠堕胎,胞衣不出。

23183 冬葵子汤

《医方考》卷六。为《圣惠》卷七十四“冬葵子散”之异名。见该条。

23184 冬葵子汤

《明医指掌》卷九。为《女科百问》卷下“冬葵子散”之异名。见该条。

23185 冬葵子汤

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】冬葵子 滑石 香菇二两 木瓜一枚(去皮)

【用法】上为末,每次五钱,水煎服,一日五次。

【主治】干霍乱,二便不通,烦热胸闷。

23186 冬葵子汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】冬葵子三钱(炒) 杜仲三钱(盐炒) 当归三钱 白芍钱半(酒炒) 陈皮钱半 茯苓钱半 麦冬三钱(去心) 续断三钱 砂仁一钱(炒)

【用法】水煎服。

【主治】怀妊十月,脉滑疾按之微濡者。

【方论选录】胎息满足,气壅血亏,宜调补以通顺其胎,即可顺流分娩。当归养血荣经以润胎元,白芍敛阴和血以顺胎气,杜仲壮肾强腰,续断续筋通脉,茯苓清治节以利渗道,麦冬生津液以润胎息,陈皮利气和中,砂仁醒脾开胃,冬葵子滑胎利窍,无不应时而

产矣。

23187 冬葵子汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】冬葵子三钱 条芩钱半 草梢钱半 车前子三钱 山梔钱半 赤苓钱半

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】孕妇淋沥涩痛,脉沉数者。

【方论选录】妊娠胎热内壅,不得施化,故溺窍闭塞,小便涩痛,而淋沥不已。冬葵子滑溺窍以通淋,条芩清内热以安胎,赤苓利营渗水,山梔清热降火,车前子清肝以利小便,生草梢泻火以除涩痛也。水煎温服,使内热施化,则溺窍自通,而小便清利,何有涩痛淋沥之患,胎孕无不自安矣。

23188 冬葵子汤

【方源】《医级》卷八。

【组成】冬葵子 猪苓 赤苓 枳实 瞿麦 车前 木通 黄芩 滑石 甘草

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】膀胱积热,腹胀,溺痛涩,口燥舌干。

23189 冬葵子汤

【方源】《大生要旨》卷二。

【组成】冬葵子二钱(略炒) 柴胡五分(炒) 桑白皮(炒) 白茯苓 归身各一钱五分 白芍一钱(酒炒)

【用法】水煎服。

【主治】怀妊而小便淋沥,此本於湿热,名曰子淋。

23190 冬葵子散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】冬葵子二两 滑石二两 赤茯苓一两 木通一两(锉) 茅根一两(锉) 石韦一两(去毛) 子芩一两 川朴消一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盞,煎至六分,去滓,不拘时候温服。

【主治】热病,小便赤涩不通。

23191 冬葵子散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】冬葵子汤(《医方考》卷六)。

【组成】冬葵子(炒) 柴胡(去苗) 桑根白皮(锉) 赤茯苓各一两 赤芍药三分 当归三分(锉, 微炒)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 葱白七寸, 煎至六分, 去滓, 不拘时候温服。

【主治】妊娠胎不安, 小便淋涩, 小腹疼痛。

【方论选录】《医方考》: 滑可以去着, 故用冬葵子; 清升则浊自降, 故用柴胡; 气化则能出, 故用桑皮; 辛利则能润窍, 故用当归。而赤苓、赤芍者, 取其入血而利丙丁也。

23192 冬葵子散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】冬葵子一两 木通半两(锉)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 煎至五分, 去滓。不计时候, 量儿大小, 分减服之。

【主治】小儿卒小便不通, 小腹急闷。

23193 冬葵子散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【异名】蒲黄散(《普济方》卷三八八)。

【组成】冬葵子(锉) 蒲黄各半两

【用法】上药以水一大盏, 入生地黄半两, 煎至六分, 去滓, 不计时候, 量儿大小, 分减服之。

【主治】小儿血淋不止, 水道涩痛。

23194 冬葵子散

《圣济总录》卷一〇一。为《外台》卷三十二“葵子散”之异名。见该条。

23195 冬葵子散

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】冬葵子(微炒) 榆白皮(细锉) 滑石(研) 阿胶(炙令燥)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕, 温水调服, 不拘时。

【主治】妊娠小便不通, 小腹胀痛。

23196 冬葵子散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】冬葵子 滑石 海蛤 蒲黄各半两

【用法】上为散。每服半钱匕, 以葱白汤调下。

【主治】小儿小便不通, 脐腹急痛。

23197 冬葵子散

【方源】《女科百问》卷下。

【异名】冬葵子汤(《明医指掌》卷九)。

【组成】冬葵三钱 赤茯苓二钱

【用法】上为细末。每服三钱, 米饮调下, 不拘时候。若利则歇。如不通, 恐是转胎, 加发灰少许。

【主治】妊娠, 小便不利, 身重恶寒, 起则眩晕; 水肿。

23198 冬葵子散

《普济方》卷五十一。为《肘后方》卷六“冬葵散”之异名。见该条。

23199 冬葵子散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【异名】冬葵散(《寿世保元》卷十六)。

【组成】木通 梔子 冬葵子 滑石各五钱

【用法】上锉一剂。水一钟半, 煎至一钟, 空心温服。

【主治】孕妇转胞, 小便不通。

【备考】此药滑胎, 临月可用, 六七个月以前不可用。

23200 冬葵子散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】冬葵子 滑石 梔子

【用法】上为末, 田螺肉捣膏, 或生葱汁调膏。贴脐中, 立通。

【主治】孕妇转胞, 小便不通。

23201 冬葵子散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】冬葵子三两 山梔二两 赤苓两半 车前子三两

【用法】上为散。荷叶梗汤下三钱。

【主治】孕妇小便不通, 脉数者。

【方论选录】胎热内遏, 溺窍闭塞, 故小便不通, 胎因不安焉。冬葵子滑利溺窍, 红山梔清利小便, 赤茯苓利营以渗膀胱, 车前子

清肝以利小水也。为散，荷梗汤下，使热化气行，则溺道自通，而溺窍无闭塞之患，胎孕无不安矣。

23202 冬葵根汁

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】生冬葵根二斤（洗净，捣，绞取汁三合） 生姜四两（捣，绞取汁一合）

【用法】上药搅匀，分作两服。空腹一服，有顷再服。服尽即通。

【主治】大小便不通。

23203 冬葵根汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】葵根一握（锉。用子一合研亦得）

【用法】以水三盏，煎取一盏半，去滓，分温二服。

【主治】妊娠患子淋，及小便不通。

23204 冬葵根汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】冬葵根（干者）一握（洗。冬即用子） 车前草一两（干者，切） 木通（细锉）三两 大黄（锉炒）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠大小便不通，七八日以上，腹胀脊闷。

23205 冬瓜子仁散

《医方类聚》卷八十。即《圣惠》卷四十“冬瓜子散”。见该条。

23206 冬瓜洗面药

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】冬瓜一个（以竹刀子刮去青皮，切作片子）

【用法】酒一升半，水一升，同煮烂，用竹绵擦去滓，再以布滤过，熬成膏，入蜜一斤，再熬稀稠得所，以新绵再滤过，于瓷器内盛，用取栗子大，用津液调涂面上，用手擦。

【主治】颜面不洁，苍黑无色。

【备考】熬药时，用柴二秤，炭一秤，布一丈。

23207 冬地三黄汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】麦冬八钱 黄连一钱 苇根汁半酒杯（冲） 元参四钱 黄柏一钱 银花露半酒杯（冲） 细生地四钱 黄芩一钱 生甘草三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。以小便得利为度。

【主治】阳明温病，无汗，实证未剧，不可下，小便不利者。

23208 冬地百部饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】干地黄四钱 天麦冬 广百部各三钱 生枇杷叶五钱 浙贝 女贞子 旱莲草 苇根各三钱

【用法】水煎，微温服。

【功用】养阴润肺。

【主治】产前身体素弱，宿有潮热咳嗽，间或咯血；产后潮热加剧，面热颧赤，手足心热，头晕耳鸣，咳嗽痰少，唇燥舌红，苔黄口干，脉虚数。

【加减】舌上无苔，舌质嫩红，加生谷芽五钱，知母三钱。

23209 冬虫夏草酒

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】冬虫夏草二两 白酒八两

【用法】冬虫夏草浸酒内七昼夜。用牙刷沾酒外戳1~3分钟，早、晚各一次。

【功用】补气血，助生发，乌须黑发。

【主治】圆形脱发，脂溢性脱发，神经性脱发，小儿头发生长迟缓。

23210 冬青槐角丸

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】冬青子（炒） 槐角子（炒） 怀生地（酒洗） 荆芥穗（炒黑）各二两 川黄连（炒黑） 川归身（酒洗） 侧柏叶（用茶水煮）各一两

【用法】上为末，米糊加醋少许为丸。每次空心滚水吞二钱。

【主治】痔漏。

23211 冬味地黄丸

《胎产心法》卷上。为《医部全录》卷三三一引《体仁汇编》“八味地黄丸”之异名。见该条。

23212 冬味地黄汤

《胎产心法》卷上。即《医部全录》卷三三一引《体仁汇编》“八味地黄丸”改为汤剂。见该条。

23213 冬获苏贝汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】苏叶三钱 麦冬二两 贝母三钱 茯苓五钱

【用法】水煎服。

【主治】口渴之极，快饮凉水，水抑肺气而不升，忽然痞哑，不能出声。

23214 冬疫五仙膏

【方源】《理渝》。

【组成】干姜二两 大黄四两 麻黄 白芷 细辛 甘草各三钱

【用法】麻油熬，黄丹收，滑石六两搅匀，或加绿豆。贴肾俞处。

【主治】冬疫。

23215 冬葵草薤散

【方源】《千家妙方》上册引梁济荣方。

【组成】冬葵子 150 克 草薤 120 克 白糖 80 克

【用法】将前两味药焙干为末，后加入白糖拌匀装瓶备用。每日早、晚各一次，每次 3~5 克，温开水送服。

【功用】清热利湿。

【主治】血丝虫乳糜尿。

23216 冬季补肾肾沥汤

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】石斛一两（去根） 五味子三分 黄耆三分（锉） 熟干地黄一两 人参三分（去芦头） 桑螵蛸半两（微炙） 附子一两（炮裂，去皮脐） 防风半两（去芦头） 白龙骨一两 肉苁蓉一两（酒浸，去麸皮，微炙） 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁，以帛绢包之） 川椒半两（去目及闭口者，微炒去

汗） 桂心半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散，每服五钱，水一大盏，以羊肾一对（切去脂膜），加生姜半分，大枣三枚，每与磁石包子同煎至六分，去滓，食前温服。

【功用】补肾。

【主治】肾虚。

务

23217 务成子萤火丸

【方源】《千金翼方》卷十。

【异名】冠军丸、武威丸（原书同卷）、萤火丸（《医方纪元》）。

【组成】萤火 鬼箭（削取皮羽） 蒺藜各一两 雄黄 雌黄 矾石（烧汁尽）各二两 羖羊角 锻灶灰 铁锤柄入铁处（烧焦）各一两半

【用法】上为散，以鸡子黄并丹雄鸡冠一具和之，如杏仁大。作三角绛囊，盛五丸，带左臂；若从军，系腰中勿离身。

【主治】辟疾病恶气、虎、狼、蛇虺、蜂蛰诸毒。

失

23218 失心丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】郁金 大黄各五钱 黄连 干漆各一钱

【用法】上为细末，糊为丸，如梧桐子大。

【主治】失心癫、癩、狂症。

23219 失心方

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】黄连二钱 郁金二钱

【用法】煎浓汁，矾三钱为末，将前汁送下。三服后，服补中益气汤。

【主治】癫癩，痰入心窍。

23220 失肚丸

【方源】《永类铃方》卷二十。

【组成】干姜 木香各一两 巴豆七七粒

(米醋同二味煮干, 去豆) 肉豆蔻半两

【用法】上为末, 醋糊为丸, 如小豆大。三岁三十丸, 空心常服, 米汤送下。

【主治】小儿疝气, 腹胀, 喘粗, 或肠鸣泄泻。

【加减】消胀, 木香止用一分, 去肉豆蔻。

23221 失笑丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】茴香一字 当归 金毛狗脊 羌黄各一两

【用法】上为细末, 醋煮面糊为丸, 如梧桐子大。每服十丸, 先用油滚过, 热醋送下; 男子冷水下。

【主治】九种心痛。

23222 失笑丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】枳实消痞丸。

【组成】干生姜 炙甘草 麦蘖面 白茯苓 白术各二钱 半夏曲 人参各三钱 厚朴四钱(炙) 枳实 黄连各五钱

【用法】上为细末, 汤浸饼为丸, 如梧桐子大。每服五七十丸, 白汤送下, 食远服。

【功用】开胃进饮食。

【主治】右关脉弦, 心下虚痞, 恶食懒倦。

【方论选录】《成方便读》: 夫满而不痛者为痞, 痞属无形之邪, 自外而入, 客于胸胃之间, 未经有形之瘀血饮食互结, 仅与正气搏聚一处为患。故以黄连、干姜并用, 一辛一苦, 一散一降, 则无论寒热之邪, 皆可开泄, 二味实为治痞之主药。然痞结于中, 则气壅湿聚, 必渐至痰食交阻, 故以枳实破气、厚朴散湿、麦芽化食、半夏行痰, 自无胶固难愈之势。但邪之所凑, 其气必虚, 故必以四君子坐镇中州, 祛邪扶正, 并驾齐驱。故此方无论虚实之痞, 皆可治之。用蒸饼糊丸者, 以谷气助脾胃之蒸化耳。

23223 失笑丸

《医学心悟》卷五。即《苏沈良方》卷八“断弓弦散”改为丸剂。见该条。

23224 失笑散

【方源】《证类本草》卷二十二引《近效方》。

【异名】断弓弦散(《苏沈良方》卷八)、失笑膏(《中藏经·附录》)、经验失笑散(《金匱翼》卷六)。

【组成】五灵脂 蒲黄各二钱

【用法】上药先用酹醋一合, 熬药成膏, 以水一小盏, 煎至七分, 热呷。

【功用】①《医学心悟》: 散血消胀, 下衣。②《方剂学》: 活血行瘀, 散结止痛。

【主治】瘀血停滞, 心腹剧痛, 或产后恶露不行, 或胞衣不下, 或月经不调, 少腹急痛。

①《苏沈良方》: 疗妇人血气。②《妇人良方》: 产后恶露不快, 腰痛, 小腹如刺, 时作寒热, 头痛, 不思饮食; 亦治久有瘀血, 月水不调, 黄瘦不思饮食, 并能治之; 亦可疗心痛。③《外科枢要》: 治跌仆、产后心腹绞痛, 或不知人事, 或经行瘀血, 作痛作痢。④《医学入门》: 食积瘀血。⑤《痧胀玉衡》: 治痧后毒气退尽, 尚留瘀血在胸膈间, 积血作痛。⑥《辨证录》: 产后仓皇惊扰, 用力过多, 以致育膜有伤, 垂出肉线一条, 约长一二尺, 牵引心腹, 痛不可忍, 以手微动之, 则痛苦欲绝。⑦《医学心悟》: 或血入衣中, 胀而不能下, 以致心腹胀痛喘急。⑧《女科切要》: 胃脘痛。⑨《验方新编》: 男妇老少心腹胸肋瘀血作痛, 小腹疝气、脚气及胎前产后血崩、血晕, 一切气痛。

【方论选录】①《古今名医方论》: 吴于宣曰: 是方用灵脂之甘温走肝, 生用则行血; 蒲黄甘平入肝, 生用则破血; 佐酒煎以行其力, 庶可直抉厥阴之滞, 而有其推陈致新之功。甘不伤脾, 辛能逐瘀, 不觉诸证悉除, 直可以一笑而置之矣。②《医方集解》: 此手足厥阴药也, 生蒲黄性滑而行血, 五灵脂气燥而散血, 皆能入厥阴而活血止痛, 故治血痛如神。③《血证论》: 蒲生水中, 花香行水, 水即气也, 水行则气行, 气止则血止, 故蒲黄能止

刀伤之血；灵脂气味温，行以行血，二者合用大能行血也。

【临证举例】心腹痛《苏沈良方》：曾有妇人病心腹欲死，十余日百药不验，服此顿愈。

【现代研究】药理研究①《简明中医辞典》：本方能提高机体对减压缺氧的耐受力；对垂体后叶素引起的大白鼠急性心肌缺血有对抗作用；有降低血压的作用。②《上海中医药杂志》(1963；9：1)：本方既能收缩子宫而有利于子宫复旧及恶露排出，又能缓解平滑肌痉挛而有助于痛经、产后腹痛及胸腔疼痛的缓解。③(1983；2：46)：本方能抑制血小板粘附和聚集，并有轻度增加抗凝血酶Ⅲ活力的作用。

【备考】本方改为丸剂，名“紫金丸”(见《妇人良方》)、“失笑丸”(见《医学心悟》)。《会约》：此方用以止痛，蒲黄宜减半；若用以止血，则宜等分，蒲黄炒黑，或五灵脂减半亦可。

23225 失笑散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【异名】夹袋散。

【组成】干漆(炒烟出为度) 胡椒各等分

【用法】上为细末。每服半小钱，煎葱酒调下，乘热服。

【主治】男子小肠气。

23226 失笑散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】川乌头 芎 甘草 地骨皮 细辛 白芷 高良姜各等分

【用法】上为细末。每用少许，于痛处擦三二次，涎出，以温水漱。

【主治】牙疼。

23227 失笑散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】大腹子半两 硫黄四两

【用法】上为细末。每用以清油涂手心内，摊嗅之。

【主治】疥癣。

23228 失笑散

【方源】《普济方》卷四〇〇引《全要方论》。

【组成】莨菪子 草乌头(醋炙切片，麸炒) 酸枣仁(炒去皮)各等分

【用法】上为末。每服半钱，水、醋各半盏，煎至三分，服两服。便睡。

【主治】小儿诸病，汗后不得睡。

23229 失笑散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】细辛(去土叶) 良姜 香白芷 芫荽各等分

【用法】上为细末。左边牙疼，口含水搐左鼻；右边牙疼，搐右鼻；如擦牙亦得。

【主治】牙疼，不问久新。

23230 失笑散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】荆芥穗一两 朴消二两

【用法】上为粗末。萝卜、葱同煎汤，淋洗。

【主治】肾肿。

23231 失笑散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】槟榔 高良姜(锉，滴油炒)各等分

【用法】上为细末。每服二钱，热酒调下，食前服。

【主治】心痛。

23232 失笑散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】芫荽 地龙(去土) 天南星 川乌头 胡椒各等分

【用法】上为细末。先用刷牙，灌漱牙净，用药干敷痛处。

【主治】牙疼。

23233 失笑散

【方源】《直指》卷十八。

【组成】川五灵脂 蒲黄(隔纸微炒) 延胡索各等分

【用法】上为末。每服二钱，酒半盏，煎七分，食前服。血痛，临熟入米醋少许。

【主治】小肠气痛及诸血痛。

23234 失笑散

【方源】《医方类聚》卷七十三引《施圆端效方》。

【组成】干姜 雄黄各等分

【用法】上为细末。口噙水，嚥少许鼻中。

【主治】牙疼。

23235 失笑散

【方源】《普济方》卷三六五。

【组成】玄胡索 白僵蚕各三钱 黄连一钱 轻粉(炒)二钱 麝香(炒)一字 铅白霜 硼砂 黄柏各半钱

【用法】上为细末。每用一捻，干贴舌上，出涎再贴。

【主治】口疮，或唇裂破血出；小儿赤白口疮，作热疼。

23236 失笑散

【方源】《疡医大全》卷十六引江仍度方。

【异名】牙痛失笑散(《全国中药成药处方集》沈阳方)。

【组成】萆薢八分 细辛(净叶)一钱 大冰片二分五厘

【用法】上为极细末。擦牙痛处。伏于桌边流涎，片时见效，便能饮食。

【主治】牙疼。

23237 失笑膏

《中藏经·附录》。为《证类本草》卷二十二引《近效方》“失笑散”之异名。见该条。

23238 失痛散

【方源】《产科发蒙》。

【组成】滑石 黄丹 甘草各二钱 质干一钱

【用法】上为极细末，鸡子清和调。先入手帛于热汤中，绞取熨患处，便敷。

【主治】产后阴门肿痛。

23239 失血奇效丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】生地一两二钱 茅根二两 侧柏二两 山药一两 薄荷一两 茜草一两 大小蓟一两 蒲黄一两 梔子一两 黄芩一两

(以上炒炭存性) 花蕊石一两 玄参(去芦)二两 古墨二两 三七二两

【用法】上为细末，过筛，用冷开水泛为小丸，每丸七厘重。每服二钱，日服二次，温开水送下。

【功用】清热凉血，除痰止咳。

【主治】咳嗽吐血，呕血，咯血，痰中带血，崩漏下血。

生

23240 生丸

【方源】《普济方》卷三二八引《卫生家宝》。

【组成】知母 细辛 石膏(火煨) 白姜(火炮裂) 血竭(细研) 黄芩 绵黄耆(洗，蜜水浸一宿，炙) 肉桂(去皮，不见火) 没药(研) 川当归(去芦，洗) 贝母 生地黄(净洗) 防风(去芦) 各一分 甘草一分半(炙) 米(炒令微黄) 黑豆(微炒) 大麻子(瓦上炒) 各三分 川椒(去子，炒去汗) 石斛(净洗，锉，蜜水浸一宿) 各半两

【用法】上药各为末，炼蜜为丸，捣多杵为妙，一两分为五丸。孕两三月，一丸分作三服，温酒细嚼下；月候不调，当归酒下；子难生，死腹中，横产倒产，衣不下，死绝无语，但看心头有气，暖煎枣汤化开，灌入口中；产后恶血攻刺，炒豆淋酒下；憎寒壮热，呕逆，半身不遂，头晕血崩，带下不止，狂言，饮食少味，日渐黄瘦，并酒下。

【功用】安胎益血，调气进食。

【主治】妇人胎前产后一切等疾。

【宜忌】忌生冷毒物。

23241 生人汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】生枣仁五钱 人参二两 附子三钱 白术四两 菖蒲五分

【用法】水煎服。

【主治】小便之时，忽然寒噤，阴阳两脱，

昏晕，外势缩入。

23242 生儿丹

【方源】《普济方》卷三二四引《仁存方》。

【组成】牡丹皮 头红花 肉桂（去皮）川当归（去苗）各一两 丁香（拣）半两 朱砂半两（为末） 马鸣退灰三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、食前热酒下，一日三次。

【主治】妇人冲任虚损，经脉不调，积滞留住，血闭、血块、血凝、血瘦、血癖停阻，腰脚脐腹久痛，寒热有时，面赤口干，黄瘦困倦，四肢颤掉，起坐艰，迢邐劳疾，喘嗽盗汗，便溺频多，鬓发脱落，或室女经脉滞结。

【加减】睡卧不宁，加人参。

23243 生力散

《卫生总微》卷十二。为《幼幼新书》卷二十六引《家宝》“生筋散”之异名。见该条。

23244 生化汤

【方源】《景岳全书》卷六十一引钱氏方。

【组成】当归五钱 川芎二钱 甘草（炙）五分 焦姜三分 桃仁十粒（去皮尖双仁）熟地三钱（一方无熟地）

【用法】上咬咀。水二钟，加大枣二枚，煎八分，温服。

【功用】《回生集》：逐瘀生新。

【主治】产后恶露不行，小腹冷痛。现用于产后子宫复旧不良，产后子宫收缩痛，小产后胎盘残留，人工流产后出血不止，子宫肌瘤，子宫肥大症，宫外孕等。

①《景岳全书》引钱氏方：妇人胎前产后皆宜此药；胎衣不下，或血冷气闭，血枯气弱者。②《外科大成》：产后患痢。③《傅青主女科》：胎前素弱妇人，见危症热症坠胎；产后血块；分娩之后，眼见黑花，头眩昏黑，不省人事；新产后，荣卫俱虚，易发寒热，身痛腹痛。④《幼幼集成》：孕妇出痘，适逢正产，产后腹痛，恶露未尽。⑤《医林纂要》：恶露不行及儿枕作痛。⑥《外科真论》：产后恶血未尽，脐腹刺痛，或注于股内肿痛如锥，

此由冷热不调，血瘀经络而然。⑦《增订胎产心法》：胎漏小产，腹痛成块有形，属血虚气逆者。

【宜忌】①《医原》：生化汤活血化瘀，儿枕作痛尚宜。其有肝虚血燥体质，平时常有肝阳上冒见证，生化汤辛温走窜，又不宜服。尝有服此成痉厥者，不可不知。②《福建中医药》（1982；6：40）：脾胃虚弱所致的大便溏滑，心火素亢所致的心悸怔忡，肝阳横逆所致的眩晕胁痛，阴虚内热所致的口燥咽干，冲任固摄无权所致的时下血块，以及产妇感受一切温暑时邪、表里邪热未解的，都是本方的禁忌症。

【加减】凡血晕虚晕，加荆芥穗六七分；凡产妇气虚气脱，倦怠无力，加人参、黄耆；凡阳虚厥逆，加附子、肉桂。脉虚烦渴，加麦冬、五味；气壅有痰，加陈皮、竹沥；血虚血燥便结，加麻仁、杏仁、苁蓉；多汗不眠，加茯神、枣仁、黄耆；上体多汗，加麻黄根，下体多汗，加汉防己；烦热，加丹皮、地骨皮；口噤如风，反张痙痲者，加荆芥、防风各三四分；恶露未尽，身发寒热，头痛胁胀，其小腹必然胀痛，加红花、丹皮、肉桂各三四分，玄胡一钱；内伤饮食，加山楂、陈皮、砂仁，或神曲、麦芽；外伤寒湿，加苍术、白术；血积食积，胃有燥粪，脐腹胀痛，加大黄二钱；产后下血不止，或如屋漏水，沉黑不红，或断或来，或如水，或有块，淋漓不休，此气血大虚之候，不可误用寒凉，其脉浮脱者，可加附子辈诸阳分药，否则无救矣。

【方论选录】①《医林纂要》：妇人产子，血既大破矣，而用力已劳，气亦耗泄，故产后多属虚寒。其有恶露不行，儿枕作痛诸病，皆气不足以行之故，故治此宜用温以行之。当归以滋养其新血，川芎以行血中之气，干姜以温之，炙草温中补气，而微用桃仁以行之。治余血作痛之方，宜莫良于此矣。②《成方便读》：夫产后血气大虚，固当培补，然有败血不去，则新血亦无由而生，故见腹中疼痛

等证,又不可不以去瘀为首务也。方中当归养血,甘草补中,川芎理血中之气,桃仁行血中之瘀;炮姜色黑入营,助归、草以生新,佐芎、桃而化旧,生化之妙,神乎其神;用童便者,可以益阴除热,引败血下行故道也。

【临证举例】①产后调理 《江西中医药》(1960; 6: 25): 给 60 名产妇服用生化汤原方,每天一剂,于产后即连服三剂,并与对照组(未服生化汤)进行对比观察。结果,服药组在产褥期发生的不利于产后恢复或不舒服的情况比对照组减少 16.6%,其中对照组的病变率为 28.33%,服药组为 10%。认为生化汤的产后调理作用,主要表现在预防产褥感染(服药组与对照组之比为 1:3)与促进泌乳机能方面(服药组与对照组乳汁分泌不足之比为 1:4)。此外,服药组产后宫缩痛增加,说明生化汤有加强子宫的收缩作用,这对防止产褥期的病变也是有利的。②小产后胎盘残留 《广东中医》(1962; 9: 17): 用生化汤去甘草,加益母草、熟地、丹皮、红花、艾叶,治疗小产后胎盘残留 22 例,其中有 3 例曾住院做过刮宫手术二次以上,但未见效果。少者服药二剂,多者服药六剂,即排出残留胎盘,出血及腹痛消除,22 例全部治愈,且追踪半年无临床症状。③人工流产后出血不止 《广西卫生》(1975; 2: 50): 对 3 例人流后阴道流血不止患者,经用各种止血药与子宫收缩药无效,后改用生化汤去炙草加丹参、益母草、牛膝,水煎服,每日一剂,服药一至三剂,阴道流血即停止。3 例均治愈。④产后子宫复旧不良与产后子宫收缩痛 《新中医》(1977; 2: 38): 选择产后子宫复旧不良 59 例,产后子宫收缩痛 41 例,给予煎服生化汤加红花治疗,并同时期用麦角新碱治疗产后子宫复旧不良 50 例进行比较。结果,甲. 产后子宫复旧不良: 中药治疗组,治疗前 24 小时宫底平均下降 0.59 厘米,服药后 24 小时宫底平均下降 3.28 厘米,治疗后比治疗前要快五倍多。西药治疗组,用

药后 24 小时宫底平均下降 1.40 厘米。中药组较西药组宫底下降速度快一倍多。乙. 产后子宫收缩痛: 服生化汤加红花治疗的 41 例中,疗效显著者 35 例,效果不显著者 3 例,记录不详者 3 例。丙. 服生化汤加红花的两组病人共 100 例,其中 47 例服药后阴道有血块排出,部分患者服药后有子宫收缩感。认为生化汤加红花的作用可使子宫收缩呈节律性加强,进而促进产后子宫的复旧及产后子宫收缩痛的消失。⑤子宫肌瘤及子宫肥大症

《山西医药杂志》(1980; 6: 21): 以加味生化汤(生化汤加益母草、炒荆芥穗)为主方,水煎服,一日一剂,30 剂为一疗程,治疗子宫肌瘤与子宫肥大症共 70 例。其中,子宫肌瘤 24 例,治愈 8 例,有效 13 例,无效 3 例;子宫肥大症 46 例,治愈 25 例,有效 18 例,无效 3 例。最少服药 10 剂,最多 84 剂,以 30 至 60 剂为多,占 75%。⑥宫外孕 《新中医》(1984; 11: 33): 基于宫外孕的病机属于少腹瘀实又兼虚证,治疗虽当活血化瘀,但又不可攻逐太过,因此选用祛瘀生新的生化汤加减(当归、川芎、桃仁、桂枝、云茯苓、赤芍、丹皮)为主治疗 21 例宫外孕,另有 10 例休克型和 2 例不稳定型宫外孕即行手术治疗。结果,生化汤加减治疗的 21 例宫外孕,全部治愈,住院天数最短 7 天,最长 75 天,平均 48 天。

【现代研究】《山西医药杂志》(1980; 3: 7): 为了探讨临床运用加味生化汤(生化汤加益母草、炒荆芥穗)治疗子宫肌瘤与子宫肥大症的机理,以乙烯雌酚造成小白鼠子宫肥大模型,观察口服加味生化汤对正常与去卵巢之小鼠子宫重量与组织形态的影响。结果显示加味生化汤在正常育龄小白鼠,可对抗雌激素使子宫充血水肿、增生肥厚的作用,而致子宫重量减轻,初步证实了临床治疗子宫肥大症的疗效。另外,对少数子宫作了组织化学的染色观察,发现用药组糖元与脱氧核糖核酸含量都有减少。去卵巢小白鼠排除

了卵巢激素之影响,便于观察加味生化汤对外源性雌激素在子宫之作用。但是实验结果与原设想相反,不仅没有象正常小鼠之作用,反而促进子宫增重。组织切片所见,本方用于去卵巢小鼠可使雌激素所致的炎症反应明显消退。这可能就是机体不同功能状态下中药所发挥的双向调整作用,即在子宫异常增大时,加味生化汤可使其固缩与减重;当卵巢功能低下时,加味生化汤又能代偿部分卵巢功能,以防止子宫萎缩。

【备考】《傅青主女科·产后篇》无熟地、大枣,以黄酒、童便各半煎服。

23245 生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】全当归一两 川芎三钱 白术一钱 香附一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后气虚,胞衣不下,腹必胀痛。

【加减】加人参三钱更妙。

23246 生化汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】当归三钱 黑姜五分 川芎一钱五分 益母草一钱 桃仁(去皮尖及双仁者,炒,研)七粒

【用法】水煎服。入童便少许尤佳。

【功用】产后服一二剂,祛瘀生新。

23247 生化汤

【方源】《金鉴》卷四十七。

【组成】当归 川芎 丹参 桃仁 红花 姜炭

【主治】产后瘀血,发热腹痛。

23248 生化汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】当归身一两(炒) 川芎三钱 桃仁十粒(去皮尖,炒) 炙草五分 木香一钱 黑姜炭五分 白芷三钱(炒) 穿山甲三钱(研)

【用法】水煎服。

【主治】乳汁不行,属恶露壅滞,经络不舒

者。

23249 生化汤

【方源】《良方合璧》卷下。

【组成】川芎五分 泽兰一钱五分 楂肉炭一两 炙草五分 黑荆芥一钱 黑姜片八分(遇暑天减轻些) 全当归二钱 生香附二钱(捣碎) 延胡索一钱五分 上红花一钱

【用法】用水两碗,煎至一碗;将药滤出,仍入水两碗,再煎至一碗;将两碗药煎至一碗,早、晚温服。

【主治】产后恶露不通。

23250 生化膏

【方源】《全国中药成药处方集》(大同方)。

【组成】当归三两 川芎一两 桃仁泥五钱 益母草三两 香附一两半 红花 泽兰 炙草各一两 姜炭五钱

【用法】清水熬汁,加蜂蜜、红糖收膏。

【功用】逐瘀生新。

【主治】产后血虚。

23251 生气汤

【方源】《局方》卷三。

【组成】盐(炒)二两半 丁香皮一两 胡椒二钱半 丁香 檀香各一两半 干姜(炮) 甘草(炙)各二两

【用法】上药同捣碎,用慢火煨令香熟,乘热入瓷器内盖覆,候冷碾罗作细散,密盛贮,勿令泄气味。每服半钱至一钱,用沸汤点服,不计时候。

【功用】常服除邪冷,生胃气。

【主治】男子、妇人一切冷气攻心腹肋肋胀满刺痛,噫醋吞酸,痰逆呕吐,胸膈痞闷,饮食不美;又治五膈五噎,一切气疾。

23252 生气汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】檀香 丁香 丁香皮 白芷 人参 胡椒各一分 甘草 温姜一两 白姜半两

【用法】上为细末。每服二钱,空心白汤点

服。

【功用】补气散寒，和养脾胃。

【备考】方中甘草用量原缺。

23253 生气汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参二钱 白术一钱 茯苓三钱 远志八分 炒枣仁二钱 熟地五钱 山茱萸二钱 甘草三分 神曲三分 半夏三分 麦冬一钱 肉桂三分 菖蒲三分 芡实三钱 广木香一分

【用法】水煎服。

【主治】壮年得伤寒后，或酒色过度，五脏俱伤而善忘。

23254 生气汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参二钱 白术一钱 巴戟天二钱 附皮三分 甘草二分 茯苓二钱 砂仁一粒 谷芽一钱 炮姜五分

【用法】水煎服。

【主治】人有贪用饮食，甚至遇难化之物而不知止，逢过寒之味而不知节，遂至胸腹胀闷，已而作痛生疼，后至起噎吞酸，见美味而作膜，不欲食者。

23255 生气散

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】钟乳粉 赤石脂（煨） 阳起石（火煨候红，好酒内浸一遍，研末）各半两

【用法】上为细末。用附子一只（炮，去皮脐，只用半只），干姜十片，水二盏，煎至七分，调生气散二钱，空心服，半日再服。

【主治】脾脏气虚，泄泻不止，百药不效者。

23256 生气散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】丁香三字 白术 青皮各二钱 甘草（微炙） 木香 人参各一钱

【用法】上为末。每服半钱，沸汤点服。

【功用】调气。

【主治】《保婴撮要》：脾胃气虚，吐泻，肚腹膨胀，饮食不化，腹痛不止。

23257 生节散

方出《串雅内编》卷四，名见《青囊秘传》。为原书同卷“藕节散”之异名。见该条。

23258 生生丹

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】生白矾 枯白矾各一两

【用法】上为末。用艾叶熬汤，打面糊二两为丸，雄黄为衣，如黑豆大。大人五丸，小儿三丸。赤痢，甘草汤下；白痢，姜汤下；泄泻，米汤下；疟疾，桃枝汤下。

【主治】水泻，痢疾，疟疾。

23259 生生汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参三两 附子三钱 枣仁五钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒少阴症，四逆恶寒，身蹇，脉不至，不烦而躁。

【方论选录】此方得人参以回其阴阳，得附子以祛其寒逆，加枣仁以安心，则心定而躁可去，躁可定而脉自出矣。死中求生，其在斯方乎！

23260 生生膏

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】生大黄六两 当归 丹皮 白芍 玄参 白芷 地黄 升麻各四两 肉桂二两大麻油八斤

【用法】煎成膏，东丹收。或纸或布摊。疮疡，贴患处；疟疾，贴颈脊第三骨。

【主治】一切外疡，劳伤内症，三阴疟疾。

【宜忌】忌食一切发物。

【加减】疮疡初起，加上好冰片少许；已溃，加天花粉；将愈，加真川贝；劳伤内症，加真沉香末少许；三阴疟疾，加胡椒七粒（研细）。

23261 生白丸

【方源】《幼幼新书》卷十六引郑愈方。

【组成】白附子（新罗者） 天南星各半两 半夏一两

【用法】上为末，取生姜汁打面糊为丸。每服二十丸至三十丸，生姜汤下。

【主治】小儿痰涎不利，上喘咳嗽。

23262 生瓜散

【方源】《解围元藪》卷四。

【异名】败花散。

【组成】败花果（即小丝瓜花将谢下后采用）

【用法】晒干为末。内服。

【功用】痲阳。

【备考】患痲风病，用以戒色。

23263 生汁汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】当归二两 川芎四钱 通草一钱 柴胡五分 麦冬四钱 白术五钱 甘草三分 熟地一两

【用法】水煎服。

【主治】产妇肝气郁结，两乳胀满作痛，乳汁不通。

23264 生圣散

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】桔梗汤（桔梗 甘草）加黄芩 枳壳 木通

【用法】上为散。每次二钱，水煎服。

【主治】痘出不快，溺赤，咳痰。

23265 生发方

【方源】《外台》卷三十二引《深师方》。

【组成】大黄六分 蔓荆子一升 白芷 防风 附子 芎藭 莽草 辛夷 细辛 椒 当归 黄芩各一两 马鬃膏五合 猪膏三升

【用法】上药煎至白芷色黄，先洗后敷。

【主治】发落。

23266 生发方

【方源】《外台》卷三十二引《广济方》。

【组成】莲子草汁一大升 熊白脂一大合 猪鬃膏一合 生麻油一合 柏白皮（切）三合 山韭根（切）三合 瓦衣（切）三合

【用法】上以铜器煎之，候膏成去滓，收贮。每欲梳头涂之。

【功用】生发、黑发。

23267 生发水

【方源】《吉人集验方》。

【组成】闹羊花不拘多少

【用法】浸酒内三十天。外搽。

【功用】生发。

23268 生发酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】侧柏叶 15 克 芝麻根 31 克 杨柳梗 31 克 墨旱莲 15 克

【用法】上为粗末。以 60% 酒精浸后外用。

【主治】脂溢性脱发。

23269 生发药

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】蔓荆子 青箱子 莲子草各一两 附子二字 头发灰一匙

【用法】上为末。以酒渍，纳瓷器中，封闭经二七日药成，以乌鸡脂和。先以米泔洗发，然后敷之。

【主治】妇人少年发少，因血海弱，则经脉虚竭，不能荣润，故发少而秃，或有纯赤黄者。

23270 生发膏

【方源】《医心方》卷四引魏文帝方。

【组成】黄耆二两 当归二两 独活 芎藭 白芷 芍药 茵草 辛夷 防风 生地 黄 大黄 蛇衔各一两 生薤白半斤 麻油四升 马鬃膏二升（一方加麝香二分）

【用法】上切，微火煎三上三下，白芷黄膏成，去滓。敷头。

【功用】生长发，白黄者令黑。

23271 生发膏

【方源】《外台》卷三十二引《深师方》。

【组成】马鬃膏 驴鬃膏 猪脂 熊脂 狗脂（炼成）各半合 升麻 防风 莽萆各二两 蛭蜋四枚 莽草 白芷各二两

【用法】上以脂煎诸药，三上三下，膏成去滓。收以涂之。

【主治】发秃落。

23272 生发膏

【方源】《外台》卷三十二引《集验方》。

【异名】白屑膏（《普济方》卷四十八）。

【组成】乌喙 莽草 石南草 细辛 皂

莢 续断 泽兰 白术 辛夷 白芷 防风 各二两 柏叶(切)二升 松叶(切)二升 猪脂四升

【用法】上以苦酒浸一宿,以脂煎三上三下。膏成去滓,滤收。沐发了,涂之。

【主治】头风痒,白屑。

23273 生发膏

【方源】《外台》卷三十二引《延年秘录》。

【组成】松叶(切) 莲子草(切) 炼成马鬣膏 枣根皮(切)各一升 韭根(切) 蔓荆子(碎)各三合 竹沥 猪脂各二升 防风 白芷各二两 辛夷仁 吴蓝 升麻 芎蒭 独活 寄生 藿香 沉香 零陵香各一两

【用法】上以枣根煮汁,竹沥等浸一宿,以脂等煎之,候白芷色黄膏成。以涂头发及顶上,日三五度。

【主治】热风冲发,发落。

23274 生发膏

【方源】《千金》卷十三。

【组成】蔓荆子 附子 细辛 续断 皂莢 泽兰 零陵香 防风 杏仁 藿香 白芷各二两 松叶 石南各三两 莽草一两 松膏 马鬣膏 猪脂各二升 熊脂二升

【用法】上咬咀。以清醋三升渍药一宿,明旦以马膏等微火煎三上三下,以白芷色黄膏成。用以泽发。

【主治】头中风痒,白屑。

23275 生发膏

【方源】《千金》卷十三。

【组成】丁香 甘松香 零陵香 吴藿香 细辛 蜀椒各二两 白芷 泽兰 大麻子 桑白皮 桑寄生 牡荆子 苜蓿 辛夷仁 杏仁 芎蒭 防风 莽草各一两 胡麻油一升 竹叶 松叶 柏叶各半升 腊猪膏一升 乌鸡肪 雁肪各一合

【用法】上咬咀,以醋渍一宿,纳油膏中微火煎三上三下,白芷色黄膏成,去滓。涂头上,日二夜一。

【功用】生发。

【备考】本方方名,《普济方》卷四十八引作“甘松膏”。

23276 生发膏

【方源】《外台》卷三十二引《广济方》。

【组成】细辛 防风 续断 芎蒭 皂莢 柏叶 辛夷仁各一两八铢 寄生二两九铢 泽兰 零陵香各二两十六铢 蔓荆子四两 桑根汁一升 韭根汁三合三勺 竹叶(切)六合 松叶(切)六升 乌麻油四大升 白芷六两十六铢

【用法】上以苦酒、韭根汁渍一宿,以绵裹煎,微火三上三下,白芷色黄去滓,滤以器盛之。用涂摩头发,日三二度。

【功用】生发。

23277 生发膏

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】莽草一两 防风 升麻 白芷各二两 莽苳二两 蛭螭四个 驴鬣膏 豹膏(一作狗膏) 马鬣膏 熊膏(一作雄鹑膏) 猪膏

【用法】上以诸膏成煎各半升,合煎诸药,沸则下,停冷复上火,三五沸止,滤去滓。敷头,择当用之。

【主治】发鬓秃落。

23278 生发膏

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】妇人梳下油头发一两半 油二两 丹一两 轻粉三钱

【用法】取头发与油,熬发稀烂,去滓,滴水中成珠不散,下丹,冷定,下轻粉,瓷器内放之。外涂。

【主治】发背,脑疽,疔疮。

23279 生发膏

【方源】《续名家方选》

【组成】生地黄 附子 山椒各五钱 白蜡五钱

【用法】上以麻油浓煎如膏。涂发。

【主治】秃发。

23280 生地汤

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】生地三钱半 犀角一钱 大黄二钱 桃仁三个

【用法】用水酒四盏，煎至二盏，入生漆一钱半，再煎至一盏即住，去滓服之。半日血不下，再一服，血下即止。

【主治】蓄血，脐腹小肿大痛。

23281 生地汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】玄参 当归 生地黄 黄芩 陈皮 甘草 薄荷 柴胡

【用法】水煎服。

【主治】小儿气壮，面红火盛，作头晕者。

23282 生地汤

【方源】《伤科汇纂》卷八。

【组成】生地黄八两 柏叶一把 黄芩 阿胶(炙) 甘草(炙)各一两

【用法】上吹咀。以水七升，先煮四味，去滓，取汁三升，纳胶，煮取二升，分四服服之。

【主治】伤损小便出血。

23283 生地饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】生地三钱 犀角三分 白芍 知母 天冬 麦冬各二钱 黄芩八分 桔梗八分 当归二钱 紫菀钱半 甘草四分

【主治】妊娠子嗽，咳嗽吐血不止。

【加减】喘，加瓜蒌一钱。

23284 生地酒

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】生地(酒炒)二两 砂仁五钱

【用法】水、酒各一碗，煎至一碗，入童便一盞，和匀，分二次服。

【主治】妊娠胎将坠欲死。

23285 生地散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】生地五两 当归三两 生姜一两(炮黑)

【用法】上为散。每用三五钱，童便煎，去

滓服。

【主治】产后血露去多，腹中疔痛，脉数虚者。

【方论选录】产后去血过多，腹中疔痛，是血虚不能滋荣血室，故腹痛不止焉。生地凉血以滋血室；当归养血以荣经脉；生姜炮黑，暖胃气以摄下行之血也。为散，童便调下，使血不妄行，则经脉完复，而腹中疔痛自止，何患血露之去多不止哉。

23286 生地粥

《病机沙篆》。为《圣惠》卷九十七“地黄粥”之异名。见该条。

23287 生地膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】细生地四两 白蜡一两五钱 麻油八两

【用法】将生地入油熬枯，沥净渣，熬至滴水成珠，离火入蜡，溶化和匀。

【功用】生肌长肉。

23288 生肉方

【方源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】腊月猪脂 松脂(煮过，收水上白者) 黄蜡(煮过，收净洁者)各二两 清麻油五六两

【用法】慢火熬成膏。先将温水洗去旧药，拭干，用纸剪一大围子，涂药于上，盖疮上。如痒，不得动，此生肉故也。一日一次换药。

【主治】痈疽发背溃后不敛。

【宜忌】切戒毒物。

23289 生肉膏

【方源】《外台》卷二十三(注文)引《肘后方》。

【组成】楝白皮 鼠肉各二两 薤白三两 当归四两 生地黄五两 腊月猪脂三升

【用法】煎膏成。敷疮孔上。

【功用】生肉。

【主治】瘰疬。

23290 生肉膏

【方源】《外台》卷二十三引《深师方》。

【组成】真当归 附子(炮) 甘草 白芷

芎藭各一两 薤白一两 生地黄三两

【用法】上咬咀，以猪膏三升半合煎白芷色黄，去滓。稍以敷疮上，日三。

【主治】痈瘤溃漏，及金疮百疮。

【方论选录】《千金方衍义》：生肉须用和血，芎、归、地黄为之必需；血不温则肉不生，故又须附子协助浮长之功；佐以白芷解毒生肌，薤白散滞消肿，甘草为解毒生肌之首药也。

23291 生肉膏

【方源】《鬼遗》卷二。

【异名】生肉黄耆膏（原书卷五）。

【组成】黄耆 细辛 生地黄 蜀椒（去目汗闭口） 当归 芍药 薤白 芎藭 独活 苁蓉 白芷 丹参 黄芩 甘草各一两 腊月猪脂二斤半

【用法】上咬咀，以苦酒一升，合渍诸药，夏一夜、冬二夜浸，以微火煎三上下，候苦酒气尽，成膏用之。

【主治】金疮，痈疽。

23292 生肉膏

《鬼遗》卷四。为原书卷二“生肌膏”之异名。见该条。

23293 生肉膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】丹参 防风 白芷 细辛 芎藭 黄芩 芍药 甘草（炙） 黄耆 牛膝 槐子 独活 当归

【用法】上切，以腊月脂五升，微火煎三上下，白芷黄耆成。病上摩，向火，日三四。

【主治】发背发乳，口已合，皮上急痛。

23294 生肉膏

【方源】《外台》卷二十三引《鬼遗》。

【组成】桑薪灰三升

【用法】水四升，淋之，复重淋之，取三升石灰，熬令黄，纳灰汁中，以两重帛裹绞去滓，更鱼目煎，取二升，勿用急火煎。随瘰孔深浅，初时作服散而愈，孔若深四寸，新药与孔裹薤白使濡，安药薤白，入药孔裹。若

深四寸，随瘰根而灸两处，每处与四十壮，唯勿灸瘰孔，随深浅去脓。散与膏安着疮孔裹十五过，少迁延日月取愈，肉满脓亦断。

【主治】瘰。

23295 生肉膏

【方源】《医心方》卷十五引《古今录验》。

【组成】苘草二两 生地黄五两 当归二两 续断一两 黄芩二两 甘草二两 薤白二两 猪膏一升 大黄四两

【用法】上咬咀，煎三上三下，膏成敷之。

【主治】痈疽。

23296 生肉膏

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】生地黄一斤，辛夷二两 独活 当归 大黄 黄耆 芎藭 白芷 芍药 黄芩 续断各一两 薤白五两

【用法】上咬咀，以腊月猪脂四升，煎至白芷黄，去滓。外敷。

【主治】痈疽、发背溃后。

23297 生肉膏

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】甘草 当归 白芷 苁蓉 蜀椒 细辛各二两 乌喙六分（生用） 蛇衔一两 薤白二十茎 干地黄三两

【用法】上咬咀，以醋半升，渍一宿，猪膏二斤煎令沸，三上三下膏成。涂之。

【主治】痈疽、发背溃后。

23298 生朱丹

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】白附子（炮制，去皮脐）半斤 石膏（烧通红，放冷）半斤 龙脑一字 朱砂一两二钱半（为衣）

【用法】上前三味为细末。烧粟米饭为丸，如小豆大，朱砂为衣。每服三十丸，食后茶、酒任下。

【功用】清神爽气。

【主治】诸风痰甚，头痛目眩，旋晕欲倒，肺气郁滞，胸膈不利，呕啰恶心，恍惚健忘，颈项强直，偏正头痛，面目浮肿，筋脉拘急，

涕唾稠粘，咽喉不利。

23299 生朱膏

【方源】《普济方》卷三七五引《医方集要》。

【组成】天麻一分 朱砂二钱 僵蚕 白附子（煨） 全蝎二十一个 黑附子一钱（炮） 麝香半字 蜈蚣一条（酒浸） 南星一钱半（煨） 花蛇（酒浸，炙干）各二钱

【用法】上为末，和匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，用金银薄荷汤化下。

【主治】急慢惊风。

23300 生血丹

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】鹿角胶 白茯苓（去皮） 干山药 各一两半 柏子（别研） 牡丹皮 菟丝子（洗净，酒浸三日，研烂成饼） 枸杞子 五味子 人参（去芦） 牛膝（去芦，酒浸三日） 远志（去心）各一两 当归（去芦，酒浸） 肉苁蓉（酒浸三日）各一两一分 生干地黄（洗） 熟干地黄（洗）各四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十九，空心、食前温酒、盐汤任下。

【主治】血少气涩，肌肉不荣，脚膝无力，眼目多昏等疾。

23301 生血汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】归身 熟地各三钱 川芎 白芍 各一钱 红花 泽兰各八分 木香三分

【用法】水煎服。

【主治】血虚经水少。

23302 生血汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】玉竹一两 当归 熟地各半两 茯苓 白芥子各五钱 山药四钱

【用法】水煎，姜汁、竹沥冲服。

【主治】中风后左半身不遂。

23303 生肌丸

【方源】《玉案》卷六。

【组成】黄蜡一斤 乳香（研细） 没药（研细） 血竭各二两（研细） 象牙末四两

【用法】先用蜡熔化，再入乳、没等药和匀，投入水中，众手为丸，如绿豆大。每服百丸，一日二服。

【功用】长肉收功。

【主治】一切发背疽毒；悬痈不能收口。

23304 生肌方

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】鸡内金（阴干） 槟榔（锉） 木香 黄连（去须）各等分

【用法】上为末。贴之，取愈为度。

【主治】疮口不合，及治金疮。

23305 生肌方

【方源】《医方易简》卷十。

【组成】田七三钱 红花 黄柏 儿茶各二钱 血竭四钱 乳香 没药 川连各五分 归尾二钱 桃仁二钱（去皮） 象胆五分 元麝三分 珍珠四分 冰片三分

【用法】上为细末。另取茶油十二两，山大刀叶（略晒）约半斤，煮焦去滓，滴水成珠，再下黄蜡三两，化溶后，下前药末，或稀，少加黄丹搅至合式。油纸开贴，贴一日。若有脓，揭起，用葱头煲酒洗净药膏及伤口，再贴，数日一换。

【主治】刀、石、木等伤、各症流血，经用药已止，但未长肉芽者。

23306 生肌药

《传信适用方》卷三。为《三因》卷十四“生肌散”之异名。见该条。

23307 生肌药

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】石膏（煨） 虢丹 当归（去芦）各一两二钱 乳香半两（别研）

【用法】上为细末。用麻油调，涂疮口，外以揭毒膏贴之，一日一换。

【功用】生新肉，去恶肉脓毒，渐令口合。

23308 生肌药

【方源】《回春》卷四。

【组成】乳香 没药 轻粉 海螵蛸（用三黄汤煮过） 寒水石（煨） 龙骨（煨）各等分

【用法】上为细末。搽患处。上用太平膏。

【主治】痔漏。

23309 生肌药

【方源】《虺后方》。

【组成】黄蜂巢一两 鱼胶四两

【用法】上锉碎，炒黑为度，研细末，放地上一宿，退去火毒，次日取出，加冰片五厘和匀。疮口每用猪蹄汤洗净，拭干，方上药，以填满为佳。

【主治】发背痈疽，黑败之肉已去，遂生新肉者。

23310 生肌药

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】珍珠 象牙 龙骨 儿茶 花蕊石 血竭各一钱 轻粉 白芷 白蔹 朱砂各五分 冰片三分

【用法】上为末。饭为条，阴干收用。不可加減。

【功用】收口。

【主治】漏疮。

23311 生肌药

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】生嫩松香（不拘多少，量加金毛狗同研细末）一两 真瓜儿血竭（研细末）一钱 乳香（研细末）三钱

【用法】上为细末，瓷瓶贮。凡用时加天鹅绒（不研碎者）一层于药上，包扎。如无天鹅绒，则用金毛狗毛代之。此药可常用，冬天二三日一换。如新肉难生者，更上玉红膏，无不愈矣。

【主治】刎伤，内管已实者。

23312 生肌饼

【方源】《医方类聚》卷一八五引《吴氏集验方》。

【组成】风化石灰六两 雄黄二两

【用法】上为细末，却以莴苣自然汁拌和作饼子，阴晾干。

【主治】金疮。

23313 生肌散

【方源】《外台》卷二十九引《古今录验》。

【组成】甘草一斤（炙） 黄柏八两 当归四两

【用法】上为末。以封疮上，日再。

【主治】金疮。

23314 生肌散

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】白术一升（淘四十九遍） 旧皮巾子一只

【用法】上药入瓷瓶子内，泥固头，以大火烧为灰，候冷，细研为末。日二三上贴之。

【主治】一切恶毒疮疼痛。

【备考】方中白术，《普济方》作“白米”。

23315 生肌散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】麝盐一分 黄丹半两 黄柏一分（锉） 白矾一分（以上三味，以瓷瓶盛，大火烧令通赤，细研） 白蔹一分 腻粉一分

【用法】上为细散，都研令匀。每用时先以温盐浆水洗疮令净，拭干，看疮口大小贴，日二度用之。

【主治】小儿瘰癧成疮，有脓水。

23316 生肌散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】秦艽（净洗，焙干）

【用法】上为细末。贴之。

【功用】生肌。

【主治】一切疮口，气冷不合。

23317 生肌散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】黄蜀葵花（焙干）半两 乳香（研）一分 不灰木一两 白蔹一分

【用法】上为散。先用温甘草水洗过疮，干，搽疮上，一日三次。

【功用】生肌肉，止疼痛，化脓消肿。

【主治】一切疮。

23318 生肌散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】墙上多年白蛭壳（火煨通赤，去火候冷，研） 无名异（为末） 密陀僧（火煨过）各一钱

【用法】上三味，更入麝香少许，同研令匀细。每用少许，掺疮口上。

【主治】诸恶疮，疮口生肉颇迟者。

23319 生肌散

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】白矾（烧令汁尽）一两 黄连末一分 轻粉一钱

【用法】上为细末。不拘多少，掺疮口上。候生肉满，脓水尽，疮口干即止。

【功用】生肌收口。

【主治】痈疽，恶物尽而不收口者。

【备考】方中轻粉一钱，《普济方》作“一分”。

23320 生肌散

【方源】《三因》卷十四。

【异名】生肌药（《传信适用方》卷三）。

【组成】黄狗头骨（烧存性）二两 腻粉一钱 桑白皮（炙）一两

【用法】上为末。生麻油调敷。

【功用】生肌。

【主治】①《三因》：痈疽疮毒。②《传信适用方》：痈疽脓已出者。

23321 生肌散

《传信适用方》卷三引李温如方。为《圣济总录》卷一三二“木香散”之异名。见该条。

23322 生肌散

【方源】《普济方》卷二三六引《卫生家宝》。

【组成】黄耆一两 当归三分 荆芥穗半两 白芍药一两 甘草半两 地骨皮一两 川芎半两 人参半两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盂半，乌梅一个，煎至一盂，去滓服。

【功用】退里外潮热。

【主治】骨蒸。

23323 生肌散

【方源】《伤寒标本》卷下。

【组成】龙骨（火煨） 赤石脂（火煨）各半两 乳香 没药 海螵蛸 轻粉 全蝎（洗，焙干）各一钱 血竭二钱 黄丹一钱

【用法】上为末。待疮头落尽，此药填满在疮口上，以膏药贴之。一日甘草汤洗二次，膏药一二日一换。

【主治】疮头落尽后。

23324 生肌散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】黄连生肌散（《医林纂要》卷十）。

【组成】黄连三钱 密陀僧半两 干胭脂二钱 雄黄一钱 绿豆粉二钱 轻粉一钱

【用法】上为细末。以温浆水洗净，用无垢软帛搥净，药贴之。

【主治】①《儒门事亲》：犬咬蛇伤，经导泻后，疮口痛减肿消者。②《医方集解》：疮口不敛。

【宜忌】《医方集解》：疮初起者禁之。

【临证举例】麻先生兄村行为犬所啮，舁至家，胫肿如罐，坚若铁石，毒气入里，呕不下食，头痛而重。往问戴人，女僮曰：痛随利减。以槟榔丸下之，见两行，不瘥。适戴人自舞阳回，谓麻曰：胫肿如此，足之三阴三阳可行乎？麻曰：俱不可行。如是，何不夫下之？乃命夜临卧服舟车丸百五十粒，通经散三四钱，比至夜半，去十四行，肿立消，作胡桃纹，反细于不伤之胫。戴人曰：慎勿贴膏纸，当令毒气出，流脓血水常行。又一日，戴人恐毒气未尽，又服舟车丸百余粒，浚川散三四钱，见六行。病人曰：十四行易，当六行反难，何也？戴人曰：病盛则胜药，病衰则不胜其药也。六日其脓水尽。戴人曰：脓水行时不畏风，尽后畏风也。乃以愈风饼子，日三服之。又二日方与生肌散，一敷之而成痂。

23325 生肌散

【方源】《活法机要》。

【组成】寒水石（镑） 滑石各一两 乌鱼骨 龙骨各一两 定粉 密陀僧 白矾灰 干胭脂各半两

【用法】上为极细末。干掺用之。

【功用】①《外科精义》：敛疮。②《医方集解》：敛疮长肉。

【主治】《医方集解》：疮口不敛。

【宜忌】《医方集解》：疮初起者禁之。

【方论选录】《医方集解》：此阳明药也。疮口不敛，盖因脓水散溢而溃烂也。石膏（亦名寒水石。李时珍曰：唐宋诸方寒水石即石膏）、滑石解肌热，龙骨、枯矾善收湿，胭脂活血解毒，蟾蜍、陀僧、定粉收湿燥脓。故能敛疮而生肉也。

23326 生肌散

【方源】《济生》卷八。

【组成】寒水石二钱 黄丹半钱 龙骨七钱 轻粉一钱

【用法】上为细末。干敷，上贴以乳香膏。

【主治】凡痈疽、疔漏、恶疮，脓水欲尽者。

23327 生肌散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】老狗头生脑骨（截碎，新瓦煨透）二两 桑白皮（新者）一两 当归二钱半

【用法】上为细末。麻油调敷，疮深则掺，伞纸护之。

【主治】痈疽、疮疡溃后。

23328 生肌散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【异名】敛肌散（《医学入门》卷六）。

【组成】真地骨皮 五倍子 甘草（各生）黄柏（炙） 黄连（炒）

【用法】上为细末。干掺疮上，以粗末用沸汤泡，蘸洗干处，津液调敷。

【功用】《医学入门》：收水凉肌解毒。

【主治】疮疡已溃，热毒未清，疮口不敛，脓血不止者。

①《活幼口议》：小儿脚肿生疮及诸疮口不合者。②《疮疡经验全书》：疳蚀不敛并痘后脓血等疮。③《医学入门》：痘后肥疮，疳疮，癣疥。④《疡医大全》：痧痘，口疮臭烂。

【备考】按：《慈幼新书》有五味子、枯矾。

23329 生肌散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】没药 黄丹（水飞过用） 赤菝

枯白矾 黄柏 乳香各一钱 白胶香二钱 麝香二钱半

【用法】上为细末。先煎葱白盐汤将疮口洗净，搦干，敷药末于疮口上。

【主治】疮口不合。

23330 生肌散

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】白矾（枯） 槟榔各一两 密陀僧一钱半 黄丹 血竭各一钱 轻粉半钱

【用法】上药各为极细末。贴疮口，看轻重选用之。

【功用】生肌长肉。

【主治】《明医指掌》：内疳疮出脓后；下疳瘡已破。

【宜忌】《医方集解》：疮初起者禁之。

【方论选录】《医林纂要》：此以解余毒去瘀为主，而兼燥湿生新之意。

23331 生肌散

【方源】《普济方》卷六十九。

【组成】枯白矾 白鲜皮 黄柏 白芷各等分

【用法】上为末。先服如意汤半，上此药。

【主治】骨槽风，走马牙疳及金疮。

23332 生肌散

《普济方》卷二八九。为《圣惠》卷六十二“托里生肌散”之异名。见该条。

23333 生肌散

【方源】《普济方》卷二九一。

【组成】白石灰二钱半 生白矾三钱（烧）黄丹一钱（研） 龙骨二钱（煨） 轻粉半钱（研） 麝香二分（研）

【用法】上为末。每日二次，干掺在疮口上。

【主治】瘰癧。

23334 生肌散

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】白矾（飞过，在地上一宿） 白胶香（别研） 韶粉各一两 腻粉一钱

【用法】上为细末。麻油调涂疮上。或热毒盛，再生一二番，亦如此涂之。

【主治】小儿头上疮。

23335 生肌散

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】寒水石(煨)一钱 龙骨(煨)五钱 干胭脂二分 轻粉一分

【用法】上为末。干贴。

【主治】痔漏等疮去尽败肉后。

【加减】疮嫩，寒水石、干胭脂加龙骨；疮老，止依方。

23336 生肌散

【方源】《痢疽验方》。

【异名】神效生肌散(《梅氏验方新编》卷六)。

【组成】木香二钱 黄丹 枯矾各五钱 轻粉二钱

【用法】上药各为细末。用猪胆汁拌匀，晒干，再研细，掺患处。

【功用】解毒，去腐，搜脓。

【主治】①《痢疽验方》：疮口不合。②《杂病源流犀烛》：伤寒狐惑，上唇生疮或下唇生疮；内疳疮脓出者。

【方论选录】薛己按：此方乃解毒去腐搜脓之剂，非竟自生肌药也，盖毒尽则肉自生。常见患者往往用龙骨、血竭之类以求生肌，殊不知余毒未尽，肌肉何以得生，反增溃烂耳。若此方诚有见也。

23337 生肌散

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】乳香 血竭各五钱 没药四钱 全蝎十个(炒) 轻粉 朱砂 黄丹(生用) 海螵蛸(去壳，煨存性)各三钱 龙骨二两(火煨红，好酒淬五次) 明矾二钱半 凤凰退二钱(煨) 赤石脂一两半(火煨，好酒淬七次)

【用法】上为细末。待疮洗净上之。

【主治】痔漏。

23338 生肌散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】乳香 没药(俱瓦上焙，去油) 血竭 黄丹(炒，水飞) 轻粉各五分 赤石

脂(煨) 龙骨各一两 螵蛸二钱 枯矾一钱 麝香一分

【用法】上为极细末。掺在生肌膏药上贴之。

【主治】痘毒难收口者。

23339 生肌散

【方源】《跌损妙方》。

【组成】五倍子 炉甘石 儿茶 龙脷皮各等分

【用法】上为末。瓷器贮用。

【主治】刀伤成疮，脓水难干，肌肉不生。

【备考】《跌损妙方校释》：方中龙脷皮，疑为芦荟。

23340 生肌散

【方源】《跌损妙方》。

【组成】乳香 没药 血竭 雄黄 蒲黄 梧子 赤石脂 白芷 朴消 寒水石 陀僧 龙骨 轻粉 花蕊石 山甲 螃蟹粉 硼砂 蟾酥各五钱 朱砂 乌药各三钱

【用法】共为末。每膏一张各下数分，贴患处。若脓疮、疔症，贴背心即安。

【主治】跌打损伤，脓疮，疔症。

【加减】若脓疮、疔症，再入麝香二三分。

【备考】《跌损妙方校释》：此散外治感染创口，有排脓解毒，生肌收口之效，适用于创伤感染创口中后期，以及外科溃疡创口，慢性骨髓炎等。

23341 生肌散

【方源】《扶寿精方》。

【组成】蛤粉一两 象皮三钱 海螵蛸 孩儿茶各一钱 珍珠三钱(入红干锅内碎之) 寒水石(火煨)一钱

【用法】上为细末。擦患处。

【主治】疮疡。

【加减】痛加乳香、没药。

23342 生肌散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】赤石脂 海螵蛸 龙骨各一钱 乳香 没药 血竭各二钱 轻粉一钱 朱砂

郁金 黄丹(飞过) 黄连 白芷各五钱

【用法】上为细末。搽疮口上,用灯心数茎,却用膏药贴之。

【功用】敛口生肉。

【主治】①《丹溪心法附余》:痈疽疮毒。②《便览》:一切痈疽恶疮溃后。

23343 生肌散

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】五倍子(为咀,炒黄色)二两 白矾(飞过)五分 没药 乳香 孩儿茶各一钱

【用法】上为细末。每次用管吹入漏疮口内。

【主治】痔漏。

23344 生肌散

【方源】《医统》卷七十四。

【组成】龙骨一两(火煨) 诃子(炮,取肉)二钱

【用法】上为细末,加轻粉三钱,和匀。先洗疮拭干,敷上,一日二次。

【主治】痔漏。

23345 生肌散

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】花蕊石(醋煨)二钱 孩儿茶二钱 鸡内金二钱 飞丹(煨,水飞)一钱 乳香一钱 血竭二钱 红绒灰一钱 黄连一钱

【用法】上为细末。加冰片一分,干掺。

【主治】茧唇烙后。

23346 生肌散

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】龙骨(煨) 海螵蛸 赤石脂各一钱 乳香 没药 血竭 轻粉 雄黄各五分 小鼠(未出毛)二枚(炙干)

【用法】上药各为细末。临用加冰片少许。

【主治】痔漏,痔根脱落后。

23347 生肌散

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【异名】生肌膏(《痘麻紺珠》卷十八)。

【组成】白芷一钱 白龙骨五分 贝母二钱 赤石脂一钱 白及一钱

【用法】上为末。敷之。

【主治】痘后成痂,脓已去者。

23348 生肌散

【方源】《便览》卷四。

【组成】白龙骨(煨) 白蔹 乳香 没药

【用法】上为极细末。掺之。粗则反痛。

【功用】收疮口。

【主治】痈疽。

23349 生肌散

【方源】《便览》卷四。

【异名】渗湿生肌散(《仙拈集》卷四)。

【组成】寒水石(煨)一两(为末)

【用法】洗净疮,敷药。

【功用】《仙拈集》:生肌。

【主治】湿热烂疮,并刀斧伤疮。

【加减】加黄丹二钱,名桃花散;加龙骨、儿茶各一钱,名红玉生肌散。

23350 生肌散

【方源】《便览》卷四。

【组成】乳香一钱 血竭五分 轻粉一钱 寒水石(煨)三钱 没药一钱 海螵蛸五分 龙骨六分 儿茶六分 黄丹一钱半 赤石脂(煨)一钱半

【用法】上为极细末。每上药,净末一两,煨天灵盖末一两同研,洗疮,外敷。

【主治】烂疮不收口,并刀斧伤出血不止。

23351 生肌散

【方源】《回春》卷八。

【组成】乳香 没药 孩儿茶各等分

【用法】上为细末。先用防风、荆芥、苦参各等分煎水洗后,掺药。

【功用】止痛生肌。

【主治】杖疮溃烂久不愈者。

23352 生肌散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】象皮二钱 白蜡二钱 乳香一钱 赤石脂四钱(煨) 血竭二钱 龙骨二钱(煨) 没药一钱 白石脂二钱(煨) 冰片少许 轻粉二钱 土鳖虫二钱

【用法】上为末。掺之。

【主治】痘疮。

23353 生肌散

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】乳香 没药 黄丹各一两(澄) 赤石脂二两(火煨) 轻粉二钱 龙骨(火煨) 熊胆各四钱 冰片一钱 血竭二钱 麝香一钱 孩儿茶二钱 海螵蛸五钱(水煮)

【用法】上为细末。消毒饮每日洗三次，上药三次，十日内全愈。

【功用】生肌长肉。

【主治】①《增补内经拾遗》：痔瘕用黑痔丹后，痔四下根开裂者。②《外科正宗》：痔上枯药之后脱落，孔窍不收者。

【备考】《外科正宗》有珍珠，无孩儿茶。

23354 生肌散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】轻粉 乳香 没药各一钱 黄丹二钱(微炒) 赤石脂五钱 寒水石三钱(煨)

【用法】上为末。湿则干搽，干则油调，将旧棉花托一二分药入窟内。过夜即愈。或捣饭内塞之。

【主治】齿窟疮。

23355 生肌散

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】水红花叶

【用法】上为细末。先用水红花根锉碎，煎汤，洗净，却用叶末撒疮上，每日洗一次，撒一次。

【主治】肿疡。

23356 生肌散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】石膏 轻粉 赤石脂各一两 黄丹(飞)二钱 龙骨 血竭 乳香 潮脑各三钱

【用法】上为细末。先用甘草、当归、白芷各一钱煎汤，洗净患上，用此干搽，软油纸盖扎，二日一洗一换。

【功用】《中成药研究》：解毒定痛，生肌敛疮。

【主治】①《外科正宗》：腐骨脱出，肌肉生迟，不能收敛者。②《中成药研究》：一般痈疽疮疡溃后，腐肉已脱，脓水将尽；乳房疾患：如内外吹乳痈、乳发、乳疽、乳痰溃后，脓水将尽，乳漏；肛门疾患：如肛周脓肿溃后脓尽，肛裂；冻疮脓腐将尽，以及某些外科疾患术后，伤口愈合迟缓者。

【方论选录】《中成药研究》(1986; 2: 31): 本方石膏可清凉防腐，生肌敛疮。药理实验表明，石膏局部涂敷，可减少分泌物渗出，防止感染，促进愈合；轻粉外用有明显杀菌作用；赤石脂善收湿排脓，敛疮长肉。三者为主，可使余毒得解，脓尽腐脱，肌肉生长，则疮口愈合。又黄丹是疡科常用的解毒生肌定痛药，与轻粉合用，解毒去腐生新之力尤著。龙骨与石膏、赤石脂相伍，生肌敛疮之力倍增。血竭可散瘀定痛，生肌长肉。乳香是活血定痛追毒之良药，与血竭相合，使血行流畅，则疼痛可止，血活肉长，则疮口可敛。至于樟脑，性走而不守，能杀虫防腐，通窍止痛。现代药理研究表明，樟脑具有某些镇痛止痒和温和的防腐作用。因本方生肌收口而不敛邪，防腐行血有利生肌，所以为外科常用的生肌收口药。

【临证举例】一女人，左口上牙根突肿如栗，坚硬如石，不痛，此多骨疽也，药亦不效。后三年始痛，破流臭脓，后出多骨，形如小鳖，肿仍不退，此骨未尽，稍久又出小骨二块，枯色棱棱，其肿方退。以四君子汤加升麻、陈皮，外以甘草煎汤漱口，生肌散日搽三次而收敛。

23357 生肌散

【方源】《外科百效》卷三。

【组成】嫩老鼠子一个(焙干存性) 鸡内金三钱 乳香 没药各一钱 儿茶三钱 轻粉一钱 甘石(火煨过)三钱 雄黄一钱 破丝网巾(烧灰)二钱 血竭一钱 孩儿骨

(烧灰存性)一钱 陀僧(火煨,水飞)一钱
黄柏末一钱 大黄末一钱

【用法】上为细末。一日一次,洗换新药。

【功用】除根脱体,生肌复旧。

【主治】痔疮,痔根已脱落者。

23358 生肌散

《济阳纲目》卷八十八。为《疮疡经验全书》卷四“海浮散”之异名。见该条。

23359 生肌散

【方源】《济阳纲目》卷九十五。

【组成】黄狗头骨 乱发 川山甲各等分(烧灰)

【用法】上为末。干撒患处。如干则用津唾调敷。

【主治】痔疮久不合。

23360 生肌散

【方源】《虺后方》。

【组成】血竭 儿茶 乳香 没药 出过鸡的蛋壳

【用法】上为末。搽之。

【主治】血箭疮。

23361 生肌散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】赤石脂 伏龙肝 轻粉 黄柏 血竭 杭粉各一钱 黄丹 发灰 乳香 没药各五分 冰片三分 密陀僧一钱五分

【用法】上为末。掺上。

【主治】痘腐后,疔溃成坑,内见筋骨者。

【加减】如有臭气,加阿魏三分。

23362 生肌散

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】人参 龙骨 赤石脂 乳香 没药 血竭 轻粉各二钱 贝母三钱 珍珠一钱 冰片一钱 (一加白蜡二钱)

【用法】上为末,罐收听用。

【功用】生肌。

【主治】跌扑、中毒、瘰癧等症已破腐尽者。

23363 生肌散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】盘鸡(煨存性)一钱 血竭 儿茶

各五分 冰片一分

【用法】上为末。吹入漏孔内。

【功用】收口。

【主治】痔漏用内消退管丸后,毒将尽,肉长管出者。

23364 生肌散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】炉甘石一两(煨,入三黄汤内七次) 木香 降香 乳香 没药 血竭 儿茶 黄柏 黄连 白芷 白藜各五钱 龙骨三钱 冰片一钱 麝香三分 赤石脂一两(煨) 黄丹一两(飞七次) 海螵蛸(汤泡,去皮)五钱

【用法】上为末用。

【功用】长肉收口。

23365 生肌散

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参一钱 三七根末三钱 轻粉五分 麒麟血竭三钱 象皮一钱 乳香(去油)一钱 没药一钱 千年石灰三钱 广木香末一钱 冰片三分 儿茶二钱

【用法】上药各为极细末,研至无声为度。外敷。

【功用】《串雅内编选注》:解毒防腐,行气活血,散瘀止痛,止血生肌。

【主治】瘰癧手术后疮口未合,溃疡久不收口。

①《石室秘录》:物瘤已用刀破者;顽癣已用刀削去其皮者。②《华佗神医秘传》:瘰癧已用小刀割破,略出白水者;粉瘤已切开挤尽其粉浆者;发瘤用针刺破,已挤尽粉发者。③《中医外科常用外用方选》:溃疡久不收口,兼治术后创面。

【方论选录】《串雅内编选注》:人参益气,木香行气,二药合用皆可止痛,促进创口早期愈合;三七根为血中之圣药,既行瘀止血,又能消肿定痛;轻粉、石灰除热消毒,去瘀生新;象皮、儿茶收湿泻热,生肌长肉;乳香、没药、血竭行气活血,散瘀止痛。诸药

合用,有解毒防腐,行气活血,散瘀止痛,止血生肌之效。

【备考】《中医外科常用外用方选》:方中象皮应经过炮制后研末;千年石灰系指石灰之陈久者,而新出窑石灰性太燥烈,不宜用。

23366 生肌散

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】真轻粉一两 铅粉一两(炒黄) 冰片二分 辰砂四分(水飞) 珍珠一钱

【用法】上为末,瓷瓶收贮。

【功用】生肌。

【主治】诸疮。

23367 生肌散

【方源】方出《冯氏锦囊·外科》卷十九,名见《疡医大全》卷九。

【组成】珍珠二分(生研极细) 乳香(簪上炙燥)五分 没药五分 铅粉五分 瓜儿血竭五分 直扫盆轻粉四分 儿茶三分 上白蜡一钱 大冰片二分 象皮一钱(切小块,瓦条细灰拌炒成珠)

【用法】上为极细末。先用浓茶或猪蹄汤洗净,以少许掺之。

【功用】生肌长肉。

【主治】痈疽。

23368 生肌散

【方源】《良朋汇集》卷五引刘士琦方。

【组成】乳香(去油) 没药(去油) 血竭各一钱 象皮少许 儿茶一钱 珍珠五分 冰片二分 龙骨五分

【用法】上为细末。瓷罐收贮,黄蜡塞口,恣用。

【主治】破伤。

23369 生肌散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】桑叶

【用法】上用醋煮一滚,捞起。贴疮上。

【功用】生肌收口。

【主治】《惠直堂方》:久远疮口不收。

23370 生肌散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】桑木灰七钱 石灰五钱

【用法】用水煎,洗患处。

【功用】去毒化腐生肌。

【主治】疔角,疮疡,核瘤,鼻痔,鼠疮。杨梅结毒成癰点、猴子。

23371 生肌散

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】猫犬头骨

【用法】烧灰,研末。上患处。

【主治】疮久不收口。

23372 生肌散

【方源】《灵药秘方》卷上。

【组成】三花聚顶丹四钱 没药 乳香 儿茶(俱去油)各二钱 珍珠一钱 或加冰片、人参

【用法】上为细末。掺疮上。

【功用】去腐生新。

【主治】疮疡。

23373 生肌散

【方源】《医部全录》卷一九四引叶心仰方。

【组成】甘石 龙骨各四两 麝 冰片各五分 象皮 没药各二两 雄黄 朱砂各三钱 轻粉 光粉各五钱 黄丹 黄柏各一两五钱 牡蛎(煨)三两

【用法】上为末。掺患处。

【主治】烂脚。

23374 生肌散

【方源】《吴氏医方类编》卷一。

【异名】消疳生肌散。

【组成】珍珠五分(煨) 海巴 象牙(煨) 乳香(去油) 没药(去油) 龙骨各一钱(煨) 冰片三分 轻粉三分 真红褐子三分(烧灰存性,或旧织锦亦可)

【用法】上为末。搽数次即愈。

【主治】牙疳因素有癖疾,积热上攻,轻为牙癖,重则牙疳。

23375 生肌散

【方源】《吴氏医方类编》卷四。

【组成】细鸡骨炭(叮啷响者,为极细末) 明亮松香(为极细末) 各等分

【用法】用葱汁调和，捣数十下；又加葱汁调和，又捣又晒。如此四五次。

【功用】止血生肌，续筋骨。

【主治】①《吴氏医方类编》：指割断两截者。②《外科证治全书》：刎伤。

【备考】《外科证治全书》本方用法：二末等分和匀。用时亦布天鹅绒一层于药上，包扎，在大半日后喉管将续，则加此药。只上一次。

23376 生肌散

【方源】《种福堂方》卷四。

【异名】海龙粉。

【组成】龙骨 血竭 红粉霜 乳香 没药 海螵蛸 赤石脂各一分 煅石膏二分

【用法】上为细末。敷上。

【功用】《串雅内编选注》：去腐生肌，防腐止痛。

【主治】①《种福堂方》：下疳。②《串雅内编选注》：一切痈疽肿毒，疮疡溃久不易收口之症。

【加减】若要去腐肉，每生肌散一两，配入（白）粉霜三分或五分；如治下疳等，每两配入一二分。

【方论选录】《串雅内编选注》：本方以龙骨、石膏、海螵蛸、赤石脂收湿敛疮，生肌长肉为主。但“腐不尽，不可以言生肌”，所以在生肌群药之中，加入红粉霜去腐，佐以血竭、乳香、没药散瘀止痛。共成去腐生肌、防腐止痛之方。

23377 生肌散

【方源】《疡医大全》卷九。

【组成】人参 西牛黄 珍珠 琥珀 熊胆 乳香（去油） 没药（去油）各二两 炉甘石（煨） 海螵蛸 龙骨 石膏（煨） 轻粉各五钱 杭粉二两

【用法】上为极细末，入冰片五分，再乳干下，瓷瓶密贮。每用少许。

【功用】生肌收口。

23378 生肌散

【方源】《疡医大全》卷九。

【组成】红升丹一钱 血竭 海螵蛸 象皮（焙焦） 黄丹 轻粉各三钱 赤石脂 儿茶 紫河车（煨）各五钱 乳香（去油） 没药（去油）各二钱

【用法】上为极细末。掺上膏贴。

【功用】生肌。

【加减】疮口红热，加珍珠二钱；疮口寒白，加肉桂一钱；疮口虚陷，加人参二钱。

23379 生肌散

《疡医大全》卷九。为《本草纲目》卷四十六引《医方摘要》“白螺散”之异名。见该条。

23380 生肌散

【方源】《疡医大全》卷九。

【组成】轻粉一钱 血竭 儿茶各一钱 自死螺蛳（连泥者）十个（煨）

【用法】上为极细末，加冰片一分收贮。每用少许，用乳汁调搽。三次全愈。

【功用】生肌。

23381 生肌散

【方源】《疡医大全》卷九。

【组成】鲜鹿腿骨（纸包，灰火内煨至黄脆为度，如焦黑则无用矣）

【用法】上为极细末。掺疮上。

【功用】生肌。

【主治】痈疽。

23382 生肌散

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】牡蛎（去粗皮，净）二两 水粉一两五钱

【用法】煮炒干，加生矾三分，又加水粉五钱，生用。共为末，研极细，掺上。或外加冰片少许，麝香亦可。

【功用】生肌。

23383 生肌散

《会约》卷十九。为《疡科选粹》卷八“鲫鱼散”之异名。见该条。

23384 生肌散

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】赤石脂一两（水飞数次再用） 乳

香一两(去尽油) 没药三钱(去尽油) 轻粉二钱五分 硼砂二钱五分 龙骨一两(火煨红, 淬入米醋内, 水飞) 孩儿茶二钱五分 大梅片三分

【用法】上为极细末。每于患处略用少许。

【主治】骨槽风溃后, 骨已退出; 鱼腮风, 日久腮穿出脓者。

23385 生肌散

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】赤石脂 海螵蛸 龙骨各一两 乳香 没药(炙) 枯矾 文蛤(炙) 各五分 白芷 轻粉 血竭 朱砂 象皮(炙) 各一钱(如无象皮, 用真象牙屑二钱代之)

【用法】上为细末。临用时加麝香、冰片少许吹之。

【功用】去腐生新收口。

【主治】缠喉风、骨槽风、单双乳蛾、喉疳、重舌等日久有脓已溃, 疮口不收者。

【宜忌】忌牛、羊肉及一切发物。

【加减】如疮口破烂难于完密者, 加珍珠一钱, 紫金藤二钱。

23386 生肌散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】真珠 琥珀 龙骨 象皮 黄连 冰片 轻粉 儿茶 血竭

【用法】上为细末。瓷瓶收用。

【功用】生肌收敛。

【主治】外伤穿溃烂。

23387 生肌散

【方源】《保婴易知录》卷下。

【组成】人参 黄耆 珍珠粉各等分

【用法】上为细末。时时扑之。

【主治】小儿初生无皮。

23388 生肌散

【方源】《伤科汇纂》卷八。

【组成】密陀僧 桑白皮(新者) 龙骨各四两 黄丹五钱 陈石灰二两 麝香一钱(另研)

【用法】上为细末。干掺之。

【主治】刀镰斧伤。

23389 生肌散

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】炉甘石三钱 白占 轻粉各一钱 冰片三分 坑膩三钱(炙, 或人中白亦可)

【用法】上为末。麻油调搽, 外用油纸盖, 扎紧。

【主治】一切痈疽, 腐肉不尽, 不肯收口。

23390 生肌散

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】龙骨 炉甘石 儿茶各钱半 白占 血竭 乳香 没药各一钱 冰片三分 煨石膏五钱

【用法】上为细末。掺患处, 外用膏贴。

【主治】一切痈疽, 腐肉去尽, 不肯收口。

23391 生肌散

《救伤秘旨续刻》。为原书“外敷生肌散”之异名。见该条。

23392 生肌散

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】上白蜜八钱 香独活 生石膏 大黄各五钱 陈石灰一两

【用法】阴阳瓦焙红, 合细末搽之。

【主治】打破头。

23393 生肌散

《蠢子医》卷四。为《直指·附遗》卷三“秘传止血定痛生肌散”之异名。见该条。

23394 生肌散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】珍珠一钱 瓜儿竭一钱 乳香(簪上烘)一钱 没药(簪上烘)一钱

【用法】上为极细末。先用猪蹄汤, 或浓茶洗净, 用少许掺之。

【功用】敛疮。

【主治】疮口不收, 必有伏毒, 周围皮肤紫黑, 年深日久。

23395 生肌散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】滑石一两 冰片二分 朱砂一钱

【用法】上为末。掺患处。

【功用】长肉收功。

23396 生肌散

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】辰砂二钱 血竭二钱 海螵蛸三钱 川贝三钱 轻粉二钱 冰片五分 龙骨三钱 寒水石五钱（煨）

【用法】上为细末。搽患处。

【功用】生肌收口。

【主治】疮疡。

23397 生肌散

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】赤石脂六两 轻白炉甘石三两（二味用防风、荆芥、黄芩、黄连、黄柏、连翘、银花、羌活、甘草等分，煎浓汤，煨红，淬汁内九次） 嫩石膏三两（冬煨夏生为末，甘草水飞浸） 白龙骨二两（煨，用童便淬七次用） 冰片一钱 粉口儿茶一两 轻粉三两 川连一钱五分

【用法】上为细末。搽患处。

【功用】生肌收口。

【主治】疮疡。

23398 生肌散

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】川文蛤二钱（炒） 乳香（去油）没药各一钱 枯矾五分

【功用】生肌收口。

23399 生肌散

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】煨龙骨 海螵蛸 乳香 没药 象皮（锉末或炙） 血竭 轻粉各一钱 赤石脂二钱 冰片三分 珍珠六分（同腐制，研至无声） 麝香少许

【用法】上为细末用。

【功用】生肌收口。

23400 生肌散

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】儿茶 白龙骨各一钱 轻粉 滑石各五分 冰片五厘

【用法】共为细末用。

【功用】生肌收口。

23401 生肌散

《性病》。为《外科大成》卷一“生肌定痛散”之异名。见该条。

23402 生肌散

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】煨石膏一两 象牙屑四钱 煨龙骨二钱

【用法】水飞为丹。

【功用】生肌。

23403 生肌散

《集成良方三百种》。为《外科方外奇方》卷二“神效生肌散”之异名。见该条。

23404 生肌散

【方源】《外科十三方考》。

【组成】朱砂 乳香 没药 轻粉 石脂 龙骨 白蜡 海螵蛸 川贝 自然铜（煨）各等分

【用法】上为末，收贮。用时每一两中配七仙丹一钱五分，和匀。每用些许，搽于疮口，盖以膏药。遇溃烂者，先用米泔水洗净，然后将此散轻轻拂上，膏药掩之。如久患成漏者，可用膏药捻成条子，蘸此药末，插入漏孔。如毒重不效者，须用前钓羊丹钓去核块，再用此散收功。

【功用】生肌退管。

【主治】痈核出尽后。

23405 生肌散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】象皮生肌散（《中医皮肤病学简编》）。

【组成】象皮（炙）一两 血竭一两 赤石脂（生）一两 乳香（炙）一两 龙骨（煨）一两 冰片三钱 没药（炙）一两 儿茶一两

【用法】上为极细末，过罗，干洒患处。

【功用】《北京市中药成方选集》：生肌止痛。

【主治】疮疖溃后、溃疡，久不收口。烫火伤。

①《北京市中药成方选集》：疮疖溃后，久

不收口。②《赵炳南临床经验集》：慢性顽固性溃疡（顽疮），下肢溃疡（臃疮），放射性溃疡。③《中医皮肤病简编》：烫火伤。

【宜忌】《赵炳南临床经验集》：疗痈溃后，脓毒未净的疮面勿用。

23406 生肌散

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】血竭 煅龙骨 生乳香 生没药 各二两 海螵蛸（去壳）五钱 象皮（滑石烫） 生赤石脂各二两 冰片一钱

【用法】上为细末，和匀，一钱重装瓶。上患处，外贴硃砂膏或朱砂膏。

【功用】化腐生肌，解毒止痛。

【主治】诸般疮疖，溃脓流水，肌肉不生，久不收口。

23407 生肌散

【方源】《全国中药成药处方集》(南昌方)。

【组成】青花龙骨（煅）三钱 血竭（另研）三钱 红粉三钱 制乳香三钱 制没药三钱 冰片一钱 煅赤石脂三钱 煅石膏三钱 海螵蛸三钱

【用法】上为极细末，通过密筛筛过，再入乳钵内搗至极细无声为度，瓷瓶收贮，封固。用时先将疮口洗净，再将药纳入疮口内，外用膏药盖护。

【功用】生肌收口。

【主治】痈疽肿毒溃后，脓腐已净。

【宜忌】脓腐未净忌用。

23408 生肌散

【方源】《全国中药成药处方集》(沙市方)。

【组成】熟甘石一两 轻粉二钱 赤石脂五钱 龙骨五钱 正梅片 黄丹各一钱 熟石膏一两 乳没各五钱

【用法】上为极细末，以无声为度。每次用少许撒患处，外贴膏药。

【功用】生肌收口。

【主治】一切肿毒溃烂。

【宜忌】忌辛辣、鱼腥、葱、蒜等品。

23409 生肌散

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】血竭一两（花） 龙骨二两 象皮二两 乳香二两 没药二两 赤石脂二两 海螵蛸五钱 梅片二钱 朱砂四钱

【用法】上为细末。将药敷疮上，用纱布盖贴之。

【功用】解毒止痛，生肌渗湿，去腐生新。

【主治】痈疽疮疖溃烂后，久不收口。

【宜忌】忌房事。

23410 生肌散

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】象皮三钱 乳香一钱 没药一钱 血竭二钱 儿茶三钱 冰片六分 海螵蛸三钱 煅龙骨三钱 煅石决明一两 煅石膏一两 珍珠一钱

【用法】上为极细末。将疮口洗净，敷患处，外以药膏覆之。

【主治】痈疽疮疖，溃后不敛。

【宜忌】忌辛辣等食物。

23411 生肌散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】珍珠五分 冰片五分 象皮一钱 乳香五分 没药五分 炉甘石五分 轻粉四分 孩儿茶三分 血竭五分

【用法】上为极细末。先用净水拭患处，再上药面即可。

【功用】化腐生肌，收敛疮口。

【主治】痈疽疮疡，溃后不敛。

23412 生肌散

【方源】《外伤科学》。

【组成】制炉甘石五钱 滴乳石三钱 滑石一两 琥珀三钱 朱砂一钱 冰片一分

【用法】上为极细末。搽疮面，外盖膏药或油膏。

【功用】生肌收口。

【主治】痈疽溃后，脓水将尽者。

【备考】《中医伤科学》：亦可用凡士林适量调煮成油膏外敷。其中冰片亦可待用时掺撒在膏的表面方敷。

23413 生肌散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】姜黄 46 克 甘草 25 克 雄黄 25 克 大海马 31 克 川黄柏 31 克 黄丹 31 克 炮山甲 31 克 生大黄 15 克 全蝎 15 克 冰片 4 克 麝香 3 克

【用法】上为细末。外用。

【功用】收口。

【主治】皮肤癌用白降丹后肿瘤脱落或消失，创面肉芽新鲜，活检病理切片报告阴性者。

23414 生肌散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】轻粉 30 克 血竭末 9 克 龙骨末 9 克 炙乳香 3 克 煅石膏末 30 克 赤石脂末 30 克

【用法】以上各药依次加入，研成细末，装瓶备用。用少许直接撒在疮面，外盖玉红膏纱条，再盖敷料。

【功用】生肌长肉。

【主治】溃疡疮面，腐肉已清，新肌已露。

23415 生肌散

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】1 号：红升丹 60 克 轻粉 15 克 乳没各 4.5 克 血竭 4.5 克 冰片 1.5 克

2 号：红升丹 60 克 轻粉 9 克 乳没各 9 克 血竭 9 克 儿茶 6 克 煅石膏 30 克 煅龙骨 30 克 珍珠母 30 克 冰片 3 克

3 号：红升丹 60 克 轻粉 9 克 乳、没各 30 克 血竭 4.5 克 儿茶 9 克 煅石膏 30 克 煅龙骨 30 克 珍珠母 30 克 冰片 3 克

4 号：红升丹 30 克 乳没各 30 克 冰片 1.5 克 象皮 18 克 煅龙骨 4.5 克 珍珠母 15 克 血竭 30 克 儿茶 30 克 轻粉 9 克 煅石膏 30 克 海螵蛸 4.5 克

5 号：珍珠母 6 克 象皮 6 克 血余炭 6 克 炉甘石 9 克 血竭 6 克 儿茶 6 克 煅石膏 30 克 冰片 0.3 克

【用法】1~5 号均研极细末。临床应用时，

当脓腐（坏死组织）量多而难以脱掉时，用去腐解毒力大的 1~2 号生肌散。脓腐已渐脱净时，改用 3 号生肌散。一旦腐肉已基本脱净时，用 4 号生肌散。若肉芽健康，且有上皮自创口边缘向内长出时，用 5 号生肌散。一般情况下，浅平的伤口，换药时先揭除敷料，用干脱脂棉擦净伤口周围（不用酒精棉球），然后再用干棉花蘸去分泌物。检视伤口，如伤口内坏死组织多而不易去除时，可撒用生肌散 1~2 号（用量不必过多，以在伤口表面薄薄覆盖一层即足），然后用涂有玉红膏的纱布盖好，粘膏固定。玉红膏的范围不要太大，只需略大于伤口即可，也不要涂得太厚。每 1~3 天换一次药。待坏死组织大部分清除后，就改用生肌散 3 号，外面仍包以玉红膏。坏死组织已脱净时，改用生肌散 4 号。当肉芽已明显长出，则改用生肌散 5 号，外面包以象皮膏。深在伤口，若伤口小而深时，揭除敷料后，同样用脱脂棉花擦净伤口周围，然后用探针卷少量棉花擦净深处的分泌物（进出探针时，要始终保持一个方向捻转）。最后取适当大小的一片棉花置于伤口外，将生肌散撒在棉花片上，用探针随捻随送进伤口内（要求棉花包裹在探针上，生肌散包在棉花中央，要求探针把棉花送到伤口深处顶端）。取出探针时，向相反的方向捻转，则棉花已形成一个药捻而脱离探针，轻轻抽出探针，棉捻则置留在伤口内，外面用玉红膏包扎粘牢。生肌散之应用按伤口坏死组织多少，伤口腔径大小，是否引流通畅来决定。坏死组织多，口腔径小，引流不畅用 1~2 号，反之，用 3~4 号，健康肉芽已长平可用 5 号。

【功用】去腐生肌，解毒长肉。

【主治】一切化脓性伤口与溃疡，硬红斑，变应性血管炎的溃疡，坏疽性脓皮病与褥疮等。

【方论选录】生肌散 1~4 号都是以具有“提毒去腐，生肌长肉”的红升丹为主药，配以轻粉杀虫祛炎，乳香、没药、血竭行气活

血止痛，儿茶、煅石膏、煅龙骨止血、祛湿、敛疮，珍珠母益阴生肌，冰片透窍为引。生肌散5号是以珍珠母、象皮生肌长肉为主药，血余益阴生肌，煅石膏、炉甘石、血竭、儿茶祛湿敛疮，冰片为引。生肌散1号中红升丹含量为70%，2号中红升丹含量为50%，3号中红升丹含量为30%，4号中红升丹含量为10%。因此生肌散1号去腐解毒力量最大，2、3、4号递减。

23416 生肌膏

【方源】《鬼遗》卷二。

【异名】生肉膏（原书卷四）。

【组成】大黄 芎藭 芍药 黄耆 独活 当归 白芷各一两 薤白二两（别方一两） 生地黄一两（别方二两）

【用法】上咬咀，以猪脂三升煎令沸，候白芷黄，膏成，绞去滓用。磨之，多少随意。

【主治】痈疽，金疮。

23417 生肌膏

【方源】《外台》卷三十七。

【组成】甘草 当归 白芷 椒（去目） 干地黄 细辛 续断各三两 乌喙六枚（去皮） 肉苁蓉三两 薤白二十茎 蛇衔一两（一法无续断）

【用法】上切，以好醋半升和浸一宿，取猪膏三斤微火煎之，令鱼眼沸，三上三下，候白芷黄膏成。用涂之。

【主治】痈疽发背已溃。

23418 生肌膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】蛇衔草一两半 当归一两半 黄连一两半 黄耆一两 甘草一两 黄芩一两 川大黄一两 续断一两 白芍药一两 白及一两 芎藭一两 莽草一两 白芷一两 附子一两（生，去皮脐） 细辛一两 蜀椒一两（去目） 生干地黄三两 薤白一把

【用法】上锉细。以酒一升，拌令润半日，先用腊月猪脂三斤，安铛内炼沸，渐渐入药，煎令白芷黄赤色，滤去滓，以绵滤过，瓷盒

盛。每日三二度，以涂患上。

【主治】一切痈疽发背，败坏疼痛。

23419 生肌膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】熏陆香一两 松脂一两 黄丹二两 羊肾脂一两 生地黄汁二合 麻油四两 故帛五寸

【用法】上药先以油煎帛消尽，下熏陆香、松脂、羊肾脂，又煎三二沸，去火，下地黄汁，煎汁令尽，去火，下黄丹，搅令相入，又煎一二沸，下腊，候色黑，软硬得所，膏成。用帛上摊贴，日二换之。

【主治】一切痈疽发背，脓血不止。

23420 生肌膏

《圣惠》卷六十八。为《千金》卷二十五“地黄膏”之异名。见该条。

23421 生肌膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】槟榔一枚 熏陆香半两 杏仁二十七枚（去皮，研如膏）

【用法】上为细散，以炼了猪脂二合，黄蜡如胡桃仁大，入杏仁膏，同煎令膏成，以瓷盒盛。每用摊于帛上贴之。

【主治】金疮、灸疮、火烧疮等。

23422 生肌膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】白芍药一两 熏陆香一两 胡粉一两 干姜一两（炮裂，锉） 油四两 蜡二两

【用法】上为细散。以油、蜡相和，煎如膏。用贴疮上，日二换之。

【功用】《普济方》：生肌。

【主治】金疮兼一切打损疮。

23423 生肌膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】乳香二两 羊肾脂一两 蜡二两 油半斤

【用法】上药以油和煎如膏，绵滤过，置不津器中。旋取涂于疮上。

【主治】金疮，兼治一切打损疮。

23424 生肌膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】防风一分(去芦头) 白蔹一分 赤芍药一分 当归一分 芎藭一分 桑根白皮一分 杏仁一分(汤浸,去皮尖双仁) 甘草一分 垂柳枝(锉)三合 乱发一两(洗令净) 黄丹五两 木香一分 丁香一分 麻油一斤(清者)

【用法】上药除香二味捣罗为末,余并细锉。以酒(油)浸一宿,慢火熬令柳枝色黄黑,绵滤去滓,澄清,拭铛令净,慢火熬药油,入黄丹,用柳木篦不住手搅,令丹色稍黑,取少许滴于水内,捻看得所,入香末,又搅令匀,倾于不津器中盛。每用看灸疮大小,以纸上匀摊贴之,每日三二度换,仍煎柳枝汤洗。勿令伤风。

【主治】灸疮久不愈,且疼痛。

23425 生肌膏

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】黄丹半两 杏仁一两(汤浸,去皮) 蛇蜕皮一条 黄蜡半两 乱发一两 菜子油六两 皂荚三寸(水浸,去黑皮子)

【用法】上药先取杏仁、蛇皮、皂荚捣碎,后以菜油于铫子中,煎乱发令消,次下杏仁等三味同煎,三上三下,以绵滤去滓,下黄蜡,次下黄丹,以柳木篦子,不住手搅令匀,候膏成。以瓷器盛,于故帛上涂贴之。

【主治】小儿瘰癧穴后。

23426 生肌膏

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】黄耆 当归各三分 生地黄一两半 防风(去叉) 大黄 芍药 黄芩(去黑心) 芎藭 续断 附子(生,去皮脐) 白芷 甘草 细辛(去苗叶)各半两 猪脂二斤

【用法】上药除猪脂外并锉碎,先以醋半升拌一宿,入脂,以瓷器盛于甑上,蒸半日,以绵绞去滓,瓷盒盛。取涂敷疮上,日二三次。

【主治】诸痈疽去脓血后虚困。

23427 生肌膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】黄丹六两 松脂半两 熏陆香半两 故帛一尺(烧灰,细研) 乱发半两 蜡一两 故青帛一尺(烧灰,细研)

【用法】上药以油一斤,先煎一二沸,纳发煎令消尽,然后纳蜡及松脂、熏陆香、青帛灰煎,搅匀烱,以绵滤去滓,却入铛中下丹,以火煎搅令黑色,软硬得所,贮一瓷器中。取少许涂于楸叶上贴,日二易之。

【主治】一切痈疽发背,溃后肌肉不生。

23428 生肌膏

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】生杨柳枝一握(碎,锉如豆大) 清油四两 黄丹二两

【用法】以油煎生杨柳枝令黄色,漉出,以新绵滤过,入黄丹,在油内重炼,以柳枝筋不住手搅,令烟青白,滴一二滴在水碗中,以丸得为度。须丸成不泥手,方可泻出也。

【主治】一切灸疮,取脓水。

23429 生肌膏

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】鸡蛋油三钱(取鸡蛋十余个,煮熟用黄,铜杓内熬油,倾入盂内) 轻粉末一钱 乳香 血竭 龙骨各五分

【用法】上为末,和匀。每日早、午、晚鸡翎蘸搽患处,膏盖避风。半月完口。

【主治】痔漏。

【加减】虚弱者,兼服养血健脾汤。

23430 生肌膏

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】轻粉一分半 密陀僧三分 水粉一钱 冰片三厘 龙骨(煨)一分 银朱五分 赤石脂八分

【用法】上为末,熟猪肉油调和。敷患处,外用膏盖之。

【主治】痈疽疮口不收。

23431 生肌膏

【方源】《串雅内编》卷二。

【组成】麻油一斤(化胎发一团,熬滴水成

珠) 龙骨(煨) 黄占 熟猪油 赤石脂 乳香 没药 轻粉 象皮(煨) 各一钱(俱研细末)

【用法】入油内搅匀成膏。摊贴，一日一换。仍以猪肉汤洗三四次即平。

【功用】生肌收口。

【主治】①《串雅内编选注》：疮疡疔肿。②《中医外科常用方选》：一切溃疡，腐肉不尽，新肉不生者。

【方论选录】《串雅内编选注》：本方用龙骨、赤石脂收敛渗湿；象皮生肌长肉；乳香、没药、黄蜡为膏，以助收敛生肌之力。

【备考】《串雅内编选注》：一般局部常规消毒，再上此药即可，不用猪肉汤洗亦可。

23432 生肌膏

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】当归 黄耆 山慈菇 白芷 甘草 血余 天麻 独活 穿山甲 露蜂房 五倍子 天花粉 荆芥 金银花 白薇 肉桂 牛蒡子 白芍各一两

【用法】净麻油三升，如法熬，去滓，入飞过黄丹一斤半收之，再入白占、黄占、血竭、铜绿各二两，待冷，再入轻粉、乳香、没药(各去油)、龙骨、象皮(炒)、樟脑、儿茶、赤石脂各一两、麝香五钱、冰片二钱(各制为末)，和入搅匀，瓷瓶收贮待用。

【功用】收功长肉。

【主治】诸毒。

23433 生肌膏

《痘麻绀珠》卷十八。为《片玉痘疹》卷十二“生肌散”之异名。见该条。

23434 生肌膏

【方源】《济众新编》卷五。

【组成】油发 松脂 黄矿油 枯矾 乳香 没药 血竭 香油

【用法】上先以香油煎发熔化后，去滓，和诸药末，瓷器收贮，涂旧蓝贴疮。

【主治】瘰癧及诸疮。

23435 生肌膏

《膏药方集》。即《圣惠》卷六十三“止痛排脓生肌神秘方”。见该条。

23436 生肌膏

《膏药方集》。为《圣惠》卷六十三“排脓生肌膏”之异名。见该条。

23437 生肌膏

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】川芎 生地 生山甲 白芷 独活 赤芍 生白附子 当归 木鳖子 大麻子 大黄 黄柏 苍术 苦参 白薇 赤小豆各一两

【用法】用香油十斤，炸枯，去渣，炼至滴水成珠，加黄丹收膏。

【主治】疮疡。

23438 生肌膏

《外伤科学》。为《外科正宗》卷一“生肌玉红膏”之异名。见该条。

23439 生肌膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】制乳香 15 克 制没药 15 克 儿茶 15 克 血竭 15 克 青花蛇蜕(煨) 15 克 碎琥珀 15 克 合欢皮 15 克 净轻粉 12 克 净红粉 3 克 川蜈蚣(焙焦) 10 条 冰片 6 克

【用法】用凡士林 156 克、白蜡 15 克、黄蜡 15 克，入锅内熔化后，离火待温，将药末加入搅和即成。外用。

【主治】下肢溃疡。

23440 生肌膏

【方源】《中医外科临证集要》。

【组成】广丹 30 克 白及 60 克 黄蜡 150 克 紫草 15 克 麻油 300 克

【用法】先将白及研成极细粉末。然后将麻油入锅内煎开，再将紫草用双层纱布包好置入油内，约五分钟离火，捞起紫草，投入黄蜡烊化，稍冷即下广丹和白及末，拌匀即成。

【功用】生肌合口。

【主治】一切痈疽溃口，毒尽不敛者。

【方论选录】方中紫草清血生肌，广丹、白

及、黄蜡生肌合口，麻油润燥养肌。腐脱脓尽者，用之效果颇佳。

23441 生军散

【方源】方出《肘后方》卷五，名见《验方新编》卷十一。

【组成】大黄

【用法】上为末。以苦酒和，贴肿上，燥易。不过三即差减。

【主治】痈疽疮疖，红肿焮痛。腰脚疼痛，跌打损伤。

①《肘后方》：痈肿振焮不可杙。②《证类本草》引《海上集验方》：腰脚冷风气。③《验方新编》：一切未破大小火热疮疖，红肿焮痛。④《不知医必要》：闪跌腰痛，及肩挑重物受伤，初时不觉，日久方痛者。

【宜忌】《验方新编》：痈疽疮疖皮色不变者，忌用。

23442 生阳丹

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】硫黄（生研） 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮） 干姜（炮）各一钱

【用法】上为末，酒煮，面糊为丸，如梧桐子大，丹砂末为衣。每服二十丸，食前温艾汤下，温米饮亦得。

【主治】肾虚脏气寒。

23443 生阳汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】黄耆 人参 熟地 麦冬各一两 当归 枣仁各五钱 五味三钱 炙草一钱

【主治】大汗伤阳。

23444 生肝饮

《医级》卷八。为《校注妇人良方》卷八“滋肾生肝饮”之异名。见该条。

23445 生附汤

【方源】《直指》卷十八。

【组成】附子（生）一分 苍术（炒） 杜仲（姜制炒）各半两 生干姜 白术 茯苓 牛膝（酒浸，焙） 厚朴（制） 甘草（炙）各一分

【用法】上锉。每服三钱，加生姜四片，大

枣二枚，食前煎服。

【主治】受湿腰痛。

23446 生附汤

《得效》卷八。为《三因》卷十二“生附散”之异名。见该条。

23447 生附汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】大附子 苍术 香附 白术各一钱 甘草三分 干姜五分 杜仲 牛膝 茯苓 厚朴各八分 生姜三片 大枣二枚

【用法】水煎八分服。

【主治】湿溜下部，两足无力，步履艰难，腰膝疼痛。

23448 生附散

【方源】《医方大成》卷十引《汤氏方》。

【组成】生附子

【用法】上为末。面水调贴之。即愈。

【主治】冻烂脚成疮。

23449 生附散

【方源】《三因》卷十二。

【异名】生附汤（《得效》卷八）。

【组成】附子（去皮脐，生用） 滑石各半两 瞿麦 木通各三分 半夏（汤洗七次）三分

【用法】上为末。每服二大钱，水二盏，加生姜七片，灯心二十茎、蜜半匙，煎七分，空心服。

【主治】冷淋。多因饮水过度，或为寒泣，心虚气耗，小便秘涩，数起不通，跨中疼痛，憎寒凛凛。

23450 生枣汤

《冯氏锦囊·杂证》卷十二。为方出《证类本草》卷十二引《简要济众方》，名见《圣济总录》卷四十二“酸枣仁汤”之异名。见该条。

23451 生势丹

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】炒黄柏三两 儿茶一两 冰片三分 生甘草一两 大黄三钱 乳香一钱 没药一钱 麝香三钱 丹砂一钱（不煨）

【用法】各为绝细末，和匀，掺之。掺之即止痛，逢湿即渗末，不数日脓尽血干。

【主治】杨梅疮，龟头烂落，连龟头亦烂尽。

23452 生明丸

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】薄荷叶 川芎各七钱半 缩砂仁 甘菊花各半两

【用法】上为细末，炼蜜和丸，每二两作十五丸。每服一至二丸，细嚼温水送下；噤化亦得。

【主治】眼目暴赤，睛痛肿赤。

23453 生明散

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】白丁香（拣净，水飞过细末）一两 南硼砂末（好者）三钱

【用法】上为极细末，用大活蛤蜊一个，将药末入蛤蜊内，又将蛤蜊放净碗内，上盖竹纸，勿沾灰尘，连碗晒令出水，用骨簪点眼。

【主治】瞎眼后及年老眼目昏花。

23454 生乳丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归八两 生地八两 川芎四两 生白芍八两 通草二两 生麦芽十六两 山甲四两 漏芦八两 生黄耆八两 鹿角霜八两 广木香四两 王不留行（炒）四两

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重三钱，蜡纸管封固。每服一丸，日服二次，温开水送下。

【功用】补气，活血，下乳。

【主治】产后气血亏损，乳少，乳汁不足。

23455 生乳丹

《傅青主女科》卷下。为原书同卷“通乳丹”之异名。见该条。

23456 生乳灵

【方源】《天津市中成药规范》。

【异名】生乳糖浆（《中药制剂手册》）。

【组成】穿山甲 30 千克 沙参 10 千克 天花粉 50 千克 丝瓜络 50 千克 白马悬蹄 60 千克 鹿角 10 千克

【用法】天花粉用 25% 醇按浸渍法提取浸

液，穿山甲、沙参、丝瓜络、白马悬蹄、鹿角按水煮法取其煮液，将煮液合并过滤，减压浓缩至适量，兑入单糖浆 1200 升，苯甲酸钠 0.5%，待冷后加入天花粉浸液，搅拌均匀，比重 1.2~1.24，25℃ 静置七天后即可灌封。每瓶 120 毫升。每次服 40 毫升，每日服三次，温热后服用。

【功用】通经活络，下乳。

【主治】妇人气血不足，经络不通，奶汁稀薄及奶汁灰黄。

23457 生金丸

【方源】《普济方》卷三八七引《全婴方》。

【组成】人参 郁金 半夏 白矾末各一两

【用法】上为末，姜糊丸，如小豆大。三岁三十丸，生姜汤送下。

【主治】小儿咳嗽有痰，气急不食。

23458 生金汤

【方源】《幼幼新书》卷十引《婴童方》。

【组成】生金黑豆大（无生，熟亦得） 茯神 干姜各一分 甘草（炙）二分

【用法】水一升，煮五合，一服一枣大，日五夜三。

【主治】小儿生七日后，忽患口鼻青，微惊，胸中冷，视物高。

23459 生金散

【方源】《幼幼新书》卷二十五引丁左藏方。

【组成】天南星一个（重一斤者） 绿矾一两

【用法】上先安排南星在干地上，用矾与南星同处，四边以灰火烧，烟尽为度。取出后研如粉，入当门子一粒，先含，浆水洗贴之。

【主治】小儿走马疳。

23460 生金散

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】千年石灰（研细）

【用法】六月六日捣韭汁拌成饼，阴干收贮，腊月复细研，以牛胆汁拌匀，装入胆中，悬挂阴干。临阵时，每用灰六钱，血竭四钱，

研极细，遇有伤者，虽皮开肉裂，敷之包裹，罔不即联。

【主治】刀斧初伤。

23461 生肤散

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】麦冬一两 熟地二两 山茱萸一两 人参五钱 肉桂一钱 当归一两 忍冬藤一两 白术五分

【用法】水煎服。二剂而肉自长，又二剂外口自平，又二剂全愈。

【主治】背痈将愈，阴虚不能济阳，而疮口不收者。

23462 生肥散

【方源】《一盘珠》卷五。

【组成】决明 乳香 没药 海螵蛸 黄丹 血竭 赤石脂(火煨) 龙骨(火煨) 熊胆 轻粉 冰片 上麝香

【用法】上为细末。每日搽二三次。

【功用】收水。

【主治】痔疮。

23463 生鱼汤

《外台》卷三十三。即《千金》卷二“鲤鱼汤”。见该条。

23464 生鱼簿

【方源】《普济方》卷三二五。

【组成】生鲤鱼(长)五寸 大黄 莽草 灶中黄土各六两

【用法】上别捣鱼如膏，三物下筛，更捣令调，以生地黄汁和。敷肿上，日五六，夜二三。即愈。

【主治】乳痈。

23465 生油方

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】生油汤(《圣济总录》卷一六九)、生油剂(《痘治理辨》)。

【组成】生油一小盏

【用法】上炖如人体温，将熟水一小盏，旋旋倾入油盏内，不住手以杖子搅挽，直候入熟水尽，更打令匀如蜜即止。夜卧时，三岁前至百日及一醉内，每服二蚬壳；五岁至七

岁，每服三蚬壳；十五岁以前，每服三大蚬壳至半合；直至大人，每服一合至二合。服后良久，令卧少时。服三五服，大小便利，四肢热退，疹痘不生也。

【主治】小儿脏腑伏于热毒，未成疹痘疾候，四肢微觉有热，食物似减，头发干竖，或时额多微热。

【备考】《圣济总录》：扁鹊及仓公用此，谓之神剂。

23466 生油方

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】生油一合

【用法】上一味，滴入耳中，日三五次。候其塞出即愈。

【主治】耳聋；虫蜒入耳。

【备考】原书卷一一五所载此方用生油三合，将油少少灌入耳中。若入腹者，空腹服酢酪一升，不出更服。仍以面和烧饼，乘热薄耳门，须臾即出。

23467 生油汤

《圣济总录》卷一六九。为《圣惠》卷八十四“生油方”之异名。见该条。

23468 生油剂

《痘治理辨》。为《圣惠》卷八十四“生油方”之异名。见该条。

23469 生茶散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】蓬莪术 茴香 生茶各等分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，盐二钱，葱白二寸，煎至六分，和滓空心服。

【主治】暴患小便不通。

23470 生韭饮

【方源】《医统》卷二十六引朱丹溪方。

【组成】生韭(捣自然汁)一盏，温加酒一二杯同服)

【用法】上先以桃仁连皮细嚼数十枚后，以韭汁送下。

【功用】开提气血。

【主治】食郁久则胃脘有瘀血作痛。

23471 生韭饮

【方源】《不居集》上集卷十四。

【组成】韭菜(取汁)

【用法】用姜汁、童便磨玉金饮之。其血自清。如无玉金，以山茶花代之。

【主治】诸血上行。

23472 生胃丸

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】良姜 白姜各四两(并油炒) 丁香 胡椒

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服百十丸，米饮陈皮汤下。

【主治】酒食所伤，胸膈不快，不思饮食。

【备考】方中丁香、胡椒用量原缺。

23473 生胃丸

《瑞竹堂方》卷二。为《济生》卷七“生胃丹”之异名。见该条。

23474 生胃丹

【方源】《医方大成》卷三引《济生》。

【异名】生胃丸(《瑞竹堂方》卷二)。

【组成】大天南星四两(用真黄土半斤，将生姜汁作黄土成面剂包裹南星，慢火煨香透去土不用，将南星切碎焙干和后药研) 丁香(不见火)一两 粟米一升(用生姜二斤和皮搗取自然汁浸蒸焙) 木香(不见火)厚朴(去皮姜汁制炒) 神曲(炒) 麦蘖(炒) 橘红 防风(去芦) 白术 谷蘖(炒) 缩砂仁 白豆蔻 青皮(去白)各一两 半夏曲二两 人参 沉香(不见火) 甘草(炙)各半两

【用法】上为细末，为丸如绿豆大。每服七十丸，不拘时候，淡姜汤送下。

【主治】脾胃不足，痰多呕逆，不思饮食。

【方论选录】此药以南星、粟米、黄土为主，盖南星醒脾，粟米养胃，黄土以土养土也。

23475 生胃丹

【方源】《朱氏集验方》卷四引刘立之方。

【组成】人参 神曲(炒) 麦蘖(炒) 谷蘖(炒) 半夏曲各一两 白术 白芍药 川续断 川牛膝(酒浸，焙) 川厚朴(姜

制) 丁香 防风各一两半 白豆蔻仁(炒) 山药 白茯苓 木香 沉香各二两 香附子三两 缩砂仁(炒)二两 粟米七升 生姜五斤(取自然汁浸粟米，蒸烂，焙) 天南星一斤(用生姜滓和作饼，真黄土成泥包裹，放慢火内煨令香熟，去土，焙为末)

【用法】上为细末。为丸如绿豆大。每服一百丸，用白汤吞下。

【主治】翻胃吐食，胃虚生风，手足抽掣，痰涎潮作声，久病全不纳食，胃气欲绝。

23476 生胃丹

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】粟米四两(温水浸透，炊作饭，火焙干乘热用；生姜自然汁和湿再焙干，如是制七次) 粉白天南星二两(姜汁浸一宿，次日用生姜汁和纸筋黄泥裹南星，晒干，用慢火煨半日，泥焦干为度，候冷取出南星入药) 人参 白术 茯苓各二两 陈皮 白豆蔻仁 缩砂仁 麦蘖(炒) 半夏曲 青皮 草澄茄 石莲肉各一两 南木香三钱

【用法】上为细末，用米粉糊为丸，如绿豆大。每服五六十丸，食前姜汤吞下。

【功用】生胃气，消痰沫，开膈进食。

【方论选录】《东医宝鉴·杂病篇》：脾胃气虚则不能运化水谷，水谷停积则为湿痰，曰补气，曰治痰，曰燥湿，三者不可偏废。此方中人参、白术以补气，麦芽、缩砂仁以消食，南星以燥湿痰，又茯苓渗湿，陈皮、青皮利气，白豆蔻、草澄茄开膈，木香调气，莲肉清心，可谓周而且备，肥白气虚者尤宜服之。

23477 生胃散

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】四圣汤(白术、人参、白茯苓、炙甘草)加石莲子 木香 黄耆

【主治】久吐胃寒。

23478 生香散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】白松香四两(用葱汁煮干)

【用法】上为末，加生猪板油二两捣成膏，贴之。次用红粉生肌。

【主治】疔疮，血风。

23479 生香膏

【方源】《三因》卷十六。

【组成】甜瓜子（去壳）

【用法】上为细末，蜜熬少许，调成膏。食后含化；或敷在齿间。一方用香附子炒去毛，为末。每早晚搽少许牙上。

【主治】口气热臭。

23480 生香膏

【方源】《医部全录》卷四一五引《类要方》。

【组成】黄柏半钱 螺青二钱

【用法】上为细末。每服一字，或半钱掺患处。

【主治】诸物梗喉。

23481 生脉汤

《丹溪心法》卷一。为《医学启源》卷下“生脉散”之异名。见该条。

23482 生脉饮

《兰台轨范》卷一引《医录》。为《医学启源》卷下“生脉散”之异名。见该条。

23483 生脉散

【方源】《医学启源》卷下。

【异名】生脉汤（《丹溪心法》卷一）、参麦散（《遵生八笺》卷四）、生脉饮（《兰台轨范》引《医录》）、人参生脉散（《症因脉治》卷二）、定肺汤（《医林绳墨大全》卷二）、参麦五味饮（《胎产心法》卷下）。

【组成】麦冬 人参 五味子

【功用】益气养阴，敛汗生脉。

①《医学启源》：补肺中元气不足。②《医便》：止渴生津。③《回春》：清心润肺。④《景岳全书》：止渴消烦，定咳嗽喘促。⑤《嵩崖尊生》：清暑益气，生脉补虚。

【主治】气阴两伤，肢体倦怠，气短懒言，口干作渴，汗多脉虚；久咳伤肺，气阴两亏，干咳少痰，食少消瘦，虚热喘促，气短自汗，口干舌燥，脉微细弱；或疮疡溃后，脓水出

多，气阴俱虚，口干喘促，烦躁不安，睡卧不宁。

①《丹溪心法》：注夏属阴虚，元气不足，夏初春末，头痛脚软，食少体热。②《正体类要》：金疮、杖疮，发热体倦，气短，或汗多作渴，或溃后睡卧不宁，阳气下陷，发热烦躁。③《内科摘要》：热伤元气，肢体倦怠，短气懒言，口干作渴，汗出不止。④《外科枢要》：胃气亏损，阴火上冲，口干喘促，或肢体倦怠，肌肉消瘦，面色萎黄，汲汲短气，汗出不止，食少作渴；或脓水出多，气血俱虚，烦躁不安，睡卧不宁。⑤《医方考》：气极者，正气少，邪气多，多喘少言。⑥《赤水玄珠》：肺气大虚，气促上喘，汗出而息不续，命在须臾。⑦《回春》：中暑，暑伤于气，脉虚弦细迟，属元气虚脱者。

【方论选录】①《内外伤辨》：圣人立法，夏月宜补者，补天真元气，非补热火也，夏食寒者是也。故以人参之甘补气，麦冬苦寒泻热，补水之源，五味子之酸，清肃燥金，名曰生脉散。孙真人云：五月常服五味子，以补五脏之气，亦此意也。②《医方考》：肺主气，正气少故少言，邪气多故多喘。此小人道长，君子道消之象。人参补肺气，麦冬清肺气，五味子敛肺气，一补一清一敛，养气之道毕矣。名曰生脉者，以脉得气则充，失气则弱，故名之。东垣云：夏月服生脉散，加黄耆、甘草，令人气力涌出。若东垣者，可以医气极矣。③《古今名医方论》引柯韵伯：麦冬甘寒，清权衡治节之司；人参甘温，补后天营卫之本；五味酸温，收先天天癸之原。三气通而三才立，水升火降，而合既济之理矣。④《医方集解》：人参甘温，大补肺气为君；麦冬止汗，润肺滋水，清心泻热为臣，五味酸温，敛肺生津，收耗散之气为佐。盖心主脉，肺朝百脉，补肺清心，则元气充而脉复，故曰生脉也。夏月炎暑，火旺克金，当以保肺为主，清晨服此，能益气而祛暑也。⑤《成方便读》：方中但以人参保肺气，麦冬保

肺阴,五味以敛其耗散。不治暑而单治其正,以暑为无形之邪,若暑中无湿,则不致留恋之患,毕竟又无大热,则清之亦无可清,故保肺一法,即所以祛暑耳。此又治邪少虚多,热伤元气之一法也。在夏月肺虚者,可服之。⑥《温病条辨》:汗多而脉散大,其为阳气发泄太甚,内虚不可留恋可知。生脉散酸甘化阴,守阴所以留阳,阳留,汗自止也。以人参为君,所以补肺中元气也。⑦《血证论》:人参生肺津,麦冬清肺火,五味敛肺气,合之甘酸化阴,以清润肺金,是清燥救肺汤之先声。

【临证举例】①中暑《续名医类案》:陆祖愚治陈元甫,七月间因构讼事,忍饥,食冷粥数碗,少顷即吐出。自此茶饮皆吐,头痛身热,咽喉不利,昏冒,口中常流痰液。医知为中暑,用冷香薷饮投之,随吐;又以井水调益元散投之,亦吐,昏沉益甚。脉之,阳部洪数无伦,阴部沉微无力。此邪在上焦,在上者因而越之,此宜涌吐者也。盖饥饿之时,胃中空虚,暑热之气,乘虚而入于胃,胃热极而以寒冷之茶饮投之,冷热相反,所以水入即吐;即口中流涎,亦胃热上溢之故也。因用沸汤入盐少许,煮汁数匙,乘热灌之,至二三碗不吐,至一时许方大吐,水饮与痰涎同出,约盆许。即以生脉散投之,人事清爽,诸症顿减。②脱症《成都中医学院学报》(1979; 1: 48):周某,女,75岁。患高血压及慢性支气管炎多年。平素血压在190~170/110~100mmHg之间,并有头晕失眠,咳嗽胸闷等。诊前约10分钟,因过劳突感呼吸困难,心悸,头汗如珠,口噤不语,脉形隐伏,怠缓而结,至数不清,每分钟约36次/分。证属脱证。急取红参2支(切片),麦冬15克、五味子12克,开水浸泡,白糖为引,徐徐灌入口中,药尽服,病人始能呻吟,手足扰动。再服即时苏醒,脉形始现,50次/分,仍无力而结,3~5至一止。此元气复而未盛,原方浓煎作饮,2小时内尽服生脉散二

剂,神识清楚,转危为安。次日再诊,觉头昏疲乏心跳,六脉弦缓,5~8至一止。血压140/100mmHg,已进食。仍按原方再进三剂,素食调养,脉形整齐,恢复常态。③低血压《四川医学》(1981; 2: 100):口服生脉散加味(粉剂):党参6克、黄耆6克、五味子2克、麦冬2克,共18克为一人一日量,共研末,每次服6克,每日三次,连服四周为一疗程,选择血压低于90/60mmHg,排除器质性及营养不良者作为观察对象,共观察10例(男女各5人),经给药一疗程后,收缩压平均升高14mmHg,舒张压平均升高6.7mmHg。④心肌炎《上海中医药杂志》(1979; 6: 25):治疗心肌炎20例(其中15例经多种西药多疗程治疗无效而改用本法),显效6例,有效10例,无效4例。⑤休克《新医药杂志》(1974; 3: 21):收治急性心肌梗塞并发心源性休克20例,其中3例单用西药治疗,死亡1例(33%),而另17例用生脉散注射液治疗,死亡1例(5.8%),16例血压全部回升恢复正常,升压作用温和是其特点。《江苏中医》(1980; 3: 59):以本方治疗休克114例,包括感染性休克98例,用药5分钟至1小时后开始升压,显效率为71.8%,血压稳定时间平均为17.3小时。⑥心衰《中医杂志》(1980; 12: 30):生脉液治疗小儿肺炎合并心衰17例,其中1~3天内症状消失者10例(58.8%),3天以上消失者7例(41.1%),平均消失时间 3.81 ± 0.39 天,而12例对照组中,3天以上消失者7例(58.3%),1~3天以内消失者5例(41.7%),平均消失时间 6.08 ± 1.19 天, $P > 0.05$ 。⑦心律失常《中级医刊》(1959; 9: 26):患者女性,73岁,支气管扩张合并支气管肺炎,继发心力衰竭,采用毛地黄叶粉末内服。治疗过程中,突然发生恶心呕吐,心率38次/分,律齐,血压降至90/0mmHg,患者疲乏,嗜睡。经中西医会诊,诊断为毛地黄中毒所致心房室传导阻滞。用人参9克、麦

冬 9 克、五味子 3 克;连服 5 剂,心律恢复至 56 次/分,诸症逐步缓解。《天津医药》(1978;2:64):用本方配合安他心 0.1 每日四次,治疗室性、房性早搏 5 例,4 例全愈,1 例好转。《成都中医学院学报》(1981;2:52):治疗心率缓慢型心律失常 21 人次(15 人),其中病态窦房结综合症 18 人次,伴有二度二型或三度房室传导阻滞的双率枝传导阻滞 3 人次。结果 1 人次显效,17 人次好转,治疗有效率为 18/21 (85.7%)。⑧冠心病、心绞痛《中医杂志》(1981;12:67)观察 54 例冠心病心气虚患者应用生脉散前后的左心功能改变,用药前后比较结果具有显著性差异。《安徽中医学院学报》(1984;3:40):严氏用生脉液治疗心血管疾病 23 例,其中冠心病 13 例,高心 6 例,肺心 3 例,心肌炎 1 例,总有效率为 70.1%。其中对改善心电图异常的总有效率为 69.6%,缓解心功能障碍症状总有效率为 70.4%。⑨肺结核《中医杂志》(1959;9:36~37):根据中医辨证施治原则治疗肺结核 22 例,其中心肺型(即心痹与肺痹混合型)用生脉散熬膏治疗。经四个月,全部有效,大多数恢复健康。

【现代研究】①镇静作用《新医药学杂志》(1974;3:21):生脉散有镇静作用,能延长小白鼠或巴比妥钠睡眠时间。给药组平均睡眠时间 136.6 ± 21.6 分钟,对照组平均睡眠时间为 100.3 ± 35.2 分钟 ($P < 0.01$)。②提高耐缺氧能力《新医药学杂志》(1974;3:21):生脉散可增加小白鼠对低压缺氧的耐受能力,给药组存活率为 63.3%,对照组存活率为 37.7%,两组差别显著 ($P < 0.05$)。说明本方能提高心肌对缺氧的耐受性,节约心肌对氧的消耗。③抗冠心病作用《北京医学院学报》(1975;2:118):家兔经结扎冠状动脉前降支,造成实验性心源性休克,生脉散注射液具有一定的治疗作用,但升压作用缓慢,给药组与对照组疗效有明显差异。《中医杂志》(1981;6:24):观察 54 例有心气

虚表现的冠心病心绞痛患者的心肌收缩时相(STT)及心尖搏动图,表明该病心气虚的实质与不同程度心功能不全有关。应用生脉散注射液后,可以改善左心室功能。其正性肌力作用与西地兰对心脏作用相类似。④抑制豚鼠心肌细胞膜三磷酸腺苷酶活性《新医药学杂志》(1973;10:27):生脉散可抑制豚鼠心肌细胞膜三磷酸腺苷酶的活性,抑制强度与剂量成正比。其中人参、五味子单味药亦有抑制作用,而麦冬则无抑制作用。认为生脉散由于抑制心肌细胞三磷酸腺苷酶的活性,是改善心脏生理功能的途径之一。⑤对 2,3-二磷酸甘油酸的双向调节作用:《全国中西医结合虚证研究与防治老年病会议资料选编》(1982 年):观察静脉注射生脉散前及 24 小时后正常人及冠状患者细胞 2,3-二磷酸甘油酸的含量变化,结果表明本方对此可能具有双向调节作用。动物实验结果还表明本方还可以提高缺氧动物的 PO_2 、 SO_2 ,设想可能是生脉散使缺氧机体的摄氧、带氧能力提高,并将此看成是生脉散益气作用机理之一。⑥抗微循环障碍作用《辽宁中医杂志》(1984;12:36):生脉散注射液对大分子右旋糖酐所致微循环障碍和弥漫性血管内凝血的病理变化,有一定的对抗和保护作用。不仅可以改善微循环障碍,还可以阻止血管内 DIC 产生。⑦强心机理《安徽中医学院学报》(1983;3:56):生脉散是通过多种途径作用而增强心肌收缩、改善心功能的。其作用途径至少有四个方面:1. 抑制心肌细胞膜 Na-K-ATP 酶活性。2. 改善心衰心肌的能量代谢。3. 改善心衰心肌蛋白的代谢。4. 兴奋垂体-肾上腺功能。⑧抗休克作用《天津医药通讯》(1972;11:44):生脉注射液可使在体兔心收缩力加强,对狗急性失血性休克具有升压作用,并使休克动物趋于安静。《新医药学杂志》(1974;3:21):心源性休克:用耳缘静脉注射橄榄油的方法,造成家兔心源性休克,对照组存活率为 12.5%,预防给生脉散组存活

率为 75%，两组差别显著 ($P < 0.05$)。本方主要作用可能是加强心肌收缩力，改善冠状动脉循环。中毒性休克：生脉散能延长家兔阻断肠系膜上动脉后所致休克的存活时间，给药组平均存活时间为 488.8 分，对照组为 344.4 分，两组比较，差别非常显著 ($P < 0.01$)。⑨毒性研究《中成药研究》(1980; 2: 41)：生脉散注射液给狗静滴 17~20 毫升/公斤，滴速 60 滴/分，心电图及血压无明显变化，快速注入 (180 滴/分)，心电图出现 ST 段下降；静脉注射未有溶血现象；小鼠尾静脉给药， LD_{50} 34.94±3.51 克/公斤。临床一次静滴 400 毫升，未发现任何副作用，仅偶有静脉炎发生。

【备考】《观聚方要补》引《内外伤辨》本方用人参、麦冬各三钱，五味子十五粒。水煎服。

23484 生脉散

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】人参 麦冬各二钱 白术 阿胶各一钱 陈皮八分 五味十个

【主治】气不布息，呼吸不接续，出多入少。

23485 生脉散

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参一两 麦冬二两 北五味子一钱 黄芩一钱

【用法】水煎服。

【主治】小便不出，中满作胀，口中甚渴，投以利水之药不应，属于肺气干燥者。

【方论选录】夫膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。上焦之气不化，由于肺气之热也。肺热则金燥而不能生水，投以利水药，益耗其肺气，故愈行水而愈不得水也。治法当益其肺气，助其秋令，水自生焉。方用生脉散治之。生脉散补肺气以生金，即补肺气以生水是矣。何以加黄芩以清肺，不虑伐金以伤肺乎？不知天令至秋而白露降，是天得寒以生水也。人身肺金之热，不用清寒之品，何以益肺以生水乎？此黄芩之必宜加

入于生脉散中，以助肺金清肃之令也。

23486 生脉散

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】人参一钱 炙黄耆三钱

【用法】水煎服。

【主治】痘后灰白，气血两亏。

23487 生脉散

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】西洋参 生地 麦冬 五味

【主治】暑伤气弱。

23488 生津丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】青蛤粉 白滑石各一两

【用法】上为细末，用黄颡鱼涎和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎陈粟米饮下，不拘时候。

【主治】消渴，饮水日夜不止。

23489 生津丸

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】乌梅 薄荷叶 硼砂 柿霜 白砂糖

【用法】蜜丸。噙化。

【功用】《全国中药成药处方集》(沈阳方)：生津止渴敛汗。

【主治】①《嵩崖尊生》：暑天发渴。②《全国中药成药处方集》(沈阳方)：胸中烦热，唇燥舌干，咽喉肿痛，口渴自汗。

23490 生津方

【方源】《医编》卷七。

【组成】兜铃 水芹 旋覆花 薤白草(俱鲜者取汁) 薄荷叶 五倍子各四两

【用法】捣作饼，盒七日，出白毛，又采前四种取汁拌捣，待干，又拌汁捣，不拘通数。每用五厘，入口津液涌溢。

【主治】口干涩，火盛津虚。

23491 生津汤

【方源】《济阴纲目》卷九。

【组成】当归 甘草(炙)各五钱 麦门冬(去心) 通草 滑石各三钱 人参 细辛各一钱

【用法】上为细末。每服六七钱，灯心煎汤，空心调服。

【主治】妊妇津液不足，常病自汗，或因下痢后，小便短少不痛者。

23492 生津汤

《医级》卷九。为《医方集解》引丹溪方“活血润燥生津汤”之异名。见该条。

23493 生津汤

【方源】《中国内科医鉴》。

【组成】麦门冬 黄耆 栝楼根 甘草 人参 黄连 牡蛎 地黄 知母

【主治】消渴嘈杂。

23494 生津饮

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】黄耆一钱半 人参 生地 麦冬 各二钱 五味十粒 当归三钱 茯苓八分 炙草 升麻各四分 葛根一钱

【主治】产后口渴，小便不利。

23495 生津饮

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】人参一钱半 麦冬三钱（去心） 知母一钱半（去毛） 天冬三钱（去心） 草梢一钱半 车前子三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】孕妇淋沥涩痛，脉软数。

【方论选录】妊娠气亏，湿热伤津液，而不能上敷下达，故口燥心烦，小便涩痛淋沥不已焉。人参扶元气以通津液，天冬润肺以资水源，麦冬生津润燥，知母清热除烦，草梢泻火以缓涩痛，车前子清肝以利小便也。水煎温服，使元气内充，则湿热自化，而津液四溢，无不上输心肺，而烦躁宁，下达膀胱肾而涩痛解，何小便淋沥之不痊者，胎孕无不自安矣。

23496 生津饮

【方源】《医方简义》。

【组成】生地黄 鲜生地 天冬 麦冬（去心）各一两 菊花 淡竹叶 霜桑叶 佩兰叶各三钱 生石膏五钱 川柏 淡秋石各五分 生苡蓂五钱

【用法】加青果五枚，水五大碗，煎至一大碗，去滓，频频而饮。

【主治】燥症。不拘内伤外感，上燥下燥诸症。

【加减】如咳嗽者，加薄荷、桔梗各一钱五分；内伤重者，加藕汁、梨汁、人乳汁各一大盅，煨热，和匀而饮；如上燥而有余热者，又加芩茎一两，同本药熬就，和入藕、梨汁、人乳汁而饮可也。

23497 生津散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄柏 天花粉 黄连 山梔各一钱 白扁豆 生地 麦门冬 知母各一钱五分 茯苓 干葛各八分

【用法】加灯心三十茎，水煎，空心服。

【主治】上焦之病，渴而饮水者。

23498 生津散

《证治宝鉴》卷四。为《医学入门》卷八“活血润燥生津饮”之异名。见该条。

23499 生姜丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】生姜（去粗皮切作片，焙） 厚朴（去粗皮生姜汁炙熟）各六两 半夏（汤洗七遍）一两 陈橘皮（去白，焙）六两 人参 白茯苓（去黑皮） 陈曲（微炒） 大麦蘖（炒）各一两半

【用法】上为细末，用生姜汁煮面糊和丸，如梧桐子大。晒干。每服三十丸，空心食前米饮下。

【功用】通气。

【主治】三焦虚胀。

23500 生姜丸

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】生姜二斤（和皮切作片子，以盐三两淹一宿，慢火焙干） 甘草（炙，锉） 陈橘皮（汤浸去白，焙）各四两 香白芷 缩砂（去皮） 胡椒各一两 蓬莪术（炮）二两

【用法】上为末，以面糊为丸，如小弹子大，

细研丹砂为衣。每服细嚼一九，食前温酒下。

【功用】益津液，和胃气。

【主治】干呕恶心。

23501 生姜丸

【方源】《幼幼新书》卷九引《聚宝方》。

【组成】蜈蚣一条(酒浸一宿) 干蝎(全者)七个 蚕蛾十个 白僵蚕(直者) 朱砂各一分(研) 天南星 白附子 麝香(当门子)各一个 薄荷心七个 龙脑(研) 水银(钊结沙子)各一钱 棘岡子二十个(炒)

【用法】上为细末，研令匀，以石脑子油和为膏，单子裹。每服一粒，如黍米大，冷水调下，须发前服。一二服必效。

【主治】小儿虚风，急慢惊搐搦，项筋紧强，手足逆冷，腰背拘急。

23502 生姜丸

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】生姜 半夏各一两 附子三分 藜芦半两

【用法】上为末，陈醋煮沸，和药末为丸，如梧桐子大。每服三十九，陈米饮下。日午再服。

【主治】脓血下痢不禁。

23503 生姜丸

【方源】《普济方》卷二一三。

【组成】生姜 藜芦 乌头 桂心 黄连 云实 代赭各等分

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸。大下痢，宿勿食。清旦以冷水服之，勿饮食，至日中过后乃饮食也。若得药力，明旦更服如前。亦可长服。虚羸，昼夜百行脓血亦愈。

【主治】热病时气下赤白痢。

23504 生姜丸

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】生姜(切作片子焙干)

【用法】上为末，糯米糊为丸，如芥子大。每服三十九，空心米饮下。

【主治】寒嗽。

23505 生姜丹

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】茴香二两 生姜四两(不去皮)

【用法】上二味擦拌，入坩器内，淹一伏时，不透汽，取出用慢火炒，不得过，次入青盐一两，同为细末，煮好面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心酒或盐汤下。

【主治】肾受邪，阳气衰弱，意情不快，多倦。

23506 生姜汤

【方源】《医心方》卷五引《古今录验》。为方出《肘后方》卷三，名见《医心方》卷二十二引《产经》“人参汤”之异名。见该条。

23507 生姜汤

【方源】《医心方》卷九引《深师方》。

【组成】生姜五两 茯苓四两 半夏一升 橘皮一两 甘草二两

【用法】以水九升，煮取三升七合，分三服。

【主治】食已呕逆。

23508 生姜汤

【方源】《外台》卷六引《集验方》。

【组成】生姜四两 泽泻三两 桂心二两 橘皮三两 甘草二两 茯苓四两 人参一两 大黄四两

【用法】上切。以水七升，煮取三升。服五合，一日三次。

【主治】吐逆干呕。

【宜忌】忌海藻、菰菜、醋物、生葱。

23509 生姜汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】生姜一斤(取汁) 食蜜八两 醍醐四两

【用法】上药微火上耗令相得。适寒温服三合，一日三次。

【主治】胸腹中卒痛。

【方论选录】《千金方衍义》：胸腹中卒痛，审无宿滞固结，但需生姜以散虚火之逆，酥、蜜以滋津血之燥，不烦猛剂峻攻也。

23510 生姜汤

【方源】《千金》卷十六。

【组成】生姜一斤 甘草三两 桂心四两

【用法】上㕮咀。以水六升，煮取一升半，每服五合，一日三次。

【功用】温中下气。

【方论选录】《千金方衍义》：甘草欺留姜、桂之性，以尽温中之力也。

23511 生姜汤

【方源】《外台》卷六引《救急方》。

【组成】东壁土一把 生姜一大两（碎之）

【用法】用水一大升，煮取半升，澄清，热饮之。如渴依前进。

【主治】干湿霍乱冷热。

23512 生姜汤

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【异名】生姜饮（《普济方》卷二〇三）。

【组成】生姜汁一合 蜜一合 糯米一合（以新汲水淘令净，研如粉）

【用法】以新汲水一大盏相和，时时服一合。

【主治】①《圣惠》：霍乱吐泻，心烦闷乱。②《神巧万全方》：胃中实热，吐逆，不受饮食，心神烦渴。

23513 生姜汤

【方源】《局方》卷十。

【组成】干生姜二斤 白面（炒）三斤 甘草（炒）十三斤 杏仁（去皮尖麸炒，别研）十斤

【用法】上以炒盐二十二斤同为末。每服半钱，如茶点吃，常服一字，不拘时候。

【功用】消食化痰，宽利胸膈。

【主治】酒食所伤。心胸烦满，口吐酸水，呕逆不定，饮食无味，胸膈不快。

23514 生姜汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】生姜（细切丝）十二两 草豆蔻（去皮）四两 甘草（生锉）半斤

【用法】上药先捣草豆蔻、甘草为末，同姜

丝烂研匀，捏作饼子焙干，再捣罗为末。每服一大钱，空心、食前盐汤点服。

【功用】和胃气，养津液。

【主治】①《圣济总录》：干呕。②《普济方》：胃有寒，气逆呕哕。

23515 生姜汤

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】生姜二两（切） 升麻二两（锉）射干二两（锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白）

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。

【主治】小儿咽喉肿痛，毒气热极，咽塞不利。

23516 生姜汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】生姜四两（和皮切作头子，入石灰一两同炒姜七分干，从入半夏一两再炒十分干） 丁香末一分 白矾一钱 硫黄一分

【用法】上为细末。每服一钱，生姜米饮调下；哕用干柿蒂汤。

【功用】定呕逆。

【主治】翻胃，膈气不下食。

23517 生姜汤

【方源】《养老奉亲》。

【异名】二仁膏（《遵生八笺》卷五）。

【组成】杏仁四两（去皮尖） 生姜六两（去皮细横切之） 甘草三分 桃仁半两（去皮尖） 盐花三两

【用法】上以杏仁、桃仁、姜湿纸同裹煨，沙盆内研极细后，入甘草、盐再研，洁器贮之。汤点服。

【主治】老人膈滞，肺疾痰嗽。

23518 生姜汤

【方源】《养老奉亲》。

【组成】生姜二两（去皮细切） 浆水一升

【用法】上和少盐，煎取七合，空心常服。

【功用】开胃进食。

【主治】老人饮食不下，或呕逆虚弱。

23519 生姜汤

《普济方》卷一〇四。即《直指》卷七“星姜汤”。见该条。

23520 生姜汤

【方源】《普济方》卷一八七。

【组成】半夏(汤七次,焙)半两 人参 前胡(去苗芦) 桂(去粗皮) 赤茯苓(去黑皮)各三两 甘草(炙)各一分 柴胡(去苗)半两

【用法】上为粗末。每服五钱,水二盏,生姜五片,大枣三枚(擘开),同煎至一盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】胸痹短气。

23521 生姜汤

【方源】《普济方》卷二四五。

【组成】生姜(和皮研)五两

【用法】上绞取汁,煎令熟。每服半合,以熟汤半盏调匀,空心服之。日午、近晚各一。

【主治】脚气。入夏取凉,或饮浆酪,停痰攻脾胃,胸满吐逆不下食,或吐清水涎沫。

23522 生姜汤

【方源】《普济方》卷三四六。

【组成】生姜一斤 淡竹叶一升

【用法】以水二升,煮取一升,去滓,分再服。

【主治】妇人产后余血不尽,血流入腰腿疼痛,胸急气满,两胁皆痛。

23523 生姜汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】半夏(法制) 生姜各等分

【用法】水煎服。

【主治】噎气。

23524 生姜汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】老生姜五钱

【用法】水煎。初服须扶开口灌。

【主治】中风闭证。

23525 生姜饮

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】生姜 大枣 甘草(微炙) 草豆

蔻(去皮) 木通各一分

【用法】上咬咀,如麻豆大。水三盏,煎至一盏半,去滓,分三服。温饮之。

【功用】治疟止渴。

【主治】疟病发渴。

23526 生姜饮

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】生姜二两(切)

【用法】以水三盏,煎取一盏半,去滓,分三温服,不拘时候。

【主治】霍乱呕哕。

23527 生姜饮

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】生姜半斤(切)

【用法】上研如泥,取自然汁,饮五分一盏。未退再服。

【主治】毒箭所伤。

23528 生姜饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】生姜汁 生地黄汁

【用法】上药各取汁半盏,相和一处,煎取七分,后下酒少许相和,温服之。

【主治】产后恶血上掩心,如见神鬼欲死。

23529 生姜饮

《普济方》卷二〇三。为方出《圣惠》卷四十七,名见《医方类聚》卷十引《神巧万全方》“生姜汤”之异名。见该条。

23530 生姜饮

【方源】《普济方》卷三六六。

【组成】南星(略炮)半两 生姜四钱 橘皮五钱

【用法】上锉。每服三钱,加紫苏五叶,水煎服。

【主治】风邪风毒,缠喉不语。

23531 生姜饮

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】生姜一两 半夏五钱 橘红三钱 藿香二钱 丁香二分

【主治】胃寒呕吐。

23532 生姜酒

【方源】方出《肘后方》卷二，名见《圣济总录》卷四十。

【组成】生姜一两（累擘破）

【用法】以酒升半，煮合三四沸，顿服之。

【主治】①《肘后方》：注痢不止而转筋入腹欲死。②《圣济总录》：霍乱转筋入腹欲死。

23533 生姜酒

【方源】《普济方》卷二六〇。

【组成】生姜汁一合 白蜜一匙 清酒倍生姜汁

【用法】上相和，温顿服之。半日乃效。

【主治】少觉不下食。

23534 生姜酒

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生姜 250 克

【用法】上药浸于 50 至 60 度酒 500 毫升中。外治。

【主治】鹅掌风。

23535 生姜散

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】生姜二两（切，焙） 陈橘皮（汤浸去白，焙） 干木瓜各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温水调下，连三五服。

【主治】霍乱吐不止，欲死。

23536 生姜散

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】生姜（切，炒）三两 蓬莪术（锉炒）一两 陈橘皮（汤浸去白，炒） 甘草（锉，炒）各二两

【用法】上为散。每服一钱匕，入盐少许，沸汤点服。

【主治】胃反，吐逆不止，心膈不利，饮食减少。

23537 生姜散

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】草豆蔻二两（去皮，白面裹煨令熟，去面） 甘草四两（炙，锉）

【用法】上为粗末，以生姜去皮半斤细切，与药末同入木臼内捣成饼子，焙干，再捣罗

为散。每服一钱匕，入盐点服，不拘时候。

【主治】胃中有寒，气逆呕哕。

23538 生姜散

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】干生姜一分 姜黄 陈橘皮（去白，焙） 白芷 白术 甘草（炙）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，用粥饮调下，不拘时候。

【功用】和胃顺气。

【主治】妊娠呕逆，不下食。

23539 生姜散

【方源】《医方类聚》卷一六四引《吴氏集验方》。

【组成】生姜 大豆（煮熟）各等分

【用法】上药搗水与服。

【功用】解附子、川乌、草乌、半夏毒。

23540 生姜粥

【方源】《证类本草》卷八引《兵部手集方》。

【组成】母生姜二斤（捣烂）

【用法】绞取汁，作拔粥服。

【功用】《长寿药粥谱》：暖脾胃，散风寒。

【主治】①《证类本草》引《兵部手集方》：反胃羸弱，不欲动。②《长寿药粥谱》：中老年人脾胃虚寒，呕吐清水，腹痛泄泻，感受风寒，头痛鼻塞，以及慢性气管炎肺寒喘咳。

【备考】《长寿药粥谱》有大枣。若用于风寒感冒，去大枣，加葱白同煮粥。

23541 生姜粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】生姜半两（湿纸裹煨熟，细切） 白面（可拌姜令足）

【用法】上将姜于面中拌和，如婆罗门粥法，于沸汤中，下煮令熟。空腹温吞之。

【主治】赤白痢及水痢。

23542 生姜粥

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】生姜（去皮细切研）一两 枇杷叶七片（拭去毛，炙，为末）

【用法】以水二升，煎至一升，去滓，用白

梗米一合煮粥，更入盐、酱汁、五味等，空心温食之。

【主治】反胃呕吐，不下食。

23543 生姜煎

【方源】《外台》卷三引《集验方》。

【组成】生姜三两（去皮，切如豆粒大）

【用法】以汤半斤和，微煎令烂。每日无问早晚，少少含，仍嚼姜滓，一时咽之。

【主治】天行病上气咳嗽，多唾粘涎，日夜不定。

23544 生姜煎

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】生姜半斤（研取汁） 白蜜十两人参末四两

【用法】入银锅子内，都搅令匀，以慢火熬成煎。每服一茶匙，以热粥饮调下，不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱，不能饮食。

23545 生姜煎

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】生姜汁一合 蜜二合 生地黄汁一升

【用法】三味相和，以微火煎如稀汤。每服一匙，和粥一盞，入煖酒二合，搅令匀，空心食之。

【主治】脾胃气弱，不能下食，黄瘦。

23546 生姜煎

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】生姜（取汁）一盞 白沙蜜三两

【用法】同煎十余沸，用瓷器盛。时时以热水调一匙头，含咽之。

【主治】口疮疼痛。

23547 生姜煎

【方源】《医统》卷七十六。

【组成】老生姜一大块（打破，湿纸包煨）

【用法】水一钟，煎半钟。热服微汗。

【主治】瘧如疟，憎寒壮热。

23548 生姜煎

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】生姜（切片，麻油煎过，为末）

【用法】煮粥调食。

【主治】反胃羸弱。

23549 生姜煎

《卫生总微》卷十四。为《千金》卷五“八味生姜煎”之异名。见该条。

23550 生姜膏

《圣惠》卷三十五。为《千金》卷六“母姜酒”之异名。见该条。

23551 生眉散

【方源】《元戎》卷十二。

【组成】桑寄生 南星 半夏 没药各一钱

【用法】上为细末。生姜自然汁调成膏子。先用自然铜擦过，次以此涂之。

【功用】生眉。

【主治】大风癰疾眉落。

23552 生眉散

【方源】方出《医方类聚》卷二十四引《急救仙方》，名见《疯门全书》。

【组成】皂角针（焙干） 新鹿角（烧存性）各等分

【用法】上为细末。生姜汁调涂眉上，一日一次。

【功用】生眉毛。

【主治】大风眉落。

23553 生眉膏

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】白花蛇 乌蛇 羊粪（炒黑） 土马鬃 半夏各等分（炒黑色）

【用法】上为细末，用生姜自然汁调匀。擦在眉上，一日涂一次。

【主治】眉毛脱落。

23554 生珠散

【方源】《普济方》卷三〇八。

【组成】生珠

【用法】上以水磨，外涂。

【主治】沙蜂叮。

23555 生珠膏

【方源】《医方大成》卷十引《幼幼方》。

【组成】天麻一分 朱砂二钱 僵蚕 白

附子(煨) 花蛇(酒浸,炙干)各二钱 全蝎二十一个 黑附子一钱(炮) 麝香半字 蜈蚣一条(酒浸) 南星一钱半(煨)

【用法】上为末,和匀,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一丸,金银薄荷汤化下。

【主治】急慢惊风。

23556 生铁酒

【方源】《济阳纲目》卷八十六。

【组成】生铁一斤 酒五升

【用法】水煎,取一升饮之。

【主治】被打,瘀血在骨节不出者。

23557 生黄散

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】生地 羌蔚 川芎各二钱 桑白皮 当归 菊花各一钱 赤芍四钱 薄荷 黄芩 黑参 白芷 木贼 防风各三钱 桔梗六钱 知母 甘草各五钱

【用法】上为细末。清茶下三钱。

【主治】胎前产后,眼内血翳流出,烂弦、羞明、云翳。

23558 生黄膏

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】牛黄膏(《永乐大典》卷九七六引《施园端效方》)。

【组成】雄黄(研) 甘草末 川甜消各一分 寒水石(生飞,研)一分 脑子一钱 绿豆粉半两 郁金末一钱

【用法】上为末,炼蜜和成膏。每服半皂子大,食后薄荷水化下。

【主治】热,及伤风疳热。

23559 生银丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】人参半两 丹砂(研) 铅霜(研) 钒藿脂 朴消(研) 升麻各一分 蓬砂(研)三钱 龙脑(研)一钱

【用法】上为末,和匀,炼蜜为丸,如皂子大。每服一丸,含化咽津。

【主治】口干咽肿,喉颊胀痛。

23560 生银丸

【方源】《幼幼新书》卷四十引《吉氏家

传》。

【组成】生银矿半两(火煨醋淬七次) 水银砂 京墨(煨) 全蝎十四个(薄荷叶裹煨,炙) 生犀屑 真珠末 麝香 板青(青黛洗下者) 轻粉 朱砂各半钱 龙脑一钱 粉霜半钱 天南星(一枚去脐,为末)一钱

【用法】上为末,薄荷叶煮面糊为丸,如鸡头子大。每服一丸,金银薄荷汤下。

【主治】小儿急慢惊风,浑身掣擗,目睛上视,喉内涎响,手足瘰癧,见人怕怖。

23561 生银丸

【方源】《普济方》卷三八七引《全婴方》。

【组成】半夏一两(姜汤泡七次) 白矾(煨)一两 寒水石(煨)六两

【用法】上为末,糊为丸,如小豆大。每服二十丸,生姜汤送下。

【主治】小儿咳嗽痰盛。

23562 生银汤

【方源】《普济方》卷三四二引《圣惠》。

【组成】生银五两 葱白三寸(切) 阿胶半两

【用法】以水一盞,同煎至七分,去银并滓,温服。若要作粥服,入糯米二合,煮为粥,服之甚佳。

【主治】妊娠惊胎不安,心神烦闷。

23563 生银散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】生银末半钱(细研) 蛇黄三分(煨,醋淬七次) 黑铅一钱(水磨) 天南星七钱(炮) 磁石一钱(煨,醋淬十次) 铁花粉二钱 朱砂一钱(水飞) 麝香一钱

【用法】上为细末。每服一字,煎犀角屑汤调下;如儿沉困者,用薄荷、乳汁调下。汗出为效。

【主治】慢惊乍静乍动,手足瘰癧,时发时止。

23564 生液丹

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】熟地二两 山茱萸 人参 生枣仁 茯神各五钱 北五味二钱 丹皮 丹参各三钱

【用法】水煎服。

【主治】燥症。肾水虚，心火旺，阴耗而思色，以降其精，则精不出而内败，小便道涩如淋而作痛。

23565 生葛散

【方源】《普济方》卷一八九引《济生》。

【组成】生葛根 小蓟根各半斤

【用法】上洗净，捣取汁。每服一盞，烫温服，不拘时候。

【主治】鼻衄不止。

23566 生硫饮

【方源】方出《本草纲目》卷十一引《直指》，名见《卫生鸿宝》卷一。

【组成】生硫黄末

【用法】老酒调下，常服之。

【主治】嗜酒，任气，血凝于气，则为气鳖；嗜酒瘤冷，败血入酒，则为血鳖；大者如鳖，小者如钱，上顷人喉，下蚀人肛，或附肋背，或隐肠腹。

23567 生筋散

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《家宝》。

【异名】生力散（《卫生总微》卷十二）。

【组成】木鳖子三个 蓖麻子三十个

【用法】上各取肉，同研。每用一钱许，津唾调贴。急抱措项上，令热贴之。

【主治】小儿疳疾后天柱骨倒。

23568 生滑汤

【方源】《普济方》卷三二一。

【组成】蒲黄一两（炒） 木通 黄芩各二两 瞿麦 滑石各半两 甘草二钱半（炒）

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盞，煎至七分，温服之。

【主治】小便秘涩血。

23569 生犀丸

【方源】《博济》卷五。

【组成】生犀半分（镑） 生龙脑半分 真麝香半分 红娘子二十个 斑猫二十一个

（去头翅，同红娘子著豆面炒焦黄为度）

【用法】上为末，用豆面糊为丸，如绿豆大。每日空心、日午、夜卧用腊茶放温酒下一丸。服至十日，加至二丸。

【功用】消毒，化结聚。

【宜忌】除淡饮烧盐外，余并忌一月，日食切忌荤腥。

23570 生犀丸

【方源】《传家秘宝》卷中。

【异名】生犀角丸（《圣济总录》卷十四）。

【组成】生犀一两（研为细末） 天麻半两 败龟半两（酥炙） 牛黄一分（别研） 茯神（去皮）一分 远志（去心）一分 人参（去芦头）一分 肉桂（去皮）一分 龙齿（酥炙黄）一分 朱砂一分（别研） 麝香半两（研） 龙脑一分（别研） 石菖蒲半两（细锉，一寸九节者） 金银箔各五十片 羚羊角半两（为末）

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，食后、临卧温水化下。或加至四丸至七丸。

【功用】聪明耳目，益精神，壮心气，镇心神。

【主治】心虚喜忘，烦躁，风涎不利，诸风颠掉，或多健忘，寢寐多惊，心常似忧，或忪或恟，往往欲倒，状类暗风，四肢颤掉，多生怯惧，每起烦躁，悲涕愁煎，并属心脏气亏。

23571 生犀丸

【方源】《证类本草》卷七引《御药院方》。

【组成】川芎十两（紧小者） 麝 脑各一分 生犀半两

【用法】川芎以粟米泔浸，三日取出，切片子，日干为末，作两料，每料入麝、脑各一分，生犀半两重，汤煮，蜜杵为丸，小弹子大。每服一丸，茶、酒嚼下。

【功用】去痰，清目，进饮食。

【加减】痰，加朱砂半两；膈壅，加牛黄一分，水飞铁粉一分；头目昏弦，加细辛一分；口眼喎斜，加炮天南星一分。

23572 生犀丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】生犀(镑) 木香 赤箭 牛膝(去苗,酒浸,微炙) 芎藭 天麻(浆水煮一日,切作片子,焙干) 草澄茄各取末二两 薤苢仁 羌活(去芦头) 威灵仙(洗去土,焙干) 酸枣仁(微炒) 补骨脂 生干地黄(焙) 干薄荷各取末三两 黄耆(锉,焙) 何首乌(米泔浸五日,竹刀子切,焙) 白花蛇(酒浸一日,去皮骨,炙黄) 甘菊花 杜仲(去粗皮,炙,锉) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙令香) 防风(去叉) 蔓荆实 桂(去粗皮) 丹砂(研) 白附子(微炮) 白芷 甘草(炙,锉)各一两 香墨一两(生用,须是年深绝好者,用二两更佳)

【用法】上为末,别入生龙脑五钱,细研于净盘中,搅拌均匀,再罗三五遍,须是匀细,炼蜜搜和得所,入臼中杵约三千下,取出,每一两分作三十丸,以麝香油涂手为丸,以瓷器内收盛。身体昏沉,鼻塞气闷,煎人参汤嚼下二十丸,日三服,不以时候;上膈不利,痰涎忽多,以龙脑、木香汤嚼下二十丸,食后、临卧,一日三服;常服茶、酒任下。

【主治】风邪客于机关,筋络缩急,肢体拘挛。

23573 生犀丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】犀角(镑屑) 芎藭 羌活(去芦头)各一两 白僵蚕(炒) 防风(去叉) 荆芥穗各半两 干蝎(炒) 白芷 藁本(去土) 龙脑(研) 麝香(研) 牛黄(研)各一分 鸡苏叶二两 天麻(酒浸一宿,锉,焙)二两(别捣为细末)

【用法】上药除天麻别捣外,先以十味捣罗为细末,再入三味研者药,炼蜜半斤,入天麻末,更入河水并真酥各少许,置于重汤内煎炼成膏,候冷和搜成剂,入臼内杵数百下为丸,如鸡头子大。每服一丸,细嚼,腊茶

清下,不拘时候。

【主治】风虚肉瞤,头目昏眩,四肢拘急,或时麻痹,旋运多痰,牙关紧痛,欠伸倦怠。

23574 生犀丸

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】犀角(镑屑) 牛黄(研)各一分 防风(去叉)半两 白附子(炮) 乌蛇(酒浸,去皮骨,炙) 天南星 干姜(炮) 丹砂(研) 没药(研) 半夏(汤洗二十四遍) 龙脑(研) 乳香(研) 桂(去粗皮)各一分 当归(锉,焙)半两 麝香(研)半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心酒下。

【主治】耳中策策疼痛。

23575 生犀丸

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】犀角(镑) 枳实(去瓢,麸炒) 射干 海藻(洗去盐,焙) 升麻各一两 白附子(炮)半两 百合 胡黄连 蒺藜子(炒)各三分 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,研)三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,绵裹咽津,不拘时候。

【主治】马喉痹。脾肺不利,热毒攻冲,发于咽喉,热冲喉间,连颊肿,数出气,烦满。

23576 生犀丸

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】荆芥穗 大黄各一两 甘草 川芎各半两 薄荷叶七钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每两作十丸。每服二丸,食后细嚼,温水送下。

【主治】目赤肿痛隐涩,眵泪生疮。

23577 生犀丸

【方源】《幼科类萃》卷六。

【异名】生犀角丸(《医统》卷八十八)。

【组成】犀角 真珠 防风 羌活 天竺黄 茯神各三钱 大黄(煨) 甘草(炙)各二钱 朱砂(水飞)一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如黄豆大。用薄荷汤研化，入麦门冬（去心），不拘时候服。冬至、立夏前宜服。

【功用】解散风热，清心肺，利咽喉。

【主治】《幼科折衷》：小儿风热，邪风客于皮毛，入脏腑。呵欠面赤，恶风发热，汗出，目涩，多睡。

23578 生犀汤

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】生犀角（镑）三分 贝齿（生用，先捣后研）一两 羚羊角（镑）一两半 升麻一两三分（生用）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，食后去滓服，日二夜一。

【主治】诸风毒气，身体疼痛，面目暴肿，肿连手足。

23579 生犀饮

《普济方》卷四。为《小儿药证直诀》卷下“生犀散”之异名。见该条。

23580 生犀饮

《圣济总录》卷一〇三。为《圣惠》卷三十三“犀角散”之异名。见该条。

23581 生犀饮

【方源】《幼幼新书》卷二十引《吴氏家传》。

【组成】羚羊角 地骨皮 紫菀 麦门冬（焙） 秦艽 大黄（生） 枳壳（麸炒） 柴胡 茯苓 赤芍药 人参 桑白皮 黄耆 羌活 半夏曲（炙黄） 鳖甲（醋炙，再糖醋炙焦）各一分

【用法】散一钱，水一盞，煎五分，食后夜卧温服。儿五岁内服半钱。

【主治】儿十岁内肌体烦躁，或食桃杏酸热类，或伤寒后肌热羸瘦，或食羊肉令儿体热，或作骨蒸瘦瘵，潮热颊赤，口干，五心烦躁，食不生肌，盗汗，伏卧食泥，一切蒸热。

23582 生犀饮

【方源】《普济方》卷六十三引《杨氏家藏方》。

【组成】大黄 盆消各二两 荆芥 薄荷

甘草各一两

【用法】上为粗末。水煎，食后服；或为末，蜜水调下。

【主治】脾肺积热，脏腑积滞，咽喉肿痛，痰嗽不利。

23583 生犀饮

《婴童百问》卷六。为《袖珍小儿》卷四“生犀散”之异名。见该条。

23584 生犀饮

【方源】《温疫论》卷二。

【异名】生犀散（《医学集成》卷二）。

【组成】犀角二钱（镑） 苍术（泔浸油炒） 川连各一钱 黄土五钱 界茶叶一大撮 金汁半盞

【用法】水煎，去滓，入金汁搅和。日三夜二服。

【主治】瓜瓤瘟。胸高肋起，呕血如汁。

【加减】虚，加盐水炒人参；大便结，加大黄；渴，加栝楼根；表热，去苍术、黄土，加桂枝、川连；便瘀血，去苍术，倍黄土，加黄柏；便滑，以人中黄代金汁。

【备考】《医学集成》有花粉，无茶叶，金汁作“人中黄”，用法为散服。

23585 生犀饮

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】生犀角二钱 羚羊角一钱 防风一钱 黄芩一钱 桔梗一钱五分 知母一钱 茯苓一钱 人参一钱

【用法】上为粗末。以水二盞，煎至一盞，食后去滓温服。

【功用】清热。

【主治】伤寒病后患目疾，因余热未清，过食辛热，两热合邪，以致瞳仁散大，时见黑花，隐涩泪多，红肿疼痛。

23586 生犀散

【方源】《局方》卷十。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》卷一七七）。

【组成】大黄（蒸，切，焙） 鳖甲（汤煮，

去裙襖，醋涂炙黄）麦门冬（去心）黄耆 秦艽（去苗并土）羚羊角（镑）桑白皮（锉）人参 茯苓（去皮）地骨皮（去土）赤芍药 柴胡（去苗）枳壳（去瓢，麸炒）各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，入青蒿少许，煎至六分，去滓温服。儿小即分为二服。

【主治】小儿骨蒸肌瘦，颊赤口干，日晚潮热，夜有盗汗，五心烦躁，四肢困倦，饮食虽多，不生肌肉；及大病瘥后，余毒不解；或伤寒病后，因食羊肉，体热不除。

23587 生犀散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】犀角二两（镑屑，生用）桔梗二两（生用）

【用法】上二味，捣罗为散。每服二钱匕，暖酒调下。

【主治】吐血似鹅鸭肝，昼夜不止。

23588 生犀散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】生犀汤（《普济方》卷四〇〇）。

【组成】生犀二钱（锉末）地骨皮（自采佳）赤芍药 柴胡根 干葛（锉）各一两 甘草（炙）五钱

【用法】上为粗末。每服一二钱，水一盏，煎至七分，食后温服。

【功用】《古方新解》：镇肝，除心热，

【主治】小儿阴虚，血分有热，或兼感外邪，日晡潮热，夜有盗汗，五心烦热，形体羸瘦，口干颊赤者。

①《小儿药证直诀》：目淡红，心虚热。②《保婴集》：虚热潮作，亦治伤寒壮热及余热。③《卫生宝鉴》：小儿骨蒸，肌热瘦悴，颊赤口干，日晚潮热，夜有盗汗，五心烦热。④《普济方》：小儿癆瘵。⑤《幼科发挥》：风热。

【方论选录】《小儿药证直诀释义》：此方以犀角为主，凉血清心；地骨皮退其虚热；赤芍柔肝敛阴；又加干葛、柴胡散外来之邪；甘

草和中解毒。对血分热毒兼有阴虚而又夹外邪者颇为适宜。

23589 生犀散

【方源】《小儿药证直诀·附方》。

【组成】生犀（凡盛物者，皆经蒸煮，不甚用，须生者为佳）不拘多少

【用法】上药于湿器物中，用新水磨浓汁，乳食后，微温饮一茶脚许。

【功用】消毒气，解内热。

【主治】疮疹不快，吐血衄血。

【方论选录】《小儿药证直诀笺正》：此热甚而痘不能透，火焰上涌，致为血溢，故以清心泄热为主。聚珍本谓消毒气，固亦指痘疹热毒言之，其意可通。

23590 生犀散

【方源】《本事》卷六。

【组成】皂角针不计多少（粗大色紫者）

【用法】上藏瓶中，盐泥固济，炭火烧过存性，放冷，碾出为末。每服一钱，薄酒微温调下；暑月用陈米饮下。

【功用】托里排脓。

【方论选录】《本事方释义》：皂角针气味辛咸温，入手太阴、阳明、足厥阴。此方因发背未能有脓，用之托里排脓；薄酒调送，欲药性之直入患处也。暑月不用酒者，恐犯古人所云疮家不可发汗之意。

【备考】本方方名，《准绳·疡医》引作“托里排脓生犀散”。

23591 生犀散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】大黄半两（湿纸裹煨，令熟）山梔子半两（微炒）甘草（炙）当归（去芦头）连翘 防风（去芦头）各一两 生犀角二钱半（镑）

【用法】上为细末。每服二钱，食后温酒调下；或因饮酒时，每饮一杯，入药半钱。

【主治】一切风热，毒气攻注，遍体生疮。

23592 生犀散

【方源】《普济方》卷三七四引《卫生家

宝》。

【组成】五灵脂一两 猪牙皂角一两(灰炒黄色) 芫花一两(醋浸,炒焦)

【用法】上为末。次用巴豆六十粒,连壳研如膏,用小钱挑药四十钱,入巴豆内,一处再碾万百碾,令极匀,用醋糊为丸,如粟米大。周岁四粒,食后、临卧薄荷汤下,日二服。惊吐,丁香汤下,或淡醋汤下;咳嗽,皂角子煨软,捶,泡汤下;白痢,甘草姜汤下;潮热,薄荷磨刀水下,惊热,亦用此汤下;磨积及癖块,温水下。

【功用】镇心安神。

【主治】惊积潮热,及五心积热,及惊吐,或伤乳食,眠睡不静。

23593 生犀散

【方源】《医方类聚》卷一五七引《施圆端效方》。

【组成】升麻二两 郁金半两 大黄 甘草各一两

【用法】上为细末。每服三钱,水一盞半,煎至七分,和滓温服,不拘时候。

【主治】一切积毒伏热,吐血衄血,呕咳咯血,伤寒杂病下血。

23594 生犀散

【方源】《得效》卷八。

【异名】生犀角散(《普济方》卷二三六)、正料生犀散(《济阳纲目》卷六十五)。

【组成】犀角(镑) 地骨皮(去骨) 秦艽(去芦) 麦门冬(去心) 枳壳(煨,去瓤) 大黄(煨) 柴胡(去须) 茯苓(去皮) 赤芍药 桑白皮(去赤) 黄耆(去芦,蜜炙) 人参(去芦) 鳖甲(醋炙) 知母各等分

【用法】上锉散。每服三钱,陈青蒿一根煎;桃枝亦可。

【主治】骨蒸肌瘦,颊赤口干,日晚潮热,夜有盗汗,五心烦躁,及大病愈后,余毒不解;小儿疳病,热似骨蒸者;及久病后或虚后,时复来作潮热者;疟疾亦用。

【加减】有痰,加半夏;热轻,去大黄,加黄芩。

23595 生犀散

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】生犀角屑 黄柏各二两 黄连 苦参各二两

【用法】上为散。以糯米煮作饮,每日空腹服一服,下日再服。

【主治】脓血痢,无问伤冷伤热。

23596 生犀散

【方源】《袖珍小儿》卷四。

【组成】杏仁三钱(去尖皮) 桔梗二钱 茯苓一钱 前胡一钱半 人参一钱 半夏二钱 五味子一钱半 甘草一钱

【用法】上锉散。每服二钱,加生姜、薄荷,水煎服。

【功用】《准绳·幼科》:解时气。

【主治】咳嗽,痰逆喘满,心忪惊悸,风热。

【加减】有热,加羌活或加麻黄。

23597 生犀散

【方源】《袖珍小儿》卷四。

【异名】生犀饮(《婴童百问》卷六)。

【组成】地骨皮 秦艽 人参 羚羊角 大黄 麦门冬(去心) 枳壳 柴胡 茯苓 赤芍药 桑白皮 鳖甲(炙)各等分

【用法】上锉散。每服二钱,入青蒿少许,水煎服。

【主治】小儿骨蒸肌瘦,颊赤口渴,日夜潮热,夜有盗汗,五心烦热,四肢困倦,饮食虽多不生肌肉;及大病后余热不解,或伤寒病瘥后因食羊肉体热不除;亦治疳劳。

23598 生犀散

【方源】《医部全录》卷四五一。

【组成】犀角屑 鳖甲(酥炙) 柴胡 知母 地骨皮 胡黄连各一钱 大黄 桃枝各半钱

【用法】上锉散。每服二钱,水一盞,煎五分,去滓服,不拘时候。

【主治】小儿骨蒸潮热,盗汗肌瘦。

23599 生犀散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生犀角一两 麻黄一两 石膏三两 羌活一两 当归二两 人参一两 甘草五钱 葛根一两 赤芍一两

【用法】上为散。每服五钱，水煎去滓，入姜汁一匙，温服。

【主治】孕妇卒中风不语，脉浮数者。

【方论选录】妊娠风热，闭遏经气不通，故卒然仆倒，不能言语，胎孕其何以能安？生犀角清心胃之火；石膏清阳明之火；麻黄开发肌表以散邪；羌活疏通经络以逐邪；人参扶元补气，善通血脉；当归养血益营，能荣经脉；葛根升阳散热；赤芍泻火利营；甘草缓中以泻火也。为散，水煎入姜汁，以散豁痰涎，务使风火两除，则经气清和而神机开发，痰涎自化，胎孕必得所养，何忧卒中风之不能言语哉！

23600 生犀散

《医学集成》卷二。为《温疫论》卷二“生犀饮”之异名。见该条。

23601 生鲈泥

【方源】《中国接骨图说》卷四。

【组成】生鲈鱼 砂糖

【用法】上药杵成泥，研匀。敷痛处。

【主治】打扑伤。

23602 生新汤

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】人参二钱 当归五钱 地榆三钱 生地五钱 三七根末三钱

【用法】水煎服。

【主治】下血之症，多因好酒成病。

【方论选录】此方之妙，全在不去治酒病，亦不去治血病。全以生地、当归活其血，血活则新血生而旧血止。况又佐以地榆之寒，以去大肠之火，又佐以三七之末，以杜塞大肠之窍，自然血止而病愈矣。此敛之一法也。

23603 生漆丸

【方源】《直指》卷二十五。

【组成】正料平胃散

【用法】上用好生漆为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空腹温酒送下。加至一百丸。

【主治】蛊毒。

【备考】本方方名，《医统》引作“平胃生漆丸”。

23604 生漆汤

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】生地黄汁一升（如无，用生干地黄三两半） 大黄二两（锉） 犀角半两 桃仁三十个

【用法】用水三升，好酒一升，慢火熬及三升，倾出，滤去滓，再入锅内，点生光漆两半，再熬至二升，即住火，净滤去滓，放冷，分作三服。每投一服，候半日许，血未下再投一服，候血下即止后服。如无生地黄汁，更添水一升，同煎。

【主治】①《伤寒微旨论》：蓄血症。病人七八日后，两手脉沉细而数，或关前脉力大，脐下满，或狂走、或喜忘、或谵语者，不大便，小便自利，病人年少气实，血凝难下者。②《医编》：蓄血症，多漱水不咽，小便利，大便黑，蓄于下，则脐腹肿痛，或如狂谵语，发黄。

23605 生漆膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】阿魏一两 生漆（滤过） 木耳各四两 蜂蜜六两

【用法】入锡罐内，密封罐口，置锅内，水煮三炷香久，取起候冷。每服二茶匙，食远烧酒调下，一日三次。

【主治】男女痞块。

【宜忌】忌油腻发毒物。

23606 生葱汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】熟地一两 山茱萸四钱 远志二钱 生枣仁五钱 柏子仁（去油）五钱 茯神三钱 人参三钱 菖蒲五分 白芥子二钱

【用法】水煎服。连服一月，自然不忘矣。

【主治】心肾不足，老年健忘，近事多不记

忆, 虽人述其前事, 犹若茫然。

【备考】此方心肾兼补, 上下互资, 实治健忘之圣药。苟能日用一剂, 不特却忘, 并有延龄之庆矣。

23607 生熟水

【医方集解】。为《增补内经拾遗》卷三引《易简》“阴阳汤”之异名。见该条。

23608 生熟汤

【方源】《肘后方》卷四。

【异名】阴阳水(《医林纂要》卷四)。

【组成】先作一升汤, 投水一升。

【用法】食盐三合, 以此汤送之; 须臾欲吐便滴出; 未尽, 更服三合; 饮汤二升后, 亦可更服汤, 不复也。

【主治】胸中多痰, 头痛不欲食, 及饮酒则瘀阻痰。

【方论选录】《医林纂要》: 霍乱吐泻, 外来之寒热争也。其证多得于暑, 暑伤气, 而清凄之气复抑之则争, 又或相火为清寒所遏, 则亦有, 然争于上焦则吐, 争于下焦则泻, 争于中焦则上吐下泻, 或郁而不得吐泻, 非必如张子和风湿三气合邪之说。熟盐以补心去瘀血, 暑邪所争, 气壅血瘀, 筋枯而急, 非熟盐不足以软之。此和阴阳、济水火之妙方, 水火济则阴阳和, 非分其阴阳之说。试思沸汤与井水既合, 能复分别之乎? 此与喻氏听胃气之自为敷布者, 同为未可以通也。

23609 生熟饮

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】厚朴二寸(一寸生, 一寸炙) 甘草二寸(一寸生, 一寸炙) 草果二枚(一枚生, 一枚炮熟) 生姜二两(一两生, 一两煨)

【用法】上咬咀。作一服, 水一大碗, 好枣七枚, 擘破, 煎至一盞, 去滓, 食前服。

【主治】疟疾。

23610 生熟饮

【方源】《直指》卷十二。

【组成】草果 肉豆蔻各二个(一煨、一

生) 川厚朴(方寸许)二片 生姜二块(半生, 半湿, 纸裹煨) 甘草二寸(半生、半炙)

【用法】上为散, 分二服, 每服一碗水, 加大枣两个, 乌梅一个, 煎至一半, 空心服。

【主治】脾寒发疟, 寒多热少。

23611 生熟饮

《中国医学大辞典》。为《妇人良方》卷二十一“生熟饮子”之异名。见该条。

23612 生熟散

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】草乌头二个(一生一炮)

【用法】上为末, 生姜自然汁和匀为丸, 如鸡头子大。每服一丸, 用蜜汤化下。

【主治】伤寒结胸硬痛。

23613 生摩膏

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】甘草 防风(去芦并叉枝)各一两 白术二十铢 雷丸二钱半 桔梗(去芦)二十铢

【用法】上咬咀。以猪脂肪一斤, 煎油入药, 微火上煎之良久, 视稠浊得所, 膏成, 乃去滓为丸, 如弹子大。每服一粒, 炙手摩儿百遍, 寒者更热, 热者更寒。小儿无病, 早起常以摩肉上及手足心, 甚辟风寒之邪。

【主治】新生儿肌肤幼弱, 为风邪所中, 身体壮热, 手足惊掣。

23614 生獐散

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷八引《类聚》。

【组成】生獐一个(取四足脐尾嘴并两耳)

【用法】上烧存性, 为末, 油调。先洗疮, 后涂之。

【主治】瘰癧溃与未溃。

23615 生髓丹

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】熟地二两 元参一两 麦冬 沙参 菊花各五钱 五味二钱

【主治】痿证, 胃火上冲。

23616 生木瓜丸

【方源】《直指》卷四。

【组成】宣州生木瓜(就蒂切一盖,取出瓢,以生艾叶塞满,合盖,竹针插定,蒸透去艾,其木瓜去皮研烂)

【用法】上入五积散末为丸,如梧桐子大,晒干。每服七十丸,食前醇酒下。

【主治】脚气。

23617 生木瓜汤

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】生木瓜一斤(不计个数,去皮瓢称,于砂盆内磨肉并浆) 生姜三两(去皮,砂盆内同磨) 盐六两(炒) 甘草三两 肉豆蔻一分 益智仁三铢 白芷 丁香 桂缩砂 檀香各三铢

【用法】上为细末,与生姜、木瓜、盐同研匀,令得所,以干净埧罐子盛之。旋旋以白汤点服。

【功用】消食和气。

23618 生牛膝酒

【方源】《千金》卷三。

【异名】单行生牛膝酒(《千金翼》卷六)。

【组成】生牛膝五两

【用法】酒五升,煮取二升,去滓,分二服。若用干牛膝根,以酒渍之一宿,然后可煮。

【主治】产后腹中苦痛。

23619 生甘草膏

《圣惠》卷八十三。为《千金》卷五“五物甘草生摩膏”之异名。见该条。

23620 生石斛酒

【方源】《外台》卷十七引《延年秘录》。

【组成】生石斛三斤(捶碎) 牛膝一斤 杜仲八两 丹参八两 生地黄(切)三升(晒令干)

【用法】上切,以绢袋盛,以上清酒二斗,入器中渍七日。每食前温服三合,日三夜一服。加至六七合至一升。

【功用】利关节,坚筋骨,令强健悦泽。

【主治】风痹脚弱,腰膝疼冷。

【宜忌】忌茺萸。

23621 生四物汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】全当归一两(生) 生白芍三钱 生地三钱 乌梅肉五个(去壳) 怀牛膝三钱

【功用】养血敛肝,导滞。

【主治】血虚胁痛而为癖为块者。

23622 生四物汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】当归身五钱(生) 白芍三钱(生) 地黄五钱(生) 川大黄三钱(酒渍) 花粉三钱 皂刺三钱(捣) 金银花三钱

【用法】水煎服,专用头汁。二剂、三剂皆可。

【主治】疮证初起,大热大渴,烦躁痞满,大便秘,小便涩,属实证者。

【方论选录】《医门八法》:生四物汤去川芎加大黄,盖阳毒炽盛,由于内热熏蒸,釜底抽薪,胜于决痈去毒,往往一泻而烦渴止,红肿消,不出脓而疮已愈。即不能全消,而热势既微,则毒气自轻,此以泻为功者也。或于前方中加二花以解毒,加花粉以止渴,加皂刺引药力以达于患处,皆甚相宜。迨至脓出之后,自能生肌敛口,不必服药矣。

23623 生四物汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】白芍三钱(生) 生地三钱 川芎二钱 知母三钱 黄芩三钱(生) 当归身五钱(生)

【主治】血热经早。

23624 生半夏丸

【方源】《医方类聚》卷一一八引《澹寮》。

【组成】半夏(汤泡七次)一两 槟榔一钱 丁香一钱

【用法】上为细末,生姜自然汁煮薄糊为丸。每服三十丸,食后姜汤吞下。一法小铍内泔令熟,倾入盏内,小匙挑服,仍吸其汁咽之。

【功用】化痰利膈。

【主治】呕吐。

23625 生半夏汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】半夏不拘多少(洗七遍,切作片)

【用法】每服称三钱,水一盏半,入生姜五大片,同煎至一盏,和滓食后服,一日二三服。服三日毕,再服枳术丸,尽其痰为度。

【主治】湿痰咳嗽。

23626 生发软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄 15 克 硫黄 15 克 凤凰衣 15 克 穿山甲(炮制) 9 克 滑石粉 31 克 生猪板油 31 克 鲜猪苦胆一个

【用法】以上前五味中药,共研为细末,用猪板油、猪苦胆汁调和药末,捣如泥即成。用时纱布包好,轻轻用力揉抹患处,每日二至三次。

【主治】斑秃。

23627 生发须膏

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】附子 荆实各二两 松叶 柏叶 各三两 乌鸡脂三合

【用法】上咬咀,合盛新瓦瓶中,阴干。百日出,捣以马鬃膏,和如薄粥,涂头发如泽法,裹絮中,无令中风。三十日长。

【功用】生发。

23628 生地制散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地三两 熟地三两 黄耆三两(蜜炙) 麦冬三两(去心) 白芍二两(炒) 条芩两半 地骨皮二两 甘草五钱 枸杞三两

【用法】上为散。水煎六钱,去滓温服。

【主治】孕妇吐血、衄血,脉软数者。

【方论选录】妊娠血气两亏,挟热而络脉暗伤,营行失度,故吐血、衄血不止焉。生地滋阴壮水以凉血,黄耆补气生血以摄血,熟地补阴滋血,麦冬润肺清心,条芩清热安胎,

白芍敛阴止血,地骨皮清肌退浮热,枸杞子补肾填精血,甘草缓中以泻火热也。水煎温服,使血气内充,则虚火自退,而经府肃清,何有吐血、衄血之患,胎孕无不自安矣。

23629 生地黄丸

【方源】方出《千金》卷四,名见《千金翼》卷五。

【异名】地黄丸(《圣济总录》卷一五三)。

【组成】生地黄三十斤(取汁) 干漆一斤(为末)

【用法】上以漆末纳地黄汁中,微火煎令可丸,如梧桐子大。每服三丸,食后酒送下。不知加之。

【主治】月经不通,脐下坚结,大如杯升,发热往来,下痢羸瘦,此为血瘦。

【宜忌】生肉瘰者不可用。

【方论选录】《千金方衍义》:生地黄得干漆灰则寒而不滞,干漆灰得生地黄则威而不猛,真破瘰之专药。但须审元气可任者用之。

23630 生地黄丸

【方源】《外台》卷十七引《广济方》,名见《普济方》卷二二七。

【组成】生干地黄十二分 天门冬十分(去心) 干姜六分 菟丝十分(酒渍二宿,焙干,别捣) 石斛八分 当归六分 白术六分 甘草八分(炙) 肉苁蓉七分 芍药六分 人参八分 玄参六分 麦门冬十分(去心) 大黄八分 牛膝六分 紫菀六分 茯苓八分 防风六分 杏仁八分(去皮尖,熬) 麻子仁八分 地骨皮六分 椒三分(去目汗)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空腹酒送下,每日二次,渐加至三十丸。

【功用】补益养精,使人体润,多情性。

【主治】五劳、七伤、六极、八风、十二痹,消渴,心下积聚。

【宜忌】忌鲤鱼、海藻、菰菜、桃、李、雀肉、大酢、葱、茺荑等。

23631 生地黄丸

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】生干地黄 知母 栝楼根 乌梅肉(微炒) 麦门冬(去心,焙) 土瓜根 五味子各一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小弹子大。食后及夜卧时以绵裹含一丸,咽津。

【主治】虚劳烦渴,津液竭绝。

23632 生地黄丸

《鸡峰》卷十九。为《千金》卷二十一“地黄丸”之异名。见该条。

23633 生地黄丸

《妇人良方》卷六。为《本事》卷十“地黄丸”之异名。见该条。

23634 生地黄丸

【方源】《直指》卷二十。

【组成】人参 防风各半两 当归 川芎 生地黄 干白蒺藜(炒,去刺)各一两 全蝎五尾

【用法】上晒,为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后薄茶送下。

【功用】明目活血,消去瘀肉。

【加减】加羚羊角半两尤佳。

23635 生地黄丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】生地 黄耆各两半 防风 鹿茸 茯神 远志 瓜蒌仁 黄芩各一两 人参一两二钱半 当归五钱 赤芍 蒲黄 戎盐各七钱半 炙草七钱 车前子 滑石末各二两

【用法】蜜为丸服。

【主治】肾虚劳淋。

23636 生地黄丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】生地 黄甘菊 防风 枳壳 决明子 石决明 白芍 茯神

【主治】肝虚,眉棱骨痛。

23637 生地黄汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】生地黄十两 竹叶四升 黄芩 黄耆 甘草(炙) 茯苓 麦门冬(去心)各

三两 升麻 前胡 知母 芍药各二两 瓜蒌四两 大枣二十枚(去核) 当归一两半 人参一两

【用法】先以水一斗五升,煮竹叶,取一斗,去叶,纳诸药,煮取三升六合,分为四服,日三夜一。

【主治】发背,发乳,痈疽,虚热大渴。

23638 生地黄汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】生地黄五两 人参 甘草 黄耆 芍药 茯苓各三两 当归 芎藭 黄芩 通草各二两 大枣二十枚 淡竹叶(切)三升

【用法】先以水二斗,煮竹叶,取一斗五升,去滓,纳诸药,再煮取四升八合,一服八合,日三夜二,能顿服为佳。

【主治】痈疽虚热。

23639 生地黄汤

【方源】《外台》卷三引《删繁方》。

【组成】生地黄(切)一升 黄芩三两 桂心二两 甘草二两(炙) 竹叶(切)一升(洗) 香豉一升(绵别裹) 菡心一升 芒消三两 尖鼠屎三七枚 干葛一两 麻黄三两(去节) 石膏八两(碎,绵裹)

【用法】上切。以水九升,煮取三升,去滓,下芒消,分三服。

【主治】天行七日至二七日,脏腑阴阳毒气,天行病欲歇而未歇,或因饮食劳复,心下胀满,烦热。

【宜忌】忌茺萸、海藻、菰菜、生葱等。

23640 生地黄汤

【方源】《外台》卷三引《删繁方》。

【异名】生地黄煎(《圣惠》卷十七)。

【组成】生地黄汁一升 生麦门冬汁一升 赤蜜一升 人参二两 白术三两 桂心一两 甘草二两(炙) 生地骨皮四两 升麻三两 石膏八两(碎,绵裹) 菡心一升

【用法】上切细,以水九升煮诸药味,取二升,去滓,下地黄汁,更煎三两沸。分温五服,昼四夜一服。

【主治】天行二七日至三七日不歇，或寒或热，来去噤噤，四肢羸瘦，饮食不能，腹中虚满，热毒不安。

【宜忌】忌茺萸、生葱、海藻、菰菜、桃、李、雀肉等物。

23641 生地黄汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】生地黄五两 生姜三两 大黄芍药 茯苓 细辛 桂心 当归 甘草 黄芩各一两半 大枣二十枚

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取二升半，去滓，分三服，一日三次。

【主治】①《千金》：产后三日至七日，腹中余血未尽，绞痛强满，气息不通。②《圣济总录》：妊娠胎气损动，气血不调，或颠扑闪坠，因致胎堕，谓之半产；及产后气血不和，恶滞不尽，腹中疝痛。

【方论选录】《千金方衍义》：（此方为）前大黄汤之变方。大黄、芍药、当归、甘草、生姜等味俱出大黄汤。其用桂心、细辛，即大黄汤中吴茺萸之意；黄芩、茯苓即大黄汤中牡丹之意。大枣佐黄芩以和寒热也，方下虽不言寒热，而用黄芩、姜、枣之意可推。

23642 生地黄汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】生地黄五两 甘草 黄连 桂心各一两 大枣二十枚 淡竹叶二升（一作竹皮） 赤石脂二两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮竹叶，取七升，去滓纳药，煮取二升半，分三服，一日三次。

【主治】产后忽着寒热下痢。

【方论选录】《千金方衍义》：方下言忽著寒热下痢，是饮食中寒热交进，或饱食后脐腹受冷，饮食不化而蕴热，与外感之寒热无预也。方中桂心专治本寒，黄连专化蕴热，淡竹、地黄专行清热，甘草、大枣专于和中，石脂一味专固下焦之脱也。

23643 生地黄汤

【方源】《千金》卷四。

【异名】地黄散（《圣惠》卷七十三）、地黄饮（《圣济总录》卷一五二）。

【组成】生地黄一斤 细辛三两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取六升，服七合。

【主治】崩中漏下，日去数升。

【方论选录】《千金方衍义》：此治风入胞门，蕴化为火而崩漏无度。故专用地黄以滋阴室之热，细辛以散厥阴之风，风散则火熄而血自安矣。以有细辛之辛散，故无藉于酒煮也。

23644 生地黄汤

【方源】《千金》卷五。

【异名】生地黄散（《普济方》卷三八六）。

【组成】生地黄 桂心各二两（一方有芍药、寒水石、黄芩、当归、甘草各半两）

【用法】上㕮咀。以水三升，煮取一升。期岁以下服二合，以上三合。

【主治】小儿寒热进退，啼呼腹痛。

【方论选录】《千金方衍义》：热邪入犯营血则寒热进退，故用生地黄专治；血热则兼桂心以行地黄之滞，寒热兼济之妙无逾于此。又方合黄芩汤则专主太阳少阳合病，更加寒水石以治心胃之火，当归以散肝脾之热也。

23645 生地黄汤

【方源】《千金》卷六。

【异名】地黄汤（《圣济总录》卷一四四）、生干地黄散（《普济方》卷三一九）

【组成】生地黄八两 黄芩一两 阿胶二两 柏叶一把 甘草二两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取三升，去滓纳胶，煎取二升半，分三服。

【主治】①《千金》：衄血。②《圣济总录》：因坠堕内损，大小便下血，经久不尽；打扑损伤肺气，或咳嗽有血，或吐血。

23646 生地黄汤

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷一八八。

【组成】地黄汁五合

【用法】煮取四合，空腹服之，且服梗米饮。

【主治】鼻衄，崩漏，小儿热病。

①《千金》：鼻衄。②《圣济总录》：妇人月水连绵不绝。③《普济方》：小儿热病，烦渴头痛，壮热不止。

【宜忌】忌酒、炙肉。

【临证举例】《朱氏集验方》：予在汝州时，因出验尸，有保正赵温，不诣尸所，问之即云：衄血已数斗，昏困欲绝。予使人扶掖以来，鼻血如檐溜，平日所记治衄数方，旋合药治之，血势皆冲出。予谓治血者莫如地黄。试遣人四散寻生地黄，得十余斤，不暇取汁，因使之生吃，渐及三四斤，又以其滓塞鼻，须臾血定。又癸未岁，予妇吐血，有医者教取生地黄自然汁煮饮之，日服数升，三日而愈。有一婢，病经血半年不通，见釜中饮汁，以为弃去可惜，辄饮数杯，随即通利。地黄活血，其功如此。地黄但用新布拭净捣汁，勿用水洗。

23647 生地黄汤

【方源】《千金》卷九。

【组成】生地黄三斤 大黄四两 大枣二枚 甘草一两 芒消二合

【用法】上药合捣，令相得。煮五升米下，熟，绞取汁，分再服。

【主治】伤寒有热，虚羸少气，心下满，胃中有宿食，大便秘利。

【方论选录】《千金方衍义》：于调胃承气汤方中加生地黄以滋血，兼取大枣以行脾气而散心腹之邪也。

23648 生地黄汤

【方源】《千金》卷十二。

【组成】生地黄一斤 大枣五十枚 阿胶甘草各三两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取四升，分四服，日三夜一。

【主治】忧恚呕血，烦满少气，胸中痛。

【方论选录】《千金方衍义》：方下虽治忧恚

呕血，而实肺沮吐血之的方。酒气逆满则肝浮胆横，每致动肝悖乱。生地黄治伤中血痹，阿胶主心腹内崩，甘草和脏腑寒热，大枣养胃气安中，藉此以统地黄归就丹田，以资少阳生发之气也。

23649 生地黄汤

【方源】方出《千金》卷十九，名见《普济方》卷三十三。

【组成】生地黄汁二升 麦门冬汁 赤蜜各一升 竹沥一合 石膏八两 人参 芎藭 桂心 甘草 黄芩 麻黄各三两 当归四两

【用法】上咬咀。以水七升，先煮八味，取二升，去滓，下地黄等汁，煮取四升，分四服，日三夜一。

【主治】精极，五脏六腑俱损伤；虚热，遍身烦痛，骨中痠痛，烦闷。

【方论选录】《千金方衍义》：此治精伤而热溢于外，血肉气衰邪热泊于肌表，虽用地黄、芍药、竹叶、麦冬、黄芩、赤蜜之属，不得麻、桂发越郁郁，不能宣通表热以救烦疼；但内蕴之火不过借麻黄之开泄，又须甘草、石膏以化本热，故越婢汤中用之；用人参者，因麻黄转伤肌表之气，不得不以填补为务也。

23650 生地黄汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】生地黄 人参 知母 桂心 厚朴（炙） 甘草（炙）各二两 赤小豆三升

【用法】上咬咀。以水二斗五升，煮地黄取一斗，去滓纳药，煎取三升，分为三服。

【主治】产后虚损少气。

23651 生地黄汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】生地黄八两 竹叶三升 小麦二升 栝楼四两 大黄五两 人参 当归各一两 黄耆 黄芩 通草 升麻 芍药 前胡 茯苓 甘草（炙）各二两

【用法】上咬咀。以水二升，煮竹叶、小麦，取一斗二升，去滓纳诸药，煮取四升。分四服，日三夜一。不愈，常服。

【主治】大热体盛发痢，或在于背，或在阴处。

23652 生地黄汤

【方源】《外台》卷三十四引《广济方》。

【异名】丹参汤（《圣济总录》卷一六〇）、地黄汤（《普济方》卷三四六）。

【组成】生地黄汁一升 芍药 甘草各二两（炙） 丹参四两 蜜一合 生姜汁半合

【用法】上切。以水三升，煮取一升，去滓，纳地黄汁、蜜、姜汁，微火煎一两沸，服三合，日二夜三。利一两行，中间进食，与药更进服。

【主治】①《外台》引《广济方》：产后三日，患腰疼，腹中余血未尽，并手脚疼，不下食。②《普济方》：血晕。

23653 生地黄汤

《圣济总录》卷九。为《圣惠》卷二十“生地黄饮子”之异名。见该条。

23654 生地黄汤

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】生地黄（研，取汁） 竹沥 荆沥各一升 羌活（去芦头） 防风（去叉）各三两 附子一枚重者（炮，去皮脐，别破之）

【用法】上药除前三味外，余三味锉如麻豆。每服三钱匕，水一盞半，地黄汁、竹沥、荆沥各少许，同煎数沸，去滓，取一盞，温服，不拘时候。

【主治】热痹。

23655 生地黄汤

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】生地黄汁一升 当归（切，焙） 甘草（炙） 白石英（碎，绵裹） 人参各一两 附子（炮裂，去皮脐）一两 白豆小者二十粒 白鸡一只（男用雌，女用雄，治如食法）

【用法】上药除地黄汁、鸡外，锉如麻豆。以水一斗五升，先煮鸡，取七升汁，去鸡纳地黄汁、诸药等，煮取三升，去滓，每服一

盞，日三夜二。

【主治】肺病。

23656 生地黄汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】生地黄半两 甘草（炙）一分 地榆三分

【用法】上咬咀，如麻豆大。水二盞，煎至一盞，去滓，分温二服，空心，日晚再服。

【主治】①《圣济总录》：热痢不止。②《景岳全书》：热痢便血，崩淋不止。

23657 生地黄汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】生干地黄三两 石膏（碎） 大黄（锉，炒） 芍药 甘草（炙）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水一盞半，大枣二枚（去核），生姜三片，煎至一盞，去滓温服。未利再服。

【功用】调血气，利大小便。

【主治】虚劳，羸瘦不足。

23658 生地黄汤

《圣济总录》卷九十二。为《千金》卷十一“地黄煎”之异名。见该条。

23659 生地黄汤

《圣济总录》卷一〇二。为《外台》卷二十一引《删繁方》“生地黄煎”之异名。见该条。

23660 生地黄汤

《圣济总录》卷一二一。为《圣惠》卷三十四“地黄汤”之异名。见该条。

23661 生地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】生干地黄（切，焙）二两 人参 甘草（炙，锉） 芍药 白茯苓（去黑皮） 芎藭 黄耆（锉） 黄芩（去黑心）各一两 木通（锉） 当归（切，焙）各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加竹叶七片，干枣二枚（擘破），同煎至八分，去滓，空心温服，日晚再服。

【主治】痢内虚热。

23662 生地黄汤

《圣济总录》卷一八三，为原书卷一三一

“地黄汤”之异名。见该条。

23663 生地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】生地黄(切碎)五两 梔子仁二十枚 小蓟根(切)三两 黄芩(去黑心)一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，入豉二七粒，煎至一盞，去滓温服，空心、日晚各一服。

【主治】乳石发热盛，吐血、衄血。

23664 生地黄汤

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】生干地黄半两 赤芍药 赤茯苓各三分 柏叶一两 阿胶 当归各半两

【用法】上为细末。煎黄耆汤调下二钱；及搐向鼻内，先含水一口，闭目搐入，然后吐出水即止。

【主治】鼻衄，面无颜色者。

23665 生地黄汤

【方源】《医方大成》卷十引汤氏方。

【异名】胎热地黄汤(《幼科证治大全》)。

【组成】生干地黄 赤芍药 川芎 当归 天花粉各等分

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盞，煎服。乳母服用，并略与儿服之。

【主治】①《医方大成》引汤氏方：小儿生下，遍体皆黄，状如金色，身上壮热，大小便不通，乳食不进，啼叫不止。此胎黄之候，皆因母受热而传于胎也。②《准绳·幼科》：小儿在胎时，因母有热或恣食酒面热毒之物，传于胎中，令儿生下面赤眼闭，身体壮热，哭声不止，口热如汤，乃胎热之候也。

23666 生地黄汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】生地 麦冬 升麻 犀角 秦艽 葛根 知母 生甘草 连翘 花粉 白芍

【主治】妊娠或动怒肝木，或房室过度，相火妄动，或嗜炙博辛热等物，以致积热聚胃，牙龈肿痛，齿缝出血，名曰牙宣，又曰齿衄。

【方论选录】上下牙痛固属胃家积热，然亦有肾虚不能制木而频频作痛者。盖齿者骨之余，肾之所主也。心主脉，肾主骨，肺主皮毛，脾主肌肉，肝主筋。肾虚则骨无所附，而阳明爆金挟相火以侮所不胜。上下牙龈浮肿作痛者，或痛而不肿者，兼肾虚也。牙缝出血，名曰牙宣，又名齿衄，主肾虚。如血乱涌不止者，亦属阳明积热也。是方升、犀、秦、葛皆阳明经药，而升、犀解毒凉血，秦、葛升阳散火；麦、地、知母滋阴生水；翘、粉、甘草除热凉肠。阳明之积热自除，血不妄行，而胎元不受伤矣。足阳明喜凉，故咽冷水而痛不止；手阳明喜热，故吞热汤而痛亦不止。

23667 生地黄汤

《洁古家珍》。为《保命集》卷下“生地黄散”之异名。见该条。

23668 生地黄汤

【方源】方出《妇人良方》卷二十，名见《普济方》卷三四九。

【组成】川芎 生干地黄 枳壳 芍药各等分

【用法】上为末。酒服方寸匕，一日二次。

【主治】产后余血不尽奔冲心，烦闷腹痛。

23669 生地黄汤

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】生地黄二两(洗净) 阿胶(炒酥)一两 川芎 北梗 蒲黄 甘草(生)各半两

【用法】上锉。每服三钱，水煎熟，入生姜汁二匙，温服。

【主治】上热衄血。

23670 生地黄汤

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】淡竹叶 草决明 黄芩各一两 生干地黄二两 赤芍药半两

【用法】上为粗末。每用五钱，水三盞，煎五七沸，绢滤去滓，乘热洗眼，冷即止，日用二次。

【主治】大人、小儿眼暴赤才发，或经一二

日,赤痛涩隐不开。

23671 生地黄汤

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】生地黄(干者) 决明子 黄芩(去心) 竹叶各二两 川黄连 芍药各半两

【用法】上为粗末。大人用十钱匕,水三盏,煎五七沸,绵滤去滓,乘热洗眼,冷即止,再暖再洗,日二三次。只用一日,次日换药。小儿约量岁数。

【主治】大人、小儿暴赤眼,涩隐肿痛不开。

23672 生地黄汤

《此事难知》。为《伤寒微旨论》卷下“地黄汤”之异名。见该条。

23673 生地黄汤

《普济方》卷二十九。为《圣惠》卷二十七“地黄金粉散”之异名。见该条。

23674 生地黄汤

《普济方》卷一九六。为《圣惠》卷五十五“生地黄饮子”之异名。见该条。

23675 生地黄汤

【方源】《普济方》卷三一八。

【组成】生地黄 续断 白术各一两 甘草 紫菊叶各半两

【用法】以水三升,煮取一升五合,去滓,温服五合。

【主治】妇人热入血室,其血不止者。

23676 生地黄汤

【方源】《幼科类萃》卷五。

【组成】生干地黄 熟地黄各一两(净) 川芎 赤茯苓 枳壳(制) 杏仁(水浸,去皮) 川黄连(净) 半夏曲 天麻 地骨皮 甘草(炙)各二钱半

【用法】上锉。每服二钱,加生姜三片,黑豆十五粒,水煎,临睡服。

【主治】小儿痘眼。

23677 生地黄汤

【方源】《医统》卷八十八。

【异名】生地黄散(《审视瑶函》卷四)。

【组成】干地黄 赤芍药 川芎 当归 瓜蒌根 甘草各一钱

【用法】上为末。每用少许,灯心煎汤调,抹入口中。连服效。

【功用】清热。

【主治】小儿生下,眼三日不开。

23678 生地黄汤

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】生地黄 赤芍药 川芎 当归(酒洗) 瓜蒌根

【用法】加黄连、灯芯为引,水煎,乳母服。或以本方为细末,灯芯汤调少许,搽儿口中。

【主治】小儿初生眼闭不开,胎黄,鼻衄,丹毒。

①《育婴家秘》:产母食热毒物,以致小儿初生下眼闭不开者。②《保婴撮要》:妊娠食酒面五辛积热,小儿生下遍体面目皆黄。③《赤水玄珠》:荣中有热,及肺壅,鼻衄生疮,一切丹毒。

23679 生地黄汤

《杏苑》卷八。为《兰室秘藏》卷中“凉血地黄汤”之异名。见该条。

23680 生地黄汤

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】生地黄三钱 川芎一钱 桔芩一钱 桔梗一钱 梔子一钱 蒲黄一钱 阿胶(炒)一钱 侧柏三钱 牡丹皮一钱 茅根三钱 甘草三分 白芍一钱

【用法】上锉一剂。水煎,温服。

【主治】衄血。

23681 生地黄汤

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】生地黄一钱 麦冬五分 杏仁八分 款冬花八分 陈皮八分 甘草五分。

【用法】水煎服。

【主治】①《治痘全书》:身热口渴,嗽甚心烦,小儿斑疹,胃经有热者。②《保婴撮要》:肺经热,痘疹,小便不利。

23682 生地黄汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】生地黄三钱 牛膝 丹皮 黑山栀 各一钱 丹参 元参 麦冬 白芍各一钱五

分 郁金 广三七 荷叶各七分

【用法】水煎，加陈墨汁、清童便各半杯，和服。

【主治】吐血。

23683 生地黄汤

【方源】《金鉴》卷五十一。

【组成】生地黄 赤芍药 川芎 当归 天花粉 赤茯苓 泽泻 猪苓 甘草(生) 茵陈蒿

【用法】引用灯心，水煎，食前服。

【功用】渗湿清热。

【主治】胎黄轻证。乃孕妇湿热太盛，小儿在胎受母热毒，以致生则遍体面目皆黄，其色如金。

23684 生地黄汤

《医级》卷九。为《景岳全书》卷六十一“益母地黄汤”之异名。见该条。

23685 生地黄汤

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】生地二三钱 干漆一钱(炒烟尽) 生藕汁一小盅(如无以大蓟一二钱代之) 蓝叶钱半 大黄一二钱(生、熟酌用) 桃仁一钱(去皮，研) 归尾二钱(酒洗) 红花六分(酒洗)

【用法】水与藕汁同煎服。

【主治】蓄血。

【方论选录】抵当汤、丸，今总难用，以此代之，甚觉和平。原方水蛭、虻虫今改用归尾、红花。蓄血有上中下之殊，上焦胸中手不可近而痛者，犀角地黄汤；中脘手不可近，桃仁承气；脐下小腹手不可近，抵当嫌峻猛，此汤主之，或再加枳实、苏木，用者酌之。

23686 生地黄饮

【方源】方出《医心方》卷十三引《广济方》，名见《圣济总录》卷九十三。

【组成】生地黄三两(切) 葱白二两(切) 香豉二两 童子小便二升 甘草二两(炙)

【用法】将生地黄等于小便中浸一宿，平旦

煎二沸，绞去滓，澄定。取一升二合，分温二服。

【主治】骨蒸及脚气，每至日晚即恶寒壮热，颜色微赤，不能下食，日渐羸瘦。

【宜忌】忌食热面、猪肉、油腻、粘食。

23687 生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】生干地黄(焙)二两 大黄(生锉) 升麻 贝母(去心，炒黄) 麦门冬(去心，焙) 甘草(炙，锉)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，蜜一小匙头，同煎三两沸，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒毒气攻肺，咳嗽，喉中生疮。

23688 生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【异名】地黄饮(原书卷四十七)。

【组成】生地黄汁 生藕汁 生姜汁 生蜜各二合

【用法】上药和匀，分作三服。每服微煎，食后、临卧服。

【主治】时疾壮热，头痛，鼻衄不止；胃气盛实，壅滞不宣，蕴积为热，口干烦渴。

23689 生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】生地黄二十两(捣绞取汁) 阿胶二两(每片如两指大)

【用法】每以胶一片，入地黄汁一盞，纳饭甑蒸之，取出放温，旋服。

【主治】肺肝内伤，卒唾血。

23690 生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】生地黄四两 黄芩(去黑心) 赤芍药 竹茹各三两 蒲黄三大合 地骨皮五两

【用法】上除蒲黄外，哎咀如麻豆。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，食后去滓温服，一日二次。

【主治】大衄。口鼻出血，血上心胸，气急

劳热。

23691 生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】生地黄二两 羌活(去芦头) 柴胡(去苗) 桂(去粗皮) 当归(切, 焙) 京三棱(煨) 芎藭 地骨皮各半两 桃仁(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒)二十一枚。

【用法】上锉细。以童子小便五升, 于新瓷器内慢火煮令如鱼眼沸至一升, 去滓, 每服半盏, 五更、日午各一服, 频作三五剂服之。

【主治】室女经水不通。

23692 生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】生地黄汁一盞 生姜汁二分盞

【用法】上药同煎至一盞, 分四服, 每以汤或酒和服。

【主治】难产。

23693 生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【异名】地黄饮(《普济方》卷三四六)。

【组成】生地黄汁半大盞 桂(去粗皮)半两 黄耆(锉)三分 麦门冬(去心, 微炒)三分 当归(切, 焙)半两 甘草(炙)半两

【用法】上药除地黄外, 粗捣筛。每服三钱匕, 水一盞, 煎至六分, 去滓, 入地黄汁一合, 更煎数沸, 温服。

【功用】补虚调气。

【主治】产后有热, 恶露未尽。

23694 生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】生地黄汁半盞 童子小便半盞 生姜一分(取汁)

【用法】上药同煎三四沸, 分作两服。温分服, 须臾再服。恶血下, 滞气通, 立愈; 未效, 再作服。

【主治】产后虚冷, 恶血结块不散。

23695 生地黄饮

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】生地黄(切, 绞汁)三合 小蓟根

(切, 绞汁)三合

【用法】合和令匀, 分温作三服, 早晨、日晚各一服。

【主治】乳石发, 衄血。

23696 生地黄饮

《普济方》卷一八九。为方出《千金》卷六, 名见《普济方》卷一八九“地黄散”之异名。见该条。

23697 生地黄饮

【方源】《诚书》卷七。

【组成】生地黄 熟地黄 地骨皮 枸杞子各一钱

【用法】上为末。蜜汤调下。

【主治】衄血。

23698 生地黄饮

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】生地黄 黄芩(炒) 阿胶(炒) 柏叶(炒)

【用法】水煎服。

【主治】血热, 小便出血。

23699 生地黄鸡

【方源】方出《肘后方》卷四, 名见《圣济总录》卷一八九。

【异名】乌鸡汤(《内外科百病验方大全》)。

【组成】乌雌鸡一头 生地黄一斤(切) 饴糖二升

【用法】乌雌鸡治如食法, 以地黄、饴糖纳腹内, 急缚, 铜器贮甑中, 蒸五升米久, 须臾取出, 食肉、饮汁, 三月三度作之。

【主治】①《肘后方》: 因积劳虚损, 或大病后不复, 常若四体沉滞, 骨肉疼痛, 吸吸少气, 行动喘促; 或小腹拘急, 腰背强痛, 心中虚悸, 咽干唇燥, 面体少色; 或饮食无味, 阴阳虚弱, 悲忧惨戚, 多卧少起, 久者积年, 轻者才百日, 渐至瘦削, 五脏气竭。②《内外科百病验方大全》: 男妇虚弱, 或病后, 或产后, 或疮毒久不收口, 脾胃不健, 一切诸损。

【宜忌】勿啖盐。

23700 生地黄酒

【方源】《普济方》卷二四四。

【组成】生地黄(干)一斤 杉木节五两 牛蒡子一斤(去皮) 丹参二两 牛膝五两(去苗) 大麻仁半斤 防风三两(去叉) 独活 地骨皮各三两

【用法】上锉。用生绢袋盛,以酒三斗,浸六七日,每于食前随性饮之。

【主治】脚气肿满,烦疼少力。

23701 生地黄散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】生干地黄一两 茯神三分 葳蕤三分 知母三分 桔楼一两 黄耆一两(锉) 地骨皮一两 石膏一两 人参一两(去芦头) 麦门冬一两(去心) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚劳烦热,口热,颊赤,多渴。

【备考】本方方名,《普济方》引作“地黄散”。

23702 生地黄散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【异名】地黄膏(《圣济总录》卷一二〇。)

【组成】生地黄汁五合 当归 白芷 细辛 盐花各一分

【用法】上为细散,相和令匀,于银器中煎成膏。临用时以药厚涂于牙龈上,有津即咽之,日三夜二。

【主治】热毒风攻头面,齿龈肿痛不可忍。

23703 生地黄散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】生干地黄二两 黄芩 赤芍药 黄连(去须) 蒲黄 地骨皮各一两

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,入竹茹一鸡子大,煎至五分,去滓,频温服之。

【主治】心肺积热,流注大肠,大便下血。

23704 生地黄散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】生干地黄一两 犀角屑一分 黄

芩一分 竹茹一分 麦门冬一分(去心)

【用法】上为散。以水二大盏,煎至一大盏去滓,分为二服,如人行五里再服。

【主治】焮黄。头痛口苦,舌根干黑,喘息不调,鼻中血出,心神烦乱,作怅望之声,小便赤色如红花汁。

23705 生地黄散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】生干地黄二两 玄参一两 甘草一两(生,锉) 赤芍药一两 黄耆一两(锉) 木通一两(锉) 黄芩一两 当归一两(锉,微炒) 地骨皮一两 赤茯苓一两半 川升麻一两 川大黄一两(锉碎,微炒)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入竹叶二十片,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】痈肿,热毒疼痛,心神烦闷。

23706 生地黄散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】生地黄汁一升 生藕汁三合 青蒿汁三合 生姜二两(取汁) 蜜四两 酥一两 柴胡一两(去苗) 知母一两 鸡苏叶一两 黄芩一两 川升麻一两 鹿角胶二两(捣碎,炒令黄燥) 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 桑根白皮一两(锉)

【用法】上为细散,与煎药汁纳于银器中,搅令匀,慢火煎成膏,收瓷盒中。每服不拘时候,以温粥饮调下半匙。

【主治】妇人劳热至甚,吐血不止,心神烦躁,少思饮食。

23707 生地黄散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】生干地黄一两 白茅根一两 木通一两(锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,水一中盏,入葱白五寸,同煎六分,去滓,空心、食前

频服。

【主治】小肠实热，心中烦闷，少腹热痛，小便赤涩或出血。

23708 生地黄散

《幼幼新书》卷十六。即《圣惠》卷八十三“生干地黄散”。见该条。

23709 生地黄散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】生地黄 麦门冬各一两半 鸡苏苗 赤茯苓 玄参各一两 甘草半两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，入竹茹一分，煎至六分，去滓，不拘时温呷。

【主治】咽喉内生疮，唾血不止。

23710 生地黄散

【方源】《保命集》卷下。

【异名】生地黄汤、生地黄饮子（《洁古家珍》）。

【组成】生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 天门冬 黄耆 芍药 甘草 黄芩各等分

【用法】上锉。每服一两，水一盞半，煎至一盞，去滓温服。

【主治】衄血、下血、吐血、溺血，皆属于热。但血家证，皆宜服此药。

【加减】脉微，身凉恶风，每服加桂半钱，吐血者多有此证。

【方论选录】《证因方论集要》：二地并用，熟以益阴，生以凉血；黄耆、甘草补气，所谓有形之血不能速生，无形之气所当急固也；天冬清上，白芍敛肝，枸杞、地骨退热除蒸；黄芩平诸热，盖血得热则妄行也。

【备考】《丹溪心法》引本方有柴胡、黄连。治郁热衄血，或咯、吐血。若下血，加地榆。《玉机微义》亦载此方，组成与《丹溪心法》相同，治“妇人经漏下血，脉虚洪，经水紫黑”。

23711 生地黄散

【方源】《妇人良方》卷六。

【组成】生干地黄 北柴胡各一两 羌活

木香 桂心 防风各半两 酸枣仁 羚羊角屑 白芍药 白术 黄耆 川牛膝 白茯苓 当归 枳壳各三分

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，姜三片，煎至七分，去滓空心，温服。

【主治】妇人血气不调，或时寒热，体痛，不思饮食。

23712 生地黄散

【方源】《小儿痘疹方论》。

【组成】生地黄半两 麦门冬（去心）三钱 杏仁 款冬花 陈皮各二钱 甘草二钱半（炙）

【用法】上为粗散。每服三钱，水一大盞，煎至六合，去滓，徐徐温服，不拘时候。

【主治】①《小儿痘疹方论》：小儿斑疹，身热口干，咳嗽心烦者。②《麻科活人》：麻疹，肺热喘咳。

【备考】原书薛己按：若肺经有热者，宜用此方；若痰气上壅，佐以抱龙丸。

23713 生地黄散

【方源】《朱氏集验方》卷十三。

【组成】生地黄 川芎 赤芍药 生藕节 当归 芸台子 川芒消 荆芥 马齿苋各一两（阴干）

【用法】上为细末，和匀。酒煎苏木取酒，调药二大钱，不拘时候服。

【功用】止血住痛，辟风，续筋骨，生肌肉。

【主治】打扑、金疮。

【加减】如不甚发热，减芒消，加桃仁、荷叶干。

23714 生地黄散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】生地黄 升麻 川芎 华阴细辛（择净） 露蜂窠（炒焦） 防风各一两 大皂角二钱（去黑皮，炙焦）

【用法】上为粗末。每服三四钱，水一大盞，入荆芥数穗，同煎至八分，去滓，微热漱，冷吐，食后或临卧时漱三二次。

【主治】牙齿疼痛。

23715 生地黄散

【方源】《保婴集》。

【组成】生地黄 当归 地骨皮 人参 甘草(炙) 赤芍药各等分

【用法】上㕮咀。水煎，不拘时服。

【主治】斑疹后寒热往来，嗜卧，烦躁闷乱。

23716 生地黄散

《普济方》卷三十三。即《圣惠》卷二十六“生干地黄散”见该条。

23717 生地黄散

《普济方》卷一三三。即《圣惠》卷十“生干地黄散”。见该条。

23718 生地黄散

《普济方》卷一四六。为《圣惠》卷十四“生干地黄散”之异名。见该条。

23719 生地黄散

《普济方》卷三二〇。即《圣惠》卷七十“生干地黄散”。见该条。

23720 生地黄散

《普济方》卷三八六。为《千金》卷五“生地黄汤”之异名。见该条。

23721 生地黄散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】生地黄 黄柏 知母 防风 荆芥 升麻 干葛 天花粉 黄芩 甘草 桑白皮 白茯苓 赤芍药

【用法】上㕮咀。每服七八钱，水煎，食后服。

【主治】眼下赤膜，发歇无时。

23722 生地黄散

【方源】《赤水玄珠》卷二十一。

【组成】生地二钱 黄芩(炒)五钱 阿胶(炒) 侧柏叶(炒)各一钱

【用法】水煎，食前服。

【主治】血热尿血。

23723 生地黄散

《审视瑶函》卷四。为《医统》卷八十八“生地黄汤”之异名。见该条。

23724 生地黄散

《东医宝鉴·外形篇》卷一。为《圣惠》卷

三十三“生干地黄散”之异名。见该条。

23725 生地黄散

【方源】《血证论》卷七。

【组成】生地五钱 川芎钱半 黄芩三钱 侧柏叶三钱 桔梗二钱 栀子二钱 蒲黄三钱 阿胶二钱 白茅根三钱 丹皮三钱 白芍三钱 甘草钱半 童便一杯 莱菔汁一杯

【主治】吐血，衄血。

【方论选录】此方以治肝为主，以肝主血故也。而亦兼用心肺之药者，以心主火，治火必先治心；肺主气，降气必先清肺。为凉血止血之通剂，方义虽浅而易效。

23726 生地黄粥

【方源】《医方类聚》卷二四二引《食医心鉴》。

【组成】生地黄汁一合 红米一合

【用法】上以米煮作粥，临熟下地黄汁，搅调和。食之。

【主治】小儿发稀，乍寒乍热，黄瘦无力。

23727 生地黄粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】生地黄汁一合 生姜汁半合 蜜一合 粳米二合 淡竹沥二合

【用法】先将米煮粥，临熟下地黄、姜汁煮令熟，次下蜜并竹沥，搅转。食后良久，或临卧食之。

【主治】心膈虚躁，口干烦渴，不多饮食，小便赤涩。

23728 生地黄粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】生地黄汁三合 蜜二合 米三合 车前叶(取汁)三合

【用法】先以水一大盏半，煮米成粥，次入诸药汁及蜜，更煎三两沸，分为二服。

【主治】小便出血，砂痛。

23729 生地黄粥

《圣济总录》卷一九〇。为《圣惠》卷九十七“地黄粥”之异名。见该条。

23730 生地黄粥

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】生地黄汁一合 酸枣仁二两(水绞取汁二盏)

【用法】上药水煮同熬数沸,次下米三合煮粥,空腹食之。

【主治】虚弱骨蒸,四肢无力,渐渐羸瘦,心烦不得睡卧。

23731 生地黄粥

【方源】《药粥疗法》引《二如亭群芳谱》。

【组成】生地黄汁约 50 毫升(或用干地黄 60 克) 粳米 60 克 生姜 2 片

【用法】先用粳米加水煮粥,煮沸后加入地黄汁和生姜,煮成稀粥食用。

【功用】清热生津,凉血止血。

【主治】热病后期,阴液耗伤,低热不退,劳热骨蒸,或高热心烦,口干作渴,口鼻出血。

23732 生地黄煎

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】生地黄汁三升 赤蜜 石膏各一升(碎,绵裹) 升麻 射干 子芩各三两 生玄参八两 梔子仁 葳蕤各四两 甘草二两(炙)

【用法】上切。以水七升,先煮石膏等,取二升,去滓,下生地黄汁,更煎取四升,绵捣,分为四服。

【主治】脾劳热,身体眼目口唇悉萎黄,舌本强直,不能得咽唾。

【加减】若须利泄,加芒消三两,分为三服;余一服停下芒消,留晚,若热不止,更进服之。得利泄,止后一服也。

【宜忌】忌海藻、菰菜、茺蓂。

23733 生地黄煎

【方源】《外台》卷二十一引《删繁方》。

【异名】生地黄汤(《圣济总录》卷一〇二)。

【组成】生地黄汁一升 玄参汁五合 蜜五合 车前汁五合 升麻 细辛各二两 芍药 梔子各三两(切)

【用法】上切。以水五升,煮升麻等四物,

取一升五合,去滓,下生地黄等汁、蜜,沸成煎,分五六服。

【主治】肝实热眼痛。

23734 生地黄煎

【方源】《医心方》卷三引《经心录》。

【组成】生地黄汁三升

【用法】上纳汁铜器中,于炭火上煎令如饴。服二合

【主治】虚热及血利。

23735 生地黄煎

【方源】《医心方》卷十三引《古今录验》。

【组成】生地黄根不拘多少

【用法】上春绞取汁,复重春绞取之,尽其汁,乃除去滓;以新布重绞其汁,去滓碎浊,令清静;置罐中,置釜汤上煮罐,勿塞全边,令汤气得泄不沓也。煎地黄汁竭减半许后煎下,更以新布绞去废杂结浊滓,移去复煎竭之,令如饴糖成煎。能多作为好,少者不可减三升汁。

【功用】补虚除热,散石。

【主治】痢疽,疮疖,痔热。

23736 生地黄煎

【方源】《外台》卷十七引《延年秘录》。

【组成】生地黄五升 枣膏六合 白蜜七合 酒一升 犛牛酥四合 生姜汁三合 紫苏子一升(研,以酒一升绞取汁) 鹿角胶四两(炙末)

【用法】上药先煎地黄等三分减一,纳蜜酥,以蜜调入胶末,候煎成,以器盛之。酒和服。

【功用】补虚损,填骨髓,长肌肉,去客热。

【备考】《外台》同卷引《延年秘录》另有生地黄煎,方中少生姜汁、紫苏子、鹿角胶三味,功用相同。

23737 生地黄煎

【方源】《千金》卷十三。

【组成】生地黄汁 赤蜜各一升 人参 茯苓 芍药 白术各三两 甘草二两 生麦 门冬一升 石膏六两 生萎蕤四两 干地黄

三两 莼心一升(一作豉) 远志二升

【用法】上㕮咀。以水一斗二升,煮人参以下十一味,取二升七合,去滓,下地黄,蜜更煎,取三升五合,分四服。

【功用】清热止极,强胃气。

【主治】脉热极则血气脱,色白干燥不泽,食饮不为肌肤。

【方论选录】《千金方衍义》:血枯气脱,脉极而咳,故用二地、芍药以滋血,参、苓、术、甘以益气,门冬、葳蕤以润肺,莼心、石膏以清胃,远志、赤蜜以通心而行诸味腻滞之性也。

23738 生地黄煎

【方源】《千金翼》卷七。

【组成】生地黄八两 茯苓 麦门冬各一斤(去心) 桃仁半升(去皮尖) 甘草一尺(炙) 人参三两 石斛 桂心 紫苑各四两

【用法】上药合捣筛,以生地黄汁八升,淳清酒八升,合调,放铜器中,置炭火上,纳鹿角胶一斤,数搅之,得一升;次纳饴三升,白蜜三升,于铜器中釜汤上煎令调,药成。为丸如弹丸大。食前服一丸,一日三次。不知,稍加至二丸。

【主治】妇人产后虚羸短气,胸胁逆满。

23739 生地黄煎

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】生地黄汁四升 生地骨皮 生天门冬(去心) 生麦门冬汁 白蜜各一升 竹叶(切) 生姜汁各三合 石膏八两(碎) 栝楼五两 茯神 萎蕤 知母各四两

【用法】上㕮咀,以水一斗二升,先煮药取三升,去滓,纳地黄、麦门冬汁,微火煎五沸,次纳蜜、姜汁,煎取六升下之。每服四合,稍加至五六合,日二夜一。

【主治】胸中热。

23740 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】生地黄汁一升 生姜汁二合 生

麦门冬汁半升 牛酥五两 白蜜半斤 枣肉三十枚(研) 桂心一两 贝母一两(煨令微黄) 细辛一两 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄,研如膏) 菖蒲一两 皂荚子仁一两(微炒)

【用法】先将前六味相和于银锅中,慢火熬令稀稠得所;后药捣细罗为散,入前地黄煎中,搅令匀,取一茶匙,含化咽津,不拘时候。

【主治】肺脏气壅,外伤风冷,语声嘶不出,咽喉干痛。

23741 生地黄煎

《圣惠》卷十七。为《外台》卷二引《删繁方》“生地黄汤”之异名。见该条。

23742 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】生地黄汁五合 生栝楼根汁五合 蜜二合 生麦门冬汁五合 酥一两 生藕汁一合

【用法】上药一处相和,于锅中熬令稍稠。每服不拘时候,抄服半匙。

【主治】热病,心胸烦热,口干,皮肉黄。

23743 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】生地黄汁半升 生天门冬汁半升 萎蕤二两 细辛一两 甘草一两(生,锉) 芎藭一两 白术一两 生麦门冬二两(去心) 黄耆一两半

【用法】上锉细,绵裹,酒浸一宿,以猪脂二斤,煎令药焦黄,绵滤去滓,纳锅中,后下地黄、天门冬汁,熬令稠,瓷器中盛。每服不拘时候,含咽半匙。

【主治】脾热,唇焦枯,无润泽。

23744 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】生地黄汁一升 生姜汁一合 白蜜五合 生麦门冬汁三合 酥五合 白沙糖三两 杏仁三两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒,研)

【用法】上药都煎成膏。每服半匙，含化咽津，不拘时候。

【主治】肺热吐血，口干心燥。

23745 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】生地黄汁五合 生姜汁一合 白蜜二两 麻黄二两（去藕节） 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 白前一两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上件药，先捣罗麻黄、白前、甘草三味为末，于银锅中纳地黄汁等，下诸药末，以慢火熬成膏，收于不津器中。每服一茶匙，含化咽津，不拘时候。

【主治】心肺暴热，咳嗽不止。

23746 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】生地黄汁二升 生天门冬汁二升 蜜五合 酥三合 生姜汁二合 贝母二两（煨微黄） 五味子二两 紫菀二两（去苗土） 甘草一两（炙微赤，锉） 鹿角胶五两（捣碎，炒令黄燥） 杏仁三两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研）

【用法】上为末，研令极细，后取诸药汁及杏仁、酥、蜜等同于银器中，以慢火熬，不住手搅，候如膏，即收于不津器中。含一茶匙，咽津，不拘时候。

【主治】咳嗽上气，心膈烦闷，痰唾不利。

23747 生地黄煎

【方源】方出《圣惠》卷四十六，名见《普济方》卷一六二。

【组成】生地黄（取自然汁）八合 黑飴三合 白蜜三合 白沙糖三合 生姜汁一合 川升麻三两（捣末） 鹿角胶三两（捣碎，炒令黄燥） 杏仁三两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒令黄，研如膏） 酥三合

【用法】上药都于银锅中，以慢火煎，搅勿住手，候稀稠得所，以不津器盛之。每次含一茶匙，咽津，不拘时候。

【主治】肺脏虚热，咳嗽，咽干痛，时唾脓

血。

23748 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】生地黄五斤（捣，绞取汁） 黑豆一升（以水四升，取一升半，去豆） 大甜石榴五颗（捣，绞取汁） 荆芥半升 枸杞根二升（细锉，入水一中盏，捣，绞取汁） 竹沥半升 桑根白皮一升（细锉，入水一中盏，捣，绞取汁） 白蜜五两 羚羊角屑 天门冬（去心，焙） 天麻 酸枣仁（微炒） 当归（锉，微炒） 羌活 薏苡仁 蚕沙（微炒） 各一两

【用法】先将前八味药汁相和于银石锅中，慢火熬如稀汤；余药捣细罗为末，研令细，入前煎中，搅令匀，瓷器中盛。每服以温酒下一大匙头，不拘时候。

【主治】妊娠中风，筋脉挛急，口眼喎斜，皮肤顽麻，言语常涩。

23749 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷八十二。

【异名】地黄煎（《普济方》卷三八五）。

【组成】生地黄汁一升 白蜜三合 生麦门冬汁三合 酥三合

【用法】上药于银锅中，以慢火熬如稀汤。每服半茶匙，以温水调下。

【主治】小儿壮热，心烦，眠卧不安。

23750 生地黄煎

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】生地黄半斤（取汁） 刺薊半斤（取汁） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄，别研） 阿胶半两（捣研，炒令黄燥，为末） 蜜一合

【用法】上药都入银锅中，以慢火熬为膏。每服一钱，用新汲水调下，不拘时候。

【主治】小儿鼻衄不止。

23751 生地黄煎

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】生地黄五斤（捣，研，绞取汁令净） 黑豆一升（以水三升，煎至一升，绞

去豆) 大甜石榴三颗(去蒂萼和子皮,同捣研,取汁) 晚蚕沙(炒)二两 海桐皮(炙,锉)三两 桂(去粗皮) 山芋各二两

【用法】上七味,先㕮咀四味,如大麻粒。于银石锅中,先煎地黄汁三二十沸,次下石榴、黑豆汁,又煎三二十沸,即下㕮咀四味,勿停手搅,慢火煎至浓,用生帛绞去滓,次下好酥二两,再煎匀,搅如稠膏,即收于不津器中。每日空腹以无灰酒一盏调煎半匙头,搅和服之,如疾甚者,加至一匙头,每日三服。

【主治】中风,手足不随,或拘挛屈伸不得,口眼喎斜,偏风疼痛,或痹痿沉重,病在筋骨;兼治妇人产后风血恶疾。

【宜忌】切慎房室。

23752 生地黄煎

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】生地黄五斤(洗,切,以木杵臼捣,绞汁) 黄精十二斤(洗,切,以木杵臼捣,绞汁) 白蜜五升

【用法】上三味汁相和于银石器中,慢火煎如膏为度,以瓷盒盛。每服生姜汤调下半匙至一匙,日二夜一。

【主治】乳石药气发热,风热相并,致痈肿疮痍,经年不愈。

23753 生地黄煎

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】生地黄(洗净) 枸杞子(去梗) 五味子(去枝)各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七十丸,食前盐酒、盐汤、米饮任下。

【功用】补肝明目。

【备考】本方方名,据剂型,当作“生地黄丸”。

23754 生地黄煎

《普济方》卷三十三。为《圣惠》卷二十六“地黄煎”之异名。见该条。

23755 生地黄煎

【方源】《普济方》卷三二〇。

【组成】生地黄汁一升 生藕汁三合 青

蒿汁三合 生姜二两(取汁) 蜜四两 酥一两 柴胡一两(去苗) 知母二两 鸡苏叶一两

【用法】上为散,与煎药汁同于银器中搅令匀,慢火煎成膏,收入瓷盒中。每服半匙,以清粥饮调下,不拘时候。

【主治】妇人劳热至甚,吐血不止,心烦神躁,少思饮食。

23756 生地黄煎

【方源】《医统》卷五十一。

【组成】生地黄 当归 黄耆(炙) 黄连 黄芩 甘草(炙) 麻黄根 黄柏 浮小麦各一钱

【用法】水二盏,煎八分,温服。

【主治】阴火盗汗。

23757 生地黄膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】生地黄 白蔹 白芷 黄连 升麻 黄芩 大黄各十两

【用法】上㕮咀,以猪脂一升半,微火煎成膏,绞去滓。敷疮,一日四五次。

【主治】热疮。

23758 生地黄膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】生地黄四两 黄连四两 大黄三两 黄柏 甘草(炙) 白蔹 升麻各二两

【用法】上㕮咀,以猪脂二升半,微火合煎,膏成绞去滓。候凝可敷之。

【主治】热疮。

23759 生地黄膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】生地黄四两 黄连五两 白蔹 芍药 白及各二两 苦参 升麻各三两

【用法】上㕮咀,以猪脂二升半,纳诸药同熬,膏成去滓。候凝敷之。

【主治】热疮。

23760 生地黄膏

《圣惠》卷十八。为《肘后方》卷二“黑膏”之异名。见该条。

23761 生地黄膏

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】生地黄一两 柏白皮二两 苦竹叶一两 甘草一两

【用法】上锉细，以猪脂一斤，煎令地黄色黑，以绵滤去滓，盛于不津器中，候冷。日三度涂之。

【主治】小儿被汤泼火烧赤痛者。

23762 生地黄膏

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】生地黄四两 辛夷 独活（去芦头） 当归（切，焙） 大黄 芎藭 黄耆 白芷 芍药 黄芩（去黑心） 各半两 续断一两 猪脂二斤 蕤白二七茎

【用法】上药除猪脂外，并锉碎，光熬脂令沸，下诸药，煎候白芷赤黑色，以绵绞去滓，瓷盒盛。涂疮，日三二次。

【主治】①《圣济总录》：痢疽败坏生肉。②《普济方》：发背。

23763 生地黄膏

【方源】《卫生总微》卷二十。

【异名】地黄膏（《痘疹传心录》卷十八）。

【组成】生地黄（去芦，洗净） 川升麻 蓝叶 梔子仁 大黄各一两

【用法】上为细末，以猪脂八两，同于铉内慢火煎色变，滤去滓，以瓷盒盛，放冷成膏。每用少许，涂疮上。

【主治】①《卫生总微》：小儿爆浆疮，毒甚发引遍身。②《痘疹传心录》：天泡疮，始生如汤烫作泡，皮破浆出成疮。

23764 生地黄膏

【方源】《直指》卷六。

【组成】石菖蒲一两半 北前胡 赤茯苓各三分

【用法】上为末，蜜一盏，生地黄汁一盏，共研为膏。每服弹子大，紫苏煎汤，食后调下。

【主治】热气乘心作痛。

23765 生地黄膏

【直指】卷十七。为《洪氏集验方》卷一引

铁瓮“琼玉膏”之异名。见该条。

23766 生地黄膏

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】生地黄 蓝青叶各等分

【用法】上入蜜杵细。每服半两，并水煎，食后服。

【主治】口舌疮肿。

23767 生地黄膏

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】露蜂房（炙黄） 五倍子 木香各三钱 滴乳香二钱 轻粉一字

【用法】上为细末，用生地黄一握，捣细和为膏。摊生绢上贴疮。

【主治】漏疮。

23768 生地黄膏

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】生地黄汁 小蓟汁 沙糖（熬膏约一大碗） 阿胶一两 侧柏叶（为末） 地榆（为末） 各一两

【用法】上用四味汁熬成膏，方入柏叶、地榆末和匀。每服三匙许，空心米饮调下。

【主治】结阴便血。

23769 生地黄膏

《杂病源流犀烛》卷十七。为《普济方》卷一八八引《余居士选奇方》“地黄煎丸”之异名。见该条。

23770 生舌仙丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参一两一钱 龙齿末三分 麦冬末一钱 血竭三分 冰片二分 土狗一个 地虱十个

【用法】除人参一两煎汤外，余药各焙为末，放地上一刻，出火气备用。用时先将参汤含漱半日，然后将药末用舌蘸之使令遍，不可将舌即缩入口中，放在外面半刻，至不能忍时然后缩入。三次则舌伸长矣。

【主治】舌断。

23771 生肌白膏

【方源】《外台》卷二十九引《范汪方》。

【组成】白芷一两六铢 干地黄一两半

芎藭一两六铢 甘草半两(炙) 当归 白
藜 附子各十八铢(去皮) 蜀椒二合半
(汗)

【用法】上㕮咀,以猪脂五斤合煎,三上三
下,药成去滓。涂疮上,一日二次。

【主治】金疮。

23772 生肌肉散

【方源】《外台》卷二十九引《范汪方》。

【组成】当归 甘草(炙) 肉苁蓉 芎藭
芍药 蜀椒(汗) 吴茱萸 干姜 桂心 白
及 黄耆 厚朴 人参各等分

【用法】上为散。每服一方寸匕,以酒饮送
下,一日三次。

【功用】止痛。

【主治】金疮内塞。

23773 生肌药丁

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】珍珠 象牙 龙骨 儿茶 花蕊
石 血竭各一钱 轻粉 白芷 白藜 朱砂
各五分 冰片三分

【用法】上为末,饭为条,阴干收用。

【功用】生肌收口。

【主治】漏疮硬管已出,尚未收口。

23774 生肌神散

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】石灰(千年者佳) 三七根 麒麟
竭各三钱 人参 象皮 乳香(去油) 没
药(去油) 木香各一钱 儿茶二钱 轻粉
五分

【用法】上各为极细末,研至无声为度。搽
患处。

【主治】物瘤割破。

23775 生苈根散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】生苈根一两半(锉) 阿胶一两半
(捣碎,炒令黄燥) 黄芩三分 赤芍药三分
当归一两(锉,微炒)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,
加大枣三枚,同煎至六分,去滓,不拘时候

稍热服。

【主治】妊娠胎动,腹内疼痛,心神烦热,
饮食少。

23776 生苈根汤

【方源】《外台》卷三引《集验方》。

【组成】灯心一分 生麦门冬十二分(去
心) 人参四分(切) 生苈根一大握
(切)

【用法】以水一大升,煎服八合,去滓,分
温三服。

【主治】天行后气膈,呕逆不下食。

23777 生苈根饮

【方源】方出《千金》卷十六,名见《外
台》卷二。

【组成】生苈根(切)一升 青竹茹一升
梗米三合 生姜一两

【用法】上㕮咀。以水五升,煮取二升,分
三服。不止,服三剂。

【主治】伤寒后嘔,干呕不下食。

23778 生苈根粥

【方源】《医方类聚》卷二四四引《食医心
鉴》。

【组成】生苈根一两(净洗) 红米一合

【用法】以水一升,煎苈根取汁七合,去滓,
入红米于汁中煮粥食之。

【主治】小儿呕吐,心烦热。

23779 生附子汤

【方源】《杏苑》卷七。

【异名】生附子散(《张氏医通》卷十四)。

【组成】黑附子(生)八分 滑石 瞿麦
木通各一钱 半夏七分 蜜少许 灯心二十
茎

【用法】上㕮咀。用生姜五片,水煎,空心
服。

【主治】冷淋,或因饮水过多,或因寒湿,
或因心虚志耗。小便闭涩,数起不通,窍中
苦痛,憎寒凛凛。

23780 生附子散

《张氏医通》卷十四。为《杏苑》卷七“生
附子汤”之异名。见该条。

23781 生鸡子酒

【方源】方出《千金》卷二，名见《普济方》卷三三八。

【组成】破生鸡子一枚

【用法】和酒服之。

【主治】妊娠心痛。

23782 生枣仁汤

【方源】《会约》卷七。

【组成】杏仁(生)

【用法】上为末。茶清调服，一日三钱。

【主治】胆热多睡。

23783 生虎骨丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十九。

【组成】生虎骨四两 金毛狗脊八两 五加皮 仙灵脾 牛膝 白茄根 油松节各二两 独活一两

【主治】由于劳力伤损，腿骨麻疼。

23784 生乳糖浆

《中药制剂手册》。为《天津市中成药规范》“生乳灵”之异名。见该条。

23785 生南星汤

【方源】《普济方》卷二八六。

【组成】生南星一两 知母 贝母(去心，炒) 生地黄 阿胶(炒) 川芎 桑白皮(炒) 甘草(炙)各三两 防风 射干 桔梗 天门冬(去心) 脑荷 杏仁(不去皮) 半夏(治) 紫苏叶 白芷 白及各半两

【用法】上锉散。每用四钱，姜七片，乌梅一个，食后煎服。

【主治】肺有痈脓，腥气上冲，呕而咳嗽。

23786 生姜汁酒

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】生姜汁半合 白蜜一匙 清酒五合

【用法】上相和，微温，顿服之。

【主治】服乳石后，少觉不下食。

23787 生姜汁煎

【方源】方出《千金》卷十八，名见《鸡峰》卷十一。

【组成】杏仁 生姜汁各二升 糖 蜜各一升 猪膏二合

【用法】先以猪膏煎杏仁黄出之，以纸拭令净，捣如膏，合姜汁、蜜、糖等合煎令可丸。每服一丸，如杏核大，日夜六七服。渐渐加之。

【主治】上气，咳嗽，喘息，喉中有物，唾血。

【备考】本方方名，《普济方》引作“生姜煎丸”。

23788 生姜汁煎

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】生姜汁五合 白蜜五两 人参二两(去芦头，捣罗为末) 百合二两(捣罗为末) 牛酥五合

【用法】上件药，纳铜锅中，以慢火煎如膏。不拘时候，含一丸如半枣大，咽津；或煎人参汤调下一茶匙，亦得。

【主治】噎，不能下食，咽喉壅塞，心胸烦闷。

23789 生姜枣汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【异名】四白汤。

【组成】白术一两 黄耆 茯苓 白芍药各半两

【用法】上为粗末。每服半两，加生姜、大枣，水煎服。不已，服养脾丸。

【主治】尺部脉伏，食不消，坐卧不安，腹胀。

23790 生姜拔刀

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】生姜二两(研，取汁) 白面四两

【用法】上以姜汁和面作拔刀。煮食之。

【主治】①《圣济总录》：反胃羸弱，身不能动，气乏醋心。②《普济方》：赤白痢，及水痢。

23791 生姜浴汤

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】生姜四两

【用法】煎汤沐浴。

【主治】小儿咳嗽。

23792 生姜煎丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】生姜汁一合 甘草半两(炙微赤,捣为末) 枣膏三十枚 蜜五合 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄,研烂)

【用法】以慢火煎令稠,为丸如鸡头子大。常含一丸,咽津。

【主治】口舌热,干燥。

23793 生姜煎丸

《普济方》卷一六二。即方出《千金》卷十八,名见《鸡峰》卷十一“生姜汁煎”。见该条。

23794 生姜醋浆

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】生姜一两 醋浆二合

【用法】银器煎取四合,连滓嚼呷。

【主治】呕吐不止。又杀腹内蛔虫。

23795 生眉毛方

【方源】《千金》卷十三。

【组成】墙上青衣 铁生衣各等分

【用法】上为末。以水和,涂患处。

【功用】生眉毛。

23796 生铁落汤

《杂病源流犀烛》卷十六。为《准绳·类方》卷五“生铁落饮”之异名。见该条。

23797 生铁落饮

【方源】《素问·病能论》。

【异名】铁落饮(《圣济总录》卷六十七)、指迷铁落饮(《观聚方要补》卷五引《十便良方》)。

【组成】生铁落

【功用】《圣济总录》:除烦下气。

【主治】①《素问·病能论》:阳厥怒狂。②《观聚方要补》引《十便良方》:阳厥,由心有所欲,因暴折而难决,阳气当动,令气郁,而致人多怒,一发则莫知所为,其后欲闭户而处,恶闻人声。

【方论选录】《古方选注》:盖铁之生者,气

寒味辛,其性直行内降,下气疾速,用其捶出之花,庶得外走经络,开结于木火之中,则狂怒自己。

23798 生铁落饮

【方源】《准绳·类方》卷五。

【异名】生铁落汤(《杂病源流犀烛》卷十六)。

【组成】生铁四十斤(入火烧赤沸,砧上煅之,有花出如兰如蛾纷纷坠地者,是名铁落,用水二斗,煮取一斗,入后药) 石膏三两 龙齿(研) 白茯苓(去皮) 防风(去芦) 各一两半 玄参 秦艽各一两

【用法】上为粗散,入铁汁中煮取五升,去滓,入竹沥一升,和匀。温服二合,不拘时候,一日五服。

【功用】《金匱翼》:坠痰镇心。

【主治】狂证。

①《准绳·类方》:狂。②《金匱翼》:痰火热狂。③《杂病源流犀烛》:风气发涌所生白沫潮痰。

23799 生铁落饮

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】天冬(去心) 麦冬(去心) 贝母各三钱 胆星 橘红 远志肉 石菖蒲 连翘 茯苓 茯神各一钱 元参 钩藤 丹参各一钱五分 辰砂三分

【用法】用生铁落煎熬三炷线香,取此水煎药,内服。

【主治】①《医学心悟》:狂症。发作则暴,骂詈不避亲疏,甚则登高而歌,弃衣而走,踰垣上屋,此痰火结聚所致。②《笔花医镜》:心热癫病。

【加减】若大便闭结,或先用滚痰丸下之。

【备考】服后安神静睡,不可惊骇叫醒,犯之则病复作,难乎为力。凡狂症,服此药二十余剂而愈者多矣。

23800 生铁落饮

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】生铁落一斤(砧上铁花,入水二斗,

煮至一斗) 生石膏五钱 生地黄一两
羚羊角钱半 青防风钱半 白茯神二钱(去木) 白龙齿三钱(煨) 黑元参三钱 真金箔一帖

【用法】上为末,入铁落饮中煮至二升,去滓,冲竹沥一升,分温三服。

【主治】狂妄,脉洪数弦急者。

23801 生菖蒲酒

【方源】《外台》卷十五引《古今录验》。

【组成】陆地菖蒲(细切)一石(别煮) 天门冬一斤(去心) 天雄三两(去皮,生用) 麻子仁一升 茵芋 干漆 干地黄 远志(去心)各三两 露蜂房五两 苦参一斤 黄耆半斤 独活 石斛各五两 柏子仁二升 蛇皮三尺 大蓼子一升

【用法】上㕮咀,以绢囊盛著,先以水二斛五斗煮菖蒲根,取八斗,以酿一斛五斗米许,用七月七日造,十日酒定熟,须去滓佳;冬月酒成,漉糟停药,著器中下消减。一剂不觉,更作尤妙,当以愈为期。更重煮菖蒲,去滓取汁,以渍洗悉,益佳。

【功用】延年益寿,耳目聪明,气力兼倍。

【主治】风虚,举体苦白驳,经年不愈。

【宜忌】禁食羊肉、饧、鲤鱼、猪肉、茺萸、鸡、犬、生冷。

23802 生萝卜粥

【方源】《普济方》卷二五八。

【组成】萝卜五枚

【用法】捣掬取汁一大盏,搅粥作饮,频吃。

【主治】消渴,发动无时,饮水不足。

23803 生庵金汁

【方源】《医统》卷二十五引《活人》。

【组成】粪清汁一斗(用好人粪置篾囊中,其囊约大可盛粪一桶,先于囊中安纸五七层,纸上加细黄土约二寸厚,方可加粪于囊中,囊悬置于缸上,俟其粪滴清汁于缸内,沥月余,将清汁收贮瓷坛中) 蜂蜜一斤

【用法】上药和匀,密封坛口,外以箬裹埋于土地中,以土盖之,约入土一尺许,次年

二三月取用。每用一碗,顿服之。如擦恶疮,将鸡翎蘸汁,疮上扫之。

【主治】时疫热病,伤寒发狂,谵语晦昧;并治中蛊恶毒,疔疮,毒气入腹欲死者。

23804 生葛汁饮

《幼幼新书》卷十一。即《圣惠》卷八十五“生葛汁饮子”。见该条。

23805 生葛饮子

《卫生总微》卷五。为《圣惠》卷八十五“生葛汁饮子”之异名。见该条。

23806 生葛根汤

【方源】《医心方》卷三引《极要方》。

【组成】生葛根一挺(长一尺三寸) 生姜汁二大合 竹沥二大升

【用法】上先取生葛根,洗净,捣碎,榨取汁令尽,和竹沥、生姜汁绵滤之,细细暖服之,不限次数及食前后。

【主治】中风,得病一二日,不能言语,手足不遂,精神昏恍。

23807 生硫黄丸

【方源】《三因方》卷十一。

【组成】硫黄不拘多少

【用法】以柳树槌研细,生姜汁拌炊饼糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前米汤送下。

【主治】寒呕,脉弱,小便复利,身有微热。见厥者难治。

23808 生犀饮子

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【异名】生犀角饮子(《秘传眼科龙木论》卷三)。

【组成】生犀角(镑) 桔梗各二两 羚羊角(镑) 人参(去芦头) 茯苓(去皮) 黄芩 知母 防风各一两

【用法】上为细末。每服一钱匕,水一盞,煎至五分,夜食后去滓温服。

【主治】①《圣济总录》:目昏暗。②《医宗金鉴》:伤寒热病后,瞳仁散大,时见黑花,隐涩泪多,红肿疼痛。

23809 生犀角丸

《圣济总录》卷十四。为《传家秘宝》卷中“生犀丸”之异名。见该条。

23810 生犀角丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷十。

【组成】犀角 麻黄 防风 石决明 当归 楮实子 枸杞子各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，茶清送下。小儿量大小，加减丸数。

【主治】①《秘传眼科龙木论》：内障病，瞳人倒者。②《审视瑶函》：气血两虚，荣卫凝滞，以致肝肾脏受风邪，瞳神歪斜内障。

23811 生犀角丸

《医统》卷八十八。为《幼科类萃》卷六“生犀丸”之异名。见该条。

23812 生犀角散

【方源】《外台》卷二十五引《广济方》。

【组成】生犀角(末) 酸石榴皮(熬) 枳实(熬令黄)各三两

【用法】上药各为末。以饮服二三寸匕，一日二次。

【主治】热毒痢血。其痢行数甚数，痢出不多，腹中刺痛。

【宜忌】停热食物。

23813 生犀角散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】生犀角屑一两 防风三分(去芦头) 赤箭三分 羌活三两 麻黄一两(去根节) 当归三分(锉，微炒) 人参五分(去芦头) 葛根三分 赤芍药三两 秦艽半两(去苗) 甘草半两(炙微赤，锉) 石膏一两

【用法】上为散，每服二钱，水一中盏，煎至六分，去滓，入竹沥半合，不拘时候温服。

【主治】妊娠卒中风，不语，四肢强直，心神昏昧。

23814 生犀角散

《普济方》卷二三六。为《得效》卷八“生犀散”之异名。见该条。

23815 生蒲黄汤

【方源】《眼科六经法要》。

【组成】生蒲黄 旱莲草各24克 丹参 郁金各15克 丹皮 生地 荆芥炭各12克 川芎6克

【功用】凉血散瘀，活血止血。

【主治】血分有热，眼底出血，视物不清，视力减退。

23816 生嘉禾散

【方源】《医学六要·治法汇》卷二。

【组成】白茯苓(去皮) 缩砂(去皮) 薏苡仁(炒) 枇杷叶(去毛，姜汁炙香) 人参(去芦)各一两 白术(炒)二两 桑白皮(炒) 槟榔(炒) 白豆蔻(炒，去皮) 青皮 谷麋(炒) 五味子(炒)各半两 沉香 杜仲(去皮，姜汁酒涂炙) 丁香 藿香 随风子 石斛(酒和，炒) 半夏(姜汁捣和作饼，炙黄色) 大腹子(炒) 木香各七钱五分 甘草(炙)两半 陈皮(去白) 神曲(炒)各一钱五分

【用法】每服三钱，水一盞，加生姜三片，大枣二枚，煎七分，不拘时温服。

【主治】脾胃不和，胸膈痞闷，气逆生痰，不进饮食，或五噎五隔。

【加减】五噎，加干柿一枚；膈气吐逆，加薤白三寸，大枣五枚。

23817 生蜜粉方

【方源】《普济方》卷二八六引《神效方》。

【组成】生蜜 米粉

【用法】调服。小便利为度。

【主治】便秘。

23818 生蜜涂方

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】蜜(生使)

【用法】上一味，频用涂疮上。

【主治】口疮糜烂。

23819 生鲤鱼汤

【方源】《医心方》卷二十二引《古今录验》。

【组成】生鲤鱼一头(重五斤) 干姜二两

吴茱萸一两

【用法】上切。以水一斗，先煮鲤鱼五沸，出鱼纳药，煎取三升，服一升，一日三次。

【主治】胎不安。

23820 生熟地汤

【方源】《产孕集·补遗》。

【组成】生地(酒炒) 大熟地各三钱 人参 当归 白芍各二钱(炒) 阿胶(蒲黄炒) 枣仁各三钱(炒) 艾八分 川断一钱五分 桑寄生五钱(酒炒) 棕榈皮一钱(炙) 杜仲三钱(姜汁炒断丝)

【用法】黄酒一杯，和服。

【主治】妊娠，因劳碌胎动血崩者。

23821 生熟饮子

《杨氏家藏方》卷三。为《医学纲目》卷六引《局方》“双解饮子”之异名。见该条。

23822 生熟饮子

【方源】《妇人良方》卷二十一。

【异名】生熟饮(《中国医学大辞典》)。

【组成】肉豆蔻 草果仁 厚朴(生，去粗皮) 半夏 陈皮 甘草 大枣(去核) 生姜各等分

【用法】上锉细，和匀，一半生，一半用湿皮纸裹煨令香熟，去纸，与一半生者和匀。每服五钱，水二盏，煎至七分，食前一服，食后一服。

【主治】产后疟疾多寒者。

23823 生熟饮子

【方源】《活幼口议》卷十八。

【组成】罂粟壳大者四个(一半炙，此一味去尽内瓣浮楞者佳) 陈皮二片(半炙) 甘草二寸(半炙) 乌梅二个(半煨) 淮枣二个(半煨) 生姜二块指大(半煨) 木香一钱(作二片，半煨) 诃子二个(大者半煨) 黑豆六十粒(半炒) 黄耆二寸(半炙) 白术二块指大(半煨) 川当归二寸(半煨)

【用法】上件各半生半熟，咬咀，和匀。每服三钱，水一小盏，入瓷罐内煮去半，滤去

滓，任意与服，至多勿虑。所有生黑豆不要打破，同煎服。

【主治】①《活幼口议》：婴孩小儿虚积痢，腹肚疼痛，下痢，里急后重，日夜无度。②《东医宝鉴·内景篇》：大人诸痢。

23824 生薯药酒

【方源】《医方类聚》卷一三六引《食医心鉴》。

【组成】生薯药半斤(刮去皮，拍令碎用)

【用法】上于铛中煮酒，酒沸，微微下薯药，不得搅，候熟，着盐、椒、葱白，更入酒少许，空心服之。

【主治】下焦虚冷，小便多数无力。

23825 生薯药酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【异名】山药酒(《寿亲养老》卷四)。

【组成】薯药

【用法】上将薯药于砂盆中烂研，然后刮下，于铫子中。先以小酥炒一大匙令香，次旋添入酒一盏，煎搅令匀，空腹饮之。

【功用】补虚损，益颜色。

23826 生薯药羹

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】生薯药半斤(切) 薤白半斤(去须，切)

【用法】上于豉汁中煮作羹，如常调和食之。

【主治】下焦虚冷，小便多数，瘦损无力。

23827 生藕汁饮

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】生藕汁半盏 地黄汁半盏 蜜一匙 淡竹叶一握(切，以水一盏半，煎取汁半盏)

【用法】同煮沸熟，温分三服，日二夜一。

【主治】产后恶血不利，壮热虚烦。

23828 生藕汁饮

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】生藕汁半盏 生地黄汁半盏

【用法】上二味相和，温暖，分为三服。

【主治】妇人蓐中好食热面酒肉，变成渴

躁。

23829 生干地黄丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】生干地黄一两 防风一两（去芦头） 薯蓣一两 茯神一两 山茱萸一两 桂心一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 远志一两（去心） 柏子仁一两 川椒一两（去目及闭口者，微炒去汗） 细辛一两 枳实一两（麸炒微黄） 甘菊花一两 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】肝脏风劳，头眩多忘，忧悲不足，面目青黄。

23830 生干地黄丸

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】生干地黄三两 羚羊角屑二两 赤茯苓一两 木香三分 甘草半两（炙微赤，锉） 河黎勒皮一两 独活一两 麦门冬一两半（去心，焙） 桂心二分 槟榔一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】干脚气，风毒搏于脚膝，皮内干枯，脚胫渐细，骨中疼痛，时复心闷。

23831 生干地黄丸

《圣惠》卷六十一。为《千金》卷二十二“干地黄丸”之异名。见该条。

23832 生干地黄丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】生干地黄一两 羚羊角屑半两 葳蕤半两 白鲜皮半两 黄连三分（去须） 黄耆半两（锉） 麦门冬一两（去心，焙） 玄参半两 地骨皮半两 川大黄一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温水送下，不拘时候。

【主治】妇人客热，面赤头疼，口舌生疮，心胸烦壅，饮食无味。

23833 生干地黄丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】生干地黄 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 当归（锉，微炒） 牛膝（去苗） 川大黄（别捣为末） 芎藭 土瓜根 赤芍药 桂心 川芒消各二两 虻虫一两（炒令微黄，去翅足） 水蛭半两（炒微黄）

【用法】上为末，以头醋三升，熬大黄末成膏，和诸药末，捣三二百杵，为丸如梧桐子大。每日空心及晚食前服二十丸，煎红蓝花汤送下。

【主治】妇人月水不调，或一月再来，或满月不来，或多或少，脐下疔痛，面色萎黄，四体虚翕，羸瘦，不能饮食。

23834 生干地黄丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】生干地黄 当归（锉，微炒） 防风（去芦头） 酸枣仁（微炒） 赤茯苓 黄耆（锉） 芎藭 羚羊角屑 羌活 甘草（炙微赤，锉） 桂心各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，食前以温酒送下。

【主治】小儿十岁以来血脉不流，筋脉缓弱，脚膝无力，不能行步。

23835 生干地黄丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】干地黄丸《准绳·幼科》卷二。

【组成】生干地黄半两 郁李仁半两（汤浸，去皮尖，微炒） 牛膝（去苗） 防风（去芦头） 桂心 海桐皮 羌活 白茯苓 薏苡仁各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服七丸，乳食前以温酒送下。

【主治】小儿脚趾挛缩。

23836 生干地黄汤

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】生干地黄 熟干地黄各一两（并洗） 麦门冬子半两（去心） 川当归一分 枳壳一分（米泔浸一宿，麸炒） 杏仁（汤泡，去皮尖，麸炒令赤） 防风 甘草

(炙) 赤芍药各一分

【用法】上咬咀。每服一大钱，水一小盏，以黑豆七粒煎至黑豆熟，去滓，通口服。

【主治】小儿疳蚀眼患，闭合不开，羞明怕日，及至开眼，有如内障，朦朦失所。

23837 生干地黄酒

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】生干地黄一斤 杉木节五两 牛蒡根一斤（去皮） 丹参三两 牛膝五两（去苗） 大麻仁半斤 防风三分（去芦头） 独活三两 地骨皮三两

【用法】上锉。用生绢袋盛，以酒三斗浸六七日。每于食前随性暖服之。

【主治】脚气，肿满烦疼少力。

23838 生干地黄散

【方源】方出《千金》卷四，名见《圣惠》卷七十三。

【组成】生干地黄半两 黄芩一两 黄连半两（去须，微炒） 桂心半两 川大黄半两（锉碎，微炒） 廋虫一分（微炒）

【用法】上为散。空心酒服方寸匕，每日三次

【主治】妇人漏下黄色。

23839 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】生干地黄一两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬半两（去心） 赤茯苓一两 半夏三分（汤洗七遍去滑） 麻黄三分（去根节） 紫菀三分（洗去苗土） 五味子二分 柴胡一两（去苗） 射干半两 黄芩三分 桑根白皮三分（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺痿咳嗽，吐脓血，胸肋胀满，短气羸瘦，不思饮食。

23840 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】生干地黄二两 玄参一两半 赤

茯苓一两 麦门冬一两（去心） 川升麻一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，心膈热毒，烦闷，谵语失度。

【备考】本方方名，《普济方》引作“生地黄散”。

23841 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】生干地黄四两 赤芍药一两 牡丹三两 犀角屑一两 黄芩一两 茜根一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。以愈为度。

【功用】消化瘀血。

【主治】伤寒发汗而不快，致内有蓄热，及鼻衄血不尽，内有余血者，面色黄，大便赤。

23842 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】生干地黄一两 赤茯苓一两 紫苏子（微炒） 桔梗（去芦头） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 人参（去芦头） 各半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，心烦喘急，咳逆，多涎唾有血。

23843 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】生干地黄一两 黄柏三分（锉） 黄芩一两 吴蓝一两 黄连三分（去须） 伏龙肝一两 麦门冬一两（去心）

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，加竹茹一分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒心热及余毒不退，吐血一二升不止。

23844 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】生干地黄 车前子 桑根白皮(锉) 紫菀(去苗土) 鹿角胶各半两(捣碎,炒令黄燥) 赤茯苓三分 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒,咳嗽唾血。

23845 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】生干地黄二两 地骨皮半两 甘草三分(炙微赤,锉) 伏龙肝一两 川朴消半两

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒后阴阳易,壮热心躁,鼻衄不止。

【备考】本方方名,《普济方》引作“生地黄散”。

23846 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】生干地黄 川升麻 玄参 赤芍药 紫菀(去苗土) 柴胡(去苗) 天门冬(去心) 麦门冬(去心) 各一两 贝母一两半(煨令微黄)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓,入蜜半匙,更煎一二沸,不拘时候温服。

【主治】时气肺热,咳嗽,喉中生疮。

23847 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】生干地黄一两 赤芍药一两 牡丹三分 犀角屑半两 刺薊一两 柏叶三分

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病发汗而汗不发,致内有积瘀,吐血不止。

23848 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】生干地黄二两 川升麻一两 柴胡三两(去苗) 射干一两 子芩一两 茵陈一两 犀角屑一两 麦门冬一两(去心) 桔梗一两(去芦头) 梔子仁一两 葳蕤一两 甘草一两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,入蜜一匙,更煎一沸,放温,食后服之。

【主治】脾劳壅热,身体、眼目、唇口悉黄,舌干,咽喉痛,不能咽唾。

23849 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】生干地黄一两 白茯苓一两 当归一两 麦门冬一两(去心) 人参一两(去芦头) 车前子三分 黄耆一两(锉) 枳壳三分(麸炒微黄,去瓤) 白芍药三分 甘草半两(炙微赤,锉) 酸枣仁一两(微炒)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】骨极。头热,肢节疼痛,不得睡卧,兼不思饮食。

【备考】本方方名,《普济方》引作“生地黄散”。

23850 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】生干地黄一两 柴胡一两(去苗) 知母一两 枳壳三分(麸炒微黄,去瓤) 赤芍药一两 麦门冬二两(去心,焙) 甘草三分(炙微赤,锉) 人参一两(去芦头)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚劳。四肢烦疼,口舌干燥,面色萎黄,食物无味。

23851 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】生干地黄一两 桑根白皮一两(锉) 诃黎勒一两(用皮) 甘草半两(炙微赤,锉) 柴胡一两(去苗) 麦门冬一

两半(去心,焙) 人参半两(去芦头) 大麻仁一两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】骨蒸寒热,肺痿喘促。

23852 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】生干地黄一两 蒲黄三分 犀角屑三分 黄连三分(去须) 黄芩一两 玄参一两 川升麻一两 川大黄一两(锉碎,微炒) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,每于饭后温服。

【主治】肝心积热,血灌瞳人,肿痛。

【宜忌】忌炙烤热面。

23853 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【异名】生地黄散(《东医宝鉴·外形篇》卷一)。

【组成】生干地黄 芎藭 羚羊角屑 川大黄(锉碎,微炒)各一两 赤芍药 枳壳(麸炒微黄,去瓤) 木香各三分

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】眼忽被撞打着,肿胀疼痛。

23854 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】生干地黄一两半 鸡苏苗三分 赤茯苓三分 射干三分 犀角屑三分 麦门冬一两半(去心,焙) 玄参一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加竹叶二七片,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾肺壅毒,咽喉不利,肿痛烦热。

23855 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【异名】干地黄散(《普济方》卷六十二)。

【组成】生干地黄一两半 鸡苏苗一两 赤茯苓一两 麦门冬一两半(去心,焙) 玄参一两 甘草半两(生,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加竹茹一分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】咽喉内生疮唾血,不下食。

23856 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】生干地黄三两 黄芩二两 阿胶二两(捣碎,炒令黄燥) 甘草二两(锉,生用) 柏叶一两 犀角屑一两 刺薊一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加青竹茹一鸡子大,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】心肺暴热,毒入胃,卒吐血不止。

23857 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】生干地黄二两 芎藭二两 黄芩二两 赤芍药 茅根 车前 人参(去芦头) 甘草(生用)各一两

【用法】上为散。每服五钱,以水一中盏,加青竹茹一鸡子大,煎至五分,去滓,温温空腹服之。

【主治】心脏积邪,毒流于小肠,小便出血。

23858 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】生干地黄二两 川大黄一两(锉碎,微炒) 人参一两(去芦头) 黄芩一两 当归半两 远志一两(去心) 麦门冬一两半(去心) 川升麻半两 赤芍药一两半 黄耆一两(锉) 赤茯苓一两 羚羊角屑一两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】缓疽,风热侵肿不住,肉欲成脓,四肢烦热。

23859 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【异名】竹叶黄耆汤（《普济方》卷二八八）。

【组成】生干地黄二两 黄耆一两（锉）甘草半两（生，锉） 麦门冬一两（去心） 赤芍药一两 黄芩一两 人参一两（去芦头）石膏一两 当归三分 半夏半两（汤浸七遍去滑）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加淡竹叶二七片，生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】发背壅热，烦渴不思饮食。

23860 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】生干地黄一两 甘草一两（炙微赤，锉） 白芷一两 当归一两（锉，微炒） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 羚羊角屑一两 续断一两 黄芩一两 赤芍药一两 芎藭二分 桂心三分

【用法】上为散。每服二钱，以温酒调下，每日四至五次。

【主治】金疮烦闷。

23861 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】生干地黄一两 酸枣仁三分（微炒） 羚羊角屑三分 白芍药三分 柴胡一两（去苗） 羌活半两 防风半两（去芦头） 桂心半两 牛膝二分（去苗） 黄耆二分（锉） 白茯苓三分 当归三分（锉碎，微炒） 白术三分 木香半两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】妇人风血气，或时寒热，体痛，不思饮食。

23862 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】生干地黄一两半 麦门冬一两（去

心） 甘草半两（炙微赤，锉） 茺萸三分 白茅根一两 兰叶一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，豆豉一百粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人心热壅闷，吐血。

【备考】本方方名，《普济方》引作“生地黄散”。

23863 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】生干地黄二两 柏叶一两（微炙）黄芩半两 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，每于食前温服。

【主治】①《圣惠》：妇人尿血不止。②《景岳全书》：血热小便出血。

23864 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】生干地黄一两 茜根一两（锉）黄芩一两 当归一两（锉，微炒） 地榆一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加竹茹一分，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】妇人赤带下不止，体瘦心烦。

23865 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】生干地黄一两 赤茯苓一两 麦门冬三分（去心） 葛根半两（锉） 石膏一两（细研） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后烦渴壮热，不思饮食。

【备考】本方方名，《普济方》引作“地黄散”。

23866 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】生干地黄二两 乌鸡骨一两(涂酥,炙令黄)

【用法】上为细散。每服半钱,以粥饮调下,不拘时候。

【主治】小儿脏腑壅热,气血不荣,致凶陷不平者。

23867 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】生干地黄 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 麦门冬(去心,焙) 五味子 川大黄(锉,微炒)各半两 滑石一分

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一中盏,入蜜半匙,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿寒热,咳逆上气,逆满,膈中有痰,食乳即吐。

【备考】本方方名,《幼幼新书》引作“生地黄散”。方中滑石,《幼幼新书》作“消石”。

23868 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】地黄散(《保婴撮要》卷四)。

【组成】生干地黄一两 杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 麦门冬一两(去心焙) 款冬花二分 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一中盏,加竹茹半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:小儿时气,壮热咳嗽,心胸胀闷,乳食不下。②《保婴撮要》:身热口干,咳嗽心烦。

23869 生干地黄散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】生干地黄半两 苦楝根一分(锉) 鹤虱半两 槟榔半两 酸石榴根半两(锉)

【用法】上为细散。三四岁儿,空心以热茶调下半钱,午后再服。取虫下为度。量儿大小,以意加减。

【主治】小儿蛔虫咬心痛。

23870 生干地黄散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】生干地黄(焙) 陈橘皮(去白,炒) 甘草(炙,锉) 白芷 酸石榴皮 牛角觔灰 续断 人参 地榆(锉,炙)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,食前米饮调下,每日二次。以止为度。

【主治】妇人血伤不止,腰脚痠重,倦怠无力,心烦渴燥,面目虚浮。

23871 生干地黄散

《普济方》卷三一九。为《千金》卷六“生地黄汤”之异名。见该条。

23872 生车前草饮

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】鲜车前草(不拘多少)

【用法】洗净捣烂,少入井水调搅取汁,食前饮一盞。

【主治】小肠有热,血淋急痛。

【加减】沙淋,加寒水石末一钱调服。

23873 生化六和汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】川芎二钱 当归四钱 黑姜 炙甘草 陈皮 藿香各四分 砂仁六分 茯苓一钱

【用法】加生姜三片,水煎服。

【主治】产后血块痛未除,患霍乱。

23874 生化夺命汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎三钱 当归四钱 干姜(炙黑)五分 甘草(炙)三分 桃仁(去皮尖,研)十一粒 肉桂三分(服二剂,去此味)

【用法】上药加黑枣一个,用水一盞半,煎七分,稍热服。

【主治】形脱气促或有汗晕厥,牙关紧闭,昏乱将绝。

23875 生化安神汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎二钱 当归四钱 干姜(炙黑)五分 甘草(炙)三分 茯神二钱 枣仁(炒)一钱 桃仁(去皮尖,研)十一粒

【用法】加黑枣二个，用水二盏，煎七分，热服。

【主治】产后气血暴虚，神魂无所依，以致言语无伦，而目多妄见，万弗认为鬼邪，是块痛未除。

23876 生化补元汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎一钱 当归三钱 干姜（炙黑）四分 甘草（炙）四分 人参二钱 黄耆（生）二钱 于术（生）二钱 茯神二钱 枣仁（炒）一钱 橘红三分 桃仁（去皮尖，研）七粒

【用法】上药加莲子十个，黑枣二个，用水二盏，煎七分，食远热服。

【功用】培养气血。

【加减】汗多，加麻黄根五分。有痰，加竹沥一匙、姜汁半匙。大便不通加肉苁蓉二钱。

【备考】产后气血暴虚，神魂无所依倚，以致言语无伦，而目多妄见，万弗认为鬼邪。服生化安神汤后，块痛已除，急须服此方。

23877 生化消食汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】川芎二钱 当归五钱（酒洗） 干姜（炙黑） 炙草各四分 桃仁十粒（去皮尖） 神曲（炒） 麦芽（炒）各六分

【用法】水煎服。伤肉食，加山楂五分、砂仁五分；伤寒食物，加吴茱萸一钱、肉桂五分；虚，加人参一钱或二钱。

【主治】产后块痛未止，停食痞塞。

23878 生化益气汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎一钱 当归二钱 干姜（炙黑）三分 人参二钱 黄耆（生）二钱 枣仁（炒）二钱 甘草（炙）四分 麻黄根五分 桃仁（去皮尖，研）九粒 浮小麦二钱

【用法】用水一盞半，煎七分，热服。

【主治】产后气短，似喘非喘，气不相续，或兼痰兼热，或头痛发热恶寒，有似外感。

【加减】有痰，加竹沥一匙，姜汁半匙；咳

嗽，加苦杏仁十一个，姜制半夏八分；口渴，加麦冬一钱，五味子七粒。

23879 生化通经汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】酒丹参四钱 香附 土牛膝各三钱 当归尾 桃仁各二钱 红花一钱 泽兰四钱

【用法】水煎，温服。

【功用】活血逐瘀。

【主治】月经先后无定期，属血瘀实证，小便黄少，脉沉弦有力。

23880 生气养胃丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】大附子一只（炮，去皮脐，切块，姜汁半盞煮干） 厚朴一两（去皮，姜制） 苍术一两（米泔水浸一宿，刮去皮） 陈皮一两（去白） 白茯苓一两（去皮） 甘草半两（炙）

【用法】上为细末，用大北枣五十个（煮熟，去皮核，取肉），大蒜五枚（煨熟，去皮膜），研烂为丸，如小梧桐子大。每服五十丸，渐加至百丸，米饮吞下。

【主治】脾虚冷涎，翻胃，药食不纳者。

23881 生气救脱汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参三两 附子一钱 黄耆三两 熟地一两 麦冬一两 北五味一钱

【用法】水煎服。

【功用】补气，生元阳，长真水。

【主治】阴阳脱症。男女贪欢，尽情纵欲，以致精脱而气亦甚微者。

23882 生发一号丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生熟地各 90 克 当归 90 克 白芍 60 克 女贞子 30 克 菟丝子 30 克 羌活 30 克 木瓜 30 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。

【功用】养血消风。

【主治】脂溢性脱发。

23883 生发二号丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】干地黄 60 克 山药 60 克 枸杞子 60 克 女贞子 60 克 桑椹子 60 克 神曲 30 克 蚕砂 30 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。

【功用】滋肝益肾，凉血消风。

【主治】斑秃。

23884 生发泽兰膏

《医心方》卷四。即《外台》卷三十二引《深师方》“泽兰膏”见该条。

23885 生发墙衣散

《普济方》卷五十。即《圣惠》卷四十一“垣衣散”。见该条。

23886 生地八味汤

《医钞类编》卷八。为《医学心悟》卷三“生地八物汤”之异名。见该条。

23887 生地八物汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【异名】生地八味汤（《医钞类编》卷八）。

【组成】生地三钱 山药一钱五分 知母一钱五分 麦冬三钱 黄芩一钱 黄连一钱 黄柏一钱 丹皮一钱五分 荷叶二钱

【用法】水煎服。

【主治】中消。

【方论选录】《证因方论集要》：生地、丹皮以凉心火，麦冬、知母以清肺热，山药以养肺阴，三黄大苦大寒，所谓以苦泄之，以甘缓之也。

23888 生地车前散

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】木通 犀角 升麻 白芍 黄耆 紫草 地榆 生地 车前 甘草

【主治】溺血，或如痘汁，或如苏木水，或如屋漏水。

【加减】便血，加川芎、米仁；吐血，加炒黄连；痢，加滑石、山栀。

23889 生地化毒汤

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】生地黄 金银花 白蒺藜（炒，去

刺） 连翘 玄参 胡麻仁 白附子（乌豆水煮透） 何首乌（乌豆水煮，俟干） 威灵仙 黄连 木通 薄荷叶 荆芥穗 甘草梢

【用法】干红浮萍为引，水煎服。

【主治】麻毒未尽，生疮不已。

23890 生地升麻汤

【方源】《医钞类编》卷十七。

【组成】梔子 升麻 生地 青黛 石膏 黄芩 葱白。

【用法】水煎服。

【主治】妊娠发斑，小便如血，胎欲堕。

【宜忌】忌热物。

23891 生地丹皮汤

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】怀生地 牡丹皮 川贝母（去心，研） 麦门冬（去心） 广陈皮各一钱 炙甘草三分 沙参一钱

【用法】加焙扁柏叶一钱，水煎服。

【主治】脉数内热，咳嗽痰血者。

【加减】如不止，加阿胶一钱（蛤粉炒成珠）；如吐血，去门冬，加荷叶、艾叶，或加藕节、童便。

23892 生地丹参汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】生地一钱五分 丹参一钱 青蒿七分 白芍（酒炒）八分 丹皮五分 桔梗六分 竹叶四分 甘草三分

【功用】清热养血。

【主治】急惊初愈者。

23893 生地四物汤

【方源】《笔花医镜》卷二。

【组成】生地三钱 归身 赤芍各一钱五分 川芎一钱

【主治】血淋。

23894 生地四物汤

【方源】《医钞类编》卷十四。

【组成】生地 川芎 当归 白芍 红花 桃仁 花蕊石

【用法】水煎服。

【主治】血淋。

23895 生地冬苓汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬 生地各二两 黄芩三钱

【用法】水煎服。

【主治】心热之极，火刑肺金，鼻中出黑血不止。

23896 生地玄参汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】生地四钱 麦冬（去心） 白芍（酒炒） 丹皮 丹参各一钱五分 郁金七分 玄参一钱五分 三七五分

【用法】加磨浓墨并童便各半酒杯，冲服。

【主治】色欲过度之人，肾火烁金而吐血、唾血。

23897 生地玄参汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生地 15 克 玄参 15 克 甘草 31 克 板兰根 31 克 银花 15 克 石斛 31 克 北沙参 31 克 紫草 31 克 莲子心 9 克 当归 15 克 丹参 31 克 桃仁 15 克 山萸肉 15 克 山甲 9 克 全虫 9 克 蜈蚣二条 大白花蛇 6 克 秦艽 15 克

【用法】水煎，内服。

【主治】系统性红斑狼疮。

23898 生地芍药汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】生地 白芍 当归 连翘 陈皮 甘草 白茯苓 川贝母 苡仁 百合

【用法】水煎服。

【主治】伤寒。表里失序，汗未通达，遗留积热，或生毒，或手足不利，强痛不伸。

23899 生地芍药汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】生地二钱 花粉 白芍 知母 泽泻（盐水炒） 黄柏各一钱五分 木通一钱

【主治】火邪头痛。

23900 生地麦冬饮

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】生地黄 麦冬各五钱（去心）

【用法】水二钟；煎八分，食后服。

【主治】胃热耳衄，肾脉虚数者。

23901 生地芩连汤

【方源】《伤寒六书》卷六。

【异名】生地黄连汤（《赤水玄珠》卷十八）。

【组成】黄芩 山梔 桔梗 甘草 生地 黄 黄连 柴胡 川芎 芍药 犀角（如无，以升麻代之）

【用法】水二钟，加大枣二枚，煎至八分，临服八茅根捣汁，磨京墨调饮，如无茅根以藕捣汁亦可。

【主治】鼻衄成流，久不止者；或热毒入深，吐血不止者。

23902 生地芩连汤

《医学入门》卷四。为《元戎》“生地黄黄连汤”之异名。见该条。

23903 生地芩连汤

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】生地黄 黄芩 黄连 犀角 茅根 甘草 人参 桔梗 山梔 当归

【用法】加生姜、大枣，水煎，临服入捣韭汁墨磨一匙，调之温服。

【主治】鼻衄成流不止者；或热毒入营，吐血不止者。

【备考】若见耳、目、口、鼻并出血者，则为上厥下竭，不治。

23904 生地芩连汤

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】生地黄 黄连 黄芩 连翘 红花 防风 粉葛 梔仁 玄参 木通 石膏 当归 牡丹皮 白芍药

【用法】加灯心为引，水煎服。

【主治】麻疹毒火炽甚，其色紫红，干燥晦暗。

【备考】如大便三四日不通，合河间凉膈散利之。

23905 生地芩连汤

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】生地 连翘 柴胡 桔梗 知母 淡芩 川连 川芎 黑梔 生草 犀角 赤芍 大枣 茅根汁 藕汁 金墨

【主治】鼻衄不止。

23906 生地连翘散

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】当归 生地 玄参各一钱五分 连翘(去心)二钱 前胡 枳壳 黄芩各八分 甘草 桔梗 粘子 花粉 白芍各一钱

【用法】加灯心二十寸，水煎服。

【主治】心脾火热，痰塞气闭，风痹壅肿诸症。

23907 生地败毒散

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】生地黄一钱五分 丹皮 黄芩(酒炒) 柴胡各七分 牛蒡子(炒) 连翘 天花粉 玄参 金银花 桔梗各八分 薄荷叶 黄柏 赤芍各五分 生甘草(去皮)三分 熟石膏 淡竹叶各一钱

【用法】加灯心五十寸为引，水煎，另以犀角磨汁兑服。

【主治】麻疹后口臭、口疮、唇烂，兼咽喉疼痛者。

23908 生地栀子汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】生地黄 栀子 葛根 薄荷叶

【用法】加灯心为引，水煎服。

【主治】心火上冲，衄血。

23909 生地骨皮汤

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】地骨皮 生地黄 玄参 麦冬 龙胆草 牛蒡子 连翘 黄芩(酒炒) 梔仁(炒) 赤茯苓 木通 甘草梢

【用法】加灯芯为引，水煎服。

【主治】麻疹收后，越六七日而又复热。

【加减】舌有白苔，加荆芥、防风；舌有黄苔，加酒炒连翘；便秘，加枳壳、火麻仁，闭甚，再加丑牛。

23910 生地养阴汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】生地黄八钱 川贝母三钱 青黛四钱 梔子三钱 黄芩四钱 万年灰三钱 藕节炭五钱 木通三钱 甘草三钱

【用法】水煎，温服。

【主治】嗽血。

【方论选录】此方以清热为要，用生地为君，养其真阴；佐以贝母，清热止嗽，青黛、梔子、黄芩、木通清其三焦之热，藕节炭去瘀生新，万年灰清热止血，甘草和药解毒，盖热清而血自止矣。

23911 生地益阴煎

【方源】《古方汇精》卷四。

【组成】玄参 银花 赤芍 白茯苓各二钱 归身 甘菊各一钱五分 丹皮八分 生地五钱 生甘草一钱

【主治】痘后诸患。

【备考】上方与参术和脾饮相间服之。

23912 生地黄汁汤

【方源】《外台》卷十引《古今录验》。

【组成】生地黄汁一升 当归 甘草(炙) 白石英(绵裹) 人参各一两 附子二分(炮) 白小豆三十粒 白鸡一只(男用雌，女用雄，疗如食法。一作雉)

【用法】上切。以水一斗五升，煮鸡，取七升汁，去滓；纳地黄汁诸药等煮取三升，去滓，分服六合，日三次，夜二次。

【主治】肺癰。

【宜忌】忌芜荑、海藻、菰菜、冷水、猪肉等。

23913 生地黄汁散

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷五十四。

【组成】生地黄汁二升 生天门冬汁 白蜜各三升 羊肾一具(炙) 白术 麦曲各一斤 甘草 干姜 地骨皮各八两 桂心 杜仲 黄耆各四两 当归 五味子各三两

【用法】上为末，纳盆中。取煎三物汁和研，微火上暖盆取热，更研，日晒干，常研，令离盆。每服方寸匕，酒下，每日一次。

【主治】肾气虚寒，腰脊苦痛，阴阳微弱，耳鸣焦枯。

23914 生地黄连汤

《赤水玄珠》卷十八。为《伤寒六书》卷六“生地芩连汤”之异名。见该条。

23915 生地黄连汤

《准绳·幼科》卷三。为《元戎》“生地黄黄连汤”之异名。见该条。

23916 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】生地黄三两 玄参一两 赤茯苓一两 麦门冬一两 犀角屑一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上细锉，和匀。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气，心膈大热烦闷，言语失度。

23917 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】生地黄二两（切） 川升麻一两 玄参一两 川大黄一两（生用） 柴胡二两（去苗） 贝母一两（煨令微黄） 麦门冬一两（去心） 百合一两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上细锉。每服半分。以水一大盏，煎至五分，去滓，入蜜一小匙。更煎一沸，放温服，不拘时候。

【主治】热病，毒气攻肺，咳嗽，喉中生疮。

23918 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷二十。

【异名】生地黄汤（《圣济总录》卷九）。

【组成】生地黄汁一中盏 竹沥一中盏 荆沥一中盏 防风半两（去芦头） 附子半两（炮裂，去皮脐） 羌活一两

【用法】上细锉。以汁沥等同煎至二中盏，去滓分温三服，不拘时候。

【主治】瘫痪风，手足不遂，言语蹇涩，心神躁闷。

23919 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】生地黄二两 柴胡一两（去苗）

葱白五寸（切） 香豉半合 甘草半两（生用） 生姜半两 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 地骨皮半两 赤芍药半两

【用法】上细锉，和匀。每服半两，以童便一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】骨蒸劳热，四肢疼痛，小便赤黄。

23920 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷五十五。

【异名】生地黄汤（《普济方》卷一九六）。

【组成】生地黄二两 淡竹叶二十片 大麦半合 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上细锉，和匀。每服半两，以水一中盏，加生姜半分，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心黄。

23921 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】生地黄汁一中盏 童便一中盏 当归一两（锉） 生姜汁一合 酒一中盏

【用法】上药捣和，煎五七沸，去滓，不拘时候，温服一小盏。

【主治】产后卒血气上攻，心胸烦闷，口干壮热，不思饮食。

23922 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】生地黄汁二合 生益母草汁二合 生藕汁二合 鸡子白二枚 童便一合

【用法】上药相和，微煎三两沸，下鸡子白，搅令散，分温三服。

【主治】产后血运，心烦闷乱，恍惚如见鬼神。

23923 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】生地黄汁三合 藕汁二合 童便三合

【用法】上药相和，煎三两沸，分温三服。

【主治】产后恶血冲心，闷乱口干。

23924 生地黄饮子

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】生地黄汁三合 竹沥三合 独活三分(末)

【用法】上药相和，煎至四合，去滓，不拘时候，量儿大小，分减温服。

【主治】小儿中风，面引口偏，身体拘急，舌不能转。

23925 生地黄饮子

《洁古家珍》。为《保命集》卷下“生地黄散”之异名。见该条。

23926 生地黄饮子

【方源】《西塘感证》卷中引海藏方。

【组成】生地 熟地 枸杞 地骨皮 黄耆 白芍 天冬 黄芩 甘草 枳壳 防风

【主治】感证劳复，微挟风寒与食。

23927 生地黄饮子

《得效》卷七。为《简易》引《家宝方》(见《医方类聚》卷一二五)“地黄饮子”之异名。见该条。

23928 生地黄饮子

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】生地 赤芍各二钱 羌活 当归各一钱 甘草二分

【用法】上为极细末。用灯心煎汤服。产妇亦宜服，抹少许入儿口内。

【主治】小儿生下满身面目俱黄，状如金色，面赤身热，眼闭不开，大便不通，小便如梔汁，满身生疮。

23929 生地黄饮子

【方源】《证治汇补》卷二。

【组成】生地 熟地 天门冬 麦门冬 黄耆 甘草 银柴胡 黄芩 地骨皮 白芍药

【用法】水煎服。

【功用】《医略六书》：扶元退热。

【主治】①《证治汇补》：虚热血证。②《医略六书》：气虚血热，潮热，吐衄，脉弦数者。

【方论选录】《医略六书》：气虚血热，不能摄火，而经气疏泄，血不得归经，故吐血、衄血，潮热不止焉。生地滋阴壮水以凉血，熟

地补血益阴以济火，麦冬清心润燥，天冬润燥益阴，黄耆补既伤之气，蜜炙能禁疏泄之血，黄芩清燥热之火，炒黑能止吐衄之血，地骨皮除蒸热，炙甘草缓虚阳，银柴胡解阴分之热，白芍药敛热伤之阴。俾热退阴藏则潮热自解，而经气清和，吐衄无不止矣。此扶元退热之剂，为气不摄火吐衄之专方。

23930 生地黄饮子

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】人参 生地 熟地 麦冬 天冬 石斛 五味子 甘草 枇杷叶 茯苓

【功用】《医略六书》：滋培润燥。

【主治】①《证治汇补》：下焦虚火上炎。②《医略六书》：下焦虚火，消渴，脉虚数者。

【加减】小便不利，加茯苓。

【方论选录】《医略六书》：下焦虚火上炎、肺金受烁，不能分布津液上潮，故消渴不止。生地滋阴壮水以制虚火，熟地滋肾补阴以济心阳，天冬益阴润肺，麦冬润肺凉心，人参扶元生水，甘草泻火生金，五味子收肺气之耗散，枇杷叶平肝气之上逆，石斛益阴以除虚热。水煎，温服，使肾水内充，则虚阳自潜而阴精无不上奉，何消渴之不瘳哉！小便不利，加茯苓，乃水出高源，源流并泽以上潮，何消渴之有？此滋培润燥之剂，为阴虚消渴之专方。

23931 生地黄饮子

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五钱 阿胶三钱(蒲黄灰炒) 白芍一钱半(炒) 麦冬三钱(去心) 地榆三钱(炒黑) 茯神二钱(去木) 小蓟根三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】孕妇尿血，脉虚数者。

【方论选录】胎热伤阴，经血暗渗，故尿血不止，胎孕不安焉。生地滋阴凉血以资血室，阿胶补阴益血以护胎元，麦冬清心润肺，白芍敛阴止血，茯神安神定志，地榆凉血涩血，小蓟散瘀凉血以上溺血也。水煎，温服，使

阴血内充，则胎热自化而经气完复，经血无妄行之患，何溺血之有不止者？胎孕无不自安矣。

23932 生地黄饮子

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】人参 黄耆 生地 熟地 金石斛 天冬 麦冬 枳壳 枇杷叶 泽泻各一钱 甘草五分

【主治】消瘕。

23933 生地黄煎丸

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】生地黄汁一升 青蒿一升 生姜汁一合 童便三升 牛膝一两（去苗） 生干地黄四两 桃仁三两（去皮尖，研如膏，同前药六味于石锅子内，慢火熬令烂，研绞取汁，去滓，入蜜半合，更熬如膏） 秦艽一两（去苗） 柴胡一两（去苗） 川大黄一两（锉碎，微炒） 鳖甲二两（涂醋，炙令微黄，去裙襕） 赤茯苓三分 胡黄连三分 犀角屑三分 知母三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 龙胆三分（去芦头） 木香三分 黄芩三分 地骨皮三分 桔梗三分（去芦头） 桑根白皮三分（锉） 赤芍药三分 当归三分 麝香半两（细研）

【用法】上为末，入麝香研令匀，用前膏和捣为丸，如梧桐子大。每于食前以温酒送下三十丸。清粥饮下亦得。

【主治】骨蒸劳，烦热口干，颊赤，咳嗽，寒热盗汗，四肢干瘦。

23934 生地黄煎丸

《圣惠》卷七十九。为《外台》卷三十四引《删繁方》“生地黄煎破血丸”之异名。见该条。

23935 生地黄煎丸

【方源】《普济方》卷三五二引《圣惠》。

【组成】童便一升 生地黄汁 生藕汁各一升 生姜汁三升

【用法】上先煎前三味，约三分减二，次下姜汁，慢火煎如稀汤。每取一合，暖酒调下。

【主治】产后血气不调，腹中生瘕结而不散，痛无定处。

【备考】本方方名，据剂型，当作“生地黄煎”。

23936 生地清肺饮

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】桑皮（炒） 生地黄 天冬 前胡 桔梗 苏叶 防风 黄芩 生甘草 当归 连翘（去心） 赤苓

【用法】加生姜、红枣为引，水煎服。

【主治】肺病。面白，气逆咳嗽，毛发枯焦，皮上生粟，肌肤干燥，憎寒发热，常流清涕，鼻颊生疮。

23937 生地清肺饮

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】生地 麦冬 天冬 杏仁 川贝米仁

【主治】肺病，鼻疮，口疮，咳血，音哑。

23938 生地榆根汤

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】生地榆根一斤（洗，切）

【用法】上锉细。以水一斗，煎取五升，去滓，温洗疮上，冷却温，每日二次。

【主治】热疮。

23939 生肉地黄膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】生地黄一斤 辛夷 独活 当归 大黄 芎藭 黄耆 薤白 白芷 芍药 黄芩各二两 续断二两

【用法】上切，以腊月猪脂四升，微火煎白芷，色黄膏成，绞去滓。敷，每日四次。

【主治】痈疽败坏。

23940 生肉芎藭散

《外科精义》卷下。为《圣济总录》卷一三五“芎藭散”之异名。见该条。

23941 生肉神异膏

【方源】《得效》卷十九。

【组成】雄黄五钱 滑石倍用

【用法】上为末。洗后搽疮上，外用绵子覆盖相护，凡洗后破烂者，用此贴之。

【主治】痈疽坏乱，及诸疮发毒。

【备考】本方方名，据剂型当作“生肉神异散”。

23942 生肉黄耆膏

《鬼遗》卷五。为原书卷二“生肉膏”之异名。见该条。

23943 生肉黄耆膏

【方源】《鬼遗·附录》。

【异名】黄耆膏（《普济方》卷二九〇）。

【组成】黄耆 芍药 大黄 当归 芎藭 独活 白芷 薤白各一两 生地黄三两

【用法】上切。猪膏二升半，煎三上三下，膏成，绞去滓，敷兑疮中，摩左右，每日三次。

【主治】痈疽发，坏出脓血。

23944 生血止崩汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎一钱 当归四钱 黑姜四分 炙草五分 桃仁十粒 荆芥五分（炒黑） 乌梅五分（煨灰） 薄黄五分（炒）

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】产后血崩。

【宜忌】忌姜、椒、热物、生冷。

23945 生血补气汤

【方源】《回春》卷八。

【组成】人参 白术（炒） 茯苓 当归 白芍 熟地黄 陈皮 香附 贝母各等分 桔梗 甘草二味减半

【用法】上锉。水煎服。

【主治】杖后溃烂久不愈者。

【加减】寒热往来，加柴胡、地骨皮；口干，加五味子、麦门冬；脓清，加黄耆；脓多，加川芎；肌肉迟生，加白蔹、肉桂。

23946 生血补髓汤

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】生地 白芍 川芎 黄耆 杜仲 茄皮 牛膝 红花 当归 续断

【用法】水煎服。

【功用】①《伤科补要》：上骱后补虚。②《中医伤科学讲义》：扭挫伤筋及脱臼复位后补虚调理。

23947 生血补髓汤

【方源】《接骨入骱》。

【组成】当归 生地 熟地 白术 枳壳 荆芥 白芍各二钱 防风 广皮 杜仲（盐水炒） 丹皮 川芎 干姜 牛膝 独活 五茄皮各一钱 川续断 黄耆 熟艾 香附 羌活各八分 鲜红花五分 甘草三分 云茯苓五钱

【用法】水、酒各半盏，加大枣，煎八分，食远服。

【主治】跌打损伤。

23948 生血起废汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】蕤蕤二两 山茱萸四钱 熟地一两 当归一两 茯苓五钱 白芥子五钱

【用法】水煎服。

【主治】血虚不能养筋脉，身未颠仆，左手半边不仁，语言謇涩，口角流涎。

23949 生血润肤汤

【方源】《证治宝鉴》卷三。

【组成】天冬 麦冬 生地 熟地 黄芩 黄耆 升麻 红花 瓜蒌 酒 桃仁

【用法】水煎服。

【主治】里燥证。口燥舌干，小便多而浊。

23950 生血润肤饮

【方源】《医学正传》卷二。

【异名】生血润燥饮（《医学六要》卷四）。

【组成】川归身（酒洗） 生地黄 熟地黄（酒洗） 黄耆（蜜炙）各一钱 天门冬一钱五分 麦门冬（去心）一钱 五味子九粒 片芩（去朽，酒洗）五分 栝楼仁五分 桃仁泥五分 酒红花一分 升麻二分

【用法】上细切，作一服。水二盏，煎至一盏，温服。

【主治】燥症。

【加减】如大便结燥，加麻仁、郁李仁各一钱。

【临证举例】予仲兄怀德处士，年四十五，平生体瘦弱血少，值庚子年岁金太过，至秋

深燥金用事，久晴不雨，得燥证：皮肤折裂，手足枯燥，搔之屑起，血出痛楚，十指甲厚，服此方数十贴，其病如脱。后治十数人皆验。

23951 生血润燥汤

【方源】《医学启蒙》卷三。

【组成】当归 生地黄 熟地黄 红花 天门冬 麦门冬 栝楼仁 桃仁 升麻 紫石英 阿胶各等分

【用法】水二钟，煎八分，食远温服。

【功用】养血润燥。

【主治】血虚气弱，口干唇燥，发黄，肌肤白屑，大便秘结，水少火多。

【加减】肌肤燥裂，加黄耆、桂枝；口渴，加天花粉、葛粉；心烦，加五味子、山梔、柏子仁；夜不寐，加枣仁、玄参；身热，加柴胡、黄芩；齿颊肿痛，加牡丹皮、石膏；气弱，加人参、黄耆；脾虚少食，加白术、陈皮；头疼，加川芎、蔓荆子；耳鸣，加山梔、木通、石菖蒲；小水不利，加车前子；腹痛，加芍药、甘草；大便秘结，加火麻仁、郁李仁，甚者加酒大黄。

23952 生血润肤饮

《医学六要》卷四。为《医学正传》卷二“生血润肤饮”之异名。见该条。

23953 生肌丁香膏

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】丁香三分 没药三分 安息香三分 麝香一分（细研） 当归三分 乳香三分（细研） 附子三分（去皮脐） 白芷三分 桂心三分 雄雀粪四十枚 茺莢仁三分 黄丹三分（微炒） 麻油一斤

【用法】上锉细。入油，以慢火煎，候白芷黄焦色，去滓，下黄丹，更微微煎，搅勿住手，膏成，收于不津器中。频取贴之。

【主治】冷瘰疮及瘰癧疼痛。

23954 生肌七宝丹

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】没药 乳香各五分 铅粉三钱 桃丹三钱 辰砂三分 六仙红升五分 川贝

三钱（去心）

【主治】乳疔。

23955 生肌八宝丹

【方源】《医方易简》卷五。

【组成】珠母（拾取露天蚌壳，左顾者）半斤（须括去背后黑衣，安火上煅，研细） 血竭三钱（另研） 芦甘石三两（以黄连二钱煎出汁，煅淬，研细末） 儿茶一两 煨石膏三两 赤石脂三两（火煅） 陈年丝吐渣一两（煅，不可过性） 梅片（临用时将药末五钱，加入冰片）一分

【用法】上为细末，研如香灰色，瓷瓶盛贮，听用。掺上。

【功用】生肌长肉；平口收功。

【主治】疮毒脓腐已尽者。

23956 生肌八宝丹

【方源】《中药成方配本》。

【组成】制甘石四钱 煨龙骨三钱 煨石膏五钱 煨赤石脂四钱 血竭五分 冰片六分 轻粉一钱五分 白蜡三钱

【用法】各取净末和匀，再研至极细为度，约成粉二两一钱。将药粉掺患处，用白玉膏盖贴。

【功用】生肌收口。

【主治】疮疡溃烂，久不收口。

23957 生肌干脓散

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】黄连 贝母 降真香（烧存性）白及 海螵蛸 五倍子（炒黑） 芸香各五钱 轻粉五分

【用法】上为末。用药水洗，次掺此末，外贴膏药。

【主治】瘰癧马刀，脓汁不干者。

23958 生肌五宝丹

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】制甘石一两 珍珠五钱 轻粉三钱 琥珀二钱 冰片二分

【功用】生肌收口。

23959 生肌太乙膏

【方源】《奇方类编》卷下。

【异名】太乙膏(《金鉴》卷九十)。

【组成】真麻油一斤 当归二两 生地二两 生草一两

【用法】以油煎三药枯,滤去滓,滴水不散;然后每油一两,下炒过黄丹五钱,慢火熬成膏,取起,再下黄鼠一两、白鼠一两,微火熬匀,再加入去油乳香、没药各二钱,搅匀。摊贴,一日一换。

【功用】生肌长肉,止疼化毒。

【主治】已破疮毒。

23960 生肌长肉膏

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】清油十两 龙骨(研)一两 木香 槟榔 黄连(去须)各三分(三味同为末,取细)

【用法】先将油入锅内慢火熬,滴水成珠子,下龙骨末,更熬如稀膏则止,去火候稍温,即下三味药末,不住手搅,候冷,以瓷盒内收。随疮大小贴之。

【主治】一切痈疽恶疮。

23961 生肌长肉膏

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】龙骨三钱 白芷二钱半 血竭二钱 黄丹 辰砂各五钱 石膏一两 樟脑少许

【用法】上为末。先将黄蜡一两熔化,入香油少许,然后入药末搅匀得所。捻成条子,塞疮口内。肌肉自长。

【主治】痈疽。

【加减】如痛甚,加乳香、没药各二钱。

23962 生肌长肉膏

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】当归 黄耆 山茨菇 白芷 甘草 血余 天麻 独活 穿山甲 露蜂房 五倍子 天花粉 荆芥 白薇 肉桂 金银花 白芍 牛蒡子各一两

【用法】净麻油三斤;如法熬,去滓,约略油之老嫩,入飞过黄丹收之,再入白蜡、黄蜡、血竭、铜绿各二两,待冷,再入轻粉、乳

香、没药各一两(均去油),龙骨(煨)、象皮(炒)、樟脑、赤石脂、儿茶各一两,麝香五厘,冰片二钱,各制为末,和入搅匀,收藏待用。

【主治】跌打损伤。

23963 生肌凤雏膏

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】鸡蛋 轻粉 乳香 血竭 龙骨末

【用法】用鸡蛋煮熟去白,用黄十余个,铜勺内熬油,倾入盏内,约油三钱,加轻粉(为末)、乳香、血竭、龙骨末各五分,共入油内和匀。每日早、午、晚鸡翎蘸涂患孔内。膏盖避风。深者半月完口。

【主治】痔疮。

23964 生肌玉红丹

《同寿录》卷四。为《奇方类编》卷下“生肌红玉丹”之异名。见该条。

23965 生肌玉红膏

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】玉红膏(《慈幼新书》卷六)、生肌膏(《外伤科学》)。

【组成】白芷五钱 甘草一两二钱 归身二两 瓜儿血竭 轻粉各四钱 白占二两 紫草二钱 麻油一斤

【用法】先将当归、甘草、紫草、白芷四味,入油内浸三日,大勺内慢火熬,药微枯色,细绢滤清,将油复入勺内煎滚,下整血竭化尽,次下白占,微火亦化;先用茶钟四只预顿水中,将膏分作四处,倾入钟内,候片时方下研极细轻粉,每钟内投和一钱搅匀,候至一伏时取起,不得加减,致取不效。用于已溃流脓时,先用甘草汤,甚者用猪蹄药汤,淋洗患上,软绢挹净,用振脚挑膏于掌中擦化,遍搽新腐肉上,外以太乙膏盖之。大疮早、晚洗换二次,内兼服大补脾胃暖药。

【功用】去腐肉,生新肉,敛疮口。

【主治】痈疽发背,诸般溃烂,棒毒等疮。

23966 生肌地栗粉

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】荸荠一两(去皮,磨粉) 真象牙屑 川贝 云苓各五钱

【用法】上药为末,和匀,再研极细。掺膏上用。

【功用】收口。

【主治】一切外患溃后,余肉已尽,新肌未生。

23967 生肌收口膏

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】乳香 没药(各去油) 儿茶 血竭 轻粉各一钱 寒水石 水龙骨(各煨) 韶粉各三钱 发灰 黄占 白占各二钱 麻油四两(一方有郁金)

【用法】将油先熬数沸下蜡,后下药末,用槐枝搅匀摊膏。先以防风、荆芥、苦参、黄柏、黄连、连翘、银花、甘草、槐花、绿豆粉各三钱,煎汤洗净其疮,然后贴之。

【主治】治诸疮并下疳及轻粉毒。

23968 生肌红玉丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【异名】生肌玉红丹(《同寿录》卷四)。

【组成】黄丹(炒)二钱 白龙骨(煨)二钱 石膏(煨)三钱

【用法】上为末。掺之。

【主治】疮不收口。

23969 生肌完肤散

【方源】《产论》。

【组成】大蒜一百钱(烧存性) 轻粉十一钱 莽草五钱(阴干,烧为灰)

【用法】以胡麻油调之,涂其疮上。

【主治】分娩阴裂者。

23970 生肌青龙散

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】诃子皮 龙骨 高茶各等分

【用法】上为末。干掺上。

【主治】打扑损伤。

【备考】本方原名“生肌青龙膏”,与剂型不符,据《普济方》改。

23971 生肌拔毒散

【方源】《重刊刺疗捷法》。

【组成】石膏一两 黄丹一钱(洗净) 乳香一钱 没药一钱 炉甘石二钱

【用法】上为细末。干掺之。

【主治】疗疮有脓者。

23972 生肌定痛散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】乳香 没药 龙骨 朱砂 雄黄各一钱 血竭 儿茶 海螵蛸各二钱 赤石脂五钱 白及 白蔹各一钱半 片脑一分(或加天灵盖一钱)

【用法】上为末。掺之,外贴膏药。

【功用】生肌止痛。

23973 生肌定痛散

【方源】《外科大成》卷一。

【异名】生肌散(《性病》)、化腐生肌散(《全国中药成药处方集》沈阳方)。

【组成】生石膏(为末,用甘草汤飞五七次)一两 硼砂五钱 辰砂三钱 冰片二分

【用法】上为末。掺之。

【功用】化腐,定痛生肌。

【主治】溃烂红热肿痛有腐者。

23974 生肌定痛散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】真紫檀香 丹参 云苓各一两 降香 远志各五钱 琥珀 血竭各三钱

【用法】上为末,和匀。掺患处。如伤手伤风、延蔓横害,每药末一钱,加蝉蜕、蛇蜕各三厘,掺患处。掺后结痂不落,用麻油稀调,鸡翎蘸润之。口疮、舌裂;并可用吹。

【功用】止血定痛。

【主治】跌打损伤,皮破流血。

23975 生肌珍珠散

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】乳香 没药 血竭 儿茶 水石象皮 海螵蛸各二钱 龙骨三钱 冰片二分五 苏珠一分

【用法】上为细末。掺之。

【功用】生肌敛口,去腐生新。

【主治】疮疡毒尽，气血不足，久不生肌敛口。

23976 生肌保肤膏

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】当归 熟地黄 白术 黄耆 白芍药 川芎 白及 白蔹 蓖麻子 白芷 金银花 天花粉 合欢皮各六两 男子发四两 白蜡六两 乳香 没药 血竭 赤石脂(醋炙七次) 龙骨(煨) 没石子各三两 麝香三钱

【用法】上当归等十五味为咀咀，乳香等各为极细末，以芝麻油二斤，煎十五味至焦黑，滤去滓，如法下丹成膏，入二蜡膏，放温，入乳香等六味膏，冷后入麝香。

【功用】生肌止痛。

【主治】杖疮，腐肉去尽，肉珠渐生者。

23977 生肌神秘散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】白升药一两 轻粉 铅粉各一两二钱 银朱 珍珠(豆腐内煮过)各四钱

【用法】上为极细末。掺于疮口。

【功用】去腐肉，生新肉。

【主治】发背。

23978 生肌桃红散

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】生鸡桃花散(《普济方》卷六十九)、生肌梅花散(《奇效良方》卷六十二)。

【组成】寒水石粉三两 朱砂(飞)二钱 甘草一字(炒) 脑子一字

【用法】上为细末。每用少许，干捻有窍处。

【主治】齿龈内出血，并有窍眼，时时吐血。

23979 生肌桃花散

【方源】《奇效良方》卷五十六。

【组成】轻粉 血竭 密陀僧 干胭脂各一钱 乳香二钱

【用法】上为细末。每用干掺，仍以膏药贴之。

【主治】杖疮，热毒疼痛。

23980 生肌桃花散

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】龙骨(火煨)五钱 花蕊石随分 乳香 没药(去油)各一钱 石膏一两 轻粉二钱 灵草(削皮) 鸡肉骨筋五钱 大黄五钱 赤石脂一两(煨) 石乳随分

【用法】上为细末，加血竭研。麻油调涂。如血不止者，将细紫草末敷即止。

【主治】打伤破血。

23981 生肌梅花散

《奇效良方》卷六十二。为《御药院方》卷九“生肌桃红散”之异名。见该条。

23982 生肌蛇衔膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】蛇衔二两 蔷薇二两 续断二两 野葛二两 当归一两半 附子一两(去皮脐) 防风一两 黄芩一两 泽兰一两 松脂三两 羊肾脂三两

【用法】上锉细，以绵裹，用猪脂三斤，煎以白芷一寸，候色黄赤，即膏成，去滓，以密器中收之。以贴疮上。

【主治】金疮，无问大小。

23983 生阴开结汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】熟地二两 玄参一两 当归一两 生地五钱 牛膝五钱 麦冬五钱 山茱萸五钱 山药三钱 肉苁蓉五钱

【用法】水煎，温服。

【主治】干燥火炽，大肠阴尽，遂至粪如羊屎，名为肠结。

23984 生阴止泻丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】熟地五两 山药四两 山茱萸四两 白术五两 肉桂一两 肉果一两 北五味一两 吴茱萸一两 人参五两 薏仁五两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日晚饭前吞五钱。旬日即健矣。

【主治】大泻之后亡阴。

23985 生阴止泻汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】山茱萸二两 车前子一两 茯苓一两 白芍二两 肉桂三分 白术一两 甘

草五钱 山药二两 薏仁一两

【用法】水煎服。一剂泻减，再剂泻又减，三剂泻全止矣。

【主治】肾水不足以制火，口渴饮水，忽然大泻，一日或十余行，或数十行，昼夜之间，泻至数百次，完谷不化，直下无留。

23986 生阴壮髓丹

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】玄参三两 麦冬二两 熟地三两 山茱萸二两

【用法】水煎服。

【主治】肾水不足，阳明火旺，骨髓空虚，痿废不立。

23987 生麦门冬汤

【方源】方出《千金》卷二十四，名见《外台》卷三十八。

【异名】麦门冬饮（《圣济总录》卷一四六）。

【组成】生麦门冬 葱白各八两 豉二升

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升半，分三服。

【主治】①《千金》：一切毒药发，不问草石，始觉恶即服此方。②《外台》：服钟乳发，寒热，胸中塞，面肿，手足烦疼。

23988 生麦门冬汤

【方源】《千金》卷二十四。

【异名】麦门冬汤（《外台》卷三十八）。

【组成】生麦门冬五两 甘草三两 桂心二两 人参一两半 葱白半斤 豉二升

【用法】上㕮咀。先以水一斗五升，煮葱白作汤，澄取八升，纳药煮取三升，分三服。才服便使人按摩摇动，口中嚼物，然后仰卧，覆以暖衣，汗出去衣；服汤热歇，即便冷涛，饭燥脯而已。

【主治】散发，身体卒生疮。

23989 生麦门冬汤

《普济方》卷一七八。为《医心方》卷十三引《玄感传尸方》“麦门冬饮”之异名。见该条。

23990 生麦门冬煎

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】生麦门冬汁三合 生地黄汁三合 生藕汁三合 生姜汁少许 白药一两

【用法】上捣罗白药为末；以前四般汁更入熟水二合，同煎三五沸，用白药末搅令匀。分温二服，不拘时候。

【主治】鼻衄不止，心神烦闷。

23991 生麦门冬煎

【方源】《医方类聚》卷一一七引《神巧万全方》。

【组成】生麦门冬（去心，研汁）半升 杏仁三两（去皮，麸炒微黄） 生地黄汁半升 生姜汁一合 白蜜五合 紫苏子三两（研，滤取汁） 人参 白茯苓 五味子各二两（同杵为末）

【用法】上先研杏仁如膏，与诸药合煎令稠。每服一茶匙，含化咽津，不拘时候。

【主治】心嗽，胸膈不利，喘息短气。

23992 生麦益阴煎

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】生地炭 麦门炭 北沙参 元参炭 元武版 人中黄 熟石膏 黑料豆

【主治】虚火，口舌牙根破烂。

23993 生秃乌云油

《永乐大典》卷八八四一引《山居备用》。为《杨氏家藏方》卷二十“香芎油”之异名。见该条。

23994 生附四君汤

《景岳全书》卷六十二。为《保婴撮要》卷三“生附四君子汤”之异名。见该条。

23995 生附白术汤

【方源】《三因》卷二。

【组成】附子（生，去皮脐） 干姜各半两 白术一两 甘草一分（炙）

【用法】上锉散。每服四钱。水盏半，煎七分，去滓，食前服。

【主治】中风湿，昏闷恍惚，胀满身重，手足缓纵，染染自汗，失音不语，便利不禁。

23996 生附除湿汤

【方源】《直指》卷三。

【组成】附子(生)一两 苍术(制)一两半 白术 厚朴(制)半两 宣木瓜 甘草(炙)各三钱半

【用法】上锉。每服四钱，水二盏，加生姜十厚片，煎一盏，食前微温服。

【主治】寒湿交攻，身体冷痛。

【备考】方中白术用量原缺。

23997 生鸡桃花散

《普济方》卷六十九。为《御药院方》卷九“生肌桃红散”之异名。见该条。

23998 生金牛黄汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】生金二铢(无生金，用熟金亦得；法应作屑，今方用成器者) 牛黄三铢 干姜一分 细辛半分 人参一分 麻黄二分 黄连一分 甘草一分

【用法】上咬咀。以水一升六合，煮取八合，去滓，临服研牛黄以煮汤中。

【主治】小儿积，下不止，因发病。

【方论选录】《千金方衍义》：痢久脾虚，内热生风而致发痛。生金、牛黄，专除内动之风；黄连、干姜，分解交错之热；麻黄、细辛，假道于表以泄内郁之邪；甘草、人参，填塞其空以杜虚风之扰。

【备考】嫌儿热者，用生姜代干姜。今世乏生金，但用成器金亦善，二三两皆得用也。

23999 生金滋水饮

【方源】《医家心法》。

【组成】生地 丹皮 当归 白芍 人参 麦冬 白术(生用) 甘草

【用法】加大枣、生姜为引。

【主治】伤寒热退后，或汗后，烦躁未除，口渴微热，大便艰涩，小便短赤。

【加减】少阳阳明症，火燥生风，风淫末疾，手足肿痛，不必俟其汗后，当即以此方加柴、芩与之。

24000 生枸杞子酒

【方源】《外台》卷十七引《延年秘录》。

【异名】枸杞酒(《医心方》卷二十六引《大清经》)、枸杞子酒(《附广肘后方》卷四)。

【组成】枸杞子二升

【用法】以上清酒二升搗碎，更添酒浸七日，漉去滓，任情饮之。

【功用】补虚，长肌肉，益颜色，肥健人。

【主治】《准绳·类方》：肝虚当风流泪。

24001 生胃进食汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】人参三钱 白术三钱 炒枣仁五钱 远志八分 山药三钱 茯苓三钱 神曲五分 良姜五分 萝卜子一钱 枳壳五分 干姜(炒黑)一钱

【用法】水煎服。

【主治】厌食。未见饮食则思，既见饮食则厌，勉强进用，饱塞于上脘之间，微微胀闷。

24002 生脉六均汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】人参 五味子 麦门冬(去心) 陈皮 半夏(姜制) 茯苓 白术(土炒) 甘草(炙)

【用法】乌梅为引，水煎服。

【主治】痘疹脾弱泄泻，伤津大渴。

24003 生脉地黄汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】六味地黄汤加生脉饮

【主治】虚劳，火盛刑金者。

24004 生脉补中汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【异名】麦味补中汤(《医级》卷八)。

【组成】生脉散合补中益气汤

【功用】润津液，助气化。

【主治】①《伤寒大白》：误汗太过，津液外亡而小便不利者。②《医级》：中气不足，暑令多汗，燥渴脉弱。

【备考】家秘加车前子，其效更速。

24005 生脉补精汤

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】人参 麦门冬 五味子 熟地

当归 鹿茸

【主治】类中风。内伤气虚之人，房劳过度，清气不升，忽然昏冒，属虚中者。

24006 生脉建中汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】人参 麦冬 五味子 白芍药 桂枝 甘草

【主治】误下太过，中气损伤，津液内耗，小便不利者。

24007 生脉保元汤

【方源】《中国医学大辞典·补遗》。

【组成】生脉散加黄耆 甘草

【用法】清水煎服。

【功用】夏月服之，令人气力充足。

【临证举例】产妇郁冒《上海中医药杂志》(1983; 10: 25): 以生脉散和保元汤加减(太子参 15 克 麦冬 10 克 五味子 10 克 黄耆 15 克 甘草 10 克 肉桂 2 克 炒白芍 15 克)，治新产妇(包括人流或引产者)产后郁冒 90 例，症见阵热，热冒于上，头晕，自汗，盗汗，汗出冒解等。如下红逾半日不尽者，加茜根炭 15 克；失眠者，加柏、枣仁各 10 克；心惊，筋脉拘挛者，加煅龙骨 15 克；便秘者，加全瓜蒌 15 克；食差，苔白腻者，加炒白术 10 克；病程较长，贫血重者，加黄精 15 克，当归 10 克。疗效：痊愈 62 例，有效 24 例，无效 4 例，总有效率 95.36%。

24008 生脉健脾汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】黄耆一钱半 人参一钱 炙甘草 官桂各三分 当归 川芎 白芍 白术各八分 茯苓五分 紫草四分 生姜一片 红枣一枚 糯米五十粒(或加酒洗红花三分)

【功用】补气，养脾，生血。

【主治】痘疮浆既成，皮软色白，乃气不足。

24009 生津止渴丸

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】乌梅肉二斤 檀香三钱 白豆蔻

五钱 薄荷三两 甘葛二两 飞盐一两 紫苏一两 花粉三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。渴即噙化一颗。

【功用】生津止渴。

24010 生津止嗽膏

【方源】《简明医彙》卷四。

【组成】雪梨汁十钟 藕汁 鲜地黄汁 茅根汁各五钟 麦门冬汁 萝卜汁各二钟半

【用法】滤净，入新砂锅煎减半，入白蜜八两，饴糖四两，姜汁少许熬膏，每服半钟，温服。

【主治】劳瘵咳嗽。

【加减】有血加扁柏(入童便捣)、韭汁、茜根汁各半钟。

24011 生津去燥汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】尖生 麦冬 沙参 谷芽 酒芍 天冬 五味 甘草

【主治】心中烦躁，津液枯少，不思饮食。

24012 生津甘露汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】清凉饮子(原书同卷)、生津甘露饮(《杏苑》卷五)。

【组成】升麻四分 防风 生甘草 汉防己 生地黄各五分 当归身六分 柴胡 羌活 炙甘草 黄耆 酒知母 酒黄芩各一钱 酒龙胆草 石膏 黄芩各一钱五分 红花少许 桃仁五个 杏仁十个

【用法】上咬咀，都作一服。水二盏，酒一匙，煎至一盏。食远稍热服。

【主治】消中，能食而瘦，口舌干，自汗，大便结燥，小便频数。

【方论选录】《古方选注》：东垣治心火亢甚，乘于脾胃，亦是至而不至乃为不及者之方也。升麻、柴胡、羌活、防风气芳，石膏性沉，虽云消渴禁芳草石药，其气慄悍，恐助燥热，然欲走达经气，非芳香不能。故脾胃不及，须少用升麻，阳气从脾胃中右迁于左，以行阳道，

得春生万化之机;更用柴胡,使诸经左迁,生发阴阳之气;黄耆、杏仁理肺气;佐石膏、知母、黄芩诸手阳明气分之热以生津,生地、当归、桃仁、红花破血结,佐龙胆、黄柏、防己清足阳明血分之热以生液。津液既生,燥热亦解,又何患二阳复结也。

24013 生津甘露饮

《脉因证治》卷下。即《兰室秘藏》卷上“生津甘露饮子”。见该条。

24014 生津甘露饮

《杏苑》卷五。为《兰室秘藏》卷上“生津甘露汤”之异名。见该条。

24015 生津甘露饮

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】兰香饮子去防风、半夏,加当归、麦冬、山栀、黄连、黄柏、藿香、木香。

【主治】上焦热渴。

24016 生津四物汤

【方源】《幼科铁镜》卷五。

【组成】川芎八分 归身一钱 生地一钱(酒洗) 知母一钱 白芍一钱(水纸包煨) 麦冬(去心)一钱 川连八分 乌梅肉五分 天花粉七分 薄荷 石莲肉 川黄柏(蜜炒) 炙甘草各五分

【主治】上消,渴饮茶水,饮之又渴。

24017 生津四物汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】白归身 大生地 杭白芍 净知母 大麦冬 人参各一钱 正川芎 正雅连 天花粉 川黄柏 炙甘草各五分 肥乌梅一粒 灯心十茎

【用法】水煎,热服。

【主治】上消,渴饮茶水,饮之又渴。

24018 生津代茶饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】青果五个(研) 金石斛二钱 甘菊二钱 荸荠五个(去皮) 麦冬三钱 鲜芦根二支(切碎) 桑叶三钱 竹茹二钱 鲜藕十片 黄梨二个(去皮)

【用法】水煎,代茶。

【功用】生津润燥。

【主治】温病热盛,灼伤肺胃阴津,口中燥渴,咳唾白沫,枯滞不爽者。

【备考】不喜甚凉者,可重汤燉温服。

24019 生津地黄汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】天花粉 生地 知母 麦冬(去心) 甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘疹,内实作热,大便坚实而渴者。

【备考】《痘疹全书》本方用法:竹叶引,水煎服。

24020 生津麦冬汤

《杏苑》卷五。为《圣济总录》卷四十九“麦门冬饮”之异名。见该条。

24021 生津利水饮

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】人参 麦冬 黄耆 怀生 五味 当归 葛根 升麻 甘草 茯苓

【功用】助脾益肺,升举气血。

【主治】产后咽干口渴,小便不利。

24022 生津补血汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】当归 白芍(炒) 熟地黄 生地 黄 茯苓(去皮)各一钱 枳实(麸炒) 陈皮 黄连(炒) 苏子 贝母(去心)各七分 砂仁 沉香各五分

【用法】上锉一剂。加生姜一片,大枣一枚,水煎,竹沥磨沉香同服。

【主治】年少胃脘血燥,噎膈翻胃。

24023 生津和胃方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】大梨三个(捣汁) 藕一支(捣汁) 荷梗三尺 橘络一钱 甘草八分 生姜三片(捣汁) 莲子心十根 元参二钱

【功用】清热止咳,生津和胃。

【主治】脾胃病。

【方论选录】方中元参滋阴降火,除烦解毒,重在滋肾,《药品化义》谓:“此药滋肾,功胜知母”;甘草和中缓急,润肺解毒,《本

草汇言》称甘草属“补虚解毒之药”；莲子心、荷梗、藕均系睡莲科植物，莲之籽、梗、根，具清热解暑，健胃除烦之作用；生姜止呕散寒，孙思邈誉为“呕家圣药”；梨能生津润燥；橘可通络化痰。

24024 生津养血汤

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】当归一钱 川芎八分 白芍（煨）一钱 生地黄（酒洗）一钱 知母五分 黄柏（蜜水炙）五分 麦门冬一钱 石莲肉五分 天花粉七分 黄连八分 乌梅五分 薄荷五分 甘草（炙）五分

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】上消，火盛制金，烦渴引饮。

24025 生津起痿汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬一两 甘草二钱 玄参一两 甘菊花五钱 熟地一两 天门冬三钱 天花粉一钱 贝母一钱 金银花五钱

【用法】水煎服。

【功用】泻胃中之火，补肺经之气。

【主治】肺痿。胃火熏蒸，日冲肺金，遂至痿弱，不能起立，欲嗽不能，欲咳不敢，及至咳嗽，又连声不止，肺中大痛。

24026 生津润肺丸

【方源】《喉科秘决》卷上。

【组成】硼砂三钱（生、煨各半） 寒水石二钱 山豆根二钱 五味子一钱 甘草二钱 枯芩二钱 乌梅一钱 薄荷三钱 上冰片二分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。含化咽下。

【功用】生津降火。

【主治】虚热喉，初起其势不急，微微缓缓，咽津觉得干燥，吞气些碍，无鹅无肿，满喉或红或紫。

【宜忌】不宜针、吊、吹药。

24027 生津益液汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】人参 麦冬（去心） 茯苓各一两 大枣 竹叶 浮小麦 炙草 栝楼根

【主治】产妇血少多汗，内烦，不生津液，虚弱，口渴气少。

【加减】大渴不止，加芦根。

【备考】方中大枣以后五味用量原缺。《胎产心法》本方用：人参随宜，麦冬一钱二分，茯苓、瓜蒌根各一钱，甘草八分，小麦一撮，竹叶十片，枣二枚。

24028 生津葛根汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】葛根 栝楼根 麦门冬（去心） 生地黄各等分 升麻 甘草（生）各减半

【用法】用糯米泔水煎，去滓，入茅根自然汁一合服之。

【主治】痘疮发渴。

24029 生姜五苓汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】生姜 猪苓 泽泻 白术 白茯苓 半夏 枳实各一钱 甘草三分

【用法】用水一钟半，煎七分，温服。取小汗。

【主治】春月大饮冷水伤脾，过饮酒而伤气。

【加减】此治伤饮之轻者，若重而水蓄积为胀满者，去甘草，加大戟（长流水煮三次，去皮，晒干）七分，芫花（醋浸，炒干）、甘遂（面包煨，去面，去心）各八分，黑牵牛（研末）二钱，槟榔一钱，用水二钟，煎一钟，空心服，利水尽即愈。

24030 生姜平胃散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】生姜皮

【用法】炒焦为末。湿者，干敷之；干疮搔痒，香油调敷。如觉热不可忍，用平胃散解去之，或入平胃散于姜皮末内敷之，自然伏大热。

【主治】肾风疮，及下部湿。

24031 生姜甘草汤

《千金》卷十七。为方出《肘后方》卷三，名见《医心方》卷二十二引《产经》“人参汤”之异名。见该条。

24032 生姜甘桔汤

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】北梗（去芦头）一两 甘草（生）生姜各半两

【用法】上锉细。每服三钱，井水煎服。

【主治】痈疽诸发，毒气上冲咽喉，胸膈室塞不利。

24033 生姜生附汤

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《三因》卷二。

【组成】附子六分 生姜三两（切）

【用法】上切。以水二升，煮取一升，分为再服。

【功用】《三因》：正气，消痰，散风。

【主治】①《肘后方》：中风，头身无不痛，颠倒烦满欲死，及但腹中切痛者。②《三因》：卒中风，涎潮昏塞不知人；并主痰冷癖气，胸满呕沫头痛，饮食不消。

【宜忌】《普济方》：忌猪肉、冷水。

【备考】《三因》：凡中风，无问冷热虚实皆可服。

24034 生姜白糖汤

【方源】《医林纂要》卷六。

【组成】生姜三钱 白糖一撮

【用法】煎姜汤熟，盛白糖于碗中，以姜汤冲下，清晨服之。

【主治】寒痰上溢于肺，咳嗽多痰，而觉有冷气上冲喉者。

【方论选录】生姜辛以行痰，而泻肝之寒邪；白糖甘以补肺，且亦能化痰；清晨则百脉方朝于肺。

24035 生姜半夏汤

【方源】《金匱》卷中。

【异名】小半夏汤（《普济方》卷一三八引《活人书》）。

【组成】半夏半升 生姜汁一升

【用法】以水三升，煮半夏取二升，纳生姜汁，煮取一升半，小冷分四服，日三夜一服。止，停后服。

【主治】①《金匱》：病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，彻胸中愤愤然无奈者。②《医学正传》：风痰上攻，头旋眼花，痰壅作嗽，面目浮肿，咳逆欲死。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》：此方与小半夏汤相同，而取意少别。小半夏汤宣阳明之气上达，故用半夏为君，生姜为佐；半夏汤通阳明之经，故用姜汁为君，半夏为佐，取其行于经络，故用汁也。②《医宗金鉴》：彻心中愤愤然无奈者，总形容似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，心中愤乱无奈，懊恼欲吐之情状也，故以半夏降逆，生姜安胃也。③《医宗金鉴》引李杲：生姜、半夏，辛温之气，足以散水饮而舒阳气。然待小冷服者，恐寒饮固结于中，拒热药而不纳，反致呕逆。今热药冷饮下咽之后，冷体既消，热性便发，情且不违，而致大益，此《内经》之旨也。此方与前半夏干姜汤略同，但前温中气，故用干姜，此散停饮，故用生姜；前因呕吐上逆，顿服之则药力猛峻，足以止逆降气，呕吐立除；此心中无奈，寒饮内结，难以猝消，故分四服，使胸中邪气徐徐散也。④《金匱要略心典》：生姜半夏汤，即小半夏汤而生姜用汁，则降逆之力少而散结之力多，乃正治饮气相搏，欲出不出者之良法也。⑤《高注金匱要略》：门人问曰：胃寒而上沁下吸，温之降之，固为正治。其温胃而不用甘草者何也？答曰：生姜辛温而性善走，取汁用之，则过燥即发，是所以温上焦之似喘似呕也；配半夏以降之，则辛温之性渐渐下沉，是温胃之外，尤欲以辛胜肝，而并治其下焦之欲哕。故于甘草之守中者无取焉。

【备考】本方方名，《外台》引作“生姜汁半夏汤”。

24036 生姜半夏汤

【方源】《准绳·类方》卷三。

【组成】半夏(咬咀) 生姜(切片)各三钱

【用法】量水多少,煎至七分服。

【功用】止呕吐,开胃消食。

24037 生姜半夏汤

【方源】《疟气证治论》。

【组成】生姜六分 半夏 吴茱 附子各三分

【用法】水煎服。

【主治】诸疟呕吐不止,饮食不纳。

24038 生姜竹茹汤

【方源】《普济方》卷一九〇引《指南方》。

【组成】竹茹 甘草 川芎 黄芩 当归各一两半 白术 芍药 官桂 人参各一两

【用法】上为末。每服五钱,水二盏,加生姜十片,煎一盏,去滓服。

【主治】呕血。

24039 生姜竹茹汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】竹茹(鸡子大) 人参半两 葛根半两 生姜一钱(切)

【用法】上为散。水三盏,煎二盏,去滓,分二服,不拘时候。

【主治】中暑,不即治之,变生热证,身大热,背微恶寒,心中烦闷,时时欲呕,渴不能饮,头昏重痛,恶见日光,遇凉稍清,起居如故。

24040 生姜附子汤

【方源】《御药院方》卷二。

【组成】附子(炮制,去皮脐,细切)

【用法】每服三钱。水二大盏,加生姜十片,煎至一盏,去滓,空心、食前温服。

【主治】①《御药院方》:痰冷癖气,胸满短气,呕沫头痛,饮食不消化;亦主卒风。②《岭南卫生方》:岭南瘴疔,内弱发热,或寒热往来,痰逆呕吐,头痛身疼,或汗多,烦躁引饮,或自利,小便赤。

24041 生姜和中汤

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】生甘草 炙甘草各一分 酒黄芩

柴胡 橘皮各二分 升麻三分 人参 葛根 藁本 白术各五分 羌活七分 苍术一钱 生黄芩二钱

【用法】上咬咀,作一服。水二盏,加生姜五片,大枣二枚(擘开),同煎至一盏,去滓,食前稍热服之。

【主治】食不下,口干虚渴,四肢困倦。

24042 生姜泄肠汤

【方源】《千金》卷十八。

【组成】生姜 橘皮 青竹茹 黄芩 梔子仁 白术各三两 桂心一两 茯苓 芒消各三两 生地黄十两 大枣十四枚

【用法】上咬咀。以水七升,煮取三升,去滓,下芒消,分二服。

【主治】①《千金》:大肠实热,腹胀不通,口为生疮。②《圣济总录》:大肠实热,大便不通,腹肋胀满,腰背重痛,上气喘满。

【宜忌】《外台》:忌生葱、茱萸、海藻、菰菜、醋物、桃、李、雀肉等。

【方论选录】《千金方衍义》:《本经》言生姜久服去臭气,通神明,故《千金》以之泄大肠之实热,兼大枣以治心腹邪气,安中养脾,平胃气,通九窍;橘皮下气通神,竹茹、黄芩、梔子清上热口疮,地黄、芒消治伤中,逐血痹,除邪热,通胀闭,共襄推陈致新之功;白术、茯苓保守中气,以助诸药之力,桂心为祛热之内应也。

24043 生姜泻心汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】生姜四两(切) 甘草三两(炙) 人参三两 干姜一两 黄芩三两 半夏半升(洗) 黄连一两 大枣十二枚(擘)

【用法】以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,每日三次。

【功用】《伤寒论讲义》:和胃降逆,散水消痞。

【主治】伤寒汗后,胃阳虚弱,水饮内停,心下痞硬,肠鸣下利;妊娠恶阻,噤口痢。现用于胃下垂、胃扩张、慢性胃炎等属胃阳虚

弱,水饮内停者。

①《伤寒论》:伤寒汗出,解之后,胃中不和,心下痞硬,干噫食臭,胁下有水气,腹中雷鸣下利者。②《产科发蒙》:妊娠恶阻,呕而腹中雷鸣下利者。③《伤寒论类方汇参》:噤口痢。

【方论选录】①《伤寒大白》:泻心汤五方,三方皆用干姜、半夏、黄连、黄芩,两热两寒,豁痰清热。此方因汗出表解,胃阳虚,不能敷布水饮,腹中雷鸣而下利,故用生姜佐干姜和胃阳,此以痰热方中化出逐寒饮之法。②《伤寒论本义》:雷鸣下利,亦是中气运行不健之故,鸣则为虚,利则为实;痞硬少气为虚,干噫食臭为热。虚热二字,合成此证。此生姜泻心以苦治热,以甘补虚,以辛散痞,为对证之剂也。③《古方选注》:泻心汤有五,总不离乎开结、导热、益胃,然其或虚或实,有邪无邪,处方之变,则各有微妙。先就是方胃阳虚不能行津液而致痞者,惟生姜辛而气薄,能升胃之津液,故以名汤。干姜、半夏破阴以导阳,黄芩、黄连泻阳以交阴,人参、甘草益胃安中,培植水谷化生之主宰,仍以大枣佐生姜发生津液,不使其再化阴邪。通方破滞宣阳,是亦泻心之义也。④《医宗金鉴》:名生姜泻心汤者,其义重在散水气之痞也。生姜、半夏散胁下之水气,人参、大枣补中州之土虚,干姜、甘草以温里寒,黄芩、黄连以泻痞热。备乎虚、水、寒、热之治,胃中不和下利之痞,未有不愈者也。

【临证举例】①胃脘痛 《伤寒论汇要分折》:杨某,女,十七岁,始见胃脘疼痛,继则呕腐吐酸,发作无常,已四年余。今春以来,胃不受纳,进食即吐,面色苍白,神倦腰痛,四肢痠楚,舌苔薄白而滑,右脉强,左脉沉细。诊断为肝胃不和,治以本方和胃降逆。②胃下垂 《汉方诊疗三十年》:某女,消瘦,胃下垂,喜饮酒,不断嗳气,予生姜泻心汤五剂,嗳气消失。③胃扩张 《古方之临床运用》:某人,年约四十余,宿嗜酒,

初则晨起吐清水,嗳气显之,继则胃中有振水声,肠鸣下利,偶食不消化物或荤腻,则下利频繁,致消瘦无力,诸治无效。某医院诊断为胃扩张、肠弛缓。脉滑数,苔反腻,心下痞硬。乃用生姜泻心汤,连服十剂而愈。④慢性胃炎 《岳美中医案集》:胡某某,男。患慢性胃炎,自觉心下有膨闷感,经年累月,饱食后嗳生食气,腹中常有走注之雷鸣声,形体瘦削,面少光泽。符合仲景生姜泻心汤证。疏方:生姜12克,炙甘草9克,党参9克,干姜3克,黄芩9克,黄连3克(忌用大量),半夏9克 大枣4枚(擘),以水八钟,煎至四钟,去滓再煎,取二钟,分二次温服。一周后所有症状基本消失,唯食欲不振,投以加味六君子汤,胃纳见佳。

24044 生姜泻心汤

《伤寒大白》卷三。即原书同卷“生姜半夏泻心汤”多加生姜。见该条。

24045 生姜枳壳汤

【方源】《直指》卷六。

【组成】辣桂一两 生姜母一两半 枳壳(制)三分

【用法】上为粗末。每服三钱,新水煎服。

【主治】中脘气滞,心下引痛。

24046 生姜枳实汤

《鸡峰》卷十一。为《金匱》卷上“桂枝生姜枳实汤”之异名。见该条。

24047 生姜香薷汤

【方源】方出《圣惠》卷四十七,名见《普济方》卷二〇三。

【组成】生姜一两(切) 香薷一两(切) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】以水二大盏,煎至一盏,去滓,分温二服。

【主治】霍乱引饮,饮即干呕。

24048 生姜益元煎

【方源】《松峰说疫》卷五。

【组成】益元散三钱 生姜三钱(捣)

【用法】黄酒、水各半钟,煎三滚,温服。

【功用】除瘟解毒。

【主治】时气瘟疫。

24049 生姜理中汤

【方源】《保命歌括》卷十九。

【组成】理中汤加生姜

【主治】霍乱不渴者。

【加减】吐多者，去术，加半夏；利多者，仍用术；心悸者，加茯苓；腹满者，去术，加附子，厚朴。

24050 生姜橘皮丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】陈橘皮（去白）一斤 生姜（洗）一斤（薄切，焙） 神曲（微炒）二两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大，每服五七十丸，加至百丸，食后米饮、熟水任下。无问老幼皆可服。

【功用】升降滞气，消饮去痰，温中散寒，快膈美食。

【主治】痰饮。

24051 生姜橘皮丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】陈皮一斤（去白） 半夏曲 藿香叶各二两 白茯苓（去皮） 人参（去芦）各一两

【用法】上为细末，用姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后生姜汤送下。

【功用】升降津气，消饮去痰，温中散寒，快膈美食。

【主治】痰饮。

24052 生姜橘皮汤

《活人书》卷十六。为《金匱》卷中“橘皮汤”之异名。见该条。

24053 生香灵仙汤

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】生黄耆一钱五分 当归三钱 川芎一钱五分 酒芍一钱五分 生地二钱五分 藁本一钱 茯苓一钱五分 苍耳一钱五分（炒） 明麻一钱 薄荷一钱五分 蔓荆一钱五分 西党四钱 白菊一钱五分 七厘一钱五分

【主治】头痛眼痒流泪。

24054 生料五苓散

《直指》卷五。为《伤寒论》“五苓散”之异名。见该条。

24055 生料五积散

《易简方》。即《理伤续断方》“五积散”诸药生用。见该条。

24056 生料五积散

《普济方》卷三五五。为原书同卷“神仙百解散”之异名。见该条。

24057 生料平胃散

《得效》卷十四。即《医方类聚》卷十引《简要济众方》“平胃散”诸药生用。见该条。

24058 生料平胃散

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】苍术 陈皮 厚朴 草果 半夏 白芷 乌梅 藿香 前胡 草豆蔻 甘草

【用法】上咬咀。每服一钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】疟疾后，脾胃虚弱，颜色憔悴，不进饮食，面目浮肿。

24059 生料正元饮

《医编》卷七。为《三因》卷十“正元散”之异名。见该条。

24060 生料四物汤

【方源】《医方大成》卷十引汤氏方。

【组成】生干地黄 赤芍药 川芎 当归（去芦） 防风各等分 黄芩减半

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盞，煎服。

【主治】小儿血热生疮，遍身肿痒。

【宜忌】①《医方大成》引汤氏方：忌诸毒食。②《准绳·幼科》：忌酒、面、猪羊肉、豆腐。

24061 生料鸡苏散

《医学纲目》卷十七。为《济生》卷二“鸡苏散”之异名。见该条。

24062 生料固本丸

《医略六书》卷二十二。为《简易方》引《叶氏录验方》（见《医方类聚》卷一五〇）“人参固本丸”之异名。见该条。

24063 生料健脾丸

【方源】《普济方》卷三十六引《澹寮》。

【组成】厚朴(去粗皮,生锉)二两五钱 半夏(生) 白豆蔻仁 草果仁 甘草 缩砂仁各二两

【用法】上咬咀,用生姜一斤四两,细切捣碎,滓汁并用,同药一处为丸,如鸡子黄大,晒干。每服一丸,水一盞半,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】呕吐反胃,脾泻白痢,肠滑冷痢,一切脾胃病。

24064 生料调气散

《直指》卷十八。为《局方》卷三“匀气散”之异名。见该条。

24065 生料鹿茸丸

《准绳·类方》卷二。为《济生》卷一“鹿茸丸”之异名。见该条。

24066 生料鹿茸丸

《医略六书》卷二十六。为《妇人良方》卷一“鹿茸丸”之异名,见该条。

24067 生益母草饮

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】生益母草汁半盞(如无,以土瓜根代) 生地黄汁半盞 生藕汁半盞 鸡子白三枚 童子小便半盞

【用法】上五味,先将汁四味相和,煎令沸,次下鸡子白搅匀,分作三服。

【主治】产后血运,心烦闷乱,恍惚如见鬼神。

24068 生商陆汁方

【方源】《圣济总录》卷一四七。

【组成】生商陆五两

【用法】上药洗,细切,用生姜半两和捣,取汁半盞,五更初服之。服了坐半时即睡,至旦不动,即以茶一盞,得利,以冷水洗手面便止。仍煮薤白温粥食之。

【主治】蛊毒。

24069 生液寄生散

【方源】《普济方》卷三四五引《护命》。

【组成】桑寄生半两 人参一分 甘草(炙)三铢 沉香一铢

【用法】上为细末。每服一钱八分,水一盞,煎取六分服。

【主治】产后正气不足,咽喉干,口无津液,饮食减少,大腑不调。

24070 生葛汁饮子

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】生葛饮子(《卫生总微》卷五)。

【组成】生葛根汁一合 竹沥一合 牛黄如杏仁大(细研)

【用法】上药相和。每服半合。

【主治】小儿欲发痫,极热不已。

【备考】本方方名,《幼幼新书》引作“生葛汁饮”。

24071 生脾助阳汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】人参三钱 白术三钱 甘草三钱 肉桂一钱 茯苓五钱 神曲五分 附子一片

【用法】水煎服。

【主治】小儿大吐之后,忽然大泻,吐止而泻不肯止,倦怠之极。

24072 生犀天麻丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】犀角(镑)一两 天麻(酒炙)二两 独活(去芦头) 人参 丁香 木香 乌药 麻黄(去根节)各一两 牛黄(研) 龙脑(研) 琥珀(研) 乳香(研) 真珠(研) 麝香(研)各一分 天南星(牛胆匿者) 防风(去叉)各半两 白花蛇(酒浸,去皮骨,炙)三分 蝎梢(炒)一分 芎藭一两 安息香一两(酒化,研,去沙石,熬成膏)

【用法】上药除研者外,为细末,再研令匀,入安息香膏,并炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下,荆芥汤亦得,不拘时候。

【主治】治一切风,手足瘫痪,肢体不仁,及骨节痠痛,口面偏斜,痰涎语涩,心忪惊悸。

24073 生犀天麻丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】犀角(镑)一两 天麻(酒炙)二两 地榆(去苗) 玄参 丁香 乌头(炮裂,去皮脐) 乌药 木香 丹砂(研)各一两 乳香(研) 龙脑(研) 麝香(研) 牛黄(研) 真珠(研) 琥珀(研) 自然铜(火煅,醋淬)各半两 安息香一两(研细,酒化,慢火熬,绵滤去沙石,再熬成膏) 麻黄(去根节)一两 白花蛇(酒浸一宿,去皮骨,炙)一两 蝎梢(炒)一分 天南星(用牛胆内匿者)半两 防风(去叉)半两

【用法】上药除别研膏外,为细末,再合研令匀;将安息香膏更别炼蜜,和为丸,如樱桃大。每服一丸,以温酒或荆芥薄荷汤嚼下;或丸如梧桐子大,每服二十丸,温酒下亦得。

【主治】一切风,手足痹曳,肢体麻痹不仁,及骨节疼痛,口面偏斜,痰涎语涩,心忪惊悸。

24074 生犀牛黄丸

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】犀角屑一分 牛黄一钱(研) 龙脑 麝香(研)各半钱 天南星(牛胆内匿者,研为末) 藿香叶(为末)各二两 甘草末 雄黄末各半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一丸,煎薄荷汤化下,不拘时候。

【功用】压惊,止头痛,化痰涎。

【主治】小儿风邪,温壮发热。

24075 生犀升麻汤

【方源】《葆光道人眼科龙木论》。

【组成】犀角一两一钱 川升麻 防风 白附子 白芷 黄芩各五钱 甘草一钱

【用法】上咬咀。每服三钱,水一钟半,煎至半钟,去滓再煎,食后服,一日三次。

【主治】内障。气血皆衰,荣卫凝滞,瞳仁倒者。

24076 生犀半夏丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】生犀屑半两(入药臼中捣为细末)

半夏四两(用生姜四两去皮细切,同捣令烂,制作曲) 白茯苓(去皮)一两 桂心七钱半

【用法】上为细末,以生姜自然汁煮面糊为丸,如绿豆大。每服三十丸,食后生姜、人参汤送下。

【主治】心肺冷热不和,痰盛气促咳嗽。

24077 生犀地黄汤

【方源】《麻科活人全书》卷四。

【组成】连翘 葛根 元参 黄连 生地 黄 荆芥穗 升麻 甘草 生犀角(另磨)

【用法】水煎,入犀角汁二三匙兑服。

【主治】走马牙疳。麻后牙龈黑烂,肉腐出血,呼吸气臭气冲人。

24078 生犀角饮子

《秘传眼科龙木论》卷三。为《圣济总录》卷一〇八“生犀饮子”之异名。见该条。

24079 生犀鸡苏丸

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】犀角屑半两 鸡苏叶 荆芥穗 天麻各一两 细辛(去苗叶)半两 独活(去芦头)一两 甘草(炙) 人参 芎藭各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一丸,食后茶清嚼下。

【主治】风壅,头痛目眩。

24080 生犀复明散

【方源】《急救仙方》卷三。

【组成】芍药 黄芩各二两 木通 桑白皮 龙胆草(去芦) 防风 羌活 当归尾各二两 大黄八钱 枳壳(去瓤)六钱

【用法】上咬咀。每服五钱,水一盂半,取新桑白皮少许,同煎至八分,食后服。

【主治】诸般眼疾。

【加减】目赤障厚者,加生蚌粉;痛肿者,加生地黄。

24081 生犀香芎丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】生犀半两(镑) 荆芥穗十五两 细辛(去土叶)十两 白芷十两 香附子二

十两(炒) 龙脑薄荷叶五两 甘草(炙)五两 芎藭半两

【用法】上为末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【功用】清神志，明耳目。

【主治】风痰上壅，头昏时痛，鼻出清涕，语声不出，咽喉不利，咳嗽涎喘，头目燎赤，肌肉蠕动，痒如虫走。

24082 生犀葡萄酒

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】好葡萄一两 酸枣仁 黄耆(去芦头) 天门冬(去心) 赤茯苓(去皮) 各六钱 生犀角半两(镑) 独活(去芦头) 四钱 大麻仁一两半(研) 五加皮六钱 防风(去芦头) 四钱 牛膝一两(酒浸一宿)

【用法】上咬咀，用生绢袋子贮，以无灰好酒八升同浸，密封，经七日取出。每食前暖服一二盏。

【功用】光泽颜色，滋润肠胃。

【主治】脚气疼痛，小便不利。

24083 生精神子丸

《医学正印》卷上。为原书同卷“生精神子奇方”之异名。见该条。

24084 生熟二地汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】生地 熟地各二两

【用法】水煎服。

【主治】咯血。血不骤出，必先咳嗽不已，觉喉下气不能止，必咯出其血而后快。此为肾气之逆。

24085 生熟三黄汤

【方源】《金鉴》卷六十九。

【组成】生地 熟地各一钱五分 黄连 黄柏 黄芩 人参 苍术(米泔水浸，炒) 白术(土炒) 厚朴(姜炙) 当归身 陈皮各一钱 地榆 防风 泽泻 甘草(生)各六分 乌梅二个

【用法】水二钟，煎八分，食前服。

【主治】血痢痔。生肛门或里或外，堵塞坠

肿，每逢大用力则鲜血急流如箭；不论粪前粪后，由肠胃风热而兼暴怒成之。

24086 生熟地黄丸

【方源】《证治要诀类方》卷四引《局方》。

【组成】生地 熟地各五两 甘菊花三两 杏仁二两 石斛 枳壳(麸炒)各一两半 羌活 防风 牛膝各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后盐汤下。

【主治】①《证治要诀类方》引《局方》：眼眶骨痛。②《准绳·类方》卷七引《局方》：肝虚目暗，膜入水轮，眼见黑花如豆，累累数十；或见如飞虫，诸治不愈，或视物不明，混睛冷泪，翳膜遮障，内外障眼。

【备考】《审视瑶函》本方用法：每服三十丸，以黑豆三升，炒令烟尽为度，淬好酒六升，每用半盏，食前送下；或茯苓汤亦可。

24087 生熟地黄丸

【方源】《丹溪心法》卷四。

【异名】熟地黄丸(《明医指掌》卷六)、地黄丸(《医方大全》卷十一)。

【组成】生地黄 熟地黄 玄参 金钗石斛各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸服。

【主治】①《丹溪心法》：眉骨痛不可忍。②《丹溪心法附余》：血虚阴虚，眼目昏花。

【备考】《丹溪心法附余》本方用法：炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心服。

24088 生熟地黄丸

《摄生众妙方》卷九。为《兰室秘藏》卷上“熟干地黄丸”之异名。见该条。

24089 生熟地黄丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】生地 熟地各五钱 川芎 赤茯苓 枳壳 杏仁 黄连 半夏曲 天麻 地骨皮 甘草各二钱半 黑豆四十五粒

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心临卧白汤送下。

【主治】肾虚血少神劳，眼目昏黑，瞳人散

大,视物昏花,或卒然见非常异处,偏头肿闷;小儿疳,眼闭合不开,内有朦雾。

24090 生熟地黄丸

《便览》卷一。为原书同卷“熟地黄丸”之异名。见该条。

24091 生熟地黄丸

《诚书》卷十一。即《直指小儿》卷三“生熟地黄汤”改为丸剂。见该条。

24092 生熟地黄丸

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】生地 熟地 天麻 川芎 茯苓 当归 白芍 黑豆 石斛 玄参 地骨皮

【用法】炼蜜为丸服。

【功用】《医略六书》:滋肾养肝。

【主治】①《证治汇补》:肝虚头痛;②《重订通俗伤寒论》:伤寒夹痲,肝肾俱虚者。

【方论选录】《医略六书》:肾水不足,无以滋养肝木,故肝虚生风,清阳不振而头痛。生地滋肾水以荣木,当归养经血以涵肝,熟地补肝阴,白芍敛肝血,川芎行血中之气,元参清浮游之火,茯苓渗湿,天麻去风,地骨皮清肌退热,金石斛平热益阴,黑豆补肾脏以养肝,蜜丸汤下,使肾水顿充,则肝阴自足,而虚风无不熄矣,何患头痛之不瘳哉!此滋肾养肝之剂,为肝虚头痛之专方。

【备考】《医略六书》本方用生地、熟地各五两,天麻一两半(煨),川芎一两,茯苓一两半,当归三两,白芍一两半,黑豆三两,石斛二两,玄参、地骨皮各一两半,炼蜜为丸。每服三钱,白汤化下。

24093 生熟地黄丸

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】大熟地(九蒸晒) 大生地(酒洗)各三两 山药(乳拌蒸) 茯苓(乳拌蒸) 丹皮(酒蒸)各一两半 泽泻(盐水蒸)一两 当归(酒蒸) 白芍(酒炒) 柏子仁(去壳,隔纸炒) 丹参(酒蒸)各二两 远志(去心,甘草水泡蒸)各四两 自败龟版(浸净,童便炙炒,研为极细末)

【用法】上为末,用金石斛四两,金银花十二两熬膏,和炼蜜为丸,每早淡盐汤送下四钱。

【主治】悬痲,生于肾囊之后,肛门之前,又名海底漏;脏毒,生于肛门之两旁,初时肿痛。总由湿热相火,内灼庚金而然;内外痔,瘰疬。

24094 生熟地黄丸

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五两 熟地五两 天冬三两(去心) 麦冬三两(去心) 当归三两 白芍一两半(炒) 茯神一两半(去木) 白术一两半(炒) 知母一两半(炒) 牡蛎三两(生)

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服五钱,米饮送下。

【主治】胎动,脉虚数者。

【方论选录】妊娠肝肾两虚,阴血不足,冲任为虚热内迫,而胎失所养,故胎动不安。是胎动因于血虚有热焉。生地滋阴壮水,熟地补血滋阴,天冬清心润肺以益肾水,麦冬润肺清心以生津液,当归养血荣冲脉,白芍敛阴固冲脉,茯神渗湿安神,白术健脾生血,知母清热润燥以安胎,牡蛎潜热益阴以固胎也。炼蜜以丸之,米饮以下之,俾阴血内充,则虚热潜藏,而冲任完固,何胎动之有哉。

24095 生熟地黄汤

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】生干地黄 熟地黄各半两(净) 川芎 半赤茯苓 枳壳(制) 杏仁(水浸,去皮) 川黄连(净) 半夏曲 天麻 地骨皮 甘草(炙)各二钱半

【用法】上锉。每服二钱,加生姜三片,黑豆十五粒,水煎,临卧服。

【主治】①《直指小儿》:疳,眼闭合不开,内有朦雾。②《得效》:肝疳,摇头揉目,白膜遮睛,流汗,合面而卧,肉色青黄,发立筋青,脑热羸瘦。

【备考】《普济方》有当归。以神曲为丸,米

汤送下，名“生熟地黄丸”(见《诫书》)。

24096 生熟地黄汤

《审视瑶函》卷三。即《兰室秘藏》卷上“熟干地黄丸”改为汤剂。见该条。

24097 生熟地黄汤

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】生地 熟地 川芎 枳壳 茯苓 黄连 半夏 天麻 杏仁 甘草 骨皮 黑豆 龙胆草

【用法】加建莲肉，水煎服。

【主治】肝疳，眼合不开。

24098 生熟地黄汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】生地 熟地各一钱半 甘菊 枳壳各一钱 杏仁(去皮)八分 淮牛膝二钱 石斛二钱 黑豆(炒)二十粒

【用法】水煎服；或加分量，炼蜜为丸，用黑豆炒，淬酒，送丸三钱。

【主治】肝虚，眼眶痛，见火更痛甚者。

24099 生熟地黄汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】熟地 生地各三钱 天冬 麦冬(去心) 贝母(杵) 茯神各一钱五分 茜根一钱 甘草六分

【用法】水煎服。

【主治】酒色劳伤，痰中有血丝；鼻衄。

【加减】如有火，加黄柏，知母。

24100 生熟地黄汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】熟地三钱 生地二钱 天冬 麦冬(去心) 归身 花粉各一钱五分 沙参二钱 元参一钱

【用法】加蔗汁一酒杯冲服；或藕汁，梨汁均可。

【主治】燥症，鼻干口渴，咽痛舌燥，目火便秘，干热。惟秋冬时久晴乃有此病；而吸鸦片者，更易犯。

24101 生熟地黄汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】生地 9 克 熟地 15 克 山萸肉 6

克 麦门冬 茯苓各 9 克 桑椹子 12 克 炙甘草 6 克

【功用】壮水制火，滋肾宁心。

【主治】赤脉传睛。肾水不足，水不制火，大眦肉浮胀，赤脉色淡，并兼耳鸣咽干，梦遗腰痠者。

【方论选录】方中熟地、山萸肉、桑椹子大补肾水，以制阳光；生地、麦门冬、炙甘草补心血，养阴液以降虚火，茯苓养心安神且能除湿，以防诸药腻膈伤脾。此方补中有泻，寓泻于补，补泻合用，是为滋水降火之良剂。

24102 生熟地黄散

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】生地黄 熟地黄 桂 白芷各等分

【用法】上为末。酒调服。

【主治】闪脑肿痛。

24103 生熟地黄散

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】生熟地黄(洗)各一两 麦门冬(去心)半两 当归三钱半 枳壳(米泔洗，炒) 防风 杏仁(去皮尖，炒) 赤芍药 甘草各二钱半

【用法】上锉散。每服二钱，加黑豆七粒，煎豆熟，去滓服。

【主治】小儿疳蚀眼患，闭合不开，羞明怕日，或生内障，朦朧失所。

24104 生熟附子汤

【方源】《永类铃方》卷十三引《澹寮》。

【组成】附子二个(一生，去皮用；一盐汤浸；炮用)

【用法】上各取二钱，用沉香、木香水各一盞，加生姜七片，大枣七枚，煎一盞。当发日空心服。亦宜以此下黑锡丹，可回元气，坠痰。

【功用】分利阴阳，止寒热。

【主治】瘵疾，欲作胸痞，痰呕，头眩战掉。

24105 生熟解毒丸

【方源】《幼科发挥》卷一。

【组成】芩 连 柏（均半生用，半酒炒）甘草（半生、半炙）各等分

【用法】上为末，雪水为丸，如麻子大，朱砂、雄黄各二分之一（水飞）为衣。淡豆豉汤送下。初生一腊内服之良。天行痘疹之岁，尤宜服之。

【功用】解小儿胎毒。

【主治】小儿胎毒，发为痈疽、丹疹、疥癣，一切恶疮。

24106 生熟罌粟丸

【方源】《医统》卷四十四。

【组成】新、陈罌粟壳（新者去顶，切，焙干；陈者泡去筋膜，炒）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。临卧嚼一丸。

【主治】一切久嗽劳嗽。

24107 生蟹足散方

【方源】《千金》卷五。

【组成】生蟹足 白蔹各半两

【用法】上为末。以乳汁和敷颊上。

【主治】小儿解烦。

【方论选录】《千金方衍义》：生蟹足散血续筋，白蔹散结解毒。

24108 生髓育麟丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参六两 山茱萸十两 熟地一斤 桑椹（干者）一斤 鹿茸一对 龟胶八两 鱼鳔四两 菟丝子四两 山药十两 当归五两 麦冬六两 北五味三两 肉苁蓉六两 人胞二个 柏子仁二两 枸杞子八两

【用法】上药各为细末，炼蜜为丸。每日早、晚时用白滚水送下五钱。服三月，精多且阳亦坚。

【功用】填精益髓。

【主治】男子精少，泄精之时，只有一二点，不能生子。

24109 生干地黄浸酒

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】生干地黄三两 独活一两 黑豆

半升（炒热） 海桐皮二两 生牛蒡根一斤（去皮） 桂心一两 大麻仁半升

【用法】上锉细，以生绢袋盛，用无灰酒二斗浸三两日。每服一小盏，于食前暖饮。

【主治】瘴毒脚气，热毒风盛，心神烦闷，脚膝痠疼。

24110 生牛膝漱口煎

【方源】方出《千金》卷六，名见《外台》卷二十二。

【组成】牛膝 生蓂荷根各三两 黄柏一两

【用法】上咬咀，以绵裹，酒三升，渍一宿，微火煎一二沸。细细含之。

【主治】口疮不歇。

【方论选录】《千金方衍义》：口疮不歇，湿热随虚阳渐渍于上，蕴为火毒，入伤有形之血，以故愈而复发。牛膝生用，去恶血，逐火毒，性专下行，能使口疮热毒下降；蓂荷乃芭蕉中之一色白者，为杀虫神药，取其辛散，故口疮亦得用之；黄柏苦寒降泄。酒渍微煎含之，虽久渍之湿热口疮，必随之而渐化矣。

24111 生地黄七味汤

【方源】《外台》卷九引《许仁则方》。

【组成】生地黄一升（切） 生姜二合（切） 桑根白皮（切）一升 射干（切）二升 干葛（切）六合 紫苏三合 竹沥一升

【用法】上药细切。以水一斗，煮取三升，去滓，纳竹沥搅调，分作四服。每食后良久则服之。若觉可，则重合服之。病轻者三数剂则愈。

【主治】热嗽，但遇于热便发者。

【宜忌】忌芜荑。

24112 生地黄汁饮子

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】地黄汤（《圣济总录》卷七）。

【组成】生地黄汁一合 独活二两（锉）附子一枚（炮裂，去皮脐） 淡竹沥一合

【用法】先以水三大盏煮独活、附子，取汁

一盞半，去滓，纳生地黄汁及竹沥，更煎一兩沸，溫服半中盞，不拘時候。

【主治】中風不語，舌根強硬。

24113 生地黄涂敷方

【方源】《聖濟總錄》卷一二八。

【組成】生地黄五兩（切，研） 豉半升（研） 芒消一兩（研）

【用法】上為細末。涂敷腫上，一日三五次。

【主治】乳癰。

24114 生地黄黃連湯

【方源】《元戎》。

【異名】生地黄連湯（《醫學入門》卷四）、生地黄黃連湯（《准繩·幼科》卷三）。

【組成】川芎 生地黄 當歸各七錢 赤芍藥 梔子 黃連 黃芩各三錢 防風一兩

【用法】上為粗末。每服三錢，水二盞，煎至七分，取清飲，不拘時候，徐徐與之。

【主治】婦人血風症，因大脫血，崩漏或前血，因而枯燥，其熱不除，循衣，撮空，摸床，閉目不省，擲手揚視，搖動不寧，錯語失神，脈弦浮而虛，內燥熱之極也；氣粗鼻干而不潤，上下通燥，此為難治。

【加減】若脈實者，加大黃下之。

24115 生肌麒麟竭散

【方源】《聖惠》卷六十四。

【組成】麒麟竭一分 訶黎勒一分 黃連一分（去須） 檳榔一枚

【用法】上為末。看瘡眼大小，薄敷瘡上。以愈為度。

【主治】腳上生瘡疼痛，傷風毒，膿水不止。

24116 生蘆根五味飲

【方源】《外台》卷六引《許仁則方》。

【組成】生蘆根（切）一升 生麥門冬一升（去心） 青竹茹一升 生薑汁五合 茯苓五兩

【用法】上切。以水八升，煮取二升半，去滓，加竹瀝六六合，攪調，分三服，相去如人行十里久始服一劑。

【主治】積熱在胃，嘔逆不下食。

【宜忌】忌醋物。

24117 生附四君子湯

【方源】《直指小兒》卷二。

【異名】加味四君子湯（《普濟方》卷三七二）。

【組成】四君子湯加生附子末四分之一

【用法】每服半錢，加生薑五片，慢火熟煎，以匙送下。

【功用】助胃回陽。

【主治】慢脾風。

【加減】厥逆者，生附子末對加。

24118 生附四君子湯

【方源】《保嬰撮要》卷三。

【異名】生附四君湯（《景岳全書》卷六十二）。

【組成】人參 白朮 附子 木香 茯苓 橘紅 甘草各等分

【用法】上為末。每服五、七分，加生薑、大棗，水煎服。

【功用】正胃氣。

【主治】小兒脾胃虛弱，吐瀉不思乳食。

24119 生津甘露飲子

【方源】《蘭室秘藏》卷上。

【組成】藿香二分 柴胡 黃連 木香各三分 白葵花 麥門冬 當歸身 丁香各五分 革澄茄 生甘草 山梔子 白豆蔻仁 白芷 連翹 姜黃各一錢 石膏一錢二分 杏仁（去皮） 酒黃柏各一錢五分 炙甘草 酒知母 升麻 人參各二錢 桔梗三錢 全蝎二個（去毒）

【用法】上為細末，湯浸蒸餅和勻成劑，捻作片子，日中晒半干，擦碎如黃米大。每服二錢，津唾下，或白湯送下，食遠服。

【主治】消渴，上下齒皆麻，舌根強硬腫痛，食不能下，時有腹脹，或瀉黃如糜，名曰瘰癧泄；渾身色黃，目睛黃甚，四肢痿弱；前陰如冰，尻臀腰背寒，面生蠟色，脇下急痛，善噫喜怒，健忘。

【備考】本方方名，《脈因証治》引作“生

津甘露饮”。

24120 生津地黄饮子

《证治宝鉴》卷四。为《简易方》引《家宝方》(见《医方类聚》卷一二五)“地黄饮子”之异名。见该条。

24121 生姜小便饮子

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】生地黄汁 藕汁 小便各一盞

【用法】上药和匀,煎三两沸,温热分作三服。

【主治】产后伤寒,恶血冲心,闷乱口干。

24122 生姜五味子汤

【方源】《外台》卷九引《小品方》。

【组成】五味子五合 生姜八两 紫菀一两 半夏二两(洗) 吴茱萸一两 款冬花半两 细辛一两 附子一枚(炮) 茯苓四两 甘草二两(炙) 桂心一两

【用法】上切。以水一斗,煮取五升,分温三服。老人可服五合。

【主治】咳嗽。

【宜忌】忌海藻、菰菜、猪肉、冷水、羊肉、饧、生菜、醋物、生葱。

24123 生姜汁半夏汤

《外台》卷二。即《金匱》卷中“生姜半夏汤”。见该条。

24124 生姜汁灌耳方

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】生姜汁一合

【用法】少少灌入耳中。立出。

【主治】百虫入耳。

24125 生葛根三味汤

【方源】《外台》卷十四引《许仁则方》。

【组成】生葛根一挺(长一尺,径三寸) 生薑汁一合 竹沥二大升(如不可得,宜用篋竹根一大升,切。以水一大斗,缓少煎取二大升以代竹沥;如竹根不可得,以细切篋竹叶一大升,以水一大斗,如上法煎取二大升,以代竹沥。如无竹叶,宜细切弩条一大升,以水一大斗,煎取二大升代之)

【用法】上药先取生葛根净洗刷,使捣极碎

且空,榨取汁令尽讫,又捣,即以竹沥泼洒,极榨取汁;汁尽又捣,泼洒不限遍数,以葛根粉汁尽为度;用生薑汁,绵滤之。细细缓服之,不限遍数,及食前食后。如腹内转作声,又似痛,即以食后温服之。如此经七日以后,服附子十味汤。

【主治】中风,因饮酒过节,不能言语,手足不随,精神昏恍,得病经一两日者。

24126 生精神子奇方

【方源】《医学正印》卷上。

【异名】生精神子丸。

【组成】沙苑蒺藜八两(微焙,四两为末入药,四两为膏入蜜) 川续断(酒蒸)二两 菟丝子三两(酒煮见丝) 山茱萸(生用) 芡实粉(生用) 莲须(生用)各四两 覆盆子(生用) 甘枸杞子各二两

【用法】上为末,以蒺藜膏同炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四五钱,空腹淡盐汤送下。

【主治】梦遗滑泄,真精亏损,以致无子。

【宜忌】有火者相宜。

24127 生发神效黑豆膏

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】黑豆三合 蓖麻三合 诃黎勒皮一两

【用法】上为末,以水拌令匀,纳于竹筒中,以乱发塞口,用煨灰内煨取油,贮于瓷器中。先以米泔皂荚汤洗头,拭干涂之,一日二次,十日发生。

【主治】小儿脑疳,头发连根作穗子,脱落不生;兼疮白秃,发不生者。

24128 生地黄煎破血丸

【方源】《外台》卷三十四引《删繁方》。

【异名】生地黄煎丸(《圣惠》卷七十九)。

【组成】生地黄汁一升 生牛膝汁一升 干漆一斤(半熬)

【用法】上药捣漆为散,纳生地等汁中搅,微火煎,取堪为丸止,停搅,丸如梧桐子大。每服三丸,以酒送下,一日二次。若觉腹内过痛,食后乃服之。

【主治】女人脏寒，子门不开，血聚腹中，生肉瘕，筑筑如物，呼为瘕气。

24129 生血地黄百花丸

【方源】《普济方》卷一九〇引《卫生家宝》。

【组成】生地黄十斤(洗，白中捣取汁) 生姜半斤 藕四斤(捣取汁) 白沙蜜四两 无灰酒一升

上五味，用银器或砂锅内熬取二碗许，渐成膏，一半瓷器收之，一半入干山药末三两，再熬一二十沸，次入后药：

川当归(焙) 熟地黄(焙) 肉苁蓉(酒浸，焙) 破故纸 阿胶(麸炒) 黄耆(蜜炙) 石斛(去根，焙) 覆盆子 白茯苓 远志(去皮) 麦门冬(去心，焙) 枸杞子各二两

【用法】上为末，入山药膏子为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心食前用温酒调地黄膏子送下，每日三次。

【主治】诸虚不足，下血、咯血、衄血、肠癖、内痔，虚劳寒热，肌肉枯瘦。

24130 生肌乌贼鱼骨散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【异名】乌贼鱼骨散(《普济方》卷二七四)。

【组成】乌贼鱼骨一两(烧令烟尽) 黄连一分(去须) 槟榔一枚 诃黎勒皮一分 白龙骨一钱半 赤石脂一钱半 麝香一钱

【用法】上为细散。于乳钵内，入麝香、龙骨、赤石脂相和，研令匀，每用时先暖盐浆水洗疮，拭令干后，以散敷，一日二次。

【主治】冷疮，发歇疼痛，脓水不止。

【备考】方中赤石脂用量原缺，据《普济方》补。

24131 生芦根八味饮子

【方源】《外台》卷三引《许仁则方》。

【组成】生芦根(切)一升 生麦门冬二升(去心) 生姜五两 人参二两 知母二两 乌梅十个 白蜜一合 竹沥三合

【用法】上切。以水八升，煮取三升，去滓，纳蜜、沥等搅令调。细细饮，不限遍数冷暖，亦不限食前后服。

【主治】天行病，用栀子六味散取利，复不觉退，加呕逆，食不下，口鼻喉舌干燥。

【备考】此饮子虽不能顿除热病，然于诸侯不觉有加，体气安稳，心腹不冷，意又欲得此饮，任重合，但依前服之；如热势不退，心腹妨满，饮食渐少，心上痞结，则不可重服之。

24132 生脉散加香薷方

【方源】《医方考》卷六。

【组成】人参 麦冬 五味子 香薷

【主治】人本阴虚，复遇暑途；饥困劳倦，暴仆昏绝者。

【方论选录】暴仆昏绝者，一则阴虚而孤阳欲脱，一则暑邪乘虚而犯神明之府也。故用人参益元而固脱，香薷辟邪而却暑；麦冬之清，所以扶其不胜之肺；五味之酸，所以敛其欲脱之真。

24133 生脉散合甘桔汤

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】人参一钱 麦门冬二钱 五味子十粒 苦梗一钱 甘草减半

【用法】上锉。分为五剂，每剂入阿胶五分，水煎服。

【主治】久嗽肺虚。

24134 生津止渴益水饮

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】人参 麦冬 当归 生地各三钱 黄耆一钱 葛根一钱 升麻 炙甘草各四分 茯苓八分 五味子十五粒

【功用】助脾益肺，升举气血。

【主治】产后烦躁，咽干而渴，兼小便不利。

【加减】汗多，加麻黄根一钱，浮小麦一大撮；大便燥，加肉苁蓉一钱五分；渴甚，加生脉散。

24135 生津凉血葛根汤

【方源】《片玉痘疹》卷十。

【组成】天花粉 干葛 地骨皮 归梢 木通 连翘 大力子 甘草 酒芩 柴胡 淡竹叶 人参各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疮收靥之时，反大热作渴烦躁，此毒火在内。

24136 生姜半夏泻心汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】生姜 半夏 枳壳 厚朴 人参 川连 甘草

【主治】伤寒，汗下早，痞满。

【加减】多加甘草，名甘草泻心汤，治胃中虚，客气上逆；多加生姜，名生姜泻心汤，治肋下水气，腹中雷鸣。

24137 生姜温中下气汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】生姜一斤 大枣三十枚 杜仲皮五两 草薢 桂心各四两 白术五两 甘草(炙) 附子(炮)三两

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，分温三服。

【主治】肺虚劳寒损，则腰背苦痛，难以俯仰，短气，唾如脓。

【宜忌】忌猪肉、海藻、菰菜、生葱、桃、李、雀肉等。

【备考】方中甘草用量原缺。

24138 生料木香匀气散

【方源】《得效》卷三。

【异名】木香匀气散(原书卷六)。

【组成】丁香 檀香 木香各一两 甘草(煨)四两 缩砂(去壳)二两 白豆蔻仁 沉香各一两 藿香(去土)四两

【用法】上锉散。每服二钱，水一盏半，加生姜三片，紫苏叶五片，食盐少许，煎热服，不拘时候；或为末，炒茴香、盐酒调亦可。治气滞腹痛，用紫苏汤调下，未效，用乳香、没药汤调服；治呕血、衄血，用侧柏叶、白茅花煎汤送下；治跌打损伤，加红曲末少许，童子小便同酒调，空心热服(如无红曲，红酒

亦可)。

【功用】和气。

【主治】寒疝作痛，冷心痛，气痢腹痛，宿冷不消，气滞腹痛；气逆呕血、衄血；从高坠下，或打扑伤损，腰胁、心腹作痛。

24139 生萝摩汁涂敷方

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】生萝摩

【用法】上捣，绞取汁。涂丹上，一日三五次。

【主治】丹毒，遍身赤肿。

白

24140 白丸

【方源】《外台》卷六引《范汪方》。

【异名】醋酒白丸子(《普济方》卷三九五)。

【组成】半夏三两(洗) 附子四两(炮) 干姜四两(炮) 人参三两 桔梗二两

【用法】上为散，临病以苦酒和之，为丸如梧桐子大；用蜜为丸亦得。若吐痢不止者，每服二丸，饮送下。不愈复服，耐药者加之。

【主治】①《外台》引《范汪方》：霍乱呕吐及暴痢。②《普济方》：小儿中寒并客忤。

【宜忌】忌猪羊肉、饴。

24141 白丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】阳起石(煨，研令极细) 钟乳粉各等分

【用法】上为细末，酒煮附子糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【主治】元气虚寒，精滑不禁，大肠溏泄，手足厥冷。

24142 白丸

【方源】《汉药神效方》。

【组成】巴豆四钱(去皮膜)

【用法】乳钵内研如泥，用米糊为四丸，用湿纸包裹，煨至纸微焦为度。壮者日服四丸，弱者服三丸，服此时，先断盐二日，于早晨

作一次服。常大便屙下；若便下不止，用豆酱汤及白粥冷食即止。

【主治】痲风。

24143 白丹

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】阳起石十两（火煨通赤一宿，成白色如粉） 钟乳粉三两（内称半两）

【用法】取白矾末半两，研细，用坩埚子销成汁，下半两钟乳粉，搅，候成丹头，与前阳起石同研匀细，滴水为丸，如鸡头子大。每服二三丸，空心米饮送下。

【主治】脏腑不和，注泻不止。

24144 白丹

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】钟乳粉一两 阳起石半两（火煨赤，放冷，研如粉）

【用法】上为细末，入白石脂末少许，同糯米粽子为丸，如鸡头子大，丸时急以气吹之，则不粘手，候干，以生布袋打过。每服三丸至五丸，空心、食前以温酒或盐汤送下。

【功用】益阳退阴。

【主治】虚损痲冷，及吐泻暴脱，伤寒阴证，手足厥冷，脉息沉细。

24145 白丹

【方源】《百一》卷一。

【组成】焰消二两（细研） 白矾三两（细研） 寒水石四两（细研） 块子砒霜一两（细研）

【用法】上用烧药罐子一个，盛得十两药，先以火炙，以生姜汁涂数遍，炙干，先下砒末在罐子底按实，次下焰消末按实，次下白矾末按实，次下寒水石末盖头，填满罐子，上用圆瓦儿盖合口，坐在地上，簇炭五斤，发顶火煨，烟尽为度，去火，候冷取药，砒最在底，刮令净尽，研极细，砒别研尤好；次入纯白石脂一两，只用好白礞土亦得，同研细如粉，滴水和成剂于手心内，以数人转手，丸如梧桐子大，先阴干，或晒干，或焙令十分干；再入新甘锅子内，用圆瓦儿盖合口，坐

在砖上，簇炭三斤，一煨通红为度，用铃铃甘锅子，倾丹入一厚瓷碟内，如玉霜白；如无药罐，只用炼得五十两银甘锅子两个，分药作两处，按实烧亦可。每服一二丸，空心用冷水送下，以干物压之。

【功用】壮脾胃，进饮食。

【主治】虚寒证。

【宜忌】服药后，忌温热物少时；有孕不可服此药。

24146 白丹

《普济方》卷二六五引《家藏经验方》。为原书同卷“扶羸黑白丹”内容之一。见该条。

24147 白丹

《普济方》卷二六五引《余居士选奇方》。为《百一》卷一引周彦广方“太素丹”之异名。见该条。

24148 白药

【方源】《奇效良方》卷五十六。

【组成】黄柏 黄芩 当归 赤芍药 黄耆 牡丹皮 生地黄 木鳖子仁 黄连 地骨皮 桑白皮 甘草各一钱半 白芷 马蓼稍叶（生者）一钱（火煨过）

【用法】上用桐油三两，煎黄色，滤去滓，再煎油稍熟，入细白板松香一片，慢火煎，须柳枝频频搅匀；却入乳香、没药、虢丹各七钱，煎数沸，出火顷时，以少绵铺于煎滤药滓布上滤过；先用瓦钵满盛清水八分，却滤药于钵水中，将去清水中，如绷面状绷三二百度，愈绷愈白，故名白药。常以清水浸，倾于冷地上，用物遮盖，勿令尘入，五七日一换水。凡刀斧一应金伤，量伤孔大小取一块填于伤孔中，以白纸护之，随手不疼，一日一换，五日生肉；打损，只敷于油纸上贴之即愈，不须入接筋续骨等剂。

【主治】刀斧金刃所伤。

【加减】筋断，加杜仲、续断各二钱同煎；收口，加龙骨半钱，碎了煎入药内。

24149 白散

【方源】《伤寒论》。

【异名】三物小白散(《金匱玉函经》卷三)、三物白散(《活人书》卷十五)。

【组成】桔梗三分 巴豆一分(去皮心,熬黑,研如脂) 贝母三分

【用法】上为散,纳巴豆,更于臼中杵之。以白饮和服,强人半钱匕,羸者减之。病在膈上必吐,在膈下必利。不利,进热粥一杯;利过不止,进冷粥一杯。

【功用】①《伤寒论讲义》(二版):除痰开结,攻寒逐水。②《中医大辞典·方剂分册》:涌吐实痰,泻下寒积。

【主治】寒实结胸,肺病,喉痹,白喉。

①《伤寒论》:寒实结胸,无热证者。②《外台》:肺病,咳,胸中满而振寒,脉数,咽干不渴,时出浊唾腥臭,久久吐脓如梗米粥者。③《伤寒论今释》:喉痹。④《伤寒论译释》白喉,喉头白腐,呼吸困难;冷痰肺喘;或痛证。

【宜忌】《外台》:忌猪肉、芦笋等。

【加减】假令汗出已,腹中痛,与白芍三两如上法。

【方论选录】①《医方考》:此证或由表解里热之时,过食冷物,故令寒实结胸,然必无热证者为是。桔梗、贝母之苦,用之以下气;巴豆之辛,用之以去实。又曰:病在膈上则吐,病在膈下则利,此桔、贝主上,巴豆主下之意。服后不行者,益以温汤;行之过多者,止以凉粥。②《伤寒来苏集》:三物白散,贝母主疗心胸郁结,桔梗能开提血气,利膈宽胸,然非巴豆之辛热斩关而入,何以胜消、黄之苦寒,使阴气流行而成阳也?白饮和服者,甘以缓之,取其留恋于胸,不使速下耳。散者,散其结塞,比汤以荡之更精。③《古方选注》:巴豆散水寒,开胸结,法用熬黑者,熟则性缓,欲其入胃,缓缓劫寒破结。④《金鉴》:是方也,治寒实水结胸证,极峻之药也。君以巴豆,极辛极烈,攻寒逐水,斩关夺门,所到之处,无不破也;佐以贝母,开胸之结;使以桔梗,为之舟楫,载

巴豆搜逐胸邪,悉尽无余。然唯知任毒以攻邪,不量强羸,鲜能善其后也,故羸者减之。

⑤《伤寒论今释》:桔梗排脓,贝母除痰解结,二者皆治胸咽上焦之药,巴豆吐下最迅烈,合三味以治胸咽闭塞之实证也。

【临证举例】①咽痛 《伤寒论今释》引《成绩录》:巽屋之家人,卒然咽痛,自申及酉,四肢厥冷,口不能言,如存如亡(按:犹言气息仅属耳),众医以为必死,举家颇骚扰。及戌时,迎先生请治,脉微欲绝,一身尽冷,呼吸不绝如缕,急取桔梗白散二钱,调白汤灌之,下利五六行,咽痛始减,厥复气爽。乃与五物桂枝桔梗加大黄汤(桂枝、地黄、黄芩、桔梗、石膏、大黄),须臾大下黑血,咽痛尽除,数日而平复。②寒实结胸 《江苏中医》(1961;8:40):郑某某素嗜酒,并有慢性气管炎,咳嗽痰多,其人痰湿恒盛。时在初春某日,大吃酒肉饭后,即入床眠睡。翌日不起,至晚出现迷糊,询之瞠目不知答。因其不发热、不气急,第三天始邀余诊,两手脉滑大有力,满口痰涎粘连,舌苔厚腻垢浊,呼之不应,问之不答,两目呆瞪直视,瞳孔反应正常,按压其胸腹部则患者皱眉,大便不行,小便自遗。因作寒实结胸论治,用桔梗白散1.5克,嘱服三回,以温开水调和,缓缓灌服。二次灌药后,呕吐粘腻胶痰样物甚多,旋即发出叹息呻吟声。三次灌药后,腹中鸣响,得泻下两次,患者始觉胸痛、发热、口渴欲索饮。继以小陷胸汤,两剂而愈。③肺脓肿 《新中医》(1981;4:45):刘某,男,18岁,学生。1975年10月30日来诊:二十天前发冷发热,三天后右胸痛,咳嗽,咯黄色脓痰,无血丝。右肺中下野叩之音浊,听诊可闻密集水泡音;胸透:肺右下角有大片状阴影,其中有一圆形影,内有液平面。上午九时半,服三物白散一剂,十分钟后,患者自觉从喉至胸骨后、胃部有麻辣灼热感;二小时后,首次排出黄色稀便,以后每十分钟一次,共五次,量多,有泡沫,至十五时半,

共排十余次。翌晨起,咯黄色脓痰,痰中带血,患者精神转佳,听诊右胸水泡音明显减少,胸透右下呈点片状影,未见空洞。第三天痰中带血较多,水泡音几乎听不到。后拟服中药桔梗、冬瓜仁、银花、蒲公英、败酱草、鱼腥草,经一月治疗痊愈。④癰闭危候(急性肾功能衰竭)《浙江中医杂志》(1984; 1: 29):谢某某,男,17岁,农民。五天前,食野蘑菇后,头痛,腰痛,尿少,嗜睡,腹胀,肾区叩击痛,膀胱无充盈,体温35.8℃,血压110/60mmHg。实验室检查:白细胞19600mm³,中性89%,非蛋白氮160毫克,肌酐5.1毫克,二氧化碳结合力24.4Ea/L,血钾6.8mEq/L。入院后诊断为急性肾功能衰竭,经抗生素、激素、速尿、胰岛素等治疗,六小时仍无尿,并出现神志不清,呼吸急促,呕恶,腹膨大,而膀胱充盈,大便1周未行,舌质红,苔黄腻,脉滑数。症属癰闭危候,治拟开通三焦,急投三物白散:巴豆(去油)、桔梗、象贝各0.5克,共研细末。冲服一半后,二小时内解干便一次,量少,呕出咖啡样物100毫升,但无尿;再冲服一半,开始滴尿(导尿管),三小时内滴出550毫升,过五小时又滴出550毫升,解干便一次,神志转清,知饥,呼吸平稳。14小时内共排尿3150毫升,解大便五次,约500克。第二三天平均尿量4000毫升,已进入多尿期。十三天后复查,血液正常;二十天后,症状消失出院。

【备考】本方方名,《外台》引作“桔梗白散”。

24150 白散

《医学金针》卷二。即《三因》卷二“白散子”,见该条。

24151 白膏

【方源】《外台》卷一引《范汪方》。

【组成】天雄 乌头(炮) 莽草 羊躑躅 各三两

【用法】上药各切,以苦酒三升,渍一宿,

作东向露灶,又作十二聚湿土各一升许成,煎猪脂三斤,着铜器中,加灶上炊,以苇薪为火,令膏释内所渍药,炊令沸,下着土聚上,沸定顷,上火煎,如此十二过,令土聚尽遍,药成,绞去滓。伤寒头痛,每服如杏核大一枚,酒下,温覆取汗;咽痛,含如枣核大一枚,咽之,一日三次。疗伤寒,以膏摩体中,手当千遍,药力方行;并疗恶疮,小儿头疮、牛领马鞍皆疗之,先以盐汤洗恶疮,布拭之,着膏疮肿上摩,向火干遍,日再摩,自消。

【主治】伤寒头痛,咽痛;并疗恶疮、小儿头疮、牛领马鞍。

【宜忌】不可近目。

24152 白膏

【方源】《千金》卷六。

【组成】附子十五枚 野葛一尺五寸 蜀椒一升

【用法】上咬咀,以醋渍一宿,猪膏一斤,煎令附子黄,去滓。涂之,一日三次。

【主治】面皴疱,疥,疔,恶疮。

24153 白膏

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】油二两 白蜡一两 膩粉一分 南粉一分(细研) 密陀僧一分(细研) 乳香一分(细研) 杏仁三七枚(汤浸,去皮尖双仁,细研)

【用法】于铫子内先炼油熟,下蜡令消,入诸药末,和匀成膏。涂患处,一日二三次。

【主治】久恶疮。

24154 白膏

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】白松脂 白藜 白及 定粉各半两 乳香一分 清油二合 黄蜡一两

【用法】上为末,先以油入瓷锅内,用慢火熬令香,下蜡令消,次下诸药末,不住手搅,熬成膏,以瓷盒盛,候冷。一日三四度涂之。

【主治】小儿汤火疮。

24155 白膏

【方源】《苏沈良方》卷九。

【组成】柳白皮半两(揩洗,阴干) 白蜡四钱 黄丹二钱 胡粉二两 油(生)四两(熟)三两八钱 商陆根三分

【用法】上先熟油,入皮、根,候变色,去滓,入药搅良久。

【功用】消肿。

【主治】①《苏沈良方》:坠击所伤。②《普济方》:一切疮疖痈肿,及瘰疬、杖疮。

【备考】《普济方》本方用法:摊帛上,贴之。

24156 白膏

【方源】《三因》卷十五。

【组成】白薇 白薇 白及 白芷 薤白各半两(锉,洗,以清油一斤,煎至半斤,滤去滓,入后药) 黄耆 甘松 藿香 零陵香 防风 当归各半两(再入煎油煎,十上火,绵滤去滓,入后药) 定粉二两 黄蜡三两 寒水石(煨,水飞过)二两(研细)

【用法】上再煎,以柳枝搅,滴水成珠为度,瓷器盛之。以脑子少许掺其上。

【主治】一切风热毒肿,及脏气郁结,丹石发动,结为痈疽、瘰疬,诸疮肿未破;九漏、浸淫,脓汁淋漓,诸治不愈者。

【宜忌】煎时忌铁器。

24157 白膏

《普济方》卷二七七。即《圣惠》卷六十八“神效白膏”。见该条。

24158 白膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】蓖麻四十九粒(去壳) 嫩松脂一钱 滴乳半钱

【用法】上用铁斧于石砧上捶为膏,干湿得所,随意加减松、乳。摊于纸上,贴之。

【主治】一切无名肿毒、发背等疾。

24159 白膏

《普济方》卷三一五。为《千金》卷七“神明白膏”之异名。见该条。

24160 白膏

《类证治裁》卷八。为原书同卷“巴膏”之异名。见该条。

24161 白膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】松香八两 铅粉二两 麻油二两

【用法】将麻油熬好,入松香烱开,熬至滴水成珠,入铅粉和匀。

【主治】疮疖及久溃不敛者。

24162 白丁散

《东医宝鉴·外形篇》卷三引《医鉴》。为《证类本草》卷十九引《简要济众方》“独胜散”之异名。见该条。

24163 白丸子

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】附子(半炮半生,去皮脐) 白附子(半生半炮) 半夏(汤洗七遍,半生半煨) 天南星(热水洗,半生半炮) 天麻干蝎(生用) 白花蛇肉(酥拌,炒令黄) 甘菊花 羌活 防风(去芦头) 芎藭 桂心 白僵蚕(生用) 白鲜皮 木香各半两 巴豆半两(去心,研,纸裹压去油,别研) 朱砂一分(细研) 雄黄一分(细研) 麝香一分(细研)

【用法】上为末,入朱砂、雄黄、麝香等,研令匀,以糯米饭为丸,如梧桐子大,用腻粉滚过。每服三丸,以暖酒送下。

【主治】一切风。

24164 白丸子

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】天麻一两 干蝎半两(生用) 附子半两(生用,去皮脐) 芎藭三分 细辛半两 半夏半两(生用) 川乌头一分(生用,去皮脐) 白附子半两(生用) 白僵蚕三分(生用) 麝香一分(细研) 麻黄半两(去根节)

【用法】上为末,以枣瓤为丸,如绿豆大,以腻粉滚过,令干。每服三丸,以温酒送下。

【主治】一切风。

24165 白丸子

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】白附子一两(炮裂) 白僵蚕一两(微炒) 干蝎一两半(微炒) 蝉壳半两 天

麻一两 羌活一两 防风一两(去芦头) 侧子一两(炮裂, 去皮脐) 麻黄一两(去根节)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如绿豆大, 以膩粉滚过, 令干。如中风不语重者, 每服十丸, 以暖酒研下, 当有汗出即愈。如常服, 每服五丸, 空心温酒送下。

【主治】一切风。

24166 白丸子

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】天麻 天南星(炮裂) 白附子(炮裂) 白花蛇肉(酒浸, 炙微黄) 附子(炮裂, 去皮脐) 白僵蚕(微炒)各一两 膩粉一分 麝香一分

【用法】上为末, 研入麝香、膩粉, 炼蜜为丸, 如梧桐子大, 以胡粉滚过。每服三丸, 以温酒送下。

【主治】一切风。

【宜忌】忌毒滑物。

24167 白丸子

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】白附子一两(炮裂) 天麻一两 雄雀粪一两 天南星(酒炒令黄) 牛黄(细研) 干蝎(微炒) 水银(以少枣瓤研令星尽)各一分

【用法】上为末, 研入水银令匀, 以枣瓤为丸, 如绿豆大, 入膩粉中滚过, 晒干。每服二丸, 以温酒送下。

【主治】一切风。

24168 白丸子

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】白僵蚕半两(微炒) 藿香一分 天南星三分(生用) 膩粉一钱(研入) 干蝎一分(微炒) 桑螵蛸一分(微炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如黄米大。每服五丸, 用薄荷汤入酒少许研下, 不拘时候。

【主治】小儿中风, 失音不能啼。

24169 白丸子

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】天南星 半夏各半两 白僵蚕 干蝎(去土) 胡粉 膩粉 麝香各一分(研)

【用法】上药生为末, 用糯米粥为丸, 如绿豆大。每服二三丸, 嚼破, 温酒送下, 荆芥、薄荷汤送下亦得; 如中风口噤, 研化灌服之。

【主治】卒中风, 口眼喎斜, 手足不随, 口噤。

24170 白丸子

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】安息香 胡桃仁(与安息香同研)各一两 白胶香(研) 牛黄(研) 麝香 丹砂(研) 芎藭各一分 当归(切, 炒)半两 干蝎七枚(全者, 酒炒) 巴豆三粒(去皮心膜, 研如膏, 压去油)

【用法】上十味, 将三味捣为细末, 与别研七味和匀, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服一二丸, 温酒送下。量力饮之, 但令醺醺, 勿至大醉。兼理中风、手脚挛缩及半身不随, 日二夜一, 不可过多。

【主治】破伤风; 兼治中风手脚挛缩及半身不随。

24171 白丸子

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】膩粉半两 粉霜 滑石末各四钱 匕 礞砂 寒水石(火煨过, 为末) 白丁香(直者, 为末)各三钱匕

【用法】上六味, 先将膩粉、滑石二味研匀, 红纸裹, 更和白面作饼子, 再裹合, 复用酒湿红纸裹二十四重, 后用桑柴熟火烧, 以面熟为度, 取出, 与前药四味一处研匀, 用水浸蒸饼心, 搗干, 和为丸, 如豌豆大。每服第一日三丸, 第二日四丸, 第三日五丸, 第四日六丸, 食前煎生姜水送下, 一日三次。服后以小便无数, 取下为度; 服四日, 痞未下, 更加一日。如服药第二日, 觉口气时, 便用贯众汤漱之。

【主治】水气肿满, 气息喘急, 小便不利, 并男子女人虚积, 及遍身黄肿。

24172 白丸子

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】硫黄半两(研) 附子(炮裂,去皮脐,取末)半两 消石(研) 钟乳(研) 白龙骨(研) 寒食面各一分

【用法】上为细末,面糊为丸,如麻子大。每服三五丸,粥饮送下。疾愈即止。

【主治】小儿虚冷,脏腑滑泄不止。

24173 白丸子

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】龙脑 粉霜各一分 轻粉半两(以上同研匀,用白面一匕,同和作一珠子,投火中烧黄,再研如粉) 海蛤二钱(烧红,研末) 寒水石一钱半 滑石二分 海金沙一钱 阳起石一分

【用法】上为细末,糯米饭为丸,如豌豆大。每服十丸,生姜汤送下,一日三次,不拘时候。五日后,牙缝中血出及臭涎,即住服。如涎血未出,加十丸;又五日未下,更加十丸,直以涎出,即住药。未即,每五日更加丸数。

【主治】水气。

【宜忌】肿消,则尤要将息慎忌。

24174 白丸子

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】轻粉 粉霜各一钱 玄精石一钱半 滑石半两 硃砂半钱 白直丁香二十个

【用法】上先次将粉霜、玄精、硃砂匀研,滴水为丸,用白面裹,草火内烧,面熟为度,不用裹药面,复同余药,丸如绿豆大,再用滑石为衣。第一日服三丸,一日三次;第二日五丸,第三日八丸,一日八次,熟水送下。不动脏腑,其水道小便出。

【主治】十种水气。

24175 白丸子

【直指】卷十八。为《局方》卷一“青州白丸子”之异名。见该条。

24176 白丸子

【直指小儿】卷四。为原书同卷“青州谢家白丸子”之异名。见该条。

24177 白丸子

《普济方》卷三九一引《保婴方》。为原书同卷“真方五色丸”内容之一。见该条。

24178 白丸子

《幼幼新书》卷十引郑愈方。为原书同卷“珍珠丸”之异名。见该条。

24179 白丸子

【方源】《普济方》卷三八四。

【组成】白附子 南星 半夏各一两(并生用) 天麻 僵蚕 全蝎 川乌头(去皮尖)五钱

【用法】上药生为末,姜汁面糊为丸。生姜汤送下。

【主治】①《普济方》:惊热。②《诚书》:惊风,中风痰盛。

【备考】方中白附子、南星、半夏,《诚书》均炮制。

24180 白丸子

【方源】《正体类要》卷下。

【组成】半夏七两(生用) 南星二两(生用) 川乌(去皮脐,生用)五钱

【用法】上为末,用生姜汁调糊为丸,如梧桐子大。每服一二十丸,生姜汤送下。

【主治】一切风痰壅盛,手足顽痰,或牙关紧急,口眼歪斜,半身不遂。

24181 白丸子

《片玉心书》卷四。为原书“五色丸”内容之一。见该条。

24182 白丸子

【方源】《名家方选》。

【组成】鸡胆五钱 黄连 黄芩各二钱半 甘草一钱

【用法】面糊为丸,银箔为衣服。

【功用】杀虫。

【主治】五疳。

24183 白丸子

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】半夏(醋煮干) 茯苓各十钱

【用法】上为细末,以生姜汁作薄糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温水送下。

【主治】产后腹中有块,上冲欲吐者。

24184 白丸散

【方源】《得效》卷十。

【组成】生硫黄 乳香 生白矾

【用法】上为末。每用手微抓动患处，以药擦之。

【主治】肺风酒皴。

24185 白及丸

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】白及末

【用法】酒糊为丸。每服三钱，黄酒送下。半月愈。

【主治】鼻渊。

24186 白及汤

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】白及 茜草 生地 丹皮 牛膝 广皮 归尾各一钱

【用法】加荷叶蒂五个，水煎服。

【主治】内伤吐血。

24187 白及肺

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】白叶猪肺一具 白及片一两

【用法】猪肺挑去血筋血膜，洗净，同白及入瓦罐，加酒淡煮熟，食肺饮汤；或稍用盐亦可，或将肺蘸白及末食更好。

【主治】肺痿肺烂。

24188 白及散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】白及一分 细辛一分 防风一分（去芦头） 柏子仁一分

【用法】上为细散。以乳汁调涂儿颅骨上，一日二次。

【主治】①《圣惠》：小儿颅骨开。②《局方》（吴直阁增诸家名方）：小儿肾气不成，脑髓不足，小儿年大，骨应合而不合，头缝开者。

24189 白及散

【方源】《三因》卷九。

【异名】白及膏（《朱氏集验方》卷十）。

【组成】白及不拘多少

【用法】上为末。冷水调，用纸花贴鼻窍中。

一法用黄胶，烫令软，贴鼻窍中。

【主治】鼻衄。

24190 白及散

【方源】《仙拈集》卷二引《保命集》。

【组成】白及

【用法】上为末。童便调服。

【主治】衄血；兼治呕血伤肺。

24191 白及散

【方源】《普济方》卷二七八引《十便良方》。

【组成】麒麟竭指面大块 木鳖子五个（去皮壳，研） 白及一两 黄连半两

【用法】上为末。用猪胆汁调涂，上留一窍。以愈为度，干即易之。

【主治】发疮肿硬热赤不散。

24192 白及散

【方源】方出《朱氏集验方》卷七，名见《普济方》卷一九〇。

【组成】白及

【用法】上为末。粥饮调服。

【主治】肺痿吐血、咯血。

①《朱氏集验方》：吐血、咯血不止。②《普济方》：肺损或食饱负重而得咯血、呕血。

③《医学入门》：久嗽成痿，咯血红痰。

【备考】《赤水玄珠》本方用法：井花水调服，每服二钱。

24193 白及散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】白及 贝母 净黄连各半两 轻粉三十贴

【用法】上前三味，锉，焙，为末，仍以轻粉乳钵内同杵匀。每用一二钱，清油调擦患处。必先用槲皮散煮水，候温，洗净拭干，方涂药。

【主治】瘰癧脓汁不止。

24194 白及散

【方源】《普济方》卷六十四。

【组成】白及二十枚（研为末）

【用法】用猪肺一个、生姜数片，煮熟，切成片子，点尽白及末，食之。

【主治】语声不出。

24195 白及散

【方源】《普济方》卷二九〇。

【组成】白及 白薇 乌鱼骨 紫参 黄芩 龙骨各三钱

【用法】上为细末。每用干掺疮口上。

【功用】生肌，住痛，止血，收疮口，辟风。

【主治】痈疽疮毒；并治金疮血不止。

24196 白及散

【方源】《医统》卷八十一。

【组成】白及八两 乌骨鸡（焙干） 红药子四两 雄黄 轻粉 红芽大戟各半两

【用法】上为末。醋调，敷患处。

【主治】大小疮疽。

24197 白及散

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】白及一两 藕节五钱

【用法】上为细末。每服一钱，白汤调下。

【主治】咯血。

24198 白及散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】白及 飞面

【用法】上为末。白汤调服。

【主治】肺络损伤，喘咳吐血。

24199 白及散

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】款冬花 紫菀 白及 阿胶各等分

【用法】水煎服。

【主治】肺痿。多年咳嗽，肺痿咳唾脓血，及肺破不愈。

24200 白及散

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】白及一钱 枇杷叶 藕节各五分 莲须 柏叶 沙参各六分 阿胶八分

【用法】水煎服。另以生地汁磨好墨服。

【主治】劳瘵，因饱屈伸伤肺，吐、咯血。

24201 白及散

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】白及 凤凰衣 桑螵蛸各等分

【用法】入猪脾内，煮烂食之。

【主治】产后伤脾，小便淋数不止。

24202 白及散

【方源】《外科真铨》卷下。

【组成】白及一两 明雄三钱

【用法】上为末。掺之。

【主治】①《外科真铨》：漏疮。②《中医皮肤病学简编》：新生儿剥脱性皮炎。

24203 白及散

【方源】《理渝》。

【组成】生南星 生半夏各三两 海藻 昆布各一两 冰片 麝香各二钱 红花 牡蛎各二两 青盐六钱（共生研末）

【用法】白及半斤，切片，熬膏，和药为锭，听用。

【主治】瘰癧。

24204 白及膏

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】白及 白薇 白蜡各一两 黄耆（锉） 乳香（研） 牡丹皮 芍药 丁香各一分 麻油二两

【用法】上九味，除油、蜡外，并锉细；先煎麻油令沸，次入前项药，以柳木枝不住手搅，绵滤过去滓，再煎，入蜡，膏成，入银石器中盛，候冷。不拘多少，取敷疮上。

【主治】小儿唇疮。

24205 白及膏

《朱氏集验方》卷十。为《三因》卷九“白及散”之异名。见该条。

24206 白及膏

【方源】《得效》卷十九。

【组成】川白芷 白及 松脂（均为末）

【用法】用头发一大握，桐油一碗，于瓦器内熬，候油沸，头发熔烂，入上药末，出火摊冷，以瓦器收贮，不容灰入。每日百沸汤泡洗皴裂令软，拭干，敷其上。或加少水粉。

【主治】断跟皴。

24207 白及膏

【方源】《普济方》卷三三四。

【组成】良姜 白及 沥青各等分

【用法】上为细末，嚼脂麻，水同熬为膏，入冷水共淀，用绛绢一片，火上摊作膏。贴疮上。

【主治】蜈蚣疮。

24208 白及膏

【方源】《卫生鸿宝》卷二。

【组成】白及五钱（炙，为末） 广胶一两（烔化）

【用法】和匀。敷患处，空一头出气，以白海蜃皮贴之。数次即消。

【主治】发背，搭手。

24209 白及膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白及面一两 煨石膏面一两 凡士林八两

【用法】以上药物，调匀成膏。外敷患处的清洁疮面。

【功用】收敛生肌。

【主治】烧、烫伤，下肢溃疡，糜烂。

24210 白马饮

【方源】方出《千金》卷十一，名见《仙拈集》卷一。

【组成】白马尿（铜器中承取）

【用法】旦旦服一升。

【主治】①《千金》：伏梁气。②《仙拈集》：酒鳖攻心者。

【备考】《本草纲目》：马尿治癰疽有验。

24211 白马饮

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】白马粪（入微水，绞汁）半碗

【用法】灌之。

【主治】吐利腹痛，绞肠痧，一切难辨之症。

24212 白云丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】大南星（炮） 川乌（炮，去皮） 白附子（生） 半夏（洗）各二两 滑石（研） 石膏（研）各三两 麝香 龙脑各一分

【用法】上药稀面糊为丸，极稀为妙，如绿豆大。每服五十丸，姜、酒、茶或薄荷茶下，

食后服为佳。每遇头目昏困，精神懵冒，胸中痰逆，愤郁如中酒刺，服此药，良久间如拏去重裘，豁然清爽，颜色夷畅。

【主治】痰实胸膈膈逆，及头昏眩困倦，头目胀痛。

24213 白云丹

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】胡椒 川乌 草乌 细辛 桂枝 各四两 火消二斤 韭菜一斤（打汁） 葱白八两（打汁）

【用法】水煎，去滓，入消溶化，再入二汁，乘热扫在方砖上，候有霜出，刮下，每霜一两，加麝香二分，和匀听用。放膏上贴之。

【主治】初起肿疡。

24214 白云丹

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】轻白炉甘石一两（将倾银罐内，煨至通红，倾好醋内，淬七次为度） 轻粉一钱 白蜡二钱 冰片一分

【功用】生肌收口。

24215 白云散

【方源】《医方类聚》卷九十四引《烟霞圣效》。

【组成】多年石灰（炒）

【用法】每服轻者半钱，重者一钱，热酒调服。

【主治】心气卒痛。

24216 白云散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】绿豆粉一两 寒水石五钱 锦纹大黄二钱 白芷三钱

【用法】上为末。猪胆汁调涂。

【主治】胎丹，以灯照手足身上，如云头之红，或点尖之肿，皮肤隐隐者。

24217 白云散

【方源】《痘疹金镜赋集解》卷六。

【组成】人中白（煨） 川连（肉汁浸三四次，以白为度）

【用法】上为末。每服一钱，白汤下。

【主治】发斑丹。

24218 白王丹

【方源】《幼幼新书》卷十三引张焕方。

【组成】天南星 半夏(并生) 僵蚕(炒) 桂心 石菖蒲各一两 膩粉 龙脑各一分

【用法】上为细末,姜汁为丸,如黍米大。每服十丸,人参汤送下。

【主治】中风涎潮。

24219 白牙药

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】零陵香 香白芷 青盐 升麻各半两 细辛二钱 麝香(另研)半钱 砂锅(细末) 石膏(细末)各一两

【用法】上除砂锅、石膏、麝香三味外,同为细末,入砂锅等三味,同研匀。每日早晨,以指蘸药擦牙后,用温水漱口。

【主治】牙齿黄黑不莹净。

24220 白牙药

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】石膏 香附子 甘松 三奈子 藿香 零陵香 沉香 川芎 细辛各半两 防风一两

【用法】上为细末,和匀。日用少许。

【功用】祛风,莹白,牢牙。

24221 白牙散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】白芷七分 升麻一钱 石膏一钱五分 羊胛骨灰二钱 麝香少许

【用法】上为细末。先以温水漱口,擦之。

【主治】①《杏苑》:一切牙痛。②《医部全录》:牙黄黑色。

【方论选录】《杏苑》:用白芷以疏阳明经风,升麻、石膏以清阳明经热,用羊胛骨补齿虚,麝香辛窜,引诸药以通行关窍。

24222 白牙散

【方源】《医方类聚》卷七十二引《居家必用》。

【组成】藁本 升麻 细辛 皂荚(烧灰) 石膏一倍于上药 檀香 麝香

【用法】上为细末。每日早晨刷牙后,搽之。

【功用】牢牙。

24223 白牙散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】升麻根四两 羌活根 龙胆根 羊颈骨

【用法】上为极细末,以纱罗子罗骨灰,作微尘末,和匀。卧时刷牙,先以温水漱口,用少许搽之。

【主治】牙龈绽肉,有牙疳肿痛,牙动欲落,牙齿不长,髭黄口臭。

【备考】方中羌活根、龙胆根、羊颈骨用量原缺。

24224 白牙散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】细辛 萆薢 防风 白芷 茯苓 川芎 升麻 甘松 香附子 石膏三倍于上药

【功用】令牙白。

【备考】《奇效良方》本方用法:上为细末,研匀。常用揩牙。

24225 白牙散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】酸枣仁 蘑菇不拘多少(煨过) 麝香少许。

【用法】刷牙。

【功用】令牙白。

24226 白牙散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】石膏 细辛 地骨皮 青盐 甘松 藿香 零陵香 白芷 藁本各三钱 磁石末 新砖末 香附子 麝香少许

【用法】上为末。搽牙。

【主治】牙宣。

【备考】方中磁石末、新砖末、香附子用量原缺。

24227 白牙散

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】石膏四两 香附子一两 白芷 甘松 三奈子 藿香 沉香 零陵香 川芎 细辛各二钱半 防风五钱

【用法】上为末。早晨搽牙，以水漱吐之。

【功用】令牙白。

24228 白凤丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】白毛乌骨雄鸡一只(须白丝毛、乌骨、高冠者，另养一处，以黄耆炒末饲之，不可近雌鸡，闭死，去毛肠，净) 香附(四制)一斤 熟地黄四两 生地黄 当归 白芍药 黄耆 牛膝 柴胡 牡丹皮 知母 川贝母(去心)各二两 黄连 地骨皮 干姜 延胡索各一两 茯苓二两五钱 秦艽一两五钱 艾叶 青蒿各四两

【用法】先将艾、蒿一半入鸡腹内，余置鸡外，同入坛内，以童便和水，浸过二寸许，煮烂，取出去骨，焙干，再将各药及鸡共研为末，用鸡汁打糊为丸，如梧桐子大。每服五六十九至七八十九丸，温酒或米饮送下。

【主治】妇人羸瘦，血虚有热，经水不调，崩漏带下，不能成胎，骨蒸。

【宜忌】忌食煎炒芣菜。

24229 白凤丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】人参(去芦)一百二十八两 鹿角胶一百二十八两 牡蛎(煅)四十八两 白芍一百二十八两 当归一百四十四两 甘草三十二两 鹿角霜四十八两 鳖甲(炙)六十四两 丹参一百二十八两 香附(炙)一百二十八两 天冬六十四两 桑螵蛸四十八两 熟地二百五十六两 乌鸡(去毛、内脏)三十二只(以上十四味均下罐，用绍酒一千三百四十四两，蒸四昼夜) 生地二百五十六两 川芎六十四两 黄耆三十二两 银柴胡二十六两 芡实(炒)六十四两 山药一百二十八两(以上六味不下罐，共研为粗末，铺槽底，搅匀，晒干)

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重三钱五分，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，一日三次。

【功用】益气养血，调经止带。

【主治】妇人身体瘦弱，经水不调，崩漏带下，腰腿痠痛。

24230 白凤丸

【方源】《全国中药成药处方集》。

【异名】参茸白凤丸。

【组成】人参一两 杜仲一两 川芎一两 熟地一两 於术一两 菟丝一两 黑艾叶七钱半 炙甘草五钱 鹿茸一两 茯苓一两 当归一两 川椒五钱 大黄酒二两 白芍二两 香附一两 阿胶一两 白绒毛一尾

【用法】共研细末，和蜜为丸，每粒重四钱，白蜡壳封。常服。

【主治】妇人诸虚百病，久不孕育。

24231 白凤丹

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】嫩黄耆(蜜水炒) 人参(去芦) 川芎 白茯苓(去皮) 当归(酒洗) 干姜(炒) 大附子(面裹炒，去皮肝) 小茴香(盐酒炒) 白芍(酒炒) 肉桂 白术(去芦，微炒) 胡椒 艾叶(醋炒) 破故纸(盐酒炒) 乌药各二两 甘草(炙)一两 香附米(醋炒)六两 苍术(米泔浸，炒)四两 吴茱萸(炒)一两

【用法】上锉；用白毛乌肉鸡一只重二斤，吊死，水泡，去毛屎并头足不用，入铁锅内，将药片盖上，入好酒，煮烂为度，取去骨，同药在锅焙干，为末，将鸡酒汁打糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心好酒送下。治后症先宜服五积散加香附、吴茱萸、小茴，减麻黄，入米糖一块煎服；后服此丸药。

【主治】妇人经水不调，肚腹冷痛，赤白带下，子宫虚冷，久无子息。

24232 白凤丹

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】白丝毛乌骨雄鸡一只(先以黄耆末一两，当归末一两，甘草末五钱，三味和米粉七合，匀作七分，调成小块，鸡食之，约有六七日，吊死不出血，去毛肠不用) 当归身(酒洗)三两 川芎二两 白芍(酒

炒)三两 怀生地(酒洗)五两 山药三两 鹿角霜四两 天门冬(去心)一两 人参二两 丹参(水洗净)二两 山茱萸(酒蒸,去核)二两 木瓜一两半 胡黄连一两 知母(去毛,酒炒)三两 小茴(酒炒)二两 麦门冬(去心)二两 怀牛膝(去芦,酒洗)二两 秦艽(去芦)二两 银柴胡二两 鳖甲(醋炙)一两 生甘草一两

【用法】上俱制如法,锉匀,将鸡切作小块,俱盛于瓷坛内,用水二分,好酒二分,米醋一分,坛口用柿漆纸封固,置大锅内,桑柴火煮三昼夜,取出日晒夜烘,一干,又入汁拌,又烘晒,以汁尽为度;为极细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服百丸,空心淡盐汤送下。

【主治】妇女五劳七伤,骨蒸,五心烦热,心虚惊怕,经水来时,或前或后,或淡白,或紫色,时常注带下;或因烦劳、性气恼怒、产后失调,致赤白带渗,及夜卧身体上下疼痛,及午后神疲,腰腿痠软,或心嘈,又时饱闷,及梦寐不清,或冲任二脉结,痼痼隐隐。

24233 白凤饮

【方源】《中国医学大辞典》引《疫喉浅论》。

【组成】乌嘴白鸭一只(取头颈骨连喉管嗦,不刺破,不落水) 玄参四钱 生地黄五钱 蜗牛二个 地龙二条 古文钱四枚 白盐梅三个 枇杷叶三钱(绢包)

【用法】用新取急流河水三大碗,扬三百六十五遍,炊以芦薪,煎至八分,去油,临饮时,每一钟加柿霜一钱,和匀,缓缓饮之。

【主治】疫喉白腐,会厌溃烂,口出臭气。

【加减】春加蚕食桑叶(孔多者)三钱,夏加荷花蒂(连须)七个,秋加荸荠苗梢(寸许长者)九枚,冬加青果汁一小酒杯(冲服,或用青果五枚,去两头尖,捣烂入煎亦可)。

24234 白凤散

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】鸡子一个(打一孔,去黄留白) 矿

石灰二钱(入鸡子内)

【用法】鸡子用纸封口,外用盐泥封固,火煨通红,去泥,碾为细末。茶油调搽。

【主治】脓窠疮。

24235 白凤膏

【方源】《修月鲁班经后录》引《劳证十药神书》(见《医方类聚》卷一五〇)。

【组成】黑嘴白鸭一只 大京枣二升 参苓平胃散一升 陈煮酒一大瓶

【用法】上先将鸭扎缚其脚,却量患人饮酒多少,随量倾酒在器中,烫温,却将刀于鸭项上割开,沥血于酒内,搅匀,一气饮之。又将鸭干得去毛,就肋下开一孔,取出肠杂,以纸拭干,将枣子去核,每介实填参苓平胃散末,以麻布扎定,填于鸭肚中,用砂糖髹一个,放鸭在内,四遭炭火慢煨,一瓶煮酒作三次添入,直至熬酒干为度,取起。次第食之,尽此一鸭。愈后,即服十珍丸。

【功用】复其真元。

【主治】①《修月鲁班经后录》引《劳证十药神书》:一切劳,大怯及虚甚急,火乘金位,嗽吐痰咯血、发热者。②《张氏医通》:少年稟气不足,因饮食饥饱所伤,致成虚损,形体羸弱,日潮潮热,腹胀气急,脉来弦数者。

【方论选录】《十药神书》陈修园按:怯而日久,虚极而急,而且咳嗽不已,则肺日因嗽而动扰矣。吐痰不已,则肺因痰而壅滞矣。咯血发热,壮火食气,不特肌肉消瘦,而且气衰言微矣。此为极症,恐非无情之草木所能治。故用黑嘴白鸭一只为君,盖以毛白者味较清而入肺,嘴黑者骨亦黑而入肾,取金水相生之义,亦资异类有情之物以补之也。最妙入京枣二升,取其甘温以补胃;平胃散一升,取其消导以转胃。胃为五脏六腑之本,胃安则脏腑俱安,与保真汤佐以厚朴同义。

【备考】其血酒直入肺经,滋补其肺,宁止其嗽。

24236 白凤膏

【方源】《顾松园医镜》卷十一。

【组成】乌嘴凤头白鸭一只

【用法】令饿透，将二地、二冬、青蒿、鳖甲、骨皮、女贞子各四两共为末，每糯米一升，用药一两同煮，连汤水与食，令极肥，辛血，陈酒冲服；将鸭去毛，挖净肚杂，如常用甜白酒加盐煮烂，空心食之更妙，食完再照上法用之；若作丸服，仍用前药一料为细末，入鸭腹中，麻线扎定，以清白人溺煮烂，去骨，捣为丸服。

【功用】滋阴除热，化痰止咳。

【主治】虚劳，内热骨蒸，咳嗽痰白。

【宜忌】虚劳之人，所宜常食。

24237 白丑散

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】白丑钱半(半生半炒) 桑皮(蜜炙) 甘草(炙) 陈皮各一钱 白术(土炒) 木通各二钱

【用法】水煎，频频服。

【主治】囊肿便秘，及四肢俱肿。

24238 白玉丸

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】巴豆三十个(去油) 南星 半夏 滑石 轻粉各三钱

【用法】上为末，皂荚仁浸浓汁为丸，如梧桐子大。每服五七丸，姜汤送下。

【主治】痰证。

24239 白玉丸

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】南星 半夏 僵蚕 白矾(生)各二钱半

【用法】上为末，杏仁七个(去皮尖)，巴豆一粒，同研匀，再用去皮生姜汁为丸，如粟米大。每服一二十丸，姜汤送下，不拘时候。

【功用】利膈下痰涎。

【主治】心胸噎塞不止，并咳嗽多痰。

24240 白玉丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】法半夏十五两 南星(炙)十五两

滑石五十两 轻粉五两 寒食五十两 甘草二十五两 巴豆霜二两五钱

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸，如绿豆大。每服五丸，温开水化下；三岁以下小儿酌减。

【功用】消食化积。

【主治】小儿停乳停食，咳嗽痰盛，呕吐腹痛，肚大胀满。

24241 白玉丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沙市方)。

【组成】法半夏 浮海石 川贝母各四两 制南星一两

【用法】上为细末，用生姜八钱，煎汤去滓，以汤汁泛为丸。三月内小儿服一分，三月至六月服二分，六月服二分，六月至一岁服三分，一岁以上服四分，用淡米汤送下，一日二次。

【主治】小儿风热，咳嗽痰多，喘促。

【宜忌】体弱无痰者忌服。

24242 白玉丸

【方源】《全国中药成药处方集》(大同方)

【组成】南星 白附子 茯苓 天麻 僵蚕 白芷 竺黄各一两 半夏 石膏各四两

【用法】水泛为丸，如米粒大。每服五丸，开水化下。

【主治】咳嗽痰喘。

24243 白玉丹

【方源】《三因》卷十五。

【组成】凝水石不拘多少(煨红，研细，水飞，再入煨锅中煨)

【用法】糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，陈米饮送下。只一眼愈。

【主治】久年肠痔下血，服百药不效者。

24244 白玉丹

【方源】《普济方》卷三六七。

【组成】天南星(生)一两 半夏(生)一两 白僵蚕一两(炒) 桂心一两 石菖蒲一两(一寸长九节，以上捣罗为末) 膩粉一分 龙脑一分(并细研)

【用法】上拌匀，取生姜汁为丸，如黍米大。每服十丸，煎人参汤送下。

【主治】小儿中风涎潮。

24245 白玉丹

《幼科发挥》卷三。为原书同卷“一粒丹”之异名。见该条。

24246 白玉丹

【方源】《保命歌括》卷二十一。

【组成】滑石二两 枯矾一两

【用法】上为细末，水煮，面糊为丸，如皂子大。每服一丸，米饮送下。

【功用】止泄。

24247 白玉丹

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】天花粉一斤（用清水浸洗，刮去粗皮，切片，晒干，磨细末，筛过极细末，将绢袋盛，用清水中洗，出浆出滓，澄清洗水，如此五七遍，去苦，晒干，取十二两）河南真绿豆粉（水漂三五次，晒干）四两 苏州薄荷叶一斤（入瓶内，层层间隔，封瓶口，入锅内，隔水煮三炷香为度，取起冷定，开瓶筛去叶，留粉听配）白檀香 白石英 白珊瑚各五钱 白豆蔻 玄明粉各一两 白石膏二两（煨） 柿霜三两 白粉霜八两

【用法】上为细末，和前粉一处入瓶。每次取二匙，噙化。

【功用】消痰止咳，开胃滋阴，降火醒酒，清心明目，解渴。

【主治】久痰嗽。

24248 白玉汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】白玉一两半 白术五两 泽泻 茯苓各二两 当归五两

【用法】上㕮咀。先以水一斗，煎玉五十沸，去玉纳药，煎取二升，分二次服，相去一炊顷。

【主治】妇人阴阳过度，玉门疼痛，小便不通。

【方论选录】《千金方衍义》：玉能灭癥，亦

能止痛，但取以通气化；兼用白术以温肉理，当归以和血脉，茯苓以滋精髓，泽泻佐白玉以通气化，皆交接过伤之专法。

24249 白玉顶

《串雅补》卷一。为原书同卷“朱砂顶”之异名。见该条。

24250 白玉饼

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】白附子 南星 滑石 轻粉各一钱 巴霜十九粒

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大，捏作饼。每服三岁一丸，五岁二丸，葱汤化下。

【主治】小儿腹中有癖，但饮乳嗽而生痰，及急慢惊风，痢症，潮搐壮热，痰涎壅盛。

24251 白玉散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】白土二钱五分 寒水石五钱

【用法】上为末。用米醋或新水调涂。

【主治】①《小儿药证直诀》：热毒气客于腠理，搏于血气，发于外皮，上赤如丹。②《永乐大典》引《婴童妙诀》：赤游丹肿。

【备考】方中白土，《小儿药证直诀》注：“又云滑石”；《永乐大典》作“白玉”。

24252 白玉散

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】黑牵牛 甘遂各等分（二次用）

【用法】上药先将水半碗，入锅煮一沸，五更时煎服。

【主治】酒疸，食黄。

24253 白玉散

【方源】《本草纲目》卷四十六引孙氏方。

【组成】壁上陈白螺蛳（烧，研）

【用法】每服一钱，酒下。

【主治】膈气疼痛。

24254 白玉散

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】寒水石（煨存性，水飞）一两 朴消一两 青黛三钱 甘草三钱 姜黄 当归各一两 柏末三钱

【用法】上为末。芭蕉根汁加蜜调，以鹅翎

扫上，干则再敷。

【主治】赤游丹毒。

24255 白玉散

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】辰砂一钱 桂府滑石（水飞过）六两 甘草一两 石膏少许

【用法】上为细末。每服二三钱，清水调下。

【功用】除胃热。

【主治】暑月小便不利而有胃热者。

【宜忌】老人、虚人及病后伤津而小便不利者，不宜用。

24256 白玉散

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】白矾一两 巴豆仁二十一粒

【用法】先将矾入铤，慢火焙化，随入巴豆仁于内，候干，去巴豆，用矾为末。每用少许，吹入喉中。

【主治】急喉痹、缠喉风，牙关紧闭，不省人事。

24257 白玉散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】樟脑二两 轻粉一两 石膏（煨）六两 红粉五钱 冰片一钱

【用法】上为细末，过罗。敷患处。

【功用】消肿解毒，化腐生肌。

【主治】诸般疮疡，溃后流脓流水，肿痛刺痒。

24258 白玉錠

【方源】《眼科秘书》卷下。

【组成】炉甘石（装入银锅，上盖瓦片，火煨起金花，钳出，浸入童便内，片时去童便，又以黄连煎汁，将石飞一二次，至次日去连水，纸封晒干，再用群药取汁入内）一两 白当归 川芎 蔓荆子 草决明 密蒙花 柴胡 羌活 防风 薄荷 白芷 南苍术 枯芩 木贼 尖核柞 蝉蜕 芥穗 甘草 白菊花各五分（煎汁，澄一夜，入甘石内，搅数十次，纸糊碗口晒干，为丹头）

【用法】用制过甘石七钱，加生硼砂三钱，

冰片七分，真麝香二分，共研细，炼蜜为錠，粘成条，官粉为衣，装入鹅翎内封固。如时行热眼，或暴发赤肿疼痛，隐涩羞明等症，取药条麦粒大一块，入手内，用骨簪蘸冷水和匀，不稀不稠，点入眼角内，每晚点二三次即愈；如小儿一岁至七岁患眼症，取药一条，入酒钟内，加水少许，新羊毛笔蘸药汁，洗眼内外，一日夜数次，洗完避风；兼治牙疼，取药半条，手心内和开，抹牙上；耳底流脓出血，取药半条，入酒钟内，加清水些须，泡开，灌耳内；蝎蜇、蛇咬、蜂叮、口疮，俱抹患处。

【主治】时行热眼，或暴发赤肿疼痛、隐涩羞明；兼治牙疼，耳底流脓出血，蝎蜇、蛇咬、蜂叮、口疮。

【备考】炼蜜法：用新竹截筒，将白蜜装入内，湿豆腐皮封口，再加盐面封固，布裹，麻绳扎紧，煮一昼夜，取出调药。

24259 白玉膏

【方源】《三因》卷十四。

【异名】收晕白玉膏（《传信适用方》卷三）。

【组成】杏仁二十一粒（去皮尖，别研） 川椒四十九粒（去目，出汗，为末） 清油一两 酒蜡半两

【用法】文武火熬，用柳青枝打紫黑色，绵滤过，再熬，滴水成珠，收净器内。看疮大小，作新月样纸花团贴，候晕收，更促小疮头聚，用核连散敷。

【功用】收缩痈疽，令不蔓延。

【主治】痈疽疮疡。

【宜忌】①《三因》：切忌用冷药外贴，逼毒气入里杀人。②《普济方》：凡贴大恶疮，毒气方盛，不可以药当上贴，恐逼散毒气，疮益大。

24260 白玉膏

【方源】《医方类聚》卷一七七引《新效方》。

【组成】乳香末 芸香末各一钱 铅粉二

钱 蓖麻子一两(去壳,研如泥)

【用法】上以蓖麻泥和三味末,安石上,捶打成膏,干湿得所。摊厚纸上,贴之。

【功用】排脓止痛。

【主治】溃疡。

24261 白玉膏

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】冰片七分 轻粉一钱 乳香 没药各九分 雄黄二分 阿魏一钱 龙骨五分(煨) 孩儿茶(烘,去油)一钱 黄占一两半 白占五钱 香油一盏,烛油一钱半 珍珠五分(煨过,入水去火毒) 水粉三两(飞过,瓦上微炒,焙干,不可使黄)

【用法】先将油、蜡二味煎,滴水不散,次下各药搅匀,略住火,方下冰片。

【主治】一切下疳疮、疔疮。

【加减】入血竭一钱,名红润膏。

24262 白玉膏

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】炉甘石一两(火煨) 白占五钱 象牙末三钱 轻粉五钱(将草纸转注火上烧)

【用法】雄猪板油七钱,捶千余下,和同一处,将罐盛之。临用以油纸作膏,贴在患处。

【主治】疔疮。

24263 白玉膏

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】樟脑四两

【用法】腊月腊日,用鲜猪肥肉板油不下水、不入盐,入锅内熬,去滓,用瓷器收贮,每油一斤化开,入白蜡半斤化匀,又下樟脑四两,搅匀,瓷器收藏,勿令出气。先用花椒、葱白、甘草煎烧猪蹄浓汤,洗去恶肉,用无灰棉纸作膏,贴之。

【主治】诸般疔毒、恶疮、疔疮、湿毒不收斂者,及烫火伤。

24264 白玉膏

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】乳香 没药各五钱 轻粉四钱

密陀僧二两 象皮五钱 铅粉二钱 黄蜡二两 白蜡五钱

【用法】以上除蜡,俱为极细末,先用真桐油一斤,放锅内火上滚透,去沫油清,先入密陀僧末,搅匀,取起,入二蜡熔尽,搅匀,待油稍温,方入细药,搅三百余遍,以大绵纸摊上,阴干。随疮大小圆长剪贴。初贴时,疮中毒水流出,膏药变黑,方换新者贴之。

【主治】久远疔疮。

24265 白玉膏

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】铅粉一两 轻粉三钱 白蜡 黄蜡各一钱五分 朝脑三分(冰脑更妙)

【用法】猪脂调于油纸上。贴之。

【主治】疔疮及脚腿上一切疮。

【加减】加红粉霜,更易收口。

24266 白玉膏

【方源】《痘疹一贯》卷六。

【组成】土贝母一两 大麻子肉五钱 江子仁五钱

【用法】槐、柳、桃、桑一寸长,每样七根,先将脂麻油一斤,入铁锅内熬;活鲫鱼一尾,重一斤,或二尾亦可,鱼去肠,入油内煎枯,取出;随入前药与各枝,熬枯去滓,复熬,入炒过铅粉一斤,搅匀,滴水不散,离火,加去油乳香、没药各五钱,研细末,入锅内搅匀,收用。

【主治】一切肿毒恶疮,初起或破烂者。

24267 白玉膏

【方源】《奇方类编》卷下。

【异名】秘传白玉膏(《仙拈集》卷四)。

【组成】白芷 甘松 炉甘石(煨) 乳香(去油) 山奈 归尾 樟脑 五灵脂 细辛各五钱 没药(去油) 象皮 白蜡各三钱 松香 冰片 麝香各一钱 铅粉十三两

【用法】先将麻油二斤,熬至烟起,离火,入白蜡、松香,又熬,不住手搅,看有大泡,入铅粉,陆续下,滚即取起,稍停,入火,如此数次,见有菊花纹小泡,便入前诸药,滚

仍取起，至滴水成珠，入冰、麝，搅匀，待凝定，倾水二三盏，入罐收贮。

【主治】一切疮、疖疮。

24268 白玉膏

【方源】《疡医大全》卷九。

【组成】乳香 没药(去油)各一钱 铅粉三钱 轻粉 儿茶各一钱五分

【用法】雄猪油半斤，入锅内熬，去滓，复入锅内熬滚，投白蜡、黄蜡各二钱化尽，再入上数药，搅匀。摊贴。

【主治】痂疽。

24269 白玉膏

【方源】《疡医大全》卷二十五。

【组成】轻粉三钱 冰片二钱 潮脑六钱 白蜡二两 猪板油四两

【用法】将蜡、油熔化，滤清，入潮脑研匀，冷定，加轻粉、冰片和匀。搥脚挑涂，油纸盖上。

【主治】多年顽癣，兼治大毒、刀疮久不收口。

24270 白玉膏

【方源】《丸散膏丹集成》引《疡医大全》。

【组成】活鲫鱼六两 白芷 穿山甲 木鳖子 象贝母 当归各一两五钱

【用法】用麻油二斤四两，煎枯，去滓滤清后，再熬，滴水成珠，候冷，加铅粉十二两，收嫩膏后，入白占二两，搥盆三钱，乳香一两，没药一两，研细末，一同收入。贴之。

【功用】拔毒，提脓，生肌，收口。

【主治】一切疮疡、热疔。

【宜忌】阴疽忌用。

24271 白玉膏

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】炉甘石一两(净，三黄制) 白占五钱(净) 水粉三钱 冰片一分

【用法】上为细末，用搥净板油一块，同研成膏。隔纸贴之。

【主治】脓疮远年不愈。

24272 白玉膏

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】乳香 血竭 没药 儿茶 轻粉 白蜡 定粉各五钱

【用法】上为极细末，先用猪油熬去滓，取净油四两，和匀药末，捣千余下，再入人乳，再捣和。涂患处。

【功用】收口。

【主治】口喉诸症溃烂者。

24273 白玉膏

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】鲫鱼大者二条 铅粉一斤 轻粉五钱 象皮(烘，研)一两 真珠(研)三钱

【用法】用麻油一斤，入鲫鱼，煎至枯，滤去骨，再煎一二十沸，离火少顷；然后下铅粉、轻粉、象皮末、珍珠末，搅匀成膏。

【功用】收湿生肌长肉。

【主治】湿毒疮，白泡脓疮，烫伤。

24274 白玉膏

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】大鲫鱼一尾 密陀僧(另研，收入) 江子肉 大黄 白蔹 黄柏 甘草节各二两

【用法】用麻油一斤四两，煎枯去滓，熬至滴水不散，待温下炒透铅粉十二两收之。

【主治】疮毒。

24275 白玉膏

【方源】《串雅补》卷五。

【组成】铅粉二两 铜绿一钱 甘石一两 板油一两

【主治】寒湿疮。

24276 白玉膏

【方源】《集验良方》卷一。

【组成】制乳香九钱 制没药九钱 儿茶九钱 血竭九钱 铜青一两 松香一两五钱(葱、姜水制) 黄蜡一两五钱 白蜡一两 铅粉十二两 甘草一两(煎水) 雄猪油一斤

【用法】先将生甘草煎水，熬猪油去滓，再入末药，和匀后，用铅粉收膏，陈久。摊贴。

【主治】陈年烂腿臃疮。

24277 白玉膏

【方源】《理渝》。

【组成】炉甘石 猪油

【用法】同捣。贴患处。

【主治】臃疮。

24278 白玉膏

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】铅粉四钱 轻粉二钱 冰片二分
制油(冬熟猪油煨烱、滤清,每油七两,配白蜡三钱)二钱五分

【用法】搽匀作膏。贴之。

【主治】一切破伤。

24279 白玉膏

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】鲜槐枝 柳枝 桃枝 桑枝各八尺 土贝 白芷各四两 巴豆 蓖麻子各八两 蛇蜕四条 蜂房二个 活大鲫鱼一尾 活大虾蟆二只

【用法】麻油十斤浸药,煎枯,铅粉收膏,再加龙骨粉二十两、白蜡八两、扫盆四两,搅匀。

【功用】生肌,软坚,去瘀生新。

【主治】腿足疮恙,妇人裙臃腐烂日久。

24280 白玉膏

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】白龙骨 煨石膏 制甘石 铅粉各等分

【用法】猪油成膏。

【主治】臃疮。

24281 白玉膏

【方源】《丸散膏丹集成》。

【组成】木鳖子二两 蓖麻子肉二两 巴豆一两 白芷二两 乳香(制)五钱 丹皮一两 金银花二两 天花粉三两 白蜡五钱 没药(制)五钱 赤芍一两 大黄一两 象贝母二两 鲜凤仙花根叶三斤 轻粉三钱 铅粉七斤半 鲜鲫鱼八两 鲜大力子根叶三斤 麻油十五斤

【用法】除铅粉、轻粉、没药、乳香均为细

末外,将余药浸入麻油内三五日,随后煎熬至药枯,滤清俟冷,再加药粉,用文火徐徐搅匀,至滴水成珠为度。摊纸上,敷贴患处。

【主治】毒疮腐烂,久不收口。

【宜忌】不可入口。

24282 白玉膏

【方源】《中药成方配本》。

【组成】巴豆十二两 蓖麻子十二两 人发二钱 虾蟆五个 活鲫鱼十尾(约三十二两) 麻油三斤

【用法】上药先将巴豆、蓖麻子二味打碎,入麻油内浸三宿,再入虾蟆浸一宿,临熬时入活鲫鱼、人发共同煎枯,去滓滤清,文火煎至滴水不化,离火候至微温,方入铅粉二斤八两,制乳香末五钱,陆续下锅,徐徐搅匀成膏,约四斤十两。贴患处。

【功用】祛腐生新。

【主治】臃疮久溃不敛。

24283 白玉膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】官粉二钱 轻粉二钱 樟脑二钱 乳香一钱 白蜡一两 冰片五分

【用法】上为细末,过罗,用猪脂油八两,熬化,和药搅匀成膏。敷患处。

【功用】解毒消肿。

【主治】疮疡结毒溃烂、顽疮、臃疮,久不收口。

24284 白玉霜

【方源】《医钞类编》卷二十一。

【组成】白玉霜(镑末,炭火煨红)一两 真蟾酥八两

【用法】上冰片二钱,于大田螺内,俟其水自出,和调白玉霜、蟾酥,用面糊作饼;或四五月间,童便浸汁久,玉自出霜者佳。敷之;或作丸服亦可。

【功用】排脓,长肌肉。

【主治】妇人乳痈,及一切菌毒、痈疽。

24285 白玉露

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【异名】白玉霜药酒。

【组成】当归一两 肉桂八钱 广皮一两 陵零香五钱 排草五钱 木香二钱 公丁香二钱 佛手六钱 白酒三十斤 冰糖五斤

【用法】将当归、肉桂、广皮、陵零香、排草、木香、公丁香、佛手八味置于布袋中，浸白酒内，文火煮之，约一小时后，再加入冰糖即成。每于饭前饭后服一、二杯。

【功用】开胃顺气祛寒，助消化，进饮食，悦容颜。

【主治】中气虚损，寒郁气滞，元阳亏耗，身体衰弱，胃脾膨满。

【宜忌】孕妇忌服。

24286 白末子

【方源】《准绳·疡科》卷六。

【组成】白芷 南星(制) 白术 何首乌 桔梗 羌活 独活 白芍药 白杨皮 川芎 白茯苓 白薇 当归 薏苡仁(炒) 骨碎补 牛膝 续断 川乌(炮) 细辛 肉桂 枫香 乳香 没药各一两

【用法】上为末。酒调下。

【主治】打扑损伤，折骨碎筋，瘀血肿痛，瘫痪顽痹，四肢痠疼，一切痛风。

【加减】欲好之际，加自然铜一两，只折骨者便可用之。

24287 白末药

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】桔梗 白芷 甘草(炙)各十两 川芎(泡七次) 山桂 细辛各半斤 川乌(炮) 续断(米泔浸) 当归 牛膝(酒浸一宿) 香附子(炒)各六两 花椒(去合口者，炒)五两 赤芍药(酒浸)九两 泽兰叶(去叉)九两 白杨皮十二两(米泔浸一宿)

【用法】上为细末。每服二钱，酒调下。病在上，食后服；病在下，空心服；遍身损伤，临卧服。

【主治】打破伤损，皮肉碎破，筋骨寸断，瘀血壅滞，结肿不散，及妇人产后诸血症。

24288 白术丸

【方源】《外台》卷八引《延年秘录》。

【组成】白术五分 白芷三分 干姜 石斛各六分 五味子 细辛 橘皮 厚朴(炙) 桂心 防风 茯苓 甘草各四分(一方有人参五分)

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，饮送下，一日二次。加至二十丸。

【主治】风痰积聚，胃中冷气，每发动令人呕，吐食或吐清水，饮食减少，不作肌肤。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、生葱、海藻、菘菜、生菜、酢物。

24289 白术丸

【方源】《外台》卷八引《延年秘录》。

【组成】白术 干姜 人参 厚朴(炙) 桂心各六分 细辛 茯苓 当归 茯神 枳实(炙) 五味子 附子各六分(炮) 吴茱萸六分 远志五分(去心) 旋覆花四分 泽泻五分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，一日二次。加至三十五丸。

【主治】恶心，数吐水不多，能食，少心力者。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、大酢、生菜、生葱、猪肉、冷水。

24290 白术丸

【方源】《外台》卷十二引《延年秘录》。

【组成】白术六分 厚朴二分(炙) 人参五分 白芷三分 橘皮四分 防风五分 吴茱萸四分 芎藭四分 薯蓣四分 茯神五分 桂心四分 大麦蘗四分(熬) 干姜四分 防葵四分(炙) 甘草五分(炙)

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，酒送下，一日两次。加至二十丸。

【主治】宿冷癖气，因服热药发热，心惊虚悸，下冷上热，不能食饮，频头风旋，喜呕

吐。

【宜忌】《鸡峰》：忌桃、李、雀肉、海藻、菘菜、醋物、生葱。

24291 白术丸

【方源】《外台》卷十二引《延年秘录》。

【异名】大白术丸（《鸡峰》卷九）。

【组成】白术六分 黄耆六分 牡蛎四分（熬） 人参六分 茯苓六分 乌头六分（炮） 干姜六分 芍药四分 当归六分 细辛四分 麦冬四分（去心） 桂心五分 前胡四分 甘草六分（炙） 防葵三分 鳖甲四分（炙） 紫菀三分（炙） 槟榔六分 桔梗三分

【用法】上药治下痢，炼蜜为丸。每服二十丸，空肚酒送下，一日二次。加至三十丸。

【主治】积聚癖气，不能食，心胁下满，四肢骨节痠疼，盗汗不绝。

【宜忌】①《外台》引《延年秘录》：忌菹菜、桃、李、大醋、猪肉、生葱。②《鸡峰》：忌雀肉、海藻、菘菜。

24292 白术丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白术一两 吴茱萸三分（汤浸七遍，焙干，微炒） 诃黎勒一两（煨，去皮） 附子一两（炮裂，去皮脐） 人参半两（去芦头） 桔梗半两（去芦头） 桂心三分 干姜半两（炮裂，锉） 细辛半两 茱萸一两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】脾胃气虚冷，水谷不化，腹膨胀满，或时寒极，四肢逆冷。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面。

24293 白术丸

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】神曲白术丸（《鸡峰》卷十二）。

【组成】白术二两 神曲一两（微炒令黄） 人参一两（去芦头） 干姜一分（炮裂，锉） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓢，焙） 茱萸一两

茱萸一两

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱，不能饮食，肌肤瘦瘠，面色萎黄。

24294 白术丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白术三两（生姜二两同捣令烂，慢火炒令黄色） 桂心半两 槟榔一两 高良姜一两（锉） 木香半两 人参一两（去芦头） 阿魏一分（面裹煨，令面熟为度） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为末，煎醋浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以生姜、橘皮汤嚼下。

【主治】脾脏冷气，壅滞胀闷，腹内鸣转，不思饮食。

24295 白术丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白术一两 槟榔三分 诃黎勒三分（煨，用皮） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 木香半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 白芷半两 肉豆蔻三分（去壳） 桂心三分 丁香半两 当归一两（锉，微炒） 干姜半两（炮裂，锉） 缩砂三分（去皮） 黄耆一两（锉） 人参半两（去芦头） 白茯苓一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】脾胃气久虚，不思饮食，肌体羸瘦少力，腹肋疼痛，面色萎黄。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面。

24296 白术丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】白术一两 赤茯苓一两 附子三分（炮裂，去皮脐） 桂心一两 紫菀三分（洗去根土） 诃黎勒皮一两 前胡一两（去芦头） 桔梗三分（去芦头） 人参一两

(去芦头) 陈橘皮三分(汤浸, 去白瓢, 焙) 槟榔半两 半夏一两(汤洗七遍去滑, 炒令微黄)

【用法】上为末, 以生姜汁煮面糊为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食前以枳壳汤送下。

【主治】肾脏虚损, 心膈痰癖, 壅滞多唾, 腹肋妨闷。

24297 白术丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】白术一两 人参一两(去芦头) 细辛半两 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 桂心三分 防风半两(去芦头) 诃黎勒皮三分 五味子半两 干姜半两(炮裂, 锉) 半夏半两(汤洗七遍去滑) 白茯苓一两 甘草半两(炙微赤, 锉) 旋覆花半两 厚朴一两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 以生姜汤送下, 不拘时候。

【主治】风痰积聚, 胃中冷气, 令人呕吐, 不纳饮食, 四肢无力。

24298 白术丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】白术一两 防葵一两 木香一两 鳖甲一两(涂醋炙微黄焦, 去裙襕) 桃仁一两(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 附子一两(炮裂, 去皮脐) 神曲一两(炒微黄) 槟榔一两 诃黎勒一两(煨, 用皮)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心及晚食前以生姜汤送下。

【主治】虚劳, 癯瘦, 不能下食, 日渐羸瘦。

【宜忌】忌苋菜、生冷。

24299 白术丸

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】白术一两 当归三分 人参三分(去芦头) 桂心一两 附子一两(炮裂, 去皮脐) 木香三分 吴茱萸半两(汤浸七遍, 焙干, 微炒) 桔梗一两(去芦头) 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 诃黎勒一两

(煨, 用皮) 石斛一两(去根, 锉) 黄耆一两(锉)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食前以生姜汤送下。

【主治】虚劳冷气, 心腹痞满, 不思饮食, 四肢少力, 疼痛。

24300 白术丸

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】白术一两 五味子一两 陈橘皮半两(汤浸, 去白瓢, 焙) 人参一两(去芦头) 桂心一两 白茯苓一两 沉香一两 厚朴二两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 紫苏子一两(微炒) 草豆蔻一两(去皮) 枳实半两(麸炒微黄)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 于食前以生姜汤送下。

【主治】上气, 胃中不和, 呕吐, 不能下食, 虚弱无力。

24301 白术丸

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】白术二两 人参一两(去芦头) 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 桔梗三分(去芦头) 杏仁一两半(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 细辛三分 贝母三分(煨微黄) 干姜半两(炮裂, 锉) 半夏半两(汤浸七遍去滑) 甘草三分(炙微赤, 锉) 桂心三分 诃黎勒皮二两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 以生姜、大枣汤送下, 不拘时候。

【主治】肺虚寒, 胸中痞塞, 短气不足, 少思饮食。

24302 白术丸

【方源】方出《圣惠》卷四十七, 名见《普济方》卷二〇一。

【组成】白术一两 人参一两(去芦头) 白茯苓一两 甘草半两(炙微赤, 锉) 厚朴一两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。

每服三十丸，以粥饮送下，一日四五次。

【主治】霍乱后，腹中冷气下痢。

24303 白术丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】白术一两 黄耆一两(锉) 牡蛎一两(烧为粉) 人参一两(去芦头) 赤茯苓一两 川乌头一两(炮裂，去皮脐) 干姜半两(炮裂，锉) 木香一两 当归一两(锉，微炒) 赤芍药三分 桂心一两 甘草半两(炙微赤，锉) 防葵半两 鳖甲一两(涂醋炙令黄，去裙襖) 紫菀半两(去苗) 槟榔一两 桔梗半两(去芦头) 枳壳一两(麸炒微黄，去瓢)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，于食前以温酒送下。

【主治】①《圣惠》：积聚，宿食不消，腹胁下妨闷，四肢羸瘦，骨节痠疼，多有盗汗。

②《普济方》：血虚。

24304 白术丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】白术一两 干姜半两(炮裂，锉) 青橘皮一两(汤浸，去白瓢，焙) 当归半两(锉碎，微炒) 芎藭半两 木香半两 山姜子三分 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 桂心一两 附子一两(炮裂，去皮脐) 草豆蔻一两(去皮)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】寒疝，心腹痛，四肢不和，面色青冷，不欲饮食，气渐羸弱。

24305 白术丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】白术三分 黄耆一两(锉) 牡蛎三分(烧为粉) 人参三分(去芦头) 赤茯苓一两 川乌头二分(炮裂，去皮脐) 干姜半两(炮裂，锉) 赤芍药三分 当归三分(锉，微炒) 诃黎勒皮三分 细辛半两 桂心半两 前胡半两(去芦头) 甘草半两(炙微赤，锉) 防葵半两 鳖甲一两(涂醋

炙令黄，去裙襖) 紫菀三分(去苗土) 槟榔一两 桔梗半两(去芦头)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】痲痹气，不能食，心胁下满，四肢骨节痠痛。

24306 白术丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】白术三分 蓬莪术三分 乌药半两 木瓜半两 桂心半两 礞砂一两半(细研) 生姜屑半两 益智子三分(去皮) 木香半两 茺萸半两 神曲一两(捣罗为末，并礞砂用酒煎成膏)

【用法】上为末，用礞砂曲膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】痲痹，气攻心胁，痛不欲食，四肢羸瘦。

24307 白术丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】白术三分 川大黄二两(锉碎，微炒) 枳壳三分(麸炒微黄，去瓢) 厚朴三分(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 鳖甲二两(涂醋炙令黄，去裙襖) 当归半两(锉，微炒) 附子半两(炮裂，去皮脐) 干姜半两(炮裂，锉) 防葵三分 食茺萸半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】食不消，结成痲痹。

24308 白术丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】白术一两 甘草半两(炙微赤，锉) 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 诃黎勒一两(煨，用皮) 陈橘皮一两(汤浸，去白瓢，焙) 桂心三分 芎藭一两 大麦蘖一两(炒微黄) 干姜三分(炮裂，锉) 人参三分(去芦头)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，生姜、枣汤送下，一日三四次。

【主治】寒癖气，腹胀，不思饮食，四肢少力。

24309 白术丸

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】白术四两 桂心二两 干姜三分（炮裂，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】酒癖，食不消化。

24310 白术丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】白术一两 干姜半两（炮裂，锉）人参一两（去芦头）厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）桂心一两 细辛一两 赤茯苓一两 当归一两（锉，微炒）枳壳一两（麸炒微黄，去瓢）五味子一两 附子一两（炮裂，去皮脐）吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）旋覆花半两 泽泻一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】膈气，痰结脾冷，不能下食，胸中刺痛。

24311 白术丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】白术三分 赤石脂三分 犀角屑三分 干姜半两（炮裂，锉）厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）龙骨三分 黄连一两（去须）乌梅肉三分（微炒）当归三分（锉，微炒）甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，于食前以粥饮送下。

【主治】赤白痢，及水谷冷热气痢。

【备考】方中甘草原缺，据《普济方》补。

24312 白术丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】白术三分 枳壳半两（麸炒微黄，

去瓢）黄连半两（去须，微炒）当归三分（锉，微炒）芫荽仁一两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下。

【主治】气痢，心腹疼痛。

24313 白术丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【异名】当归白术丸（《鸡峰》卷十四）。

【组成】白术二两 神曲一两（炒令微黄）肉豆蔻一两（去壳）干姜一两（炮裂，锉）当归一两（锉，微炒）人参一两（去芦头）桂心半两 木香半两 附子二两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煮枣粥饮送下。

【主治】痢后四肢羸弱，不能饮食。

24314 白术丸

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】白术三两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙）人参一两（去芦头）甘草半两（炙微赤，锉）熟干地黄二两 当归一两（锉，微炒）黄耆一两（锉）干姜半两（炮裂，锉）厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，于食前以粥饮送下。

【主治】久积虚冷，肠风痔瘻，下血太多，面色萎黄，日渐羸瘦。

24315 白术丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【异名】桂心白术丸（《鸡峰》卷十五）。

【组成】白术一两 木香半两 诃黎勒皮半两 当归半两（锉碎，微炒）桂心半两 芎藭半两 青橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙）附子一两（炮裂，去皮脐）干姜半两（炮裂，锉）蓬莪术半两 人参半两（去芦头）厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以生姜、大枣汤送下，不拘时候。

【主治】妇人脾胃气虚弱，腹中冷痛，时复呕吐，不能下食，四肢少力。

24316 白术丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】白术一两 赤芍药一两 当归一两(锉，微炒) 黄连一两(去须，微炒) 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 黄芩一两 肉豆蔻一两(去壳) 干姜一两(炮裂，锉)

【用法】上为末，以枣瓤和捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以艾叶煮粥饮送下，不拘时候。

【主治】产后赤白痢，腹痛，不思饮食。

24317 白术丸

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】白术 白芍药 木香 当归(锉，微炒)各一分 麝香一钱(细研)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮研下，一日三次。

【主治】小儿大肠虚冷，乳食不消，大便青色。

24318 白术丸

【方源】《普济方》卷一六二引《指南方》。

【组成】麦门冬 人参 地黄 白术 泽泻 茯苓 大豆各一两 桑白皮五钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，用米饮送下。

【主治】喘嗽时血。

24319 白术丸

【方源】《普济方》卷一八八引《指南方》。

【组成】白术十两 干姜 黄耆 人参 伏龙肝各三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】伤胃吐血。

24320 白术丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】白术 牛膝(去苗，酒浸，切，焙) 巴戟天(去心) 菟丝子(酒浸，别捣) 各一两半 熟干地黄(焙) 三两 桂(去粗皮) 一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、晚食前温酒送下。加至三十丸。

【主治】风虚，脚弱无力，肌瘦不能食。

24321 白术丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】白术 人参 赤茯苓(去黑皮) 各一两半 甘草(炙) 半两 厚朴(去粗皮，生姜汁炙) 一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，一日四五次，不拘时候。

【主治】胃风腹胀，飧泄下痢。

24322 白术丸

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】白术 丹砂(研) 麝香(研) 丁香 诃黎勒皮 安息香(入胡桃仁，研) 檀香(锉) 华芩 犀角(镑) 各半两 薰陆香 苏合香 龙脑(研) 各一分 莎草根 石膏 木香各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。腊月合，以新瓷器盛，勿令泄气。每服十丸，老人、小儿每服三丸，空腹并花水送下。仍用砂绢袋盛，带于臂。

【主治】瘵症。

24323 白术丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】白术 诃黎勒(去核) 厚朴(去粗皮，生姜汁炙，焙干) 山芋 丁香 木香 甘草(炙) 白茯苓(去黑皮) 青橘皮(汤浸，去白，焙) 各一两

【用法】上为末，煮大枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，煎粟米、姜、枣汤送下，食前、早晚各一次。

【功用】止喘闷，定呕逆，进饮食，除腹肋

胀痛。

【主治】脾虚。

24324 白术丸

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】白术(锉) 厚朴(去粗皮, 生姜汁炙, 锉) 苍术(去粗皮, 炒) 各半斤 芫荽四两 青橘皮(去白, 焙) 附子(炮裂, 去皮脐) 各三两 甘草(炙, 锉) 干姜(炮裂) 各二两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如鸡头子大。每服一九, 空心米饮嚼下。

【主治】脾胃不和, 不能饮食。

24325 白术丸

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】白术 槟榔(锉) 姜黄(炒) 沉香(锉) 京三棱(煨, 锉) 各一分 大腹(锉) 一两半 莎草根(去毛) 丁香皮各三分 木香 丁香 桂(去粗皮) 各半两

【用法】上为细末, 酒浸炊饼为丸, 如梧桐子大。每服二十九, 温酒送下; 嚼破, 温水送下亦可。

【主治】腹胁痛, 积滞不消, 烦满痞闷, 不思食。

24326 白术丸

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】白术 枳实(麸炒) 桂(去粗皮) 各一两半 人参二两 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 桔梗(锉, 炒) 甘草(炙) 各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十九, 温酒送下, 一日三次, 不拘时候。

【主治】息积, 肋下妨闷, 喘息气逆。

24327 白术丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】白术 蓬莪术(炮, 锉) 木瓜(切, 焙) 桂(去粗皮) 陈曲(炒, 别为末) 木香 芫荽(炒) 姜屑各半两 北亭(汤研, 滤清, 入曲末, 同煎成膏) 益

智各三分

【用法】上十味, 捣罗九味为末, 用北亭膏搜为丸, 如梧桐子大。每服二十九, 生姜、盐汤送下。

【主治】积冷痞气, 口吐清水, 面色萎黄。

24328 白术丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】白术 吴茱萸(汤浸七遍, 焙干, 炒) 各二两 桔梗(炒) 一两 当归(切, 焙) 赤茯苓(去黑皮) 各一两 干姜(炮) 二两 桂(去粗皮) 附子(炮裂, 去皮脐) 生干地黄(焙) 细辛(去苗叶) 椒(去目并闭口者, 炒出汗) 甘草(炙, 锉) 各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十九, 空心温酒送下。

【主治】久寒宿癖, 心腹刺痛, 痰逆呕吐, 饮食不消, 下利羸瘦。

24329 白术丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】白术 干姜(炮) 各三分 厚朴(去粗皮, 生姜汁炙) 一两 人参三分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三九, 空心米饮送下, 一日二次。

【功用】健脾。

【主治】脾胃受湿, 濡泻不止。

24330 白术丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】白术(锉, 炒) 一两一分 厚朴(去粗皮, 生姜汁炙) 人参 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 麦蘖(炒) 桂(去粗皮) 紫苑(去苗土) 贝母(去心) 甘草(炙) 各三分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十九, 米饮送下, 一日三次。

【功用】消食散气, 止嗽, 令能食。

【主治】虚劳, 脾胃气弱, 饮食不消, 胸膈满闷。

24331 白术丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】白术 人参各一两半 枳壳(去瓢,麸炒)一两一分 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 桂(去粗皮) 槟榔(锉)各一两 陈橘皮(汤浸,去白,焙)三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,米饮送下;若有寒,温酒送下。

【功用】消食下气。

【主治】虚劳,脾胃虚冷。

24332 白术丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】白术二两 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 人参 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 甘草(炙,锉)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸至二十丸,温酒送下,一日三次。

【主治】虚劳,脾胃虚冷,不能食,食不消化。

24333 白术丸

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】白术 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)各三两 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 干姜(炮) 黄耆(锉)各一两半 人参 甘草(炙) 当归(切,焙)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五至二十丸,空心米饮送下。

【主治】久积虚冷,肠风痔瘻,面色萎黄,日渐羸瘦,虚劣。

24334 白术丸

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】白术 厚朴(去粗皮,涂生姜汁炙烟出七遍) 当归(微炒) 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各一两 白茯苓(去黑皮) 熟干地黄(微炒)各一两半

【用法】上为末,炼蜜搜和,涂酥为剂,捣令匀熟,为丸如梧桐子大。每服二十丸,空心米饮送下,早晨、日晚各一次。

【主治】妊娠阻病,头疼,肩背烦闷,气胀,不思饮食。

24335 白术丸

《圣济总录》卷一七一。为《伤寒论》“理中丸”之异名。见该条。

24336 白术丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】白术 橘皮(洗)各一两 厚朴(去皮,姜汁涂,炙焦) 人参各半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,米饮送下。

【主治】咳嗽,嗜卧,饮食不荣肌肤,或不能食,心腹虚胀,滑泄,背脊牵急,劳倦不能动止,或因大病后,或因下利后不复常,得之于脾,四肢煎厥,亦谓之肉极。

【备考】脉弦大甚则不治。

24337 白术丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】麦门冬(去心) 人参 茯苓 白术 泽泻 生地黄(焙) 大豆卷各一两 桑白皮(炒)二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前米饮送下。

【主治】喘咳时血出,四肢懈怠,脉浮大而沉。

24338 白术丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】丁香半夏丸(《济生》卷二)。

【组成】白术三两 半夏(汤洗七遍)二两 橘皮(洗) 干姜各三两 丁香一两

【用法】上为细末,姜汁煮糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前姜汤送下。

【主治】宿寒在胃,心中温温常欲呕,闻食吐酸,其关弦,脉小而短。

24339 白术丸

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】白术 当归 芍药各等分 木香 减半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服十丸至十五丸,米饮送下,不拘时候。

【主治】小儿白泻。

24340 白术丸

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《赵氏家传》。

【组成】白术 木香 丁香 肉豆蔻 黄连各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如黄米大。每服十丸，米饮送下。

【功用】温胃消食。

【主治】小儿吐泻不止。

24341 白术丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】白术加一倍 厚朴 橘皮 藿香 甘草 白茯苓各等分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如粟米大。每服三二十丸，温米饮送下，不拘时候。

【功用】温中进食。

24342 白术丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】干姜 白术 厚朴 赤芍药 艾叶 当归 黄连 肉豆蔻各等分

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下，一日三次，不拘时候。

【主治】产后虚损，风冷，痢泻腹痛。

24343 白术丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】陈皮一两 泽泻半两 甘草 防己 葶苈 木香各一分（一方有白术、茯苓）

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】支饮，上气不得卧，身体肿满，小便不利。

24344 白术丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】白术 半夏 干姜（炮） 人参（去芦头）各二两 丁香半两 高良姜（油炒）半两 木香一两

【用法】上为细末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温米饮送下。

【主治】泄泻呕吐，脾胃不和，痰多气逆。

24345 白术丸

【方源】《普济方》卷二〇六引《卫生家宝》。

【组成】白术一两 缩砂仁二两（不见火） 干姜一两 丁香半两（不见火） 白豆蔻半两（去壳，不见火） 甘草一两（炙） 香附子一两（去毛皮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，分六丸。每服一丸，米饮、姜汤送下。

【主治】冷气呕吐，心腹疼痛。

24346 白术丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】南星 半夏（俱汤洗）各一两 白术一两半

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，生姜汤送下。

【主治】痰湿咳嗽，脉缓，面黄，肢体沉重，嗜卧不收，腹胀，食不消化。

24347 白术丸

【方源】《洁古家珍》

【组成】白术四两 泽泻二两 地榆 枳实（麸炒） 皂角子各一两（烧存性）

【用法】上为细末，烧饭为丸，如梧桐子大。米饮或白汤或温酒送下。

【主治】①《洁古家珍》：痔疾。②《普济方》：诸虫。

24348 白术丸

《洁古家珍》。即《保命集》卷下“白术散”改为丸剂。见该条。

24349 白术丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】枳实（炒黄）一两一钱 白术 半夏（汤浸） 神曲（炒黄）各一两 橘皮（去瓢）七钱 黄芩五钱 白矾（槌）三分

【用法】上为极细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆一倍大。每服五十丸，白汤送下，量所伤加减服。素食多用干姜，故加黄芩以泻之。

【主治】伤豆粉、湿面、油腻之物。

24350 白术丸

【方源】《妇人良方》卷十三。

【异名】长胎白术丸(《医学入门》卷八)。

【组成】白术 川芎 阿胶(炒) 地黄(炒令六分焦) 当归(去尾,炒)各一两 牡蛎(煨为粉)二分 川椒三分(如常制)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三四十丸,空心米饮送下;酒、醋汤亦可。

【功用】调补冲任,扶养胎气,常服益血,保护胎脏。

【主治】妊娠宿有风冷,胎萎不长,或失于将理,伤动胎气,多致损堕妊孕。

24351 白术丸

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】白术八两 半夏(汤泡七次) 赤茯苓(去皮) 干姜 肉桂(去皮) 枳壳(麸炒)各二两

【用法】上为细末,生姜自然汁煮面糊为丸,如梧桐子大。每服多至二百丸,一日三次。久服、多服而后效。

【主治】痰饮。

24352 白术丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】白术一两 芍药半两

【用法】上为末,粥为丸。泄者,炒丸服。

【主治】脾虚泄泻。

【加减】冬月不用芍药,加肉豆蔻。

24353 白术丸

【方源】《普济方》卷一一六引《经效济世方》。

【组成】草乌头五两(去皮,细切,盐少许炒) 苍术十两(米泔浸三日,去皮,切,炒)

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服五丸,加至十丸,如觉麻即减至五丸,食后茶、酒任下。

【主治】一切风疾。

24354 白术丸

【方源】《普济方》卷一四三。

【组成】白术 干姜 茯苓各二两

【用法】炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,白饮送下。以效为度。

【主治】跌阳脉沉而缓,沉则胃气强,缓则大便频,沉缓相搏,小便难,其胃为约。

24355 白术丸

【方源】《普济方》卷一九三。

【组成】羌活 白术各半两 木通 黄耆 桑白皮各三两 木香二两 黑牵牛十两(半生半炒) 陈皮三两

【用法】上为末,炼蜜为丸。生姜汤送下。

【主治】通身肿满,及病气疾。

24356 白术丸

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】白术二两(炒) 黄芩五钱 白芍药七钱 红白葵花二钱半

【用法】上为极细末,蒸饼糊为丸。每服五十丸,空心煎四物汤送下。先以小胃丹开导,后用此补之。

【主治】赤白带。

24357 白术丸

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】白术 茯苓 半夏各等分

【用法】上为粗末。每服五分或半两,水二盏,加生姜七片,煎一半,取清水调神曲末二钱服之。

【主治】咳嗽体重,嗜卧脉缓。

24358 白术丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】白术 茯苓 陈皮各二两 砂仁 神曲各一两五钱 五谷虫四两

【用法】用荷叶、老米煎水,送为丸。每服三钱,开水送下。

【主治】气虚中满。

24359 白术丸

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】白术四两(炒) 炮姜二两 肉桂二两

【用法】上为末,粥为丸。每服三钱,米饮送下。

【主治】虚痰，脉细者。

【方论选录】脾胃虚寒，不能运化，故生痰积饮，为患不已焉。白术培脾土以燥痰湿，炮姜暖胃气以除寒饮，肉桂温经暖血，祛散血分之寒湿，使无羁留之患。粥丸饮下，俾脾胃调和，则中气温暖而寒湿自散，痰饮自消。此不治痰而痰自消之一法也。

24360 白术丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】人参两半 白术三两(炒) 干姜两半(炒) 乌梅三两 白芍两半(酒炒) 炙草六钱

【用法】上为末，粥为丸。每服三钱，米饮煎，去滓温服。

【主治】产后吐泻烦渴，脉数弦细者。

【方论选录】产后脾胃两虚，寒邪袭入，不能上输下达，而吐泻并作，阴液顿亡，故烦热口渴不止焉。人参扶元，补胃气之虚；白术崇土，健脾元之弱；干姜温中散寒；炙草缓中益胃；乌梅收津液以止泄泻；白芍敛阴血除烦渴也。粥丸米饮煎，使脾健胃强，则寒自解，而清阳上奉，津液四布，安有烦渴不止，吐泻不痊乎。

24361 白术丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】白术一斤(土炒，研末) 生地半斤(饭上蒸熟)

【用法】捣和，干则少入酒为丸。每服十五丸，米饮送下，一日三次。

【主治】痔漏，脱肛，泻血，面色萎黄，积年不愈者。

24362 白术丸

【方源】《医学金针》卷三。

【组成】白术(陈土炒) 枳实(麸炒) 桂心各一两五钱 人参 陈皮 炙草 桔梗各一两(炒)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下，一日二次。

【主治】悲哀恼怒，郁伤肝气，两胁骨疼痛，

筋脉拘急，腰脚重滞。

24363 白术丸

《中国医学大辞典》。即《百一》卷六“白术散”改为丸剂。见该条。

24364 白术汤

【方源】方出《千金》卷六，名见《普济方》卷五十四。

【组成】羊肾一具(治如食法) 白术五两 生姜六两 玄参四两 泽泻二两 芍药 茯苓各三两 淡竹叶(切)二升 生地黄(切)一升

【用法】上咬咀。以水二升，煮羊肾、竹叶，取一斗，去滓澄之；下药煮取三升，分三服。不已，三日更服一剂。

【主治】肾热，面黑目白，肾气内伤，耳鸣吼闹，短气，四肢疼痛，腰背相引，小便黄赤。

24365 白术汤

【方源】《幼幼新书》卷十二引《婴童方》。

【组成】白术五两

【用法】白米泔二升，煮三沸，适寒温洗头及身。

【主治】风痼，瘰疬，身汗而头独无。

24366 白术汤

【方源】方出《圣惠》卷十二，名见《圣济总录》卷二十三。

【组成】白术一两 人参三分(去芦头) 桂心半两 干姜半两(炮裂，锉) 附子一两(炮裂，去皮脐) 甘草一分(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：伤寒四逆，内有久寒。②《圣济总录》：汗出脉微。

24367 白术汤

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】白术 半夏 当归 厚朴 生姜 屑各半两 舶上丁香皮三分

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，入生姜一块如枣大(擘破)，同煎至七分，去滓热服。清明以后至芒种以前，宜服本方。

【主治】胸膈痛，身体拘急疼痛，手足逆冷，脉沉细无力。

【加减】如三五服后，脉未有力及寸脉力尚小，加细辛半两，葱白三寸，同煎服。

【备考】方中生姜屑，《阴证略例》作“干姜”。

24368 白术汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】白术 防己各三两 附子（炮裂，去皮脐）半两 桂（去粗皮）人参各三两 甘草（炙，锉）二两半 当归（焙）芍药各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一盏半，加生姜三片，煎至一盏，入醋少许，更煎三四沸，去滓温服。当觉体中热痹；未觉，加药末并醋，如前煎服。

【主治】历节风，四肢疼痛不可忍。

【宜忌】《普济方》：忌一切发物。

24369 白术汤

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】白术 人参 草澄茄各一两 诃黎勒（煨，去核）二两 丁香 草豆蔻（去皮）黄耆 附子（炮裂，去皮脐）白茯苓 麦藁（微炒）沉香 陈橘皮（汤浸，去白，焙）木香各三分 枳实（去瓢，麸炒）甘草（炙）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜五片，大枣二个（擘破），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾痹，心腹胀满，不欲饮食，食则气滞体重，四肢无力。

24370 白术汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】白术 五味子 甘草 石膏各四两 干姜三两

【用法】上为末。每服三钱匕，水一盏，加盐一捻，煎至八分，去滓，连并热服。

【主治】伤寒三日，头疼壮热，骨节痠痛，有汗或无汗。

【加减】如伤寒挟冷腹痛，加生姜三片，大枣二个，同煎。

【备考】本方方名，《普济方》引作“立胜散”。

24371 白术汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】白术 石膏各二两 干姜（炮）半两 五味子（炒）甘草（炙，锉）人参 芎藭 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙）各一两

【用法】上为末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二个，同煎至七分，去滓稍热服。

【主治】中风伤寒，初受病一日至三日，头痛肢体疼，烦躁，恶风，身热憎寒；妊娠伤寒。

24372 白术汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】白术（锉，炒）一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙透）黄耆（细锉）人参 白茯苓（去黑皮）桔梗（锉，炒）桂（去粗皮）陈橘皮（汤浸，去白，焙）甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气出汗吐下后，四肢羸劣，呕逆减食。

24373 白术汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】白术 陈橘皮（汤浸，去白，炒）各一两 干木瓜二两

【用法】上为末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，一日二次。

【主治】伤寒后，霍乱吐利，脚转筋。

24374 白术汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】白术 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各三分 甘草（炙）一分 白豆蔻（去皮）高良姜各半两 茯神（去木）一两

【用法】上为末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜半分（拍碎），大枣二个（擘破），同煎至七分，去滓、食前温服。

【主治】伤寒愈后，胃虚不思食。

24375 白术汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】白术三两 甘草（炙） 附子（炮裂，去皮脐） 人参各一两 桂（去粗皮） 当归（切，焙） 陈橘皮（去白，焙）各二两

【用法】上锉如麻豆大。每服五钱匕。煮小麦汁一盞半，加竹叶一握，生姜半分（拍碎），煎至八分，去滓温服，一日三次。

【主治】霍乱吐利。

24376 白术汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】白术一两半 枳壳（去瓢，麸炒）一两一分

【用法】上为末。每服三钱匕，加大枣三个（擘，去核），水一盞，煎至六分，去滓，空腹温服，早晨、午时、日晡各一次。

【主治】霍乱，脾胃气攻，腹胀满不下食。

24377 白术汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】白术（锉） 木瓜（去瓢，切，焙） 人参各一两 甘草（炙） 干姜（炮）各半两

【用法】上为末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣一个（擘），同煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中恶，霍乱吐利，手足麻痹或转筋。

24378 白术汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】白术 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙三遍） 当归（切，焙） 人参 干姜（炮裂） 甘草（微炙）各二两

【用法】上为末。每服五钱匕，水一盞半，煎至七分，去滓温服，如人行五六里再服。

【主治】霍乱下利不止而渴者。

24379 白术汤

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】白术 附子（炮裂，去皮脐） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参 白茯苓（去黑皮）各二两 干姜（炮）一两

【用法】上锉如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，入荆芥一穗，煎至七分，去滓，空心温服，一日三次。

【主治】脾脏虚冷泄痢，四肢壮热。

24380 白术汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】白术（炒） 附子（炮裂，去皮脐） 陈橘皮（汤浸，去白，焙，炒）各三分 人参一两 桂（去粗皮） 芍药 枇杷叶（去毛，炙） 白茅根 芦根 枳壳（去瓢，麸炒）各半两

【用法】上锉如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃气弱，留饮停积，饮食不化，呕吐不止。

24381 白术汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】白术（锉） 甘草（炙，锉） 莎草根（炒去毛）各一两 草豆蔻五枚（大者，去皮，炒） 干姜（炮） 陈曲（炒） 麦蘖（炒）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣二个（擘破），同煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】胃气受冷，气逆奔冲，呕哕不定。

24382 白术汤

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】白术一两二钱 人参 陈橘皮（汤浸，去白，炒） 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮）各半两 吴茱萸（水浸一宿，微炒） 干姜（炮）各三分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】脾心痛如刺。

24383 白术汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】白术 赤茯苓（去黑皮） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 桔梗（去芦头，锉，炒） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 吴茱萸（汤洗，焙干，炒） 人参各一两 甘草（炙，锉）一分 细辛（去苗叶）半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣一个（去核），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】腹胀肠鸣切痛，发作有时。

24384 白术汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】白术 人参各二两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 各一两半 桂（去粗皮）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，煎至六分，去滓温服，一日二次，不拘时候。

【主治】腹胀不能食，背上冷汗出。

24385 白术汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】白术一两半 木香 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一两 芍药一两半 桑根白皮（锉） 木通（锉）各二两 牵牛子一两半（捣，取粉一两，旋入）

【用法】上药除牵牛粉外，锉如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，入牵牛粉半钱，空腹温服。

【主治】肠胃冷气，腹胀不能食。

24386 白术汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】白术 丁香 甘草（炙，锉） 陈橘皮（去白，焙） 木香各半两 大腹（锉） 枳壳（去瓢，麸炒） 诃黎勒（炮，去核）各三分 草豆蔻（去皮）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜五片，同煎至七分，去滓，空心温服。

【主治】呕吐厥逆，不思饮食。

24387 白术汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】白术一两 人参 桔梗（锉，炒） 诃黎勒（煨，取皮） 桂（去粗皮）各三钱 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 半夏（汤洗七遍，生姜汁制） 甘草（炙，锉） 五味子各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，加生姜半分（切），煎取八分，去滓温服，一日二次，不拘时候。

【主治】咳嗽，呕吐涎沫，心胸不快，饮食不下。

24388 白术汤

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】白术 柴胡（去苗） 生姜（去皮，薄切，焙干） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙香熟） 桂（去粗皮）各三两 甘草（炙，锉）一两 槟榔（锉）十枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服。微利为度。

【主治】痞气，肋肋满闷。

24389 白术汤

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】白术 赤茯苓（去黑皮） 枳壳（去瓢，麸炒）各一两半 人参 桔梗（去芦头，炒） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，加生姜半枣大（拍破），同煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】痞气，两肋胀满，不能饮食。

24390 白术汤

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】白术 木香 益智仁（去皮）各一两 京三棱（微煨熟，锉）三两 槟榔（锉）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】痞气，每发疼痛，不能饮食。

24391 白术汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】白术 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 当归(切,焙) 龙骨各一两 熟艾(炒)半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盞,加生姜二片,同煎至七分,去滓,空心,日晚温服。

【功用】《证因方论集要》:温固升清。

【主治】风冷入中,飧泄不止,日夜数行,口干腹痛,脉虚而细。

【方论选录】《古方选注》:经言,热气生清,清气在下则生飧泄,是清浊交错矣。白术健脾消谷;厚朴平胃散结,即《伤寒论》下焦利从胃主治之义;龙骨止下利,固大肠之脱;艾叶,震亨谓其入药,服则气上行,时珍曰,转肃杀之气为融和,能回垂绝之元阳;当归,病因热而转生清者,血分必伤,用以调血也。

24392 白术汤

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】白术三分 甘草(炙,銼)半两 厚朴(去粗皮,涂生姜汁炙令紫色)一两 黄柏(去粗皮,炙) 龙骨各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜三片,同煎至八分,去滓,空心温服,日晚再服。

【主治】白滞痢及水痢,日夜一二十行,心下痛。

24393 白术汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【异名】四君子汤(《局方》卷三新添诸局经验秘方)、白术散(《朱氏集验方》卷二)、四圣汤(《活幼口议》卷二十)、人参散(《普济方》卷三九四)、温中汤(《医部全录》卷四三六)、四君汤(《文堂集验方》卷四)

【组成】白术 赤茯苓(去黑皮) 人参 甘草(炙)各等分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水二盞,煎一盞半,去滓温服。

【功用】益气补中,健脾和胃。

①《局方》(新添诸局经验秘方):温和脾胃,进益饮食,辟寒邪瘴雾气。②《医方类聚》引《澹寮》:平调脏腑,通顺三焦,育神养气,暖胃消谷。③《普济方》:补五脏,生津液,调气血,解虚烦,益肌体。④《医统》:调理脾胃,进乳食,止泄泻。⑤《医学入门》:扶胃降火,补虚固本。⑥《古今医鉴》:大补阳气。⑦《简明医》:补元气,养脾胃。

【主治】脾胃虚弱,元气不足,面色萎黄,身体瘦弱,倦怠嗜卧,气短懒言,四肢无力,心腹胀满,不思饮食,呕逆吐逆,肠鸣泄泻,脉虚弱。

①《圣济总录》:水气渴,腹胁胀满。②《局方》(新添诸局经验秘方):荣卫气虚,脏腑怯弱,心腹胀满,全不思食,肠鸣泄泻,呕逆吐逆。③《医方类聚》引《澹寮》:脾胃不和,形气怯弱,肢体倦怠,腹胁膨胀,饮食减少,嗜卧乏力,及病后羸弱,食不复常。④《普济方》:小儿脾胃虚弱,逆不止,心神烦闷,吐泻,气虚烦渴。⑤《玉机微义》:肺损,皮聚而毛落。⑥《内科摘要》:脾胃虚弱,饮食少进;或肢体肿胀,肚腹作痛;或大便不实,体瘦而黄;或胸膈虚痞,痰嗽吞酸。⑦《古今医鉴》:气虚脾泻不止。⑧《医方考》:面色萎白,言语轻微,四肢无力,脉来虚弱。年高气弱,痔血不止。或误服攻痔之药,致血大下而虚脱。⑨《赤水玄珠》:真气虚弱,及短气脉弱。⑩《回春》:气虚痰湿头眩。⑪《会约》:胃中有痰,心中欲吐不吐,欲呕不呕。⑫《证治汇补》:气虚卒中自汗,及偏枯在右;气症脾胃虚而食少泻多,脉虚濡;气虚火动咽痛;胃虚气弱、水气上乘作喘。

【方论选录】①《丹溪心法附余》:四君子汤用白术、人参、茯苓、甘草者,白术则健脾燥湿,人参则补肺扶脾,茯苓则降气渗湿,甘草则补胃和中,譬如宽厚和平之君子,而不为奸险卒暴之行也。《和剂》之等分,愚以为药为君臣,剂之大小,又人之所处何如也。

②《医方考》：人参甘温质润，能补五脏之元气；白术甘温健脾，能补五脏之母气；茯苓甘温而洁，能致五脏之清气；甘草甘温而平，能调五脏愆和之气。四药皆甘温，甘得中之味，温得中之气，犹之不偏不倚之君子也，故曰“四君子”。③《医灯续焰》：白术强土健运，茯苓渗湿燥脾，甘草守气于中宫，人参益气于五脏，皆主脾胃者，以人身真气即水谷之气也。四药冲和平淡而能补气维阳，诚君子哉。④《医方集解》：此手足太阴足阳明药也。人参甘温，大补元气为君；白术苦温，燥脾补气为臣；茯苓甘淡，渗湿泄热为佐；甘草甘平，和中益土为使也。气足脾运，饮食倍进，则余脏受荫，而色泽身强矣。⑤《伤寒绪论》：气虚者，补之以甘、参、术、苓、草，甘温益胃，有健运之功，具冲和之德，故为“君子”。盖人之一身，以胃气为本，胃气旺则五脏受荫，胃气伤则百病丛生。故凡病久不愈，诸药不效者，惟有益胃，补肾两途。故用四君子，随证加减，无论寒热补泻，先培中土，使药引津气四达，则周身之机运流通，水谷之精微敷布，何患其药之不效哉！是知四君子为司命之本也。⑥《古方选注》：汤以君子名，功专健脾和胃，以受水谷之精气，而输布于四脏，一如君子有成人之德也。入太阴、阳明二经，然其主治在脾，故药品分两皆为偶数。白术健脾阳，复人参保脾阴，炙草和胃阴，复茯苓通胃阳，大枣悦脾，生姜通胃。理运阴阳，刚柔相济，诚为生化良方。

【临证举例】①虚寒泄泻 《静香楼医案》：中气虚寒，得冷则泻，而又火生齿衄。古人所谓胸中聚集之残火，腹内久积之沉寒也。此当温补中气，脾土厚则火自敛，四君子汤加益智仁、干姜。②溃疡病 《中医杂志》(1980；12：947)：将溃疡病合并出血分虚寒与实热两型，前者共 153 例，用本方辨证加灶心土、白及、山药等治疗，有效率为 92.8%。③胃脘痛 《广西中医药》(1983；6：49)：用四君

子汤加味治疗以脾胃虚寒为主证的胃脘痛 38 例，临床表现：食欲不振，胃脘胀痛，饥饿时或夜间疼痛加重，常因饮食生冷而发病，疼痛时进食可缓解，经常泛吐清水，反酸，呃逆或欲呕，形困倦，喜按喜热饮，或大便稀烂，胃脘部有压痛，舌质淡，舌苔薄白或白腻，脉沉细而弱。38 例中，急性胃炎 2 例；胃、十二指肠球部溃疡 17 例；慢性胃炎 12 例；胃、十二指肠球部溃疡合并慢性胃炎 6 例；胃下垂 1 例。病程最短半天，最长达 30 年。皆以四君子汤为主方，气虚甚者加黄芪；血虚甚者加当归；偏寒者加干姜、高良姜或吴茱萸；湿重者加半夏；泛酸者加海螵蛸，煅瓦楞子；气滞者加陈皮、木香；腹痛甚者加延胡索。每日一剂，水煎服。共治愈 26 例，有效 12 例。平均住院 58 天。④慢性肝炎 《中医杂志》(1983；8：592)：慢性活动性肝炎 40 例，其中肝郁脾虚型 15 例，肝肾阴虚型 12 例，脾肾阳虚型 6 例，气阴两虚型 7 例，均以本方加黄耆为基本方，治疗 4~5 月，均获痊愈；HBsAg 转阴 28 例 (70%)，HBsAg 滴度下降 6 例；免疫学指标、肝功能及生化指标均恢复正常。⑤妊娠恶阻 《黑龙江中医药》(1989；1：4)：马某某，女，25 岁，妊娠二月，食欲不振，恶心欲吐，因症状加重而入院，西药治疗四天未见疗效，频频呕吐，不能进食，食入加剧，吐黄绿苦水，脘闷，倦怠乏力，思睡，舌淡苔薄，脉滑无力，以四君子汤加陈皮 20 克，竹茹 15 克，厚朴 10 克，一剂即觉脘内舒适，恶心减轻，呕吐未作，能进食。服第 4 剂药的午后，恶心微作，持续约一小时，但终未吐出，而后恶心消失，食欲增进。⑥小儿疳疾 《浙江中医杂志》(1964；2：16)：恒以本方为主，因证加入一二味药，治小儿疳疾，效果甚佳。附病例三则：例一，因母乳不足，多进甘肥厚味，脾胃受损，大便泄泻无度近一年。方用四君子丸 9 克，滚开水泡，连滓分二三次服。服十五贴后诸症大减，大便正常。但多食后仍有

便溏。续服一月，体渐肥胖。例二，大便秘结，粪如算盘珠样，数日不解，排便啼哭，便中挟血丝。方用四君合剂(党参、茯苓各9克，冬术4.5克，炙甘草3克)加女贞子6克，煎服。服八帖而愈。例三，禀赋素弱，麻疹后饮食不节，杂食生冷，致大便经常溏薄，日解6—7次，量多色白，肌肉消削，咳嗽盗汗，治以培上滋阴，方用四君合剂加枸杞子，女贞子各6克，十贴愈。⑦小儿低热《四川中医》(1984; 1: 44): 华某某，男，6岁，平素脾胃虚弱，经常大便溏薄，纳食不香。一月前因中毒性消化不良住院治疗，吐泻止后，低热长期不退，经多种化验检查，诊断为“功能性低热”。就诊时所见：面色桃白，肢倦乏力，语声低微，不思饮食，时觉口干喜热饮，颧角及两手心发热，舌质胖润，苔薄白，脉细缓无力，体温37.5℃—38.5℃之间。病属吐后脾胃虚弱，元气受损，虚阳外浮之发热，治宜四君子汤补气健脾，加山药、花粉滋养脾胃之阴，以期阴平阳秘。五贴后热退病愈。

【现代研究】①对消化道运动的影响《新中医》(1978; 5: 53): 本方可消除胃纳不佳，脘腹满闷及完谷不化，腹泻和肠道充气症状；对肠道运动的影响与抗副交感药物阿托品相似；对家兔离体十二指肠及回肠的自发活动呈抑制性影响，使紧张性下降，收缩幅度减小，有显著的解痉作用；对乙酰胆碱及氯化钡所致兔回肠强直性收缩的抑制率分别为83%及26%，对组织胺，氯化钡所致豚鼠回肠痉挛的抑制率分别为65%和27%；其对乙酰胆碱痉挛的解除主要表现为紧张性的明显下降，而收缩幅度仍保持原有水平乃至增加，对于肾上腺素所致十二指肠或回肠的抑制，则反可使收缩幅度加大。上述结果表明本方对肠道运动的影响主要是与其抗乙酰胆碱及组织胺有关，而直接作用则较弱。②对胰腺功能的影响《中国中西医结合研究会第二届学术讨论会论文摘要汇编》(1985年): 四

君子汤对金地鼠脾虚模型的作用，可见到胰腺合成消化酶能力加强，恢复分泌消化酶的能力。不论是生化检测结果，还是对胰腺细胞超微结构的观察，均可证实这些结论。③对糖代谢的影响《广东中医》(1962; 3: 4): 四君子汤具有增加肝糖元作用。将本方制剂连续口饲小鼠，一周后给药小鼠肝细胞中糖元颗粒聚集成较大团块，含量比对照组显著增多。推测本方益气补脾的作用可能包括糖代谢的改善，以及相应的能量供应增加。④对免疫功能的影响《中西医结合杂志》(1984; 6: 363): 四君子汤能明显提高小白鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能，单味药实验，党参、白术、茯苓都能明显提高小白鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能，其中尤以党参显著，白术次之，茯苓稍差，炙甘草未见有提高作用。在四君子汤配伍中，炙甘草浓度含 $\frac{1}{3}$ 时，可明显拮抗党参、白术、茯苓提高巨噬细胞吞噬功能的作用；炙甘草浓度含 $\frac{1}{5}$ ， $\frac{1}{7}$ 时，拮抗作用不明显。《辽宁中医杂志》(1989; 3: 43): 四君子汤能够促进萎缩的胸腺恢复，其作用不是通过促进食欲，增加进食量实现，而是相对特异地作用于胸腺，促进皮质细胞的增殖和分化。对正常小鼠胸腺结构则无明显影响。《中华微生物学和免疫学杂志》(1987; 3: 189): 四君子汤对 ^{60}Co 放射性损伤大鼠的细胞免疫和非特异性免疫功能具有明显的保护作用，给药组的迟发超敏反应程度(足垫肿胀)较对照组明显为高，血清总补体活性和血清溶菌酶含量，给药组也均较对照组有显著的提高。

【备考】本方改为丸剂，名“四君子丸”，(见《丸散膏丹集成》)。

24394 白术汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】白术二两 木瓜一枚(分为四片，每服用一片，锉碎，临煎时入) 甘草(炙，锉)半两

【用法】上三味，先将白术、甘草为粗末。每服五钱匕，水一盞半，入前铍者木瓜，加生姜一枣大（拍破），同煎至一盞，去滓，空心温服，一日三次。

【主治】脚气，呕逆不下食。

24395 白术汤

《圣济总录》卷八十八。为《圣惠》卷三十“白术散”之异名。见该条。

24396 白术汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】白术 木香 人参 白茯苓（去黑皮） 草豆蔻（去皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 桂（去粗皮） 枳壳（去瓢，麸炒） 细辛（去苗叶） 陈曲末各半两 诃黎勒三枚（煨，取皮用）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加盐少许，生姜五片，煎至七分，去滓，空心热服。

【功用】补暖水脏，和益脾胃。

【主治】虚劳痰饮，心胸烦满，气逆呕吐。

24397 白术汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】白术 陈橘皮（汤浸，去白，炒） 桂（去粗皮） 白茯苓（去黑皮） 前胡（去芦头）各一两 枳实（麸炒） 半夏（汤洗，去滑七遍） 附子（炮裂，去皮脐）各三分 甘草（炙）半两

【用法】上铍，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盞半，加生姜半分，煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳，胸中气满，痰饮癖结，或时呕逆，不欲饮食。

24398 白术汤

《圣济总录》卷九十四。为《圣惠》卷四十八“白术散”之异名。见该条。

24399 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】白术（铍，炒）二两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 芎藭 芍药 当归（切，焙） 人参 甘草（炙，铍） 诃黎勒（炮，

去核）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜一分，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】妊娠胎萎燥，渐觉羸劣，面色黄黑，腹脏虚冷。

24400 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】白术三两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两 木香半两 甘草（炙）一两半 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）二两 丁香 干姜（炮）二两 半夏一两（生姜汁浸一宿，切，焙干）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水二盞，加生姜五片，同煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠腹满，少食多胀。

24401 白术汤

《圣济总录》卷一五五。为《外台》卷三十三引《古今录验》“术汤”之异名。见该条。

24402 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】白术二两 半夏一两（生姜汁浸一宿，焙）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，同煎至半盞，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】妊娠咳嗽，痰盛呕逆。

24403 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】白术一两 麻黄（去节，先煎，掠去沫，焙）三两 石膏 葛根（铍） 何首乌 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加葱白一寸，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，壮热憎寒，头疼体痛。

24404 白术汤

《圣济总录》卷一五六。为《苏沈良方》卷十“白术散”之异名。见该条。

24405 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】白术(切,炒) 当归(锉,炒) 桑根白皮(锉)各一两半 大黄(锉,炒令香) 细辛(去苗叶) 桂(去粗皮)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后血气壅滞,攻心腹疼痛,或拘急胀满。

24406 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】白术(锉,炒) 赤茯苓(去黑皮) 人参 甘草(炙)各一两 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 枳壳(去瓢,麸炒)各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后霍乱吐利,不思食。

24407 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】白术 枇杷叶(炙,去毛) 桂(去粗皮) 当归(切,焙) 枳壳(去瓢,麸炒) 人参 甘草(炙,锉) 麦蘖(炒)各一两 干姜(炮)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后呕逆,饮食不下。

24408 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】白术一两 人参 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 甘草(炙,锉) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)各三分 枳实(去瓢,麸炒) 木香 当归(切,焙) 熟干地黄(焙)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,大枣一个(擘破),同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后气短力乏,言语不利。

24409 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】白术 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 草豆蔻(去皮) 枳壳(去瓢,麸炒)各三分 白茯苓(去黑皮) 木香 人参各半两

【用法】上锉细,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,加生姜三片,同煎至八分,去滓温服,一日二次。

【主治】产后心腹胀满,饮食不消,时作水痢。

24410 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】白术 人参 麻黄(去根节) 甘草(炙,锉) 葛根(锉) 藿香(去梗) 桔梗(炒)各半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水半盞,煎至三分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿伤寒,头痛肌热,喘粗。

24411 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】白术 人参 甘草(炙) 枳壳(去瓢,麸炒) 当归(切,焙)各一两 牡蛎(熬)半两

【用法】上为粗末。一二岁儿每服一钱匕,水七分,煎至四分,去滓,分温二服。

【主治】小儿腹胀,虚热不能食。

24412 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】白术 人参 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)各一分

【用法】上为粗末。一二岁儿每服一钱匕,水半盞,煎至三分,去滓温服,至晚三服。

【主治】小儿脾胃气虚,乳不消,腹胀。

24413 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】白术一两一分 干姜(炮)一分 白茯苓(去黑皮) 甘草(炙)各一两 附子(炮裂,去皮脐)半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水半盞,

煎至三分，去滓，空心、食前分温二服。

【主治】小儿赤白痢，日夜三五十行。

24414 白术汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】白术三分 赤茯苓（去黑皮）人
参各一两 当归（切，焙）半两 厚朴（去
粗皮，涂生姜汁炙令香熟）半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水半盏，
加生姜二片，煎至三分，去滓带热服，至夜
三四服。

【主治】小儿胃风，泄痢不止，腹胀羸瘦。

24415 白术汤

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】白术 甘草各四分 桑白皮三分
茯苓二分

【用法】上为末。每觉渴时点一钱服之，不
拘时候。

【主治】水气口渴；脾虚气上，食少发渴。

【宜忌】切不可饮冷。

24416 白术汤

【方源】《本事》卷二引庞老方。

【组成】白术 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）
桂心（不见火） 桔梗（炒） 干姜（炮） 人
参（去芦） 当归（洗，去芦，薄切，焙
干） 茯苓（去皮） 甘草（炙）各等分

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，
加大枣二个，同煎至八分，去滓，不拘时候
服。

【功用】和气调中进食。

【方论选录】《本事方释义》：白术气味甘温
微苦，入足太阴；厚朴气味辛温，入足太阴；
桂心气味辛热，入肝制木；桔梗气味苦辛平，
入手太阴，为诸药之舟楫；干姜气味辛温，入
足太阴；人参气味甘温，入脾胃；当归气味
辛微温，入手少阴、足厥阴；茯苓气味甘平
淡渗，入胃；甘草气味甘平，调和诸经络；再
佐以枣之和荣。盖病虽去而正未复，非调和
中气，谷食渐加，精神何由复乎？

24417 白术汤

《卫生总微》卷十。为《小儿药证直诀》卷下
“白术散”之异名。见该条。

24418 白术汤

【方源】《宣明论》卷十一。

【组成】白术三两 寒水石 当归 黄芩
芍药 人参 石膏 干葛 防风 缩砂 藿
香 甘草 茯苓各一两 木香二两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加
生姜三片，同煎至六分，去滓温服，一日三
次。

【功用】养液润燥，开通结滞，令血昌盛。

【主治】妊娠血液虚衰痿弱，难以运动，气
滞痹麻，营卫不能宣通。

24419 白术汤

【方源】《三因》卷十二。

【异名】白术散（《得效》卷五）。

【组成】白术二两 五味子 茯苓各一两
甘草一分 半夏四个（洗去滑，切作十六
片）

【用法】上为散，分作十六服。水一盏半，
加生姜五片，半夏一片，煎七分，空腹服。

【主治】五脏伤湿，咳嗽痰涎，憎寒发热，
上气喘急。

24420 白术汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】白术 葛根各一两 升麻 黄芩
各半两 芍药二两 甘草二钱半

【用法】上咬咀。每服一两，水一盏半，煎
至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】破伤风，大汗不止，筋挛搐搦。

24421 白术汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】白术散（《医学纲目》卷二十二）。

【组成】半夏曲半两 白术二钱 槟榔二
钱半 木香一钱 甘草一钱 茯苓二钱

【用法】上为细末。每服二钱，食前煎生姜
汤调下。

【功用】《杏苑》：补中豁痰。

【主治】胃中虚损，及有痰而吐者。

【方论选录】《杏苑》：治中气挟痰作吐，法当补中豁痰。是以白术、炙甘草补中，茯苓、半夏豁痰，木香、槟榔散逆气以止呕。

24422 白术汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】白术散（《医统》卷三十五）、小白术散（《赤水玄珠》卷八）。

【组成】白术 芍药各三钱 干姜半两（炮） 甘草二钱（炙）

【用法】上为粗末。每服半两，水一盞，煎至七分，去滓取清，宜温服之。

【主治】大肠经动，下痢为鹜溏。大肠不能禁固，卒然而下成水泄，青色，其中或有硬物，欲起而又下，欲了而不了，小便多清，得之秋冬者。

【加减】甚则去干姜，加附子三钱。

24423 白术汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】白术 白茯苓 半夏各等分

【用法】上为末。每服半两，病大者一两，水二盞，加生姜七片，煎至一盞，取清，调神曲末二钱，顿服之。

【主治】①《保命集》：痰潮上如涌泉，久不可治者。②《济阳纲目》：形肥脉缓，体重嗜卧，痰滑。

【加减】病甚者，下玉壶丸一百丸。

24424 白术汤

【方源】《玉机微义》卷六引《易简》。

【组成】人参 白茯苓 白术 木香 甘草 黄耆各一两 干葛二两

【用法】上为粗末。每服五钱，水煎服。不问阴阳，并宜服之。

【主治】小儿泄泻，胃热烦渴。

24425 白术汤

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】白术 甘草 当归 陈皮 桔梗 枳壳各等分

【用法】上为粗末。每服三五钱，水煎，去滓温服。

【功用】散气除湿，解急和经。

【主治】湿嗽。

【临证举例】湿嗽 赵君玉妻病嗽，时已十月矣。戴人处方六味：陈皮、当归、甘草、白术、枳壳、桔梗。君玉疑其不类嗽药，戴人笑曰：君怪无乌梅、罂粟壳乎？夫冬嗽，乃秋之湿也，湿土逆而为嗽。此方皆散气除湿，解急和经。三服帖然效矣。

24426 白术汤

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】三物汤（《济阴纲目》卷九）、痢下白术汤（《医略六书》卷二十八）。

【组成】白术 黄芩 当归各等分

【用法】上为末。每服二三钱，水煎，食前服。

【主治】①《儒门事亲》：孕妇痢呕吐血。②《医略六书》：孕妇下痢，脉虚数者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠胎热内炽，脾弱不能健运，血得偏渗肠间，故下痢赤白，胎孕因之不安。黄芩清热安胎，白术健脾止痢，当归养血以引血归经。使脾气健旺，则胎热自化，而胃气清和，血无不归，何有下痢赤白，胎孕不安乎！

24427 白术汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】茯苓半夏汤（《东垣试效方》卷三）。

【组成】炒神曲二钱 陈皮 天麻各三钱 白术 白茯苓 麦蘖面（炒黄色） 半夏各五钱

【用法】上吹咀。每服五钱，水二盞，加生姜五片，同煎至一盞，去滓，稍热服之。

【功用】《杏苑》：驱风导痰，祛宿食。

【主治】风邪羈絆于脾胃之间，胃气虚弱，身重有痰，恶心欲吐。

【方论选录】《杏苑》：脾胃虚弱，羈风挟痰，宿食不化而作恶者，法当治中为本，驱风导痰，祛宿食为标。是以用白术补中气，神曲、麦芽消宿食，天麻驱风，茯苓、半夏豁痰，用

橘红、生姜散逆气以止呕吐。

24428 白术汤

【方源】《阴证略例》。

【组成】白术二两 防风二两 甘草一两(炙)

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候，一日只一二服。

【主治】①《阴证略例》：内伤冷物，外感风邪有汗者。②《普济方》：风湿恶风，脉缓。

24429 白术汤

【方源】《普济方》卷一六一引《济生》。

【异名】白术散（《普济方》卷一六一）。

【组成】白术二两 五味子 半夏(汤浸七次) 白茯苓(去皮) 橘红各一两 甘草(炙)半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】五脏受湿，咳嗽痰多，上气喘急，身体痛重，脉来濡细，憎寒发热。

24430 白术汤

【方源】《此事难知》。

【组成】白术二两(如汗之，改苍术) 防风二两(去芦)

【用法】上咬咀，水煎服。

【功用】上解三阳，下安太阴。

【主治】伤风寒。

【加减】若发热引饮，加黄芩、生甘草各一两；头痛恶风者，加羌活散三钱半。

24431 白术汤

《丹溪心法》卷三。即《三因》卷十“桂术汤”。见该条。

24432 白术汤

【方源】方出《医学纲目》卷三十七引丹溪，名见《医部全录》卷四九五。

【组成】白术一钱半 黄耆(炙) 当归 陈皮各五分 甘草(炙)少许

【用法】水煎，温服。

【主治】痘疮，疡塌不掩。

24433 白术汤

【方源】《普济方》卷十五。

【组成】白术 木通(细锉，炒)各二两 梔子仁 黄芩(去黑心) 赤茯苓(去黑皮)各一两 榆白皮(炙，锉)一两半

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盞半，煎至一盞，去滓，分温服，空心一服，食后一服。

【主治】筋虚，胞转急满。

24434 白术汤

《普济方》卷二十。即《圣惠》卷五“补脾白术散”。见该条。

24435 白术汤

《普济方》卷二十五。为《兰室秘藏》卷中“白术茯苓汤”之异名。见该条。

24436 白术汤

【方源】《普济方》卷一三八。

【组成】白术 芦根 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)各一两 枇杷叶(去毛，炙)半两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，加生姜五片，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒邪热虽退，胃中不和，干呕不饮，甚则吐逆。

24437 白术汤

《普济方》卷一九二。为《全生指迷方》卷四“白术散”之异名。见该条。

24438 白术汤

【方源】《普济方》卷三三八

【组成】白术(锉，麸炒)四两 桂(去粗皮)二两 陈橘皮(汤浸，去白，焙)二两半 甘草(炙，锉)一两 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)二两 芍药 芎藭各一两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，大枣一个，煎至六分，去滓，食前热服。

【功用】安胎。

【主治】妊娠腹痛刺刺。

24439 白术汤

【方源】《普济方》卷三七六。

【组成】白术 当归各一两 厚朴(炙) 半夏(洗) 甘草(炙) 人参 川芎 生

姜各二两 枳实三个(炙) 食茱萸二两

【用法】以水七升,煮取二升,温服三合,日三夜二服。

【主治】少小腹中有热,有寒在胸上,逆吐,腹雷鸣而满,惊啼,甚即发病,掣缩,休作有时。

24440 白术汤

【方源】《玉机微义》卷三十九。

【组成】葛根汤加桂心 黄耆 白术

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】柔痉。

24441 白术汤

【方源】《医方类聚》卷一〇二引《御医撮要》。

【组成】白术一两 木香 青橘皮各半两 神曲 麦蘖 人参 赤茯苓各一两 甘草 槟榔各半两

【用法】上为细末。每服一钱,入盐少许,沸汤点服。

【主治】脾胃不和,胸膈痞闷,逆恶不思饮食。

24442 白术汤

【方源】《奇效良方》卷一。

【组成】白术二钱 厚朴(姜制)二钱 防风(去芦)二钱 附子(炮,去皮脐) 橘红 白鲜皮 五加皮各一钱

【用法】水二钟,加生姜五片,煎至一钟,不拘时候服。

【主治】①《奇效良方》:脾经受病,多汗恶风,身体怠惰,四肢不动,不能饮食,口角两边黄。②《校注妇人良方》:脾脏中风,腹满身黄,呕吐酸水。

24443 白术汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】白术 川芎 蔓荆子 没药 白蒺藜(去刺) 黄芩 防风 五味子 菊花 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】眼痛而憎寒,此乃气衰血盛。

24444 白术汤

《校注妇人良方》卷十二。为《普济方》卷三三七引《十便良方》“白术散”之异名。见该条。

24445 白术汤

《校注妇人良方》卷十四。为《圣惠》卷七十四“白术散”之异名。见该条。

24446 白术汤

《赤水玄珠》卷十一。即方出《丹溪心法》卷三,名见《医学正传》卷五“四制白术散”。见该条。

24447 白术汤

《准绳·女科》卷五。为《金匱要略》卷中“枳术汤”之异名。见该条。

24448 白术汤

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】白术一钱半 陈皮 白茯苓 五味子 半夏 杏仁各一钱 甘草五分

【用法】水一盏半,加生姜三片,煎六分,分二服。

【主治】咳嗽气喘,呕吐痰涎。

24449 白术汤

《嵩崖尊生》卷九。为《三因》卷六“四兽饮”之异名。见该条。

24450 白术汤

《嵩崖尊生》(锦章书局本)卷十三。即原书同卷(三让堂本)“实脾汤”。见该条。

24451 白术汤

《医略六书》卷二十五。为《鸡峰》卷十八“白术茯苓汤”之异名。见该条。

24452 白术汤

《金匱翼》卷三。即《济生》卷一“白术饮”。见该条。

24453 白术汤

【方源】《续名家方选》

【组成】白术 紫苏 芍药 金银花各八分 葛根三分 荆芥 干姜 知母 独活 甘草各二分 生姜一片。

【用法】水煎服。

【主治】痛风。

24454 白术汤

【方源】《医彻》卷二。

【组成】白术一钱(土炒) 人参一钱 茯苓一钱 牛膝一钱 黄柏一钱 苍术七分(泔制) 当归一钱 白芍药一钱(酒炒) 木瓜一钱 柴胡五分 广皮一钱

【用法】加大枣二枚, 生姜一片, 水煎服。

【主治】脚气, 气血亏损, 足脛疼痛。

24455 白术汤

《医钞类编》卷九。即《金匱》卷中“泽泻汤”。见该条。

24456 白术汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】白术(净) 八钱 生薏米七钱

【用法】水煎服。

【主治】腰湿痛, 如击重物。

【加减】如系寒湿, 去薏米, 加干姜一钱。

24457 白术汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】白术(土炒) 四钱 炙草一钱

【用法】加煨姜三片, 大枣二个, 水煎服。

【主治】小便清长而泻者。

【加减】如寒甚, 则煨姜换用干姜。

24458 白术汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】白术 茯苓各9克 橘络 甘草各3克 荆芥1.5克

【功用】健脾除湿, 疏风散邪。

【主治】粟疮。脾虚有湿, 外受风邪, 症状轻微, 颗粒稀少, 形体瘦弱者。

【方论选录】方中白术、茯苓、甘草健脾除湿。橘络理气健脾, 通络脉以除胞睑之湿滞。荆芥疏散风邪。五味合用, 具有健脾除湿, 疏风散邪之功。

24459 白术饮

【方源】《圣济总录》卷十七。

【异名】白术散(《医统》卷五十三)。

【组成】白术 厚朴(去粗皮, 生姜汁炙) 甘菊花各半两 人参 白芷 防风(去叉)各一两

【用法】上咀咀, 如麻豆大。每服五钱匕, 水一盏半, 加生姜五片, 煎至一盏, 去滓, 食前温服。

【主治】风邪在胃, 头旋不止, 复加呕逆。

24460 白术饮

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】白术(炒) 附子(炮裂, 去皮脐) 高良姜(炮) 桂(去粗皮) 人参 干姜(炮) 各一两 藿香(去梗) 一分

【用法】上锉, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盏, 同煎至七分, 不拘时候, 去滓温服。

【主治】伤寒伏阴气, 胸膈妨闷, 吐逆不定, 手足厥冷。

【备考】本方方名, 《普济方》引作“白术散”。

24461 白术饮

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】白术 芦根 厚朴(去粗皮, 生姜汁炙) 各一两 枇杷叶(去毛, 炙) 半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盏, 加生姜五片, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】伤寒邪热虽退, 胃中不和, 干呕不已, 甚则吐逆。

24462 白术饮

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】白术 乌头(炮裂, 去皮脐) 桔梗(锉, 炒) 附子(炮裂, 去皮脐) 细辛(去苗叶) 各一两 干姜半两(炮)

【用法】上锉, 如麻豆大。每服二钱匕, 以水一盏, 煎至六分, 去滓热服, 不拘时候。

【主治】阴毒伤寒, 心神烦躁, 四肢厥冷。

24463 白术饮

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】白术 人参 生姜(切) 各半两 甘草(炙) 一分

【用法】上锉, 如麻豆大。以水三盏, 煎至一盏半, 去滓, 食前分温二服。

【主治】伤寒后胃虚, 不思饮食。

24464 白术饮

【方源】《济生》卷一。

【异名】白术散(《医学六要·治法汇》卷二)。

【组成】白术 人参 草果仁 干姜(炮) 厚朴(姜制,炒) 肉豆蔻(面裹,煨) 橘皮(去白) 木香(不见火) 麦蘖(炒) 各一两 甘草(炙) 半两

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盞半,加生姜五片,大枣一个,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】脾劳虚寒,呕吐不食,腹痛泄泻,胸满喜噫,多卧少起,情思不乐,肠鸣体倦。

【备考】本方方名,《金匱翼》引作“白术汤”。

24465 白术饮

《普济方》卷九十二。为方出《千金》卷八,名见《三因》卷二“白术酒”之异名。见该条。

24466 白术酒

【方源】方出《千金》卷八,名见《三因》卷二。

【异名】白术饮(《普济方》卷九十二)、一味白术酒(《时方歌括》卷下)。

【组成】白术四两

【用法】以酒三升,煮取一升,顿服之。

【主治】中风或中湿所致口噤不知人,骨节疼痛,遍身疼痛不能转侧。

①《千金》:中风,口噤不知人。②《三因》:中湿,口噤不知人。③《医方大成》:中湿,骨节疼痛。④《寿世保元》:中湿,遍身疼痛不能转侧,及皮肉痛难忍者。⑤《济阳纲目》:破伤湿。⑥《不居集》(下集):感湿咳嗽,身体重痛。

【宜忌】忌桃、李、雀肉。

【方论选录】《法律》:此方专一理脾,不分功于利小便。盖以脾能健运,自湿不留而从水道出耳。然则胃中津液不充,不敢利其小便者,得此非圣药乎!

24467 白术酒

【方源】《千金翼》卷十三。

【异名】术酒(《圣惠》卷九十五)。

【组成】白术二十五斤

【用法】上咬咀。以东流水两石五斗,不津器中渍之二十日,去滓,纳汁大盆中,取以渍曲,如家醪法,酒熟取清,任性饮之。

【功用】除万病。白发返黑,齿落更生,久服长年。

【宜忌】《外台》:忌桃、李、雀肉。

24468 白术酒

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】白术三两(捣碎) 黑豆三两(炒令熟)

【用法】以酒四升,煎至二升,去滓,分温四服,揭开口灌之。

【主治】妇人中风,口噤,言语不得。

24469 白术酒

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】白术一两半 独活一两 黑豆一合(炒令熟)

【用法】上锉细。以酒三升,煎取一升半,去滓,分温四服,揭开口灌之。得汗即愈。

【主治】妊娠中风,口噤,言语不得。

【方论选录】《医略六书》:妊娠风中少阴,经气闭塞,口噤不开,不得言语,胎独难安焉。黑豆滋补少阴之脏以培本,独活疏通少阴之经以逐邪,合之白术健脾气以开发神机,酒煎活血脉以行其经络也。务使经气健旺,则邪自利散而脏气调和,口噤无不自开。

24470 白术酒

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】白术 独活各一两

【用法】上为粗散。以酒二大盞,煎至一大盞,去滓,分温二服,揭开口灌之。

【主治】妊娠中风,遍身强直,口噤不开。

24471 白术酒

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】白术

【用法】上为细散。每服二钱匕,温酒调下。

【主治】①《圣济总录》：产后风痉。②《普济方》：兼治中风。

24472 白术酒

《普济方》卷十六。即《千金》卷八“白术酿酒”。见该条。

24473 白术散

【方源】《金匱》卷下。

【异名】芎藭散（《圣济总录》卷一五五）、芎椒白术散（《鸡峰》卷十六）、安胎白术散（《卫生宝鉴》卷十八）。

【组成】白术 芎藭 蜀椒三分（去汗）牡蛎

【用法】上为散。每服一钱匕，酒下，日三次，夜一次。若呕，以醋浆水服之；复不解者，小麦汁服之；已后渴者，大麦粥服之。病虽愈，服之勿置。

【功用】①《金匱》：养胎。②《局方》：调补冲任，扶养胎气，壮气益血，保护胎脏。

【主治】妊娠脾虚，寒湿中阻，脘腹时痛，呕吐清涎，不思饮食，胎动不安，胎萎不长；室女带下。

①《局方》：妊娠宿有风冷；胎萎不长；或失于将理，动伤胎气，多致损堕。②《三因》：室女带下诸疾。③《金匱要略讲义》：妊娠脾虚寒湿中阻，每见脘腹时痛，呕吐清涎，不思饮食，白带下，甚至胎动不安。

【宜忌】《外台》引《古今录验》：忌桃、李、雀肉等。

【加减】但苦痛，加芍药。心下毒痛，倍加芎藭。心烦、吐、痛，不能食饮，加细辛一两；半夏（大者）二十枚，服之后，更以醋浆水服之。

【方论选录】①《金匱要略直解》：白术主安胎为君，川芎主养胎为臣，蜀椒主温胎为佐，牡蛎主固胎为使。按瘦而多火者，宜用当归散；肥而有寒者，宜用白术散，不可混施也。芍药能缓中，故若痛者加之。川芎能温中，故毒痛者倍之。痰饮在胸膈，故令心烦吐痛，不能食饮，加细辛破痰下水，半夏

消痰去水，更服浆水以调中。若呕者，复用浆水服药以止呕。呕不止，再易小麦汁以和胃。呕止而胃无津液作渴者，食大麦粥以生津液。病愈服之勿置者，以大麦粥能调中补脾，故可常服，非指上药可常服也。②《金匱要略心典》：妊娠伤胎，有因湿热者，亦有因湿寒者，随人脏气之阴阳而各异也。当归散正治湿热之剂；白术散白术、牡蛎燥湿，川芎温血，蜀椒去寒，则正治寒湿之剂也。仲景并列此，其所以诏示后人者深矣。

【备考】方中白术、芎藭、牡蛎用量原缺。《外台》引《古今录验》本方用白术、芎藭各四分，蜀椒三分，牡蛎二分。

24474 白术散

【方源】《千金》卷十五。

【组成】白术 厚朴 人参 吴茱萸 茯苓 麦蘖曲 芎藭各三两（一方加大腹、橘皮）

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，食后酒下，一日三次。

【主治】①《千金》：脾胃俱虚冷。②《普济方》：脾虚腹胀，不能饮食。

24475 白术散

【方源】《千金》卷十七。

【组成】白术十四枚 附子 秦艽 人参 牡蛎 蜀椒 细辛 黄芩 芎藭 牛膝各三分 干姜 桂心 防风各五分 茯苓 桔梗 当归 独活 柴胡各四分 乌头 甘草 麻黄 石南 莽草 栝楼根 天雄 杜仲各二分

【用法】上药治下筛。每服五分匕，平旦酒下。讫，如人行七里久，势欲解，更饮酒五合为佳。

【主治】风入脏腑闷绝，常自躁痛，或风疰入身，冷疰、鬼疰、飞尸，恶气肿起，或左或右，或前或后，或内或外，针灸流移，无有常处，惊悸，腹胀气满，叉心，头痛，或恍惚悲惧，不能饮食，或进或退，阴下湿痒，或大便有血，小便赤黄，房中劳极。

24476 白术散

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《普济方》卷一七六。

【组成】茯苓八两 泽泻四两 白术 生姜 桂心各三两 甘草一两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮小麦三升，取三升，去麦下药，煮取二升半，服八合，一日二次。

【主治】消渴，阴脉绝，胃反而吐食。

24477 白术散

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】白术八分 茯苓八分 吴茱萸四分 橘皮六分 萆薢四分 厚朴八分（炙） 槟榔十分 人参六分 大黄十分

【用法】上为散。每服方寸匕，空腹煮姜、枣汤下，一日二次。渐加至二匕半，觉热即少饮食三两口压之。

【主治】呕吐酸水，结气筑心。

【宜忌】忌酢物，桃、李、雀肉。

24478 白术散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】白术半两 甘草半两（炙微赤，锉） 当归三分（锉，微炒） 白茯苓三分 远志半两（去心） 熟干地黄一两 黄芩半两 半夏半两（汤浸七遍去滑） 附子三分（炮裂，去皮脐） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 桂心三分 木香半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，饴糖半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】心气虚损，志意不定，腰脊腹肋相引痛，不能俯仰。

24479 白术散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白术一两 诃黎勒二两（煨，用皮） 丁香三分 人参一两（去芦头） 草豆蔻三分（去皮） 黄耆三分（锉） 附子三分（炮裂，去皮脐） 白茯苓三分 萆薢一两 麦蘖三分（微炒） 沉香二分 陈

橘皮三分（汤浸，去白瓢，微炒） 木香三分 枳实半两（麸炒微黄） 甘草半两（炙令赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾气不足，心腹胀满，不欲饮食，若食则气滞体重，四肢无力。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面。

24480 白术散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白术一两 草豆蔻一两（去皮） 槟榔一两 甘草半两（炙微赤，锉） 桂心二分 桔梗一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 前胡三分（去芦头） 诃黎勒一两（煨，用皮） 赤茯苓三分 枳实半两（麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃冷热气不和，腹协胀闷，少思饮食。

24481 白术散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白术一两 人参三分（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 桂心三分 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 诃黎勒一两（煨，用皮） 白豆蔻一两（去皮）

【用法】上为粗散。每服三钱，水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱，呕吐不能食，四肢少力，心腹妨闷。

24482 白术散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白术一两 干姜半两（炮裂，锉） 桂心半两 人参半两（去芦头） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮一两

(汤浸,去白瓢,焙) 附子一两(炮裂,去芦头) 缩砂二两(去皮) 草豆蔻一两(去皮) 当归一两(锉,微炒) 诃黎勒一两(煨,用皮)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加大枣三个,煎至六分,去滓,食前热服。

【主治】脾脏虚冷,吃食减少,大肠泄痢,腹痛,四肢无力。

24483 白术散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白术三分 紫菀半两(洗去苗土) 干姜半两(炮裂,锉) 人参三分(去芦头) 熟干地黄三分 桂心一两 五味子三分 甘草半两(炙微赤,锉) 黄明胶三分(捣碎,炒令黄燥) 白茯苓三分

【用法】上为散。每服二钱,以水一中盏,加大枣三个,糯米五十粒,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺气不足,胸中短气,咳嗽恶寒。

24484 白术散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白术半两 人参一两(去芦头) 肉桂半两(去皱皮) 桔梗半两(去芦头) 细辛半两 甘草半两(炙微赤,锉) 厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】肺脏伤风冷,头目昏重,常多清涕,少思饮食。

24485 白术散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】白术三分 前胡三分(去芦头) 葛根三分(锉) 桑根白皮三分(锉) 川升麻半两 赤芍药一两 石膏一两半 荆芥半两 子芩三分

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,

加生姜半分,豆豉五十粒,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒四日,腹膨胀满,心胸不利,四肢疼痛,咳嗽恶寒,喘急壮热。

24486 白术散

【方源】《圣惠》卷十。

【异名】桂心白术汤(《活人书》卷十七)。

【组成】白术 桂心 附子(炮裂,去皮脐) 防风(去芦头) 芍药 甘草(炙微赤,锉) 各三分

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至五分,去滓热服,不拘时候。

【主治】伤寒阴痉,手足厥冷,筋脉拘急,汗出不止。

24487 白术散

【方源】《圣惠》卷十。

【异名】八物白术散(《活人书》卷十七)、八物白术汤(《永类铃方》卷八)。

【组成】白术半两 白茯苓半两 麻黄半两(去根节) 五味子半两 桂心三分 高良姜一分(锉) 羌活半两 附子三分(炮裂,去皮脐)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒阴痉,三日不愈,手足厥冷,筋脉拘急,汗不出,恐阳气内伤。

24488 白术散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】白术一两 前胡一两(去芦头) 桂心三分 甘草半两(炙微赤,锉) 附子一两(炮裂,去皮脐) 五味子半两 干姜半两(炮裂,细碎) 诃黎勒皮一两 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。如人行十里再服。

【主治】阴毒伤寒,心胸满闷,喘促,四肢

厥逆。

24489 白术散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】白术三分 附子三分(炮裂,去皮脐) 干姜半两(炮裂,锉) 桂心三分 甘草半两(炙微赤,锉) 川大黄三分(锉碎,微炒) 木香半两 枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为细散。每服二钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣二个,煎至五分,去姜、枣,温服,不拘时候。

【主治】伤寒食毒,壮热头痛,腹胀惜寒,四肢痠痛,口苦。

24490 白术散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】白术三分 诃黎勒一两(用皮) 高良姜半两(锉) 丁香半两 肉桂半两(去皱皮) 甘草一分(炙微赤,锉) 桔梗半两(去芦头) 人参半两(去芦头) 陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙) 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒后,胃虚逆呕,不纳饮食。

24491 白术散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】白术 甘菊花 赤茯苓 人参(去芦头) 前胡(去芦头) 大腹皮半两(锉) 旋覆花各三分 半夏(汤洗七遍去滑) 石膏一两 附子半两(炮裂,去皮脐) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒,痰滞在胸膈闷不散,身体壮热,头目昏沉,胃气不和,少思饮食。

24492 白术散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】白术一两 人参一两(去芦头) 甘草半两(炙微赤,锉) 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒霍乱,胃气不和,心烦吐利,不下饮食。

24493 白术散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】白术 人参(去芦头) 白茯苓 干木瓜 陈橘皮(汤浸,去白瓤,焙) 各一两 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热频服,不拘时候。

【主治】伤寒,冷热气相乘,霍乱吐利,转筋不止。

24494 白术散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】白术一两 甘草一分(炙微赤,锉) 芎藭三分 羌活一分 羚羊角屑一分 桂心一分 麻黄一两(不去根节) 知母二分 石膏一两

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒,体虚汗出,心烦,头痛恶风。

24495 白术散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】白术三分 桂心三分 赤芍药一两 当归三分(锉,微炒) 半夏三分(汤洗七遍去滑) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 干姜三分(炮裂,锉) 木香三分 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】伤寒，冷气结在心腹，痞满妨闷。

24496 白术散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】白术一两 陈橘皮半两(汤浸，去白瓢，焙) 芎藭半两 当归半两(锉碎，微炒) 桂心一两 附子半两(炮裂，去皮脐) 厚朴半两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 槟榔半两 大腹皮半两(锉) 草豆蔻一分(去皮) 川大黄一分(锉碎，微炒) 高良姜一分(锉)

【用法】上为粗末。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，脾胃气不和，吃食全少，四肢乏力。

24497 白术散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】白术一两 半夏一两(汤洗七遍去滑) 人参一两(去芦头) 白茯苓一两 陈橘皮二两(汤浸，去白瓢，焙) 桂心半两 旋覆花半两 五味子半两 大腹皮半两 前胡一两(去芦头) 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒后，脾胃气虚，食不消化，头目昏重，心神虚烦。

24498 白术散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】白术一两 黄耆一两(锉) 麦门冬一两(去心) 人参一两(去芦头) 桂心半两 陈橘皮三分(汤浸，去白瓢，焙)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒后虚羸少力，不思饮食。

24499 白术散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】白术 人参(去芦头) 陈橘皮(汤浸，去白瓢，焙) 大腹皮(锉) 黄耆(锉) 枳壳(麸炒微黄，去瓢) 甘草(炙微赤，锉) 各一两 诃黎勒一两(用皮) 沉香一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】时气后胃虚，宿食不消，心胸壅闷，乍寒乍热。

24500 白术散

【方源】《圣惠》卷十七。

【异名】白术香散(《普济方》卷一五二)。

【组成】白术三分 芦根三分(锉) 草豆蔻三分(去皮) 人参三分(去芦头) 陈橘皮三分(汤浸，去白瓢，焙) 枇杷叶三分(拭去毛，炙微黄) 厚朴三分(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，邪热已退，胃气未和，嘔不能食。

24501 白术散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】白术一两 麦门冬半两(去心) 黄耆三分(锉) 人参三分(去芦头) 前胡三分(去芦头) 陈橘皮一两(汤浸，去白瓢，焙) 桂心半两 白芍药半两 白茯苓一两 当归半两 半夏半两(汤洗七遍去滑) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】热病后，脾胃气虚，四肢疼痛，不思饮食。

24502 白术散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】白术一两 前胡一两(去芦头) 防风三分(去芦头) 枳壳三分(麸炒微黄，去瓢) 赤茯苓一两 蔓荆子三分 甘草半

两(炙微赤, 锉) 半夏半两(汤洗七遍去滑) 芎藭三分

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加入生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】风头眩, 心胸不利。

24503 白术散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】白术三分 白茯苓二两 桂心三分 厚朴二两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 陈曲三分(微炒黄色) 草豆蔻一两(去皮) 大麦蘖一两(微炒令黄) 木香一两 吴茱萸三分(汤浸七遍, 焙干微炒) 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 人参二两(去芦头) 槟榔一两

【用法】上为细散。每服二钱, 食前以温酒调下。

【主治】脾劳。胃中虚冷, 饮食不消, 腹胁胀满, 忧患不乐。

24504 白术散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】白术一两 白芍药三分 人参一两(去芦头) 甘草半两(炙微赤, 锉) 当归一两 半夏半两(汤浸七遍去滑) 桂心三分 附子一两(炮裂, 去皮脐) 黄耆一两(锉)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】虚劳里急, 四肢不和, 身体疼痛, 不欲吃食。

24505 白术散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】白术一两 陈橘皮(汤浸, 去白瓢, 焙) 枳实三分(麸炒微黄) 半夏三分(汤洗七遍去滑) 桂心一两 白茯苓一两 附子三分(炮裂, 去皮脐) 前胡一两(去芦头) 甘草(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏,

加生姜半分, 煎至六分, 去滓稍热服, 不拘时候。

【主治】虚劳, 胸中气满, 痰饮癖结, 时或呕逆不食。

24506 白术散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】白术三分 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 人参三分(去芦头) 麦蘖一两(微炒) 附子一两(炮裂, 去皮脐) 芎藭三分 桂心三分 厚朴一两半(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 诃黎勒一两(煨, 用皮)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓, 食前稍热服。

【主治】虚劳, 脾胃虚冷, 食不消化, 渐加无力。

24507 白术散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】白术一两 人参一两(去芦头) 桂心三分 厚朴一两半(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 吴茱萸半两(汤浸七遍, 焙干, 微炒) 诃黎勒一两(煨, 用皮) 益智子三分(去皮) 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 槟榔半两

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加大枣三个, 煎至六分, 去滓, 食前稍热服。

【主治】虚劳, 脾胃虚冷, 饮食不消化。

24508 白术散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】白术 木香 草豆蔻(去皮) 陈橘皮(汤浸, 去白瓢, 焙) 人参(去芦头) 肉豆蔻(去壳) 益智子(去皮) 干姜(炮裂, 锉) 白茯苓 厚朴(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 各一两 半夏(汤浸七遍去滑) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓稍热服, 不拘时候。

【主治】虚劳，脾胃气虚，不思饮食。

24509 白术散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】白术半两 防葵一两 槟榔二两 郁李仁二两（汤浸，去皮，微炒） 鳖甲二两（涂醋炙微黄，去裙襖） 吴茱萸三分（汤浸七遍，焙干，微炒） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 诃黎勒一两半（煨，用皮）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。以微利为度。

【主治】虚劳，积聚坚实，腹如鼓，食即却吐，坐卧不安，喘急。

【宜忌】忌苋菜、生冷、油腻。

24510 白术散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】白术三分 藿香半两 桂心半两 枇杷叶三分（拭去毛，炙微黄） 人参一两（去芦头） 白茯苓一两 肉豆蔻三枚（去壳） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】虚劳，脾胃气冷即呕逆，无食即饥。

24511 白术散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】白术一两 前胡一两（去芦头） 半夏三分（汤洗七遍去滑） 人参三分（去芦头） 桑根白皮三分（锉） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 紫菀三分（去苗土） 赤茯苓三分 槟榔半两 桂心三分 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襖） 百部三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 旋覆花半两 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半两，煎至六分，去滓温服，不拘时

候。

【主治】虚劳羸瘦，每唾稠粘，心胸壅闷。

24512 白术散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】白术一两 人参三分（去芦头） 诃黎勒一两（煨，用皮） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 草豆蔻一两（去皮） 桂心三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】虚劳冷气，心腹痞满，不思饮食，四肢少力。

24513 白术散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】白术一两 酸枣仁一两（微炒） 麻黄根二两 防风一两（去芦头） 白龙骨二两半 黄耆二两（锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳盗汗，夜卧心烦少睡。

24514 白术散

【方源】《圣惠》卷三十。

【异名】白术汤（《圣济总录》卷八十八）。

【组成】白术一两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 槟榔三分 紫苏茎叶三分 人参一两（去芦头） 白茯苓一两 木香半两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 桂心三分 诃黎勒皮一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】虚劳上气，及心腹气胀，不能饮食，呕吐酸水。

24515 白术散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】白术一两 丁香三分 诃黎勒三分（煨，用皮） 桂心三分 细辛三分 附

子三分(炮裂,去皮脐) 枳壳半两(麸炒微黄,去瓤) 吴茱萸一分(汤浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上为散。每服一钱,食后以温水调下。

【主治】肺脏虚寒,心膈壅滞,头目不利,鼻流清涕,日久不止。

24516 白术散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】白术一两 当归三分(锉,微炒) 柴胡一两(去苗) 桂心半两 青橘皮三两(汤浸,去白瓤,焙) 桔梗半两(去芦头) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣二个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】乳石发动,体颤寒热,心腹痛噤,不能饮食。

24517 白术散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】白术一两 人参三分(去芦头) 当归一两(锉,微炒) 木香半两 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】乳石发动,多服凉药过度,致脾胃虚冷,腹痛下痢,不能饮食。

24518 白术散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】白术一两 桂心三分 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 泽泻一两 诃梨勒皮一两

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,一日三四次。

【主治】因食热及饮冷水,上气胸满,心下有水不散,虚喘妨闷,不下食。

24519 白术散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】白术三分 半夏三分(汤浸七遍去滑) 槟榔半两 桂心半两 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 丁香一分 高良姜 半两(锉) 木香一分

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】心痛,痰饮多唾,腹胀不能下食。

24520 白术散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】白术一两 半夏半两(汤洗七遍去滑) 桂心半两 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 草豆蔻一两(去皮)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】腹虚胀及胸满,腹中冷痛。

24521 白术散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】白术 赤茯苓 当归(锉,微炒) 桂心 桔梗(去芦头) 陈橘皮(汤浸,去白瓤,焙) 吴茱萸(汤浸七遍,焙干,微炒) 人参(去芦头) 各一两 甘草一分(炙微赤,锉) 细辛半两 厚朴半两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】腹胀肠鸣切痛,发作有时。

24522 白术散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】白术一两 诃梨勒皮一两 半夏半两(汤洗七遍去滑) 甘草半两(炙微赤,锉) 桔梗三分(去芦头) 桂心半两 前胡一两(去芦头) 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,

加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，痰壅呕吐，心胸不利，气逆食少。

24523 白术散

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二〇一。

【组成】白术半两 肉豆蔻半两（去壳）人参半两（去芦头）厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱呕吐，脾胃虚冷，气膈，不思饮食。

24524 白术散

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二〇二。

【组成】白术二两 枳壳二两（麸炒微黄，去瓢）桂心一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三个，生姜半分，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】霍乱吐逆下利，心腹胀满，脚转筋，手足冷。

24525 白术散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】白术一两 藿香一两 人参一两（去芦头）枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄）高良姜半两（锉）草豆蔻半两（去皮）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱胃气虚，干呕不止。

24526 白术散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【异名】白术汤（《圣济总录》卷九十四）。

【组成】白术二两 赤茯苓一两 枳壳一

两（麸炒微黄，去瓢）人参一两（去芦头）桔梗二两（去芦头）桂心一两 京三棱一两（炮，锉）槟榔一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】①《圣惠》：积聚，心腹胀满，不能饮食。②《圣济总录》：寒疝凝结，积聚不散，攻注腹内疼痛，不下饮食。

24527 白术散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】白术一两 诃黎勒皮一两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢）陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙）干姜三分（炮裂，锉）人参一两（去芦头）桔梗半两（去芦头）桂心三分 木香二分 槟榔三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣二个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痼癖冷气胀满，不能食。

24528 白术散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】白术半两 半夏一两（汤洗七遍去滑）青橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙）赤茯苓一两 大腹皮一两（锉）人参半两（去芦头）枇杷叶一两（拭去毛，炙微黄）木香半两 前胡二两（去芦头）槟榔一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】膈气不散，胸中噎塞，不下食，时时妨闷。

24529 白术散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】白术一两 人参一两（去芦头）干姜半两（炮裂，锉）甘草半两（炙微赤，锉）吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）五味子半两 曲末一合（炒微黄）大麦蘖一合（炒微黄）桂心一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】膈气，肾虚呕逆，从朝至夜，不能饮食，胸中痛，气渐羸困。

24530 白术散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】白术一两 木香一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 桂心一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 藜蘆半两 槟榔一两 人参一两（去芦头） 川大黄一两（锉碎，微炒） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】五膈，气呕吐酸水，寒气上攻，胸中刺痛，腹胁胀满，饮食不下。

24531 白术散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】白术三分 木香半两 诃黎勒皮三分 桂心三分 甘草一分（炙微赤，锉） 丁香半两 人参半两（去芦头） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 草豆蔻一两（去皮）

【用法】上为细散。每服一钱，煎生姜、木瓜汤调下，不拘时候。

【主治】气膈，心腹痞满，四肢拘急，体重。

24532 白术散

【方源】方出《圣惠》卷五十，名见《普济方》卷二〇五。

【组成】白术一两 枳实一两（麸炒微黄） 神曲一两（炒微黄）

【用法】上为细散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】膈气，心胸间痛。

24533 白术散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】白术一两 吴茱萸半两（汤浸七

遍，焙干，微炒） 高良姜一两（锉） 桂心一两 人参一两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】食讫醋咽多噎，食不下，脾胃虚冷。

24534 白术散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】白术一两 柴胡一两（去苗） 赤芍药三分 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 赤茯苓三分 槟榔一两 桔梗二两（去芦头） 诃黎勒皮三分 桂心半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】气隔痰饮，两肋下痛，食不消化。

24535 白术散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】白术一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 丁香半两 赤茯苓半两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 附子半两（炮裂，去皮脐） 桂心半两 前胡一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸膈留饮，腹中虚满气逆，不下饮食。

24536 白术散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】白术三分 麻黄一两（去根节） 赤芍药三分 旋覆花半两 桂心一两 前胡三分（去芦头） 甘草三分（炙微赤，锉） 五味子一分 半夏三分（汤洗七遍去滑）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓热服，不拘时候。衣盖取汗。如人行十里未汗，即再

服。

【功用】发汗。

【主治】溢饮。

24537 白术散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】白术一两 半夏三分(汤洗七遍去滑) 赤茯苓二两 人参三分(去芦头) 桂心三分 甘草一分(炙微赤, 锉) 附子一两(炮裂, 去皮脐) 前胡一两(去芦头)

【用法】上为散。每服五钱, 以水一大盏, 加生姜半分, 煎至五分, 去滓热服, 不拘时候。

【主治】痰冷癖饮, 胸膈满闷, 不能下食。

24538 白术散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】白术一两 赤茯苓一两 桑根白皮一两半(锉) 楮白皮一两半(锉) 汉防己一两 泽漆茎叶(锉) 二两半 射干一两 槟榔一两

【用法】上为散。每服三钱, 以水、酒各半中盏, 煎至六分, 去滓温服, 如人行十里再服。以疏利为度。

【主治】石水, 四肢瘦细, 腹独肿大, 状如怀娠, 心中妨闷, 食即气急。

24539 白术散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】白术一两 牵牛子一两(微炒) 木通一两(锉) 川大黄一两(锉碎, 微炒) 陈橘皮半两(汤浸, 去白瓢, 焙) 槟榔一两 川朴消一两

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 煎至六分, 去滓, 空腹温服, 如人行十里再服。以利为度。

【主治】大小便难, 腹胁胀满, 气急。

24540 白术散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】白术一两 附子一两(炮裂, 去皮脐) 龙骨二两 黄连一两(去须, 微炒) 阿胶二两(捣碎, 炒令黄燥) 干姜一两(炮

裂, 锉) 赤石脂二两 地榆一两(锉) 当归一两(锉, 微炒)

【用法】上为细散。每服二钱, 以粥饮调下, 不拘时候。

【主治】久赤白痢不止, 腹中疼痛。

24541 白术散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】白术一两(锉, 微炒) 干姜一两(炮裂, 锉) 木香半两 甘草半两(炙微赤, 锉) 厚朴一两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 阿胶一两(捣碎, 炒令黄燥) 神曲一两(炒令微黄) 当归一两(锉, 微炒) 诃黎勒一两(煨, 用皮)

【用法】上为细散。每服二钱, 煮枣粥饮调下, 不拘时候。

【主治】久冷下痢后, 脾胃尚虚, 不能饮食, 四肢少力。

24542 白术散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】白术三分 石斛三分(去根, 锉) 黄耆一两(锉) 桂心半两 熟干地黄一两 续断三分 人参一两(去芦头) 牛膝一两(去苗) 天门冬三分(去心) 肉苁蓉一两(酒浸一宿, 刮去皱皮, 炙干) 白茯苓一两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】肠风痔疾失血后, 虚损羸瘦, 饮食无味, 面色萎黄, 四肢乏力。

24543 白术散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】白术三分 桂心半两 草豆蔻二分(去皮) 槟榔半两 赤茯苓半两 诃黎勒三分(煨, 用皮) 陈橘皮三两(汤浸, 去白瓢, 焙) 厚朴一两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 人参一两(去芦头) 甘草一分(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏,

加生姜半分、大枣三个，煎至六分，去滓，每于食前稍热服。

【主治】妇人脾胃气虚，心腹胀满，不欲饮食，四肢少力。

【备考】方中草豆蔻，《妇人良方》作“草果”。

24544 白术散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】白术一两 艾叶一两（微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 芎藭三分 阿胶一两（捣碎，炒令黄燥） 桂心一两 白石脂一两 白矾灰一两 乌贼鱼骨二两（烧灰） 熟干地黄一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 伏龙肝一两 当归三两（锉，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以热酒调下。

【主治】妇人白崩，脐腹冷痛，四肢不和，面无颜色。

24545 白术散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】白术汤（《校注妇人良方》卷十四）。

【组成】白术一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 麦门冬一两（去心） 芎藭一两 甘草半两（炙微赤，锉） 人参一两（去芦头） 半夏半两（汤浸七遍去滑） 前胡一两（去芦头） 赤茯苓一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，淡竹茹一分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，烦热头痛，胎气不安，或时吐逆，不下食。

【备考】方中赤茯苓，《普济方》作“赤芍药”。

24546 白术散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】白术三分 草豆蔻半两（去皮） 益智子半两（去皮） 枳壳三分（麸炒微黄，

去瓤） 高良姜半两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠霍乱，吐逆不止，腹痛。

【备考】《济阴纲目》：此真虚寒腹痛吐利方也，勿妄用。

24547 白术散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】白术一两 白茯苓一两 芎藭三分 人参半两（去芦头） 干姜半两（炮裂，锉） 草豆蔻一两（去皮） 厚朴三两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 当归三分（锉，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠霍乱，吐泻过多，伤冷，胎脏不安。

24548 白术散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】白术一两 人参一两（去芦头） 葛根一两 赤茯苓一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 枇杷叶（拭去毛，炙微黄） 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 黄耆（锉） 柴胡（去苗） 麦门冬（去心） 甘草（炙微赤） 半夏（汤洗七遍去滑）各半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半两，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠心胸痰逆，烦闷，头重目眩，憎寒，恶闻食气，四肢无力。

24549 白术散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】白术一两 黄芩一两 赤石脂二两 干姜半两（炮裂，锉） 芎藭三分 艾叶一两（炒令微黄） 人参一两（去芦头） 阿

胶一两(捣碎,炒令黄燥) 当归一两(锉,微炒)

【用法】上为细散。每服二钱,以粥饮调下,不拘时候。

【主治】妊娠下痢赤白,腹痛日夜不止。

24550 白术散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】白术一两 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 白茯苓一两半 葛根一两 麦门冬二两(去心) 人参一两(去芦头) 甘草半两(炙微赤,锉) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠阻病,心中愤愤,头闷目眩,四肢沉重,恶闻食气,好吃酸咸果实,多卧少起,三月四月皆多呕逆,百节痠疼,不得自举。

24551 白术散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】白术三分 草豆蔻一两(去皮) 当归一两(锉,微炒) 甘草半两(炙微赤,锉) 干姜半两(炮裂,锉) 芎藭半两 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加大枣三个,煎至六分,去滓,每于食前温服。

【主治】妊娠腹中冷,胎动不安。

24552 白术散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】白术三分 熟干地黄一两 白茯苓三分 甘草半两(炙微赤,锉) 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 当归一两(锉,微炒)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】妊娠胎动,腹痛,及腰疼不止。

24553 白术散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】白术一两 黄芩一两 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠心腹胀满,不欲饮食。

24554 白术散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白术三分 芎藭三分 赤芍药三分 附子三分(炮裂,去皮脐) 桂心二分 青橘皮一分(汤浸,去白瓢,焙) 甘草一分(炙微赤,锉) 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 石膏一两半

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】产后伤寒,四肢拘急,心腹满闷,头痛壮热。

24555 白术散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白术 麦门冬(去心,焙) 厚朴(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 人参(去芦头) 陈橘皮(汤浸,去白瓢,焙) 当归(锉,微炒) 桂心各一两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后腹中痛,呕逆,饮食不下。

24556 白术散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白术 麦门冬(去心,焙) 陈橘皮(汤浸,去白瓢,焙) 干姜(炮裂,锉) 人参(去芦头) 各一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后霍乱，吐利腹痛，烦渴，手足逆冷。

24557 白术散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白术三分 石膏一两半 白芍药半两 白茯苓三分 麦门冬一两半（去心，焙） 牡蛎粉一两 生干地黄一两 人参三分（去芦头） 五味子半两 黄耆三分（锉） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后体虚，劳动过多，致头痛烦热，汗出不止，四肢少力，不思饮食。

24558 白术散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白术 龙骨 当归（锉，微炒）各三分 生干地黄 黄耆（锉） 牡蛎粉各一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后体虚汗出，四肢乏力，腹内疼痛，不思饮食。

24559 白术散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】白术一两 木香半两 熟干地黄一两 干姜半两（炮裂，锉） 白芍药三分 芎藭半两 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 人参三分（去芦头） 桂心半两 黄耆三分（锉） 当归三分（锉，微炒） 白茯苓半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，一日三四次。

【主治】产后褥劳虚羸，发歇寒热，心腹疼痛，四肢无力，不思饮食。

24560 白术散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】白术一两 黄耆一两（锉） 五味子半两 石斛一两（去根，锉） 防风半两（去芦头） 人参三分（去芦头） 酸枣仁半两（微炒） 牛膝半两（去苗） 木香半两 桂心（半两） 当归半两（锉，微炒） 白茯苓三分 熟干地黄一两 芎藭半两 羚羊角屑半两 附子三分（炮裂，去皮脐） 甘草三分（炙微赤，锉） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓温服，一日三次。

【主治】产后体虚羸弱，不思饮食，远视无力，起止不得。

24561 白术散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】白术一分 附子三分（炮裂，去皮脐） 当归三分（锉，微炒） 桂心半两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 人参三分（去芦头） 木香半两 槟榔半两 干姜半两（炮裂，锉） 赤芍药半两 芎藭三分 甘草一分（炙微赤，锉） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】产后冷气攻心腹疼痛，四肢不和，少思饮食。

24562 白术散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】白术半两 赤芍药一分 紫菀半两（洗去苗土） 麻黄半两（去根节） 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 人参半两（去芦头） 陈橘皮一分（汤浸，去白瓢，焙） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓服，不拘时候。

【主治】小儿内中冷气,及伤于外寒,咳嗽,或时寒热头痛。

24563 白术散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】白术半两 当归半两(锉碎,微炒) 芎藭半两 干姜一分(炮裂,锉) 青橘皮一分(汤浸,去白瓢,焙) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓服,不拘时候。

【主治】小儿冷热不调,腹内疼痛,发歇不定。

24564 白术散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】白术半两 草豆蔻一分(去皮) 丁香半两 当归一分(锉,微炒) 陈橘皮半两(汤浸,去白瓢,焙) 甘草半分(炙微赤,锉)

【用法】上为细散。每服半钱,以粥饮调下,量儿大小,加減温服,不拘时候。

【主治】小儿霍乱,吐泻不止,心腹痛,面无颜色,渐至困乏。

24565 白术散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】白术一分 木香一分 陈橘皮一分(汤浸,去白瓢,焙) 丁香一分 麦门冬二分(去心,焙)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一中盏,煎至五分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】小儿冷热不和,吐利不止。

24566 白术散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】白术半两 土瓜根半两 牡蛎粉三分

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,加生姜少许,大枣二个,煎至六分,去滓温服。

【主治】小儿遗尿,足寒。

24567 白术散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】白术一两(微炒) 当归半两(锉,微炒) 地榆半两(微炙,锉) 木香半两 赤芍药半两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿疳痢,腹胀疼痛,日夜三二十行。

24568 白术散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】白术半两 人参半两(去芦头) 厚朴三分(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 黄连半两(去须,锉,微炒) 当归半两(锉,微炒) 地榆半两(锉) 木香半两 桦树皮半两(炙微赤,锉) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿赤白痢,腹内疼痛,羸弱不能饮食。

24569 白术散

【方源】《苏沈良方》卷十。

【异名】白术汤(《圣济总录》卷一五六)、保安白术散(《卫生宝鉴》卷十八)。

【组成】白术 黄芩各等分(新瓦上同炒香)

【用法】上为散。每服三钱,水一中盏,加生姜三片,大枣一个(擘破),同煎至七分。但觉头痛发热,便可二三服,即愈。

【功用】安胎,益母子。

【主治】妇人妊娠伤寒,头痛发热。

【宜忌】四肢厥冷阴证者未可服。

24570 白术散

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】白术 萆薢 独活 肉桂 五加皮 甘菊花 汉防己 葛根 羚羊角屑 赤芍药 防风 芎藭 杏仁(汤浸,去皮尖,麸炒令黄) 侧子(炮,去皮) 甘草(炙黄) 各一两 磁石三两(碎研,水淘去赤

屑) 麻黄二两(去节) 薏苡仁二两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎六分,去滓温服。

【主治】瘫痪风,手足不遂,肌肉顽痹,筋脉拘急,心神不安,言语蹇涩,胸膈痰涎不利。

24571 白术散

【方源】《活人书》卷十六。

【组成】白术一两 细辛一两 附子一两(炮,去皮脐用) 桔梗一两(去芦头) 干姜半两(炮裂,锉) 川乌头一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为细末。每服二钱,以水一中盏,煎至六分,稍热和滓顿服,不拘时候。

【主治】阴毒伤寒,心间烦躁,四肢厥冷。

24572 白术散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】白术(微炒) 人参 秦艽(去苗土) 当归(切,焙) 天雄(炮裂,去皮脐) 各三分 附子(炮裂,去皮脐) 乌头(炮裂,去皮脐) 各二两 干姜(炮裂) 一两 蜀椒(去目并闭口者,炒出汗) 一两 防风(去叉) 桂(去粗皮) 防己(锉) 草薢(炒) 白薇 桔梗(去芦头,炒) 黄耆(细锉) 各二两 山茱萸 麻黄(去根节,先煮,掠去沫,焙干用) 茵芋(去粗茎) 甘草(炙) 各三分 细辛(去苗叶) 半两

【用法】上为散。每服二钱匕,温酒调下,空心、午时各一次;未效,渐加服之。觉口唇疼痛即减服之。

【主治】恶风,无问新久,四肢不仁,一身尽痛,头目眩倒,口面喎僻。

24573 白术散

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】白术(微炒) 三两 附子(炮裂,去皮脐) 二两 石斛(去根,锉) 半两 蜀椒(去目并闭口者,炒出汗) 干姜(炮) 天雄(炮裂,去皮脐) 细辛(去苗叶,轻炒) 各三分 羊躑躅(微炒) 半两 乌头

(炮裂,去皮脐) 一两 石南(用叶,酒醋微炒) 三分 桂(去粗皮) 一两 防风(去叉) 二两半

【用法】上为散。每服半钱至一钱匕,渐加至一钱半,温豆淋酒三合调下,空心、临卧各一次。每服药后宜以少白羊脯嚼汁下药,续更用三合温豆淋酒冲涤,令接药力,常令有酒气。其药以韦皮袋贮,勿泄其气。初服身与腿膝有汗,宜避外风。

【主治】积年周痹,头发秃落,隐疹生疮,气脉不通,搔之不觉痛痒。

24574 白术散

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】白术(锉,炒) 缩砂仁 河黎勒皮各三分 肉豆蔻三枚(去壳) 甘草(炙,锉) 半分 木香一分 人参 丁香 干姜(炮) 各半两

【用法】上为散。每服三钱匕,米饮调下。

【主治】脏腑寒,泄泻,不思食。

24575 白术散

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】白术 河黎勒(煨,去核) 各三分 甘草(炙,锉) 丁香 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 各一分 木香 桂(去粗皮) 人参 槟榔(半生半熟,锉) 各三分 陈橘皮(去白,麸炒) 草豆蔻(去皮) 各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,生姜、木瓜煎汤调下。

【主治】胃冷,气胀满闷,四肢急,体重。

24576 白术散

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】白术(锉,炒) 人参各二两 丁香 甘草(炙,锉) 各三分 白茯苓(去黑皮) 一两半 草豆蔻(去皮) 陈橘皮(去白,焙) 干姜(炮裂) 各一两 桔梗(炒) 半两

【用法】上为散,研匀。每服二钱匕,生姜、大枣汤调下。

【主治】胸满气逆,呕吐,不思食。

24577 白术散

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】白术一两 白芷 鳖甲(去裙襖,醋炙令焦) 苍术(米泔浸一宿,锉,焙) 防风(去叉) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉) 桂(去粗皮) 人参 陈橘皮(去白,焙) 干姜(炮) 高良姜(炮)各半两 吴茱萸(汤洗三遍,焙干) 柴胡(去苗) 蜀椒(去合口并目,炒出汗) 芎藭 白茯苓(去黑皮) 白芫荇 缩砂(去皮)各一两 附子二枚(炮裂,去皮脐) 沉香(锉) 丁香 当归(炙,锉) 木香各一分

【用法】上为散。每服五钱匕,用猪肝三两,批开,入葱白、盐各少许,掺药在内,湿纸裹,慢火煨香熟为度,空心、食前米饮嚼下。

【主治】冷劳,大便滑泄,食饮不美,有盗汗。

24578 白术散

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】白术一两 人参三分(去芦头) 诃黎勒一两(煨,去核) 陈橘皮一两(汤浸,去白,焙) 草豆蔻一两 桂心三分

【用法】上为末。每服四钱匕,水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】虚劳冷气,心腹痞满,不思饮食,四肢少力。

24579 白术散

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】白术二两(米泔浸一宿,炒) 芍药 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 吴茱萸(汤洗,焙,炒) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 细辛(去苗叶)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,入盐沸汤点服。

【主治】元脏虚冷,腹内雷鸣,夜多小便。

24580 白术散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】白术(锉,炒) 黄柏(去粗皮,

炙)各一两半 白薇半两

【用法】上为散。每服二钱匕,温酒或米饮调下。

【主治】妇人漏下赤白。

24581 白术散

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】白术二两 芎藭 芍药 人参 阿胶(炙令燥)各一两 甘草(炙,锉)半两

【用法】上为散。每服三钱匕,以葱粥饮调下,一日三次。

【主治】妊娠胎不长养。

24582 白术散

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】白术一两(锉,炒) 木香 青橘皮(去白,焙)各半两 丁香 麦蘖(炒) 人参 赤茯苓(去黑皮)各一两 甘草(炙) 槟榔各半两 干姜一分(炮裂)

【用法】上为散。每服二钱匕,入盐少许,沸汤点下,不拘时候。

【主治】妊娠呕逆,不下饮食,胸膈痞闷。

24583 白术散

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】白术一两 人参二两 白茯苓(去黑皮)三分 黄耆(微炙,锉) 姜制半夏各一两 山芋 桔梗(炒) 桑根白皮(微炙,锉) 白芷 五味子各半两 甘草一分(微炙)

【用法】上为散。每服二钱匕,食后、临卧沸汤点下。

【功用】止嗽宽膈,和气进食。

【主治】妊娠痰盛。

24584 白术散

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】白术 芍药(炒)各三分 木香(半生半炒) 缩砂仁 黄连(去须,炒)各半两 陈曲(炒)一两半 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)一两

【用法】上为散。每服二钱匕，煎干姜、米饮调下。

【主治】产后冷痢，脐下痛，羸瘦不能食。

24585 白术散

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】白术 楝实(取肉)各二两 青盐一分

【用法】上锉细，慢火炒黑色留性，捣罗为散。每服二钱匕，热酒调下，一日三次。

【主治】小肠气。

24586 白术散

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】白术二两 芍药三两 桂(去皮)附子(炮，去皮脐，锉)各一两

【用法】上为细末。每服二钱匕，食前温酒调下。

【主治】隐隐腰痛，以热物熨痛处即少缓。由处卑湿，复为风邪伤足太阳之经，其脉缓涩。

24587 白术散

【方源】《全生指迷方》卷四。

【异名】白术汤(《普济方》卷一九二)、全生白术散(《女科撮要》卷下)。

【组成】橘皮(洗) 大腹皮 茯苓 生姜各半两 白术一两

【用法】上为末。每服方寸匕，食前饮调下。

【主治】①《全生指迷方》：妊娠面目肿如水状。②《普济方》：久下痢之后，脾肺虚，不能渐运诸气，肌肉空疏，气无所归，卒然身体足胫面目浮肿，小便反快，脉虚。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳、太阴药也。水病常令上下分清，姜皮、橘皮辛而能散，使水从毛窍出；腹皮、茯苓皮淡而能泄，使水从溺窍出；水盛由于土衰，故用白术之甘温以扶脾土而隄防之，不致泛溢也。

24588 白术散

【方源】《广嗣纪要》卷九引《全生》。

【组成】白术一钱 生姜皮 大腹皮 白茯苓皮 陈皮 桑白皮各五钱

【用法】上咬咀。浓磨木香汁半盏，同煎八分，去滓温服。

【主治】①《广嗣纪要》：妊娠面目虚浮，四肢肿如水气。②《医略六书》：子肿，脉浮濡数者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠脾亏气滞，肺不通调，致湿流四肢，渍于皮肤，溢于头面，故肢腹上下浮肿，谓之子肿。白术健脾以运动其气；桑皮肃金以通其湿；茯苓渗湿气，清治节；陈皮利中气，除痰涎；大腹皮泻滞宽胀；生姜皮散湿退肿也。为散米饮下，使脾气健运，则肺气通调而湿流气化，浮肿无不退，胎气无不安矣。

【备考】《医略六书》本方用法：为散，米饮下。

24589 白术散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】白术汤(《卫生总微》卷十)、钱氏白术散(《局方》卷十吴直阁增诸家名方) 人参白术散(《小儿痘疹方论》)、七味人参白术散(《永类铃方》卷二十一)、清宁散(《得效》卷十二)、七味白术散(《校注妇人良方》卷二十一)、参苓白术散(《片玉痘疹》卷六)、干葛参苓白术散(《痘疹全书》卷上)、七味白术汤(《景岳全书》卷六十四)。

【组成】人参二钱五分 白茯苓五钱 白术五钱(炒) 藿香叶五钱 木香二钱 甘草一钱 葛根五钱

【用法】上咬咀。每服三钱，水煎服。

【功用】健脾养胃，益气升清，生津止渴。

①《小儿痘疹方论》：清神生津，除烦止渴。②《古今医鉴》：和胃生津，止泻痢。③《幼科释谜》：助脾和胃，调中益气。④《小儿药证直诀类证释义》：健脾养胃升清。

【主治】脾胃虚弱，运化失司，津液耗伤，虚热内炽，呕吐，泄泻，霍乱，痢疾，烦渴饮水，羸困少力。

①《小儿药证直诀》：小儿脾胃久虚，呕吐

泄泻，频作不止，精液枯竭，烦渴躁，但欲饮水，乳食不进，羸瘦困劣；及失治后变成惊痫，不论阴阳虚实者。②《宣明论》：伤寒杂病，一切吐泻烦渴霍乱，虚损气弱，及酒积呕哕。③《小儿痘疹方论》：小儿痘疮已靨，身热不退。④《御药院方》：小儿吐泻之后，腹中疼痛，气不和，烦渴，引饮不止；及伤寒泻后，胃中虚热。⑤《得效》：小儿疳渴，烦躁引水，乳食不进，夜则渴甚者。⑥《保婴金镜》：积痛。⑦《医学六要》：消中，消谷善饥。⑧《寿世保元》：小儿胃虚寒所致的冬月吐蛔症。⑨《医略六书》：妊娠口干不渴，脉浮缓者；孕妇泄泻，脉浮软者。

【加减】热甚发渴，去木香；渴者，葛根加至一两。

【方论选录】①《育婴秘诀》：本方治阳明经本虚，阴阳不和，吐泻亡津液，烦热口干。以人参、白术、甘草甘温补胃和里；木香、藿香辛温以助脾；白茯苓甘平，分阴阳，利水湿；葛根甘平，倍于众药，其气轻浮，鼓舞胃气，上行津液，又解肌热，治脾胃虚弱泄泻之圣药也。不问泄痢，但久不止者，并服之。②《医略六书》：妊娠脾胃两亏，清阳下陷，津液不能上敷四达，故泄泻烦渴不解，胎因不安焉。人参扶元气以通血脉，白术健脾土以生血脉，茯苓渗湿和脾，炙草缓中益胃，葛根升清气，最除烦渴，藿香开胃气，兼止泄泻，木香调气以醒脾胃也。为散水煎，使脾胃调和，则清阳上奉而津液四布，泄泻无不止，烦渴无不除，何胎孕之不安哉！③《小儿药证直诀类证释义》：小儿体质娇嫩，气血未充，而气血津液又是生机之本，必须时时顾护珍惜。基于这样的治疗思想，针对胃有虚热，津液亏耗，中气下陷等证，钱氏创立了著名的白术散，此方健脾养胃，又能升清，应用于因运化失司而复津液耗竭，虚热内炽，口渴不止者。方以四君补中，木香、藿香芳香悦脾而健胃，葛根升清止泻，又能解渴，实为临床治疗渴泻之圣药，疳证初起之

妙剂，惟多服则佳。

24590 白术散

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《王氏手集》。

【组成】芍药 当归 官桂 人参 白术 茯苓 粟米（炒）各一两

【用法】上为粗末。每服一钱，水六分盏，煎至三分，去滓温服。

【功用】和中益胃，散风湿。

【主治】小儿肠鸣泄泻，米谷不化，利下青白，腹痛呕逆，胁胀满，气痞不散，体热多睡，全不思食。

24591 白术散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】白术 人参 旋覆花 熟地黄 当归 阿胶各一两

【用法】上为粗末。每服二钱，水二盏，煎三分，同于银器中熬至一盞，去滓，空心温服，一日一次，至六个月觉胎气荣安即罢服。若觉腰痛，即是药养胎气，未胜邪气，每服加吴茱萸四七粒同煎。

【功用】和养胎气。

24592 白术散

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】人参 白术 吴茱萸 阿胶 熟艾 桑寄生 茯苓 当归各等分

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盞，加大枣三个，煎至八分，去滓，空心、食前稍热服，一日二次。

【主治】妊娠胎频动，微微腹痛。

24593 白术散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】吴白术一两 厚朴二两半 橘皮二两 甘草一两半

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，煎至六分，和滓温服。

【功用】和养脾胃。

24594 白术散

【方源】《本事》卷四。

【异名】白术茯苓泽泻汤（《医方考》卷

六)。

【组成】泽泻 白术 茯苓(去皮)各等分

【用法】上为细末。每服一钱，汤调温下。

【主治】脾气不足，水湿内停，食后多吐；或痘如水泡，大便泄泻。

①《本事》：食后多吐，欲作反胃。②《医方考》：痘而水泡。③《痘学真传》：痘家作泻，则液内竭而色干；疮湿则液外走而便结，如泄泻疮湿并见者，此脾胃多湿而不健运也。

【方论选录】①《医方考》：痘疹中有实热，膈有停水、湿热外行，初则痘色晶亮，顷则痘皆水泡矣。此乃水不能润下，灶底燃薪，釜中发泡之义。是方也，白术甘而燥，能益土以防湿；茯苓甘而淡，能益土以决防；泽泻咸而润，能润下而利水。水利湿消，泡自愈矣。②《本事方释义》：泽泻气味咸微寒，入足太阳；白术气味甘温，入足太阴；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明，能引诸药达于至阴之处。此治食后多吐，将成反胃之疴，其人必是酒客，中宫气馁，饮浊上干，三味最能达阴泄浊，又能和中养正，所以确中病情也。

24595 白术散

【方源】《本事》卷四。

【组成】白术 木香 附子 人参各等分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，大枣一个，煎六分，食前温服。

【主治】因忧愁中伤，食结积在肠胃，故发吐利。自后至暑月稍伤，则发暴下，数日不已。

【方论选录】《本事方释义》：白术气味甘温，入足太阴；木香气味辛温，入足太阴；附子气味咸辛大热，入手足少阴；人参气味甘温，入脾胃；姜、枣和营卫。此方因温下之后，病去元虚，尤恐未尽之积复聚，治以辛香疏滞，中焦不致留邪；咸辛暖下，下焦亦不致留邪；则甘温之补，引受其益，焉有不能复元者乎！

24596 白术散

【方源】《本事》卷十。

【异名】白术舒脾散(《医略六书》卷二十八)。

【组成】白术(炒) 干紫苏各一两 白芷(微炒)三分 人参三分(去芦) 川芎(洗) 诃子皮 青皮(去白)各半两 甘草一分(炙)

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，煎七分，不拘时候温服。

【主治】①《本事》妊娠气不和谐，饮食少。②《医略六书》：孕妇脾虚难化，脉浮缓者。

【方论选录】《本事方释义》：白术气味甘温。微苦，入足太阳；干苏叶气味辛温，入足太阳；白芷气味辛温，入足太阳；人参气味甘温，入足阳明；川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；诃子气味温湿，入手阳明、足太阳；青皮气味辛酸微温，入足少阳、厥阴；甘草气味甘平，入足太阴，通行十二经络，能缓诸药之性；生姜辛温入卫，凡妇人妊娠气不和谐，饮食不节，以致脾胃不和，必鼓动脾阳，使其健运，亦必以扶持胎气为要耳。经云：饮食自倍，脾胃乃伤。又云：阴之所生，本在五味；阴之五官，伤在五味。若妊子饮食不节，生冷毒物，恣性食噉，必致脾胃之疾，故妊娠伤食，难得妥药，唯此方最稳捷。②《医略六书》：妊娠脾胃虚弱，饮食不能消化，故胸腹满闷，胎孕因之不安。白术健脾土以化食，人参扶元气以安胎，紫苏理血气以散满，白芷升清阳以开胃，青皮平肝气，甘草和胃气，诃子涩玄府以防散药之疏泄也。为散，砂仁汤下，使滞散气行，则脾胃内强而饮食自化，满闷自除，何胎孕之有不安哉！

【备考】《医略六书》本方用法：每服三钱，熟砂仁汤下。

24597 白术散

【方源】《本事》卷十。

【组成】白术 人参各二钱 半夏曲二钱 茯苓 干姜 甘草各一钱

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，大枣三个(擘，去核)，煎至七分，

去滓温服，一日二三次。

【功用】《本事方释义》：温养中宫，通调营卫。

【主治】小儿呕吐，脉迟细，有寒。

【方论选录】《本事方释义》：白术气味甘温微苦，入足太阴；人参气味甘温，入足阳明；半夏曲气味甘辛微温，入足阳明；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明；干姜辛温，入手足太阴；甘草气味甘平，入足太阴；姜、枣之辛温甘，和营卫。小儿挟寒呕吐，脉迟细者，恐延成慢惊，故必温养中宫，通调营卫，则正气旺而呕吐除，病何由入乎！

24598 白术散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】白术二两 干山药 白茯苓各一两 人参(去芦) 木香 白扁豆(炮) 藿香(去土)各半两 甘草一分(炙)

【用法】上为末。每服一钱，紫苏汤下；喘者，陈皮汤下，不拘时候。

【主治】小儿吐逆，或加喘促。

24599 白术散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】白术 砂仁 陈皮 人参 甘草 草蔻 茯苓 藿香 乌药 香附 竹茹 前胡 川芎 白芍 当归 姜 枣

【功用】豁痰导水，理气养血。

【主治】妊娠恶阻。妇人素禀怯弱，或受风寒，或当风取凉，或中脘有宿痰，受妊之后，经血既闭，饮食相搏，气不宣通，遂使肢体沉重，头目昏眩，好食酸咸，多卧少起，甚或憎寒壮热，心中愤闷呕吐，恍惚不能支持。

【方论选录】是方四君以补气；芎、归、芍以养血，砂、陈、藿、蔻、香附以温中和胃；竹茹、前胡以豁痰；乌药以理气；姜、枣和营卫，生津液。

24600 白术散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】川芎 当归 白芍 茯苓 白术 甘草 木香 广皮 香附 乌药 前胡 紫

苏 竹茹 延胡索

【主治】妊娠心痛，乃风寒痰饮客于心之经络，邪气与正气相搏而作也。若真心痛，旦发夕死，夕发旦死，指甲唇口俱青。乍安乍甚者，乃伤心之别络而痛也。或暴怒气上，或食积停滞，痛而不已，损伤于脏则胎动不安，久而不愈，必致堕胎。

【方论选录】是方芎、归、芍、苓、甘、术以补气血，而固胎元；附、香、陈、乌以行滞气，更可消食；前、茹以消痰饮；延胡以行血中滞气、气中滞血；紫苏散外邪，宽胸祛胀。凡因风寒、痰饮、食积、滞气、瘀血致心痛而胎不安者，并能治之。但乌药太燥，延胡太峻，恐伤胎气，酌而用之。雷公云：心痛欲死，急觅玄胡。如血虚心痛，以手按之而痛稍止者，不可服前方。

24601 白术散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】人参 白术 陈皮 甘草 香薷 厚朴 藿香 乌药 茯苓 猪苓 泽泻 苍术 木瓜 干葛 竹茹

【主治】妊娠霍乱，阴阳不和，清浊相干；或胃气素虚，饮食过度，触冒风寒，填塞上中二焦，以致挥霍撩乱。或吐或泻，或吐泻交作，胎气上逼心胸，甚则反目上视，手足厥，冷汗。

【方论选录】是方四君以固中，猪、泽以利水，藿、陈、厚朴以和胃，苍术、乌药燥湿理气，木瓜恐有转筋，葛根引入阳明，竹茹清胃火、止烦逆，香薷亦佐行水，非清暑也。

24602 白术散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】白术 茯苓 苏叶 人参 苍术 川芎 诃子仁 甘草 腹皮 陈皮 青皮 木香 厚朴 当归 白芍 砂仁

【主治】妊娠伤食症。由饮食不节，恣食生冷致伤脾胃，轻则胸腹胀满暖气，重则脾虚不能运化，寒则完谷不变，热则粪黄臭不可当，日久不愈变为滞下，胎气受伤。

【方论选录】是方四君子壮土健脾；芍、归养血安胎；胸膈腹胀，则以青、陈、腹、朴运之消之；脾虚脏寒，以苍、砂、木香和之温之；伤食必腹痛，芍、甘缓之止之；紫苏气芳香而性轻浮，用于醒脾，升发胃中元气，培复谷气；诃子之涩，或以完谷泄痢而暂用之，不可过也。

24603 白术散

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】牡蛎(煅)三钱 白术一两二钱半 防风二两半

【用法】上为末。每服一钱，温水调下，不拘时候。

【主治】虚风多汗，食则汗出如洗，少气痿劣，久不治必为消渴证。

【加减】如恶风，倍防风、白术；如多汗面肿，倍牡蛎。

24604 白术散

【方源】《三因》卷四。

【组成】白芷 甘草(炒) 青皮 陈皮 白茯苓 桔梗 山药 香附(去毛)各三两 干姜半两 白术一两

【用法】上为末。每服二钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣一个，木瓜干一片，紫苏两三叶，煎七分，食前服。若吐泻，入白梅煎；喘，入桑白皮、杏仁煎；伤寒劳复，入薄荷；膈气，入木通三寸、麝香少许；中暑呕逆，入香薷；产前产后，血气不和，入荆芥煎；霍乱，入藿香煎；气厥，入盐汤调下。

【主治】伤寒，气脉不和，憎寒壮热，鼻塞脑闷，涕唾稠粘，痰嗽壅滞；或冒涉风湿，憎寒发热，骨节烦疼；或中暑呕吐，眩暈；及大病后，将理失宜，食复、劳复，病证如初；又治五劳七伤，气虚头眩，精神恍惚，睡卧不宁，肢体倦怠，潮热盗汗，脾胃虚损，面色萎黄，饮食不美，呕吐酸水，脏腑滑泄，腹内虚鸣，反胃吐逆，心腹绞痛，久症久利；及膈气咽塞，上气喘促，坐卧不安；或饮食所伤，胸膈痞闷，腹肋腹胀；妇人产前产后，血

气不和，霍乱吐泻，气厥不省人事；辟四时不正之气及山岚瘴疫。

24605 白术散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】木香一分 白术 青橘皮(去白) 黑牵牛(半生半炒) 桑白皮(生)各半两

【用法】上为细末。每服半钱，温米饮调下，不拘时候。

【主治】小儿脾肺不调，饮食无度，腹胀喘粗，头面手足虚浮。

24606 白术散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】白术 茯苓 半夏(洗) 黄芩各等分

【用法】上为粗末。每服五钱至七钱，水二盞，加生姜十片，煎至一盞，去滓，调陈皮末一钱，神曲末一钱，食后服。

【主治】夏暑大热，或醉饮冷，痰湿不止，膈不利。

24607 白术散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】白术 泽泻各半两

【用法】上为细末。每服三钱，煎茯苓汤调下。或丸亦可，服三十丸。

【主治】水肿觉胀下者。

【宜忌】《洁古家珍》：忌房室、鱼、酒等物。

【备考】本方改为丸剂，名“白术丸”(见《洁古家珍》)。

24608 白术散

【方源】《洁古家珍》。

【组成】白术 芍药 茯苓各等分

【用法】上为末。水煎服。

【主治】泻痢证。四肢懒倦，小便不利，大便走，沉困，饮食减少。

【加减】如发热或恶热，或腹不痛而脉疾，加黄芩为主；如未见脓血而恶寒，乃太阴而传少阴，加黄连为主，桂枝佐之；如腹痛甚者，加当归，倍芍药；如见白脓，加黄芩为主；如见血，加黄连为主，桂枝、当归佐

之。

24609 白术散

【方源】《普济方》卷三三七引《十便良方》。

【异名】白术汤（《校注妇人良方》卷十二）、四味白术汤（《景岳全书》卷六十一）。

【组成】白术一两 人参半两 丁香二钱半 甘草一钱

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，加生姜五片，煎至七分，温服。

【主治】①《普济方》引《十便良方》：妊娠恶阻，吐清水，甚则十余日粥浆不入者。②《医略六书》：恶阻，脉虚弦者。

【方论选录】《医略六书》：妊娠胃气暴虚，寒伏中脘，故呕吐清涎。是恶阻，因于胃虚挟寒焉。人参扶元以补胃之虚，白术健脾以壮胃之弱，丁香温中散寒滞，甘草缓中和胃气，稍佐生姜以止呕也。为末姜煎，使虚回寒散，则胃气调和而恶阻无不退矣。

24610 白术散

【方源】《百一》卷六。

【组成】白术二两 人参（去芦） 白茯苓（去黑皮） 黄耆各一两 山药 百合三分（去心） 甘草（炙）半两 前胡（去芦） 柴胡（去芦）各一分

【用法】上为散。每服一钱半，水一盞，加生姜三片，大枣一个，同煎至六分，温服，日三服。

【功用】行营卫，顺气止血，进食退热。

【主治】①《百一》：吐血、咯血。②《中国医学大辞典》：脾肺气虚。

【宜忌】忌食热面、煎炙、海味、猪、鸡一切发风之物；酒不宜，饮食不宜饱。

【备考】方中山药用量原缺。本方改为丸剂，名“白术丸”（见《中国医学大辞典》）。

24611 白术散

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】白术（炒） 芍药 藁本（去苗土）各一两 续断（去枯者） 当归（酒洗，

焙）各二两 虎骨（酥炙） 乌蛇肉各半两

【用法】上为细末。每服二钱匕，温酒调下。

【主治】中风，身体麻痹不仁。

【加减】脏寒多痢者，加附子半两；骨中烦热者，加生地黄一两。

24612 白术散

【方源】《朱氏集验方》卷二引赵冀公方。

【组成】白术不拘多少（锉成小块或稍大，用浮麦一升，水一斗，煮干，如白术尚硬，又加一二升煮，取出切作片，焙干，去麦不用）

【用法】上为细末。别用浮麦汤，每服二三钱，不拘时候。

【主治】①《朱氏集验方》：盗汗。②《良朋汇集》：多汗盗汗，四肢作痛，饮食少进，面黄肌瘦。

24613 白术散

《朱氏集验方》卷二。为《圣济总录》卷八十“白术汤”之异名。见该条。

24614 白术散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】白术 丁香 肉豆蔻（面裹） 陈皮 甘草各等分

【用法】上为细末。白汤调下；慢惊沉困，冬瓜子煎汤下；若见水即吐，进药不得，吐止用枣子点药干吃。

【功用】调理三焦，大进饮食。

【主治】小儿呕吐，冷痢。

24615 白术散

【方源】《医方大成》卷十引《经济方》。

【组成】白术 丁香 肉豆蔻 青皮 甘草 茯苓各等分

【用法】上为末。每服一钱，紫苏汤下。

【功用】小儿脾胃虚弱。

24616 白术散

《得效》卷二。为《三因》卷六“麻黄白术散”之异名。见该条。

24617 白术散

《得效》卷五。为《三因》卷十二“白术汤”之异名。见该条。

24618 白术散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《医林方》。

【组成】白术 芍药各一两 甘草五钱

【用法】上为细末。每服三钱，白汤调下。

【主治】米谷不化，泻痢不止。

24619 白术散

【方源】《普济方》卷二十九。

【组成】白术一斤 肉桂半斤 干地黄 泽泻 茯苓各四两

【用法】上为末。每服方寸匕，米饮下，一日三次。两服佳。

【功用】补肾气。

【主治】肾虚。

24620 白术散

《普济方》卷一三〇。即《圣惠》卷九“和气白术散”。见该条。

24621 白术散

《普济方》卷一三一。即《圣济总录》卷二十一“白术饮”。见该条。

24622 白术散

【方源】《普济方》卷一三九。

【组成】白术 甘菊花 赤茯苓 人参 前胡(去芦头) 半夏(汤浸七次去滑) 旋覆花各三分 石膏一两 附子(炮裂，去皮脐) 大腹皮(锉) 甘草(炙微赤，锉)各半两

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒痰滞在胸膈间不散，身体壮热，头目昏沉，胃气不和，少思饮食。

24623 白术散

《普济方》卷一五四。即《杨氏家藏方》卷四“天麻除湿汤”。见该条。

24624 白术散

《普济方》卷一六一。为原书同卷引《济生》“白术汤”之异名。见该条。

24625 白术散

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】白术一两 附子一两 龙骨二两 黄连一两 阿胶二两 甘草一两 赤石脂三两 地榆二两 当归一两

【用法】上为细散。每服二钱，粥饮调下，不拘时候。

【主治】久赤白痢不止，腹中疼痛。

24626 白术散

【方源】《普济方》卷三二四。

【组成】曲末二升 麦蘖末一升 生地黄(肥者，切)三升 白术八两 牛膝(切)三升 桑甘(金色者，锉)三升 姜黄八两(一作干姜) 当归十四分 生姜(和皮切)三升 桃仁 杏仁各二升(去皮尖及双仁者，热熬) 近用橘皮八两

【用法】上切细，于臼中以木杵捣之如泥，纳瓶中，以物盖口封之，勿令泄气。蒸于一大石米中，饭熟出，入停屋下三日，开出晒干，捣为散。每服方寸匕，酒送下，一日二次，渐加至一匕半。若不能散，蜜丸服之亦得，每服三十丸，一日二次。

【主治】妇人腹内冷癖，血块虚胀，月经不调，瘦弱不能食，无颜色，状如传尸。

【宜忌】初服十日内忌生冷难消之物，以助药势。过十日外，百无所忌，恣口任意食之，人肥健，好颜色。忌桃、李、雀肉、茺萸。

24627 白术散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 藿香 山药 扁豆(炒)各等分

【用法】上为末。每服一钱，热汤点服。

【主治】小儿变蒸风，吐乳自泄。

24628 白术散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】白术 木香(炮) 甘草(炙) 茴香(炒) 青皮(浸，去皮，切) 巴豆三十枚，去皮膜，同青皮一处炒了，仍去巴豆不用)各半两

【用法】上为末。饭饮调下。

【主治】小儿水气肿。

24629 白术散

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】白术一两 人参 白茯苓 白扁豆 山药 甘草(炒) 粉葛 糯米各半两

【用法】上为末。一岁半钱，水半盏，煎三分服。

【功用】滋养津液，助气补虚。

【主治】小儿吐泻，失亡津液，身凉烦渴，不食，困倦少力，亦治虚热。

24630 白术散

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】白术一两 陈橘皮(汤浸，去白，焙干) 人参(去芦头) 桑根白皮(锉，研) 半夏(汤浸七次，焙干)各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水一小盏，加生姜二片，煎至五分，去滓温服。

【功用】滋津液。

【主治】呕吐。

24631 白术散

《医学纲目》卷十六。为《外台》卷三十三引《古今录验》“术汤”之异名。见该条。

24632 白术散

《医学纲目》卷二十二。为《保命集》卷中“白术汤”之异名。见该条。

24633 白术散

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】白术 川乌 桔梗 细辛 干姜 羌活 防风 肉桂 甘草

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】阴疽。

【加减】自汗，加黄耆。

24634 白术散

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】白术 人参 木香 黄耆 甘草 白茯苓 藿香 葛根

【用法】水煎服。

【主治】痘疮，内虚作热，泄泻而渴者。

24635 白术散

《医统》卷三十五。为《保命集》卷中“白术汤”之异名。见该条。

24636 白术散

《医统》卷五十三。为《圣济总录》卷十七“白术饮”之异名。见该条。

24637 白术散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】川芎一钱 归身八分 白术(土炒)五分 白芍(酒炒)八分 竹茹五分 紫苏一钱 前胡八分 木香五分 乌药八分 香附(便制)一钱 陈皮八分 甘草四分

【用法】上锉。水煎，食远服。

【功用】定痛安胎。

【加减】如兼腹痛，加砂仁、泽泻。

24638 白术散

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】人参 白术 茯苓 藿香 木香 甘草各一两 干姜二两 乌梅一个

【用法】上为细末。每服一二钱，水煎服。若加伏龙肝极妙。

【主治】小儿泄泻，时常作渴。

24639 白术散

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】人参 白术 甘草 木香 花粉 干葛 藿香 麦冬 白芍 白茯苓

【用法】莲肉、生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】痘疮收靥，时时作渴，泄泻者。

【加减】虚寒甚者，加干姜(炒)、诃子肉、乌梅肉。

24640 白术散

《医学六要·治法汇》卷二。为《济生》卷一“白术饮”之异名。见该条。

24641 白术散

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】白术 白茯苓各二钱 神曲 天麻各一钱 橘皮(去白) 麦蘖 半夏各一钱五分 生姜五片

【用法】上吹咀。水煎，食前温服。

【主治】脾胃虚弱，身重有痰，噁心欲吐者。

24642 白术散

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】白术 猪苓 泽泻 山药 莲肉
白茯苓 人参 炙甘草

【功用】实脾利水。

【主治】脾虚身肿。

24643 白术散

【方源】《诚书》卷九。

【组成】人参 茯苓 白术 藿香 甘草
砂仁 山药 泽泻 肉豆蔻(面煨)

【用法】加生姜三片，莲子七粒，水煎服。

【主治】久泄。

24644 白术散

【方源】《女科指掌》卷三。

【组成】白术 茯苓 泽泻 陈皮 姜皮
大腹皮 木香

【用法】上为末。砂仁汤下。

【主治】胎水。妊娠五六月腹大异常，胸腹胀满，手足面目浮肿，气逆不安者。

24645 白术散

【方源】《痘诀余义》。

【组成】广陈皮三钱 白术(土炒)三钱
茯苓(生用)四钱 木香(面包煨)二钱 锅巴四钱 炙甘草二钱

【用法】上为细末。撒粥中与食。

【主治】痘，里虚泄泻者。

24646 白术散

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】白术三钱(微炒) 云苓二钱 薏苡仁五钱(炒) 鲜石斛四钱 葛根二钱 木瓜五分 生甘草五分

【用法】加石莲肉二十枚，水煎，温服。

【主治】脾家湿热，唇沈湿烂。

24647 白术散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】白术一钱(土炒) 茯神一钱(炒黑) 归身一钱 小洋参五分 龙骨一钱(煨) 浮小麦一钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿心虚血热，自汗、盗汗。

24648 白术散

【方源】《证治宝鉴》卷十二。

【组成】枳 术 桂 豉 甘 杏 葛

【主治】酒疸误下，致变黑疸。

24649 白术散

《全国中药成药处方集》。为《局方》卷三(绍兴续添方)“参苓白术散”之异名。见该条。

24650 白术煎

《普济方》卷三二七。为《妇人良方》卷二“朱翰林白术煎”之异名。见该条。

24651 白术煎

《仙拈集》卷一。为《金匱》卷上“防己黄耆汤”之异名。见该条。

24652 白术膏

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】白术半两 白茯苓 人参(去芦)滑石各一分 泽泻半两

【用法】上为末，炼蜜和膏。每用一皂子大，米饮化下，不拘时候。

【主治】小儿暑月中热，或伤暑伏热，头目昏痛，霍乱吐泻，腹满气痞，烦躁作渴，小便不利；并治小儿脾胃不和，腹胀气痞，不美乳食。

24653 白术膏

【方源】《扶寿精方》。

【异名】助胃膏。

【组成】人参 白术(炒) 白茯苓各二钱 甘草(炙)二钱 白豆蔻七分 肉豆蔻二个(面包煨) 木香一钱 山药五钱 砂仁二十个(炒)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如肥皂子大。每服一九，空心米饮化下。

【功用】①《扶寿精方》：和脾胃，进饮食。②《全国中药成药处方集》(沈阳方)：利水消积。

【主治】①《扶寿精方》：小儿吐泻。②《全国中药成药处方集》(沈阳方)：小儿伤乳停食，胃弱脾虚，中气不足，小水不利，寒湿腹痛，泄泻不止。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(沈阳方)：

忌生冷硬物。

【备考】本方方名，据剂型当作“白术丸”。

24654 白术膏

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【异名】白术助胃丹（《医便》卷四）。

【组成】上好片术（全无一些苍色者）。

【用法】切开，入瓷锅，水浮于药一手背，文武火煎干一半，倾置一瓶盛之。又将滓煎，又如前并之于瓶，凡煎三次，验术滓嚼无味乃止，去滓，却将三次所煎之汁，仍入瓷锅内文武火慢慢熬成膏。

【功用】健脾祛湿，温中止泻，益气固表。

①《摄生众妙方》：补养。②《本草纲目》引《千金良方》：止久泄痢。③《寿世保元》：善补脾胃，进饮食，生肌肉，除湿化痰，止泄泻。④《冯氏锦囊·痘疹》：补中气，固自汗。⑤《北京市中药成方选集》：理脾和胃，温中止泄。⑥《赵炳南临床经验集》：健脾祛湿。

【主治】①《古今医鉴》：脾胃大虚，自汗乏力，四肢怠倦，饮食不思，或食而不化，呕吐泄痢，泻下完谷、白沫。②《赵炳南临床经验集》：慢性湿疹（顽湿），下肢慢性溃疡（臃疮），手足汗疱疹。

【备考】《本草纲目》引《千金良方》本方用法：每服二三匙，蜜汤调下。《痘疹全集》：虚极者，人参汤调服。

24655 白术膏

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】白术一斤 人参四两

【用法】上切，以沸过熟水十五碗浸一宿，次日桑柴文武火煎成膏，仍成一斤四两，入炼蜜四两。以白沸汤调服。

【功用】补养。

24656 白术膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】白术一斤 陈皮四两

【用法】煎膏服。

【主治】一切脾胃不和，饮食无味，泄泻。

24657 白术膏

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷五。

【组成】白术十斤（取于潜出者，先煮粥汤待冷，浸一宿，刮去皮，净，切片，用山黄土蒸之，晒干，再以米粉蒸之，晒干）

【用法】上用水百碗，柴火煎至三十碗，加白蜜二斤，熬成膏。每服一酒杯，淡姜汤点服。

【功用】补脾健胃，和中进食。

【方论选录】太阴主生化之源，其性喜燥，其味喜甘，其气喜温，白术备此三者，故为中宫要药。配以白蜜，和其燥也，且甘味重则归脾速。陶氏颂云：百邪外御，六腑内充，味重金浆，芳躅玉液，岂无故而得此隆誉哉？

24658 白术膏

【方源】《名家方选》。

【组成】猪皮 桑白皮（生）各三钱 白术 瓢肉（为末）各二钱八分 黑豆三合

【用法】以水二升，煮取四合，去滓，入酒五合，更煮取三合，令如泥，更加术末。每服二钱，白汤送下。

【主治】水肿迫胸部者。

24659 白石方

【方源】《扶寿精方》。

【组成】五灵（炒烟尽，研细） 阿魏（研细）各等分

【用法】用雄黄、狗胆汁为丸，如黍米大。每服三十丸，空心唾津送下。

【主治】痞块、疝积、噎膈。

【宜忌】忌羊肉、醋、面。

24660 白龙丸

【方源】《普济方》卷四十六引《博济》。

【组成】白附子（炮） 附子（炮裂，去皮脐） 半夏（洗去滑，切，焙） 天南星（炮）各半两 麝香（研）少许 凝水石三两（用炭火三斤煨通赤，埋于地坑内，出火毒，候冷取出） 乌头（炮裂，去皮脐）一两 龙脑（研）少许

【用法】上为细末，用面糊为丸，如豌豆大。

每服三丸至五丸，空心、食前薄荷温酒茶送下。

【主治】首风，每发头痛难忍。

24661 白龙丸

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】石膏半斤（火煨过，如面，分为三停，留一停为衣）川乌头（去皮）甘草天南星各四两（各生用）肉桂甘菊花各二两防风白僵蚕京芎各一两半牛膝海桐皮（去皮，水浸）麻黄（去节用）甘松（洗）川白芷藁本（洗）各一两

【用法】上为散，研和令匀，用糯米拣择净煮粥研烂，旋旋入药和匀，杵为剂，丸如大鸡头子大，微干上衣。每服一丸，空心，夜卧用煨葱暖酒嚼下。如中急风，用两丸，薄荷自然汁半盏，酒半盏，磨化灌下，衣被盖出汗；妇人血风，当归酒送下，伤寒头痛，葱酒送下；常服，茶、酒任下；小儿急慢惊风，量大小，金银汤磨下。

【主治】头风，并诸般风疾。

24662 白龙丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】半夏十枚（大者，汤洗去滑，生姜汁制，切，焙，捣末）硃砂一钱（去砂石，研）巴豆八粒（去皮心膜，研，不出油。以上三味同用枣肉和搜为剂，外以生白面裹，烧面熟为度，去面不用）膩粉粉霜各一钱龙脑一字（以上三味细研）

【用法】上同和捣匀，为丸如麻子大。每服五丸至七丸，小儿一二丸，甘草汤送下。

【主治】大人小儿，上喘咳嗽，呀呷有声，痰涎痞闷。

24663 白龙丸

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】天南星四两（以生姜四两同捣成饼）川乌甘草藁本甘松白芷桂心各二两海桐皮一两石膏二两（煨，研极细）

【用法】上为末，糯米糊为丸，如弹子大，石膏为衣。每服大人一丸，小儿半丸，茶清送下；若治伤寒，姜、葱汤送下，出汗。

【主治】风邪，言语不遂，面如虫行，手足麻木，头旋眼晕，及伤风伤寒，头痛拘急，小儿急慢惊风，大人风抽失音。

24664 白龙丸

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【组成】藁本（去土）细辛白芷川芎甘草各等分

【用法】上为细末，用药四两，加石膏末一斤（系煨了者），水搜为丸，每两八丸。每服一丸，食后薄荷茶嚼下；风虫牙，一丸分作三服，干揩后用盐汤漱之，更用葱茶嚼下。

【主治】①《局方》（绍兴续添方）：男子、妇人一切风，遍身疮癣，手足顽麻，偏正头疼，鼻塞脑闷，及伤寒头风。②《丹溪心法》：酒渣鼻。

【备考】《丹溪心法》治酒渣鼻，以白龙丸末，逐日洗面，如澡豆法，更髻少时，方以汤洗去，食后常服龙虎丹一贴。

24665 白龙丸

【方源】《百一》卷十九。

【组成】白石脂一分（只白礞好者亦得）白龙骨一分

【用法】上为细末，滴水为丸，如芥子大。每服三四十九至五十丸，紫苏、木瓜汤送下，一日三次。

【主治】①《百一》：小儿泻清水不止。②《普济方》：婴孩乳食不消，泻不止。

24666 白龙丸

【方源】《医方类聚》卷二十四引《施圆端效方》。

【组成】白附子明天麻藁本（去土）缩砂仁荆芥穗川羌活细辛（去叶）川独活薄荷叶藿香叶麻黄（去根节）甘松（去土）各一两葛根防风白芷川芎桔梗香附子（炒）甘草（炒）川乌（生，去皮）石膏各二两寒水石

(烧)一斤半

【用法】上为细末，鹅梨汁为丸，每两作十丸，别用水石粉为衣，阴干。每服一丸，食后细嚼，茶、酒任下，一日两次。嗽，含化；伤风，葱白酒送下；小儿，薄荷酒送下。难衣，用绿豆粉飞过，与水石粉同匀衣之妙。

【主治】男子妇人，卒暴中风，口眼喎斜，神昏涎堵，筋脉拘急，肢体顽痹，头目旋运，呕逆恶心，皮肤瘙痒，偏正头疼，暗风倒仆，男子肾风，妇人血风，伤风咳嗽，声重，鼻渊，小儿慢惊，吐泻霍乱，手足厥冷，湿风痙病，痲疯潮搐，昏乱不省，一切诸风。

24667 白龙丸

【方源】《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》。

【组成】滑石二两（研碎，水飞过，焙干）

【用法】用酒或醋糊为丸，如弹子大。如用时，将药火内烧通红，放于碗内，急用热酒两盏，倾在内，其药自化，趁药热即服用。被盖之，汗出即愈。

【主治】伤寒。

24668 白龙丸

【方源】《永类铃方》卷二十一。

【组成】附子（炮）半两 白石脂（煨）白龙骨（煨）一分（一方加白矾，煨，一分）

【用法】上为末，面糊为丸，如小豆大，三岁服三十丸，米饮送下。

【主治】小儿吐泻不定，滑泄注水，小便少。

24669 白龙丸

【方源】《医学纲目》卷二十六引丹溪方。

【组成】半夏 滑石 茯苓 白矾（枯）各等分

【用法】上为末，神曲糊为丸服。

【主治】酒积有痰。

24670 白龙丸

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】南硼砂一钱半 缩砂一钱 地栗三十个（去皮） 甘草二钱 寒水石二钱（烧） 白僵蚕（直者）三十个 桂心二钱 白

茯苓二钱

【用法】上为细末，水为丸，如小豆大，蛤粉为衣。咽喉中有一切痰痛，用清水半盏，放药在内，用竹箸搅动出，细呷之。

【主治】一切口内诸疮。

24671 白龙丸

【方源】《解围元藪》卷三。

【异名】辅龙丹。

【组成】乳香 没药 川乌 草乌 地龙 南星各等分

【用法】上为末，酒糊为丸。每服四十丸，或酒或荆芥汤送下。服至四两除根。外以石楠叶煎汤洗沃。

【主治】风湿，腰胯以上至肩背大痛，肘臂僵软，匙箸难举，伛偻脊高。

24672 白龙丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】鹿角霜二两 龙骨（生用）一两 牡蛎（火煨）二两

【用法】上为细末，酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐汤或酒送下。

【功用】固精壮阳。

【主治】虚劳肾损，梦中遗精，白淫滑泄，盗汗。

24673 白龙丸

《本草纲目》卷九。即《得效》卷五“硫黄散”改为丸剂。见该条。

24674 白龙丸

《诚书》卷九。为《百一》卷七“玉壶丸”之异名。见该条。

24675 白龙丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】生军二两 生半夏一两 北辛二两

【用法】上为末，鸡子清为丸。每服三钱，开水送下。此丸不宜久服。

【主治】湿热下注，淋浊初起，小便涩痛。

24676 白龙丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】川大黄 穿山甲 雄黄 僵虫各

四两 乳香 没药各三两

【用法】上为细末，酒泛为丸，滑石六两为衣。每服二钱，熟汤送下。不宜多服。

【主治】湿热下注，淋浊初起，小便涩痛。

24677 白龙丹

【方源】《博济》卷二。

【组成】雷丸末二钱 甘遂末三钱 牵牛一两（杵，取末六钱，不用再罗者） 龙脑少许 粉霜四钱 轻粉四钱（入白面少许，三味同研令匀细，滴水和作饼子，于慢火内煨令热，放冷，再研令细）

【用法】上为细末，研令匀，入青州枣煮熟，取肉和为丸，如绿豆大。每服五七丸，温浆水送下。如一切风痢惊搐涎滞，并服七丸，及至十丸，浆水送下。如小儿痰热，及渴不止，头疼，但频少与服，自然消除。大人风气壅盛，上焦不利，最宜服此，更在临时酌其加減。

【功用】化痰涎，利胸膈，逐风秘。

24678 白龙丹

【方源】《本草纲目》卷十一引《经验方》。

【组成】枯明矾

【用法】上为末，飞罗面醋打糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸。白痢，姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；泄泻，米汤送下。

【主治】泄泻下痢。

24679 白龙丹

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】川芎 防风各十二两 滑石一斤。草乌十两（生用） 两头尖 甘草各八两 川乌 桔梗 寒水石各四两 何首乌二两四钱 茴香一两七钱 广木香一两半 地骨皮一两七钱 白及一两四钱 藁本 甘松 白芷 香附子 良姜 薄荷 当归 白芍药 羌活 川椒（去子，炒） 广零陵香 藿香叶 全蝎（不炒） 细辛 荆芥穗 甘菊花 麻黄（去根）各一两 人参 升麻 天麻 僵蚕（炒断丝） 干葛各七钱 蕲州白花蛇一条（去头尾，酒浸三日，去骨皮，将肉焙干，为

末） 乌梢蛇一条（同上制） 豆粉四两（为糊） 麝香一钱（同滑石为衣） 白面半斤（蛇酒为糊）

【用法】上为末，打糊，蛇酒为丸，如弹子大，滑石为衣，晒干收用。每服一丸，临卧茶清或酒化下。

【主治】男子妇人诸般风证，左瘫右痪，半身不遂，口眼喎斜，腰胸疼痛，手足顽麻，语言謇涩，行步艰难，遍身疮疥上攻头目，耳内蝉鸣，痰涎不利，皮肤瘙痒，偏正头痛，一切诸风。

24680 白龙丹

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】炉甘石一钱 玄明粉五分 硼砂三分 片脑一分

【用法】上为细末。点眼。

【主治】一切火热眼及翳膜胬肉。

24681 白龙丹

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】芒消一钱 朱砂一分 麝香一分 冰片一分

【用法】芒消用白消，放于销银锅内，用新瓦盖口，炭火溶化，倾于碗中，凝成，拣白玉色者，取起听用，并别药同研细末。

【主治】赤目后生翳膜。

24682 白龙丹

【方源】《医部全录》卷二九一。

【组成】明枯矾

【用法】上为末，飞罗面醋打糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，东南桃心七个煎汤送下。

【主治】疟疾寒热。

24683 白龙汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】桂枝 白芍（酒炒） 龙骨（煨） 牡蛎（煨）各三钱 甘草（炙）三钱

【用法】上锉一剂。加大枣两个，水煎服。

【主治】男子失精，女子梦交，自汗盗汗。

24684 白龙散

【方源】《证类本草》卷三引《经验方》。

【组成】马牙消(光净者)

【用法】用厚纸裹令按实,按在怀内着肉处养一百二十日,取出,研如粉,入少龙脑,同研细。每用药末两米许,点目中。

【功用】退翳明目。

【主治】①《证类本草》引《经验方》:不计年岁深远,眼内生翳膜,渐渐昏暗,远视不明,但瞳人不破散者。②《普济方》:目生胬肉,或痒或痛不可忍。

24685 白龙散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】龙脑 马牙消各半钱 绿豆粉一钱

【用法】上为极细末。用灯心蘸药点之,一日四五次。

【主治】睛漏疮,目大眦出脓汁,有孔子。

24686 白龙散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】蛤粉 白矾各二两 青盐一两

【用法】上为末。用生油调涂肿处。

【主治】热肿赤痛。

24687 白龙散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】天浆子(有虫者)一枚 白僵蚕(直者,炒)一枚

【用法】上为散,加膩粉少许,以薄荷自然汁调灌之,取下毒物;量儿大小,分作二服,亦得。

【主治】小儿脐风。

24688 白龙散

【方源】《中藏经·附录》卷七。

【组成】白善粉一两 铜绿一钱(别研入)

【用法】上同再研匀。每用半钱,百沸汤化开,以手指洗眼;或滴水为丸,如鸡头子大服亦得。

【主治】风毒赤烂,眼眶倒睫,冷热泪不止。

24689 白龙散

【方源】《中藏经·附录》卷七。

【组成】寒水石(生) 甘草(半生半炙) 葛粉各等分

【用法】上为细末。每服二钱,浓煎麦门冬苗汤调下。

【主治】消渴。

24690 白龙散

【方源】《幼幼新书》卷十八引王兑方。

【组成】乌牛粪不拘多少(晒干,火煨成灰,取心中白者,研令极细) (一方用黄牛粪)

【用法】如用蛤粉相似,用绵扑扑有疮处,不拘时候。敷之便干,更不成癰痕。

【主治】小儿麻痘疮子,已出太盛,发溃,脓水粘衣着席不能转动,疼痛湿烂。

24691 白龙散

【方源】《幼幼新书》卷二十引《张氏家传》。

【组成】龙骨半两 麝少许

【用法】上为细末。每服半钱,冷水调下。

【主治】盗汗。

24692 白龙散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】柑子皮 白梅 象牙屑各等分

【用法】上为细散。每用一钱,绵裹含化。

【主治】鱼骨鲠。

24693 白龙散

《普济方》卷五十三引《经验良方》。为《圣惠》卷八十九“白矾散”之异名。见该条。

24694 白龙散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】西硼砂一钱 铅霜 脑子各一字 寒水石一两(水飞)

【用法】上为细末。每用少许,干掺舌上,咽津,不拘时候。

【主治】大人小儿咽喉肿痛,满口生疮。

24695 白龙散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】寒水石四两(烧半白,研) 乌贼鱼骨(研) 滑石(研) 各一两 硼砂三钱 轻粉一钱

【用法】上为细末。每用干掺。耳中痛者,油调如糊,滴经于耳中。

【功用】生肌止痛。

【主治】①《外科精义》：耳中卒然大痛。②《青囊秘传》：聒耳。

24696 白龙散

《普济方》卷七十八。为《圣惠》卷三十三“马牙消散”之异名。见该条。

24697 白龙散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】枯矾七钱 乳香三钱

【用法】上为末。敷三时。

【主治】缺唇、自刎，血流如注者。

【备考】本方为原书“二龙散”之第一方。

24698 白龙散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】白及 水龙骨

【用法】上为末。无根水调敷。

【主治】白蛇缠腰。

24699 白龙散

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】枯矾四分 龙骨一钱五分

【用法】上为末。先用绵杖搅净脓水，然后将药少许吹入，一日二三次。

【主治】耳有脓水不干。

24700 白龙膏

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】膩粉一分 乳香半两（细研） 湿百合根一两（烂研）

【用法】上药相和研令匀熟。每用先以盐浆水洗净洗疮，以厚纸涂药于上，一日二次。

【主治】诸恶疮肿，人不识者。

24701 白龙膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】沉香二钱半 白檀 白茯苓（去皮） 木香各一钱半 白附子一钱 桔梗一钱 白及二钱 白薇半两 白芷一钱半 白薇一钱 白术一钱半 黄耆二钱半 川芎一钱半 甘草二钱 防风二钱半 白芍药二钱半 当归（洗，焙）半两 生干地黄一钱 瓜蒌根一钱半 杏仁（汤浸，去皮尖） 桑白皮 桃仁（汤浸，去皮尖）各二钱 木鳖子（去壳） 人参（去芦头）各二钱半 木通 独

活 川升麻 槐白皮 零陵香叶各二钱半 苦参一钱 腊日澄清脂麻油一斤二两 上好瓦粉十四两

【用法】上为粗末，用上项油浸七日七宿，于净石锅或银器中以慢火煎，候白芷焦黄色，放温，以新绵滤去滓，于瓷罐子内密封，澄三日三宿，候取出倾于锅内，以慢火轻温，再滤去滓，倾在上好瓷碗中，用慢火再熬动，次下黄蜡十四两，用竹篦子不住手搅令匀，放温，次入瓦粉再搅令匀，以慢火再轻熬动，抬下搅令匀，续次再上火，三日方欲成膏，于瓷盒内盛密封。每用药时，用软白绢子上摊药，贴患处。

【主治】一切恶疮，焮赤肿痛。

24702 白龙膏

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】轻粉五钱（另研） 白薇 白芷 白薇 黄耆 商陆根 柳白皮 桑白皮各一两 乳香二两（另研） 定粉（另研） 黄蜡各八两 杏子油一斤（如无，用脂麻油）

【用法】上七味锉，油内揉浸三日，于木炭火上煎，令白芷黄色，滤去滓，于油中下黄蜡、乳香后，溶开出火，再滤，候微冷，下轻粉、定粉急搅，至冷，瓷盒内收贮。每用绯绢上摊用之。

【功用】清血脉，通气脉，消毒败肿，止痛生肌。

【主治】头面五发恶疮及烧汤冻破溃烂。

24703 白龙膏

【方源】《古今医鉴》卷十六引陈仪宾方。

【组成】黄蜡二两 黄耆二两（为末，去黑渣不用） 香油三两（煨温） 乳香末五分 没药末五分

【用法】先将蜡入瓷碗内，慢火化开，用箸敲碗边，续续入黄、香、乳、没，取碗离火，入温香油于内，搅匀待冷，入水缸内，去火毒。三日取出油，单纸摊药贴患处。

【主治】杖疮，及远年近日一切顽疮。

24704 白龙膏

【方源】《回春》卷八。

【组成】香油四两 官粉一两(研细) 黄蜡一两

【用法】先将香油煎数沸,再入官粉,次入黄蜡溶化,搅匀退火,待药将皱面,用厚连四纸剪大小不一,拖药在上收候。若贴时,先将葱须煎汤洗净贴之。

【主治】背疽及癰疮。

24705 白龙膏

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】白及一两 五倍子(炒)五钱 白薇三钱

【用法】上为末,醋调敷。

【主治】各样疮肿症,或腿或臂。

24706 白龙膏

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】麻油二十两 大附子二个 川山甲十片 杏仁五十粒 槐白皮一片

【用法】浸十余日,燥枯,滤去滓,入血余一团,蛤蟆一个,白花蛇一条,徐徐煎化,再滤滓净,入飞黄丹十两成膏,加乳香、没药各二钱。贴之。

【主治】鼠疮。

24707 白龙膏

【方源】《全国中药成药处方集》(西安方)。

【异名】验方千捶膏。

【组成】蓖麻仁十二两 没药 乳香 轻粉 铅粉各五钱 杏仁 铜绿各三钱 松香一斤四两

【用法】各药入石臼内捣千余下,以和匀融粘为度,收贮瓷罐中。视肿疡大小,裁青布摊贴之。

【主治】皮肤疮疖及由湿毒引起之暴发疮肿。

24708 白归汤

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷六。

【组成】川芎 当归 白芍 (一方加甘菊,去心蒂)

【用法】水煎服。

【主治】血虚头痛。

24709 白瓜丸

【方源】《普济方》卷五十一。

【组成】白瓜子仁三两 陈橘皮三分 白芷 藁本 远志 杜衡 车前子 当归 云母粉 白石脂各一两 天门冬 细辛 柏子仁 栝楼根 黄丹各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以温酒送下,不拘时候。

【功用】令色光白。

【主治】面黧黯。

24710 白头兵

《串雅补》卷二。为原书同卷“小串”之异名。见该条。

24711 白圣散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】天雄(炮裂,去皮脐) 山茱萸(炒过,候冷)各二两 山芋三两 干姜(炮)一分

【用法】上为散。每服二钱匕,用热豆淋酒半盏调下,患重者加至三钱匕。

【主治】中风口眼喎斜。

24712 白圣散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】樟柳根三两 大戟二两半 甘遂一两(炒)

【用法】上为极细末。每服二三钱,热汤调下。取大便宣利为度。

【主治】产后腹大坚满,喘不能卧。

24713 白皮散

《普济方》卷八十三。即《圣惠》卷三十三“老柏皮散”。见该条。

24714 白芍汤

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】白芍药 炙甘草 莲肉 山药 扁豆 龙眼肉 青黛 麦冬

【用法】合三四剂,水煎服。

【功用】调脾胃,平肝木。

【主治】麻后元气不复,脾胃虚弱,羸瘦,身无潮热者。

24715 白芍汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】白芍 枣仁 乌梅

【主治】肝虚自汗。

24716 白芍汤

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】白芍(酒炒) 苡仁(炒) 钩藤 茯苓各一钱 泽泻 桂心 甘草各五分

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】脐肿如吹，惊悸多啼。

24717 白灰散

【方源】方出《千金》卷六，名见《得效》卷十七。

【组成】白布灰

【用法】缠白布作大灯柱如指，安斧刃上，燃柱令刃汗出，拭取敷唇上，一日二三次。故青布亦佳。

【主治】紧唇。

【备考】本方方名，《普济方》引作“白灯散”。

24718 白灰散

【方源】方出《本草纲目》卷九引《简便方》。名见《古今医鉴》卷九。

【组成】石灰

【用法】醋调，敷肿处。

【主治】疔腮肿痛。

【备考】《古今医鉴》本方用石灰不拘多少(炒七次，地下窖七次)，醋调，敷肿处。

24719 白灰散

【方源】《得效》卷十八。

【组成】白石灰不拘多少

【用法】韭菜汁调，阴干，为末。少许敷上，擦少时，血止便安。如肠溃出，桑白皮线缝合罅之，帛系，定效。

【主治】恶疮，刀斧伤见血。

24720 白吊药

【方源】《经验方》卷上。

【组成】水银一两 胆矾五钱 食盐五钱 火消一两 明矾一两

【用法】上为细末，用降药罐一只，将药逐

一掺入，微火结胎，火旺则汞走矣，至不嫩不老为度，老者则裂缝汞漏下，嫩者其胎必堕，将罐合于大碗内，盐泥封口，四面灰拥留顶，先以文火，一块炭扇至一炷香完，再加炭一块后扇至第二炷香完，以多炭武火烘逼，烧至第四炷香完，待冷取出。如胎结太嫩，堕于碗内者，可取起研细，再加水银、白矾从新再炼，必得白如霜，形如冰片者为佳。若松绿及淡黄者，其力较薄，用宜多也。研极细末，须收藏石灰缸中，不可受潮，愈陈愈佳。不可入口，不可多用，用时洒于膏上，如有如无之间足矣。

【主治】一切痼疽，大小诸毒，无名肿毒；并治风火牙痛，头痛，喉风，乳蛾，一应实证。

【宜忌】溃者忌用。

24721 白华散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】蛤粉(水飞，研) 连翘 甘草(锉) 白药子 白附子(炮) 各等分

【用法】上为散。每服半钱匕，用麦门冬、熟蜜水调下。

【功用】凉膈退热。

【主治】小儿肝热，眼赤疼痛。

24722 白衣丸

【方源】《回春》卷八。

【组成】乌贼鱼骨 白茯苓 砂仁 山豆根 甘草 僵蚕各五钱 贯众一两五钱 硼砂 麝香 珍珠 象牙 脑子各少许

【用法】上为细末，飞罗白面打糊为丸，如梧桐子大，用蚌粉为衣，阴干。每用二丸，冷水浸化，频频咽服。又将一丸口噙化尤妙。

【主治】男、妇、小儿误吞麦芒、针刺、铜钱、杂鱼等骨梗在喉中，及喉闭肿痛，死在须臾。

24723 白灯散

《普济方》卷三〇四。即方出《千金》卷六，名见《得效》卷十七“白灰散”。见该条。

24724 白米饮

【方源】《养老奉亲》。

【组成】白米四合(研) 春头糠末一两

【用法】煮饮熟，下糠米调之，空心服食尤益。

【主治】老人咽食，入口即塞涩不下，气壅。

24725 白米粉

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】早白稻粳米

【用法】上为粉。扑之，肌肉自生。

【主治】小儿初生，血皮赤色有红筋。

24726 白杨汤

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】白杨皮(取东南面皮，去地三尺以来，去苍皮，勿令见风，细切)半斤

【用法】用水一升，煎至七分，去滓热洗。以肿消为度。

【主治】风毒攻肌肉，皮肤浮肿。

24727 白杨醋

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】白杨皮一握(细锉)

【用法】上以醋二升，煎十余沸，去滓，热漱即吐。

【主治】牙齿痛。

24728 白豆顶

【方源】《申雅补》卷一。

【组成】白扁豆三钱五分 雨茶三钱五分 白信一钱五分 陀僧一钱五分

【用法】上为细末，面糊为丸，分作十丸。每服一丸，冷浓茶送下。

【主治】一切痰证。

24729 白豆散

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】白豆末

【用法】水和涂之，勿令干。

【主治】小儿赤游肿，流行于体。

24730 白豆散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】白藜 赤小豆 天南星 淡豆豉各等分

【用法】上为末。芭蕉叶捣烂绞汁调敷，一

日一次。如脐小白色即愈。

【主治】脐突虚肿，按之有声，软而不痛者。

24731 白芷丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】白芷五两 干地黄四两 续断 干姜 当归 阿胶各三两 附子一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，一日四五次。无当归，芎蒭代，入蒲黄一两妙；无续断，大蜀根代。

【主治】产后所下过多，及崩中伤损，虚竭少气，面目脱色，腹中痛。

24732 白芷丸

【方源】方出《本草纲目》卷十四引《圣惠》，名见《奇效良方》卷五十七。

【组成】白芷末 葱白

【用法】捣为丸，如小豆大。每服二十丸，茶送下。仍以白芷末，姜汁调，涂太阳穴，乃食热葱粥取汗。

【主治】小儿风寒流涕。

24733 白芷丸

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】白芷 细辛(去苗叶) 五味子 枳壳(去瓢，麸炒) 石决明(洗) 各一两 羌活 熟地黄 蕤仁各二两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温水送下，一日三次。

【主治】肝肾虚风，多泪渐昏，及生翳膜。

24734 白芷丸

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】白芷三两 芎蒭 天南星(水煮) 各二两 羌活(去芦头) 半两 藿香叶一两 菊花三分 防风(去叉) 半两 细辛(去苗并叶) 一两 当归(切，焙) 二两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】妊妇风气壅，头目不利，身体生疮。

24735 白芷丸

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷一引《本事》。

【组成】新白芷不拘多少

【用法】上锉，以萝卜汁浸，晒干，为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，以茶清或荆芥汤送下。

【主治】沐浴后眩晕头痛，或头风眩痛，及暴寒乍暖，神思不清，头目昏晕。

24736 白芷丸

【方源】《寿亲养老》卷四。

【组成】白芷 石斛 干姜各一两半 细辛 五味子 厚朴 肉桂 防风 茯苓 甘草 陈皮各一两 白术一两一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，不饥不饱时清米饮送下。

【主治】老人气虚头晕。

【方论选录】《本事方释义》：白芷气味辛温，入手足阳明，引经之药；石斛气味甘平微咸，入肝脾肾三经；干姜气味辛温，入手足太阴；细辛气味辛温，入足少阴；五味子气味酸咸温，入肾；厚朴气味辛温，入足太阴阳明；肉桂气味辛甘热，入肝；防风气味辛甘平，入手足太阳；茯苓气味甘平，淡渗入胃，能引诸药入于至阴之处；甘草气味甘平，入脾，通行十二经络，能缓诸药之性；陈皮气味辛平微温，入脾胃；白术气味甘温，入手足太阴。此治气虚头晕之方也。诸经络皆有赖于中土，故守中之药居多，中宫气旺，则辛热之品得各行其志，而病情中矣。

24737 白芷丸

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】白芷半两 槟榔一个 青橘皮一分（去白） 巴豆四粒（炮，去皮，出油）

【用法】上为末，同研，面糊为丸，如粟米大。每服三丸至五丸，温水送下，常服。

【功用】消乳食。

【主治】小儿宿食不消。

24738 白芷丸

【方源】《医统》卷七十三。

【组成】白芷一两 糯米半两（炒黑色）

【用法】上为末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，用木馒头或根煎汤送下。

【主治】夜多小便。

24739 白芷汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】白芷 白术 芎藭 防风（去叉）各半两 羌活（去芦头）一两 麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙干）半两 石膏一两半 牛膝（去苗） 狗脊（去毛） 草薢（炒）各半两 薏苡仁（炒） 杏仁（汤退去皮尖双仁，炒） 附子（炮裂，去皮脐） 葛根各一两 桂（去粗皮）一两半

【用法】上咀咀，如麻豆大。每用十八钱匕，以水四盏，加生姜一分（切），煎取二盏，去滓，分温三服，微热服，日二次夜一次。

【主治】中风，手足一边不随，言语蹇涩。

24740 白芷汤

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】白芷 鹿茸（去毛，酥炙） 诃黎勒（煨，去核） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 牡丹皮 地榆 黄耆（锉，炒）各一两半 肉豆蔻（去皮）一枚 白术 黄连（去须） 附子（炮裂，去皮脐） 代赭（碎） 桂（去粗皮）各一两 黄芩（去黑心）半两 龙骨（去土）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，煎取七分，去滓，食前温服。

【主治】妇人血海虚冷，经行太过。

24741 白芷汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】白芷石膏三物汤（《丹溪心法》卷二）、白芷石膏汤（《症因脉治》卷四）。

【组成】白芷一两 知母一两七钱 石膏四两

【用法】上为粗末。每服半两，水一盏半，煎至一盏，温服。

【主治】疟病，身热目痛，热多寒少，睡卧不安，脉长，以大柴胡汤下之后微邪未尽者。

【方论选录】《医方考》：此条阳明证也，以其有热而无寒，或热多而寒少，故《机要》名为热疟。白芷所以解阳明之经，石膏所以清

阳明之府，知母所以养阳明之阴。虚者宜加人参。质实便燥者，此方不足与也，宜下之，用伤寒门大柴胡汤，后以本方调之。

24742 白芷汤

《医学入门》卷七。为《东垣试效方》卷六“白芷散”之异名。见该条。

24743 白芷汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】白芷散（《济阳纲目》卷一〇七）。

【组成】防风 荆芥 连翘 白芷 薄荷 赤芍 石膏

【用法】上锉。水煎，温服。

【主治】阳明确热有风，下牙疼。

24744 白芷散

【方源】《外台》卷二（注文）引《范汪方》。

【组成】白芷十二分 白术十分 防风八分 栝楼五分 桔梗四分 细辛三分 附子二分（炮，去皮）干姜二分 桂心二分

【用法】上为散。每服一钱匕，以粳米粥清下；食已，服二钱，小儿服一钱。常以鸡子作羹，吃粳米饭，多少与病人食之。亦未必常有鸡子羹、粳米饭，如服药讫，即扶起令行一步，仍栉头洗手面，食辄服之，劳行如前，则不复。数用佳。

【功用】伤寒愈后令不复。

【宜忌】忌猪肉、桃、李、雀肉、胡荽、青鱼、鲆、生葱、生菜。

24745 白芷散

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】白芷二两 芎藭二两 甘草二两（炙）

【用法】上药熬令变色，捣为散。每服方寸匕，水调下，日五次夜二次。

【功用】止烦。

【主治】金疮烦闷。

24746 白芷散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】白芷半两 防风一两（去芦头）白茯苓一两 细辛一两 芎藭一两 天雄一

两（炮裂，去皮脐） 薯蓣一两 人参一两（去芦头） 杜若半两 桂心三分 白术一两 前胡一两（去芦头）

【用法】上为细散。每服二钱，以暖酒调下，不拘时候。

【主治】头风目眩，恶风冷，心烦，不下饮食。

24747 白芷散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】白芷一两 黄连一两（去须） 地榆一两（锉）

【用法】上为细散。每用以鸡子白调，涂布上贴疮，一日换三四次。

【主治】痈疮已溃。

24748 白芷散

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】白芷（炒）半两 巴戟天（去心）一两 高良姜一钱

【用法】上为散。每服一钱匕，猪肾一对，去筋膜，入药末煨熟，细嚼，温酒下。

【主治】虚劳，元脏虚冷，心腹疼痛，精神倦怠。

24749 白芷散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】白芷（醋浸，焙干）二两

【用法】上为细散。每服二钱匕，煎木通酒调下，连服三服。

【主治】气淋结涩，小便不通。

24750 白芷散

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】白芷末一钱，铜绿一钱 白僵蚕四枚 干胭脂半钱

【用法】上为末。每用少许，以鸡翎扫疮。有涎吐之，不得咽津。

【主治】口舌生疮，久不愈。

24751 白芷散

《圣济总录》卷一二一（文瑞楼本）。即原书同卷（人卫本）“揩齿白芷散”。见该条。

24752 白芷散

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】白芷半两 当归一两(一半生,一半炒) 侧柏(切,炒)二两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心米饮调下。

【主治】妇人月事不通。

24753 白芷散

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】白芷三分 郁金 阿胶(炙燥)滑石各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,煎葱白汤调下。

【主治】妊娠子淋,小便频涩痛。

24754 白芷散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】黄连 槟榔 木香 白芷各等分

【用法】上为细末。搽所伤处,血便止。如妇人血晕,以童便调一钱;如脏毒诸血,以水煎服。

【主治】金铁所伤,及破伤风。

24755 白芷散

【方源】《三因》卷十。

【组成】香白芷

【用法】上为末。水调下。顷刻,咬处出黄水尽,肿消皮合。

【主治】恶蛇咬伤,顿仆不可疗者。

24756 白芷散

【方源】方出《百一》卷七,名见《朱氏集验方》卷二。

【组成】香白芷一两 荆芥一钱

【用法】上为末。腊茶清调服。如不用荆芥,薄荷一钱亦佳。

【主治】伤寒鼻塞,出清涕不已。

24757 白芷散

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】白芷一两 海螵蛸二个(烧) 胎发一团(煨)

【用法】上为细末。每服二钱,空心温酒调下。

【主治】①《妇人良方》:妇人赤白带下。②《景岳全书》:下元虚弱,赤白带下,或经行

不止。

【方论选录】《成方便读》:如带下无虚寒等证,即可于此方求之。白芷独入阳明,芳香辛苦,其温燥之性,为祛风逐湿之专药,以阳明为五脏六腑之海,水谷之所藏,湿浊之所聚,故以为君;女子以肝用事,海螵蛸入肝经血分,其性燥而兼涩,可固可宣,为带下崩中之要药,故以为臣;胎发得血之余气,益阴之中,又有去瘀之力,使瘀者去而新者生,以复妇人之常道。不特赤白带下可痊,而一切瘀浊,亦可愈耳。

24758 白芷散

【方源】《妇人良方》卷七。

【组成】白芷一两(切作片,于瓦上炒令黄)

【用法】上为细末。用猪血二十文切片,以沸汤泡七次,将血蘸药,吃七片。如剩药末,留后次用。

【主治】妇人翻胃吐食。

24759 白芷散

【方源】《普济方》卷三十八引《余居士选奇方》。

【组成】香芷

【用法】上为末。米饮调下。

【主治】肠风。

24760 白芷散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】郁金散。

【组成】郁金一钱 香白芷 石膏各二钱 薄荷叶 芒消各三钱

【用法】上为极细末。口含水,鼻内搐之。

【主治】头痛。

24761 白芷散

《兰室秘藏》卷中。为原书同卷“治虫散”之异名。见该条。

24762 白芷散

【方源】方出《直指》卷二十一,名见《普济方》卷五十七。

【组成】杏仁(水浸,去皮,焙) 细辛 白芷各一钱 全蝎两个(焙)

【用法】上为末。麻油调敷。

【主治】鼻痛。

24763 白芷散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】白芷 血余 川芎 百草霜 川乌 草乌 雄黄 花桑皮(烧) 朱砂 全蝎 麝香 北细辛 没药 当归各等分

【用法】上为末。每服一钱，空心茶、酒任下。先将此药用醋调如膏，次以皂角炭火烧令烟出，却用皂角点药，搽患处，即安。

【主治】牙疼。

24764 白芷散

【方源】《普济方》卷四十四引《朱氏集验方》。

【组成】白芷四钱 生乌头一钱

【用法】上为末。每服一字，茶调下。有人患眼睛痛者，先含水，次用此药搐入鼻中，其效更速。

【主治】头痛及目睛痛。

24765 白芷散

【方源】《东垣试效方》卷六。

【异名】白芷汤(《医学入门》卷七)。

【组成】麻黄 草豆蔻各一钱半(不去皮) 黄耆一钱 吴茱萸四分 藁本三分 当归半钱 羌活八分 熟地黄半钱 白芷四分 升麻一钱 桂枝二分半

【用法】上为细末。先以温水漱净，以药擦之。

【主治】大寒犯脑，牙齿疼痛。

【备考】《医学入门》本方用法：或水煎服亦可。

24766 白芷散

【方源】《医方类聚》卷一六七引《吴氏集验方》。

【异名】麦门冬散(《普济方》卷三〇七)。

【组成】白芷(用麻油煎过)

【用法】上为末。每服五钱，麦门冬煎水冷调下。外以雄黄敷。

【功用】解蛇虫咬及犬虎伤。

【主治】毒气入腹，胀肿者。

【临证举例】蛇咬伤 《本草纲目》引《夷坚志》：临川有人被蝮蛇伤，即昏死，一臂如股。少顷遍身皮胀黄黑色。一道人以新汲水调白芷末一斤，灌之，觉脐中汨汨然，黄水自口出，腥秽逆人，良久消缩如故。以麦门冬汤调尤妙。

24767 白芷散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】斑蝥五个 蝉壳五个 轻粉一钱 槟榔三个 香白芷二钱 蛇床子 硫黄 樟脑各二钱

【用法】上为细末，罗过，却入轻粉，再碾极细。用香油调搽。

【主治】①《瑞竹堂方》：身上诸般恶疮，及小儿耳项头疮。②《普济方》：疥癣。

24768 白芷散

《普济方》卷七十。为《圣济总录》卷一二一“揩齿白芷散”之异名。见该条。

24769 白芷散

《普济方》卷七十。为《圣济总录》卷一二一“洗齿白芷散”之异名。见该条。

24770 白芷散

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】小乌豆 香白芷

【用法】上为末。水调，敷肿处。

【主治】肿毒、暑毒、水刺肿手背。

24771 白芷散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】甘草节 白芷 五倍子

【用法】水煎，温洗。

【主治】疳疮。

24772 白芷散

【方源】《普济方》卷三〇七。

【组成】雄黄 香白芷

【用法】上为末。掺之。先用妇人扎髻绳扎定疮处。如无头绳，麻油绳亦可用。用新汲水调末服之，或热酒送下皆良。

【主治】毒蛇咬伤。

24773 白芷散

《普济方》卷三五六。为方出《证类本草》卷五引《杜壬方》，名见《产育宝庆》“神应黑散”之异名。见该条。

24774 白芷散

【方源】《普济方》卷三六五。

【组成】香白芷末半两 盐绿一钱 五倍子一分 麝香少许

【用法】上为细末，每用一字，掺疮上。

【主治】小儿口疮。

24775 白芷散

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】白芷 硫黄 密陀僧各半两 母丁香 白丁香各三七粒

【用法】上为末。每服半钱，煎面汤调下，未发时一服，取下黑物，不用服补药。发时一服。如用补，只煎醋石榴皮汤与吃，一日二次。逐日下黑物为效。

【主治】小儿疳癖，虚中积及奶癖。

【宜忌】忌鸡、鱼、果子。乳母亦忌。

24776 白芷散

《医学入门》卷七。为《直指》卷十九“香芷散”之异名。见该条。

24777 白芷散

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】白芷 防风 连翘 石膏（煨）荆芥 赤芍药 升麻（焙） 薄荷

【用法】上为细末。薄荷汤调服及搽牙龈；或煎服亦可。

【主治】下月牙疼。

24778 白芷散

《济阳纲目》卷一〇七。为《古今医鉴》卷九“白芷汤”之异名。见该条。

24779 白芷散

【方源】《济阳纲目》卷一〇八。

【组成】白芷三钱 王不留行一钱

【用法】上为末。每用量擦头发内，微揉后以篦子刮去药末，自无气息。

【功用】去头垢，除汗气。

24780 白芷散

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】白芷 菖蒲 苍术 陈皮 细辛 厚朴 半夏 官桂 木通 苏梗叶 炙草各一分 川芎二分

【用法】加生姜、葱，水煎服。

【主治】虚火妄动，耳鸣。

24781 白芷散

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】开结散（《外科证治全书》卷三）。

【组成】乳香 没药（各去油） 白芷 浙贝 归身各等分

【用法】上为末。每服五钱，陈酒调下。醉盖取汗。

【主治】乳痈乳疔。

24782 白芷散

【方源】《医级》卷九。

【组成】白芷 乌贼骨 白术 米仁 赤苓 芡实各一两

【用法】上为末。每服五钱，米饮下。

【主治】带下日久，清腥如水。

24783 白芷散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】白芷三钱 牡蛎粉五钱 上片二分

【用法】上为细末。搽患处。

【主治】乳疔。

24784 白芷散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】白芷三钱 夏枯草三钱 蒲公英二钱 银花三钱 紫花地丁二钱 甘草一钱

【用法】水煎，内服。

【主治】青蛇头。

24785 白芷膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】白芷 蔓荆子 附子 防风 芎藭 茵草 细辛 黄芩 当归 蜀椒各一两（去汗，闭口） 大黄一两半 马鬣膏五合（此所用无多）

【用法】上切。以腊月猪脂三升合诸药，微火煎三上下，白芷色黄膏成。洗头泽发，勿近面。

【功用】生发。

【主治】头秃。

24786 白芷膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】白芷 通草 蕤核各一分 熏草二铢 羊髓八铢 当归一分

【用法】上哎咀。以清酒炼羊髓三过，煎，膏成绞去滓。用小豆大纳鼻中，一日三次。

【功用】利鼻。

【主治】鼻中塞。

24787 白芷膏

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】白芷一两 当归一两 鸡屎白五两

【用法】上药用猪脂七两，麻油三两，以慢火煎白芷色黄，去滓，纳鸡屎白，搅和，煎如膏。入瓷器内盛，每日涂摩疮痂上。

【功用】灭瘢。

【主治】伤寒豌豆疮愈后。

24788 白芷膏

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】白芷半两 防风半两（去芦头）附子半两（去皮脐） 白芍药半两 当归半两 川椒半两（去目） 羌活半两 独活半两 藁本半两 川乌头半两（去皮脐） 细辛半两 生姜五两 白僵蚕半两 黄蜡五两 猪脂二斤半（水浸二宿，逐日一换）

【用法】上锉细。先煎猪脂，去滓，入诸药，煎白芷色焦赤，以绵滤去滓，澄清，拭铛令净，慢火熬，入蜡消为度，用瓷盒盛。每取少许于火畔烘手摩之。

【主治】风毒流注，骨节疼痛，筋脉挛急。

24789 白芷膏

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】白芷 芎藭 木通 当归 辛夷各半两 细辛三分 莽草三分

【用法】上锉细。以不中水猪脂一升，煎五七沸，候白芷色焦黄，滤去滓，瓷盒中盛。每以枣核大，绵裹纳鼻中，一日三次。

【主治】鼻痛。

24790 白芷膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】白芷一两半 生干地黄一两半 甘草半两 当归三分 白藜三分 附子三分（去皮脐） 川椒二合

【用法】上锉细。以绵裹，用猪脂三斤，煎白芷焦黄，膏成，滤去滓，收盒器中。每取涂于疮上。

【功用】生肌。

【主治】金疮。

24791 白芷膏

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】白芷 细辛 木通 当归各半两

【用法】上锉细，以羊髓四两，与药同入铫子内，慢火上熬，候白芷赤黄色，膏成，绞去滓，贮于瓷器内。敷儿肉上及鼻中，一日三四次。

【主治】小儿凶气虚肿，鼻塞不通。

24792 白芷膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】白芷 白藜各三两 白术三两半 白附子（炮）一两半 白茯苓（去黑皮）一两半 白及 细辛（去苗叶）各三两

【用法】上为末，用鸡子白搜和匀，为丸如弹子大，瓷合中盛。每卧时先洗面，后取一丸，以浆水研化涂面，明旦并花水洗之。

【主治】面疔疮。

【备考】本方方名，据剂型当作“白芷丸”。

24793 白芷膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】白芷（留两小块子验所煎膏） 白芨 芩 木兰皮 细辛（去苗叶） 藁本（去苗土） 白附子（炮）各三分 芎藭半两 防风（去叉）半两 丁香 零陵香 松花 麝香（研）各一分 熊脂三斤（如无，以酥代）

【用法】上十三味，除麝香、熊脂外，并锉碎，入净器中，以酒二升浸一宿，先将熊脂

入铜铛中化令销，次下酒中诸药，以文火煎之，三上三下，候白芷黄色膏成，用新绵滤去滓，入麝香搅匀，稀稠得所，瓷盒盛。每临卧时，先以澡豆温浆水洗面，后涂膏。

【主治】面皴疤。

24794 白芷膏

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】白芷 熟干地黄(焙) 当归(切，焙) 各一两半 白薇一两 芎藭一两一分 蜀椒(去目并闭口，炒出汗) 三合 附子(炮裂，去皮脐) 三分 甘草(炙) 半两

【用法】上锉细，以猪脂五斤合和，煎三上三下，药成膏去滓，软硬得所。每日涂疮上，频涂即效。

【功用】止血生肌。

【主治】金疮。

24795 白芷膏

【方源】方出《外科全生集》卷一，名见《仙拈集》卷二。

【组成】新鲜白芷

【用法】用酒煎至成膏，收贮瓷瓶。每服二钱，陈酒送下。再取二三钱涂患处，至消乃止。

【主治】鹤膝风。

24796 白花饮

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】白术五钱 苡仁 茯苓各一两 甘草五分 天花粉三钱 柴胡一钱 枳壳五分

【用法】水煎服。

【主治】胃气壅滞，痰涎流溢于四肢，汗不出而身重，吐痰靡已。

24797 白花散

《杨氏家藏方》(人卫本)卷十二。即原书(北大本)“百花散”。见该条。

24798 白花散

《卫生宝鉴》卷十七。为《圣济总录》卷九十五“朴消散”之异名。见该条。

24799 白花散

《治痘全书》卷十四。为《奇效良方》卷

六十五“白花蛇散”之异名。见该条。

24800 白花膏

【方源】《济生》卷二。

【组成】款冬花 百合(蒸，焙) 各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，食后，临卧细嚼姜汤咽下，噉化尤佳。

【主治】喘嗽不已，或痰中有血。

【备考】本方方名，《医方类聚》引《严氏济生续方》引作“百花膏”。

24801 白花膏

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】香油一斤 青槐枝百段 黄蜡一两半 定粉一两半 净乳香 儿茶 没药 白花蛇各三钱 潮脑一两 麝香一钱

【用法】青槐枝入油熬枯，去枝，至滴水不散，入黄蜡、定粉，离火，温时再下净乳香、儿茶、没药、白花蛇、潮脑、麝香，同油搅匀成膏，浸水内一宿。摊贴。

【主治】痈疡痒极见骨者，臃疮孔内发痒者。

24802 白芥丸

【方源】方出《普济方》卷一六七，名见《本草纲目》卷二十六。

【组成】甘遂 朱砂 风化朴消 大戟 白芥子 黑芥子各等分

【用法】上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。

【主治】热痰烦闷，头晕眼花，四肢不用。

24803 白芥丸

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】消积丸(《东医宝鉴·杂病篇》卷六)、连罗丸(《杂病源流犀烛》卷十四)。

【组成】白芥子 萝卜子各一两半 山梔 川芎 三棱 莪术 桃仁 香附 山楂 神曲各一两 青皮五钱 黄连一两半(一半用吴黄水炒，一半用益智仁水炒)

【用法】上为末，蒸饼为丸服。

【主治】男妇食积死血，痰积成块在两胁，

动作腹鸣，嘈杂眩晕，身热时作时止。

24804 白杏膏

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】轻粉一钱 杏仁七个（去皮）

【用法】捣烂。将疮去痂，先抹猪胆汁，后涂药。

【主治】杨梅疮。

24805 白连散

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】白矾（枯） 乌贼鱼骨 黄连 龙骨各一两

【用法】上为末。以绵裹枣核大塞耳中，一日换三次。

【主治】①《卫生宝鉴》：聤耳，出脓汁。②《青囊秘传》：浸淫疮。

【备考】《青囊秘传》：外用。

24806 白吹药

【方源】《经验秘方》卷下。

【组成】山豆根八分 薄荷四分 白附子一片 硼砂五分 青鱼胆五分 细辛五分 真麝香三分（孕妇忌用） 僵蚕六分 上冰片五分

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮听用。用时以雄鸡冠血一碗，入药于血内，将舌放在血内。

【主治】中蜈蚣毒而舌出者。

24807 白围药

【方源】《外科方外奇方》卷一。

【组成】天花粉三两 生南星四两 生半夏四两

【用法】上为细末，用酸醋调涂。

【主治】一切痰毒。

24808 白疔散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】海螵蛸 21 克 滑石 9 克 寒水石 9 克 煅石膏 9 克 青黛 3 克 冰片 1 克

【用法】上为细末，外用。

【主治】湿疹。

24809 白疔丸

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】苍术二两 白附子二两 桂枝二两 当归二两 西秦艽二两 草乌二两 追地风二两 千年健二两 威灵仙二两 川芎二两 钩藤二两 兔丝子二两 川牛膝二两 何首乌二两 川乌二两 知母二两 梔子二两 红花二两 白花蛇一两 苦参四两 刺蒺藜四两 防风四两 小胡麻四两 苍耳子四两 黄柏四两 桃仁四两 紫草四两 全虫四两 丹皮四两 荆芥六两 白鲜皮六两

【用法】上为细末，水泛为丸，如绿豆大。每服一至二钱，温开水送下，一日二次。

【功用】驱风攻毒，除湿止痒。

【主治】牛皮癣（白疔风），神经性皮炎（顽癣），慢性湿疹（顽湿疮）。

24810 白沙丹

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】八角茴香二两（炒黄） 川乌二两（火炮炒） 南苍术二两（米泔水浸） 熟地三两（蒸，不用酒） 白茯苓二两 干山药二两（炒）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十九丸，空心酒送下。

【功用】和补筋脉，起阴发阳，破滞气，化五积，益精神，安脏腑，除心气，去盗汗，乌须发，去风疾。

【主治】五劳七伤，左瘫右痪。

24811 白灵丹

【方源】《经验方》卷上。

【组成】川贝母

【用法】上为细末，弗使受潮。未溃者，以冷茶调涂，即可消退；已溃者掺之，即可收功。

【主治】乳痈，红肿疼痛。

24812 白灵丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】熟石膏一两 白蜡二钱 梅片三分

【用法】上为末。掺之。

【功用】收口。

24813 白灵药

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】水银二两(用铅一两化开,投入水银听用) 火消二两 绿矾二两 明矾二两

【用法】上为末,投入锅内化开,炒干,同水银碾细,入泥护阳城罐内,上用铁盏盖之,以铁梁铁兜左右,用烧熟软铁线上下扎紧,用紫土盐泥如法固口,要烘十分干燥为要,架三钉上,砌百眼炉,先加底火二寸,点香一枝,中火点香一枝,顶火点香一枝;随用小罐安滚汤在傍,以笔蘸汤擦擦盏内,常湿勿干。候三香已毕,去火罐,待次日取起,开出药来,如粉凝结盏底上,刮下灵药,收藏听用。凡疮久不收口,用此研细,掺上少许,其口易完。若入于一概收敛药中,用之其功甚捷。

【主治】疮久不收口。

24814 白灵药

《医宗金鉴》卷六十二。为原书同卷“白降丹”之异名。见该条。

24815 白灵药

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】芦甘石一两 黄连一钱 黄柏黄芩各二钱

【用法】将三黄煎浓汁,将甘石放在银罐内,烧极红收汁,约九次,以甘石酥为度,晒干研细,加冰片五分。治口碎,点眼甚妙。加珍珠少许,治下疳,可生肌长肉。凡有热毒,配三白头升药,人乳调敷。

【功用】生肌长肉。

【主治】口碎,下疳。

24816 白灵药

【方源】《串雅补》卷三。

【组成】生石膏一两 墨二钱

【用法】上为细末。入水黑色,二味须各研和匀。

【主治】一切无名肿毒。

24817 白附丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《刘氏家传》。

【异名】真珠膏、人参丸(原书同卷引《张

氏家传》)。

【组成】白附子(生)二个 天南星(炮)半两 全蝎三七枚 人参二钱 白僵蚕(麸炒)二七个 朱砂一钱 脑 麝 乳香各少许

【用法】上为末,炼蜜为丸,如芡实大。每服一丸,卧时金银薄荷汤送下。

【主治】①《幼幼新书》引《刘氏家传》:小儿因惊,或风涎盛,手足欲动之疾。②《幼幼新书》引《张氏家传》:惊风,天钓眼睛,搐掣手脚。涎潮心舍,叫唤不应,并夹惊伤寒、惊痫。

24818 白附丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】牛胆星一两(须用黄牯牛胆,腊月粉南星,亲手修合风干,隔一年用。牛胆,须入三四次者佳) 大陈半夏半两 粉白南星一两(切作片,用腊雪水浸七日,去水晒干) 枯白矾二钱半

【用法】上为末,宿蒸饼为丸,如梧桐子大。用姜汁蜜汤送下。

【主治】风痰。

【加减】有热,加薄荷叶。

24819 白附丸

【方源】《医方类聚》卷二六一引《新效方》。

【组成】南星八两(切片) 白矾半两(末) 白附子二两

【用法】以水浸南星、白矾过一指,晒干,研细,入白附子,和匀,飞罗面为丸,如芡实大。每服一二丸,姜、蜜、薄荷汤浸化下。

【主治】风痰。

24820 白附丸

【方源】《医学纲目》卷三十八。

【组成】南星二两 半夏(二味用冬藏雪水于六月六日浸起,晒干,又浸,凡九次方用。) 白附子 白矾各一两

【用法】上为细末,姜汁糊为丸,如梧桐子大。一岁儿服八丸,用薄荷汤化下。

【主治】小儿咳嗽有痰，感冒发热，吐泻，心神不安。

24821 白附丸

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】白附子二两（盐水炒黑） 黑附子二两（盐水炒） 黄狗头骨四两（炙灰）

【用法】上为末，炼蜜为丸，每服一二钱，米饮送下。

【主治】白崩经久，脉微者。

【方论选录】寒湿袭虚，带脉不固，而白带淫溢特甚，故曰白崩焉。黑附子补火燥湿，白附子燥湿升阳，黄狗头骨壮阳涩脱，以固白崩也。蜜以丸之，饮以下之，使阳气内充，则寒湿外散，而冲任清和，带脉无不完固，何有白带溢甚，谓白崩之患乎！

24822 白附丹

【方源】《医方类聚》卷八十二引《瑞竹堂方》

【组成】白附子二两 白及 白藜 白茯苓 密陀僧（研） 白石脂（研） 淀粉各等分（研）

【用法】上为细末，先用洗面药洗净，临睡用人乳汁，如用牛乳或鸡子清调，如合就，用乳将药末丸如龙眼大，窖干。逐旋用温浆水磨开敷之。

【主治】男子妇人，面生黑斑点。

24823 白附汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】全蝎五分 白附 南星 半夏 旋覆花各一钱 菊花 天麻 川芎 橘红 僵蚕 生姜各一钱

【主治】风痰，头晕痛。

24824 白附饮

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】白附子 南星（生用） 半夏（生用） 川乌（生用，仍去皮脐） 天麻（明亮者） 陈皮（去白） 南木香 全蝎（去尾尖毒） 僵蚕（去丝） 丁香各二钱

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盞半，加

生姜三片，慢火煎七分，作五次空心温服。

【主治】肝风克脾土，痰涎壅盛，饮食吐出。

24825 白附饮

【方源】《观聚方要补》卷十引《儿科方要》。

【组成】白附子 枳实 防风 全蝎 胆星 天麻 半夏各一钱 僵蚕 官桂 丁香 木香 甘草各四分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】顿嗽。小儿咳即呛顿，连声不已，嗽则脸红，吐即嗽止，嗽久不已，眼肿而目中白珠起有红丝者。

【加减】若痰中有血，去官桂、丁香、木香。

24826 白附散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】白附子 藿香叶（去土）各等分

【用法】上为细末。每服半钱或一钱，米饮调下，不拘时候。

【主治】小儿吐逆不定，虚风喘急。

24827 白附散

《准绳·类方》卷四。为《鸡峰》卷十八“白附子散”之异名。见该条。

24828 白附散

《经验奇方》卷上。为《外科正宗》卷四“玉真散”之异名。见该条。

24829 白鸡汤

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《圣济总录》卷一八八。

【组成】小豆一升 白鸡一头（治如食法）

【用法】以水三斗煮熟，食滓饮汁，稍稍令尽。

【主治】大腹水病。

24830 白驳片

【方名】《中医皮肤病学简编》。

【组成】紫草 降香 重楼 白药子 白薇 红花 桃仁 生首乌 刺蒺藜各 50 克 海螵蛸 30 克 甘草 35 克 龙胆草 20 克 苍术 20 克

【用法】上为细末，制片，每片重 1 克。每服 10 片，一日三次。

【功用】祛风活血。

【主治】白癫风。

24831 白英丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】白英五两 白藜三两 紫草 芒消(研) 大黄(锉)各二两 茵陈蒿 葶苈子(纸上炒) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙透) 枳壳(去瓢,麸炒)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,早、晚食前用蜜汤送下。以知为度。

【主治】中焦热结,胃气郁伏,身发黄疸。

24832 白英丹

【方源】《四圣悬枢》卷一。

【组成】大黄五钱 芒消三钱 甘草一钱(炙) 枳实二钱(炒) 厚朴三钱(炒) 玄参三钱 麦冬八钱 丹皮三钱 芍药三钱 生地三钱

【用法】流水煎大半杯,热服。

【功用】滋其脏阴,泄其腑热,勿令阳亢而阴亡。

【主治】①《四圣悬枢》:温病脾脾津液、肝肾精血为相火煎熬,燥热烦蒸,脏阴枯竭。②《治疫全书》:阳明腑病,谵语腹满,潮热作渴。

24833 白英散

【方源】《名家方选》。

【组成】白英一钱(根茎叶并烧为霜) 胡椒(烧为霜) 丁子各三分(烧为霜)

【用法】每服六分,温酒饮下。

【主治】痢症及诸热毒肿。

24834 白苓汤

【方源】《医统》卷五十一。

【组成】黄耆(炙) 防风 白茯苓 白术各一钱 麻黄根 甘草 牡蛎各五分 小麦五粒

【用法】水盏半,煎八分,食远服。

【主治】因虚盗汗。

24835 白茅汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】白茅根五钱 瞿麦 白茯苓各三钱半 葵子 人参各一钱一分半 蒲黄 桃胶 滑石 半夏各七钱半 甘草五分 紫贝一个(煨) 石首鱼脑砂二个(煨)

【用法】分二贴,加生姜三片,灯心二十根,水煎服。或为末,每服二钱,木通煎汤下;如气壅,木通、橘皮煎汤下。

【主治】产后诸淋,无问冷、热、膏、石、气等淋。

24836 白茅汤

【方源】《四圣心源》卷四。

【组成】人参二钱 甘草二钱 茯苓三钱 半夏三钱 麦冬三钱(去心) 茅根三钱 芍药三钱 五味子一钱

【用法】煎大半杯,温服。

【主治】零星吐鲜血者。

24837 白茅汤

【方源】《女科秘旨》卷八。

【组成】白茅根 瞿麦 车前子 冬葵子各二钱 通草七分 鲤鱼齿一百个

【用法】先将鱼齿为末,药熟入末,空心服。

【主治】产后淋,小便痛,及血淋。

24838 白茅散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】丁香 花桑叶 人参(去芦) 藿香叶(去土) 白茅根(锉)各一分

【用法】上为散。每服一钱,水一小盏,煎至五分,去滓,量大、小分服,不拘时候。

【主治】吐逆不定。

24839 白茅煎

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】白茅根(切)四斤

【用法】水一斗五升,煮取五升,每服一升,日三次,夜二次。尽剂而愈。

【主治】热淋痛。

24840 白矾丸

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】白矾灰 黄丹各一钱 蝙蝠粪二十粒 巴豆一粒(麸炒微黄)

【用法】上为细末,以软粟米饭为丸,如粟

米大,晒干。凡有蛀虫孔疼痛不可忍者,以一丸于痛处咬之。立安。

【主治】牙齿被虫蚀,有虫孔疼痛,牙齿根朽烂。

24841 白矾丸

【方源】方出《圣惠》卷四十七,名见《普济方》卷三十六。

【组成】白矾二两 黄丹二两 硫黄一两

【用法】先将白矾、黄丹入于坩锅内,以炭火半秤,烧通赤,任火自消,取出,于湿地出火毒两日,入硫黄同研为末,以粟米饭为丸,如绿豆大。每服二十丸,以粥饮送下,不拘时候。

【主治】脏腑久积虚冷,反胃呕逆。

24842 白矾丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】白矾半两(烧令汁尽) 踯躅花半两(酒拌,炒令干) 细辛半两 半夏半两(汤洗七遍 去滑) 藜芦半两(去芦头) 丹砂半两(细研,水飞过) 巴豆半两(去皮心,研,纸裹压去油) 苦参半两(锉) 雄黄半两(细研) 川大黄半两(锉碎,微炒) 川芒消一两 大戟半两(锉碎,微炒) 川乌头半两(炮裂,去皮脐) 狼毒半两(锉碎,醋拌炒熟)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如黍米大。每服五丸,空心以温水送下。以通利为度。

【主治】水瘕,腹大肿硬,大小肠不通。

24843 白矾丸

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】白矾半两(烧令汁尽) 附子一两(炮裂,去皮脐) 桑黄一两(锉,微炒)

【用法】上为末,以温水浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食前以粥饮送下,加至二十丸。

【主治】痔疾多年不愈,下部肿硬疼痛。

24844 白矾丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】白矾灰 附子(炮裂,去皮脐,为

末)各二两

【用法】上为末,以汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以荆芥汤送下,一日三次。

【主治】妇人痔疾久不愈。

24845 白矾丸

【方源】方出《圣惠》卷七十三,名见《普济方》卷三三一。

【组成】白矾灰一两 附子二两(炮裂,去皮脐) 狗头骨灰二两

【用法】上为末,以软饭为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以粥饮送下。

【功用】《普济方》:补虚退冷,暖血海。

【主治】赤白带下,崩漏不止。

①《圣惠》:妇人白带下,脐腹冷痛,面色萎黄,日渐虚损。②《普济方》:妇人血脏久冷,赤白带下。③《医学六要·治法汇》:久崩不止。

【宜忌】《普济方》:忌生冷、毒物。

24846 白矾丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】白矾灰 虾蟆灰 密陀僧(烧醋淬三遍) 乌贼鱼骨(炙令焦黄)各一分 麝香半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服三丸,以温水送下,一日三次。

【主治】小儿一切疳,肌肤消瘦,泻痢不止,口鼻生疮,腹胀脚细,水谷不化。

24847 白矾丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】白矾灰三钱 田父三分(烧灰) 蛇蜕皮一条(炒令微黄) 青黛一分(细研) 鹤虱一分 朱砂一分(细研) 麝香一钱(细研) 芦荟三分(细研) 苘荍子一分(水淘去浮者,水煮,令芽出,炒黑色)

【用法】上为末,同研令匀,以烧饭为丸,如绿豆大。每一岁儿服二丸,以粥饮送下。

【主治】小儿脊疳,下痢羸瘦。

24848 白矾丸

《圣惠》卷九十三。为《幼幼新书》卷二十六引《水鉴》“圣丸子”之异名。见该条。

24849 白矾丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】白矾(生研) 陈橘皮(去白,炒) 桂(去粗皮)各一两

【用法】上为细末,枣肉为丸,如弹子大。每服一丸,含化咽津,不拘时候。

【主治】卒中风不语,失声,及声啞不出。

24850 白矾丸

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】白矾(枯) 熟干地黄(焙) 玄参 知母(焙) 贝母(炒) 河黎勒皮各一两

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸至二十丸,食后、临卧时煎生姜、大枣汤送下。

【功用】止喘嗽,化痰涎,利胸膈,定烦渴。

【主治】肺壅热。

24851 白矾丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】白矾(烧令汁尽) 铅白霜各一分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大。绵裹,含化咽津。

【主治】消渴烦热。

24852 白矾丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】白矾(研) 铅丹(研) 硃砂(研) 硫黄(研)各一分

【用法】上四味,先入矾於瓷盒子内,次入硫黄、硃砂、铅丹覆之,用瓦片盖面。文武火煨赤,倾地上候火气绝,再为末,蒸饼为丸,如梧桐子大。每服十丸,米饮送下。

【主治】久痢脓血,日夜不止。

24853 白矾丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】白矾 铅丹各二两

【用法】上药拌匀,用瓷瓶子固济封却头,以火烧令赤,候一两炊久,方可取出,放冷

杵碎,于地上出火毒一宿,研令极细,用粟饭为丸,如梧桐子大。每服三丸,空心米饮送下。

【主治】赤白痢久不止。

24854 白矾丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】白矾(炭火烧令汁尽,候冷研为末)一两 黄耆(细锉) 枳实(去瓢,麸炒)各二两

【用法】上三味,先捣罗黄耆、枳实为细末,入矾末拌匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下,加至三十丸,一日二次。

【主治】牝痔下血不止。

24855 白矾丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】白矾(烧灰) 赤石脂各一两 附子(炮裂,去皮脐)一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心煎干姜汤送下,晚食前再服。

【主治】五痔连年不愈,及痿下脓血不止。

24856 白矾丸

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】枯白矾 定粉 寒水石(煨)各等分

【用法】上为细末,烂饭研匀为丸,如黍米大。每服五丸,乳食前煎乌梅汤送下。

【主治】小儿滑泄,肛头脱出。

24857 白矾丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】知母 贝母 款冬花 半夏(汤泡七次)各半两 白矾二两半(枯)

【用法】上为细末,以生姜自然汁为丸,如梧桐子大。每服五十丸,临嗽时萝卜子煎汤,加姜汁少许送下。

【主治】远年日近,风壅痰甚,一切喘咳。

24858 白矾丸

【方源】《普济方》卷一六五引《仁存方》。

【组成】半夏一两 白矾半两(为末) 香附(皂角水浸透)一两

【用法】上为末，生姜自然汁糊为丸，如梧桐子大。每服三四十九，生姜汤送下。

【主治】停痰宿饮，风气上攻，胸膈不利。

24859 白矾丸

《普济方》卷二九八。为方出《千金》卷二十三，名见《圣济总录》卷一四三“大效丸”之异名。见该条。

24860 白矾丸

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】白矾灰三钱 田父三钱 蛇蜕皮一条(炒令微黄) 青黛一分 鹤虱一分 朱砂一分 麝香一钱 芦荟一钱(研) 茛菪子一分(水淘去浮者，水煮令芽出，炒黑色) 白扁豆(微炒，令黄色勿焦)各一两 白附子(文武火炮令黄色，去火毒) 天麻(锉如石子，与大麦炒黄)

【用法】上为末，好瓷罐盛，遇有患，依汤用使之，常服半钱或一字，米饮调下；妇人产妇产亦可服之；慢惊搐搦，用麝香饮下，一日六次；急惊定后，用陈饭调下，惊吐不止，陈米饭调下；天柱倒脚，浓米饮下；夹伤寒发搐者，薄荷、葱白汤调下；疳气胀急，多渴者，百合汤调下；赤白痢，不思乳食者，生姜三片，枣子五个，陈米饭一合调下；发热面赤、浑身壮热、忽然惊叫者，金、银、薄荷汤调下；吃饭不知饥饱，不长肌肉，参柏一撮同炒，姜汤调下；暴泻，紫苏、木瓜汤调下；形神脱，言不正，及大人吐泻，藿香汤下。

【备考】本方方名，据剂型，当作“白矾散”。

【主治】小儿脊疳，下利羸瘦。

24861 白矾汤

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】白矾(烧令汁尽，研) 干姜(炮)各半两 藜芦(去芦头) 蛇床子各一分 甘草(炙) 细辛(去苗叶)各半两 防风(去叉)半两 蜀椒(去目并闭口，炒出汗)一分

【用法】上为粗捣末。每用二钱匕，以酒一盏调匀，煎三五沸，热漱冷吐。

【主治】齿痛，风肿摇动，发作不时，兼蚰牙。

24862 白矾汤

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】白矾(火上枯)一两

【用法】上为末。每用半钱匕，沸汤浸如人体温，淋洗。

【主治】牝痔。

24863 白矾汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】白芍三两 白矾五钱 当归 丹皮各一两 柴胡三钱 附子一钱

【用法】水煎服。一剂气通即愈。

【主治】钩吻中毒。

24864 白矾酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】白矾粉 10 克 酒精 90 毫升

【用法】混合外用。

【主治】癣。

24865 白矾散

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《圣惠》卷三十六。

【异名】矾石散(《圣济总录》卷一一九)

【组成】矾石 桂

【用法】上为末。绵裹如枣，纳舌下，有唾出之。

【主治】①《肘后方》：中风，卒失声，声噎不出。②《圣惠》：舌强不能语。

【备考】《圣惠》本方用矾石一分(烧灰)，桂一分。

24866 白矾散

【方源】方出《千金》卷六，名见《医部全录》卷一三一。

【组成】白矾 石硫黄 白附子各六铢

【用法】上为末。以酢一盏，渍之三日，夜净洗面敷之。

【主治】①《千金》：面黧黯。②《回春》：面上粉刺。

【宜忌】莫见风日。

24867 白矾散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】白矾 马牙消 黄丹各一两

【用法】上为细末。先固济一瓷瓶子，候干，入药末在内，以文火歇口烧之，阴气尽后，用大火煨令通赤，候冷，入地坑内，埋七日，取出，细研。每取少许点之。

【主治】风毒攻眼肿痛，时发时愈，或生赤脉。

24868 白矾散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】白矾一分（烧灰） 蟾酥半分 干虾蟆一枚（焚灰） 雄黄半分 麝香半分 熊胆一分

【用法】上为细末。每用半钱，敷牙齿根。

【主治】齲齿断肿出脓汁。

24869 白矾散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】白矾灰 杏仁二十枚（汤浸去皮尖，研） 蛭蛇胆一钱（分）

【用法】上为细末。先以生布揩齿龈令血出，嚙令血尽，即用散药，掺于湿纸上，可患处贴之，一日二三次。以愈为度。

【主治】齿齲，断肿有脓血出。

24870 白矾散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】白矾三分（烧灰） 蛭蛇胆一钱

【用法】上为细散。先以布揩齿，令血尽，每用半钱，以湿纸上掺药，于患处贴之。

【主治】①《圣惠》：齿根血出。②《圣济总录》：疳齲，龈肿有血出。

24871 白矾散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】白矾半两 硃砂半两 马牙消半两

【用法】上药于瓷盒子内盛，用盐泥固济，候干，以炭火煨令通赤，取出细研。用纸两重匀摊，置于湿地上，以物盖之一宿，出火毒后，再细研为散。每服半钱，纳竹管中，吹

入喉内，须臾即通。如是咽门肿，只以篦子抄药，点于肿处，咽津即愈。

【主治】喉痹气闷。

24872 白矾散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】白矾一两（烧灰） 盐花一两

【用法】上为细散。以箸头点药在悬壅上。愈。

【主治】①《圣惠》：悬壅垂长，咽中妨闷。

②《普济方》：一切急风，口噤不开。

24873 白矾散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】白矾一分（烧灰） 黄药末一分 膩粉一分 麝香一钱

【用法】上为细散。每取一字，掺在疮上，以意加减用之。

【主治】恶口疮久不愈。

24874 白矾散

【方源】方出《圣惠》卷五十七，名见《圣济总录》卷一四八。

【组成】白矾灰半两 羖羊角半两（烧灰） 射菌一分 雄黄一两 麝香一两 干姜一两

【用法】上为末。用敷疮上。

【功用】《圣济总录》解毒。

【主治】①《圣惠》：青蛙蛇螫。②《圣济总录》：诸蛇所伤。

24875 白矾散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】白矾一两（烧灰） 黄丹一两半（微炒） 胡粉一两（炒令微黄） 龙骨一两半 当归一两（锉，微炒） 诃黎勒一两（煨，用皮） 黄连三分（去须，微炒） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服三钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】下痢脓血，心腹疼痛不止。

24876 白矾散

【方源】《圣惠》卷六十。

【异名】大安散（《圣济总录》卷一四三）。

【组成】白矾一两 硫黄一两（研） 乳香

一两(研) 黄连一两(去须,为末) 黄蜡一分

【用法】上用大鲫鱼一头,不去鳞,除腹内物,入诸药末在内,以湿纸裹,又以麻缠了,盐泥固济,于煖火(灰)内煨令熟取出。却以慢火炙焦,捣细罗为散。每服二钱,食前以粥饮调下。

【主治】久痔,肠胃风冷,及痿脓血不止。

24877 白矾散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】白矾(烧为灰)一两 硫黄一两(细研) 胡粉一两 黄连一两半(去须) 雌黄一两(细研) 蛇床子三分

【用法】上为细散,都研令匀。以猪膏和如稀面糊,每以盐浆水洗,拭干涂之。

【主治】一切疥。

24878 白矾散

【方源】方出《圣惠》卷六十五,名见《圣济总录》卷一二九。

【组成】白矾一两(烧令汁尽) 麝香半两(细研) 芦荟半两 蛭蛇胆大豆大

【用法】上为细末。先以温浆水洗疮,拭干敷之。重者不过三四度愈。

【主治】甲疽、骨疽。

24879 白矾散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】白矾半两 石胆半两 麝香一分 朱红一分 麒麟竭一分

【用法】上药取白矾、石胆,于铁器内一处,以炭火煨过,入麝香、麒麟竭、朱红,同为细末。用少许干掺疮上,以帛子缠定,一日换二三次。

【功用】缩肉干疮。

【主治】男子妇人风血毒气,攻手足指,生甲疽疮,久不愈者,餐肉裹指甲痛,出血不定。

24880 白矾散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】白矾半两 甘草半两(分)(生

用) 川大黄一分(生)

【用法】上为细散。取枣许大,绵裹纳阴中,一日换三次。

【主治】妇人阴肿坚痛。

【方论选录】《医略六书》:湿伤水府,热遏阴中,故阴肿疼痛,坚实不移焉。大黄荡坚泻热,白矾却湿解毒,生甘草以缓中和药也。绢包纳阴中,使湿热并解,则血气调和而坚实自消,其阴中肿痛无不除矣。

24881 白矾散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【异名】朱矾散(《局方》卷十吴直阁增诸家名方)、朱砂散(《中医皮肤病学简编》)。

【组成】白矾一分(烧灰) 朱砂末一分

【用法】上为极细末。敷儿舌上,一日三次。以乱发洗舌上垢,频令净,即愈。

【主治】小儿鹅口并噤。

24882 白矾散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】白矾灰一分 黄矾一分(烧赤) 雄黄一分(细研) 盐绿一分(细研) 虾蟆灰一分 麝香一分(细研) 人中白一分(烧灰) 人粪灰一分 蛭蛇胆一分(研入)

【用法】上为细末。每用药时,先以发裹指,清水洗口齿上,然后用蜜水调药末如膏,以篦子薄涂于齿龈上,一日三五次。

【主治】小儿口齿疮疮,疼痛肿烂。

24883 白矾散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】白矾一两(烧灰) 蛇床子一两

【用法】上为细散。干掺于疮上。立效。

【主治】小儿耳疮、及头疮,口边肥疮,蜗疮。

24884 白矾散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】龙黄散(《医学纲目》卷三十九引汤氏方)、白龙散(《普济方》卷五十三引《经验良方》)。

【组成】白矾灰半两 龙骨末半两 黄丹

半两(微炒) 麝香一分

【用法】上为细末。先用绵杖子展却耳中脓水，用散半字，分为两处，掺在耳内，一日三次。

【主治】小儿聤耳，汁出不止。

【宜忌】勿令风入。

24885 白矾散

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》

【组成】独茎羊蹄根(锉，捣) 白矾(为末)

【用法】二药一处以极酸米醋调匀，抓破涂药，觉痒极至痛即止，隔日再搽，不过三次即愈。又治癰风，以苎麻刮热，以药擦之。三四度绝根。

【主治】遍身生癰，日久不愈，上至头面，及癰风。

24886 白矾散

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】白矾二两(生用) 生姜一两(连皮捣碎，水二升，煮取一升二合)

【用法】上二味，先细研白矾为末，入浓煎生姜汤，研滤。分三服，旋旋灌。须臾吐出痰毒。

【主治】初中风，失音不语，昏冒不知人。

【宜忌】若气衰力弱，不宜用猛性药吐之。

24887 白矾散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】白矾(烧令汁尽)半两

【用法】上为细散。以少许吹鼻中。

【主治】①《圣济总录》：鼻久衄。②《不知医必要》：鼻生息肉。

24888 白矾散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】白矾(烧灰，研)半两 升麻一两 细辛(去苗叶)一两 丹砂(研)一分 麝香(研)半钱 甘草(炙，锉)一分

【用法】上为散。先以盐浆水洗漱后，用熟水调药，鸡毛涂之，一日三五次。

【主治】风疔口疮。

24889 白矾散

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】白矾(研)半两 苘茹(末)一两 膩粉(研)一分 雄黄(研) 当归(末)各一两

【用法】上为末。取少许敷疮，一日三次。

【功用】蚀恶肉。

【主治】发背癰疽及恶疮不生肌，肉败坏，其色黑。

24890 白矾散

《圣济总录》卷一四三。为原书卷一四一“矾香膏”之异名。见该条。

24891 白矾散

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】白矾(生用)一两 甘草(生用)半两

【用法】上为细末。每服三钱匕，冷水调灌下。便以大蒜横切钱子贴疮口，以艾柱于蒜钱上灸之，不拘壮数，如蒜钱焦，即别换更灸，痛定即止。

【主治】毒蛇并射工沙虱等伤，眼黑口噤，手脚强直，毒攻腹内，逡巡不救。

24892 白矾散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】矾石(烧灰) 龙骨各一分

【用法】上为细末。敷脐中。取愈为度。

【主治】小儿脐不干。

24893 白矾散

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】白矾(煨，焙，研)一两 消石(研) 雄黄(研)各一分 苦参(末)半两

【用法】上为细散。每服半钱匕，冷水调下，并三服。

【主治】小儿走马喉痹。

24894 白矾散

【方源】《医方类聚》卷七十四引《济生续方》。

【异名】扫涎立效丹(《白喉全生集》)。

【组成】白矾三钱 巴豆三枚(去壳，分作六瓣)

【用法】上将白矾及巴豆于铉内慢火熬化
为水，候干，去巴取矾，研为细末。每用少
许，以芦管吹入喉中。

【主治】①《医方类聚》引《济生续方》：缠
喉风，急喉闭。②《白喉全生集》：白喉，风
涎壅盛急症。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“帐
带散”、“通关散”。

24895 白矾散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】白矾半两（飞过） 朴消一钱（飞
过）

【用法】上为末。铜箸点肿处，再点疮，如
疮软，则用药点穿，硬则用针。

【主治】①《朱氏集验方》：软疮。②《普
济方》：急喉痹，缠喉风，兼主重舌，咽喉肿
塞。

【备考】本方方名，《普济方》引作“矾消
散”。

24896 白矾散

【方源】《医方类聚》卷二四二引《经验良
方》。

【组成】白矾（枯） 蛇床子各一两 黄连
半两

【用法】上为细末。干掺疮口上；水调涂亦
得。

【主治】风湿搏于血气之月蚀疮，疮生于两
耳鼻口间，时愈时发者。

24897 白矾散

【方源】《普济方》卷三六五引《傅氏方》。

【组成】白矾 硼砂各一钱 朱砂半钱

【用法】上为末。灯心蘸，点舌上下。

【主治】鹅口疮。

24898 白矾散

《普济方》卷五十五。为方出《圣惠》卷三
十六，名见《卫生宝鉴》卷十“松花散”之
异名。见该条。

24899 白矾散

【方源】《普济方》卷六十五。

【组成】屋松 白矾 蜂窠（炒）各等分

【用法】上为粗末。醋煎，热漱冷吐。

【主治】牙疼。

24900 白矾散

【方源】《普济方》卷二七七。

【组成】雄黄 白矾各等分

【用法】用乌梅三个捶碎，巴豆一个合研为
末。每用半钱，油调敷患处。

【主治】马汗入肉。

24901 白矾散

《普济方》卷三〇〇。为方出《百一》卷十
二，名见《普济方》卷三〇〇“黄连散”之
异名。见该条。

24902 白矾散

【方源】《普济方》卷三〇八。

【组成】露筋草 白矾

【用法】用露筋草其根洗净，焙干，捣为末。
用白矾水调贴。

【主治】蜘蛛并蜈蚣咬伤。

24903 白矾散

【方源】《奇效良方》卷五十九。

【组成】白矾（生用） 硫黄（生用） 乳
香各等分

【用法】上为细末。每用手微抓动患处，以
药擦之。

【主治】肺风酒渣鼻。

24904 白矾散

《奇效良方》卷六十一。为《医方类聚》卷
七十四引《济生》“二圣散”之异名。见该条。

24905 白矾散

【方源】《医统》卷六十三。

【组成】白矾（枯） 没药 乳香 铜绿各
等分

【用法】上为细末。掺之。

【主治】赤口疮。

24906 白矾散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】白矾（煨枯）二钱 硼砂五分

【用法】上为细末。每用少许，点鼻。

【主治】鼻痔。

24907 白矾散

【方源】《医级》卷九。

【组成】白矾 朴消各三钱 小麦一合五倍子一钱五分

【用法】同葱白煎汤熏洗。

【主治】阴中肿痛。

24908 白矾散

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】白矾一钱

【用法】上为末。用阴阳水调服。

【主治】霍乱欲吐不出，欲泻不行，兼之腹痛。

24909 白矾煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】白矾三分(烧灰) 黄柏(末)三分 黄连(末)一分 雄黄一分 熊胆一钱 朱砂一分

【用法】上为细末。以水二大盏，调令匀，纳瓷瓶中，以重汤煮一日，药成待冷，用绵滤过。每以铜箸取少许，点眦头。

【主治】眼脓漏久不止。

24910 白矾煎

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】白矾一分(烧为灰) 黄连半两(去须) 青钱十文 防风三分(去芦头) 朴消三分 地黄汁一合 白蜜三分

【用法】上为细散。用绵裹，纳一青竹筒中，入地黄汁及蜜，以绢油罩盖紧，系筒口。于炊饭内蒸之，候饭熟即泻出。以绵滤过，取少许涂之，一日三四次。

【主治】小儿缘目及眦烂作疮肿痛。

24911 白矾煎

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】白矾(末) 铅丹(研)各一两 附子(去皮脐，生为末) 屋下火煤各半两

【用法】上为末，入白蜜三两煎为煎，入竹筒盛，饭上炊一次。每用少许含。吐涎出。

【主治】口疮。

24912 白矾膏

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】白矾灰一分 硫黄一钱 铁粉一

钱 绿矾半两 川大黄一分(末)

【用法】上为末。以米醋一升，熬如黑汤，收于瓷器中，旋取涂之。

【主治】小儿癣，痒痛不止。

24913 白矾膏

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】白矾(熬令汁尽)一分

【用法】以清水四合，置熟铜器中煎取半合，去滓，加少许白蜜，以绵滤过。每日三次，点如黍米大。

【主治】小儿目睛有膜。

24914 白虎丸

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】青黛 麝香 白牵牛(末) 甘遂(末) 寒食面 大黄(末)各三钱 膩粉 龙脑 粉霜各一钱

【用法】上为细末，滴水为丸，如鸡头子大。每服半丸至一丸，磨刀水化下。量大小加减，微利为度。

【主治】小儿急惊，及天钩客忤。

24915 白虎丸

【方源】《普济方》卷九十三。

【组成】川乌五两 草乌六两 两头尖 全蝎 细辛 香白芷 川芎 乳香 没药 白术 苍术 五灵脂 天麻 人参 防风 菊花 薄荷各三两 独活 白僵蚕 羌活 石膏 雄黄 藁本 茯苓 青皮 大风子 陈皮 桔梗 荆芥 甘草 官桂 芍药 寒水石各二两 白花蛇 乌梢蛇 自然铜以上各一两

【用法】上为细末，梨汤水为丸。麝香少许，滑石为衣，每两作十丸。每服一丸，食后细嚼，热酒送下；头风，茶清送下；牙疼，入盐一捻擦之；浑身疼痛，温酒送下，不拘时候。

【主治】中风身体不遂。

24916 白虎丸

《医方类聚》卷五十九引《必用之书》。为原书同卷“夺命坐丹”之异名。见该条。

24917 白虎丸

【方源】《古今医鉴》卷六。

【异名】白虎丹（《串雅内编》卷三）。

【组成】千年古石灰不拘多少（刮去杂色、泥土，杵为末，水飞过）。

【用法】晒勿令太燥，量可丸即收为丸，如梧桐子大。每服五十丸，看轻重加减，烧酒送下。

【功用】顺气散血，化痰消滞。

【主治】青筋初觉，头疼恶心，或腹痛，或腰痛，或遍身作痛，不思饮食；又治心腹痛，及妇人崩漏、带下；或因气恼致病，或久患赤白痢疾，或打扑内损，血不能散。

24918 白虎丹

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】车前草 九里香 马蹄香 枸杞苗 雁稜菜

【用法】先将马桶洗净，用沸汤倾入，盖少顷，倾出盆内，浴之数次即退。再用上药同捣烂，和麻油遍身自上而下擦之。

【主治】头面四肢眼目俱肿，而惟额上指尖两耳不肿，及不见赤色者。

【宜忌】大忌鸡、鱼、生冷、炙煨、日色、火光、灯烟、汤气，极须谨慎。

24919 白虎丹

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】生白矾一两 枯白矾一两

【用法】上为末，用艾叶熬汤，打面糊二两为丸，如黑豆大，雄黄为衣。每服大人五丸，小儿三丸，白滚汤送下。

【主治】水泻痢疾。

24920 白虎丹

《串雅内编》卷三。为《古今医鉴》卷六“白虎丸”之异名。见该条。

24921 白虎丹

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】大黄三两二钱 陈皮 青皮各八钱 丁香 广木香 槟榔各四钱 党参 巴豆霜 干姜各一两六钱 黄芩二两

【用法】上为细末，水泛为丸。每服四分，

温开水送下，五岁至八岁一分五厘，九岁至十二岁服三分。

【主治】过食生冷，饮食积滞，胃脘寒痛，风寒痢疾。

【宜忌】孕妇及虚弱患者忌用。

24922 白虎汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】知母六两 石膏一斤（碎） 甘草二两（炙） 粳米六合

【用法】以水一斗，煮米熟，汤成去滓，温服一升，一日三次。

【功用】清热生津。

①《阎氏小儿方论》：解暑毒。②《注解伤寒论》：解内外之热。③《麻科活人》：清肺金，泻胃火实热。

【主治】阳明气分盛热。壮热面赤，烦渴引饮，大汗出，脉洪大有力或滑数。

①《伤寒论》：伤寒，脉浮滑，此以表有热，里有寒；三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁面垢，谵语遗尿，发汗则谵语，下之则额上生汗，手足逆冷，若自汗出者；伤寒，脉滑而厥者，里有热。②《局方》：伤寒大汗出后，表证已解，心中大烦，渴欲饮水，及吐或下后七八日，邪毒不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者；夏月中暑毒，汗出恶寒，身热而渴。③《医学入门》：一切时气，瘟疫杂病，胃热咳嗽、发斑，小儿疮疱隐疹伏热。④《痧证汇要》：温病身热，自汗口干，脉来洪大，霍乱，伤暑发痧。

【宜忌】①《伤寒论》：伤寒脉浮，发热无汗，其表不解者，不可与。②《温病条辨》：脉浮弦而细者，不可与也；脉沉者，不可与也；不渴者，不可与也；汗不出者不可与也。

【方论选录】①《伤寒明理论》：白虎，西方金神也，应秋而归肺；夏热秋凉，暑喝之气，得秋而止。秋之令曰处暑，是汤以白虎名之，谓能止热也。知母味苦寒，《内经》曰：热淫所胜，佐以苦甘。又曰：热淫于内，以

苦发之。欲彻表寒，必以苦为主，故以知母为君。石膏味甘微寒，热则伤气，寒以胜之，甘以缓之，欲除其热，必以甘寒为助，是以石膏甘寒为臣。甘草味甘平，粳米味甘平，脾欲缓，急食甘以缓之，热气内蕴，消灼津液，则脾气燥，必以甘平之物缓其中，故以甘草、粳米为之使。是太阳中暍，得此汤则顿除之，即热见白虎而尽矣。②《医方考》：石膏大寒，用之以清胃；知母味厚，用之以生津；大寒之性行，恐伤胃气，故用甘草、粳米以养胃。是方也，惟伤寒内有实热者可用之。若血虚身热，证象白虎，误服白虎者死无救，又东垣之所以垂戒矣。③《伤寒来苏集》：石膏大寒，寒能胜热，味甘归脾，质刚而主降，备中土生金之体；色白通肺，质重而含脂，具金能生水之用，故以为君。知母气寒主降，苦以泄肺火，辛以润肺燥，内肥白而外皮毛，肺金之象，生水之源也，故以为臣。甘草皮赤中黄，能土中泻火，为中宫舟楫，寒药得之缓其寒，用此为佐，沉降之性，亦得留连于脾胃之间矣。粳米稼穡作甘，气味温和，稟容平之德，为后天养命之资，得此为佐，阴寒之物，则无伤损脾胃之虑也。煮汤入胃，输脾归肺，水精四布，大烦大渴可除矣。④《医方集解》：烦出于肺，躁出于肾，石膏清肺而泻胃火，知母清肺而泻肾火，甘草和中而泻心脾之火，或泻其子，或泻其母，不专治阳明气分热也。

【临证举例】①温热《岳美中医案集》：汪某某，男，54岁。患感冒发热，入某某医院，在治疗中身热逐步上升，曾屡进西药退热剂，旋退旋起，8天后仍持续发热达38.8℃，口渴，汗出，咽微痛，脉象浮大，舌苔薄黄。此为温热已入阳明，内外虽俱大热，但尚在气分，以白虎汤加味以治，处方：生石膏60克，知母12克，粳米12克，炙甘草9克，鲜茅根30克（后下），鲜芦根30克，连翘12克。水煎，米熟汤成，温服。下午及夜间连进两剂，热势下降，体温38℃，次日原方续进2

剂，热即下降到37.4℃，后将石膏量减至45克，二剂后体温已正常。②中暑《生生堂治验》：某儿，八岁，中暑，身灼热烦渴，四肢懈惰，一医与白虎汤，二旬余日，犹不效，先生曰：某医之治，非不当，然其所不效者，以剂轻故也，即倍前药与之（贴重十钱），须臾发汗如流，至明日善食，不日复故。③三阳合病《天津医药》（1979；8：357）：某男，70余岁。秋患伤寒证，不治，久而化热，便难溲赤，头常晕，渐加剧，不能起坐，坐则房屋旋转。发热间或恶寒，继则昏瞢，发则口木舌强不能言，手足亦不能动，耳聋，呼之如无所闻，目灼灼直视，约需1小时始复常态，时谵语。曾数就医，均以老年体虚，治当滋补，服药无效，病反日进。其中有认为病有热象，当用清凉者，投之小效。迁延至春不愈，后来我处诊治。脉六部洪滑，舌苔黄厚，口渴引饮。与三阳合病相近，治当用白虎汤。处方：鲜茅根120克，生石膏60克，知母、花粉各15克，粳米9克，甘草6克。服药后病人顿觉清爽，眩晕大减，是日昏瞢仅发二次，但脉之洪滑不减，知其蕴热尚炽，原方加量，先煎茅根，取汤去滓，再入余药，煎取清汤三碗，每小时一碗，日尽一剂。两天后身即不重，耳不聋，转侧自如，昏瞢已不发。又服六七剂，口亦不渴，舌苔渐薄，大便亦通，更进五剂，头晕始去。④热厥证《中医杂志》（1964；11：22）：史某某，女性，38岁，农民。急诊时病人已陷入昏迷三小时。发热已二日，急性热性病容，体质营养不良，全身多汗，皮肤湿润，体温40.5℃，手足微冷，心跳急速，口腔干燥，白色薄苔，脉滑而有力，腹诊腹壁紧张度良好，无抵抗，压痛。来院后静脉注射25%葡萄糖100毫升，为处白虎汤原方。六小时后病人诉口渴，给饮凉开水少量，次日神志清楚，诉头痛乏力，体温38.5℃，续服前方，病情续有好转，第三日恢复常温，又五日痊愈。

【现代研究】抗乙脑作用《中华医学杂志》

(1964; 7: 456): 用本方煎剂于实验性小白鼠流行性乙型脑炎病毒感染的治疗中, 与青叶提取物、竹叶石膏汤、安宫牛黄散等对照组相比较, 本方能提高小白鼠存活率, 经统计学处理, 有显著性差异。

24923 白虎汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】龙骨(研) 白石英(研) 白茯苓(去黑皮) 人参 桑根白皮(锉) 百合 磁石(煨, 醋淬十遍) 各一两 玄参半两 大豆一合

【用法】上为末。每服三钱匕, 以水一盞, 煎取六分, 更入酒半盞, 煎至八分, 去滓温服。

【主治】肺气劳伤。

24924 白虎汤

【方源】《普济方》卷一三五引《三因》。

【组成】知母 甘草(炙微赤, 锉) 各一两 麻黄二两(捣碎) 粳米一合

【用法】上锉细, 以水二大盞, 煮米熟为度, 去滓, 分温三服, 不拘时候。

【主治】阳毒伤寒, 服桂枝汤, 大汗出后, 大渴, 烦躁不解, 脉洪大者。

24925 白虎汤

【方源】《女科万金方》。

【异名】知母石膏汤(《郑氏家传女科万金方》卷二)。

【组成】知母 石膏 甘草 糯米一合

【用法】水二钟, 煎服。

【主治】①《女科万金方》: 男子妇人感冒风寒, 表里俱热, 狂言妄语, 后结不解, 大热大渴; 及暑热发渴。②《郑氏家传女科万金方》: 妇人身热如蒸而渴者。

【备考】方中知母、石膏、甘草用量原缺。

24926 白虎汤

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】石膏四两 知母一两半 人参四两 甘草(炙)二两

【用法】上锉。糯米煎, 米熟为度, 子母同

服, 但加生姜、大枣煎。渴盛者, 更加干葛, 春冬秋寒有证亦服, 但加枣煎。小儿减半。

【主治】温热及中暑烦渴; 并治小儿痘疱、麻疹、痱疮赤黑, 出不快, 及疹毒余热。

24927 白虎汤

【方源】《校注妇人良方》卷七。

【组成】知母 石膏各二钱 粳米半合。

【用法】水煎服。

【主治】胃热作渴, 暑热尤效; 又治热厥腹满, 身难转侧, 面垢谵语, 不时遗溺, 手足厥冷, 自汗, 脉浮滑。

24928 白虎汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】石膏五钱 知母二钱 粳米一勺 甘草七分 人参一钱 五味子十粒 麦门冬(去心) 山梔各一钱

【用法】上锉一剂。水煎, 温服。

【主治】阳明经汗后脉洪大而渴, 或身热有汗不解。

【宜忌】无汗脉浮, 表未解而阴气盛, 虽渴不可用白虎汤; 里有热者方可用。

【加减】秋感热之疫病, 或阳明下后, 大便不固, 热不退者, 或湿温证热不退而大便溏者, 依本方加苍术; 若伤寒汗下后, 自汗虚热不退, 加苍术、人参。

24929 白虎汤

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】熟石膏 金斛 知母 连翘 竹叶 粳米 玄参 山梔 淡芩 生甘草

【主治】疹已出而烦渴者。

24930 白虎散

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】砒霜 铅丹各一分

【用法】上二味, 先取砒研细, 入青葱梢内, 轻轻扎定, 次入秆草内, 如缚粽子样, 以草火烧透, 取砒如金色一铤子, 次取铅丹, 同研匀细。每用时以灯心点药一米许, 入于耳内, 左则左用, 右则右用。

【主治】一切风肿牙痛不可忍者。

24931 白虎散

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】生石膏十两 辰砂五钱

【用法】上为细末，和匀。大人每服三钱，小儿一岁至三岁一钱，四岁至七岁一钱五分，八岁至十二岁二钱，十三岁至十六岁二钱五分，俱用生蜜调下。

【主治】中风；兼治小儿急惊。

24932 白虎膏

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】白石膏（火煨，研极细，水飞过）

【用法】炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，临卧白汤化下；如肺受寒邪，咳嗽，咽膈不利，用麻黄、杏仁煎汤下。

【主治】小儿热嗽有痰。

【备考】本方方名，据剂型，当作“白虎丸”。

24933 白果汤

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】半夏 麻黄 款冬花 桑皮 甘草各三钱 白果二十一个 黄芩 杏仁各一钱五分 苏子二钱 御米壳一钱

【用法】水煎，分二服。

【主治】哮喘痰盛。

24934 白果浆

【方源】方出《本草纲目》卷三十，名见《卫生鸿宝》卷一。

【组成】生白果仁十枚

【用法】搗水饮，每日一服。

【主治】白浊。

24935 白乳汤

【方源】《医方类聚》卷一六五引《御医撮要》。

【组成】薯蓣五两 干姜少许 杏仁二两 甘草一两 白芷三分

【用法】上为细末，不入干姜亦得。每服一钱，入盐少许点下。

【功用】消化食食。

【主治】酒病。

24936 白乳散

【方源】《幼幼新书》卷三十六引《惠眼观证》。

【组成】白丁香半两 乳香 黄丹 白及各一分

【用法】上为末。水调涂帛上贴。

【主治】痈毒。

24937 白金丸

【方源】《医方考》卷五引《本事》。

【异名】郁金丸（《普济方》卷十八引《海上方》）、郁矾丸（《得效》卷八）、金蝉丸（《普济方》卷一〇〇）、蔚金丸（《医统》卷四十九）、矾郁丸（《金鉴》卷四十一）、金矾丸（《仙拈集》卷二）、截癩丸（《串雅内编》卷一）、定心化痰丸（《外科传薪集》）、白玉化痰丸（《全国中药成药处方集》沈阳方）。

【组成】白矾三两 郁金七两（须四川蝉腹者为真）

【用法】上为末，米糊为丸。每服五十丸，水送下。

【功能】去郁痰。

【主治】忧郁气结，痰涎上壅，癩痢痰多，口吐涎沫；并治喉风乳蛾。

①《医方考》引《本事》：忧郁日久，痰涎阻塞包络、心窍所致癫狂证。②《普济方》：一切痢病，久不愈。③《外科全生集·新增马氏试验秘方》：喉风乳蛾。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：忌辛辣食物。

【方论选录】白矾咸寒，可以软顽痰，郁金苦辛，可以开结气。

【临证举例】昔有一妇人，癫狂失心，数年不愈，后遇至人授此方，初服觉心胸有物脱去，神衰洒然，再服顿愈。

【备考】《普济方》引《海上方》本方用法：以薄荷糊为丸，如梧桐子大，每服六十丸。《外科全生集·新增马氏试验秘方》：以白矾、郁金等分和匀，皂角汁为丸。本方改为散剂，名“郁矾散”（见《医略存真》）。

24938 白金丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】朱砂三两(别研为末) 雌黄一两半 硫黄一两

【用法】上二黄同研如粉。先于铛中销成汁，次下朱砂末，搅令匀，即以桑灰汁，煮三日三夜，旋以暖灰添之，日满，即刮入鼎子中，以文火烧干，出阴气尽，重固济，以十斤火煨，候火销至三二斤即住。其药只在鼎子底。作一片，凿取成白金状，以甘草、余甘子，瓷器中水煮一日，出火毒了，研为末，以粟米饭为丸，如绿豆大。每服三丸，空心以冷椒汤送下。渐加至五丸。服之半月，大效。

【主治】一切风，偏风口不收敛，及半身不遂。

【禁忌】忌羊血。

24939 白金丹

【圣惠】卷九十五。为原书同卷“伏火四神玉粉丹”之异名。见该条。

24940 白金丹

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】桑白皮一两(锉) 前胡(去芦)一两 半夏一两(汤泡七次) 白术一两 人参(去芦)半两 陈皮半两 甘遂一分(微炒)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如黍米大。每服五七丸，水送下，周岁至一二岁儿三丸，以上者以上意量加，不拘时候。

【功用】《普济方》消痰实，利胸膈。

【主治】肺壅痰实，胸膈不利。

24941 白金汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【异名】白金散(《御药院方》卷五)。

【组成】桑根白皮(炙，锉) 桔梗(炒)各半两 甘草(炙) 紫苏叶各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎至八分，去滓，食后温服。

【功用】①《圣济总录》：解五劳、益肌肉。

②《御药院方》：利肺下痰，止烦渴。

【主治】肺经壅热。

24942 白金散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】白面 九节菖蒲(末)各一两

【用法】上药再研匀。每服二钱匕，新汲水调下，未止再服。如中暑毒气，生姜、蜜水调下。

【主治】吐血，肺损不止。

24943 白金散

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】狼毒不拘多少

【用法】上为细散。每服一钱匕，用杨一皂子大，沙糖少许，临卧腹空时以温水同化下。来日早取下虫为效。

【主治】脏腑内一切虫，令人偏好食生物，及面黄呕吐，或时心腹发痛。

24944 白金散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】天南星一两(大者，破之) 朴消两半 自矾一钱 甘草半两

【用法】上为粗末，用水五盞，慢火一处煮水尽为度，焙干，为细末，加朱砂末一钱拌匀。每用半钱，煎金银薄荷汤放温调下，不拘时候。

【主治】急惊发搐。

24945 白金散

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】白僵蚕(去丝嘴，直好者)半两(汤洗，焙黄，为末) 天竺黄一分(细研) 真牛黄一钱(别研) 麝香(研) 龙脑(研)各半钱

【用法】上为细末。每服半钱，生姜自然汁调灌，不拘时候。

【主治】诸痢，渐发不省者。

24946 白金散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【异名】比金散(《普济方》卷二九七)。

【组成】乌贼鱼骨不拘多少(削去硬皮)

【用法】上为细末。用麻油调敷。

【主治】①《杨氏家藏方》：恶疮。②《传信适用方》：久新痔痢。

24947 白金散

《御药院方》卷五。为《圣济总录》卷四十九“白金汤”之异名。见该条。

24948 白金散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】桂府滑石不拘多少

【用法】上为细末。先用虎杖、甘草、豌豆各等分，约半两许，水二碗，煎上项药至一碗，去滓，微热，淋洗疮。水冷拭干，上掺滑石末，便睡至明。

【主治】风攻注毒，遍身及手足生热疮疼痛，有黄水出。

24949 白金散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】黄柏 猪胆 轻粉 香油

【用法】黄柏分作手指大小条，慢火炙热，淬猪胆汁中，用二枚，每炙每淬，汁尽为度，研细，入轻粉钱余。香油调敷患处。

【主治】下疳疮。

24950 白金散

【方源】《诚书》卷八。

【组成】牛黄一钱 白僵蚕(炒) 枳壳(炒)各五钱 附子(炮) 胆南星 茯苓 硼砂 牙消 朱砂各二钱半 全蝎(去毒)十个 麝一字

【用法】上为末，糯米粥为丸。生姜汤或麦冬汤送下。

【主治】胎惊，诸痫，潮热。

24951 白金散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】香白芷梢

【用法】上为末。清油调敷。

【主治】①《伤科汇纂》：刀箭伤疮。②《梅氏验方新编》：十足趾折断者。

24952 白金膏

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】桑根白皮三两 柳白皮二两 槐白皮二两 蒺藜白一握(切) 白芷一两 当

归一两 乳香一两 黄丹十三两 羌活一两

【用法】上锉细。用麻油二斤，以慢火煎油，次下三般白皮并蒺藜，煎令焦黄色，去滓，即下诸药，煎半日，又去滓，次下黄丹，以柳枝子搅，令黑色成膏，以瓷盒贮。每用时，即以故帛上摊，贴于疼痛处。

【主治】伤折疼痛。

24953 白鱼酒

【方源】方出《外台》卷十五引《救急方》，名见《本草纲目》卷四十一。

【组成】衣中白鱼七枚 竹茹一握

【用法】以酒一升，煎取二合，顿服之。

【主治】小儿痢疾。

24954 白鱼膏

【方源】《普济方》卷九十二。

【组成】衣中白鱼七枚

【用法】摩偏缓一边，才正便止，恐太过。凡患急边缓边皆有病，先摩缓边，急边少用。

【主治】中风口面喎斜。

24955 白鱼膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】鸡眼膏。

【组成】鲫鱼八两 巴豆三钱

【用法】用香油六十四两将药炸枯，过滤去滓，炼至滴水成珠后温再入官粉六十四两搅匀，收膏，每张油重三分。贴患处。

【功用】解毒消肿。

【主治】诸毒恶疮，痈疽对口，肿毒坚硬不溃，脚生鸡眼。

24956 白兔丸

【方源】《医统》卷七十八引《青囊》

【组成】白兔粪(中秋夜取)四十丸 硃砂五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，甘草五钱(生，搗碎。若患人瘦弱即用炙过甘草)，水一盞，揉取浓汁，五更空心送下。小愈两日，再服下虫药一次为妙。

【功用】追尸虫。

【宜忌】预戒患人不得心躁，冷服不防。

24957 白油膏

【方源】《寿世新编》卷中。

【组成】真桐油三两 防风 白芷各一钱五分

【用法】放油内泡一夜，入铁器内，慢火熬枯，去药沥净滓，将油再熬，俟欲开时，用鸡蛋一个去壳放油内炸至深黄色，去蛋不用，再将油用火慢熬，俟油色极明，能照见人须眉，入白蜡六分，黄蜡四分溶化，赶紧用竹纸十余张，乘热浸入油内，一张放，一张起，令透火气，须张张隔开，日前吹透，若放一处，虽数日火气难退，贴上毒气内逼，难以收功，视疮大小裁纸贴之，顷刻脓粘满纸，弃去再换，一日数十余次，数日脓尽，肉满生肌，脓尽后不贴亦可生肌。脓多者黄蜡六分，白蜡五分，不得稍为增减。

【主治】疔疮数十年不愈者。并治秃头疮。

24958 白沸汤

【方源】《急救仙方》卷二。

【组成】白矾五钱 青黛三钱 豚间贴背干石灰三钱

【用法】上为细末，研至无声为度，拌和令匀。每服三钱，并花水半碗，柳条搅千百下，顿服之，厚衣盖覆良久，再用葱豉汤入醋少许，极热服，少助药力，得汗而解。

【主治】疔疮初发，毒气在表，寒热身痛。

24959 白泽丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】阳起石一两半(煨令通赤，研) 附子(炮，去皮脐，取末)一两半 钟乳粉(成炼好者)二两 白檀香(末)一两 滴乳香(别研)一两 麝香一钱(别研)

【用法】上药和匀，滴水成剂，分作六十丸。每服一丸，水一盏化开，加生姜三片，煎七分，食前、空心通口温服。

【主治】脏腑虚寒，真元不固，肠虚泄利，心腹撮痛，气逆呕吐，自汗。

24960 白降丹

【方源】《金鉴》卷六十二。

【异名】白灵药、夺命丹。

【组成】朱砂 雄黄各二钱 水银一两 硼砂五钱 火消 食盐 白矾 皂矾各一两五钱

【用法】先将朱、雄、硼三味研细，入盐、矾、消、皂、水银共研匀，以水银不见星为度。用阳城罐一个，放微炭火上徐徐起药入罐化尽，微火逼令干，取起。如火大，太干则汞走，如不干则药倒下无用，其难处在此。再用一阳城罐合上，用棉纸截半寸宽，将罐子泥、草鞋灰、光粉三样研细，以盐滴卤汁调极湿，一层泥一层纸糊合口四五重，及糊有药罐上二三重，地下挖一小潭，用饭碗盛水放潭底，将无药罐放于碗内，以瓦挨潭口四边齐地，恐炭灰落碗内也。有药罐上以生炭火盖之，不可有空处，约三炷香去火，冷定开看约一两外药矣。炼时罐上如有绿烟起，急用笔蘸罐子盐泥固之。此丹疮大者用五六厘，疮小者用一二厘，水调敷疮头上。初起者立刻起疱消散，成脓者即溃，腐者即脱，消肿。

【功用】《全国中药成药处方集》(沈阳方)：拔毒消肿，化腐生肌。

【主治】痈疽发背，一切疔毒。

24961 白降丹

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】水银 净火消 白矾 皂矾 炒白盐各五钱

【用法】将上药共研至不见水银星，盛于新大倾银罐内，以微火熔化，火急则水银上升走炉，须用焊炭为妙；熬至罐内无白烟起，再以竹木枝拨之，无药屑拨起为度，则药吸于罐底，谓之结胎；胎成用大木盆一个盛水，水盆内置净铁火盆一个，以木盆内水及铁盆之半腰为度。然后将前就之胎连罐覆于铁盆内之居中，以盐水和黄土封固罐口，勿令出气，出气即走炉；再用净灰铺于铁盆内，灰及罐腰，将火按平，不可摇动药罐，恐伤封口，即要走炉；铺灰毕，取烧红栗炭，攒固罐底，用

扇微扇，炼一柱香，谓之文火，再略重扇，炼一柱香，谓之武火；炭随少随添，勿令间断而见罐底；再炼一柱香，即退火；待次日盆灰冷定，用帚扫去盆灰，并将封口土去净开看，铁盆内所有白霜，即谓之丹。将瓷瓶收贮待用，愈陈愈妙。其罐内胎，研掺瘰疮神效。若恐胎结不老，罐覆盆内，一遇火炼，胎落铁盆，便无丹降，亦为走炉。法用铁丝作一三脚小架，顶炉内撑住丹胎再为稳要。此丹如遇痈疽、发背、疔毒，一切恶毒，用一厘许，以津唾调点毒顶上，以膏盖之，次日毒根尽拔于毒顶上，顶上结成黑肉一块，三四日即脱落，再用升药数次即收功。此丹用蒸粉糕，以水少润，共和极匀为细条，晒干收竹筒内，名为锭子。凡毒成管，即药量管之深浅，插入锭子，上盖膏药，次日挤脓，如此一二次，其管即化为脓，管尽再上升药数次，即收功矣。此丹比升丹，功速十倍，但性最烈，点毒甚痛，法用生半夏对掺，再加冰片少许，名夏冰对配丹，能令肉麻不痛。

【主治】痈疽，发背，疔毒，一切恶毒。

【宜忌】《申雅内编》：降丹乃治顽疮恶毒死肌之物，万万不可多用、乱用，务宜慎之。

24962 白降丹

【方源】《许订外科正宗》卷二。

【组成】水银一两四钱 净火消一两四钱（夏天加三钱） 白矾一两（另研） 朱砂五钱三分（另研） 雄精二钱三分（另研） 硼砂四钱（另研） 皂矾一两七钱 白砒二钱（另研） 食盐三钱

【用法】上药研至不见水银星为度，盛于阳城罐内，用煑炭微火熔化，火急则水银上升走炉，熬至罐内无白烟起，以竹枝拨之，无药屑拨起，用木杵捶实，则药吸于罐底而结胎，胎成，将空罐合上，用绵纸条润以墨水，置于缝间，盐泥封固烤干，如有裂缝，添盐泥密固之，再用宜兴罐头盛水，上放大黄砂盆，中开一孔，将有药之罐在上，空罐在下，入砂盆孔中，水平罐底，然后盆内铺以净灰，轻

轻按平，不可摇动，恐伤封口。铺毕，取烧红栗炭，用扇微扇，文火炼一柱香，再略重扇，武火炼一柱香，炭随少随添，勿令间断而见炉底，再炼一柱香，即退火，俟盆灰冷定，去灰及封口土，开看下罐内所有白霜，即谓之丹，瓷瓶收贮听用。治肿疡脓成不穿，用津唾调少许点毒顶，以膏盖之即穿，或用面糊以竹片拌和为条，切作芝麻大，放膏中对肿头贴之，不可用手指拌，因新降甚烈，恐沾指疼痛起泡；如治溃瘍毒根坚硬如石，用以消化；如用作点药，病者怕疼，可用生半夏对掺，再加冰片少许，能令肉麻不痛，名夏冰对配丹；或用蟾酥少许掺入，亦可不痛。用新丹性烈，寻常之症，只用九一丹为妥，如腐肉厚韧，不化不脱，或对掺，或三七，或一九斟酌用之。年久烈性已退，方可专用，然四围好肉，亦须用生肌之药护之。

【主治】肿疡脓成不穿，溃瘍毒根坚硬如石。

【宜忌】对于肌薄骨露无肉之处，及经脉交会之所，神气之所注，气血之所聚，溃后元气有伤，不能收敛，须藉温补涩敛收功者，此丹不可施。

24963 白降丹

【方源】《王氏医存》卷十四。

【组成】水银一两 火消二两 明白矾三钱 绿皂矾一两 青盐一两 白砒一两或五钱（不可无此） 官硼砂五钱 朱砂三钱 明雄黄三钱 黑铅一两

【用法】先将铅入铁勺，火上化熔，离火，入水银，冷定取下，即可粉矣，研为细末。朱砂、雄黄、白砒、硼砂亦共研为细末。再合诸药，共研细末。将公罐放炭火上，续续下药，以竹箸搅之，药尽化溶，渐搅渐稠渐干，以白烟飞尽为度。又以箸将药摊抹于罐中，务使罐底以至周围贴实粘匀。药既干不再化，起罐离火，则覆罐受火，药乃不坠，此名坐胎。若白烟未尽，或粘药不匀，则覆罐加火，药即坠矣。炼此丹，以善坐胎为工。又以空母

罐在下，实公罐在上，套合，铁丝绊耳，加盐水和赤石脂为泥，封固其口，阴干，再夹红炭烤其口泥，使无潮湿及罅缝。干净地挖坑，内置净水一盂，将母罐半坐于水内，勿使水浸封口之泥，又用净砖瓦，由罐之周围盖密此坑，以平下罐之口为止，上罐四面立放薄砖四片，空间又放碎砖四块，以便架炭也，砖勿挨罐。水碗、净箸、线香、香炉、红炭炉俱备。先用红透炭两节，加于上罐之顶，俟香烬二寸，又加红炭一层于罐顶周围，俟香又烬二寸，又加红炭，须轻手不响为妙。见炭有化尽露罐之处，速即轻轻补红炭一节，炭有黑者，速换红炭。见罐口有走气之处，速即轻手以泥补固。俟三炷香烬，轻手渐渐去炭。俟冷定，轻手扫净炭灰，轻手取起双罐，正放几上，轻手刮吹口泥，开去上罐，丹在下罐，如雪如银矣。此固罐中无潮降，得干丹；若罐中有潮，则丹下皆水。故取罐时仍正放，不可平放也。此丹用之最疼勿论，丹有水，且勿取出，须加生石膏为末一两，拌入丹中，另以盞盖罐口，置炉上以小火煨一炷香时，取过冷定，刮丹收固，名回生法，用之可减其痛。

【主治】痈毒火疔。

24964 白珏膏

【方源】《疡医大全》卷二十五。

【组成】银粉 密陀僧 黄蜡各二两 乳香（去油） 没药（去油） 象皮 白蜡各五钱 轻粉四钱

【用法】除黄白蜡不研，余俱各为细末听用。以真桐油一斤，放锅内熬滚去沫，油清入密陀僧末搅匀取起，入二蜡溶化搅匀，待油稍温，方入乳、没、象、轻末，搅二百余遍，以大棉纸摊上阴干。随疮大小圆长剪贴。初贴时疮中毒水流出，膏药变黑，再换新者贴之。

【主治】疔疮。

24965 白垢散

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】老粪缸边白垢（如牙者）

【用法】洗净，为细末。每服二三钱，水酒下。

【主治】①《治痘全书》：痘疮烦热。②《痘疹仁端录》：痘疹点胀发狂，心血虚，毒气乘之，神不守舍。

24966 白柘汤

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】白柘（东南根一尺，去皮，取中皮，炙熟，细切）

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下。

【主治】人素有劳根，苦作便发，发则身体百节皮肤疼痛，或热极筋急。

24967 白柏丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】白术五钱 黄柏 生地 白芍 黄芩 地榆 香附各二钱

【用法】上为末，蒸饼为丸服。

【主治】湿热下血。

24968 白柿粥

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】干柿不拘多少。

【用法】水浸，下筛，取汁，和糯米泔煮成粥，任食之。和蜜用亦好。

【功用】温补，厚肠胃，健脾胃，消宿食，去面黥，除宿血，润声喉。

24969 白草散

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】甘草五文 白矾十文

【用法】上为细末。含化。

【主治】口舌生疮，或咽喉痛者。

24970 白药丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】白药 黄药 玄参 射干 甘草 桔梗（去芦头）各半两

【用法】上为末，炼砂糖为丸，如弹子大。以绵裹一丸，常含咽津。

【主治】①《圣惠》：咽喉中生疮肿痛。②《圣济总录》：咳嗽。

24971 白药末

【方源】《理伤续断方》。

【组成】白杨皮十二两(米汁浸一宿) 桔梗十两(去苗) 赤芍药九两(酒浸一宿) 川芎半斤(汤泡七次) 白芷十两 山桂半斤(去粗皮) 细辛半斤(去苗) 甘草十两(炙) 花椒五两(去子合口者) 川乌六两(炮) 续断六两(米汁浸) 牛膝六两(去苗, 酒浸一宿) 泽兰叶九两(去叉枝) 当归六两 香附子六两(炒)

【用法】上为细末。每服二钱, 酒调下。病在上, 食后服; 病在下, 空心服; 遍身损, 临卧服。

【功用】续筋接骨。

【主治】打扑伤损, 皮肉破碎, 筋骨寸断, 瘀血壅滞, 结肿不散; 或作痂疽, 疼痛至甚; 或因损后中风, 手足痿痹, 不能举动, 筋骨偏纵, 挛缩不伸; 及劳伤破损, 身背四肢疼痛; 并妇女诸血风气, 产后诸血疾。

24972 白药酒

【方源】《良朋汇集》卷三引王永光方。

【组成】白茯苓 白术 花粉 山药(炒) 薏苡仁 芡实(研) 牛膝各五钱 白豆蔻(去壳) 三钱

【用法】用烧酒十斤, 加入白蜜, 久泡为妙。

【功用】开胃健脾, 补虚劳。

24973 白药散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】白药二两半 生地黄汁三合 生藕汁一合 生姜汁少许

【用法】上四味, 捣白药为末。先煎三物汁令沸, 每以半盏, 入熟水一合, 白药末二钱匕, 搅匀, 食后温饮之。

【主治】衄血, 汗血。

24974 白药散

【方源】《普济方》卷二九一引《卫生家宝》。

【组成】白药子不拘多少

【用法】上为末。每服一钱, 临卧冷米饮或冷水调下。

【主治】瘰癧疮。

24975 白药散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】白药 朴消

【用法】上为末。以小管吹入喉。

【功用】散血消痰。

【主治】喉中热塞肿痛。

24976 白带丸

【方源】《便览》卷四。

【组成】蕲艾 当归 熟地各二两 香附三两(醋煮, 焙) 川芎 人参各一两二钱 白芍(酒炒) 白术 苍术 阿胶 黄柏(酒炒) 樗根皮各一两 地榆七钱 白茯苓八钱 白石脂(火煅) 六钱

【用法】上为极细末, 醋糊为丸, 如梧桐子大。每服六七十丸, 空心温水送下。

【主治】赤白带下。

24977 白带丸

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】藕节八两 芡实二两 白茯苓一两 白茯苓一两 山药三两 莲须一两五钱 莲子二两 金樱膏十八两

【用法】上为末, 金樱膏为丸服。

【主治】白带。

24978 白带丸

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】乌梅炭二两 棕灰二两 樗根皮二两 五味炭一两 熟地炭三两 杜仲二两 山药二两 白芍二两 生耆三两 党参三两 当归二两 菟丝子二两 煅龙骨二两 桑螵蛸二两 五倍子二两(去毛) 煅明矾三两 牡蛎粉二两 金樱子二两(去毛) 川断一两 料豆三两 乌贼骨二两 莲须二两 赤石脂八钱 禹余粮二两(煅)

【用法】上为末, 以芡实粉四两打糊为丸。每服三钱, 淡盐汤送下。

【主治】妇人赤白带。

24979 白带丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】白芍(酒炒) 黄柏(盐水炒) 茅

术(米泔浸)各四两 高良姜一两 豆腐锅巴八两

【用法】上为细末，薏苡仁煎汤泛丸，如梧桐子大。每服三四钱，盐汤送下。

【主治】赤白带下，经水不调，或先或后，头晕眼花，四肢无力，腰痠胸闷，骨蒸内热，饮食减少。

24980 白带丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归八两 白术(炒)八两 木香一两 茯苓八两 川芎二两 甘草四两 生地八两 白芍八两 白鸡冠花四两 杞子四两 莲肉八两 益智仁二两 枣仁(炒)四两 鳖甲胶四两 龟版胶四两 白木耳四两 檀香四两 鹿角胶四两 玫瑰花二两 巴戟肉(炙)四两 吴萸(炙)四两 茜草四两 没石子二两 白矾二两 乌梅肉四两

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重三钱，蜡皮封固。每服一九，温开水送下，一日二次。

【功用】温经散寒，利湿止带。

【主治】妇女湿寒白带，淋漓不止，经期腹痛，身体倦怠。

24981 白带丸

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】当归四两 生白芍三两 野党参(去芦)二两 焦白术三两 茯苓(去皮)四两 椿皮(醋炒)二两 鹿角霜三两 故纸(盐炒)二两 芡实(麸炒)四两 海螵蛸 香附(醋制)各三两 肉桂(去粗皮)一两 陈皮 杜仲炭(盐炒) 续断 甘草各二两 木通一两五钱 吴萸(甘草水制)二两

【用法】上为细末，凉开水为小丸，每斤丸药用桃胶二钱化水，滑石三两上衣，二钱重装袋。每服一袋，白开水送下。

【功用】温经散寒，利湿止带。

【主治】湿寒白带，淋漓不止，经期腹痛，血寒经闭，不思饮食，四肢倦怠，精神不振。

24982 白带丸

【方源】《全国中药成药处方集》(重庆方)。

【组成】乌贼骨一两 山药二两 芡实二两 炒黄柏五钱 醋柴胡四两 白芍一两 续断五钱 香附四钱 白果仁一两 车前子五钱 牡蛎一两 赤石脂五钱

【用法】上为细末，炼蜜加醋醋一两为丸。每服三钱至四钱。

【主治】赤白带下，经水不调或先或后，头晕眼花，四肢无力，腰 胸闷，骨蒸内热，饮食减少。

【宜忌】忌食生冷。

24983 白带丸

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】人参八两 白术(土炒) 茯苓 艾炭 川芎 当归 白芍(炒) 煅龙骨 煅牡蛎 阿胶(炒) 山药(炒) 巴戟(炒) 熟地 杜仲炭 肉桂 黄耆 川断 香附 赤石脂各四两 半夏 苍术 黄柏各二两 破故纸六两

【用法】上为细末，水泛小丸，青黛三两为衣。每服一钱五分，临睡时白水送下。

【主治】赤白带下，淋漓不止，凝滞腹痛，腰痠腿疼，四肢倦怠，多睡少食。

【宜忌】忌生冷食物。

24984 白带丸

【方源】《妇产科学》。

【组成】白术 茯苓 白芍 龙骨 山药 白芷 牡蛎 干姜炭 鹿角霜 榆白皮 赤石脂 陈棕炭

【用法】每服一钱，一日三次。

【主治】肾虚带下稀薄，量多。

24985 白带丸

【方源】《中国药典》。

【组成】黄柏(酒炒)150克 椿皮300克 白芍100克 当归100克 香附(醋制)50克

【用法】以上五味，除椿皮外，其余黄柏等四味，粉碎为细末，过筛，混匀。椿皮加水蒸煮二次，合并蒸液，滤过，滤液浓缩至适

量(酌留部分包衣),与适量的水泛丸,用浓缩液包衣,干燥,打光即得。每服6克,一日二次。

【功用】清湿热,止带下。

【主治】湿热下注,赤白带下。

24986 白带片

【方源】《中药制剂手册》。

【组成】白术(土炒)十五两 车前子十两 泽泻十两 椿根皮十两 茯苓十两

【用法】将白术等五味用煮提法提取三次,取上清液浓缩成膏约十五两,放冷。另取淀粉六两,掺入放冷的浓缩膏内搅拌成软材,制成颗粒,加入2—3%滑石粉约5钱,混合均匀,压片,包滑石粉糖衣,打光,每片重约0.2克。每服6至8片,温开水送下,一日三次。

【功用】补脾燥湿。

【主治】由于脾虚、湿热下注引起的白浊、带下及崩漏。

24987 白带丹

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】苍术三钱 萸肉(去核) 白芍药各二钱半 黄芩(炒) 白芷各二钱 椿根皮(炒) 黄连(炒) 黄柏(炒) 各一钱半

【用法】上为末,面糊为丸。每服五十丸,空心温酒送下。

【主治】妊娠白带。

24988 白带散

【方源】《全国中药成药处方集》(昆明方)

【组成】于术十六两 淮药十六两 苍术六两 茯苓十两 猪苓六两 党参六两 杜仲八两 故纸六两 天雄八两 干姜六两 黄耆十两 柴胡十两 广皮四两 益智六两 薏米六两 甘草三两 白果三两

【用法】上为末。每服二钱半,开水送下,早晚各一次。

【主治】湿盛带下,腰痠肢软。

【宜忌】烦热无白带者忌服。

24989 白垩丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】白垩 龙骨 芍药各十八铢 黄连 当归 茯苓 黄芩 瞿麦 白薇 石韦 甘草 牡蛎 细辛 附子 禹余粮 白石脂 人参 乌贼骨 藁本 甘皮 大黄各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,空腹饮送下,一日二次。不知加之。二十日知,一月百病除。

【主治】女人三十六疾。即十二癥、九痛、七害、五伤、三瘤。十二癥:是所下之物,一曰状如膏,二曰如黑血,三曰如紫汁,四曰如赤肉,五曰如脓血,六曰如豆汁,七曰如葵羹,八曰如凝血,九曰如清血,血似水,十曰如米泔,十一曰如月浣乍前乍却,十二曰经度不应期也。九痛:一曰阴中痛伤,二曰阴中淋漓痛,三曰小便即痛,四曰寒冷痛,五曰经来即腹中痛,六曰气满痛,七曰汁出阴中如有虫啮痛,八曰胁下分痛,九曰腰胯痛。七害:一曰窍孔痛不利,二曰中寒热痛,三曰小腹急坚痛,四曰脏不仁,五曰子门不端引背痛,六曰月浣乍多乍少,七曰害吐。五伤:一曰两胁支满痛,二曰心痛引胁,三曰气结不通,四曰邪思泄利,五曰前后瘤瘕。三瘤:一曰羸瘦不生肌肤,二曰绝产乳,三曰经水闭塞。

【加减】若十二癥,倍牡蛎、禹余粮、乌贼骨、白石脂、龙骨;若九痛,倍黄连、白薇、甘草、当归;若七害,倍细辛、藁本、甘皮、加椒、茱萸各一两;若五伤,倍大黄、石韦、瞿麦;若三瘤,倍人参,加赤石脂、矾石、巴戟天各半两。合药时随病增减之。

【方论选录】《千金方衍义》:方取白垩命名,取其温中益气,专主寒热癥瘕、月闭、积聚;石脂治崩中漏下;禹余粮治血闭、癥瘕;龙骨治漏下,癥瘕,结坚;牡蛎治赤白带下;五者皆本经主治。乌贼骨治气竭肝伤,月事衰少不来,此则《素问》主治。其藁、薇、细辛专散下袭虚风;石韦、瞿麦专祛下阻血热;

芩、连、大黄专除内蕴积滞；然非人参不足以助其力；非附子不足以鼓其雄；不特补泻相需，寒热互用，深得长沙妙旨。而汇取兜涩之品，以安伤残之余，庶几痛止害平，气血渐复，是归、芍、芩、甘、桔皮之属，虽庸不废，斯可藉以流布也。

24990 白垩丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】邯郸白垩 禹余粮 白芷 白石脂 干姜 龙骨 桂心 瞿麦 大黄 石韦 白菰 细辛 芍药 甘草 黄连 附子 当归 茯苓 钟乳 蜀椒 黄芩各半两 牡蛎 乌贼骨各十八铢

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，空心酒送下，一日二次。不知，加至十丸。

【主治】女子三十六疾，胞中病，漏下不绝。

【方论选录】《千金方衍义》：本方主治与前白垩丸不殊，而虚寒过甚，关闸废弛，故取钟乳，佐白垩以固脱利窍，姜、桂、蜀椒，佐附子以安中止崩，白芷杜风，治阴中肿，与藁本无异，以方中辛烈过多，故无藉人参、桔皮助气耳。

24991 白垩丸

【方源】《千金》卷四。

【异名】白垩丹《局方》卷九（续添诸局经验秘方）。

【组成】白垩 白石脂 牡蛎 禹余粮 龙骨 细辛 乌贼骨各一两半 当归 芍药 黄连 茯苓 干姜 桂心 人参 瞿麦 石韦 白芷 白菰 附子 甘草各一两 蜀椒半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心酒送下，一日三次。至月候来时，日四五服为佳。

【主治】①《千金》：妇人月经一月再来，或隔月不来，或多或少，淋漓不断，或来而腰腹痛，噎吸不能食，心腹痛，或青黄黑色，或如水，举体沉重。②《局方》（续添诸局经验

秘方）：治妇人三十六病，崩中漏下，身瘦手足热，恶风怯寒，咳逆烦满，拘急短气，心、胁、腰、背、腹肚与子脏相引痛，漏下五色，心常恐懼，遇患怒忧劳即发，皆是内伤所致。

【方论选录】《千金方衍义》：本方月经不调，例中复有白垩丸于第一方中除去大黄、茯苓、藁本、柑皮，易入姜、桂、椒、芷，于第二方中除去钟乳、茯苓、大黄，仍从事于人参，以无内蕴之滞，故用法稍平。

24992 白垩丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】白垩二两 鹿角霜二两 天南星一两（炮裂） 羌活一两 附子一两（炮，去皮脐） 川乌头一两（炮裂，去皮脐） 天麻一两 蛤粉三两 白附子一两（炮裂） 白僵蚕一两（微炒） 龙脑一分（细研） 麝香半两（细研）

【用法】上为末，入研了药，都研令匀，用糯米饭为丸，如鸡头子大。每服一丸，以温酒研下，不拘时候。

【主治】卒中风，语涩多涎。

24993 白垩丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】白垩一两（火煨过） 干姜（炮）一两 楮叶二两（生，研细）

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心米饮调下。

【主治】水泻，水谷不化，昼夜不止。

24994 白垩丸

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】白垩（火烧）一两 赤茯苓（去黑皮） 生干地黄（焙） 干姜（炮） 陈橘皮（去白，炒）各半两

【用法】上为末，以薄面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】产后冷滑，泄泻不止。

24995 白垩丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】白垩（火煨） 禹余粮（煨，醋淬

七次) 鳖甲(醋炙) 乌贼骨(醋炙) 当归(去芦,酒浸) 鹊巢灰 干姜(炮) 紫石英(火煨,醋炙七次) 附子(炮,去皮脐) 金毛狗脊(燎去毛) 川芎各一两 艾叶灰半两 鹿茸(燎去毛,切片,醋炙) 一两

【用法】上为细末,醋煮米糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心温酒、米饮任下。

【主治】妇人白带,久而不止,面色黧黯,绕脐疼痛,腰膝冷痛,日渐虚困。产后白带,

【备考】《普济方》引本方有香附子(醋煮)二两。

24996 白垩丹

《局方》卷九(续添诸局经验秘方)。为《千金》卷四“白垩丸”之异名。见该条。

24997 白垩散

【方源】《妇人良方》卷七引《千金翼》。

【异名】白善散(《准绳·女科》卷三)。

【组成】白垩土(以米醋一升,煨白垩土令赤,入醋内浸,令冷再煨,再浸,以醋干为度,研取)一两 干姜一分(炮)

【用法】上为细末,研停。每服一钱,饭饮调下。甚者二钱,服一斤以上为妙。

【主治】①《妇人良方》:妇人翻胃吐食。②《普济方》:男子畏寒。

24998 白砂丹

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】茯苓三五斤(去黑皮,为细末。须要坚实者,其赤筋最损目,亦宜去之)

【用法】用水淘三五遍,去筋膜,用白砂蜜对分,拌匀,固封坛口,锅内悬煮一昼夜,土埋三日,去火毒。白汤调服。

【功用】补心补虚,驻容颜。

24999 白砂丹

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】熟地黄二两 白茯苓二两 大川乌一两 干山药二两 苍术二两(米泔浸) 大茴香二两(与大川乌头炒) 粉草二两(即大甘草) 川椒四两(去目)

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒送下;盐汤亦可服。后五日,唇口红润,手足温暖,面有光泽。半月之后,声清目明,夜思饮食,香入脑中。

【功用】补养。

25000 白面丸

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】砒霜方寸匕(于熨斗内炒出烟) 黄丹方寸匙 白面一匕

【用法】加麝香一字,同研,入面糊为丸,搓作铤。每有患者,少蘸生油填在痛处,仍挑洗,去牙缝内烂肉,然后用药方效。

【主治】大人小儿疳,虫蚀,牙齿血出,及走马疳。

25001 白面饼

【方源】《证治宝鉴》卷五。

【组成】白面二钱 砂糖二钱

【用法】用饴糖饼化汁,捻作饼子,炉内燥炒,擦出,加轻粉四钱。令病人吃后吐出病根即愈。三涌三补,屡建奇功。

【主治】咸哮,食咸味即发者。

25002 白骨膏

《普济方》卷三〇九。为原书同卷“黄柏散”之异名。见该条。

25003 白香丸

《普济方》卷二〇六。即《得效》卷四“香白丸”。见该条。

25004 白香散

【方源】《养老奉亲》。

【异名】枫香散(《圣济总录》卷一三二)。

【组成】枫香一分(纸衬于地上,食顷令脆,细研) 膩粉一分

【用法】上为细末。每有患者,先用口内含浆水令暖,吐出洗疮令净后,以药末干敷之。疼痛立止。

【主治】一切恶疮,疼痛不可忍者。

25005 白香散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】枫香脂(研) 膩粉 防风各一分

【用法】上细研令匀。先以含浆水令暖,吐

出洗疮令净,后以药末干敷之。疼痛立止;贴至令瘥即易。

【主治】一切恶疮疼痛,久不瘥者。

25006 白獬丹

【方源】《喉科指掌》卷一。

【组成】明矾一两 火消三钱 硼砂三钱 (各研末,以银罐放炭上,先将明矾入下一层,入火消一层,入矾一层,入硼砂一层,入矾一层,如此入完。煨如馒首样,取出) 生蒲黄一钱 甘草一钱 僵蚕五分 鸡内金五分 (焙存性) 薄荷叶二钱 牙皂五分 (炙) 冰片五分

【用法】上为极细末。吹之。

【主治】咽喉口舌等症。

25007 白饼子

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】玉饼子。

【组成】滑石末一钱 轻粉五分 半夏末一钱 南星末一钱 巴豆二十四个(去皮膜,用水一升,煮干研细)

【用法】上为末,入巴豆粉,次入轻粉,又研匀,却入余者药末,如法令匀,糯米粉为丸,如绿豆大。量小儿虚实用药,三岁以下,每服三丸至五丸,空心紫苏汤送下。若三五岁儿,壮实者不以此为限,加至二十九丸,以利为度。

【主治】小儿痰食积滞内阻,致发惊搐,癫痫,或腹有癖积及夹食伤寒。

①《小儿药证直诀》:小儿伤食后发搐,身体温,多睡多睡,或吐不思食,大便乳食不消,或白色。②《续易简》:小儿腹中有癖,但饮乳者,及漱而吐痰涎乳食。③《玉机微义》:小儿风痰,惊涎,癫痫,惊搐。④《婴童百问》:小儿夹食伤寒,发热呕吐,噎气,肚疼者。

【宜忌】忌热物。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》:此方为温下之剂。钱氏每见积滞而体壮者,概用白饼子下之。下必有积,壮热也因积,故

方用星、夏之辛温以化痰积;用轻粉之辛冷以杀虫积;用滑石之甘寒以降热积;用巴豆以平诸般之积,使痰癖血瘕,气痞食积等物一鼓荡平,不留余孽。

25008 白饼子

【方源】《活幼口议》卷十八。

【组成】白矾(枯白净) 膩粉一钱 白面半两 胡粉(炒)一钱

【用法】上药和匀,水搜作饼,如钱大。每服半饼,大者一饼,饭饮磨化。

【主治】小儿秋痢,号曰毒痢,纯下白,腹肚痛。

【备考】方中白矾用量原缺。

25009 白饼子

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】白滑石 黄芩条各一钱 半夏一枚(炮制) 蛤粉半钱

【用法】上为细末,薄面糊为丸,如豆蔻大,捻为饼子。每服三饼,丁香汤下。新生儿,汤内研灌半饼。

【主治】小儿吐逆。

25010 白前丸

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】白前 贝母(炮,去心) 人参 紫菀(去苗土)各一两 款冬花三分 桑根白皮(炙,銼) 葶苈(隔纸微炒) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒黄,别研如膏)各一两半

【用法】上八味,捣罗七味为末,入杏仁同研匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食后米饮送下。渐加至二十九丸。

【主治】伤寒后,上气咳嗽。

25011 白前汤

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】白前二两 紫菀 半夏(洗)各三两 大戟(切)七合

【用法】上切。以水一斗,渍之一宿,明旦煮取三升,分三服。

【主治】久咳逆上气,身体浮肿,短气胀满,

昼夜倚壁不得卧，喉常作水鸡鸣。

【宜忌】忌羊肉、饴。

【方论选录】《千金方衍义》：咳逆上气而见肢体浮肿，作水鸡声，乃水饮溢于肺胃，流入百骸。故用白前以疏肺气，紫菀以散血气，半夏以涤痰气，大戟以利水气，皆从《金匱》泽漆汤中采出。大戟之利水与泽漆不殊。

25012 白前汤

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】白前五两 紫菀 杏仁 厚朴(炙)各三两 半夏(洗) 麻黄(去节)各四两 生姜一斤 人参 桂心各二两 甘草一两(炙) 大枣十四个

【用法】上切。以水八升，煮取二升半，分三服。

【主治】上气及诸逆气。

【宜忌】忌海藻、菰菜、羊肉、生葱、饴。

25013 白前汤

【方源】《外台》卷二十引《深师方》。

【异名】大白前汤(《圣济总录》卷八十)。

【组成】白前三两 紫菀四两 半夏一升 生泽漆根一升(切，凡四味，水一斗七升，煮取一斗汁，纳入后药) 桂心三两 人参六分 大枣二十个(擘) 白术五两 生姜八两 茯苓四两 吴茱萸五两 杏仁三两(去两仁皮尖，碎) 葶苈二两 栝楼五合

【用法】上药纳前汁中，煮取三升，分四服。当得微下，利小便，气即下肿减。

【主治】水咳逆上气，通身洪肿，短气胀满，昼夜倚壁不得卧，喉中水鸡鸣，大小便不通，不下食而不甚渴。

【宜忌】忌羊肉、饴、生葱、桃、李、雀肉、酢物。

25014 白前汤

【方源】方出《外台》卷十引《广济方》，名见《普济方》卷一八四。

【组成】白前四分 生麦门冬十分(去心) 贝母 石膏 甘草(炙) 五味子 生姜各四分 黄芩五分 杏仁四十颗 淡竹叶

(切)一升 白蜜一匙

【用法】上切。以水七升，煮取二升七合，绞去滓，纳白蜜，更上火煎三沸，汤成后宜加芒消八分，分温三服，每服如人行五六里，须利三二行。

【主治】上气，肺热咳嗽，多涕唾。

【宜忌】忌热面、炙肉、油腻、醋食、海藻、菰菜。

25015 白前汤

【方源】《外台》卷九引《许仁则方》。

【组成】白前三两 桑白皮三两 生地黄一升 茯苓五两 地骨皮四两 麻黄二两(去节) 生姜六两

【用法】上切，以水八升，煮取二升六合，去滓，加竹沥五合。分温四服，食后服之，昼三夜一。觉得力，重合服五六剂佳，隔三日服一剂。

【主治】肺气嗽。

【宜忌】忌醋、茺荑。

25016 白前汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】白前 木通(锉)各二两 防己 麻黄(去根节)各一两半 白茯苓(去黑皮) 厚朴(去粗皮，生姜汁炙紫色) 桑根白皮(锉、炒)各三两 紫菀头五十枚

【用法】上锉细。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，食后良久温服，一日三次。胸中有脓者，当得吐出。

【主治】肺痿咳嗽日久，喘急，仰卧不安。

25017 白前汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】白前一两半 杏仁二七枚(去双仁尖皮，炒) 紫菀(去苗土) 黄芩各一两 麦门冬(去心，焙)二两 紫苏茎叶三分 陈橘皮(汤浸，去白，炒)半两 大麻仁(净淘，研细)

【用法】上八味，除大麻仁旋入外，为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜五片，煎至数沸，入研麻仁半钱匕，再煎至七分，去滓，食

后温服，一日二次。

【主治】咳嗽喘闷，背膊烦疼，四肢无力。

25018 白前汤

《圣济总录》卷六十九。为方出《外台》卷九引《近效方》，名见《圣惠》卷三十七“白前散”之异名。见该条。

25019 白前汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】白前（去土）三分 紫菀（去土）一两半 半夏（汤洗七遍去滑）三两 泽漆根（细切，微炒）三两半 桂（去粗皮）一两半 人参 干姜（炮）各半两 栝楼一枚（去皮） 白术一两 吴茱萸（水浸一宿，焙干，炒）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水三盏，加大枣二个，生姜一枚（拍破），煎至一盏半，去滓，分二服。当小便利，或微溲，肿即减。

【主治】水咳逆上气，通身浮肿，短气胀满，昼夜倚壁不得卧，喉中水鸡声。

25020 白前汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【异名】白前散（《普济方》卷二三六）。

【组成】白前 桑根白皮（炙，锉） 麦门冬（去心，焙）各一两半 旋覆花半两 木通（锉，炒）二两 甘草（炙，锉）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，分二服，空腹、食后各一次。

【主治】骨蒸，肺痿咳嗽，涕唾如胶，胸背烦热。

25021 白前汤

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】白前 昆布（洗去咸，炙干） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 陈橘皮（汤浸，去白，切，炒） 附子（炮裂，去皮脐） 海藻（洗去咸，炙干） 半夏（汤洗七遍） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 甘草（炙，锉）各一两 小麦（醋浸，晒干）三合

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水

一盏半，加生姜一枣大（拍碎），煎至八分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】气瘵初作。

25022 白前汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】白前 桑根白皮（锉） 生干地黄（焙）各一两半 白茯苓（去黑皮）二两半 地骨皮二两 麻黄（去根节）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤风咳嗽，壮热憎寒。

25023 白前汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】白前 细辛（去苗） 川芎 五味子各一两 麻黄（去根节） 芍药 桂（取心）各半两

【用法】上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】肾咳，咳则腰背相引痛，恶风，脉浮。

25024 白前饮

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】白前二两半 桑根白皮（炙） 桔梗（炒）各三两 白茯苓（去黑皮）三分 杏仁（去双仁皮尖，熬）一两半 甘草一两（炙）

【用法】上药各锉，如麻豆大，拌匀。每服三钱匕，水一盏半，煎取七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】虚劳咳嗽，上气壅热，咯吐脓血。

25025 白前散

【方源】方出《外台》卷九引《近效方》，名见《圣惠》卷三十七。

【异名】白前汤（《圣济总录》卷六十九）。

【组成】白前三两 桑白皮 桔梗各二两 甘草一两（炙）

【用法】上切。以水二大升，煮取半大升。空腹顿服。若重者十数剂。

【主治】久咳唾血。

【宜忌】忌猪肉、海藻、菘菜。

25026 白前散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白前三分 旋覆花半两 桑根白皮一两(锉) 赤茯苓一两 汉防己半两 麻黄半两(去根节) 紫菀一两(洗去苗土) 五味子半两 白蒺藜半两(微炒, 去刺)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺痿咳嗽,日月久远,喘息促,肩胛高,仰卧不安。

25027 白前散

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】白前三分 甘草半两(炙微赤, 锉) 人参一两(去芦头) 生干地黄一两 大麻仁三分 桂心半两 赤茯苓一两 黄耆三分(锉) 阿胶八两(捣碎,炒令黄燥) 麦门冬一两半(去心, 焙) 桑根白皮三分(锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】骨蒸肺痿,心中烦渴,痰嗽不止。

【宜忌】忌炙、油腻。

25028 白前散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】白前二分 杏仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 紫菀半两(去苗土) 桑根白皮三分(锉) 甘草半两(炙微赤, 锉) 麦门冬一两(去心) 紫苏茎叶三分 陈橘皮三分(汤浸,去白瓢, 焙)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】暴热咳嗽,心肺气壅,胸膈烦疼,四肢无力。

25029 白前散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】白前一两 紫菀一两(去苗土)

半夏一两(汤洗七遍去滑) 大戟一分(锉碎,微炒) 麻黄一两(去根节) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服二钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】咳嗽,坐卧不得,喉中作呀呷声。

25030 白前散

【普济方】卷二三六。为《圣济总录》卷九十三“白前汤”之异名。见该条。

25031 白姜散

【方源】《医方类聚》卷五十四引《神巧万全方》。

【组成】白姜半两(炮) 附子三分(炮) 甘草半两(炙) 陈橘皮半两 诃黎勒皮一两 厚朴三分(姜汁炙)

【用法】上为末。每服二钱,水一中盏,同煎五分,温服。

【主治】食毒伤寒,头痛,身不大热,心间痞闷,大便不利。

25032 白姜散

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】白姜 良姜(半生半炒)各半两 穿山甲三钱(炮)

【用法】上为末。每服二钱,猪肾酒调下。

【主治】疟疾。

25033 白姜散

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】白姜 木香 官桂 陈皮 槟榔 甘草各等分

【用法】水煎,量儿大小,以绵蘸灌之。

【主治】婴儿胎寒,生后身冷,口气亦冷,肠鸣,泻利青黑,盘肠内钓,心腹绞痛不乳者。

【加减】呕吐,加木瓜、丁香;面青肢冷,去槟榔,加川芎、当归。

25034 白扁饮

【方源】方出《得效》卷十,名见《普济方》卷二五一。

【异名】巴豆灵膏(《普济方》卷二五一)。

白扁豆饮、巴豆膏（《奇效良方》卷六十九）。

【组成】白扁豆 青黛 甘草各等分，巴豆一枚（去壳）

【用法】上为末，以沙糖一大块，水化开，调一盞饮之。毒随利去，却服五苓散之类。

【功用】解砒毒。

25035 白神丸

【方源】年氏《集验良方》卷三。

【组成】白酒药八两（愈陈愈佳） 南苍术（水泡，炒）一两 厚朴（姜炒）一两 生甘草一两 陈皮一两 木香五钱 砂仁五钱

【用法】上为细末，神曲打糊为丸，如梧桐子大。每服三钱。

【主治】一切饱胀，气不顺，停食积聚。

25036 白神散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】白梅末不拘多少

【用法】揩牙。立开。

【主治】中风或吐泻，牙关紧噤，下药不能。

25037 白蚕丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】海藻 僵蚕各等分

【用法】上为末。取白梅肉汤泡，捣为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，临卧米饮送下，一日五六次。毒当从大便泄去。

【主治】蛇盘病，生于头项上交接处。

【宜忌】忌豆、心、鸡、羊、酒、面。

25038 白蚕散

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】白僵蚕一两 麒麟竭 没药各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，麝香温酒调下。

【主治】瘰癧。

25039 白盐方

【方源】《普济方》卷五十三。

【组成】盐五升

【用法】甑上蒸热，以耳枕之，冷即换。或用软布裹熨之患处。

【主治】卒得风疾，耳中恍恍卒痛。

25040 白莲散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】花碱二钱 桑柴灰（炒）一钱 风化石灰半钱 糯米三钱

【用法】上药一处，盛在小瓷罐儿内，上用瓦盖口，用黄泥固济，以文武火焙定半时，取出药，用乳钵研为极细末。每用先用针尖拨过麝子，用药少许干贴。

【功用】《普济方》：去黑子诸般瘤瘰。

【主治】瘰癧或影青。

【宜忌】忌油腻物及当风行立。

25041 白鸭方

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《普济方》卷一九三。

【组成】白鸭一只（去毛肠，洗） 饭半升

【用法】以饭、姜、椒酿鸭腹中缝定，如法蒸，候熟食之。

【主治】水气，胀满浮肿，小便涩少。

25042 白胶汤

【方源】方出《千金》卷十八，名见《普济方》卷一六二。

【组成】白胶五两 干地黄（切）半斤 桂心二两 桑白皮（切）二升 芎藭 大麻仁 饴糖各一升 紫菀二两 大枣二十个 人参二两 大麦二升 生姜五两

【用法】上咬咀。以水一斗五升煮麦，取一斗，去麦下药，煮取三升，分五服。

【主治】肺伤咳唾脓血，肠涩背气，不能食，恶风，目暗眦疏，足胫寒。

【方论选录】《千金方衍义》：白胶乃枫香脂，其性疏通，善于开发肺气，故取以治咳唾脓血；川芎、地黄得桂心和荣之力，紫菀散结之功，可无委积顿湧之虞。且人参助气于上，麻仁滋化于下，桑皮泻肺气之满，大麦降肝气之逆，大枣、饴糖滋肠胃之津气也。

25043 白胶汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】嫩白及四钱（研末） 陈阿胶二钱

【用法】冲汤调服。

【主治】肺叶痿败，喘咳夹红者。

25044 白胶散

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】白胶二两（捣碎，炒令黄燥） 人参（去芦头） 半夏（汤洗七遍去滑） 秦艽（去苗） 紫葳 甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加葱白二茎，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠三两月后，或时伤损，下血不止，绕脐疼痛，吐逆闷绝。

【备考】方中紫葳，《普济方》作“紫菀”。

25045 白胶散

【方源】《普济方》卷一八八引《澹寮》。

【组成】地黄汁一升二合 白胶香二两

【用法】上以瓷器盛，入甑蒸，候胶消服。

【主治】吐血。

25046 白胶煎

【方源】《医方类聚》卷一六七引《吴氏集验方》

【组成】白胶香

【用法】上为末，平铺纱帛上，火上烘干，乘热贴。未可，再用。

【主治】壁镜咬。

25047 白酒煎

【方源】《原病式》卷下。

【组成】绿矾四两 五倍子 百草霜一两 木香二钱

【用法】上为细末，用酒煎飞面为丸，如梧桐子大。每服五丸，空心酒送下，一日二三次。

【主治】黄肿。

25048 白粉散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】海螵蛸三分 白及三分 轻粉一分

【用法】上为末。先用浆水洗，拭干，贴。

【主治】诸疳疮。

【方论选录】《小儿药证直诀类证释义》：轻

粉拔毒，海螵蛸，白及粘腻长肌，浆水化滞物以治疳疮。

25049 白粉霜

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】水银一两 食盐 明矾 火消绿矾各二两五钱 朱砂 雄黄各三钱

【用法】内除水银，先将余药和匀，渐入阳城罐内，烱尽方下水银，慢火令干，有霜头起为度，以空罐对合，盐泥固。星一地窠，以水盆一个置窠内，以空罐放水盆内，以泥壅之，只留上瓶，武火煨三炷香为度，取出上白药。每用一厘，冷水调点上，三四日即愈。

【主治】梅毒。

25050 白粉霜

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】铅炼水银 龙骨（煨）各二钱 芦甘石三钱（煨） 轻粉一钱

【用法】上药各为末，和匀。干掺。

【功用】专收疮口。

25051 白屑膏

《普济方》卷四十八。为《外台》卷三十二引《集验方》“生发膏”之异名。见该条。

25052 白通汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】葱白四茎 干姜一两 附子一枚（生，去皮，破八片）

【用法】以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

【功用】①《注解伤寒论》：温里散寒。②《成方切用》：复阳通脉。

【主治】少阴病，下利脉微者。

【方论选录】①《注解伤寒论》：少阴主水，少阴客寒，不能制水，故自利也。白通汤，温里散寒。内经曰：肾苦燥，急食辛以润之，葱白之辛，以通阳气，姜、附之辛，以散阴寒。②《医方考》：少阴属肾，水脏也，得天地闭藏之令，主禁固二便，寒邪居之，则病而失体矣，故下利。葱白，所以通阳气也；姜、附，所以散阴寒也。是方也，能散阴而通阳，故

即葱白而名曰白通。③《金鉴》：少阴病，但欲寐，脉微细，已属阳为阴困矣。更加以下利、恐阴降极，阳下脱也。故君以葱白大通其阳而上升，佐以姜、附急胜其阴而缓降，则未脱之阳可复矣。

【临证举例】寒厥 《哈尔滨中医》〔1960；2：22〕：赵某，男，30岁。患者于1951年在成都读书时，突感双脚冰冷，至1955年更见厉害，冬天不能离火，热天也一点不能沾凉风，既往有遗精史，从1949年起常患腹泻便溏，至今仍时发时止。西医诊断为雷诺氏病，经治年余未效。于1956年11月6日来我院医治，院内医师诊断为严重的寒厥证。给服白通汤，并加重其剂量，共服13剂基本改善，后又继服14剂，病即痊愈。

25053 白通汤

【方源】《外台》卷二引《肘后方》。

【组成】大附子一枚（生，削去黑皮，破八片） 干姜半两（炮） 甘草半两（炙） 葱白十四茎（一方有犀角半两）

【用法】上切。以水三升，煮取一升二合，去滓，温分再服。

【主治】伤寒泄痢不已，口渴不得下食，虚而烦。

【宜忌】忌海藻、菘菜、猪肉。

25054 白通汤

【方源】《易简》。

【组成】干姜二两 附子（生用）二两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水二盏，煎六分，去滓温服。

【主治】伤寒发热，大便自利。

25055 白通汤

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】白术 木通 木瓜 前胡 柴胡 羌活 独活 花粉 金银花 风藤 牛膝 甘草 陈皮 角针 蒺藜 薄荷 米仁 苍耳子 皂角子各等分

【用法】每贴加土茯苓一两，生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】风癰。

25056 白梅丸

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】白僵蚕不拘多少（直者，炒令黄色）

【用法】上为末，用陈白梅肉捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，熟水送下，空心、午后各一次。

【主治】风毒、气毒瘰癧。

25057 白梅丸

【方源】《普济方》卷六十引《仁存方》。

【组成】白梅二十五个（取肉） 白矾一钱 甘草（末） 生蓖麻四十九粒（去皮）

【用法】上为细末，为丸如鸡头子大。以绵裹之，含化。

【主治】喉闭及肿痛。

【备考】方中甘草用量原缺。

25058 白梅丸

【方源】《普济方》卷三十六。

【组成】生硫黄 白梅

【用法】共研成膏，为丸如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下。

【主治】反胃。

25059 白梅汤

【方源】《局方》卷十（吴直阁增诸家名方）。

【组成】白梅（研破）二十九斤 檀香十四两 甘草十三斤半 盐（炒）十五斤

【用法】上为末。每服一钱，擦生姜，新汲水下。如酒后干哕，恶心舌涩，如茶吃。

【主治】中热，五心烦躁，霍乱呕吐，口干烦渴，津液不通；及酒后干哕，恶心舌涩。

25060 白梅饮

【方源】《普济方》卷三十八引《余居士选奇方》。

【组成】橡斗子不拘多少 白梅肉（以蜜拌和，填在橡斗子内，候满）

【用法】两个相和，铁线扎之，烈火煨存性，为末。米饮调下。

【主治】肠风。

25061 白梅散

【方源】方出《医学正传》卷八，名见《幼科证治大全》。

【组成】盐白梅(烧存性) 红枣(连核烧存性) 铅丹(火飞) 人中白(火飞) 龙脑少许

【用法】上为细末。敷之。

【主治】小儿口疮。

25062 白黄散

【方源】《医统》卷六十二引《易简》。

【组成】白矾 雄黄 细辛 瓜蒂各一钱

【用法】上为细末。以雄大胆汁为剂，如枣核。塞鼻中。

【主治】鼻鼈，瘰肉，鼻痔。

25063 白黄散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】白矾 15 克 甘草 1.5 克 大黄 31 克

【用法】上为细末。外用。

【主治】女阴溃疡。

25064 白雪丸

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】消石一两 硫黄一两 白矾一两

【用法】上以固济了瓶子一所，先下消石，次下硫黄，后下白矾，其瓶盖上留一小窍子，先掘一地坑，内更着水瓶子一所，坐令安稳，便将药瓶坐于瓶上，用泥密固之，以慢火逼之，候窍中相次烟出尽，即却泥之后，用大火熬令通赤，候冷，开瓶取出药，于纸上摊，用甘草水洒地令湿，以盆合之，二日出火毒了，细研，用绿豆粉，以水调和，丸如梧桐子大。每服五丸，于食后以冷水送下。

【主治】头偏痛。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“白雪丹”。

25065 白雪丸

【方源】《苏沈良方》卷五。

【组成】天南星(炮) 乌头(炮，去皮) 白附子(生) 半夏(洗) 各一两 滑石(研) 石膏 龙脑 麝香(研) 各一分

【用法】上为末，稀面糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，姜腊茶或薄荷茶送下。

【主治】痰壅胸膈，嗜逆及头目昏眩困倦，头目胀痛。

【宜忌】食后服为佳。

【临证举例】头目昏眩 予每遇头目昏困，精神懵冒，胸中痰逆，愤愤如中酒，则服此药，良久间如褰一重裘，豁然清爽，顿觉夷畅。

【备考】《御药院方》无乌头。

25066 白雪丸

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】乌头(去皮脐) 附子(去皮脐) 白附子 天南星 天麻 麻黄(去根节) 甘草(并生用) 各等分

【用法】上为末，水浸宿炊饼为丸，如樱桃大，火煨寒水石粉为衣。每服一丸，热酒或葱茶嚼下。良久以热粥投之。

【主治】伤寒头痛，三日以内。

25067 白雪丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】白矾五两(上好者，捣罗为末)

【用法】上于银锅中，以真牛乳五升，和白矾，煎令泣泣如雪，以寒食蒸饼末，旋下于锅中，搅令匀，为丸如梧桐子大。每服十五丸，空心以粥饮送下。

【功用】止泄痢，除骨髓风。

【主治】女人风冷及血气；男子冷病，肠风泻血。

25068 白雪丹

《医方类聚》卷八十。即《圣惠》卷四十“白雪丸”。见该条。

25069 白雪丹

【方源】《灵药秘方》卷上。

【组成】盐 矾 消 皂矾各二两五钱

【用法】上为末，入锅炒九分干，加汞二两，朱砂五钱，共研无星带青色，入包酒瓶内按紧，上用布(如瓶口大)盖住，再用黄泥靠瓶遍周围按紧，中留一孔，依瓶口大，俟泥干，再用夏布一块扎瓶口，用阳城罐一个，将

药罐对口扎定，封固如法，再用大瓷盆一个盛水在内，将前药瓶倒立空罐底，立盆内，其盆上用砖如法隔之，先将罐内药圈记何处，止其火亦止到药边为度，或过药一指亦可，药出上罐入下罐，即过分火候，其功效同，猛火亦可，可先文后武，共三炷香，火足冷定，取起下罐，内有水不可横浸，入水湿了上罐口药，开罐取出，其药松白色为妙，然不松白亦可用。未出脓者，用之点起泡自破，出水再用药纸贴之，自干而愈。

【功用】拔毒，去脓血。

【主治】一切肿毒。

25070 白雪丹

【方源】《良方合璧》卷上。

【组成】真川贝六两（去心，研） 生半夏四两（研）

【用法】五月五日午时合和，在铜锅内，微火炒嫩黄色，冷后入瓷器收贮，勿泄气。每服一分五厘，生姜汁二三匙调药，隔水煨热，未来时先服一服，重者再服一服。

【主治】疟疾。

【宜忌】愈后忌食南瓜、鸡蛋、芋艿、螃蟹、蜆。

25071 白雪汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】干姜末三分

【用法】人乳一钟和服。

【主治】痘虚弱不浆不靥，及癍瘡。

25072 白雪糕

【方源】《古今医鉴》卷四引单孟齐方。

【组成】大米一升 糯米一升 山药四两 芡实四两 莲肉（去皮心）四两

【用法】上为细末，加白沙糖一斤半，搅和令匀，入笼蒸糕。任意食之。

【功用】①《古今医鉴》引单孟齐方：调脾健胃，固本還元。②《证治汇补》：养元气，生肌肉，润皮肤，益血秘精，安神定智，壮筋力，养精神，进饮食。

【主治】①《古今医鉴》引单孟齐方：内伤。

②《回春》：虚劳泄泻。

【备考】方中糯米，《回春》作“梗米”。《证治汇补》作“白茯苓”。

25073 白雪糕

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】干山药二两 人参二两 茯苓二两 莲肉二两 芡实二两 神曲（炒）一两 麦芽（炒）一两 大米半斤 糯米半斤 白沙糖一斤

【用法】上为末，蒸糕。当饭食之。

【主治】腹胀。

25074 白眼药

【方源】《青囊秘传》。

【组成】月石一两 荸荠粉三钱 梅片五分 麝香五厘

【用法】上药先以净月石为极细末，以荠粉飞净，再研，以后梅片、麝香和入。

【主治】一切老眼糊涂，迎风流泪，外内翳障。

25075 白蛇丸

【方源】《霉疔新书》。

【组成】乌梅一钱 竹虫蛀末三钱（无则以淡竹末代之） 牙茶（华产物）一钱五分 白蛇（酒浸，少炙）二钱 洩疏皮一钱五分（乌桕及纳遏末葛苳，当长夏时采之，余月难得） 轻粉一钱（纸包，入搏饭内煨熟，取出用）

【用法】上为极细末，米糊为丸，如绿豆大。每旦食前服一钱六分，以赤小豆煎汁送下。过五六日，则当齿龈黑，血自出。完七日而后，宜用淡味噌汁煮瓢蓄、萝卜、冬瓜、鳢脯、鲮鱼、鳊鱼之类食啖之。嗣以白蛇汤。

【主治】杨梅结毒，痼疾痼病。

【宜忌】七日内，须忌禽兽、鱼鳖、卤盐、茶、酒。唯以白粥将养之。

25076 白蛇汤

【方源】《霉疔新书》。

【组成】当归 川芎 芍药 甘草 大黄 白蛇（酒浸，少炙） 黄芩 肉桂 桂枝 槿

榔 山椒 丁子 茯苓 人参(用俗称萨摩小人参者) 青木香各等分(一方加威灵仙、萍蓬根、没药、乳香)

【用法】加生姜二片，水煎服。七日后又用加味四物汤、祛毒煎。

【主治】杨梅结毒，痼疾废病。

25077 白蛇散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】白花蛇二两 青皮 黑丑各五钱 生犀角五分

【用法】上为末。每服一钱，加膩粉五分，研匀，五更糯米饮调下。巳时利下恶物，十日后再进一服。如疮已成者，一月可效。利后用海藻、石决明、羌活、瞿麦各等分为末，米饮调下二钱，一日三次，下尽清水后，调补以除病根。

【主治】九漏瘰癧，憎寒发热，或痛或不痛。

【宜忌】忌发风壅热物。

25078 白蛇散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】蛇退(烧存性) 坑厕板上浮泥

【用法】上为末。童便调敷。

【主治】白蛇缠腰。腰里起红泡一围，如袴腰样。

25079 白银丹

《普济方》卷三七二。为《幼幼新书》卷十引《万全方》“银朱丸”之异名。见该条。

25080 白银汤

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】纹银不拘多少(或用银器一件亦可) 薄荷 灯草

【用法】水煎服。

【主治】小儿微有惊风，夜啼，体热不安。

25081 白鸽肉

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】白鸽子一只(去肝肠，净) 血竭(一年者)一两(二年者二两，三年者三两，为末，入鸽肉)

【用法】以线缝住，用无灰酒煮极烂。令病人食之，瘀血自行；如心中慌乱，白煮肉一

块，食之。

【主治】干血癆。

25082 白鸽煎

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】白鸽一只

【用法】治如法，切作小块，以土苏煎。含而咽其汁。

【主治】消渴，饮水不知足。

25083 白绿丹

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】人中白一钱(煨) 铜绿三分 麝香一分 蚯蚓二条(葱白汁浸，火炙，为末)

【用法】上药各为细末。敷之。

【主治】走马牙疳。

25084 白绿散

【方源】《医统》卷六十三。

【组成】白芷 铜绿各等分

【用法】上为细末。掺舌上，以温醋漱之。

【主治】口舌疮，不能食。

25085 白斑散

【方源】《古今名方》。

【组成】细辛6克 白芷 雄黄各3克

【用法】上为细末。用醋调匀，外搽。

【功用】祛风。

【主治】白癫风。

25086 白散子

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】白药子不拘多少(为末)

【用法】用鸡子清调涂在纸花上，纸可碗口大，贴在脐下胎存处，干即以温水润之。

【功用】护胎。

【主治】妊娠伤寒。

25087 白散子

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】栝楼根 知母(焙) 贝母(去心) 甘草(炙，锉)各等分

【用法】上为散。每服半钱匕，煎黄蜡、米饮调下。

【主治】小儿咳嗽。

25088 白散子

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】白附子 大香附子各半两(炒) 半夏一分(姜制) 黑牵牛二两(半生,半炒令熟) 大甘遂一分(以大麦炒,候麦黄赤色,去麦不用,须极慢火炒之)

【用法】上为末。每服二钱,量患人虚实加減,以蜜酒调下,续饮温酒一两盏。候所苦处刺痛为度,微利三五行,泻出恶物即愈。次用青凉膏贴之。气盛者一服二钱,余更裁度。

【主治】发背。

25089 白散子

【方源】《三因》卷二。

【异名】白散(《医学金针》卷二)。

【组成】大附子(生,去皮脐) 桂府滑石各半两 园白半夏(汤洗二十一次) 三分

【用法】上为末。每服二钱,水二盏,加生姜七片,蜜半匙,煎七分,空腹冷服。

【主治】肝肾虚,为风所袭,卒中涎潮,昏塞不语,呕吐痰沫,头目眩晕,上实下虚,真阴耗竭;兼治阴证伤寒,六脉沉伏,昏不知人;霍乱吐泻,饮食不进,小便淋沥不通,眼赤,口疮,咽喉冷痛。

【加减】霍乱,加藿香;小便不利,加木通、灯心、茅根煎。

25090 白散子

【方源】《三因》卷十二。

【组成】附子一枚(煨熟,新水浸一时久,去皮脐,焙干)

【用法】上为末。每服一钱,白沙蜜二钱,水一盞,煎七分,通口服。

【主治】久年咳嗽不愈。

25091 白散子

【方源】《三因》卷十五。

【组成】晋矾不拘多少(煨) 轻粉少许

【用法】上为末。搽疮上。如治漏疮,每挑一钱,入黄柏末一钱、轻粉半钱。

【主治】妬精疮,痒不可忍,皮肤诸疮,手抓疽疮,漏疮。

25092 白散子

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】牡蛎三两(煨,研) 寒水石一两半(煨,研) 天南星(炮) 白僵蚕(炒,去丝嘴) 龙骨各一分

【用法】上为细末。搽疮上。

【功用】止疼痛,生肌肉,灭瘢痕。

【主治】破伤风。

【宜忌】避风将息,勿令着水。

25093 白散子

【方源】《普济方》卷三五五。

【组成】大川乌(去皮脐) 南星 半夏 白附子各一两 羌活 黄芩各五钱

【用法】上生用,锉散。每服三钱,加生姜五片,水一钟半煎服。

【主治】产后瘀血结滞,发为寒热,心胸如火烦躁。

25094 白葱散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】川芎 当归 生地 白芍 枳壳 厚朴 莪术 三棱 茯苓 官桂 干姜 人参 川楝肉 神曲 麦芽 青皮 茴香 木香各等分

【用法】加葱白、食盐,水煎服。

【主治】一切冷气入膀胱,疝痛;胎前产后腹痛,胎动不安,或血刺痛,兼血脏宿冷,百节倦痛,肌体怯弱,劳伤带癖。

【加减】如大便利,用诃子;大便闭,去盐,加大黄。

25095 白雄散

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】雄黄一两 白附子五钱 皂荚(炙,去皮弦筋)三钱

【用法】上为末。如黑肿、斑块、赤癣,以老姜蘸药一两擦;若鹅掌、雁来等风,用煨姜蘸药擦;如烂风疮,用蟹黄调涂极妙。

【主治】黑肿,斑块,赤癣,鹅掌风,雁来风,烂风疮。

25096 白痧药

【方源】《良方合璧》。

【组成】白胡椒一两 北细辛二钱 檀香木三钱 牙皂一钱 焰消三钱 明矾三钱 蟾酥三钱 丁香三钱 冰片五分 麝香五分

【用法】上为极细末，或加金箔二张，研匀收贮。嗅之。

【主治】暑痧。

25097 白痧药

【方源】《医方易简》卷四。

【组成】蟾酥 冰片各五钱 牙消三钱 硼砂一钱五分 珍珠 白檀香各一钱五分 飞滑石七钱

【用法】上为极细末，用小瓶收贮。发痧时闻搐取嗅。

【主治】痧证。

25098 白痧散

【方源】《全国中药成药处方集》(杭州方)。

【组成】生半夏四两 川贝母 月石各二两 麝香四钱六分 梅冰片四钱二分 西牛黄二钱 杜蟾酥九钱

【用法】上药各为细末，和匀，玻璃瓶封固。每用少许，吹入鼻孔。病重再服一分，凉开水调下。

【主治】伤暑受热，霍乱痧胀，绞肠腹痛，胸闷呕吐，头晕鼻塞，瘟疫秽气，中风昏厥，不省人事。

【宜忌】孕妇忌内服。

25099 白善方

【方源】《普济方》卷三〇八。

【组成】鸡子 白善

【用法】鸡子和白善。敷之。浸淫为广，以大蒜磨研书墨涂之。

【主治】螻蛄尿疮。

25100 白善散

《准绳·女科》卷三。为《妇人良方》卷七引《千金翼》“白垩散”之异名。见该条。

25101 白铤子

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】白降丹(即白灵药)四钱 银麝二钱 寒水石二钱 人中白二钱

【用法】上为细末，以白及面打糊为铤，大

小由人，不可入口。每用以陈醋研敷患处，如干再上，自能消毒。

【功用】消毒。

【主治】初起诸毒，痈疽，疔肿，流注，痰包，恶毒，耳痔，耳挺。

25102 白菰丸

【方源】《外台》卷二十六引《范汪方》。

【组成】白菰 狼牙 藟芦 桃花 贯众各三分 橘皮二分 芫荽一分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如小豆大。旦以浆水服一剂。日中乃食，立下。服此药下赤虫如笋茎者一尺所，有头目百余枚，病愈。

【主治】三虫。男子病大腹面黄，欲食肉；或胁下有积大如杯，小腹亦坚，伏痛上下移，呕逆喜唾，心下常痛。

【宜忌】宿勿食；妊身妇人不得服之。

【临证举例】虫证 九江谢丘病胁下有积，大如杯，小腹亦坚，伏痛上下移，呕逆喜唾，心下常痛，欲食肉，服此药下虫无头足，赤身，有口尾二百余枚得愈；九江陈防病大腹烦满，常欲食生菜，服此药下白虫，大如臂，小者百余枚，立愈。

25103 白菰丸

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】白菰一两 黄耆一两(锉) 木香一两 枳壳一两(麸炒微黄，去瓤) 玄参一两 乌蛇二两(酒浸，去皮骨，炙令黄) 斑蝥十四枚(去头足翅翎，以糯米拌炒，令米黄)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心及晚食前以粥饮送下。

【主治】瘰癧结肿有头，脓水不止。

25104 白菰丸

【方源】方出《圣惠》卷七十三，名见《济生》卷六。

【组成】鹿茸一两(去毛，涂酥，炙令黄) 白菰三分 狗脊半两(去毛)

【用法】上为末，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】①《圣惠》：妇人漏下白色不绝。②《济生》：室女冲任虚寒，带下纯白。

【方论选录】《医略六书》：鹿茸扶阳御寒，以壮督脉；狗脊补肾填精，以益肾元；白菰专祛久遏之湿热，以清经脉也；醋煮艾汁丸之，温酒下，使湿热顿化，则寒郁自解，而督肾内充，带脉无不完复，何白带之淫溢不已哉！

【备考】《济生》本方用法：用艾煎醋汁，打糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空温酒送下。

25105 白菰汤

【方源】方出《圣惠》卷四十五，名见《圣济总录》卷八十三。

【组成】漏芦三两 白菰三两 槐白皮三两 蒺藜子二两（微炒，去刺） 五加皮三两 甘草三两（炙微赤）

【用法】上锉细。以水一斗，煮取一升，去滓，看冷暖，于避风处洗之。

【主治】脚气。脚上生风毒疮，肿疼痛。

25106 白菰汤

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】白菰一两 黄芩一两 赤芍药一两 丹参一两

【用法】上锉细。以水三升，煮至一升半，以帛浸拓肿上，频频换之。

【主治】痈肿溃后。

25107 白菰汤

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】白菰三两 阿胶二两（炙令燥）

【用法】上为粗末。每服二钱匕，酒、水共一盞，加生地黄汁二合，同煎至七分，去滓温服。如无地黄汁，加生干地黄一分同煎亦得。

【主治】吐血不止。

25108 白菰汤

《普济方》卷四〇七。为《圣惠》卷九十一“白菰散”之异名。见该条。

25109 白菰贴

《外台》卷二十四引《删繁方》。为《肘后

方》卷五“白菰薄”之异名。见该条。

25110 白菰贴

【方源】《医心方》卷十五引《效验方》。

【组成】大黄 黄芩 白菰各三分 芍药二分 赤石脂一分

【用法】上药治下筛。以鸡子白和如泥，涂纸以铺肿上，燥易之。

【主治】卒痈肿。

25111 白菰散

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《千金》卷八。

【组成】白菰二分 附子一分

【用法】上为末。每服半刀圭，一日三次。

【主治】中风肿痹，风痹筋急，肝痹。

①《肘后方》：中风肿痹虚者。②《千金》：风痹肿筋急，展转易常处。③《永乐大典》引《风科集验》：肝痹。

【宜忌】《外台》：忌猪肉、冷水。

【备考】《千金》本方用法：每服半刀圭，酒下，一日三次，不知增至一刀圭，身中热行为候，十日便觉。

25112 白菰散

【方源】《普济方》卷二二九引《肘后方》。

【组成】芫荽六分 狼牙四分 白菰二分

【用法】上药治下筛，以苦酒二合，和一宿。次早空腹服之。

【主治】寸白虫为病，令人眼光无泽，脚膝少力。

25113 白菰散

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】白菰二两 半夏三两（汤洗七遍，生姜浸一宿，熬过）

【用法】上为末。每服方寸匕，水调下，一日三次。若轻浅疮十日出，深疮二十日出，终不停在肉中。

【主治】金疮，箭在肉中不出。

25114 白菰散

【方源】《外台》卷二十六引《古今录验》。

【异名】赤小豆散（《圣济总录》卷一四一）。

【组成】赤小豆四分 黄耆三分 芍药二分 白薇二分 黄芩三分 桂心三分 附子(炮) 牡蛎各二分(熬)

【用法】上为散。每服方寸匕，酒若泔汁下，一日三次。

【主治】十年痔，如鼠乳，脓出，便作血剧。

25115 白薇散

【方源】方出《千金》卷四，名见《圣济总录》卷一五二。

【组成】鹿茸一两 白薇十八铢 狗脊半两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，空心米饮下，一日三次。

【主治】漏下色白。

25116 白薇散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】白薇三两 天雄三两(炮裂，去皮脐) 商陆一两 黄芩二两 干姜二两(炮裂，锉) 踯躅花一两(酒拌，炒令干)

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】白癫风，遍身斑点痒痒。

25117 白薇散

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《圣济总录》卷一一五。

【组成】白薇 黄连(去须) 龙骨 乌贼鱼骨 赤石脂各一分

【用法】上为细散。每用一钱，绵裹塞耳中。

【主治】聾耳，出脓血不止。

25118 白薇散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】白薇一两 川大黄一两 赤石脂一两 赤芍药一两 莽草一两 黄芩一两 黄连一两(去须) 吴茱萸一两

【用法】上为末。以鸡子清和如泥，涂布上，贴于肿处，干即易之。

【主治】①《圣惠》：恶核脓肿不消；瘰癧结核，根源深固，肿硬疼痛。②《普济方》：痈疽。

25119 白薇散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】白薇半两 甘草半两 玄参半两 木香半两 赤芍药半两 川大黄半两

【用法】上为细散。以醋调为膏，贴于患上，干即易之。

【主治】瘰癧生于颈腋，结肿寒热。

25120 白薇散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】白薇二两 黄芩二两 莽草(艾叶)二两 地松三两 石灰五两 狗头骨五两(烧灰)

【用法】上为细散。用敷疮上。

【主治】金疮久不愈。

25121 白薇散

【方源】《圣惠》卷九十一。

【异名】白薇汤(《普济方》卷四〇七)。

【组成】白薇(末)三分 白及(末)半两 生油麻二合(生捣)

【用法】上为末。更用蒸萝卜一个，烂研一处，以酒调似稀膏。先以童便洗，后便涂之。

【主治】①《圣惠》小儿冻手，皴裂成疮。②《普济方》：冻疮，偏发耳上及手足，令皴肿生疮。

25122 白薇散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】白薇(炮) 当归(切，焙) 附子(炮裂，去皮脐)各半两 黄芩(去黑心) 干姜(炮) 天雄(炮裂，去皮脐)各一两 羊踯躅半两(蒸熟，炒干)

【用法】上为散。每服半钱至一钱匕，酒调下，一日三次。

【主治】风，头项及面上白驳，渐长如癣，但白红色。

25123 白薇散

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】白薇二分 牡丹(去心)三分

【用法】上为散。每服三钱匕，温酒调下，空心、日午、夜卧各一次。

【主治】箭头不出。

25124 白薇散

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】白薇 白及 黄芩 当归 芍药 吴茱萸各半两

【用法】上为细末。看疮多少，用生蜜调膏，摊纸上，先用盐汤热些洗了拭干，贴疮，一日换一次。

【主治】肾脏风毒流注，脚膝生疮，痛痒有时。

25125 白薇散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】白及 白薇 络石各半两（取干者）

【用法】上为细末。干掺疮上。

【功用】敛疮。

25126 白薇散

【方源】《百一》卷十六。

【组成】天南星一两 蝎一钱 大草乌半两 白矾五文

【用法】上为细末。先以手于癣处抓动，将药掺贴。每用药二钱许，入烧蟹壳灰一钱，合和生油、好粉贴疮。

【主治】干湿疮癣延生，或如钱成圈晕，久不愈者。

【备考】本方名白薇散，但方中无白薇，疑脱。

25127 白薇散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】白薇 白矾（枯，别研） 远志 雄黄各半两（别研） 藜芦一分 麝香一钱（别研） 白芷一两

【用法】上为细末。以腊月猪脂调敷之。

【功用】长肉生肌。

【主治】发背疽疔。

25128 白薇散

《得效》卷十二。为《圣惠》卷九十一“黄柏散”之异名。见该条。

25129 白薇散

【方源】《普济方》卷二八五。

【组成】白薇 乌头（炮） 黄芩各等分

【用法】上为末。和鸡子白敷上。

【主治】痈肿。

25130 白薇散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】白薇

【用法】同槿树皮煎汤饮之。

【功用】收敛疮口。

25131 白薇散

《医部全录》卷四五六。为《圣惠》卷九十一“赤芍药散”之异名。见该条。

25132 白薇膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】白薇三两 白芷三两 芎藭 大黄 黄连各二两 当归三两 黄柏二两 败八合（炒） 羊脂三两 猪脂二升

【用法】上咬咀，以二脂合煎，纳诸药，微火煎，膏成去滓，候凝。敷之。

【主治】痲，瘰癧疮。

25133 白薇膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】白薇 黄连各二两 生胡粉一两

【用法】上药治下筛，溶脂调和。敷之。

【主治】皮肤中热痲，瘰癧。

25134 白薇膏

【方源】方出《外台》卷二十三引《广济方》。名见《圣济总录》卷一二六。

【组成】白薇 甘草（炙） 青木香 芍药 大黄各三两 玄参三两

【用法】上为散，以少酢和稀糊。涂故布贴上，干易之，勿停。

【主治】瘰癧息肉结硬。

【宜忌】忌猪肉、五辛、热肉、饮酒、热面。

【备考】方中甘草，《圣济总录》作“莽草”。

25135 白薇膏

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】白薇三分 矾石半两（生用） 白石脂一分 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，研如膏）

【用法】上为细散，次入杏仁膏，研令匀，

后入新鸡子白一枚，酥二两相和，研为膏，入瓷器中盛。每夜取涂面上，来日以温浆水洗之。

【主治】伤寒豌豆疮愈后，满面疮瘢久不没。

25136 白薇膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】白薇 白石脂 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，研)各半两

【用法】上为末，更研极细，以鸡子白调和，稀稠得所，瓷盒盛。每临卧涂面上，明旦以井花水洗之。

【主治】面粉皴。

25137 白薇膏

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】白薇一两 白及一两 白蜡三黄耆一分 麝香(研)一分 乳香(研)一分 牡丹皮一分 芍药一分 丁香一分 麻油半斤

【用法】上药除油并研药外，并锉细，先用油煎十余沸，即下锉药，候黄耆赤黑色，用绵滤过，慢火煎十余沸，次下诸研药，搅不住手，候凝成膏，于瓷器中盛，下麝香搅令匀。每用少许，涂贴患处，一日三五次。

【主治】唇疮。

25138 白薇膏

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】白薇 羊粪 栝楼根各半两

【用法】上捣如膏。封裹疮上，一复时其刺自出。

【主治】狐尿刺，久不愈。

25139 白薇膏

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】白薇 白及 白芷各一两 突厥子两半

【用法】上为细末，用牛酥五两煎为膏。早晨涂在眼睛内；夜半涂亦得。

【主治】风牵险出外障。

25140 白薇膏

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】白薇 白及 白僵蚕 当归 大黄 乳香 桃枝 柳枝 槐枝 桑枝 皂荚枝各等分

【用法】上为末，每用香油一斤，入前药浸三宿，缓火熬，以焦黄色为度，滤去滓，加黄丹半斤，候油欲再滚，即掇锅于地上，用槐枝频搅匀，滴水不散为度。

【主治】一切恶疮肿毒。

25141 白薇膏

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】白薇 白及 白芷 白薇皮 石决明 牛蒡子各等分

【用法】上为末，用牛脂熬，将末入内，同熬成膏。早、晚以膏搽于睑胞。屡用有效。

【主治】风牵出险外障。

25142 白薇膏

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白薇面二两 祛湿药膏(或凡士林)八两

【用法】调匀成膏。外敷患处。

【功用】收敛除湿，解毒止痒。

【主治】一切渗出性皮肤病。

25143 白薇膏

【方源】《肘后方》卷五。

【异名】白薇贴(《外台》卷二十四引《删繁方》)。

【组成】白薇 黄连 大黄 黄芩 茵草 赤石脂 吴茱萸 芍药各四分

【用法】上药治下筛，以鸡子白和如泥。涂故帛上，薄之，开小口，干即易之。

【主治】痈肿瘰癧，核不消。

25144 白薇膏

【方源】《鬼遗》卷四。

【组成】白薇 大黄 黄芩各等分

【用法】上药治下筛，和鸡子白。涂布上，薄痈上，干燥辄易之。亦可以三指撮药末，置三升水中煮三沸，绵注汁，拭肿上数十过，以寒水石末涂肿上，纸覆之，燥，复易，一易，辄以煮汁拭之，昼夜二十易之。

【主治】痢症。

25145 白蔻散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】白蔻 红蔻 苍术 羌活 陈皮 厚朴 槟榔 枳壳 香附各一钱五分 姜皮 白术 砂仁各一钱 甘草八分

【用法】生姜、灯心为引。

【主治】酒病发表后，上膈已松，但脐下气胀痛，周身复旧酸麻胀。

25146 白蜡膏

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】生地 当归各一两

【用法】用麻油一两，煎药枯黑，滤去滓，加白蜡或黄蜡一两熔化，候冷搅匀，即成膏。或加乳香、没药、龙骨、血竭、儿茶、轻粉尤妙。

【功用】去腐生肌止痛，补血续筋。

【主治】痢症，发背，烫火。

25147 白蜡膏

《洞天奥旨》卷十五。为《外科启玄》卷十二“杖疮白蜡膏”之异名。见该条。

25148 白鲜汤

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】白鲜皮 麦冬 茯苓 杏仁 细辛 白芷各七分 桑白皮 石膏各一钱

【用法】用黑豆水煎服。

【主治】鼻干痛。

25149 白膏子

【方源】《医方类聚》卷一六九引《新效方》。

【组成】北硫黄二两（别研如粉，舶硫黄亦可） 砒霜一钱半（别研） 腊月猪脂八两（熬净）

【用法】上以猪脂，重阳炖烊，入二味（研末）和匀，瓷盒密收，勿令泄气。春加柏油，减猪脂；夏加煨过千年石灰，船灰亦可。乘痒搔动疮痂，以指蘸药擦之，不要药多，只要擦得入肉。休敷面目及男女前后阴、奶上；休洗热汤。

【主治】顽癣，疥癬，一切痒疮。

25150 白膏子

【方源】《医方类聚》卷一八七引《经验良方》。

【组成】牡蛎少许。

【用法】上为末。用糯米粥调之，涂伤折处，却以杉木板夹之。

【功用】接骨。

25151 白膏药

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】乳香一两 沥青 寒水石各二两（并研为末） 轻粉四五钱（同前三味合研令匀）

【用法】上同入坩石器内，慢火熔，不住用篦子搅匀如泥，先手上涂油，圆得成膏子，以熟水浸三日，瓷盒子收之。熬时入油少许，如浸三日尚硬，再入少油更熬，亦勿令过，当得所可也。不得犯铜、铁器。临用先以温盐蘸汁洗疮拭干，摊作纸花子贴之，五日一换。

【主治】发背，诸痢肿恶疮。

【宜忌】忌食辛酸热毒物。

25152 白膏药

【方源】《普济方》卷二七三。

【组成】官粉四两 脂麻油九两

【用法】上药沙铍内文武火慢煎，不宜大火，火大色黄，火小透油。

【主治】疔疮，及一切恶疮。

25153 白膏药

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】蓖麻子（去皮，研为泥）

【用法】旋摊膏药贴之。

【功用】消肿散毒。

【主治】痢症，恶疮，发背，附骨痢。

25154 白膏药

《医学入门》卷八。为《直指附遗》卷二十二“秘传白膏药”之异名。见该条。

25155 白膏药

【方源】《回春》卷八。

【组成】白及一两 猪脂油六两 芸香四两 樟脑四两 轻粉 乳香 没药 孩儿茶各二钱 片脑五分。

【用法】上药各为末，将油铜锅化开，先下白及，次下芸香、樟脑、儿茶，一二时取出，离火，方下乳香等药，候冷，又下片脑、轻粉，膏成，将瓷罐内盛之。每用油纸摊贴患处。如外伤出血，候血尽，用葱、花椒煎水，将患处洗净拭干，敷药，不必包裹。

【功用】生肌。

【主治】跌打或刀斧所伤，外伤出血；疮毒。

25156 白膏药

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】光粉二两 甘石（煨，水淬，飞过）白石脂（煨） 龙骨 乳香 没药 枫香 樟脑 水银各一钱 麝香 片脑各一分 黄蜡半两 柏蜡 猪油各一两半

【用法】上为末，先熔蜡，次入油，和匀候冷，调末搅匀，油纸摊贴。瘰疬，作隔纸膏贴之。

【主治】杖疮，瘰疬。

25157 白膏药

【方源】《便览》卷四。

【组成】腊月猪油四两 嫩柳条四十九寸 黄蜡二两 朝脑三钱 轻粉一钱五分 乳香 没药各一钱

【用法】将腊月猪油沙锅内熬，加嫩柳条油内熬焦为度，去柳枝，随加黄蜡熔开，下火，入朝脑，烟尽为度，后加轻粉、乳香、没药。贴。

【功用】止疼。

【主治】烫火伤，各样杖疮。

25158 白膏药

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】净巴豆肉十二两 蓖麻子（去壳）十二两 香油三斤 蛤蟆（各衙人发一团）五个 活鲫鱼十尾

【用法】先将巴豆肉、蓖麻子入油内浸三日，再将蛤蟆浸一宿，临熬时入活鲫鱼共炸焦，去滓净，慢火熬油，滴水成珠，离火倾于净锅内，再加官粉二斤半、乳香末五钱，不时搅之，冷定为度。用时重汤炖化，薄纸摊

贴。

【主治】诸疮肿毒，溃破流脓。

25159 白膏药

【方源】《年氏集验良方》卷六。

【组成】炉甘石一两（先以黄芩、黄柏、黄连用童便煮汁，候冷，方将甘石入倾银罐内煨红，淬入童便汁内许久） 水龙骨一两（数百年水中石灰更妙，船底石灰亦可） 乳香（去油）五钱 没药（去油）五钱 川连五钱 龙骨五钱（煨） 官粉一两 麝香五分 冰片一钱 轻粉三钱 黄蜡三钱 白蜡一钱

【用法】上为细末。用公猪油四两，熬油去滓，入黄蜡、白蜡溶化，略冷，入药末搅成膏，若硬，加香油些须。任用。

【主治】夏月疮毒不收口；伤手疮。

25160 白膏药

【方源】《易简方便》卷四。

【组成】顶上炉甘石（以轻能浮水者佳，炭火内烧三五炷香久，研末，摊地上一日，冷透火气）

【用法】用猪油和匀捣溶。摊贴。

【功用】拔毒生肌。

【主治】无名肿毒，小儿胎毒，黄水湿疮无皮，红肉现露，日久不愈。

25161 白蜜汤

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷一九九。

【组成】童便一升 蜜三匙

【用法】上相和，煎三四沸。温汤顿服之。每发日，平旦即一服，直至发时勿食，重者不过三服。

【主治】①《圣惠》：疟，无问新久，发作无时。②《普济方》：疟，瘵疴。

25162 白蜜汤

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【异名】白蜜酒（《济阴纲目》卷九）。

【组成】白蜜二两 生地黄汁一盞 酒半盞

【用法】上三味，将地黄汁与酒于铜器中煎五七沸，入蜜搅匀。分作两服，放温，相次再服。服三剂，百病可愈。

【功用】《济阴纲目》：缓肝行血。

【主治】妊娠堕胎后恶血不出。

25163 白蜜饮

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】白蜜二两 生地黄汁一升

【用法】上药搅匀，用银石器慢火煎至半升，放令极冷，再于重汤内温过。顿饮。

【主治】吐血。

25164 白蜜酒

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】白蜜一合 酒二合

【用法】相和煎暖。食前服。

【主治】风隐疹，搔痒不止。

25165 白蜜酒

《济阴纲目》卷九。为《圣济总录》卷一五八“白蜜汤”之异名。见该条。

25166 白蜜膏

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】紫苏子三两 生姜汁一合 白蜜一中盏 鹿角胶 杏仁各三两 生地黄汁一盞

【用法】上药捣熟，入生姜、地黄、蜜相和，以慢火熬成膏，于不津器中密收之。每服半匙，以温粥饮调下，一日三次。

【主治】久新咳嗽上气，心胸烦热，唾脓血。

25167 白敷药

【方源】《疡医大全》卷八引吴近宸方。

【组成】陈小粉 白蔹 生半夏 白芷 生南星 白及 五倍子 三奈 人中白各三两

【用法】上为细末，瓷瓶密贮。火痰用黄蜜调；流痰、湿痰用鸡蛋清调；癰疽、腮痈、腋痈、喉痰用米醋调；唯乳证用活鲫鱼一尾，捣烂去骨，和药末捣敷。

【主治】一切流痰、湿痰、寒痰、喉痰、腮痈、腋痈、妇人乳痈、乳疽、乳吹、癰疽。

25168 白鹤丹

【方源】《永乐大典》卷九八〇引《凤髓经》。

【组成】白花蛇肉半两（酒浸，去皮，炙黄焦） 白附子（生用）二个 僵蚕（去丝） 天南星（去皮，红酒煮） 天麻 轻粉

【用法】上为末，法酒煮面糊为丸，如黍米大。薄荷汤入酒一滴化下。

【主治】小儿慢脾风不醒，四肢冷，不食呕逆，渐生风疾。

【备考】方中僵蚕、天南星、天麻、轻粉用量原缺。

25169 白鹤散

【方源】《传信适用方》卷三。

【异名】提毒散（《普济方》卷二七八引《卫生家宝》）。

【组成】寒水石二两（软者。烧不爆散者，乃是寒水石；烧爆裂散，即是石膏，不可用）

【用法】上用炭火烧寒水石通赤，为细末。冷水调少许在疮高处，后用万金膏贴，一日一次，用此药后便软做疮头儿，更用七圣散，扫膏药周回肿处，药干即更扫。

【主治】疮肿，热毒肿硬难消。

25170 白薇丸

【方源】《千金》卷二。

【组成】白薇 细辛 防风 人参 秦椒 白蔹（一云白芷） 桂心 牛膝 秦艽 羌活 沙参 芍药 五味子 白僵蚕 牡丹 蛭蟪各一两 干漆 柏子仁 干姜 卷柏 附子 芎藭各二十铢 紫石英 桃仁各一两半 钟乳 干地黄 白石英各二两 鼠妇半两 水蛭 虻虫各十五枚 吴茱萸十八铢 麻布叩复头一尺（烧）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，酒送下，一日二次，稍加至三十丸。当有所去，小觉有异即停服。

【功用】令妇人育子。

【主治】《圣惠》：妇人子宫风虚积冷，经候不调，面无血色，肌肉消瘦，不能饮食；带

下,久无子。

25171 白薇丸

【方源】《千金》卷二。

【组成】白薇十八铢 紫石英三十铢 泽兰 太一余粮各二两 当归一两 赤石脂一两 白芷一两半 芎藭一两 藁本 石膏 菴蒿子 卷柏各二十铢 蛇床子一两 桂心二两半 细辛三两 覆盆子 桃仁各二两半 干地黄 干姜 蜀椒 车前子各十八铢 蒲黄二两半 人参一两半 白龙骨 远志 麦门冬 茯苓各二两 橘皮半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,酒送下,一日二次。渐增,以知为度,亦可至五十丸。

【主治】久无子,或断绪,上热下冷。

【宜忌】慎猪、鸡、生冷、酢、滑、鱼、蒜、驴、马、牛肉;觉有孕即停;三月正择食时,可食牛肝及心。

25172 白薇丸

【方源】《外台》卷三十三引《广济方》。

【组成】白薇 细辛 厚朴(炙) 椒(汗) 桔梗 鳖甲(炙)各五分 防风 大黄 附子(炮) 石硫黄各六分(研) 牡蛎 蒙二分 人参 桑上寄生各四分 半夏(洗) 白僵蚕 续断 秦艽 紫苑 杜仲 牛膝 蛇虫(去翅足,熬) 水蛭各二分 紫石英(研) 朴消 桂心 钟乳 当归各八分

【用法】上药治下筛,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空腹温酒送下,一日二次。渐加至三十丸。

【主治】妇人百病,断绝绪产。

【宜忌】忌生冷、油腻、伤、生血物、人苋、生葱、生菜、猪肉、冷水、粘食、陈臭。

25173 白薇丸

【方源】《外台》卷三十三引《广济方》。

【组成】白薇 牡蛎 藁本各五分 当归 干地黄各七分 芎藭 人参 柏子仁 石斛 桂心 附子(炮) 五味子 防风 吴茱萸

甘草(炙) 牛膝 桑寄生各六分 姜黄七分 禹余粮八分 秦椒二分(汗)

【用法】上药治下筛,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空腹酒送下,加至三十丸,一日二次。

【功用】《局方》:补调冲任,温暖子宫,祛下脏风冷,令人有子。

【主治】①《外台》引《广济方》:久无子。②《局方》:胞络伤损,宿受风寒,久无子息,或受孕不牢,多致堕损。

【宜忌】①《外台》引《广济方》:忌生葱、生菜、热面、荞麦、猪肉、葵菜、茺萸、菰菜、海藻、粘食、陈臭物。②《局方》:才觉妊娠即住服,已怀孕者尤不宜服之。

25174 白薇丸

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】白薇一两 知母一两 地骨皮一两 生干地黄一两 麦门冬一两半(去心,焙) 甘草半两(炙微赤,锉) 蜀漆半两 葳蕤 陈橘皮各一两(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前以粥饮送下。

【主治】伤寒后阴阳易,四肢或寒或热。

25175 白薇丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【异名】小白薇丸(《局方》卷九)。

【组成】白薇一两 车前子半两 当归半两(锉碎,微炒) 芎藭半两 蛇床子半两 藁本三分 卷柏三分 白芷三分 覆盆子三分 桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 麦门冬二两半(去心,焙) 人参三分(去芦头) 桂心三分 菖蒲三分 细辛半两 干姜半两(炮裂,锉) 熟干地黄一两 川椒一两(去目及闭口者,微炒出汗) 白茯苓三分 远志二分(去心) 白龙骨一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心及晚食前以温酒送下。

【功用】①《局方》:壮筋骨,益血气,暖

下脏，防风冷，令人有子。②《济阴纲目》：补气行血。

【主治】①《圣惠》：妇人无子或断绪，上热下冷。②《局方》：妇人冲任虚损，子脏受寒，多无子息，断续不产，或月水崩下，带漏五色，腰腹疼痛，面黄肌瘦，月水不匀，饮食减少，夜多盗汗，面生肝黯，齿摇发落，脚膝疼痛，举动少力。

25176 白薇丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】白薇一两 熟干地黄二两 白前半两 当归半两（锉，微炒） 附子半两（炮裂，去皮脐） 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 山茱萸半两 牛膝半两（去苗） 防风半两（去芦头） 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 桂心半两 白芷半两 赤石脂一两 柏子仁一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 禹余粮一两（烧，醋淬七遍） 藁本半两 牡丹三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】妇人脏腑久冷，腰膝疼痛，背膊虚烦，月水不利，无子。

25177 白薇丸

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】白薇三分 柏子仁一两 牡丹三分 熟干地黄一两 芎藭半两 羌活半两 当归三分（锉，微炒） 黄耆半两（锉） 人参三分（去芦头） 桂三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 石斛三分（去根，锉） 白茯苓一两 白芍药半两 五味子半两 白术三分 甘草三分（炙微赤，锉） 肉苁蓉三分（酒浸一宿，锉，去皱皮，炙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】产后风虚劳损，寒热发歇，血脉虚竭，四肢羸弱，饮食无味。

25178 白薇丸

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】白薇（拣）一两 赤芍药 乌贼鱼骨（去甲）各半两

【用法】上为末，炼醋一盏熬成膏，为丸如梧桐子大。每服二十丸，食前以熟水送下，一日二次。

【主治】妇人白带不止。

25179 白薇丸

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】白薇（去芦头） 牡丹皮（锉） 熟干地黄（焙） 木香 当归（切，焙） 肉豆蔻仁 远志（去心） 附子（炮裂，去皮脐） 禹余粮（火煨，醋淬五七遍，别研） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，切，焙） 各二两 芎藭 白茯苓（去黑皮） 细辛（去苗叶） 石膏（别研） 独活（去芦头） 吴茱萸（汤洗七遍去滑，焙） 各一两 蜀椒（去目并闭口，炒出汗） 半两 黄耆（锉） 五味子（微炒） 桂（去粗皮） 各三分

【用法】上二十味，除别研外，捣罗为末，入研药拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心食前以温酒送下。

【主治】妇人血海冷急，不能养胎，妊娠数堕。

25180 白薇丸

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】白薇 柏子仁（研） 附子（炮裂，去皮脐） 鳖甲（醋炙，去裙襖） 当归（切，焙） 黄耆（锉） 各一两 人参 桂（去粗皮） 石斛（去根） 芍药（炒） 牡丹皮 羌活（去芦头） 各三分 熟干地黄（焙） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 各一两一分 甘草（炙，锉） 芎藭各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温米饮送下，不拘时候。

【主治】产后羸劳，寒热时作，肢体羸弱，饮食无味。

25181 白薇丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】人参（去芦头） 当归（洗，焙）

香白芷 赤石脂 牡丹皮 藁本(去土) 白茯苓(去皮) 肉桂(去粗皮) 白薇(去土) 川芎 附子(炮, 去皮脐) 延胡索 白术 白芍药各一两 甘草(炙) 半两 没药半两(别研)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 每一两作十丸。每服一丸, 食前温酒或淡醋汤化下。临月服之即滑胎易产。

【功用】安胎, 滑胎易产。

【主治】产后诸疾, 四肢浮肿, 呕逆心痛; 或子死腹中, 恶露不下, 胸胁气满, 小便不禁, 气刺不定, 虚烦冒闷; 及产后中风口噤, 寒热头痛。

25182 白薇丸

【方源】《普济方》卷三三一引《卫生家宝》。

【组成】白薇五两(净洗) 地黄二两(洗, 焙) 牛膝(酒浸一宿, 焙) 当归(酒浸一宿, 焙) 山茱萸(焙) 肉桂(不见火) 白术 诃子皮 石斛 附子(炮熟, 去皮尖) 黄连 干姜 肉豆蔻(生) 人参(焙) 萆薢(焙) 槟榔(生) 茯苓(焙) 没药(生, 研) 麒麟竭(生) 大黄(焙) 肉苁蓉(去皮毛, 切, 焙) 木香(焙) 薯蓣(焙) 各一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空心、日午盐酒送下; 盐汤亦可。

【主治】妇人血气弱, 四肢倦怠, 不思饮食, 气冷微疼, 赤白带下, 血崩。

25183 白薇丸

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】白薇 柏子仁 白芍药 当归 桂心 附子 萆薢 白术 吴茱萸 木香 细辛 川芎 槟榔各半两 熟地黄二两 牡丹皮一两 紫石英一两 人参三分 石斛 白茯苓 泽兰叶 川牛膝各三分

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 晚食前空心温酒送下。

【主治】妇人月水不利, 四肢羸瘦, 吃食减少, 渐觉虚乏, 无子。

25184 白薇丸

【方源】《济生》卷六。

【组成】白薇 紫石英(火煨, 醋淬七次) 琥珀(别研) 白芍药 桂心(不见火) 川续断(酒浸) 防风(去芦) 山茱萸(取肉) 当归(去芦, 酒浸) 柏子仁(炒) 川乌(炮, 去皮尖) 牡丹皮(去木) 各一两 木香(不见火) 半两 麝香(别研) 半钱

【用法】上为细末, 生姜自然汁打米糊为丸, 如梧桐子大。每服七十丸, 空心、食前温酒、米饮任下。服此药先宜多进苏合香丸, 温酒化服。

【主治】妇人搐搦。

25185 白薇丸

《产乳备要》(注文)引《施圆端效方》。为《产乳备要》“蠡斯丸”之异名。见该条。

25186 白薇丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】白薇半两 防风 白蒺藜(去角, 炒) 石榴皮 羌活各三钱

【用法】上为末, 米粉糊为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 白汤送下。

【主治】漏睛脓出。心气不宁, 风热停留在睑中, 眦头结聚生疮, 流出脓汁, 或如涎水, 粘睛上下, 不痛, 仍无翳膜。

25187 白薇丸

《普济方》卷三五〇。为《圣惠》卷八十一“补益白薇丸”之异名。见该条。

25188 白薇丸

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】白薇一两 人参两半 附子一两(炒) 熟地三两 桂心一两 白芍两半(酒炒) 吴茱一两(醋炮) 当归二两 紫石英二两(醋煨) 槟榔一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸。每服二钱, 温酒送下。

【主治】寒热气逆, 经迟无子, 脉沉紧涩。

【方论选录】附子补火, 以御寒邪; 人参扶

元，以通血脉；熟地补阴，专滋血室；桂心暖血，力行寒滞；当归养冲脉之血；白芍敛任脉之阴；槟榔破滞降逆；吴茱温中逐冷；紫石英温涩子宫，能令有子；嫩白薇降泄虚阳，可除寒热也；蜜丸酒下，俾火暖阳回，则寒散滞消，而血气内充，自然腹痛退而寒热降，岂不经调而有子乎。

25189 白薇汤

【方源】《普济方》卷二三八引《指南方》。

【组成】白薇 紫苏各三两 当归二两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，煎一盏，去滓服。

【主治】郁冒。

25190 白薇汤

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】白薇（焙干） 细辛（去苗叶）各一两半 龙齿（捣末）三两 杏仁（去皮尖双仁，炒）八十枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水二盏，煮取八分，去滓温服，空心、午时、夜卧各一次。风热盛实，即入竹沥少许，搅匀服。

【主治】风惊恐，四肢牵掣，神志不宁，或发邪狂叫，妄走见鬼，若癫痫状。

25191 白薇汤

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】白薇 蜀漆叶各半两 常山一两 知母（切，焙）半两 鳖甲（去裙襕 醋炙黄）三分 甘草（炙，锉） 苦参各半两 大黄（生）一两 升麻半两 石膏（碎）三分 豉一合 蒜三枚（独棵者，切） 淡竹叶（切）三两 赤茯苓（去黑皮）三分 龙胆 黄芩（去黑心）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，酒半盏，同煎至一盏，去滓，未发前温一服，发时一服，仍以药汁涂手面良。

【主治】瘧症，经百日或一年者。

25192 白薇汤

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】白薇 当归各一两 人参半两

甘草（炙）一分

【用法】上为散。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】①《全生指迷方》：郁冒血厥，居常无苦，忽然如死，身不动，默默不知人，目闭不能开，口噤不能语，又或似有知而恶闻人声，或但如眩冒，移时乃寤。②《医学入门》：产后胃弱不食，脉微多汗。

【方论选录】《本事方释义》：白薇气味苦咸微寒，入足阳明；当归气味辛甘微温，入手少阴、足厥阴；人参味甘温，入足阳明；甘草味甘平，入足太阴，通行十二经络。以咸苦微寒及辛甘微温之药和其阴阳，以甘温甘平之药扶其正气，则病自然愈也。

25193 白薇汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】白薇二钱 麦冬三钱 款冬花 桔梗各三分 百部二分 贝母五分 生地三钱 甘草三分

【用法】水煎汤，漱口服，日服一剂。服十日虫死。后用溉喉汤三十剂。

【主治】喉痹。喉咙必先作痒，面红耳热不可忍，其后咽唾之时，时觉干燥，必再加咽唾而后快，久而作痛，变为杨梅红瘰，或痛或痒。

25194 白薇汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】白薇 生地 丹皮 丹参 沙参 芍药 甘草 麦冬 石斛

【主治】阴虚火旺，身热支满；及热入血室，传热归阴，冲任受邪，潮热沾语，或昼明夜乱。

25195 白薇散

【方源】《外台》卷一引《小品方》。

【组成】白薇二两 麻黄七分（去节） 杏仁（去皮尖，熬） 贝母各三分

【用法】上为散。每服方寸匕，酒下。厚覆卧，汗出愈。

【功用】发汗。

【主治】伤寒二日不解。

25196 白薇散

【方源】《鬼遗》卷二。

【组成】白薇 瓜蒌 枳实(炒) 辛荑(去毛) 甘草(炙) 石膏各一两 厚朴二分(炙) 酸枣二分(炙)

【用法】上为末。每服方寸匕，调温酒下，日三次，夜一次。

【主治】金疮烦满疼痛，不得眠睡。

25197 白薇散

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】白薇 防风 射干 白术各六分 当归 防己 青木香 天门冬 乌头 枳实 独活 山茱萸 薏苡各四分 麻黄五分 柴胡 白芷各三分 莽草 蜀椒各一分 秦艽五分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，以浆水下，一日三次。加至二匕。

【主治】痈疽，疔疮。

①《千金》：疗肿，痈疽。②《医心方》：风热相搏结，气痛左右走，身中或有恶核者。③《圣济总录》：气肿痛，状如瘤，无头，但虚肿，色不变，皮急痛。

【方论选录】《千金方衍义》：白薇散中祛风走表之味居多，兼取当归、天门冬、薏苡和血通津之味，以滋风燥之性；独山茱萸一味，人但知补肝肾涩精之用，不知《本经》原有心下邪气寒热，温中逐寒湿痹，去三虫诸治，惟《千金》得之。

25198 白薇散

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】白薇 干姜 甘草各一两 栝楼二两 消石三两

【用法】上药各为末。先纳甘草白中，次纳白薇，次纳干姜，次纳栝楼，次纳消石，治下筛。每服方寸匕，冷水下，一日三次。

【主治】虚烦。

25199 白薇散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】白薇三分 白龙骨一两 黄耆一两(锉) 牡蛎三分(烧为粉) 附子三分(炮裂，去皮脐) 甘草半两(炙微赤，锉) 肉苁蓉一两(酒浸，去皱皮，炙干)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳羸弱，小便数者。

25200 白薇散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】白薇一两 白薇一两 白芍药一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】①《圣惠》：小便不禁。②《杂病源流犀烛》：挟热遗溺。

25201 白薇散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】白薇一两 栝楼根一两 枳实一两(麸炒微黄) 辛荑仁一两 甘草一两(炙微赤，锉) 赤芍药一两 酸枣仁三两(微炒)

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，一日四五次。

【主治】金疮烦闷，不得眠卧，疼痛。

25202 白薇散

《圣济总录》卷一五七。为方出《外台》卷三十四引《小品方》。名见《医心方》卷十二引《令李方》“芍药散”之异名。见该条。

25203 白薇散

【方源】《得效》卷十五。

【组成】白薇(去土) 川芎 熟地黄(酒炒) 桂心 牡丹皮(去骨) 甘草(炙) 当归(去尾) 泽兰叶 苍术(切，焙) 芍药各等分

【用法】上为末。每服三钱，随证酌量用汤饮。气刺心胁痛，艾醋泽兰汤；头痛心躁，米泔米饮；气虚，土芎汤；头痛，荆芥汤；胎前潮热，气急心闷，生地黄、灯心汤；产后

腹膨吐逆，藿香、胡椒汤；胎气不安，陈艾汤；下血不止，糯米、地榆、陈艾汤；产后血刺胁痛，艾醋汤；小腹痛，地黄、姜汁、好酒；产后腰腿疼痛、背膊痛，木瓜、白胶香、没药、好酒；月经不匀，百草霜温酒；若过多，藕节酒煎，又用陈艾、阿胶；月水不通，杜牛膝、野苳根、苏木、红花酒下；赤白带，心躁腰痛，没药；白带，黄耆（切，和盐炒，酒浸），吃十服；胎衣不下，顺流水、酸车草；产后血气，当归（盐炒）好酒；产后劳嗽，糯米、桑白皮；热嗽，生地黄、芭蕉水；产前产后潮热，桃柳枝；临产小腹紧痛，桑白皮、葛根，立便催生；产前产后脏腑热，枳壳；下血，地榆；心神乱，银器；大小便秘，麻仁、苏子；血风，脚膝肿痛寒热，生姜黄、水柳根；血崩，竹青、藕节、霜梅；热吐红，山梔子、竹青、藕节；奶痈，蔓荆子酒煎调服之。

【主治】①《得效》：妇人胎前产后诸证。②《医统》：妇人阴挺。

25204 白薇散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】白薇 白芍 牡蛎 当归 益智 陈皮 熟地 甘草 香附 黄耆 人参 川芎 白矾 桑螵蛸

【主治】妊娠遗尿。

【方论选录】是方，参、耆以培元气；四物以养胎血；桑螵、牡蛎、益智固肾益精，涩以止脱之义；白矾酸涩，佐螵蛸而引阴气入内；附、陈、甘草辛甘，以佐参、耆而引阳气上升；白薇入心、肾二经，取水火相交之意也。

25205 白薇散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】白薇一钱 白芍（火煨）一钱五分 苍术（米泔浸）三钱 当归三钱 怀熟地黄三钱 川芎三钱 牡丹皮一钱五分 泽兰叶十片 凌霄花（即紫薇花）一钱

【用法】上锉一剂。水煎，空心服。后用熏

洗之药，其物自上。次服三茱丸断根。

【主治】茄病。

【备考】用法中所云熏洗法为：宣黄连一两，金毛狗脊八钱，茄藤七钱，水杨柳根一两，五倍子八钱，鱼腥草一两，枯矾七钱。为散。每帖要如数，大罐贮药煎滚，放桶内，去罐上纸盖熏，候药水略温，倾小半在盆内洗，次日再将前药煎滚熏，如前洗，其物自收。

25206 白薇散

【方源】《异授眼科》。

【组成】白薇二两 生地一两 白蒺藜一两五钱 防风一两五钱 石榴皮九钱 羌活一两

【用法】上为末。枸杞汤下。

【主治】目睛出痘，眼下皮漏脓。

25207 白薇煎

【方源】《春脚集》卷四。

【组成】东白薇二钱 泽兰叶三钱 穿山甲片一钱（炒黄，研）

【用法】好酒煎服。

【功用】行血络，通瘀透邪。

【主治】箭风痛。或头项、肩背、手足、腰、肘、筋骨疼痛，遍身不遂。

25208 白薇膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】白薇半两 白薇半两 白及半两 白附子半两 白芷半两 赤芍药半两 胡粉二两（细研） 乳香一分（细研） 白蜡三两 油十二两

【用法】上件药，白薇等六味锉，以油浸经七日，用瓷瓶子盛，以纸三重封瓶口，绳子牢系，于火上蒸五度，然后用铤子煎五六沸，绵滤去滓，又入胡粉、乳香、白蜡，更煎一二沸，以瓷器盛。于软帛上摊贴，一日换二次。

【主治】一切恶毒疮肿。

25209 白糖饮

【方源】《经验奇方》卷上。

【组成】白糖四五两

【用法】先用半夏在两腮边擦之，牙关自开。急用热绍酒冲白糖灌入。不饮酒者，水服亦可，愈多愈妙。

【功用】止瘀血冲心。

【主治】可免瘀血冲心。

25210 白壁膏

【方源】《霉病新书》。

【组成】白蜡 牛脂 野猪脂 家猪脂 椰子油 粉锡三十钱 麻油一合（一方去椰子油加片脑十钱）

【用法】上先以麻油入洁净锅内，慢火熬至八分，下黄蜡，将柳条篦搅片时，更挑少许，滴入水中，试软硬得中乃住火，顷之，用细旧绢滤净，却上火，看似溶化之象，而入四种油脂，搅和，乃下锅犹搅，候温冷交，以白垩徐徐投入膏内，不住手搅之，看渐渐膏凝，其色如白壁，而后纳贮瓷器听用。

【功用】解热止痛。

【主治】下疳，便毒，一切溃疡，痔疾。

25211 白霜丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》。

【组成】铅白霜 人参 茯苓各半钱 麝香少许。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如青豆大。每服五丸，以薄荷汤送下。

【功用】镇心惊。

【备考】本方方名，《普济方》卷三七四引作“铅白霜丸”。

25212 白螺丸

《景岳全书》卷五十四。为方出《丹溪心法》卷四，名见《医学正传》卷四“白螺壳丸”之异名。见该条。

25213 白螺散

【方源】《本草纲目》卷四十六引《医方摘要》。

【异名】生肌散（《疡医大全》卷九）。

【组成】（墙上）白螺蛳壳（洗净，煅研）

【用法】掺之。

【主治】痘疮不收。

25214 白螺散

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】白螺蛳不拘多少 片脑少许

【用法】香油调搽患处。

【主治】痘抓破。

25215 白癩方

【方源】方出《肘后方》卷五，名见《外台》卷三十引《范汪方》。

【异名】苦参酿酒（《圣惠》卷二十四）、苦参酒（《圣济总录》卷十八）。

【组成】苦参二斤 露蜂房二两 曲二斤（一方加猬皮）

【用法】水三斗，渍药二宿，去滓，黍米二升，酿熟。稍饮，一日三次。

【主治】①《肘后方》：鼠瘻，诸恶疮。②《外台》引《范汪方》：遍身白屑痒。

25216 白癩膏

【方源】《医心方》卷四引《极要方》。

【组成】附子三两 天雄三两 防风二两 乌头三两

【用法】上以猪膏三升煎之。敷上。

【主治】白癩。

25217 白糯米

【方源】《普济方》卷三十三引《经验良方》。

【组成】大白芷一两（为末） 真糯米五钱（炒赤色）

【用法】上为末，糯米为丸。煎木馒头汤吞下。无木馒头，用根亦可，后用《局方》补肾汤调补。

【主治】老人小便凝停白浊，卒死，头昏。

【加减】后生禀赋怯弱，房室太过，小便太多，水道壅涩，小便如膏脂，加石菖蒲、牡蛎。

25218 白丁香丸

【方源】《医方类聚》卷一一〇引《神巧万全方》。

【组成】白丁香一两 京三棱 槟榔各半两 白艾灰 白姜 桂心 木香各一两 硃砂半两

【用法】上以醋熬硝砂为膏，为丸如梧桐子大。每服二十丸，空心生姜汤送下。

【主治】痲癖，诸气块并伏梁等疾。

25219 白丁香丸

《医方类聚》卷二六〇引《经验良方》。为《千金翼》卷十一“雀矢丸”之异名。见该条。

25220 白丁香丸

【方源】《普济方》卷六十一。

【组成】白丁香二十个（家雀屎是也）

【用法】以沙糖如胡桃大一块，同滚研，分作三丸。每一丸，用薄绵子裹，令含在口内。即时遂愈，甚不过两粒也。

【主治】咽喉双雕及单雕。

25221 白丁香散

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】白丁香十四个（直者）石燕子一个（火煨，瘦者乃是雄）硫黄一皂子大 膩粉十个 密陀僧半两 黑丁香二十一个

【用法】上为细末。每料分作十服，用面丝汤调下；或煮面汤亦得。服了取下如虾蟆胎之类恶物是效。

【主治】乳癖。

25222 白丁香散

【方源】方出《瑞竹堂方》卷四，名见《普济方》卷三九一。

【组成】白丁香（雀儿粪也）黑丁香二钱 木香二钱 密陀僧三钱 硫黄三钱 诃子皮轻粉半钱

【用法】上为细末。每服一钱，用乳汁调下。女用男儿乳汁调、男用女儿乳汁调，食前半饥半饱服，一日三次，用枣压药，大人米饮空心调下。

【主治】小儿、大人痞癖。

【备考】方中白丁香、诃子皮，用量原缺。

25223 白丁香散

《外科精义》卷十九。为《证类本草》卷十九引《简要济众方》“独胜散”之异名。见该条。

25224 白丁香散

【方源】《痲疡机要》卷下。

【组成】白丁香 贝母

【用法】上为末。入乳汁调，点眼内。

【主治】痲风，眼中生胬肉。

25225 白大通丸

【方源】《普济方》卷一一六引《卫生家宝》。

【组成】藿香（去土）二两 香白芷二两 川芎二两 川乌四两（冬去皮尖，春不去，半生半炮） 鸡苏二两 木瓜二两 天南星二两 甘草四两（春炙，冬生） 官桂二两 荆芥二两 乳香半两（别研） 白僵蚕二两（炒，去丝嘴及足） 藁本（去土）二两 羌活二两 桔梗（洗）二两 甘松二两 牛膝（酒浸）二两 天麻一两 川当归一两 没药（别研）一两 麻黄二两（春不去节，冬去） 真细辛（洗去苗）二两 乌蛇五两（水浸，去皮骨，好酒浸一宿，炙） 软石膏一斤（煨过，研称四两为衣，余者并入众药） 甘菊花一两

【用法】上为末，糯米糊为丸，如弹子大，隔日方焙干，即上石膏衣。每服一丸，薄荷茶酒温嚼下；如肾气疼，炒茴香酒送下。

【主治】一切大风，左瘫右痪，口面喎斜，手足痹掉，言语蹇涩；兼治偏正头风，风痹脚疾。

25226 白丸子散

【方源】《得效》卷五。

【组成】青州白丸子（生料）加木香 丁香 橘红 天麻 全蝎（去毒足） 僵蚕（炒，去嘴足）各少许

【主治】肝木克脾土，风痰壅盛，咳嗽，直至嗽顿，饮食痰物俱吐尽，方少定。

25227 白马毛散

【方源】《千金》卷四。

【组成】白马毛二两 龟甲四两 鳖甲十八铢 牡蛎一两十八铢

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，一日三次。加至一匕半。下白者，取白马毛；下赤者，取赤马毛，随色取之。

【主治】带下。

【方论选录】①《医方考》：气陷于下焦则白带；血陷于下焦则赤带。以涩药止之，则未尽之带留而不出；以利药下之，则既损其中，又伤其下，皆非治也。白马得乾之刚，毛得血之余，血余可以固血，乾刚可以利气，固血则赤止，利气则白愈，此用马毛之意也。龟、鳖、牡蛎，外刚而内柔，离之象也，去其柔而用其刚，故可以化癥，可以固气。化癥，则赤白之成带者，无复中留；固气，则营卫之行不复陷下，营不陷则无赤，卫不陷则无白矣。②《千金方衍义》：此方与后白马蹄丸功用相仿，而白马毛与白马蹄功用亦相仿，龟、鳖二甲相为辅佐亦相仿。惟牡蛎咸寒入肾，有软坚止漏之能，可抵禹余粮、磁石之功，其主赤白带下亦《本经》之旨。

25228 白马茎丸

【方源】《千金》卷二十。

【组成】白马茎 赤石脂 石韦 天雄 远志 山茱萸 菖蒲 蛇床子 薯蓣 杜仲 肉苁蓉 柏子仁 石斛 续断 牛膝 栝楼根 细辛 防风各八分

【用法】上为末，白蜜为丸，如梧桐子大。每服四丸，酒送下，一日二次。七日知，加至二十丸，一月百病愈。

【主治】空房独怒，见敌不兴，口干汗出，失精，囊下湿痒，尿有余沥，卵偏大引疼，膝冷胫痠，目中眵眵，少腹急，腰脊强。

25229 白马蹄丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】白马蹄 鳖甲 鲤鱼甲 龟甲 蜀椒各一两 磁石 甘草 杜仲 草薢 当归 续断 芎藭 禹余粮 桑耳 附子各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，酒送下，加至三十丸，一日三次。

【主治】女人下焦寒冷成带下赤白。

【方论选录】《千金方衍义》：赤白带下积久不愈，必有瘀血留着于内，非辛温无以疗之。

然血气久伤，草根木实不足以固其脱，故取异类有情之物，方得同气相感之力。白马蹄、龟、鳖、鲤鱼甲，皆厥阴、任、冲之响导，以其襄填塞罅漏之功；禹余粮、磁石专行固脱；蜀椒、川附专行温散；草薢、桑耳，一取入肝搜风，一主漏下赤白，有散敛相须之妙。盖白马蹄专主白崩，赤马蹄专主赤崩。《本经》取治惊邪、癰疽、乳难；《别录》取治衄血、内崩，总取清理血室之用。桑耳凉润，善祛子脏风热，不但主漏下，并可以治寒热积聚，积聚去则不难成孕矣。其用芎、归、续断、杜仲、甘草，不过调和血气之辅助耳。

25230 白马蹄散

【方源】《鬼遗》卷二。

【异名】马蹄散（《千金翼》卷二十）。

【组成】白马蹄

【用法】烧令烟尽，治下筛。每服方寸匕，温酒下，日三次，夜一次。

【功用】《千金方衍义》：避鬼气恶毒，蛊疰不祥，破瘀结。

【主治】跌打腹中瘀血；亦治妇人血疾。

25231 白马蹄散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】白马蹄三两（烧令烟尽） 栗子黄一两（阴干） 桂心三分 蒲黄一两 龟壳二两（涂酥，炙微黄）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，一日三次。

【功用】化瘀血为水。

【主治】伤折。

25232 白马蹄散

《圣惠》卷七十三。即《千金》卷四“马蹄屑汤”改为散剂。见该条。

25233 白马蹄散

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】白马蹄（炙黄）一两半 龟甲（醋炙） 鳖甲（醋炙，去裙襖）各二两 牡蛎（煨）三分

【用法】上为散。每服二钱匕，食前温酒调

下，一日三次。

【主治】带下久不愈。

25234 白牛毛散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】纯白牛毛五钱（用银碗煨成灰）朱砂二钱（为末）丝瓜（近蒂五寸，焙干为末）三钱

【用法】上为末。空心白汤下；或蜜汤调服。

【功用】稀痘。

25235 白氏眼药

《中药制剂手册》。为《北京市中药成方选集》“白敬字眼药”之异名。见该条。

25236 白凤饮子

【方源】《疫喉浅论·新补会厌论》。

【组成】乌嘴白雄鸭（取头颈骨连喉管，以及喉嚨，均莫刺破，不落水）玄参四钱 生地五钱 蜗牛二个 地龙二条 古文钱四枚 白盐梅三个 枇杷叶三钱（绢包）

【用法】春，加蚕食过桑叶（孔多者）三钱；夏，加荷花蒂（连须）七个；秋，加荸荠苗梢九枝（各寸许）；冬，加青果汁一小酒杯（冲服），或青果五枚（去两头尖，捣烂入煎）亦可。上药共和一处，用新取急流河水三大碗，扬三百六十五遍，炊以芦薪，煎至八分，去油。临饮时，每一钟加柿霜一钱，和匀，缓缓饮之。

【主治】疫喉白腐，会厌腐溃，口出臭气。

25237 白平安散

【方源】《中药成方配本》。

【组成】薄荷精二两 冰片六钱 煨石膏粉二十两 飞滑石粉二十两

【用法】各取净末，共研至极细为度，约成散四十一两，分装八百瓶，每瓶五分。每用少许吹鼻。

【功用】解暑辟秽。

【主治】感受暑热，头昏脑胀。

25238 白平安散

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】绿豆粉一斤四两 煨石膏二钱 滑石一两 白芷 川芎各一钱 檀香四钱

（共研细粉，兑入后药）麝香一钱四分 冰片十一两 薄荷冰八分

【用法】上为细末，五分重装瓶。吃闻均可，酌量取用。

【主治】清凉解热，去暑避瘟。

【主治】夏季受暑，头目昏晕，呕吐恶心。

【宜忌】孕妇忌用。

25239 白玉饼子

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】寒石面二两 白滑石一两 巴豆十二个（去油）半夏十二个（泡七次）

【用法】上为末，滚水为丸，如绿豆大，作饼。每岁服一饼半，干姜汤送下，不拘时候，五岁以上不可服。

【主治】小儿吐泻。

25240 白玉神膏

【方源】《寿世新编》卷中。

【组成】芦甘石四两（先以黄芩、黄连、黄柏，用童便煮汁候冷，方将甘石倾银罐内煨红，淬入童便汁内许久，再研细，水飞）龙骨一两五钱（煨透，水飞）真乳香一两五钱 真没药一两五钱 轻粉一两 血竭一两五钱 赤石脂一两五钱 生甘末一两二钱 正川连一两五钱 枯矾一两 银朱二两 大梅片八钱

【用法】上药各为极细末，过绢筛听用。先以猪板油四斤去膜，干净铁锅熬化，细布滤净滓，仍熬滚，方加黄、白蜡各四两，再熬化，离火，再将各药末放入油内，搅至极匀。十日后用棉纸摊贴患处。

【功用】去毒生肌。

【主治】手足溃烂，并久疮不收口及下疳。

25241 白玉膏药

【方源】《青囊秘传》。

【组成】白及 白蔹 白芷

【用法】以上三味加鲫鱼一条，麻油一斤，先熬去滓，再入轻粉、白占各一两、铅粉十两收膏。

【主治】疗毒疮久不收口。

25242 白玉蟾丸

【方源】《解围元藪》卷三。

【异名】白玉蟾蜍遗方(《疡医大全》卷二十八)。

【组成】川胡麻 川牛膝 木瓜 山梔 黄柏 苍术 明天麻 白蒺藜各五两 五加皮 风藤 羌活 苦参 当归各十两 水银 水飞朱 车米(面包煨) 麝香各三钱 香蛇一两 代赭石(醋煨)二两 新鲜去子肉四十两(此即大风子肉)

【用法】先将大风子肉用水二十碗,煮至二三碗,滤干,入臼捣烂,以朱、汞、赭、米四味共研,不见星,收瓷器内;再将各药末称准,以煮大风子汁,加陈米糊为丸,如梧桐子大。于卯、午、酉时各服三钱,酒送下。病轻者只服二钱,或一钱五分,至四五日反觉病凶,口内齿根麻木,精神恍惚,过后渐痊,面色红活,再不沉重,惟要戒守,则永不发。

【主治】风癰。

【备考】方中车米,《疡医大全》作“苍耳子”。《疡医大全》无麝香。

25243 白末眼药

【方源】《普济方》卷七十八。

【组成】朵梯(水飞)一两 碗糖霜(净)五钱 大海螺(火煨,为末)一两(水飞)

【用法】上为细末。用少许点眼。

【主治】云翳。

25244 白术香散

《普济方》卷一五二。为《圣惠》卷十七“白术散”之异名。见该条。

25245 白术浴汤

【方源】方出《千金》卷二十二,名见《圣济总录》卷十一。

【组成】白术三两 戎盐 矾石各半两 黄连 黄芩 细辛 芎藭 茵芋各一两

【用法】上咬咀。以水一斗,煮取三升,洗之良,一日五次

【主治】风瘙隐疹。

25246 白术酩酒

《圣济总录》卷八。为《千金》卷八“白术酿酒”之异名。见该条。

25247 白术煎丸

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】白术二两 当归一两 神曲 干姜 人参各半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食后米饮送下。

【主治】饮食过伤,胃中冷,不能克消,所食之物与气共上冲膈,以致吐血,腹中绞痛,汗出,胸中烦闷,呕吐。

25248 白术酿酒

【方源】《千金》卷八。

【异名】白术酩酒(《圣济总录》卷八)

【组成】白术(切) 地骨皮 荆实各五斗 菊花二斗

【用法】以水三石,煮取一石五斗,去滓澄清,取汁酿米一石,用曲如常法。酒熟,多少随能饮之,常取半醉,勿令至吐。

【功用】补心志,定气。

【主治】①《千金》:厉风损心,心虚寒,气性反常,心手不随,语声冒昧。②《普济方》:中风,手足不遂,神识冒昧,及心风虚寒。

【方论选录】《千金方衍义》:白术治风寒湿痹,地骨皮治五内邪气周痹风湿,荆实治筋骨间寒热湿痹拘急,菊花治诸风头眩肿痛恶风湿痹。

【备考】本方方名,《普济方》引作“白术酒”。

25249 白术膏酒

《外台》卷十九。即《千金》卷七“术膏酒”。见该条。

25250 白石英丸

【方源】《千金》卷十七。

【组成】白石英(一作白石脂) 磁石 阳起石 苁蓉 菟丝子 干地黄各二两半 石斛 白术 五味子 栝楼根各一两 巴戟天 五分 桂心 人参各一两 蛇床子半两 防

风五分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至三十丸，酒送下，一日二次。

【功用】①《千金》：补养肺气。②《普济方》：补益元气。

【主治】《普济方》：肺感寒邪，咳而鼻塞，唾浊涕，语音嘶破，酒渐恶寒。

【方论选录】《千金方衍义》：方中磁石专解石英、阳起石之慊悍，地黄专助菟丝、苁蓉之滋精，防风专鼓人参、白术之益气；石斛专辅巴戟之强阴，栝楼根专化桂心之辛热，五味子专收蛇床之燥烈。用药之奥，全在配合得宜，不可拘于药性，或随佐使，或相反激，或用和解，或寒因寒用，热因热用，或补中寓泻，泻中寓补，或寒热交错，补泻杂陈种种，各具至理，非熟擅《金匱》、《千金》之法者，难以语此。

25251 白石英丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【异名】阳起石丸（《圣济总录》卷一八七）。

【组成】白石英二两（细研，水飞过） 磁石二两（烧，醋淬七遍，捣碎细研，水飞过） 阳起石三两（细研，水飞过） 熟地黄三两 石斛二两（去根，锉） 五味子一两 肉苁蓉二两（酒浸一宿，去皱皮，炙干） 石南一两 菟丝子一两（酒浸三宿，晒干，别捣为末） 五加皮一两 胡麻一两 巴戟一两 桂心一两 人参一两（去芦头） 蛇床子半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹及晚食前以温酒送下。

【功用】助阳气，补不足。

【主治】虚损乏力。

25252 白石英丸

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】白石英五两（炼成粉者） 生地黄二两 白茯苓二两 人参三两（去芦头）

天门冬五两（去心，焙） 地骨皮二两

【用法】上为末，入石英粉研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎黄耆汤送下，不拘时候。

【主治】五劳七伤，羸瘦，体热心烦，小便不利，夜多恍惚。

25253 白石英丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】白石英五两（打碎如小豆大，以牛乳三升、水五升相和于银器中，慢火煮石英，以乳水尽为度。取出用井花淘挑，晒干，细研如粉） 黄耆三两（锉） 人参三两（去芦头） 巴戟二两 附子二两（炮裂，去皮脐） 肉苁蓉三两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 牛膝一两（去苗） 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 吴茱萸一两（酒浸七遍，焙干，微炒） 甘草一两（炙微赤，锉） 石斛一两（去根，锉） 五味子一两 桂心一两 白茯苓一两

【用法】上为末，与石英相和，研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以石英浸酒送下。

【功用】补五脏，利四肢，益颜色。

【主治】虚损，下元风冷，上焦虚热。

【宜忌】忌生冷、牛肉、豆豉。

25254 白石英丸

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】白石英（别研） 芒消（别研） 凝水石（别研）各二两 赤茯苓（去黑皮） 人参 地骨皮 泽泻 苦参 甘草（炙，锉） 麦门冬（去心，焙）各三两

【用法】上十味，除别研外，捣罗为末，合研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温水送下，不拘时候。

【主治】消渴经年，饮水不止。

25255 白石英汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】白石英 人参 藿香叶 白术 芎藭 紫石英各一分 甘草一钱半 细辛

(去苗叶)一钱 石斛(去根) 菖蒲 续断 各一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，煎取七分，去滓，空心温服。

【主治】心气虚，精神不足，健忘，阴痿不起，懒语多惊，稍思虑即小便白浊。

25256 白石英汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】白石英一分(杵细者，绵裹) 五味子 白茯苓 附子 人参各半钱 甘草一字

【用法】上吹咀，用水五大盞，银石器中煮石英至三盞，投药再煎至一盞半，去滓，分两服，空心、晚食前或鸡鸣拂旦服。

【功用】补虚羸，益肺止咳，进饮食。

【主治】肺虚少气。

25257 白石英汤

【方源】《济生》卷二。

【组成】白石英 细辛(洗去土) 五味子 陈皮(去白) 钟乳粉 阿胶(锉，蛤粉炒) 桂心(不见火) 人参 甘草(炙)各半两 紫菀(洗)一两

【用法】上吹咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺气虚弱，恶寒咳嗽，鼻流清涕。喘息气微。

25258 白石英酒

【方源】方出《圣惠》卷三十八，名见《普济方》卷二六〇。

【组成】白石英五两(上好者，捣碎) 磁石五两(捣碎) 石斛三两(去根) 草薢一两 丹参一两 牛膝三两(去苗) 杜仲一两(去粗皮，炙令黄) 防风一两(去芦头) 生干地黄一两 山茱萸一两 黄耆一两 附子三两(炮裂，去皮脐) 羌活一两 桂心三两 羚羊角屑一两 白茯苓二两 酸枣仁一两

【用法】上锉细，以绢袋盛，用酒二斗，入瓷瓶中，密封头。浸二七日后，每于空心及

晚食前，暖一小盞服之。其酒服五七日后，旋添一二升，至酒味淡薄即止。

【主治】风虚湿痹，脚弱筋挛，阴痿体寒，视听不明。

25259 白石英酒

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】白石英五两(上好者，捣研) 续断二两 薏苡仁五两 茵芋二两 牛膝五两(去苗) 防风二两(去芦头) 附子二两(炮裂，去皮脐) 石斛三两(去根，锉) 桂心二两 羌活二两 枸杞子二两 山茱萸一两 生干地黄半斤 白茯苓一两

【用法】上锉细，用生绢袋盛，以酒三斗密封，浸二七日后，每于空心及晚食前，暖服一小盞。

【主治】风虚湿痹，筋脉拘挛，脚弱，不能行步。

【宜忌】忌生冷。

25260 白石英酒

《本草纲目》卷二十五。即《圣济总录》卷二十“白石英浸酒”。见该条。

25261 白石英散

【方源】《千金》卷十七。

【组成】炼成白石英十两(白石英无多少，以锤子砧上细碾，向明选去属翳色黯黑黄赤者，惟取白净者为佳，捣，绢下之，瓷器中研令极细熟，以生绢袋于铜器中水飞之，如作粉法，如此三度，研讫澄之，渐渐去水，水尽至石英，晒得干，看上有粗恶不净者去之，取中央好者，在下有恶者亦去之，更研堪用者，使熟白绢袋子盛，着瓷碗中，以瓷碗盖之，于三斗米下蒸之，饭熟讫出，取悬之使干，更以瓷器中研之为成) 石斛 苁蓉各六分 茯苓 泽泻 橘皮各一两 菟丝子三两

【用法】上药治下筛，总于瓷器中研令相得，重筛之。每服方寸匕，酒下，一日二次，不得过之。

【功用】补五劳七伤，明目，利小便。

【主治】五劳七伤及百病。

【宜忌】忌猪、鱼、鹅、鸭、蒜、冷、酢、滑。

【方论选录】《千金方衍义》：肺气虚寒已极，必须白石英为君，佐以苳蓉、菟丝引领虚阳归宿下元、不使上浮喘满。其余石斛、泽泻、茯苓、橘皮，通解石英之性耳。

25262 白石英散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白石英一两(细研如粉) 钟乳粉一两 款冬花二两 桂心一两 天门冬一两(去心) 桑根白皮一两(锉) 紫菀一两(洗去苗土) 人参一两半(去芦头) 五味子二两 白茯苓一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，糯米五十粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺气不足，烦满喘嗽，气逆上冲，唾血；或自惊恐，皮毛自起；或呕逆歌哭，心烦不定，耳中虚鸣如风雨，面色常白。

25263 白石英散

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】白石英(研) 肉苳蓉(酒浸，切，焙) 泽泻 韭子(炒)各一两 白粳米(淘)五合

【用法】上为散。每服二钱匕，食前米饮调下，一日三次。

【主治】小便白淫。

25264 白石英散

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】白石英 五味子各一两 麦门冬三分 干姜半两 白茯苓 附子各一两 甘草半两 桂 阿胶 人参 陈皮各一两

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓服，不拘时候。

【功用】补肺。

【主治】肺气虚，恶寒，咳嗽，鼻有清涕，息气微，四肢少力。

25265 白石英散

《普济方》卷七十。为《圣济总录》卷一二一“揩齿白石英散”之异名。见该条。

25266 白石英粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】白石英三斤

【用法】上为细末。取一乳牛十岁以上方养犊而形瘦者，每日称一两石英末拌豆与食，经七日即可乳。每朝空腹热饮一升，余者作粥，任意食之，百无所忌。五月上旬起服良，如急要用亦不拘。此牛粪粪地种菜，供服乳人食，甚佳。

【主治】乳石发动。

25267 白石脂丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】白石脂 乌贼骨 禹余粮 牡蛎各十八铢 赤石脂 干地黄 干姜 龙骨 桂心 石韦 白菰 细辛 芍药 黄连 附子 当归 黄芩 蜀椒 钟乳 白芷 芎藭 甘草各半两(一方有黄柏半两)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心酒送下，一日二次。

【主治】妇人三十六疾，胞中痛，漏下赤白。

【方论选录】《千金方衍义》：妇人经癸不调，总以温理血气为主。或因形寒饮冷而阻绝不行，或因房劳过剧而亡脱无度，详推治例，必于固脱剂中兼散干血，庶两得之。所以赤石脂丸虽用石脂，必兼姜、桂、椒、萸辛温散结，则石脂无兜涩结痛之虞，然非当归、丹皮不能使血归经，非白菰、防风不能杜风祛热，更须半夏以清中焦营气之源，菴芦以除癥瘕之积，所谓标本兼该之治也。白石脂丸虽取白以固气，必兼赤以固血，其禹余粮等味则与白垩丸相仿，彼用归、芍，此用芎、地犹退萸本而进白芷之义也。

25268 白石脂丸

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】白石脂一两(煅赤，于地上出火毒，细研如粉) 肉豆蔻(面裹煨，令焦，去壳)半两

【用法】上为末，和匀，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【功用】和胃气，固大肠。

【主治】脾脏虚冷泄痢。

25269 白石脂丸

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】白石脂 芎藭 大蓟 伏龙肝各六两 熟干地黄十二两(焙) 阿胶(炒令燥) 三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，空心、晚食前各一次。

【主治】妇人经血五色杂下，或独赤独白，日久不止。

25270 白石脂丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】白石脂 厚朴(去粗皮，生姜汁炙) 当归(锉，炒)各一两 干姜(炮) 赤石脂 诃黎勒皮各三分 陈橘皮(去白，焙) 半两

【用法】上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服五丸，空腹米饮送下。

【主治】小儿洞泄。

25271 白石脂丸

《杨氏家藏方》卷十五。为《圣惠》卷七十三“禹余粮丸”之异名。见该条。

25272 白石脂汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】白石脂四两 龙骨三两 当归二两 桔梗二两 女萎 白头翁各四两 黄连二两 干姜三两

【用法】以水九升，煮取三升二合，去滓，服八合，日三次，夜一次。

【主治】发背已溃，而下不住。

25273 白石脂汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】白石脂一两 蜀漆半两 附子(炮裂，去皮脐)一分 牡蛎(煨)一两

【用法】上锉，如麻豆大。一二岁儿，每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，空心、午

后分温二服。更量儿大小加减。

【主治】小儿客忤吐利。

25274 白石脂散

【方源】《千金》卷五。

【组成】白石脂。

【用法】上为细末。熬令微暖，以粉脐疮，一日三四次。

【主治】小儿脐疮赤肿，汁出不止。

25275 白石脂散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】白石脂一两 乌贼鱼骨一两 槟榔 一两

【用法】上为细散。时掺疮中，以成痂为度。

【主治】金疮中风水，久不成痂。

25276 白石脂散

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】白石脂(烧) 赤石脂各半两 雄黄一分 乳香二钱

【用法】上为末。未破者用朴消水调贴，已破有脓者干贴。

【主治】紫靨疔疮，不疼硬肿，腋下有根如鸡卵。

25277 白石脂散

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】白石脂(烧令赤)一分 乱发(烧灰)一分 甘草(炙令赤)半两

【用法】上为细散。每服一字至半钱匕，米饮调下，早晨、午后各一次。

【主治】小儿肠癖下脓血。

25278 白石脂散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】白石脂半两

【用法】上为末。和白粥，空心与服。

【主治】水泻形羸，不胜大汤药。

25279 白石脂散

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】白石脂(真者，用炭煨通红)

【用法】上为细末。每服三钱，空心米饮调下。

【主治】泄泻，或便血，或痢不已。

25280 白龙骨丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】阿胶丸(《圣济总录》卷一七三)。

【组成】白龙骨 白石脂 鸡屎矾(烧令汁尽) 黄连(去根,微炒) 胡粉(微炒) 白茯苓 阿胶(捣碎,炒令黄燥)各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如麻子大。每服五丸,以粥饮送下,一日三四次。

【主治】小儿疳痢不止。

25281 白龙骨丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】白龙骨一两 韭子(炒)半两 补骨脂(炒) 肉苁蓉(酒浸,切、焙) 各一两 菟丝子(酒浸,别捣)半两

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十九至三十九,空心、食前温酒送下。

【主治】虚劳,元气虚弱,精滑不禁,腰脊疼痛。

25282 白龙骨丸

【方源】《普济方》卷二〇一。

【组成】白龙骨 白善 白石膏 白矾各等分

【用法】上为末,滴水为丸,如梧桐子大,入干锅,火煨红为度。每服五丸至十丸,米饮汤送下。石膏是软者,北人谓之寒水石,故可煨。

【主治】吐泻。

25283 白龙骨丸

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】白龙骨 牡蛎(大白者,火煨赤)各等分

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服十五至二十丸,赤茯苓汤送下。

【主治】小便白浊。

25284 白龙骨散

《普济方》卷三六〇。为原书同卷“枯矾散”之异名。见该条。

25285 白归脾丸

《全国中药成药处方集》(福州方)。即《正

体类要》卷下“归脾汤”改为丸剂。见该条。

25286 白瓜子丸

【方源】《千金》卷六。

【组成】白瓜子二两 藁本 远志 杜蘅 各一两 天门冬三两 白芷 当归 车前子 云母粉各一两 柏子仁 细辛 橘皮 栝蒌仁 铅丹 白石脂各半两

【用法】上为末。炼蜜为丸,如梧桐子大。空腹服二十丸,一日三次。

【功用】令色白。

【主治】面黧黯。

【方论选录】《千金方衍义》:铅丹除热下气,而镇摄阴邪从大便出;云母粉治身皮死肌;白石脂敛固肺气,肺气固则色白也;白瓜子即冬瓜仁,令人悦泽颜色;杜蘅、藁本、细辛、白芷、天冬、栝蒌佐之,以祛在经风气之滞,乃内服正治法也。

25287 白头翁丸

【方源】《准绳·幼科》卷七引《肘后方》。

【组成】白头翁三分 黄连六分(研) 石榴皮三分

【用法】以水二升,煮取八合。儿生四十日,以五合为三服。大者则加药。

【主治】小儿毒下及赤滞下如鱼脑。

【加减】有毒,去榴皮,加犀角屑三分。

25288 白头翁丸

【方源】方出《外台》卷二十三引《必效方》,名见《圣济总录》卷一二五。

【组成】白头翁半两 昆布十分 海藻七分 通草七分 玄参 连翘(微炒)各八分 白薇六分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五丸,若冷,用酒送下。

【主治】气瘤。

【宜忌】忌蒜、面、生葱、猪、鱼。

25289 白头翁丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】白头翁半两(去芦头,蒸五遍,焙干) 当归半两 川大黄半两(锉碎,微

炒) 羌活半两 苦参半两(锉) 独活半两 防风半两(去芦头) 牛膝半两(去苗) 仙灵脾半两 枳壳半两(麸炒微黄,去瓢) 桂心半两 晚蚕蛾半两(微炒) 乌蛇肉二两(酒浸,炙微黄)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前以温酒送下。渐加至三十丸。

【主治】顽麻风及腰脚疼痛。

25290 白头翁丸

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】白头翁一两 黄丹二两(并白头翁入铁瓶内烧令通赤) 干姜一两(炮裂,锉) 芫荽子半升(以水淘去浮者,煮令芽出,晒干,炒令黄黑色) 白矾二两(烧令汁尽)

【用法】上为末,以醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前以粥饮送下。

【主治】休息痢,日夜不止,腹内冷痛。

25291 白头翁丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】白头翁一两 干姜一两(炮裂,锉) 黄连一两(去须,微炒) 地榆一两 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥)

【用法】上为末,以黄蜡消成汁为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前以粥饮送下。

【主治】产后下痢不止。

25292 白头翁丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】白头翁(去芦头)半两 艾叶二两(微炒)

【用法】上为末,用米醋一升,入药一半,先熬成煎,入余药末为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前米饮送下。

【主治】冷劳泄痢,及妇人产后带下。

25293 白头翁汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】白头翁二两 黄柏三两 黄连三两 秦皮三两

【用法】以水七升,煮取二升,去滓,温服

一升,不愈更服一升。

【功用】①《注解伤寒论》:散热厚肠。②《中医方剂学》:清热解毒,凉血止痢。

【主治】热痢。痢疾腹痛,里急后重,肛门灼热,便下脓血,赤多白少,渴欲饮水,及噤口痢。现用于细菌性痢疾,阿米巴痢疾,阿米巴性肝脓肿。

①《伤寒论》:热利下重,欲饮水者。②《金鉴》:厥阴下利,属于热者,下重,便脓血。③《伤寒今释》引《类聚方广义》:眼目郁热,赤肿阵痛,风泪不止。④《温病条辨》:噤口痢,热气上冲,肠中逆阻似闭,腹痛在下尤甚。⑤《中西医结合治疗急腹症》:阿米巴性肝脓肿。

【宜忌】《千金翼》:忌猪肉、冷水。

【方论选录】①《伤寒来苏集》:四味皆苦寒除湿胜热之品也。白头翁临风偏静,长于驱风,盖脏腑之火,静则治,动则病,动则生风,风生热也。故取其静以镇之,秦皮木小而高,得清阳之气,佐白头翁以升阳,协连、柏而清火,此热利下重之宣剂。②《医方集解》:此足阳明、少阴、厥阴药也。白头翁苦寒,能入阳明血分而凉血止痢;秦皮苦寒性涩,能凉肝益肾而固下焦;黄连凉心清肝;黄柏泻火补水,并能燥湿止利而厚肠,取其寒能胜热,苦能坚肾,涩能断下也。③《金鉴》:厥阴下利,属于寒者,厥而不渴,下利清谷;属于热者,消渴下利,下利便脓血也。此热利下重,乃火郁湿蒸,秽气奔逼广肠,魄门重滞而难出,即《内经》所云:暴注下迫者是也。君白头翁,寒而苦辛;臣秦皮,寒而苦涩,寒能胜热,苦能燥湿,辛以散火之郁,涩以收下重之利也;佐黄连清上焦之火,则渴可止;使黄柏泻下焦之热,则利自除也。

【临证举例】①急性菌痢 《新中医药》(1957;9:7):用白头翁汤治疗急性菌痢40例,痊愈37例,占92.5%,平均退热天数为1.5天,大便次数恢复正常为5.5天,大便性

状恢复正常为 5.8 天,大便细菌培养转阴为 4.3 天。治疗过程中未发现任何副作用。②阿米巴痢疾 《千家妙方》:用本方煎服,每日一剂,治疗 14 例阿米巴痢疾,10 例完全治愈(症状完全消失,连查大便 2~3 次,未再发现阿米巴滋养体或包裹);4 例好转(症状减轻,查大便阿米巴滋养体或包裹仍为阳性)。③急性结膜炎 《新中医》(1973;4:23):陈某,男,11 岁。眼睑肿胀,目睛赤痛,眵泪多。西医诊为急性结膜炎。曾用中西药治疗无效,病已 10 多天,眼睑高度红肿,形如荔枝,球结膜极度充血,视物模糊,大便不畅,小便短赤,舌赤红,苔黄,脉弦数。证属肝肺之火俱盛,予白头翁 30 克,黄连 5 克,黄柏 6 克,秦皮 10 克以泻火解毒,服三剂,肿痛随即消除而愈。

【现代研究】抗菌作用 《四川中医》(1986;8:4):用打孔法进行抗菌试验,本方中的各药白头翁、黄连、黄柏、秦皮均有抗菌作用。其中以黄连、秦皮抗菌作用最强,黄柏次之,白头翁最弱。方中如增大黄连用量,抑菌效力明显增大。白头翁对溶组织阿米巴原虫有抑制作用,因而认为治疗阿米巴痢疾应加大白头翁的用量,才能收到较好的疗效。

【备考】《伤寒今释》引《类聚方广义》本方用法:治目赤肿痛,为洗蒸剂亦效。

25294 白头翁汤

【方源】《外台》卷二十五引《古今录验》。

【组成】白头翁 干姜各二两 甘草(炙)一两 当归一两 黄连 秦皮各一两半 石榴皮一两(生者二两)

【用法】上切。以水八升,煮取三升,分为四服。

【主治】寒痢急下及滞下。

25295 白头翁汤

《千金》卷三。为《金匱》卷中“白头翁加甘草阿胶汤”之异名。见该条。

25296 白头翁汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】白头翁 厚朴 阿胶 黄连 秦皮 附子 黄柏 茯苓 芍药各二两 干姜 当归 赤石脂 甘草 龙骨各三两 大枣三十个 粳米一升

【用法】上㕮咀。以水一斗二升,先煮米令熟,出米,纳药煮取三升,分四服。

【主治】赤滞下血,连月不愈。

【方论选录】《千金方衍义》:《伤寒》厥阴例中白头翁汤治热痢下重,《金匱》加甘草、阿胶治下痢虚极,更合驻车丸治洞痢无度,并取附子、龙骨、石脂佐干姜以固内崩。因白头翁、秦皮、黄柏苦寒萃聚,故黄连为之量减,详白头翁汤本治热痢后重,此方条下虽不言后重,然不用白术而用厚朴,其意可知。茯苓、芍药、大枣、粳米稼穡之类,则与白术功用不殊。

25297 白头翁汤

【方源】《普济方》卷二二。

【组成】白头翁二两 黄连 柏皮 椿皮各三两

【用法】上锉为散。每服四大钱,水一盞,煎七分,去滓服。

【主治】热痢滞下,下血连月不愈。

25298 白头翁汤

【方源】《普济方》卷三五五。

【组成】白头翁(刘寄奴花亦可) 甘草 阿胶各二两 黄连 柏皮 陈皮各三两

【用法】上㕮咀。每服四钱,水碗半,煎至七分,去滓,空心服,一日三次。

【功用】清风火,平肝。

【主治】产后下痢虚极。

25299 白头翁汤

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】黄连(去须)一两 白头翁 酸石榴皮(炙) 犀角(镑屑)各半两(一方无犀角)

【用法】上药治下筛。一二岁儿,每服半钱,水七分,煎至四分,去滓,分温二服,空心、

午间、晚各一次。

【主治】小儿热毒下痢如鱼脑，手足壮热。

25300 白头翁汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】白头翁二两 黄连三两 黄柏二两 陈皮二两

【用法】上咬咀。水一斗，煮五升，去滓，每服一升。

【主治】湿热痢疾。

【方论选录】治一切湿热痢疾，法当清理湿热也。经云，苦可以胜热。是以用白头翁、黄连、黄柏、陈皮等诸苦寒之剂，以胜湿清热。

25301 白头翁汤

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】白头翁 秦皮 黄连各等分

【主治】①《明医指掌》：协热自利，小便赤涩。②《麻科活人》：热痢下重。

25302 白头翁酒

【方源】《医心方》卷八引陶氏方。

【组成】白头翁二两 甘草一两 牛膝二两 海藻二两 石斛一两 干地黄一两 土瓜根一两 附子三两 葛根一两 麻黄二两

【用法】以酒二斗，渍五日。服一合，稍至三四合。

【主治】足肿。

25303 白头翁酒

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】白头翁草一握（烂研）

【用法】以醇酒投之，顿服。

【主治】诸风痛攻四肢百节。

25304 白头翁酒

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】白头翁 156 克 白酒 1 升

【用法】将白头翁根洗净，剪成寸段，放入盛白酒坛内，用厚布密封坛口，隔水放入锅内煮数沸，捞出白头翁根渣，将药酒装瓶收贮。每服一二钟，一日两次，历一二月。

【功用】《千家妙方》：解毒散结，排脓敛疮。

【主治】淋巴腺结核。

【临证举例】淋巴结核 《千家妙方》：郭

某某，男，22 岁，未婚，美术工作者。患者自幼体弱，16 岁时左侧颈部发现瘰核，经外科手术切除已愈。19 岁时，右侧颈部又发现瘰核，自溃后逐渐愈合。隔两年，整个颈部又发，时好时犯，残遗疤痕五处。今年初，右耳下颈部锁骨中央偏上见核桃大肿胀一处，市某医院诊断为淋巴结核，注射链霉素，内服雷米封，仍未消散，破溃后时流清稀脓液，同时右腋窝内亦有瘰核溃破，并沿连上臂内侧面二寸许，形成皮下瘰管，脓液时流时蓄，经外科开刀引流又转皮肤科会诊，诊断“皮肤腺病”，配合理疗，经治二月余，未能收口。全身倦怠无力，午后有微热，食纳尚可，二便正常，困倦喜睡。缺盆疮面为长方径寸，边缘整齐，无红肿，腐肉灰白色，有稀薄豆渣样脓汁，邻近有豆粒大之疙瘩三个，痠胀不痛。腋窝及上臂处疮面宽约一寸，长三寸，粉紫色肉芽组织凹凸不平，脓液浸润，有特腥气，舌苔薄白，脉沉而无力。属瘰癧重症，服白头翁酒百日，全部疮面结疤痊愈。

25305 白头翁散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】白头翁半两 黄连二两半（去须，微炒） 酸石榴皮一两（微炙，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候服。

【主治】小儿热毒下痢如鱼脑。

25306 白头翁散

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【组成】白头翁 黄连（去须，微炒） 茜根（锉，焙干） 苏枋木 故旧鼓皮（炙令黄焦）各一两 甘草（炙）一分 地榆（炙，锉） 犀角屑各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水一小盏，煎至六分，去滓，乳食前温服。

【功用】去毒止痛。

【主治】盘毒痢，肛门脱出。

25307 白头翁煎

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】白头翁二两 牛膝三分(去苗) 附子三分(炮裂,去皮脐) 桂心三分 羌活三分 赤芍药三分 赤茯苓半两 人参半两(去芦头) 防风三分(去芦头) 虎胥骨一两(涂酥,炙微黄) 牡丹半两 当归二分 酥 生姜汁

【用法】上为细散,用好酒五升,都煎如饬。每服一茶匙,以温酒调下,不拘时候。服药后仍须炒蚕砂熨之为妙。

【主治】四肢疼痛,至夜转甚不可忍者。

25308 白母丁散

【方源】《卫生总微》卷八。

【组成】白丁香

【用法】上为末,加麝香少许,研匀。每服一字,米饮调下。

【主治】疮疹黑熏,发抽危困。

25309 白芍药丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】白芍药 川芎 白术 阿胶 当归各一两 干姜 人参各三分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心米饮送下。

【主治】妇人气血虚弱,冲任久虚,风冷客滞于内,以致怀孕不牢;或妊娠久不能产,饮食进退,肢体倦怠,头眩项强。

25310 白芍药丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】当归 芍药(白者) 鹿茸 熟地黄各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,阿胶汤送下。

【主治】劳淋,小腹疼痛,小便不利。

【备考】本方原名白芍药煎,与剂型不符,据《奇效良方》改。

25311 白芍药汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】白芍药一两半 泽泻(去粗皮)七钱半 甘草三钱(炙) 薄桂(去粗皮)一钱半

【用法】上咬咀。每服二钱,水一盏,煎七分,空心温服。

【主治】①《活幼心书》冷疝腹痛,及误汗误下之坏证伤寒,并宜先服,次投对证之剂。②《幼科类萃》:胎寒腹痛。

【加减】误汗误下,加人参、南木香各二钱;脐下痛,加生姜及盐同煎,或加钩藤。

25312 白芍药汤

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】白芍药一两半(煨) 泽泻七钱 白术五钱 桂心二钱半 当归一钱半 干姜二钱 甘草三钱(炙)

【用法】上锉。每服二钱,用水一盏,煎至五分,空心服。

【主治】小儿胃寒腹痛,至夜多啼。

25313 白芍药汤

《医家心法》。为《保命集》卷中“芍药汤”之异名。见该条。

25314 白芍药散

【方源】《普济方》卷一八九引《肘后方》。

【组成】白芍药一两 犀角末一分

【用法】上为末。每服一钱,新汲水下。以血止为度。

【主治】咯血,衄血。

25315 白芍药散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】白芍药 桂心 白术 人参(去芦头) 白茯苓 五加皮各一两 干姜三分(炮裂,锉) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓;食前温服。

【主治】伤寒虚损,小腹拘急,腰背强疼,夜梦失精,四肢羸瘦。

25316 白芍药散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】白芍药一两 当归一两(锉,微炒) 附子一两(炮裂,去皮脐) 黄芩一两 白术一两 阿胶一两(捣碎,炒令黄燥) 生干地黄四两 甘草一两(炙微赤,

铤)

【用法】上为细散。每服二钱，以糯米粥饮调下，不拘时候。

【主治】虚损劳极，面色枯悴，或时唾血、吐血。

25317 白芍药散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】白芍药一两 牡蛎一两(烧为粉) 熟干地黄一两半 白芷三分 干姜三分(炮裂，铤) 桂心一两 乌贼鱼骨一两(炙黄) 黄耆三分(铤) 五色龙骨一两半

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人漏下五色不止，淋漓连年，黄瘦萎悴。

25318 白芍药散

【方源】方出《圣惠》卷七十三，名见《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】白芍药二两 干姜半两

【用法】上铤细，炒令黄色，为细散。每服一钱，食前以粥饮下。

【主治】①《圣惠》：妇人带下赤白，年月深久不愈。②《卫生宝鉴》：腹脐疼痛。

25319 白芍药散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】白芍药一两 牡蛎粉一两 熟干地黄一两 白术二两 麒麟竭三两 柏子仁二分 乌贼鱼骨一两(炙黄) 桂心一两 附子一两(炮裂，去皮脐) 黄耆一两(铤) 龙骨一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】①《圣惠》：妇人崩中下血不断，淋漓连年不绝，黄瘦。②《魏氏家藏方》：虚劳盗汗，便浊走失，血少筋痿。

25320 白芍药散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】白芍药一两 牡蛎一两(烧为粉) 熟干地黄一两 桂心一两 干姜一两(炮裂，

铤) 鹿角胶一两(捣碎，炒令黄燥) 乌贼鱼骨一两 黄耆一两(铤) 龙骨一两

【用法】上为细散。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】产后崩中，下血不止，淋漓不绝，黄瘦虚损。

25321 白芍药散

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】白芍药 白茯苓 当归 白术 陈皮 香附子各半两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，同煎至八分，去滓，食前温下。

【主治】癰疾久不愈。

25322 白朱砂散

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】上好白雪瓷器

【用法】上为极细末。搽疮口上。

【功用】生肌敛口。

25323 白朱砂散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】朱砂 雄黄 象皮(煨) 硼砂各一钱 蟾酥五分 白朱砂(煨)二钱

【用法】上为细末。用真生桐油调搽患处，以火烘之，痒止为度。遍身顽癣如癩者，烧猪粪熏之烘之；鹅掌风，烧鸽粪熏之烘之。

【主治】顽癣，鹅掌风。

25324 白华玉丹

【方源】《不居集》(上集)卷十九。

【组成】钟乳粉一两(炼) 白石脂五钱(煨红，水飞) 阳起石五钱(煨，酒淬，干) 牡蛎七钱(韭汁盐泥固济，火烧，取白)

【用法】上为极细末，和作一处，研一二日，以糯米粉煮粥为丸，如芡实大，入地坑出火毒一宿。每服一丸，空心人参汤送下。

【功用】清上实下，助养本元。

【主治】遗精，白浊。

25325 白羊心汤

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白羊心一枚(细切，以水六中盪，

煎取三盏，去心）熟干地黄三分 防风（去芦头）牡蛎（捣碎，炒令微黄）人参（去芦头）远志（去心）独活 白芍药 黄耆（锉）茯苓 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为散。每服三钱，以羊心汁一中盏，煎至六分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】产后内虚，风邪所攻，心神惊悸，志意不定。

25326 白羊肉汤

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】白羊肉二斤（去脂膜，以水四升，煮取二升）杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉）白茯苓一两 熟干地黄一两半 牛膝一两（去苗）人参一两（去芦头）黄耆一两（锉）白术一两 桂心三分 磁石三两（捣碎，水淘去赤汁）龙骨一两 远志一两（去心）

【用法】上为粗散。每服四钱，用羊肉汁一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服之。

【主治】虚劳羸瘦，脚腰无力，耳聾盗汗，心多忪悸。

25327 白羊肉汤

【方源】《普济方》卷二五〇。

【组成】白羊肉半斤

【用法】去脂膜，切作片，以蒜齑煮食之，三日一度。

【功用】益肾气，强阳道。

【主治】癫症。

25328 白羊肾丸

【方源】《普济方》卷一八〇引《郑氏家传渴浊方》。

【组成】半夏 猪苓二两

【用法】上将半夏洗净，猪苓同炒。色褐为度。却用半夏为末，酒煮羊内外肾烂研，同杵为丸。却以猪苓为末，入瓷瓶内养。每服五七十九，温水或猪苓煎温汤空心送下。

【功用】除浊。

【主治】①《普济方》引《郑氏家传渴浊方》：小便白浊。②《丹溪心法附余》：遗精。

25329 白羊肾羹

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】白羊肾一对（去脂膜，切）肉苁蓉（酒浸，细切）一两

【用法】上药相和，加葱白、盐、酱、椒，如常法，煮作羹。空腹食。

【主治】久积虚损，阳道虚弱，腰脚无力。

25330 白羊肾羹

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】白羊肾二具（切作片）肉苁蓉一两（酒浸，切）羊脂四两（切作片）胡椒二钱 陈皮一钱（去白）草茺二钱 草果二钱

【用法】上药相和，加葱白、盐、酱煮作汤，入面棋子，如常作羹食之。

【主治】虚劳，阳道衰败，腰膝无力。

25331 白羊鲜汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】白羊鲜三铢 蚱蝉二枚 大黄四铢 甘草 钩藤皮 细辛各二铢 牛黄如大豆四枚 蛇退皮一寸

【用法】上或咀。以水二升半，煮取一升二合，分五服，一日三次。若服已尽而痢不断者，可更加大黄、钩藤各一铢，以水渍药半日，然后煮之。

【主治】小儿风痢，胸中有痰。

【方论选录】《千金方衍义》：白羊鲜即白鲜，《本经》虽主头风、黄疸、湿痹、死肌，乃兼搜风湿痰气之药，不独治外证也；蚱蝉、蛇退、牛黄，《本经》皆主惊痫癫病；细辛疏利九窍；大黄推陈致新；甘草解毒除邪；以风痢为足厥阴之病，故用钩藤为响导也。

25332 白杨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】白杨皮一握 地骨皮一两 防风（去叉）半两 蔓荆实一两 细辛（去苗叶）一两 杏仁（去皮尖双仁，生用）三十枚 生

干地黄(焙)二两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水二盏，煎至一盏，去滓，留八合，入酒一合，更煎三五沸，热漱冷吐。

【主治】牙齿宣露。

25333 白杨皮汤

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】白杨皮(锉)一握 地骨皮一两 蜀椒(去闭口者并目，炒出汗)三十粒 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒) 苍耳子各一分 高良姜(炒) 生干地黄(切，焙) 细辛(去苗叶)各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎十余沸，去滓，热含冷吐。以愈为度。

【主治】小儿急疳，蚀唇口鼻。

25334 白杨皮酒

【方源】《外台》卷十九引《必效方》。

【组成】白杨皮(东南面去地三尺以上，去苍皮)

【用法】上切细，熬令黄赤色即止，纳不津器中，以酒浸，随皮多少，每令酒浸皮二三寸，乃以泥封，冬月二七日，春夏一七日开饮。昼二夜一，随性多少，有酒气为度。病可者，饮至一石，若重者乃至两石，以瘳为度。酒唯须不灰，其白杨不得取丘塚者。每日服一两，行鸭澹利。

【主治】脚气偏废，及一切风，缓风手足拘挛。腹满癖坚如石，积年不损。

25335 白杨皮散

【方源】方出《肘后方》卷六，名见《千金》卷六。

【组成】白瓜子仁五分 白杨皮二分 桃花四分

【用法】上为末。食后服方寸匕，一日三次。三十日面白，五十日手足俱白。

【功用】令皮肤白。

【主治】《千金》面与手足黑。

【加减】欲白，加瓜子；欲赤，加桃花。

25336 白杨皮散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】白杨皮四握 细辛半两 露蜂房半两

【用法】上为散。每用三钱，以水一大盏，浸一宿，煎令三五沸，去滓，热含冷吐。

【主治】齿疼。

25337 白杨皮散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】白杨皮一握 地骨皮 苍耳子 川椒一分(去目及闭口者，微炒去汗) 盐半合 生地黄二两 杏仁一分(汤浸，去皮尖双仁) 细辛一两

【用法】上为散。每用半两，以水二大盏，煎至一盏，去滓，热含冷吐。

【主治】齿龈疼痛。

【备考】方中地骨皮、苍耳子用量原缺。

25338 白芨散

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【异名】芨散(《普济方》卷二三八)。

【组成】白芨(微炒) 附子(炮裂，去皮脐) 白槟榔(煨，锉) 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 干姜(炮) 桂(去粗皮) 零陵香各一两 安息香(研)半两 茴香子三分

【用法】上为散。每服三钱匕，空心热酒调下。

【主治】气注刺痛。

25339 白芨散

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】白芨一两半 狼牙草一两 白薇半两

【用法】上为散。每服一钱匕，以苦酒二合，空腹调下。

【主治】小儿寸白虫。

25340 白芷洗方

【方源】《普济方》卷二八三。

【组成】白芷一两 新桑白皮三分 贝母半两 汉椒三钱 紫苏二茎

【用法】上锉。分两次入连根葱煎，以葱蘸

汤洗。溃烂者，猪蹄煎汤洗；或水胶煎汤洗亦好。

【主治】痈疡溃烂。

25341 白芷摩膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】白芷三分 甘草三分 乌头三分 薤白十五枚 青竹皮如鸡子大一块

【用法】以猪脂一升合煎，候白芷黄，膏成绞去滓。涂疮四边。

【主治】痈疽已溃。

25342 白花蛇丸

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白花蛇二两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 人参一两（去芦头） 玄参一两 沙参一两（去芦头） 丹参一两 苦参一两（锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 黄芩半两 防风半两（去芦头） 白蒺藜一两（麸微炒，去刺） 漏芦半两 川大黄半两（锉碎，微炒） 秦艽半两（去苗） 白鲜皮半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】肺脏风毒，皮肤瘙痒，疮疥癰疹。

25343 白花蛇丸

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】白花蛇一两（酒浸，炙微黄，去皮骨） 干蝎一两（微炒） 仙灵脾一两 茵芋半两 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 天南星半两（炮裂） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 天麻一两 桂心一两 麻黄一两（去根节） 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 革薢一两（锉） 桑螵蛸半两（微炒） 雄黄一分（细研） 麝香一分（研）

【用法】上为散，都研令匀，用天麻三两，捣罗为末，以无灰酒一大盏，慢火熬成膏，用和药末，更捣为丸，如梧桐子大。每服二十丸，用薄荷酒送下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：风湿痹，皮肤不仁，肢节疼痛。②《圣济总录》：风不仁，皮肤痒厚，

搔之如隔衣；寒湿着痹。

25344 白花蛇丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】白花蛇三两（酒浸，去皮骨。炙微黄） 干蝎一两（微炒） 白僵蚕一两（微炒） 白附子一两（炮裂） 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 天南星半两（炮裂） 牛黄半两（细研） 防风一两（去芦头） 桂心一两 麻黄一两（去根节） 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 桑螵蛸半两（微炒） 半夏一两（汤浸七遍去滑） 朱砂三分（细研，水飞过） 雄黄半两（细研，水飞过）

【用法】上为末，都研令匀，用天麻三两，捣罗为末，以无灰酒一大碗，慢火熬成膏，用和药末，更捣为丸，如梧桐子大。每服十丸，以薄荷酒研下，不拘时候。

【主治】急风，口噤项强，手足挛急，唇青面黑。

25345 白花蛇丸

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】白花蛇肉三两（汤浸，炙微黄） 晚蚕蛾（微炒） 天南星（炮裂） 白僵蚕（微炒） 当归 桂心 革薢（锉） 藁本 附子（炮裂，去皮脐） 白附子（炮裂） 天麻 羌活 芎藭 防风（去芦头） 麻黄（去根节） 各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，临卧时以热酒送下。以衣被厚盖，勿令通风，要知药力行，即须臾汗出。如无汗，即依前再服，以汗出为度，仍须避风。

【主治】一切风。

25346 白花蛇丸

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】白花蛇二两（酒浸，炙微黄，去皮骨） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 黄耆一两（锉） 胡荽子一两（微炒） 蝎皮一两（炙黄焦） 人参一两（去芦头） 鲤鱼皮一两（烧灰） 附子一两（炮裂，去皮脐） 枳壳二两（麸炒微黄，去

瓢) 男儿发二两(烧灰) 肉桂二两(去皱皮) 当归一两(锉, 微炒) 皂荚树耳一两(微炒)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食前煎人参汤送下。

【主治】肠风下血, 日夜不绝, 疼痛至甚。

25347 白花蛇丸

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】白花蛇三两(酒浸, 去皮骨, 炙令微黄) 黄芩一两 防风一两(去芦头) 白鲜皮一两 甘草一两(炙微赤, 锉) 枳壳一两(麸炒微黄, 去瓢) 梔子仁一两 赤芍药一两 川大黄一两(锉碎, 微炒) 苍耳子一两 麦门冬一两半(去心, 焙) 黄耆一两(锉) 白蒺藜一两(微炒去刺) 羌活二两 苦参二两(锉)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 以薄荷酒送下。

【主治】风痹疮, 皮肤疮, 痒久不愈。

25348 白花蛇丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】白花蛇(酒浸, 去皮骨, 炙)半两 羌活(去芦头)半两 白附子(炮)一分 麻黄(去节, 煎, 掠去沫, 焙)半两 桂(去粗皮)半两 芎藭半两 干蝎(去土, 酒炒)一分 防己半两 附子(炮裂, 去皮脐)半两 干姜(炮)一分 蜀椒(去目并闭口, 炒出汗) 乌头(炮裂, 去皮脐)各一分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服十丸至十五丸, 空心温酒送下。如要出汗, 先浴后服药, 热酒或葱酒送下。汗出避风。

【主治】肾中风, 腰膝骨髓疼痛, 转动不得, 及一切风病。

25349 白花蛇丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】白花蛇(酒浸, 去骨取肉, 炙)一两 人参 蝉壳(洗泥土) 干蝎(去土,

炒) 天麻 白僵蚕(洗, 炒) 草薢 当归(切, 焙) 羌活(去芦头) 芎藭 白芷 乌头(炮裂, 去皮脐) 附子(炮裂, 去皮脐)各半两 狼毒三分(炮) 生犀(锉末)半两 龙脑三钱(别研) 雄黄一两半(细研, 水飞) 甘草(炙, 锉)一分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如皂子大。每服一丸, 茶、酒任嚼下, 不拘时候。

【主治】风邪客于机关, 筋脉拘急, 肢体拘挛。

25350 白花蛇丸

《圣济总录》卷二十。为《圣惠》卷十九“附子丸”之异名。见该条。

25351 白花蛇丸

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】白花蛇头一枚(自开口者, 生用) 干蝎(全者, 炒)半两 牛黄(研) 龙脑(研)各半分 丹砂(研)一分 麝香(研)一钱半

【用法】上为细末, 炼蜜和为剂。每服旋丸, 如一绿豆大, 薄荷温水化下。

【主治】小儿急惊, 体热凝壅, 四肢拘急, 筋脉牵掣。

25352 白花蛇丸

【方源】《疮疡经验全书》卷七。

【组成】白花蛇一条(酒浸三夕) 白附子 天麻 牛膝各一两 当归(酒浸)一两 何首乌二两 僵蚕一两(炒) 威灵仙二两 羌活 独活 防风 草薢 蔓荆子 苦参各一两 甘草七钱(炒) 石菖蒲二两(酒浸) 蝉壳一两 白芍四两 川芎一两 苍耳草四两 雷丸三两 赤芍一两 风子肉三两 枳壳一两 雄黄五钱 皂角三两 乌药

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每五十丸, 空心好酒送下。

【主治】大麻风。

【备考】方中乌药用量原缺。

25353 白花蛇丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】白花蛇一条(酒浸) 当归二两 川芎 白芍 生地 防风 荆芥 酒芩 连翘 胡麻子 何首乌 升麻 羌活 桔梗各一两

【用法】上为末,将浸蛇酒和水打糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,茶清送下。

【主治】头面手足白屑疮痒,皮肤皴燥。

25354 白花蛇丸

【方源】《本草纲目》卷四十三。

【组成】花蛇肉(酒炙) 龟版(酥炙) 穿山甲(炙) 蜂房(炙) 汞粉 朱砂各一钱

【用法】上为末,红枣肉为丸,如梧桐子大。每服七丸,冷茶送下,一日三次。服尽即愈。

【主治】杨梅疮。

【宜忌】忌鱼、肉。

25355 白花蛇丸

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】防风(去苗)二两 荆芥穗一两半 金银花(去叶)二两 川芎一两 枸杞子(甘州)二两 黄芩 黄连 山梔子 黄柏 全蝎(用醋浸一日,去盐味)各一两 蝉蜕二两(去土) 漏芦半斤(洗净,去苗,取四两) 乌药 何首乌(不犯铁) 牛膝(去芦) 牛蒡子 连翘 天花粉 白蒺藜 威灵仙 细辛 金毛狗脊 胡麻子(炒) 蔓荆子各一两 槐花 苦参 生地黄各二两 白花蛇一条(去头尾,连骨生用) 乌梢蛇一条(去头尾,生用)(一僧加风藤一两)

【用法】上为细末,米糊为丸,如梧桐子大。每服五六十九丸,茶清送下,空心、午后、临卧各一次。

【主治】风病。

【加减】上头面者,加香白芷一两;如肌肉溃烂,加大皂角一两。

25356 白花蛇丸

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】防风 金银花 枸杞子 蝉蜕 苦参各二两 荆芥穗(酒洗)两半 黄连

(酒炒) 全蝎(滚醋泡,炒黄) 牛膝 何首乌(不犯铁器) 牛蒡子 连翘 白蒺藜 细辛 胡麻(即亚麻) 蔓荆子各一两 漏芦(去苗) 四两 白花蛇一条(去尾连头,生用。紫云风不用) 乌梢蛇一条(去头尾,不犯铁,石臼中捣。白癞风不用)

【用法】上十九味,除乌梢蛇外,预为粗末,同蛇捣和,焙干,重为细末,米饮糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,茶清送下,一日三次。

【主治】大风恶疾,掀赤腐烂。

【加减】如头面上肿,加白芷一两;肌肉溃烂,加皂角刺一两。

25357 白花蛇酒

【方源】《本草纲目》卷四十三引《濒湖集简方》。

【组成】白花蛇(一条,温水洗净,头尾各去三寸,酒浸,去骨刺,取净肉)一两 全蝎(炒) 当归 防风 羌活各一钱 独活 白芷 天麻 赤芍药 甘草 升麻各五钱

【用法】上锉,以绢袋盛贮。用糯米二斗蒸熟,如常造酒,以袋置缸中,待成,取酒同袋密封,煮熟,置阴地七日出毒。每温饮数杯,常令相续。

【主治】诸风无新久,手足缓弱,口眼喎斜,语言蹇涩;或筋脉挛急,肌肉顽痹,皮肤燥痒,骨节疼痛;或生恶疮、疥、癩。

25358 白花蛇酒

《本草纲目》卷四十三。即《普济方》卷一一〇引《瑞竹堂方》“白花蛇造酒方”。见该条。

25359 白花蛇酒

【方源】《本草纲目》卷四十三。

【组成】白花蛇(一条,取龙头虎口,黑质白花,尾有佛指甲,目光不陷者为真。以酒洗润透,去骨刺,取肉)四两 真羌活二两 当归身二两 真天麻二两 真秦艽二两 五加皮二两 防风一两

【用法】上锉,以生绢袋盛之,入金华酒坛

内，悬胎安置，入糯米生酒醋五壶浸袋，箬叶密封。安坛于大锅内，水煮一日，取起埋阴地七日取出。每饮一二杯。仍以滓晒干研末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，用煮酒送下。

【主治】中风伤酒，半身不遂，口目喎斜，肌肉痹痹，骨节疼痛，及年久疥癣、恶疮、风癩诸症。

【宜忌】切忌见风犯欲，及鱼、羊、鹅、面、发风之物。

25360 白花蛇酒

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】白花蛇 乌梢蛇各一条(去头尾皮骨) 升麻 紫苏 枳实 当归 香附 熟地 黄耆 天冬 丹皮 粟壳 川芎 茯苓 厚朴 枳壳 三棱 苍术 牛膝 芍药 玄胡 杏仁 红花 肉桂 蓬术 防风 草果 杜仲 木香 陈皮 青皮 半夏 桔梗 荆芥 藿香各一两 僵蚕 麦冬 人参各二两 白芷 枫藤 麻黄各三两 乳香 没药各五钱 核桃肉四钱 益智仁五钱

【用法】上药入在酒内封口，晨煮至晚，取出埋土中，去火毒七日，分作四小瓶，半月开饮。先服《千金》托里散，或用加减天麻散，后用本方。如疮口烂，外贴阿魏膏药。

【主治】柘子风。其形遍身如柘子，细突而起，久不出血，其痛难忍。

25361 白花蛇散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白花蛇三两(酒浸，去皮骨，炙微黄) 天麻一两 槐子一两(微炒) 羌活一两 防风一两(去芦头) 晚蚕沙一两(微炒) 蔓荆子一两 白鲜皮一两 威灵仙一两 枳壳一两(麸炒微黄，去瓢) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：肺脏风毒，遍身生疮，或生白蚁，或生斑点，及皮肤皴裂。②《圣

济总录》：白癩，语声嘶哑，目视不明，四肢痹痹，关节热痛，身体隐疹，鼻生息肉。

25362 白花蛇散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】白花蛇二两(汤或酒浸，炙微黄，去皮骨) 白附子一两(炮裂) 磁石一两(烧，酒淬七遍，细研) 天麻半两 狗脊半两(去毛) 侧子半两(炮裂，去皮脐) 草薢半两(锉) 白僵蚕半两(微炒) 细辛半两 防风半两(去芦头) 白术半两 芎藭半两 白鲜皮半两 羌活半两 蔓荆子半两

【用法】上为细散，入磁石同研令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】风痹，关节不利，手足顽麻。

25363 白花蛇散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】白花蛇五两(酒浸，去皮骨，微炙) 露蜂房二两(炙黄) 苦参一两半(锉) 防风一两(去芦头) 丹参一两 梔子仁一两 薯蓣一两 秦艽一两(去苗) 玄参一两 白蒺藜一两(微炒，去刺) 独活一两

【用法】上为细散。每服二钱，空心用温酒下，晚食前再服。

【主治】大风疾，皮肉变改，眉须欲落。

25364 白花蛇散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】白花蛇二两(酒浸，去皮骨，炙令微黄) 麻黄半两(去根节) 天麻半两 何首乌半两 天南星半两(炮裂) 白附子半两(炮裂) 桂心半两 草薢半两(锉) 白鲜皮半两 羌活半两 蔓荆子半两 白僵蚕半两(微炒) 晚蚕蛾一分 防风半两(去芦头) 乌犀角屑半两 磁石一两(烧，醋淬七遍，捣碎细研，水飞过)

【用法】上为细散，研入磁石令匀。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】①《圣惠》：紫癜风。②《普济

方》：白癰风。

【宜忌】忌热面、鸡、猪、鱼、蒜等。

25365 白花蛇散

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】白花蛇肉一两(酒浸，炙微黄) 白僵蚕一两(微炒) 麝香一分(细研) 朱砂一两(细研) 羌活二两 秦艽一两(去苗) 附子一两(炮裂，去皮脐) 桂心一两 当归一两 牛膝一两(去苗) 芎藭一两 草薢一两(锉) 干蝎一两(微炒) 防风一两(去芦头)

【用法】上为细散，入研了药，更研令匀。每服一钱，以暖酒调下。

【主治】一切风。

【宜忌】忌生冷、鸡、猪肉等。

25366 白花蛇散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】白花蛇一条(去皮骨，酒浸，炙令微黄) 蜂房三两(微炙) 苦参四两(锉) 防风四两(去芦头) 梔子仁三两 丹参三两 薯蓣三两 秦艽二两(去苗) 甘菊花二两 玄参三两 白蒺藜二两(微炒去刺) 独活三两

【用法】上为细散。每服二钱，食后以温酒调下。

【主治】热毒风，皮肤生痂疥。

25367 白花蛇散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白花蛇肉一两(酒拌炒令黄) 天南星一两(炮裂) 土蜂儿(微炒) 干蝎(微炒) 桑螵蛸(微炒) 麻黄(去根节) 赤箭 薏苡仁(微炒) 酸枣仁(微炒) 柏子仁 当归(锉，微炒) 桂心 羚羊角屑 牛膝(去苗) 各半两 麝香一分(研)

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，豆淋酒调下，不拘时候。

【主治】产后中风，四肢筋脉挛急，皮肤麻痺。

25368 白花蛇散

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】白花蛇(酒浸一宿，去皮骨，取肉炙) 三两 人参半两 白茯苓(去黑皮) 半两 当归(切，焙) 半两 甘草(炙) 半两 麻黄(去根节) 半两 白附子(炮) 半两 天麻半两 芎藭半两 羌活(去芦头) 半两 藁本(去苗土) 半两 附子(炮裂，去皮脐) 半两 细辛(去苗叶) 一两 干蝎(炒) 一两 白芷半两 防风(去叉) 半两 白鲜皮一分 丹砂(别研) 一分 麝香(别研) 二钱 牛黄(别研) 一分

【用法】上二十味，除别研外，捣罗为散，即入研药，再罗匀细。每服二钱匕，葱白、腊茶调下。

【主治】肺中风，心胸烦满，项背强直，皮肤不仁。

25369 白花蛇散

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】白花蛇(用头项肉，酒浸，去骨，慢火炙令焦) 藁本(去苗土) 五加皮(锉) 牛膝(酒浸，切，焙) 草薢 桂(去粗皮) 熟干地黄(焙) 木香 芸薹子(炒) 当归(切，焙) 各半两 甘草(炙) 一两 威灵仙(去苗土) 白附子(炮) 甘菊花各半两 蔓荆实(去白皮) 一两 郁李仁(去皮) 半两 羌活(去芦头) 虎骨(酥炙) 一两 干蝎(微炒) 半两 白芷 防风(去叉) 各一两

【用法】上为散，每服二钱匕，空心温酒调下，不拘时候亦得。

【主治】柔风。血气俱虚，邪中内外，皮肤缓纵，腹里拘急。

【备考】方中羌活用量原缺。

25370 白花蛇散

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】白花蛇(酒浸，去皮骨，炙) 天南星(炮) 天雄(炮裂，去皮脐) 白僵蚕(炒) 干蝎(去土，炒) 麻黄(去根节，汤煮掠去沫，焙) 各一两 蜂子 甘草

(炙) 干姜(炮)各半两

【用法】上为散,研匀。每服二钱匕,温酒调下。

【主治】筋络拘急,挛缩疼痛。

25371 白花蛇散

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】白花蛇(酒浸,炙,去皮骨)二两 何首乌(去黑皮,切) 牛膝(三味用酒浸半日,焙干) 蔓荆实(去白皮)各四两 威灵仙(去土) 荆芥穗 旋覆花各二两

【用法】上为末。每服一钱匕,空心、临卧温酒调下。

【主治】中风,肢节疼痛,言语蹇涩。

25372 白花蛇散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】白花蛇(一条,酒浸,炙,取肉)三两 露蜂房(微炙) 苦参(锉) 防风(去叉) 丹参 梔子仁 山芋各二两半 秦艽(去苗土)一两一分

【用法】上为散。每服二至三钱匕,空心用温酒调下,一日二次。

【主治】恶风。

25373 白花蛇散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】白花蛇(去皮骨,酒炙) 乌蛇(去皮骨,酒炙) 干蝎(全者,去土,炒) 白僵蚕(炒)各一两 地龙(去土,炒)半两 雄黄(醋熬,研)一分 蜈蚣十五条(赤足全者,炒) 蝎虎十五枚(全者,炒) 蜜蜂(炒)一分 丹砂(研)一两 黄蜂(炒)一分 胡蜂(炒)一分 龙脑(研)半钱

【用法】上为散。每服一钱匕,温蜜水调下,一日三五次。

【主治】大风疾,须眉堕落,皮肉已烂成疮者。

25374 白花蛇散

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】白花蛇(去皮骨,酒炙) 独活

(去芦头) 丹参 蔓荆实 蒺藜子(炒,去角) 玄参 苦参 秦艽(去苗土) 山芋 甘草(炙,锉) 防风(去叉) 菊花 附子(炮裂,去皮脐) 天麻 牛膝(酒浸,切,焙)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,温酒调下。

【主治】肾脏风攻注,遍体生疮,皮肤瘙痒。

25375 白花蛇散

【方源】《幼幼新书》卷十三引张涣方。

【组成】白花蛇(腰以上取肉酒浸,炙黄) 桂心 人参 羚羊角 菖蒲各一两 川乌头半两(净,炮裂)

【用法】上为细末。每服一字至半钱,点麝香、荆芥汤调下。

【主治】小儿中风,啼不出,及心肺中风。

25376 白花蛇散

《三因》卷十五。为《圣济总录》卷一二六“蛇犀散”之异名。见该条。

25377 白花蛇散

《普济方》卷一一四。即《局方》卷一“大通圣白花蛇散”。见该条。

25378 白花蛇散

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【异名】助元散、白花散(《治痘全书》卷十四)。

【组成】白花蛇(连骨)一两(火炙令干,勿焦) 大丁香二十一枚

【用法】上为细末。每服一钱,小儿半钱,以水解淡酒调下。如黑羸者服之,移时重红。

【主治】①《奇效良方》:大人小儿疮子倒靨。②《张氏医通》:痘虚寒白陷。

25379 白花蛇散

《本草纲目》卷四十三。即《圣济总录》卷十五“地骨皮散”。见该条。

25380 白花蛇散

《本草纲目》卷四十三。即《洁古家珍》“黑白散”。见该条。

25381 白花蛇煎

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】白花蛇一条(去皮骨) 海桐皮

白芷 防风(去芦头) 独活 羌活 白术
附子(去皮脐) 天南星 半夏(汤洗七遍
去滑) 前胡(去芦头) 细辛 干蝎 桂
心 汉椒(去目) 木鳖子(去壳) 当归
吴茱萸 苍术各一两

【用法】上锉。以米醋二升，煎三二沸，匀
拌药一宿，用腊月猪脂炼了者三斤，于铛内
煎令沸，渐渐下药，候白芷色赤黄，用绵滤
过，瓷盒盛。先以苦参汤淋浴，后以暖酒下
半匙。外以膏涂在疮上，令热为度。一日三
次。

【主治】风毒攻身体生疮，或时发痒肿痛。

25382 白花蛇煎

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】白花蛇 乌蛇(并用酒浸，去皮骨，
焙干) 各二两 白蜜三十两 生姜汁六两
薄荷汁六两 白僵蚕(炒) 干蝎(去土，
炒) 苦参各一两 白附子(炮) 三分

【用法】上九味，捣罗六味为末；先下蜜并
生姜汁、薄荷汁，次下诸药末，拌和匀，银
器中重汤熬成煎。每服半匙匕，以无灰酒调
下。久服身体滑腻。

【主治】蛊风，身痛如刀划。

25383 白花蛇膏

【方源】《本草纲目》卷四十三引《鸡峰备
急方》。

【组成】白花蛇(酒煮，去皮骨，瓦焙，取
肉) 一两 天麻 狗脊各二两

【用法】上为细末，以银盂盛无灰酒一升浸
之，重汤煮稠如膏，银匙搅之，入生姜汁半
杯同熬匀，瓶收。每服半匙头，用好酒或白
汤化下，一日二次。

【主治】营卫不和，阳少阴多，手足举动不
快。

25384 白花蛇膏

【方源】《本草纲目》卷四十三引《三因》。

【组成】白花蛇五寸(酒浸，去皮骨，炙
干) 雄黄一两(水飞，研匀) 白沙蜜一
斤 杏仁一斤(去皮，研烂)

【用法】同炼为膏。每服一钱，温酒化下，
一日三次。须先服通天再造散，下去虫物，乃
服此除根。

【主治】《本草纲目》：癩。

25385 白花蛇膏

《医统》卷九，为《本草纲目》卷四十三引
《元戎》“驱风膏”之异名。见该条。

25386 白芥子丸

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】白芥子一两 防风三分(去芦头)
安息香一两 沉香半两 补骨脂一两(炒)
槟榔半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。
每服二十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】肝风筋脉拘挛，骨髓疼痛。

25387 白芥子丸

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】白芥子半两 安息香半两 麝香
一钱(细研) 乌药半两 桃仁半两(汤浸，
去皮尖、双仁，麸炒微黄) 陈橘皮半两
(汤浸，去白瓢，焙)

【用法】上为末，入麝香研令匀，以汤浸蒸
饼为丸，如梧桐子大。每服一丸，煎生姜、童
便送下，不拘时候。

【主治】中恶心痛，闷乱不识人。

25388 白芥子丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普
济方》卷一九八。

【组成】白芥子一分 朱砂一分(细研)
阿魏一分 恒山一分

【用法】上为末，入朱砂研匀，以醋煮面糊
为丸，如梧桐子大。每服三丸，未发前以醋
汤送下。

【主治】寒症，手足鼓颤，心寒面青。

25389 白芥子散

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】真白芥子 木鳖子各二两(麸炒)
没药(别研) 桂心 木香各半两

【用法】上为细末，入研药令匀。每服一钱，
温酒调下。

【主治】荣卫之气循行失度，痰滞经络，与正气相搏，以致臂痛外连肌肉，牵引背脾，时发时止，发则有似瘫痪。

25390 白芥子散

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【组成】白芥子

【用法】上为末。水调敷脚心。

【主治】①《奇效良方》：小儿疮疹。②《痘治理辨》：痘。

25391 白豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白豆蔻一两（去皮） 诃黎勒二两（煨，用皮） 黄耆一两（锉） 沉香一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 白术一两 人参一两（去芦头） 肉桂一两半（去粗皮） 木香一两 枳实一两（麸炒微黄） 厚朴三两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为细末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二九，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】脾气不足，体重胸满，腹胁虚胀，食少无力，水谷不消，或时自利。

【宜忌】忌生冷、油腻、粘食。

25392 白豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白豆蔻三分（去皮） 黄耆半两（锉） 赤茯苓半两 干姜半两（炮裂，锉） 桂心半两 白术半两 当归半两（锉，微炒） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 人参三分（去芦头） 附子半两（炮裂，去皮脐） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，煮枣肉，和捣为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】脾胃冷热气不和，心腹疼痛，呕逆，不欲食，四肢少力。

【宜忌】忌生冷、油腻、饴糖。

25393 白豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白豆蔻一两（去皮） 干姜一两（炮裂） 半夏一两半（汤洗七遍去滑，微炒） 桂心二分 白术三分 细辛三分 木香一两 诃黎勒一两半（煨，用皮） 枳实一两（麸炒微黄）

【用法】上为细末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，用厚朴汤送下，不拘时候。

【主治】脾胃虚弱，胸膈气滞，吐逆不下食。

25394 白豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】白豆蔻三分（去皮） 草豆蔻三分（去皮） 食茱萸三分 白术三分 人参三分（去芦头） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 桂心三分 干姜半两（炮裂，锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 神曲三分（炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前以生姜、大枣汤送下。

【主治】时气后脾胃气冷，食不消化。

25395 白豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】白豆蔻半两（去皮） 白术半两 胡椒半两 当归半两 白龙骨半两 革茱萸半两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 芎藭半两 人参半两（去芦头） 肉桂一两（去皱皮） 白茯苓半两 诃黎勒一两半（煨，用皮） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】虚劳泄痢，腹胀满痛，或时疼痛，饮食减少，四肢无力。

25396 白豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】白豆蔻三分（去皮） 干姜半两（炮裂，锉） 白术一两 甘草半两（炙微赤，锉） 人参三分（去芦头） 桂心半两 厚

朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 诃黎勒皮三分

【用法】上为散,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以生姜、大枣汤送下,一日四五次。

【主治】①《圣惠》:霍乱,及脾胃气虚,腹胀妨闷,不思饮食。②《普济方》:胃受风冷。

25397 白豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白豆蔻三分(去皮) 桂心三分 丁香半两 陈橘皮三分(汤浸,去白瓢,焙) 诃黎勒皮三分 木香半两 吴茱萸一分(汤浸七遍,焙干微炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以橘皮汤送下;如人行三五里再服。

【主治】产后咳噎,心胸噎闷。

25398 白豆蔻丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】白豆蔻一两(去皮) 白术三分 干姜三分(炮)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心、食前煎生姜、大枣汤送下。

【主治】脾气不和,不思饮食。

25399 白豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】白豆蔻(去皮) 陈橘皮(去白,焙) 厚朴(去粗皮,生姜汁浸,炙) 草豆蔻(去皮) 桂(去粗皮) 白术(炒) 干木瓜 人参 半夏(汤洗去滑七遍) 各二两 缩砂蜜(去皮) 高良姜(炒) 甘草(炙,锉) 陈曲(炒) 麦蘖(炒) 木香 干姜(炮) 白茯苓(去黑皮) 各一两 桃仁四两(去皮尖双仁,炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸至四十丸,空心米饮送下。

【主治】霍乱后,脾胃尚虚,谷气未实,津液内燥,令人烦躁,睡卧不安。

25400 白豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】白豆蔻(去皮) 木香 干姜(炮) 枳实(去瓢,麸炒) 各一两 半夏(汤洗去滑七遍,焙) 一两半 桂(去粗皮) 白术 细辛(去苗叶) 各三分 诃黎勒皮一两一分 当归(切,焙) 半两

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心、食前以米饮盐汤送下。

【主治】脾胃虚冷,胸膈痞滞,吐逆霍乱,脏腑滑利,水谷不消,胀满肠鸣。

25401 白豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】白豆蔻(去皮) 人参 白茯苓(去黑皮) 诃黎勒(煨,去核) 桂(去粗皮) 厚朴(去粗皮,姜汁炙熟) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 各一两 丁香 荜茇 附子(炮裂,去皮脐) 槟榔(锉) 当归(切,焙) 缩砂仁 干姜(炮) 各半两 肉豆蔻仁五枚

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前米饮送下。

【主治】虚劳,脾胃挟冷,肠滑下痢,不思饮食。

25402 白豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】白豆蔻(去皮) 二两 枳壳(用浆水煮令软,去瓢,焙干) 半斤 陈橘皮二两(醋浆水煮令软,去白,细锉,炒令黄色) 诃黎勒(去核) 二两(一两煨,一两生用) 木香二两 当归(切,焙) 二两

【用法】上为末,将大枣用浆水煮,去皮核,烂研和药,丸如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,切生姜入盐炒焦黑色煎汤送下,不拘时候。

【功用】宽中匀气,健脾和胃。

【主治】妊娠腹满，饮食迟化。

25403 白豆蔻丸

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】白豆蔻 丁香 木香 沉香 肉豆蔻 槟榔 甘草 青皮各半两 白术五两 茯苓 诃子皮 人参各一两 桂 干姜各一分 麝香一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，生姜汤嚼下，不拘时候。

【功用】治气和胃。

25404 白豆蔻丸

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】白豆蔻仁(炒) 缩砂仁(炒) 人参 白术 茯苓(去皮) 丁香 白姜(炮) 粉草 麦蘖各一两(炒) 良姜半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一二丸，食前煎人参、大枣汤嚼下。

【主治】脾胃气弱，饱则胸间虚满。

25405 白豆蔻丸

【方源】《医方类聚》卷一六四引《居家必用》。

【组成】白豆蔻仁 缩砂仁 干葛 橘红 甘草(炙)各一两 蜜曲律二两(如无，以葛花代之)

【用法】上为细末，用生蜜为丸，如鸡头子大。如甚醉，可用酒或白汤化一二丸。服之立醒。

【主治】饮酒过多。

25406 白豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】白豆蔻(去皮) 人参 白术 芎藭 白茯苓(去黑皮) 陈橘皮(汤浸，去白，焙)各一两 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)二两 甘草(炙)三分 干姜(炮) 丁香各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服一钱半匕，水一盞，加生姜三片，大枣一个(擘)，同煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】脾虚不进饮食。

25407 白豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】白豆蔻(去皮) 人参 白术各一两 厚朴(去粗皮，生姜汁炙透，锉)二两 陈橘皮(汤浸，去白，焙)半两 芎藭 白茯苓(去黑皮) 干姜(炮)各一两 丁香半两 甘草(炙，锉)三分 白檀香(锉)一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣二个(擘破)，煎至七分，去滓稍热服。

【主治】脾胃气弱，呕吐不下食。

25408 白豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】白豆蔻(去皮) 半夏(为末，生姜汁和作饼，焙干) 槟榔(锉) 丁香 甘草(炙，锉) 青橘皮(去白，切，焙)各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【主治】胃虚气寒，饮食无味，呕吐冷痰，噫时闻食气。

25409 白豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】白豆蔻(去皮) 诃黎勒(炮，去核) 陈橘皮(汤浸，去白，焙、炒) 干姜(炮)各半两 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，切薤白三寸，水一盞半，煎至七分，去滓，空心温服，每日二次。

【主治】肠胃受湿，濡泻无度，腹痛，饮食不化。

25410 白豆蔻汤

《圣济总录》卷一五六。为《博济》卷三“白豆蔻散”之异名。见该条。

25411 白豆蔻汤

《圣济总录》卷一七五。为《圣惠》卷八十四“白豆蔻散”之异名。见该条。

25412 白豆蔻汤

《圣济总录》卷一八七。为《博济》卷二“白豆蔻散”之异名。见该条。

25413 白豆蔻汤

【方源】《医方类聚》卷一〇八引《御医撮要》。

【组成】白豆蔻(去皮)一分 白术一两半 人参(去芦头)一两

【用法】上为粗散。每服三钱，加生姜一分(拍碎)，水一盞，煎至六分，去滓，空腹温服，一日三次。

【主治】霍乱吐利不止。

【宜忌】忌生冷、桃李。

25414 白豆蔻汤

【方源】《医统》卷五十二。

【组成】黄连 葛根 天花粉 麦门冬各一钱 五味子 白豆蔻 陈皮各五分 黄柏 甘草各七分

【用法】水二盞，加竹叶二十片，煎一盞，温服。

【主治】酒毒消渴。

25415 白豆蔻汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】白蔻 藿香 半夏 陈皮 生姜

【主治】呕吐啰。

25416 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】白豆蔻一两(去皮) 高良姜一两(锉) 青橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙) 木瓜一两 沉香一两 当归三分(锉，微炒) 甘草半两(炙微赤，锉) 桂心三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盞，加生姜半分，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】肝风冷转筋，四肢厥冷。

【宜忌】忌鸡、猪、鱼、蒜。

25417 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】白豆蔻半两(去皮) 茴香子半两 槟榔半两 木香半两 干姜一分(炮裂，锉) 附子半两(炮裂，去皮脐) 吴茱萸

一分(汤浸七遍，焙干，微炒) 青橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙) 硫黄半两(细研入)

【用法】上为细散。每服一钱，不拘时候。

【主治】肾脏积冷气攻，心腹疼痛，两胁胀满，不思饮食。

25418 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】白豆蔻一两(去皮) 白术一两 陈橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙) 高良姜半两(锉) 甘草一分(炙微赤，锉) 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盞，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒服冷药过多，寒气伤胃，呕啰不止。

25419 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】白豆蔻三分(去皮) 白术三分 甘草半两(炙微赤，锉) 厚朴半两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 枳壳半两(麸炒微黄，去瓤) 桂心半两 陈橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙) 高良姜半两(锉) 白茯苓三分 半夏半两(汤浸七遍去滑) 诃黎勒皮三分 人参三分(去芦头)

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盞，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒后，脾胃不和，吃食减少，四肢乏力。

25420 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】白豆蔻一两(去皮) 木香一两 青橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙) 白术一两 吴茱萸半两(汤浸七遍，微炒) 诃黎勒一两(煨，用皮) 干姜三分(炮裂，锉) 草豆蔻一两(去皮) 厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 桂心一两 人

参一两(去芦头) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓,食前稍热服。

【主治】虚劳,脾胃冷弱,食不消化,四肢少力。

25421 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】白豆蔻三分(去皮) 诃黎勒一两(煨,用皮) 白术三分 当归三分(锉,微炒) 木香半两 干姜三分(炮裂,锉) 厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】腹痛下利,四肢不和。

25422 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】白豆蔻半两(去皮) 枇杷叶一两(拭去毛,炙微黄) 诃黎勒皮三分 前胡一两(去芦头) 人参三分(去芦头) 槟榔一两 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 白术三分

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】反胃。胸膈不利,食即呕吐。

25423 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】白豆蔻三分(去皮) 芎藭半两 丁香半两 藿香半两 人参半两(去芦头) 白术一两 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 白茯苓半两 木香半两 陈橘皮二分(汤浸,去白瓤,焙) 桂心半两 附子半两(炮裂,去皮脐) 半夏半两(汤洗

七遍去滑) 诃黎勒皮半两 高良姜半两(锉) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人脾胃气虚弱,时欲呕吐。

25424 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】白豆蔻一两(去皮) 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 人参三分(去芦头) 白术三分 厚朴三分(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 芎藭三分 半夏一分(汤洗七遍去滑) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠胃气虚冷,呕逆不下食,腹胁胀满,四肢不和。

25425 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】白豆蔻半两(去皮) 人参三分(去芦头) 前胡一两(去芦头) 赤茯苓一两 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 诃黎勒一两(煨,用皮) 甘草半两(炙微赤,锉) 白术三分 枳壳半两(麸炒微黄,去瓤) 大腹皮三分(锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠心腹胀满,气攻胸膈,咽喉不利,饮食减少。

25426 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白豆蔻(去皮) 人参(去芦头) 白术 黄耆(锉) 当归(锉,微炒) 附子(炮裂,去皮脐) 白茯苓各三分 半夏半两(汤洗七遍,去滑) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 甘草一分(炙微赤,锉) 干姜半两(炮裂,锉) 芎藭半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后脾胃气寒，呕逆，不纳饮食，四肢乏力，不能运动。

25427 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】白豆蔻半两（去皮） 人参半两（去芦头） 桂心半两 白术一两 半夏半两（汤浸洗七遍去滑） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓢） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后脏腑气虚，两胁胀满，不思饮食，四肢无力。

25428 白豆蔻散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】白豆蔻汤（《圣济总录》卷一七五）。

【组成】白豆蔻一分（去皮） 黄耆半两（锉） 甘草一分（炙微赤，锉） 干木瓜半两 陈橘皮一分（汤浸，去白瓢，焙） 芎藭一分 人参半两（去芦头） 枇杷叶一分（拭去毛，炙微黄）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加生姜少许，大枣一个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿脾胃气不和，憎寒壮热，不纳乳食。

25429 白豆蔻散

【方源】《博济》卷二。

【异名】白豆蔻汤（《圣济总录》卷一八七）

【组成】白豆蔻仁半两 肉豆蔻三个 白术一两 厚朴（姜汁炙）半两 甘草三分（炙） 肉桂半两 青皮半两

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生

姜二片，粟米少许，大枣二个，同煎至七分，去滓热服。

【功用】补中益气，调顺脾元。

【主治】心胸满闷，不思饮食，上热下冷。

25430 白豆蔻散

【方源】《博济》卷三。

【异名】白豆蔻汤（《圣济总录》卷一五六）。

【组成】白豆蔻二两（用仁，一半生，一半熟） 枳壳半斤（去瓢，以浆水煮软，麸炒令香止） 肉桂二两（去皮） 橘皮二两（去瓢，炒，切细） 诃子二两（去核，半生半熟） 当归二两（洗）

【用法】上为末。每服一钱，水一中盏，加生姜、大枣，同煎至七分，稍温服。如要丸，用好枣浆水煮，去皮核，细研为丸，如梧桐子大。每服十五丸，以姜擘破，炒令黑色，入水，煎汤送下。

【主治】①《博济》：脾胃气不和，泄痢。②《圣济总录》：妊娠下痢，腹痛肠鸣。

25431 白豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】白豆蔻仁 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 白术 沉香（锉） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 甘草（炙）各等分

【用法】上为散。每服二钱匕，入盐少许，食前沸汤点服。

【主治】脾胃气弱，不进饮食。

25432 白豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】白豆蔻仁 桂（去粗皮） 木香 人参各半两 曲（炒） 京三棱（炮，锉） 陈橘皮（去白，切，焙） 大麦麴（炒）各三分 干姜（炮裂） 甘草（炙）各一分

【用法】上为细散。每服二钱匕，加生姜三片，盐少许，食前沸汤点服。

【主治】脾胃气虚弱，不能饮食。

25433 白豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】白豆蔻(去皮)二两 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 莎草根(炒去毛)各一两 甘草(炙,锉)五两 缩砂蜜(去皮) 青橘皮(汤洗,去白,焙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 丁香各四两 木香三两

【用法】上为末。每服二钱匕,加生姜二片,盐少许,食前沸汤点服。

【主治】中寒冷气,脐腹刺痛,胀满便利,醋心呕逆。

25434 白豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】白豆蔻(去皮)三分 桂(去粗皮) 丁香 附子(炮裂,去皮脐)各半两 高良姜 木香 肉豆蔻(去壳)各一分 人参 枳壳(去瓢,麸炒) 甘草(炙,锉) 陈橘皮(去白,焙,炒)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,煎木瓜、生姜汤调下。

【主治】积聚,心腹胀满,宿食不化,气刺疔痛,泄泻,善噫吞酸,食欲呕吐,手足逆冷。

25435 白豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】白豆蔻(去皮) 干木瓜各一两 生糯米三合 干姜(炮)三分 甘草(炙,锉)半两 缩砂仁一两半

【用法】上为散。每服二钱匕,新汲水调下。

【主治】胃中诸食结滞不消,心腹胀满,吐泻不止。

25436 白豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】白豆蔻 白术 甘草(炙,锉) 肉豆蔻仁 芍药 白茯苓(去黑皮)各三分 桂(去粗皮) 陈橘皮(去白,焙)各半两 枳壳(去瓢,麸炒)一分

【用法】上为散。每服二钱匕,空腹米饮调下。

【主治】产后冷痢,脐下痛,不能食。

25437 白豆蔻散

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】沉香三分 缩砂仁(微炒) 白豆蔻仁(微炒) 干生姜各一两 木香 人参(去芦头) 白术 白茯苓(去皮) 丁香各半两

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,入盐一捻,加生姜三片,煎至七分,食前热服;或用盐汤点亦得。

【主治】脾胃不和,中脘痞闷,气不升降,痰逆恶心,不思饮食。

25438 白豆蔻散

【方源】《直指》卷五。

【组成】白豆蔻仁 缩砂 革澄茄 丁香 木香 甘草(炒)各一分 青皮 陈皮 辣桂各二分 厚朴(制) 香附(炒)各三分

【用法】上为末。每服三钱,水一盞,加生姜三片,盐一捻,煎七分,不拘时候服。

【主治】七气所伤,滞于胸膈,窒于咽喉,胀痛于心下,噎气吞酸,不能饮食。

25439 白豆蔻散

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】白豆蔻仁 缩砂仁 青皮 陈皮 甘草(炙) 香附子 蓬莪术各等分

【用法】上为末。每服一钱,紫苏煎汤调下。

【主治】盘肠气痛。

25440 白豆蔻散

《普济方》卷三九四。为《幼幼新书》卷二十七引丁时发方“肉豆蔻散”之异名。见该条。

25441 白豆蔻散

【方源】《奇效良方》卷四十二。

【组成】白豆蔻(去皮)三分 肉豆蔻(去壳)一分 高良姜 木香各一分 桂心(去粗皮) 附子(炮,去皮脐) 枳壳(炒) 陈橘皮(去白,炒) 人参 丁香 甘草(炙) 各半两

【用法】上为细末。每服二钱,食前用木瓜、生姜煎汤调下。

【主治】积聚,心腹胀满,宿食不消,气刺

疔痛，泻泄，善噫，呕吐酸水，手足厥冷。

25442 白豆蔻散

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】白豆仁三钱

【用法】上为末。酒送下。

【主治】①《赤水玄珠》：胃口寒，作吐及作痛者。②《济阳纲目》：胃冷有积，吃食欲作呕吐者。

25443 白沉香散

【方源】《局方》卷三（淳祐新添方）。

【组成】川白姜（炒） 半夏曲 白茯苓 附子（炮熟，去皮） 诃子肉 干山药 沉香 白术（煨） 木香 人参（去芦）各一两半 丁香半两 甘草（炙）六钱

【用法】上为细末。每服二大钱，水一中盏，加生姜三片，大枣三个，木瓜一片，煎七分，食前服。

【功用】常服坠气，和脾胃。

【主治】一切冷气攻冲心腹，胁肋胀满，噫醋吞酸，胸膈噎塞，饮食减少。

25444 白附子丸

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】白附子一两（炮裂） 白僵蚕一两（微炒） 膩粉一分 天南星三分（炮裂） 白花蛇一两（酒浸，炙微黄，去皮骨） 防风一两（去芦头） 麻黄一两（去根节） 赤箭二两 麝香一两（细研） 白术半两 羚羊角屑三分

【用法】上为末，加麝香、膩粉，研令匀，以糯米粥为丸，如梧桐子大。每服十丸，以温酒研下，不拘时候。

【主治】风痉口噤，身体强直，迷闷不识人。

25445 白附子丸

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】白附子三分 白芷三分 杜若三分 赤石脂二两 桃花二两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甜瓜子一两（微炒） 牛膝一两（去苗） 鸡粪白三分（微炒） 白石脂二两 远志三分（去心） 蕨

蕤三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后以温牛乳一合送下。

【功用】令人面洁白媚好。

25446 白附子丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】白附子一分（炮裂） 白僵蚕一分（微炒） 乌蛇三分（酒拌，炙令黄） 牛黄一分（细研） 干蝎半两（微炒） 麝香一分（细研） 朱砂半两（细研，水飞过） 甜葶苈一分（隔纸炒令紫色） 青黛半两（细研） 蟾酥半钱 蛭虻一分（微炒，去翅足） 天浆子三七枚（内有物者）

【用法】上为末，以猪胆汁为丸，如绿豆大。每服一九，以冷水研，滴入鼻中，候嚏一两声，便以温水研三丸服之，或吐出粘涎。得睡便愈。

【主治】小儿急惊风，手足抽掣。

25447 白附子丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】白附子三钱 龙脑（研）一钱 麝香（研）一钱 蝎梢（微炒）七枚 天南星（炮）一两 白僵蚕（微炒）一钱 凝水石（煨过，研）一两半

【用法】上药，除凝水石外，捣研为末，再同和匀，入白蜜不拘多少，研令如稀汤状，入白面糊半匙头许，然后将凝水石末旋入，以干可为丸，如鸡头子大，于凝水石末中，留少许为衣，慢火焙干。每服一九，细嚼，食后用薄荷熟水送下；茶清亦得。

【主治】脑风。鼻息不通，时流清涕，多嚏不已。

25448 白附子丸

《圣济总录》卷十九。为《圣惠》卷七“蚬蛭丸”之异名。见该条。

25449 白附子丸

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】白附子一分（末） 蝎梢一分（研） 舶上硫黄半两（研细）

【用法】先将半夏半两(汤洗净,生为末),生姜自然汁和剂,捻作饼子,小钱大,沸汤内煮至熟,取出研成膏,入三味药末和之,如干,添少汤,丸如萝卜子大。每服二三十丸,米汤或乳汁送下,不拘时候。

【主治】伤风冷吐逆,及治粪青下泻。

25450 白附子丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】半夏(汤洗七遍,生姜汁制) 天南星(炮) 寒水石(煨) 细辛(去叶土) 白茯苓(去皮) 白僵蚕(炒,去丝嘴) 肉桂(去粗皮) 白附子(炮) 川芎各三分 香白芷一分 麝香一分(别研)

【用法】上为细末,生姜汁煮糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后用温热水送下。

【主治】风搏阳络,胸膈涎盛,眉痛头旋。

25451 白附子丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】白附子(微炮) 天麻 半夏(汤洗七遍) 朱砂(研细,水飞)各半两 白僵蚕一两(炒,去丝嘴) 全蝎二十一枚(去毒,微炒) 膩粉一分(别研) 麝香一钱(别研) 金箔十片(别研)

【用法】上药将白附子等五味研为细末,次入研者药,一处拌匀,煮枣肉为丸,如黍米大。每服十丸,煎荆芥汤送下,不拘时候。

【主治】小儿急慢惊风,潮热生涎,上气喘急。

25452 白附子丸

【方源】《直指》卷十一。

【组成】白附子(炮) 南星(炮) 半夏(汤七次) 旋覆花 甘菊 天麻 川芎 橘红 僵蚕(炒,去丝嘴) 干姜(生)各一两 全蝎半两(焙)

【用法】上为末,用生姜半斤,取汁打面糊为小丸。每服五十丸,食后荆芥汤送下。

【主治】风痰上厥,眩运头疼。

25453 白附子丸

【方源】《普济方》卷四十七引《经效济世

方》。

【组成】天南星(生) 天麻 半夏(汤洗七遍) 川乌头(生,去皮脐) 白附子(生用)各等分

【用法】上为细末,加脑子、麝香少许,瓷盒内闭一二宿,清水为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服五七丸,加至十丸,食后茶清或姜汤送下。服时微以齿碎之。

【主治】风虚痰盛,头目昏眩。

25454 白附子丸

【方源】《济阴纲目》卷三。

【组成】白附子四两 附子二两 黄狗骨头四两(烧灰)

【用法】上为细末,粥为丸,如梧桐子大。每服三十丸。与伏龙肝散兼服。

【主治】妇人经年崩漏不止,诸药不效,脉濡微。

25455 白附子汤

《审视瑶函》卷五。为《永类铃方》卷十一“白附子散”之异名。见该条。

25456 白附子散

【方源】《外台》卷三十二引《古今录验》。

【组成】白附子 青木香 由跋各二两 麝香二分

【用法】上为散。以水和,涂面。

【主治】面皤痒肿。

25457 白附子散

【方源】方出《千金》卷六,名见《圣济总录》卷一二一。

【组成】白附子 知母 细辛各六铢 芎劳 高良姜各十二铢

【用法】上为末。以绵裹少许着齿上,有汁吐出,一日两度含之。

【主治】龋齿及虫痛;口气。

25458 白附子散

【方源】《幼幼新书》卷十四引《石壁经》。

【组成】白附子 朱砂各三分 全蝎分半 黑附子(炮) 雄黄 羌活各半两 石膏七钱半 麻黄(去节)一两 脑 麝(随意入,别研)

【用法】上为末。每服半钱或一字，薄荷、腊茶汤调服，如热再服。

【主治】夹惊伤寒。

25459 白附子散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】白附子半两 附子半两 天南星一分 天麻半两 半夏半两 乌头半两 朱砂一分（细研） 干蝎一分 麻黄半两（去根节）

【用法】上药生为细散，入研了朱砂令匀。每服一钱，以生姜汤调下。良久，以热葱豉粥饮投之，当便汗出。

【主治】伤寒中风，头痛项强。身体壮热，服诸药不得汗者。

25460 白附子散

【方源】方出《圣惠》卷三十四，名见《圣济总录》卷一二一。

【组成】白附子（生用） 莽草 细辛 芎藭 高良姜各一分（锉）

【用法】上为细散。以绵裹少许，着龋上，有汁勿咽。

【主治】龋齿疼痛。

25461 白附子散

【方源】方出《圣惠》卷四十，名见《普济方》卷五十七。

【组成】白附子一两 木香半两 由跋半两 麝香一分（细研） 细辛一两

【用法】上为末。加麝香研匀，水调如膏，夜卧涂之。

【主治】肺脏风毒，及酒渣皴痒发歇。

【备考】方中由跋，《普济方》作“细辛”。

25462 白附子散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】白附子（生用） 白术 天麻 白芷各一两 防风（去叉） 芦荟各半两 丹砂（研）一分 龙脑（研）少许 麝香（研）少许

【用法】上药先将白附子等捣罗为末，次将丹砂等研细，同前件药末拌匀，瓷器中盛。早、

晚每服一钱匕，用薄荷汁少许、温酒一盏调下。

【主治】风邪循风府上至脑户，为脑风头痛。

25463 白附子散

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】白附子（炮） 续断 防风（去叉）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，童便和热酒一盏调下，并三服，不拘时候。

【主治】打扑内损及坠马伤。

25464 白附子散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【异名】白附散（《准绳·类方》卷四引《本事》）。

【组成】麻黄（不去节） 乌头 天南星各半两 干姜一分 蝎五个 白附子一两 朱砂一分（研） 麝香一分（研）

【用法】上为细末。每服一字，酒调服讫，去枕卧少时，又灸曲鬓穴七壮，左痛灸左，右痛灸右。

【主治】①《鸡峰》：风寒留于骨髓，脑逆，头痛连齿，时发时止，连年不已。②《本事》：风寒客于头中，偏痛无时，久久牵引两目，遂至失眠。

【方论选录】《本事方释义》：白附子气味辛甘大热，入足阳明；麻黄气味辛温，入足太阳；川乌气味苦辛大热，入足太阳、少阴；南星气味苦辛温，直入手、足太阴；全蝎气味甘平，入足厥阴，最能行走入络；干姜气味辛温，入手足太阴；朱砂气味苦温，入心；麝香气味辛香，入手足少阴，能引药入络。此因客邪入于头中，偏痛无时，以致失明，非辛香温热能行之药不能搜逐其邪，非温散之药不能送邪达外；外内清平，其病焉有不去者乎？

25465 白附子散

【方源】《百一》卷三。

【组成】白附子半两（炮） 天南星半两

(炮) 黑附子(炮,去皮脐)一分

【用法】上为细末。每服二钱,水一盏,加生姜五片,慢火煎六分,不拘时候服。小儿一钱,水一盏,加生姜三片,慢火煎,不住手搅匀,至小半盏,分三服。

【功用】止吐化涎。

【主治】大人、小儿虚风呵欠。

25466 白附子散

【方源】《永类铃方》卷十一。

【异名】白附子汤(《审视瑶函》卷五)。

【组成】荆芥穗四两 菊花 防风 木贼(去节) 白附子各三两 白蒺藜(炒,去刺)一两 粉草(炙)一两 制苍术 人参 羌活各半两

【用法】上㕮咀。每三钱,水煎、食后服。

【主治】发散初起黑花,昏朦内障。

【备考】方中白附子原脱,据《准绳·类方》补。

25467 白附子散

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】白附子 密陀僧 茯苓 白芷 定粉各等分

【用法】上为末。先用萝卜煎汤洗面净,后用羊乳调,至夜敷患处,次早洗去。

【主治】面上热疮似癣,或生赤黑斑点。

25468 白附子散

【方源】《理瀹》。

【组成】白附子八两 大黄四两 川乌二两 草乌八钱 羌活 防风 半夏 南星 天麻 白芷 细辛 麻黄 马前子 当归尾 白芍 川芎 生地 苏木 红花 骨碎补 灵仙 续断 延胡 灵脂 刘寄奴 五倍子 降香 儿茶 黄丹 石膏(以上皆生晒) 松香(去油) 乳香(去油) 没药(去油)各二两 雄黄一两 轻粉三钱 龙骨(杵) 象皮 生龟版各七钱 蝉蜕身 蛇蜕 山甲 朱砂 芸香 官桂(锉) 发灰各五钱(共末) 血竭三两(单研,在后和入) 酌加冰 麝

【用法】以少许掺散阴膏贴;如破者干掺;肿者用葱汁和醋调敷。

【主治】跌打各伤。

25469 白附子膏

【方源】《外台》卷三十二引《必效方》。

【组成】白附子 青木香 丁香各一两 商陆根一两 细辛三两 酥半升 羊脂三两 密陀僧一两(研) 金牙三两

【用法】上药以酒三升渍一宿,煮取一升,去滓纳酥,煎一升膏。夜涂面上,旦起温水洗。

【功用】令面白悦泽。

【主治】黧妇。

【宜忌】不得见大风日。

25470 白附子膏

【方源】《圣惠》卷十四。

【异名】玉容散(《杨氏家藏方》卷二十)。

【组成】白附子 密陀僧 牡蛎(烧为粉) 芎藭 白茯苓各半两

【用法】上为细散,更研令极细,以酥调。敷疮痂上。

【主治】①《圣惠》:伤寒生豌豆疮,愈后瘢痕不消。②《普济方》:面黑黧黯,皮皱皴。

25471 白茅根汤

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】白茅根一握 麦门冬一两(去心) 陈橘皮半两(汤浸,去白瓢,焙) 淡竹茹半两 赤茯苓半两 甘草半两(炙微赤) 生姜半两 枇杷叶半两(拭去毛,炙微黄)

【用法】上锉细。以水三大盏,煎至一盏半,去滓,分为三次温服,不拘时候。

【主治】乳石发动,虚热,痰饮呕逆,不可饮食。

25472 白茅根汤

【方源】方出《圣惠》卷五十八,名见《普济方》卷二一四。

【组成】滑石 芭蕉根各半两 莲子草一两 白茅根一两半(锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,水一盏,煎

至六分，去滓，食前温服。以利为度。

【主治】热淋涩痛，热极不解。

25473 白茅根汤

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】白茅根（锉）三两 秦艽（去苗土） 茵陈蒿 犀角（镑） 黄芩（去黑心）各一两半 朴消（研） 赤芍药各二两大黄一两 麦门冬（去心，生用）二两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，煎至一盞，去滓，空腹服，日二夜一。

【主治】心脾热壅，小便赤涩，皮肉发黄，目黄色。

25474 白茅根汤

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【异名】茅根汤（原书卷一八四）。

【组成】白茅根（细锉）五两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热淋，小便赤涩不通。

25475 白茅根汤

《鸡峰》卷十八。为《圣惠》卷五十八“白茅根散”之异名。见该条。

25476 白茅根汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】白茅根 瞿麦 茯苓 车前 人参 滑石 通草 麦冬 炙甘草

【用法】加灯心数茎，煎服。

【主治】产后小便数淋。

【加减】血淋，加淮牛膝。

25477 白茅根散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】白茅根一两（锉） 百合一两 陈橘皮一两（汤浸去白瓤焙） 葛根一两（锉） 人参一两（去芦头）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盞，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，嘔逆不下食。

25478 白茅根散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】白茅根一两（锉） 犀角屑三分

刺薊根一两半 黄芩一两 桑根白皮二两（锉） 紫菀一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盞，入竹茹一分，煎至五分，去滓，入生地黄汁一合，更煎三两沸，每于食后温服之。

【主治】心、肺脏热壅致唾血。

25479 白茅根散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【异名】白茅根汤（《鸡峰》卷十八）。

【组成】白茅根一两（锉） 赤芍药三分 滑石一两 木通三分（锉） 子芩三分 葵子一两 车前子三分 乱发灰一分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盞，煎至六分，去滓温服。如人行十里再服，以愈为度。

【主治】血淋，小便中痛不可忍。

【备考】方中赤芍药，《鸡峰》作“白芍药”。

25480 白茅根散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】白茅根三分（锉） 蓬麦一两 鲤鱼齿二十枚（细研） 木通二两（锉） 车前子一两 冬葵子一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盞，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】产后小便淋涩及血淋。

25481 白茅根散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】伏龙肝 禹余粮 白芍药 熟地黄 地榆 白茅根各四两 龙骨 当归各六两 甘草 麒麟竭

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，煎至七分，不拘时候服。

【主治】妇人崩中不止，逐脐撮痛，或时烦渴。

【备考】方中甘草、麒麟竭用量原缺。

25482 白茅藤酒

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】白茅藤根（于石臼内杵粉）

疔痛，泻泄，善噫，呕吐酸水，手足厥冷。

葵三分

【用法】每用粉四两，糯米一斗，蒸饭作酒；或每酒一升，用药三两煮服。以醉为度。

【主治】大麻风并三十六种风。

25483 白矾灰散

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《普济方》卷五十五。

【组成】白矾灰一分 白龙脑三分 乌贼鱼骨一分 蒲黄半两

【用法】上为细散。每以半钱，绵裹塞耳，日三易之。

【主治】聤耳出脓水，久不绝。

25484 白矾灰散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】白矾灰 黄柏（锉） 乌贼鱼骨 龙骨各半两

【用法】上为细散。以绵缠柳杖，展去脓血尽，干掺药末于耳内，一日二三次。

【主治】小儿聤耳有脓血，疼痛不止。

25485 白矾涂方

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】白矾一两（研为末）

【用法】用醋调如糊，涂摩癣上。

【主治】一切干湿癣。

25486 白矾涂方

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】白矾（生末） 黄米粉各一两

【用法】每用一钱匕，清水半合，调如泥，涂脑上，一日三次。

【主治】小儿脑热鼻干。

25487 白矾煮散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】白矾（烧灰） 防风（去叉） 细辛（去苗叶） 附子（生用） 干姜（炮） 白术 甘草（炙）各半两 蛇床子（微炒）一分 藜芦（去芦头） 椒（去目并开口者，炒出汗）各一分

【用法】上为细散。每用一钱匕。以无灰酒一盞，水半盞，煎十余沸，热含冷吐，一日三次。以愈为度。

【主治】小儿牙齿急疳，虫蚀齿床，及口面

肿，开口不得，臭烂疼痛不可忍。

25488 白虎骨酒

【方源】《全国中药成药处方集》（抚顺方）。

【组成】虎骨二两 怀牛膝一两三钱 木瓜一两 蚕沙一两 没药六钱 海藤六钱 桂楠一两三钱 年健八钱 地枫八钱 赤术八钱 西花一两 桂枝六钱 当归八钱 川断六钱 防风七钱 白花蛇一两三钱 鹿胶一两三钱 公藤一两三钱 公丁香七钱 松节四钱 紫萸一两三钱 草萸四钱 广木香四钱 良姜七钱 官桂七钱 红参一两三钱

【用法】用烧酒三十斤，用罐泡药一天许，再以温火燉数开，澄清去滓用之。每早服三钱。

【功用】疏风散寒，镇痛。

【主治】风寒湿痹，经络闭塞，筋骨疼痛，或麻木，或筋抽搐，腰膝疼痛，难以伸屈；及妇人经闭血寒，抽筋麻木，关节作痛。

【宜忌】孕妇忌用。

25489 白果叶散

【方源】《疡医大全》卷十八引（吴氏家秘）。

【组成】珍珠 银粉各二钱 雄黄一钱 白果叶（去梗，瓦上微火焙干，研末）三钱

【用法】先将珍珠、雄黄研末，同虾蟆心、肝十副捣烂，围住疮疮四边，再将白果叶末、银粉、好醋调搽疮疮中心，不过二次即消。破烂者，用醋浸白果叶一昼夜，贴破疮上。

【功用】能掘诸病，不使漫生，即能消散。

【主治】瘰癧。

25490 白果蛋方

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】头生鸡子五个 生白果肉十枚

【用法】将鸡子开一小孔，每一鸡子内入白果肉二枚，放饭上蒸熟，每日吃一个，连四五次即愈。

【主治】白浊。

25491 白物神散

【方源】《产科发蒙·附录》。

【组成】土茯苓(炒)十五钱 当归 川芎 薏苡仁 牡丹皮各五钱(炒) 人参 甘草各二钱

【用法】上为细末。每服一钱，白汤送下。

【主治】妇人带下，因气滞、欲郁、血郁者。

25492 白狗肺汤

【方源】《幼幼新书》卷十六引《婴童方》。

【组成】白狗肺一具(切) 紫菀五分 清酒一斗 人参 乌韭 款冬花 细辛 桂心 白术各一两 生姜三两 饴糖半斤 豉一升 甘草(炙)一寸 麻黄(去节)二分 吴茱萸半斤(一方无桂心，有杏仁七个)

【用法】用前清酒一斗，同药微火煮至七升。每服一合，日三夜一。

【主治】少小咳逆善呕，面肿涕出，胸满肺胀，短气肩息。

25493 白鱼灰散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】书中白鱼七枚(烧灰)

【用法】上为细末。乳汁调一字与服；或敷在乳上吮之。

【主治】百日内儿涎壅吐乳。

25494 白定眼药

【方源】《普济方》卷七十六。

【组成】可铁刺(如无，以白及粉代之) 阿飞勇各一钱 李子树胶四钱 白锡粉(炒，水飞)八钱

【用法】上为细末，鸡子清为锭，用奶女儿乳汁，于光磨石上磨汁。不拘时点之。

【功用】定痛，消肿，去翳。

25495 白降雪丹

《疡医大全》卷十七。为《金鉴》卷六十六“白降雪散”之异名。见该条。

25496 白降雪散

【方源】《金鉴》卷六十六。

【异名】白降雪丹(《疡医大全》卷十七)。

【组成】石膏(煨)一钱五分 硼砂一钱 焰消 胆矾各五分 元明粉三分 冰片二分

【用法】上为极细末。以笔管吹入喉内。

【主治】喉风肿痛，声音难出。

25497 白树鸡粥

【方源】《医方类聚》卷一四一引《食医心鉴》。

【组成】白树鸡三两(洗泽，细切。一名白木耳) 米三合 薤白五合(切)

【用法】上相和于豉汁中，煮作粥。空心食之。

【主治】肠滑，赤白下痢。

25498 白荆花丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】白荆花半两(微炒) 乌头一分(炮裂，去皮脐) 半夏一分(汤洗七遍，去滑) 膩粉半分 水银半两(以枣瓤研令星尽) 白花蛇二两(酒浸，去皮骨，炙令微黄) 天南星一分(炮裂)

【用法】上为末，入水银都研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】急风，腰背强硬，口眼牵急。

25499 白茯苓丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】白茯苓一两 白龙骨一两 远志一两(去心) 防风一两(去芦头) 人参一两(去芦头) 柏子仁一两 牡蛎二两(烧为粉) 犀角屑一两 生干地黄一两

【用法】上为末，加枣肉二两，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹以粥饮送下，晚食前再服。

【主治】肝劳热，恐畏不安，精神闷怒，不能独卧，志气错乱。

25500 白茯苓丸

《圣惠》卷二十六。为《外台》卷十七引《素女经》“更生丸”之异名。见该条。

25501 白茯苓丸

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】白茯苓一两 黄柏一两(微炙，锉) 干姜一两(炮裂，锉) 木瓜一两半(干者) 白石脂二两

【用法】上为末，煮粟米饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】霍乱后水痢不止。

25502 白茯苓丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】白茯苓一两 覆盆子一两 黄连一两(去须) 人参一两(去芦头) 栝蒌根一两 熟干地黄一两 鸡胞脬五十枚(微炒) 草薢一两(锉) 玄参一两 石斛三分(去根, 锉) 蛇床子三两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 食前煎磁石汤送下。

【主治】因消中之后, 胃热入肾, 消烁肾脂, 令肾枯燥, 遂致消肾, 即两腿渐细, 腰脚无力。

【方论选录】《医方集解》: 此足少阴药也。茯苓降心火而交肾, 黄连清脾火而泻心, 石斛平胃热而涩肾, 熟地、玄参生肾水, 覆盆、蛇床固肾精, 人参补气, 花粉生津, 草薢清热利湿, 胞脬能消水谷, 通小肠、膀胱而止便数, 善治膈消, 磁石色黑入肾, 补肾益精, 故假之为使也。

25503 白茯苓丸

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白茯苓一两 熟干地黄一两 人参(去芦头) 琥珀 桂心 远志(去心) 菖蒲 柏子仁各半两

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 以粥饮送下, 不拘时候。

【主治】产后心虚惊悸, 神不安定。

25504 白茯苓丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】白茯苓一两 人参一两(去芦头) 麦门冬(去心, 焙) 酸枣仁一两(微炒) 甘草三分(微炙黄, 锉) 朱砂三分(别研) 生龙脑一分(别研)

【用法】上七味, 除别研药外, 同捣为细末, 入研了药, 再研令匀, 炼蜜为丸, 如鸡头子大。每服一丸, 食后、临卧乳香汤送下。

【功用】化痰、镇心安神。

【主治】肝脏实热上攻, 头目昏眩; 兼治风。

25505 白茯苓丸

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】白茯苓(去黑皮) 黄柏(去粗皮) 干姜(炮裂) 各三两 木瓜(干者, 去瓢) 一枚(切, 焙)

【用法】上为末, 以梗米或粟米饮为丸, 如梧桐子大, 晒干。每服三十丸, 米饮送下, 一日二次。老小加减。

【主治】霍乱后, 水利不止; 亦治诸利。

25506 白茯苓丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】白茯苓半两 黄连二两半 黄柏 羚羊角各一两半

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服三十丸, 空心米饮送下, 日午再服。

【主治】休息痢, 日夜频并。

25507 白茯苓丸

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】白茯苓(去黑皮) 石斛(去根) 肉苁蓉(酒浸, 切, 焙) 酸枣仁(炒) 五味子(炒) 天雄(炮裂, 去皮脐) 续断 泽泻(锉) 当归(切, 焙) 各一两半 白茯苓(炒) 人参 羚羊角(镑) 枳壳(去瓢, 麸炒) 黄耆(炙, 锉) 五加皮(锉) 防风(去叉) 细辛(去苗叶, 炒) 独活(去芦头) 杜仲(去粗皮, 酥炙) 甘草(锉, 炙) 各一两 熟干地黄(焙) 白槟榔(生用) 鹿角胶(炙令燥) 云母粉(别研) 各二两 菟丝子(酒浸软, 别研) 三两

【用法】上药先将二十三味捣罗为末, 入细研云母粉、菟丝子, 揉拌令匀再罗, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每日早、晚食前各服二十丸, 大枣汤送下。

【主治】风毒脚气缓弱, 腰脊急痛, 臂膊痠疼, 心胸痰壅, 气逆肋满。

25508 白茯苓丸

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】白茯苓(去黑皮) 贝母(去心) 五味子 紫菀(去苗土) 白术 百部根 杜蘅 麦门冬(去心, 焙) 人参 麻黄(去根节, 汤煮, 掠去沫) 杏仁(汤浸, 去皮尖双仁, 熬) 陈橘皮(汤浸, 去白, 焙) 桂(去粗皮) 各等分

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服二十丸, 空腹米饮送下, 一日二次。加至三十丸。

【主治】虚劳上气咳嗽。

25509 白茯苓丸

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】白茯苓(去黑皮) 黄耆(炙, 锉) 薏苡仁 萆薢 山茱萸 赤芍药各一两半 枳壳(去瓢, 麸炒) 一两一分 白槟榔(炮, 锉) 熟干地黄(焙) 各二两 桃仁(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒黄色) 二两半 当归(切, 焙) 一两

【用法】上为末, 炼蜜为丸。涂酥捣熟为丸, 如梧桐子大。每服四十丸, 空腹煎大枣汤送下。

【主治】妇人月水不调, 或多或少, 脐下胀满疼痛。

25510 白茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】白茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 附子(炮裂, 去皮脐) 白芍药各三分 补骨脂(炒) 黄耆(锉) 各一两 蜀椒(去目及闭口, 炒) 四十粒 肉苁蓉(酒浸, 切, 焙) 一两半

【用法】上㕮咀, 如麻豆大。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓, 食前、临卧温服, 一日三次。

【主治】肺痿。小便数, 甚者吐涎沫, 欲咳不能。

25511 白茯苓汤

《圣济总录》卷五十五。为《圣惠》卷三“补肝白茯苓散”之异名。见该条。

25512 白茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】白茯苓(去黑皮) 五灵脂 白芷(微炒) 各一两 黄明胶(两片) 一两(炙令燥)

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至八分, 去滓, 入蜜少许, 更煎两沸, 放温, 细呷服, 不拘时候。

【主治】虚劳咳嗽。

25513 白茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】白茯苓(去黑皮) 牛黄(研) 各三分 犀角屑一分 甘草(炙) 人参 羚羊角屑 熟干地黄(焙) 白术 桂(去粗皮) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 煎至七分, 去滓温服, 一日三次。

【主治】舌肿强。

25514 白茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】白茯苓(去黑皮) 赤芍药 芎藭 各一两半 桂(去粗皮) 大腹皮(锉) 枳壳(去瓢, 麸炒) 熟干地黄(焙) 各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盞, 加生姜三片, 煎至七分, 去滓温服, 一日三次。

【主治】产后气血虚, 心膈烦满, 身体壮热, 恶露不行。

25515 白茯苓汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】白茯苓 泽泻各二两 郁李仁二钱

【用法】上㕮咀。作一服, 水一碗, 煎至一半, 不拘时候常服, 从少至多服。或煎得澄, 加生姜自然汁在内, 和面或做粥饭, 顿食。五七日后, 觉胀下, 再加以白术散。

【主治】①《保命集》: 蛊胀。②《普济方》: 水肿。

25516 白茯苓汤

【方源】《医学纲目》卷五引《济生》。

【组成】白茯苓一钱 人参三钱 远志三钱(去心) 龙骨 防风各二钱 甘草三钱 犀角末五钱 生地黄四钱 大枣七个 麦门冬(去心)四钱

【用法】水二大盏,煎作八合,分三次温服,如人行五里一服。仍避风寒,若觉未安,隔日更作一剂。

【功用】《济阴纲目》:取虫后补虚。

【主治】破伤风五脏虚弱,魂魄不安。

25517 白茯苓汤

《女科指掌》卷五。为《圣惠》卷八十“白茯苓散”之异名。见该条。

25518 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷三。

【异名】茯苓汤(《圣济总录》卷四十二)。

【组成】白茯苓一两 前胡一两(去芦头) 桂心半两 黄芩一两(锉) 白术一两 沉香一两 鳖甲一两(涂醋,炙微黄,去裙襴) 生干地黄三分 五味子三分 枳实半两(麸炒微黄)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,同煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肝气不足,筋脉不遂,心膈壅滞,左肋肋胀,不思饮食。

【禁忌】忌苋菜。

25519 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】白茯苓一两 人参一两(去芦头) 防风半两(去芦头) 桂心三分 远志半两(去心) 桔梗三分(去芦头) 枳壳三分(麸炒微黄,去瓤) 诃黎勒三分(煨,用皮) 白术半两 半夏三分(汤洗七遍去滑,微炒) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】心气虚寒,心膈胀满,悲思忧愁。

25520 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】白茯苓一两 远志三分(去心) 甘草二分(炙微赤,锉) 桂心一两 人参一两(去芦头) 白芍药三分 防风三分(去芦头) 熟干地黄一两 铁粉二两 黄耆三分(锉) 麦门冬三分(去心)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【功用】安定神志。

【主治】心脏风虚,惊悸好忘,恍惚。

25521 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】白茯苓一两 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 人参(去芦头) 白术三分 五味子三分 草豆蔻半两(去皮) 半夏三分(汤洗七遍,去滑) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱,胸中满闷,气促,呕吐不能下食。

25522 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】槟榔一两 青橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙) 桂心一两 厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 白茯苓半两 甘草半两(炙微赤,锉) 附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒里虚,心下悸,腹中气不和。

25523 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】白茯苓一两 人参一两(去芦头) 白术三分 白芍药三分 麻黄根一两 五味子半两 牡蛎一两(烧为粉) 肉苁蓉一两

(酒浸一宿,刮去皱皮,焙干)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒,脉微细,汗出不止,渐觉虚羸。

25524 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】白茯苓一两 远志三分(去心) 半夏半两(汤洗七遍去滑) 石膏一两 黄芩半两 人参一两(去芦头) 桂心半两 熟干地黄一两 麦门冬半两(去心)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣二个,煎至六分,去滓,下饴糖一分,搅令匀,不拘时候温服。

【主治】伤寒后,心虚惊悸,或时妄语,四肢烦热,肢体羸瘦。

25525 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】白茯苓半两 人参半两(去芦头) 柴胡半两(去苗) 草豆蔻一分(去皮) 半夏半两(汤洗七遍去滑) 枇杷叶半两(拭去毛,炙令微黄) 厚朴半两(去粗皮,涂生姜汁,炙令微黄)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,大枣二个,煎至五分,去滓,食前温服。

【主治】热病后,脾胃气虚,冷痰滞,不思饮食。

25526 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】白茯苓 前胡(去芦头) 人参(去芦头) 黄耆(锉) 诃黎勒皮各一两 麦门冬(去心,焙) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 紫菀(去苗土) 陈橘皮(汤浸,去白瓢,焙) 各三分 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚劳咳嗽,心胸壅闷。

25527 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】白茯苓一两 黄耆一两(锉) 半夏三分(汤洗七遍,去滑) 甘草半两(炙微赤,锉) 人参一两(去芦头) 桂心一两 白芍药一两 麦门冬一两半(去心焙) 陈橘皮三分(汤浸,去白瓢,焙) 熟干地黄一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】虚劳不足,小腹里急,四肢少力疼痛,不欲饮食。

25528 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】白茯苓 鳖甲(涂醋,炙令黄,去裙襖) 黄芩 革薢(锉) 麦门冬(去心) 酸枣仁(微炒) 甘草(炙微赤,锉) 生干地黄 人参(去芦头) 黄耆(锉) 柴胡(去苗) 各一两 白芍药半两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加秫米一百粒,生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚劳烦热,不得睡卧,四肢疼痛。

25529 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】白茯苓一两 白术一两 甘草半两(炙微赤,锉) 黄耆一两(锉) 人参三两(去芦头) 鳖甲一两(涂醋,炙令黄,去裙襖) 熟干地黄一两 当归三分 白芍药三分

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,豉三十粒,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚劳寒热,心烦体痛,吃食减少。

【禁忌】忌苋菜。

25530 白茯苓散

【方源】方出《圣惠》卷四十七,名见《普

济方》卷二〇二。

【组成】白茯苓一两 大枣十枚(去核) 麦门冬半两(去心)

【用法】上锉细。分为五服，每服以水一中盏，煎至六分，去滓，温温频服。

【主治】霍乱心烦渴。

25531 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】白茯苓二两 人参三两半(去芦头) 干姜一两(炮裂，锉) 桂心一两 远志一两 甘草一两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】上焦虚寒，精神不守，泄下便利，语声不出。

25532 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【异名】熟干地黄汤(《普济方》卷三五三)。

【组成】白茯苓一两半 熟干地黄一两半 远志一两(去心) 甘草一两(炙微赤，锉) 白芍药一两 黄耆一两(锉) 桂心一两 当归一两(锉，微炒) 麦门冬一两(去心，焙) 人参一两半(去芦头) 菖蒲一分 桑寄生一分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后心神惊悸不定，言语失常，心中愤愤。

25533 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白茯苓三分 麦门冬三分(去心，焙) 草豆蔻(去皮) 藿香 当归(锉，微炒) 人参(去芦头) 高良姜(锉) 芎藭 甘草(炙微赤，锉) 各半两

【用法】上为粗散。每服二钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温

服，不拘时候。

【主治】产后霍乱吐泻，心神烦闷，腹内疼痛，四肢不和，或时燥渴。

25534 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷八十。

【异名】白茯苓汤(《女科指掌》卷五)。

【组成】白茯苓一两 当归(锉，微炒) 白芍药 芎藭 桂心 黄耆(锉) 人参(去芦头) 熟干地黄各半两

【用法】上为散。每服先以水一大盏半，入猪肾一对(去脂膜，细切)，生姜半分，大枣三个，煎至一盏，去滓，入药半两，更煎至七分，去滓，食前分温二服。

【主治】产后蓐劳。盖缘生产日浅，久坐多语，运动用力，遂致头目四肢疼痛，寒热如疟状。

25535 白茯苓散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】白茯苓一两 乌梅肉一分(微炒) 干木瓜半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓令温，时时与服。

【主治】小儿霍乱，渴不止。

25536 白茯苓散

【方源】《普济方》卷二一六引《十便良方》。

【异名】茯苓散(《普济方》卷三十三)。

【组成】白茯苓 龙骨 甘草(炙，锉细) 干姜 桂心 续断 附子各一两 熟干地黄 桑螵蛸(微炒)

【用法】上为散。每服四钱，水一钟，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】小便不禁，日夜不止；白浊，甚至下血。

25537 白茯苓散

《普济方》卷十五，即《圣惠》卷三“羌活散”。见该条。

25538 白茯苓粥

《长寿药粥谱》引《直指》。为《圣济总录》卷一九〇“茯苓粥”之异名。见该条。

25539 白茯神散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】熟地五两 人参两半 黄耆三两(酒炙) 枣仁三两 当归三两 白芍两半(酒炒) 远志两半 麦冬三两(去心) 肉桂五钱(去皮) 辰砂一两 茯神二两(去木) 炙草五钱

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】产后惊病，脉软数者。

【方论选录】产后血气大虚，心包失养，无以振发神明，而触事易惊焉。人参扶元补气以充血脉，黄耆补气固中以壮胃阳，当归养血营经脉，枣仁养心安神志，白芍敛阴和血脉，麦冬润肺清心火，远志通肾交心，肉桂平肝暖血，茯神安神定志，辰砂镇心定惊，炙草缓中和胃也。为散水煎，使胃气一壮，则心胆俱雄而心包得养，神志自强，安有触事易惊之患乎。

25540 白药子散

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】川升麻 白药 前胡 石膏各一两 羚羊角屑 甘草(炙)半两 玄参三分 麦门冬一两半 川朴消二两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盞，加竹茹一分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病咽喉肿塞连舌根疼痛，及干呕头疼不下食。

25541 白药子散

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】白药子一两 甘草半两

【用法】上为末。用猪肝一叶，批开掺药五钱，水一大盞，煮熟，食后服。

【主治】一切瘡眼赤烂，目生翳膜，内外障疾，并小儿吐痢。

25542 白药子膏

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】白药子末

【用法】鸡子清调，摊纸上如碗大。贴于脐

上，干则温水润之。

【主治】妊娠伤寒，恐毒气损胎。

25543 白牵牛散

【方源】《圣济总录》卷八十引《膜外气方》。

【组成】白牵牛子(炒) 青橘皮(去白，焙，炒) 木通(锉)各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，煎商陆汤调下。大便下黄水为度。

【主治】膜外水气。

【禁忌】忌盐一百日。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“白牵牛子散”。

25544 白牵牛散

【方源】《金鉴》卷十六。

【组成】白牵牛(半生半熟) 甘草(炙) 橘红 白术(土炒) 桑白皮 木通各一钱

【用法】水煎服。

【主治】膀胱蕴热，风热相乘，小儿阴囊肿兼四肢肿，二便不利者。

25545 白扁豆丸

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】白扁豆一两(炒) 绿豆二两(炒) 好信五钱(醋煮)

【用法】上为末，入白面四两，水为丸，如梧桐子大。临发日五更服一九，用凉水送下。

【主治】疟疾。

【禁忌】忌热物。

25546 白扁豆饮

《奇效良方》卷六十九。为方出《得效》卷十，名见《普济方》卷二五一“白扁饮”之异名。见该条。

25547 白扁豆散

【方源】《本事》卷五。

【组成】白扁豆(饭上蒸) 生姜各半两 枇杷叶(去毛) 半夏(汤浸七次) 人参(去芦) 白术各一分 白茅根三分

【用法】上锉细。水三升，煎至一升，去滓，下槟榔末一钱和匀，分作四服，不拘时候。

【主治】久嗽咯血成肺痿，多吐白涎，胸膈

满闷不食。

25548 白扁豆散

【方源】《医学正传》卷七。

【组成】白扁豆(生,去皮)

【用法】上为细末。每服方寸匕,清米饮调下。

【主治】妊娠误服草药及诸般毒药毒物。

25549 白扁豆粥

【方源】《长寿药粥谱》引《延年秘旨》。

【组成】白扁豆 粳米

【制法】每次取炒白扁豆60克,或鲜白扁豆120克,粳米60克,同煮为粥,至扁豆烂熟,夏秋季可供早晚餐服食。

【功用】健脾养胃,清暑止泻。

【主治】脾胃虚弱,食少呕逆,慢性久泻,暑湿泻痢,夏季烦渴。

25550 白荷花露

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】鲜白荷花瓣

【功用】清暑,凉脾,消瘀,止血,安胎。

【主治】喘嗽,烦渴,痰血。

【备考】《中药成方配本》本方用法:用蒸气蒸馏法,每斤吊成露三斤。每用四两,隔水温服。小儿酌减。

25551 白蛭壳散

【方源】方出《肘后方》卷三,名见《卫生总微》卷十四。

【组成】屋上白蛭壳(捣末)

【用法】每服方寸匕,酒送下。

【主治】卒得咳嗽。

【备考】《卫生总微》本方用法:每服五分,米饮调下。

25552 白胶香散

【方源】《医方类聚》卷八十五引《王氏集验方》

【组成】白胶香不拘多少

【用法】上为细散。每服二钱,食后新汲水调下。

【主治】吐血不止。

25553 白胶香散

【方源】《普济方》卷三一〇引《鲍氏方》。

【组成】白胶香末

【用法】敷之。

【主治】断筋。

25554 白胶香散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】白胶香 赤石脂 枯矾各五钱 黄丹 乳香 没药 轻粉各二钱

【用法】上为末。干掺;湿则油调敷。

【主治】诸疔侵蚀,日久不愈,下注疔疮疼痛,内外踝生疮。

25555 白胶香膏

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】乳香 白胶香 沥青各等分(研)

【用法】上以脂麻油和如面剂,重汤煮成膏,不犯铜、铁、以杖子剔起如丝即成。

【主治】折伤。

25556 白凉散煎

【方源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】蕤仁 膩粉各等分 龙脑少许

【用法】上为极细末,以儿孩儿乳调,敷眼中。

【主治】浮翳障。

25557 白酒药曲

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】高良姜四两 草乌八两 吴茱萸 白芷 黄柏 桂心 干姜 香附 辣蓼 苦参 秦椒各一两 菊花 薄荷各二两 丁皮 益智各五钱

【用法】同杏仁共为细末,滑石五斤,米粉,河沙拌匀,为丸。干用酿酒;或炒焦拌食。

【功用】消肠胃积滞。

25558 白粉灵丹

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】水银一两 明矾 皂矾 火消食盐各二两 雄精三钱 朱砂三钱

【用法】上药先将后六味研细,入阳城罐内,中间放水银,上以铁盖盖好,再用铁线扎紧,以盐泥固济封口,晒干,裂纹补好,照

升药法打三柱香为度，冷定，刮下盏内灵药，研细。每用二三厘，冷水调敷，三四次痊愈。

【主治】一切梅毒结毒，溃烂险恶。

25559 白粉霜丸

《普济方》卷一九一，即《宣明论》卷八“粉霜丸”。见该条。

25560 白瓷药散

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】白瓷药（烧令通赤）

【用法】上乘热捣研为细末。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】产后血运至急。

25561 白梅饮子

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】白梅一枚（去核）

【用法】盐水研烂，合蜡茶醋汤沃服之。

【主治】血痢不止。

25562 白菊花酒

【方源】《证类本草》卷六引《本草图经》。

【组成】菊花（秋八月合花收，晒干，切）三大斤

【用法】以生绢袋盛，贮三大斗酒中，经七日。日服三次。常令酒气相续为佳。

【主治】丈夫、妇人久患头风眩闷，头发干落，胸中痰结，每发即头旋眼昏，不觉欲倒者。

25563 白菊花散

《卫生宝鉴》卷十九，为《活人书》卷二十一“通圣散”之异名。见该条。

25564 白菊花散

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】白菊花 绿豆皮 谷精草（去根）各一两 夜明砂一两

【用法】上为末。三岁一钱，加干柿一个，生粟米泔一盞，共一处煎，候米泔尽，只将干柿去核食之，不拘时候，一日可三枚；五七日可救。

【主治】小儿疮痘入眼及生翳障。

25565 白蛇浸酒

【方源】《永乐大典》卷一三八七九引《可

用方》。

【组成】白花蛇一条（半斤重者） 虎胥骨一条 当归 川芎各一两半 附子 桂心 熟地黄 山茱萸 萆薢 石斛 细辛 黄耆 天麻各二两 独活三两 枳壳一两 肉苁蓉二两半

【用法】上锉细，以生绢袋盛，好酒三斗于瓷甕子内密封，浸七日后开。随性暖饮，常令醺醺，勿令大醉。其酒旋添，酒味薄即换药。

【主治】风痹，骨髓及腰脚疼痛，行步稍难；兼风毒走注，皮肤痒痛不知。

25566 白银錠子

【方源】《回春》卷四。

【组成】白芷三两 白矾一两

【用法】上为细末，铁勺熔成饼，再入炭火，煅令烟尽取出，去火毒，为末，用面糊和为錠子成条。插入漏内，直透里痛处为止。每日上三次，至七日为止，至九日疮结痂而愈。

【主治】痔漏。

25567 白鹿洞方

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【组成】大风肉四两 明天麻四两（酒浸） 川防风（去芦）四两 汉防己四两 香白芷四两（酒浸） 独活二两 苏薄荷二两 全蝎三两（洗去盐足） 僵蚕（炙，去足）六两 蝉蜕（去足）六两 金头蜈蚣（炙，去头足）二两 蕲蛇八两（酒浸，焙） 川山甲二两（烧） 狗脊四两（去毛，酒浸） 白菊花四两 大何首乌四两（忌铁） 川当归六两（酒浸） 好苦参（净）四两 大川芎一两 赤芍六两 山梔仁二两（炒） 连翘（净）二两 白苏二两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧子大。每服七八十丸，空心好酒送下，临卧再一服。

【主治】大麻风，眉毛脱落，手足拳挛，皮肉溃烂，唇翻眼眦，口歪身麻，肉不痛痒，面生红紫斑。

【宜忌】忌气怒、房事、油腻、煎炒、鸡、

鱼虾、蟹、芋头、山药、糟鱼、肉、鹅、生冷；春酸食、冬冷物、然冬月亦不可烘火。宜绵暖净室坐定，节饮食、断妄想，服药时宜仰卧，令药力遍行，服此药只宜食鸭、鲫鱼、牛肉，俱常淡食。

25568 白清胃散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】生石膏四两 生硼砂一两 玄明粉一两 冰片二钱

【用法】上为细末，过罗。蘸药少许，擦患处。

【功用】清热去火，清肿止痛。

【主治】胃火上升，牙齿疼痛，口舌糜烂，牙缝流血。

25569 白蔹茹散

【方源】《肘后方》卷五。

【组成】白蔹茹

【用法】上为散。敷之。看肉尽便停。

【主治】痈疽生臭恶肉者。

25570 白雄鸡羹

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】白雄鸡一只（治如食法）

【用法】水煮令烂熟，漉出，劈肉，于汁中入葱、姜、五味作羹。空心食之。

【主治】风邪癰痛，不欲睡卧，自能骄居，妄行不休，言语无度。

25571 白提毒散

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】轻粉 乳香 梅片 台麝各一钱 煅石膏五分 白降丹三分

【用法】上为极细末。先净拭患处，上疮口即可。

【功用】拔毒祛腐，生肌。

【主治】诸般恶疮，痈疽发背，溃烂流水。

25572 白鹅膏粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】白鹅脂二两 粳米三合

【用法】上药和煮粥。调和以五味、葱、豉，空腹食之。

【主治】五脏气壅，耳聋。

25573 白填鸭散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】纯白公鸭一只

【用法】自霜降日起每日用麸面和蜗牛、地龙、柿霜、瓜蒌霜、古钱（醋煨，为末）各等分（计麸面七成药三成），捏成小丸，卯、酉时各填十二个，关闭笼内，不使多走。所遗之粪，另以一器收好。至小雪日交节之时宰，取喉颈骨连喉管及肺（宰时以刀刺腹，勿割其喉，忌见水）置瓦上焙干为炭存性；另以一月内所遗鸭粪用清水漂去其垢，澄去其土，至冷为度，带水研至极细，澄定，沥去水，置瓦上焙干为炭存性，与前炭置一处，共研细末，加蜗牛（焙黄）四十九个，用旧寿州烟斗口门七个（用凸起处一圈，余勿用），洗净烟渍，火上微烘二物，同研极细，再与两炭合研拌匀，瓷瓶封固，置低潮处以去火气。临用时加入冰片、硼砂、人指甲（煨黄）、人中白、鸭嘴胆矾五种细末各少许（计炭七成药三成），频频吹之。虽已闭之喉，犹能开通一线，即以蜜水冲少许服亦良。

【主治】喉闭。

25574 白蓝脂方

【方源】《外台》卷三十二引《古今录验》。

【组成】白蓝（即白薇）一分 白矾一分（烧） 石脂一分 杏仁半分（去尖皮）

【用法】上药治下疳。鸡子和，夜涂面，明旦以井花水洗之。

【主治】面黑似土，肝皤。

25575 白痰葵丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】白痰葵一两（微炒，去刺） 茵芋一两 羌活一两 木香一两 羚羊角屑一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 白花蛇肉二两（酒浸，炙微黄） 白附子一两（炮裂） 当归一两（锉，微炒） 干蝎一两（微炒） 葱苡仁三分 槟榔半两 牛膝一两（去苗） 芎藭一两 牛黄一分（细研） 麝香一分（细研） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，别研）

如膏 防风三分(去芦头) 酸枣仁一两(微炒)

【用法】上为末,入杏仁膏,相和令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以温酒送下,不拘时候。

【主治】刺风。遍身如针刺,肩背四肢拘急,筋骨疼痛。

【禁忌】忌生冷、油腻、毒滑、鱼肉。

25576 白蒺藜丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】白蒺藜三分(微炒,去刺) 独活三分 羚羊角屑三分 防风三分(去芦头) 枳壳三分(麸炒微黄,去瓢) 薯蓣三分 地骨皮三分 莽草一两(微炒) 葳蕤半两 苦参一两(锉) 枫香一两 蝉壳半两(微炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以温酒送下,不拘时候。

【主治】热毒风攻,头面瘙痒,如似虫行,时发风疹。

【禁忌】忌猪、鱼肉。

25577 白蒺藜丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】白蒺藜一两(微炒,去刺) 黄耆三分(锉) 独活三分 白芷半两 防风半两(去芦头) 薯蓣三分 枳实一两(麸炒微黄,去瓢) 人参三两(去芦头) 黄连一两(去须) 葳蕤半两 地骨皮半两 桂心半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以温酒送下,不拘时候。

【主治】风毒上冲,头面瘙痒如虫行,身上时有风疹,心神烦闷。

25578 白蒺藜丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】白蒺藜二两半(微炒,去刺) 熟干地黄二两半 鹿茸二两半(去毛,涂酥,炙微黄) 白薇二两半 磁石三两(烧,醋淬七遍,细研,水飞过) 铁精一两(细研) 桂

心一两 续断一两 巴戟三两 赤芍药二两 玄参二两 木通二两 海藻二两(洗去咸味) 牛膝二两(去苗) 桑寄生二两 泽泻二两 射干一两半 肉苁蓉二两(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心及晚食前以温酒送下。

【主治】阴癰肿大。

25579 白蒺藜丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】蒺藜子(炒,去角) 旋覆花(择) 皂荚(去皮子,烧为灰) 恶实(炒) 各一两 龙脑(研) 二钱 麝香(研) 一钱 菊花(择) 二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一丸,食后嚼细,温酒送下。

【主治】风头旋,目运痰逆。

25580 白蒺藜丸

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】白蒺藜一升 鸡蛋十个(去黄存白,拌蒺藜一宿)

【用法】炒,磨,水泛为丸服。

【主治】时行赤眼,流泪红肿,翳翳遮睛,怕火畏光。

【方论】白蒺藜辛苦性温,行瘀破滞,有泻肺疏肝之力,具宣风导滞之功,故凡一切目疾翳障等证,悉可用之;但蒺藜之性,纯乎疏逐见长,恐一味单行,诛伐无过,故以鸡子白之润养阴血,以复肝家生生之体。刚柔相济,剿抚互施,宜乎如上诸证,皆得见功耳。

25581 白蒺藜汤

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】白蒺藜 防风 道人头 蛇床子 卷柏 黄耆 漏芦各一两半 羊蹄根二两 蒴藿根三两

【用法】上锉细。以水一斗,煎至五升,去滓,看冷暖,于避风处洗之。

【主治】妇人血风，皮肤瘙痒，不可禁止。

25582 白蒺藜汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】白蒺藜 青箱子 木贼草 白芍 草决明 山梔 当归各一钱 黄连 黄芩 川芎各五分 甘草三分

【主治】时行火邪，两目肿痛。

25583 白蒺藜散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】白蒺藜三分（微炒，去刺） 羌活三分 沙参三分（去芦头） 丹参三分 麻黄三分（去根节） 白术三分 羚羊角屑三分 细辛三分 草薢三分（锉） 五加皮三分 五味子三分 生干地黄三分 赤茯苓三分 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 菖蒲三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 郁李仁三分（汤浸，去皮尖，微炒） 附子三分（炮裂，去皮脐） 桂心三分 木通三分（锉） 槟榔三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏中风，项强头旋，中如虫行，腹膨胀满，语声不出，四肢顽痹，大肠不利。

【禁忌】忌生冷、毒滑、鱼肉。

25584 白蒺藜散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】白蒺藜一两（微炒，去刺） 白鲜皮一两 防风一两（去芦头） 子芩一两 玄参一两 赤芍药一两 梔子仁一两 桔梗一两（去芦头） 川大黄一两（锉碎，微炒） 麦门冬一两半（去心，焙） 前胡一两（去芦头） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，食后煎薄荷汤调下。

【主治】热毒疮瘙痒，心神壅躁。

25585 白蒺藜散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】白蒺藜二两（微炒，去刺） 玄参

一两 沙参一两（去芦头） 丹参一两 苦参一两（锉） 人参一两（去芦头） 秦艽二两（去苗） 梔子仁一两 甘菊花一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 黄芩一两 乌蛇四两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 独活二两 茯神一两 薯蕷一两 细辛一两 防风二两（去芦头） 麻黄一两（去根节）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】一切癣及疥，风痒病疮。

25586 白蒺藜散

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】白蒺藜半两（微炒，去刺） 香豉半两（微炒） 鼠妇 廋虫（微炙） 川大黄（锉，微炒） 桂心 细辛各一分

【用法】上为细散。一二岁儿，每服半钱，以温酒调下，早晨、晚后各一服。

【主治】小儿阴癫不消。

25587 白蒺藜散

【方源】《普济方》卷一一一引《圣惠》。

【组成】白蒺藜（炒） 芎藭各二两 山梔子（去皮） 防风（去芦）各一两三钱 草薢（炒） 羌活（去芦头） 白芷（炒） 升麻各二两 白茯苓（去黑皮）二两半 远志（去心） 菖蒲（九节者，泔浸，切，焙干） 蔓荆实 细辛（去苗叶，微炒） 茵芋（去粗茎） 芍药 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙干） 龙骨（刮去土） 人参 当归（切，焙） 桂（去粗皮）各一两一钱 白术（微炒）一两 附子（炮裂，去皮脐）三枚 甘草（炙，锉） 桔梗（切，焙）各一两半

【用法】上为细散。每服二钱匕至三钱匕，用温酒调下，空心、午时前各一服。如口干舌涩，喉里烟生，鼻中卒痛，是佳应也；甚，即煎少许甘草汤解之。

【主治】大风恶疾，或二年三年眉须堕落者，手足疼闷，骨节烦肿，面色黑，皮肉渐变。

25588 白蒺藜散

【方源】《博济》卷二。

【组成】地骨皮(去土) 白蒺藜(去刺) 旋覆花 山茵陈 白菊花各半两 鼠粘子 石膏各一两

【用法】上药生为末。每服一钱,食后清茶调下,一日三次。

【主治】上焦虚热,头目昏疼,或眼赤肿,心胸烦闷。

25589 白蒺藜散

【方源】《普济方》卷三十二引《博济》。

【组成】白蒺藜(炒) 黑附子(炮) 羌活 川芎 黄耆各等分

【用法】上为细末。每服二钱,空心温酒送下。三服见效。

【主治】肾脏风下注,脚膝疼痛,或麻痺生疮。

【禁忌】忌发风食。

25590 白蒺藜散

【方源】《三因》。

【组成】白蒺藜(炒,去角) 防风 甘草(生) 僵蚕(去丝嘴)各一两(直者) 南星一两半(黑豆二合,青盐半两,水煮透,取出焙,不用盐豆) 甘菊花三两(生)

【用法】上为末。每服二钱,食后煎甘草汤送下。

【主治】肾脏风毒上攻,眼目赤肿,热泪昏涩,筋肉攀睛。

【禁忌】忌炙煨。

25591 白蒺藜散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】白蒺藜

【用法】上为细末。每服三钱,空心、食前温酒调下。

【主治】腰痛。

25592 白蒺藜散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】白蒺藜 菊花 蔓荆子 草决明 甘草(炙) 连翘 青箱子各等分

【用法】水煎,食后温服。

【主治】①《银海精微》:肝风目暗疼痛。②《张氏医通》:肝肾虚热生风,目赤涩多泪。

25593 白蒺藜散

【方源】《慈幼新书》卷十一。

【组成】松香(透明者,化开倾地上,候冷用) 黄丹各一两 白蒺藜(炒) 白鲜皮(炒)各五钱

【用法】上为末。先将冷粥洗过患处,敷上,以油片扎之。如已作脓血,鲜肉汤洗之。

【主治】刀伤、人咬、狗咬及跌打损伤。

25594 白蒺藜散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】白蒺藜(炒) 蔓荆子 茺蔚子 苍术(米泔浸) 菊花各二两 草决明 升麻 石决明 甘草

【用法】上为末。食后酒调温服。

【主治】肝风目暗外障。

【备考】方中草决明、升麻、石决明、甘草用量原缺。

25595 白蒺藜散

【方源】《方症会要》卷三。

【组成】白蒺藜 桃条 柳条

【用法】上为末。每服一钱,酒调下。治痰痛,用玄明粉白汤送下一钱二分。

【主治】胃脘火痛、痰痛。

25596 白槟榔散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】炒槟榔 白及 黄柏(去粗皮) 木香各半两

【用法】上为末。加轻粉二钱和匀。如疮干,即以腊月猪脂调药敷之,湿则干掺。

【功用】收疮口,长肉。

【主治】痢疮。

25597 白蒺藜贴

【方源】《外台》卷二十四引《删繁方》。

【组成】白蒺藜 当归 芍药 大黄 莽草 芎藭各等分

【用法】上药治下筛,下鸡子黄和如泥。涂布上,随大小贴之,燥则易。

【主治】痈肿。

25598 白雌鸡汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】白雌鸡一只(去肠脏,治如食法) 泽漆(切碎)二两 半夏(汤洗七遍去滑)三两 白术一两 甘草(炙令赤色)一两半

【用法】上五味,除鸡外,粗捣筛,先用东流水五升煮鸡令烂熟,去鸡,纳药末五钱匕,煮赤小豆一合,大枣三个(擘),生姜三片,候豆熟,去滓温服,日三夜一。

【功用】利小便。

【主治】胸中喘咳逆,水气身肿。

25599 白鲜皮丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】白鲜皮 苦楝根 鹤虱(炒) 青橘皮(汤浸,去白,焙)各半两 定粉 石灰各一分

【用法】上为细末,面糊为丸,如绿豆大。每服十丸,煎使君子汤送下,不拘时候。

【主治】小儿诸虫大啼,时作心腹痛。

25600 白鲜皮汤

【方源】《千金》卷五。

【组成】白鲜皮 大黄 甘草各一两 芍药 茯苓 细辛 桂心各十八铢

【用法】上咬咀。以水二升,煮取九合,分三服。

【主治】少小客魅挟实。

【方论选录】《千金方衍义》:方中白鲜皮专解风毒,故风痼亦多用之;大黄荡涤肠胃,有推陈致新之功;芍药除坚积腹痛;茯苓治胸胁逆气;细辛治百节拘挛;桂心利关节结气;甘草和脏腑寒热。合诸味主治,则风痼乳癖,无不兼该,何悼魅气之不释乎?

25601 白鲜皮汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】白鲜皮 人参各一分 芍药 芎藭各三分 知母一两 款冬花二两 百合一两 前胡(去芦头)一两 茯神(去木)一两半 防风(去叉)三两 黄芩(去黑心)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以水一盞半,煎至八分,去滓,入竹沥半合,重煎一两沸,放温服,临卧再服。

【主治】肝虚中风,目眩,视物不明,筋肉抽掣。

25602 白鲜皮汤

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】白鲜皮 女萎 防风(去叉) 细辛(去苗叶) 升麻 苍耳(炒) 桂(去粗皮) 附子(炮裂,去皮脐) 五味子 菖蒲(九节者,去须节,米泔浸,切,焙) 蒺藜子(炒,去角)各一两半 黄耆(炙,锉)三两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,食前温服,一日二次。

【主治】风腰脚不随,四肢痛痹,口噤不语,手臂脚膝痿弱颤掉。

25603 白鲜皮汤

《圣济总录》卷九。为《圣惠》卷十九“白鲜皮散”之异名。见该条。

25604 白鲜皮汤

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】白鲜皮一分半 麻黄(去根节)半两 白茯苓(去黑皮)三分 防风(去叉) 独活(去芦头) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,研) 当归(锉,焙) 芍药各一分半 桂(去粗皮)一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓,空腹温服,一日三次。服訖,取微汗为度。

【主治】风邪入脏,狂言妄语,精神错乱,腰疼骨痛。

25605 白鲜皮汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】白鲜皮 菊花 石膏(研) 荆芥穗各一两 桂(去粗皮)一分 甘草(炙)半两 麻黄(去节)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,

煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒头痛。

25606 白鲜皮汤

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】白鲜皮 款冬花 柴胡（去苗）
车前子 枳壳（去瓢，麸炒） 黄芩（去黑
心）各一两 甘草（炙）半两 百合二两 菊
花 蔓荆实（炒）各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞
半，煎至八分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】目肤翳遮睛，及瞳人上有物如蝇翅
状，令人视物不明。

25607 白鲜皮汤

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】白鲜皮 麦门冬（去心，焙） 白
茯苓（去黑皮） 白芷各一两半 桑根白皮
（切） 石膏（碎）各二两 细辛（去苗叶）
杏仁（去皮尖双仁，炒，研）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水三盞，
煮大豆三合，取汁一盞，去豆下药，煎取七
分，去滓，早、晚食后、临卧温服。

【主治】肺受风，面色枯白，颊时赤，皮肤
干燥，鼻塞干痛，此为虚风。

25608 白鲜皮汤

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】白鲜皮 玄参 葛根（锉） 白前
大黄（锉碎，微炒）各二两 知母（焙） 鳖
甲（醋浸，炙，去裙襕） 秦艽（去苗土）各
一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盞，
入童便少许，同煎至七分，去滓温服，如人
行四五里再服。

【主治】肺风虚热气胀，鼻中生疮，喘息促
急，时复寒热。

25609 白鲜皮汤

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】白鲜皮 桑根白皮（锉） 玄参
漏芦（去芦头） 升麻各一两 犀角屑半两
败酱三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞
半，煎至一盞，入芒消半钱匕，滤去滓，空
心温服，晚再服。

【主治】痈疽日久久远，脓水不尽，心中烦
闷。

【加减】稍觉疮痛止，即去芒消。

25610 白鲜皮汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】白鲜皮 人参 白芷 防风（去
叉） 黄芩（去黑心） 知母（焙） 沙参
犀角（镑）各半两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，加薄荷三
片，煎取五分，去滓，分温二服。

【主治】小儿潮热。

25611 白鲜皮汤

《圣济总录》卷一七一。为《圣惠》卷八十
五“白鲜皮散”之异名。见该条。

25612 白鲜皮汤

《普济方》卷二十八。为《医方类聚》卷十
引《简要济众方》“白鲜皮散”之异名。见该
条。

25613 白鲜皮汤

《普济方》卷三四九。为《外台》卷三十四
引《小品方》“一物白鲜汤”之异名。见该条。

25614 白鲜皮汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】白鲜皮 海风藤各三两 金银花
白茯苓 肥皂子肉 苦参各二两 五加皮
汉防己 鸭脚花根 蝉退各一两 猪牙皂角
皂角刺 苡仁各一两五钱 土茯苓四两

【用法】上分十剂。水三钟，煎一钟服。每
日空心食雄猪肉三四两。

【主治】杨梅疯癰及鹅掌风。

【禁忌】忌发物。

25615 白鲜皮汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】白鲜皮 茵陈蒿各等分

【用法】水二钟，煎服，一日二次。

【主治】痈黄如金，好眠吐涎。

25616 白鲜皮汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】白鲜皮 15 克 粉丹皮 9 克 怀山药 9 克 薏仁米 15 克 木通 9 克 大豆黄卷 9 克 龙胆草 9 克

【用法】水煎内服。

【主治】女阴溃疡。

【加减】局部灼痛，分泌物多者，重用银花、连翘；口腔溃烂不愈，重用大黄、豆卷、扁豆、金果榄；苔白而滑，加厚朴、陈皮、白术。

25617 白鲜皮酊

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】白鲜皮 15 克 鲜生地 31 克 高粱酒 150 毫升

【用法】浸泡五日后，外涂。

【主治】脂溢性皮炎。

25618 白鲜皮酒

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】白鲜皮三两 川独活三两

【用法】醇酒五六升，蒸膏。空心随量饮。

【主治】产后中风，脉沉弦濡者。

【方论】产后中风挟湿，而留连不解，不能流行血气，故肌肤顽木，痛痒不知。白鲜皮去风湿以理皮肤，川独活开经气以除顽痹。醇酒蒸膏，务使风散湿除，则营血灌注，而肌肤润泽，焉有顽痹之患乎！

25619 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】白鲜皮一两 百合一两 石膏一两半 羚羊角屑一分 木通一两（锉） 防风一两（去芦头） 川升麻一两 龙齿一两半

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加葱白七寸，豉五十粒，煎至六分，去滓服，不拘时候。

【主治】伤寒阳痉，壮热不渴，筋脉不能舒展，牙关疼急，不欲进食。

25620 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】白鲜皮 黄芩 柴胡 大青 麦

门冬 栀子仁 甘草（炙微赤，锉）各一两 羚羊角屑半两 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气六日，热毒不退，心胸烦躁，大小肠秘涩，不得眠卧。

25621 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】白鲜皮 犀角屑 川升麻 大青 甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至六分，去滓，不拘时候服。

【主治】时气大热，闷乱谵语。

25622 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】白鲜皮一两半 大青 羚羊角屑 玄参 栀子仁 子芩 川大黄（炙微赤，锉） 地骨皮各三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气大热，心狂欲走。

25623 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】白鲜皮一两 川大黄半两（锉碎，微炒） 大青半两 麦门冬一两（去心，焙） 黄芩半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加竹叶三七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，热毒在心脾，狂乱烦躁。

25624 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】白鲜皮一两 栀子仁三分 麦门冬三分（去心，焙） 川大黄三分（锉碎，微炒） 郁金三分 黄芩三分 甘草一分（炙微赤，锉） 铅霜一分（细研）

【用法】上为细散，入铅霜同研令匀，每服二钱，以熟水调下，不拘时候。

【主治】热病，心神烦躁不止。

25625 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】白鲜皮半两 黄芩半两 秦艽半两（去苗） 犀角屑半两 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬半两（去心） 大青半两 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，狂言不止。

25626 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】白鲜皮半两 川升麻半两 黄芩半两 玄参半两 麦门冬一两（去心，焙） 犀角屑半两 梔子仁半两 赤芍药半两 川大黄半两（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，毒气不散，遍身生热毒疮。

25627 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷十九。

【异名】白鲜皮汤（《圣济总录》卷九）。

【组成】白鲜皮一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 麻黄一两（去根节） 白芷一两 白术一两 防风二两（去芦头） 葛根一两（锉） 独活一两 汉防己一两 人参一两（去芦头） 茯神一两 甘草一两（炙微赤，锉） 当归一两（锉，微炒） 石膏三两 桂心一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半两，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痹，四肢缓弱，心神烦闷，不能言。

25628 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】白鲜皮半两 川升麻半两 川朴消一两 茵陈一两 黄芩半两 梔子仁半两

大青半两 川大黄二两（锉碎，微炒） 葛根半两（锉）

【用法】上为细散。每服三钱，新汲水调下。须臾当利一两行，如人行十里未利，即再服。

【主治】急黄，头目四肢烦热疼痛，小便赤，大便难，心躁不得睡。

25629 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】白鲜皮半两 子芩半两 川升麻半两 玄参半两 白蒺藜半两（微炒，去刺） 桔梗半两（去芦头） 防风半两（去芦头） 前胡半两（去芦头） 百合半两 甘草半两（炙微赤，锉） 梔子仁半两 马牙消一两 麦门冬一两半（去心，焙） 茯神半两

【用法】上为细散。每服二钱，食后以薄荷汤调下。

【主治】①《圣惠》：遍身热毒疮，及皮肤痒痒，烦躁。②《圣济总录》：热苑四肢，肿实不散，令人气壅。

25630 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】白鲜皮 防风（去芦头） 犀角屑 黄芩 知母 沙参（去芦头） 人参（去芦头） 各半两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服一钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿心肺风热壅滞，胸膈不利。

25631 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】白鲜皮汤（《圣济总录》卷一七一）。

【组成】白鲜皮半两 细辛半两 蚱蜢二枚（微炙） 钩藤半两 川大黄三分（锉碎，微炒） 蛇蜕皮五寸（炙令黄色） 甘草三分（炙微赤，锉） 牛黄半分（细研）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入牛黄末少许，温服。

【主治】小儿风痫，胸中痰涎。

25632 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】白鲜皮三分 黄芩三分 川升麻三分 地骨皮三分 钩藤三分 犀角屑三分 麦门冬一两(去心,焙) 胡黄连三分 龙齿一两 甘草一两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一盞,煎至五分,去滓,入牛黄末一字,温服。

【主治】小儿百日以来,至三四岁,发热痢瘵,身体如火。

25633 白鲜皮散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】白鲜皮一两 犀角屑三分 钩藤一两 子芩三分 龙齿一两 蝉蜕半两(去翅足,微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盞,加淡竹叶七片,煎至五分,去滓服之。

【主治】小儿惊痫,邪气发即吐涎,迷闷难醒。

25634 白鲜皮散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】白鲜皮汤(《普济方》卷二十八)。

【组成】白鲜皮一两 防风一两(去芦头) 人参一两(去芦头) 知母一两 沙参一两 子芩三分(去黑心)

【用法】上为散。每服二钱,水一中盞,煎至六分,食后、临卧温服。

【主治】肺脏风热毒气,攻皮肤瘙痒,或时胸膈不利,时发烦躁。

25635 白鲜皮散

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】白鲜皮二两 黄连(去须) 土瓜根 芍药 大青 梔子仁 茵陈蒿 栝楼根 柴胡(去苗)各一两半 芒消三两半(研入) 贝珠三十枚(烧赤,研入) 黄芩(去黑心)一两 大黄三两

【用法】上为散。每服三钱匕,煎茅根汁调下,空腹顿服。取利;至晚不利再服,服了

以少葱豉粥投之。

【主治】诸黄。皮肉如金色,小便赤黑,口干烦渴。

25636 白蜜煎丸

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】白蜜二升 腊月猪肪一升(去膜) 胡麻油半斤(微熟) 熟干地黄一升

【用法】上药合和,入银器中,重汤煎令可丸,丸如梧桐子大。每服三十九,以温酒送下。一日三次。稍加,以知为度。

【功用】久服令人肥充,好颜色。

【主治】虚羸瘦弱,乏气力。

25637 白僵蚕丸

【方源】《普济方》卷一〇四引《肘后方》。

【组成】白僵蚕(炒) 麝香(研) 乌蛇(酒浸,去皮骨,炙) 牛黄(研) 干蝎(酒炒) 木香 龙骨(去土,研) 蝉蜕(炒,去土) 杜仲(去粗皮,炙) 天麻 原蚕蛾(炒) 雄黄(研)各半两

【用法】上将八味捣罗为末,与别研四味和匀,炼蜜为丸,如绿豆大。每服二丸,温酒送下;甚者三丸,并两服,豆淋酒送下。

【主治】风痰。风遍身瘾疹疼痛成疮。破伤中风。

【备考】汗出如珠颗,眼黄,饮得水者可治。若汗出如油,直视吐涎水,心烦热闷,头发乱,身不转者难治。本方改为散剂,名“白僵蚕散”(见《普济方》),治大肠风秘。

25638 白僵蚕丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】白僵蚕半两(微炒) 蛇蜕皮灰半两 皂荚刺灰半两 虾蟆灰半两 防风半两(去芦头) 薄荷根半两 茵陈根半两 兰香根半两 蜥蜴半两(炙微黄) 腰带皮灰半两 皮巾子灰半两

【用法】上为末,用乌蛇卵为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心及晚食前以温酒送下。

【主治】大风癩疾。

25639 白僵蚕丸

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】白僵蚕一两(微炒) 当归一两(锉,微炒) 桂心一两 补骨脂一两(微炒) 神曲一两(炒令微黄) 芎藭半两 薯蕷半两 半夏一两(汤洗七遍去滑) 槟榔一两 白附子半两(炮裂) 赤芍药一两 芫花半两(醋拌,炒令干)

【用法】上为末。炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以温酒送下,一日三次。

【主治】骨折筋伤后,恶血攻筋骨,疼痛不止。

25640 白僵蚕丸

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白僵蚕一两(微炒) 白附子一两(炮裂) 地龙一两(微炒) 黄丹一两(微炒) 人中白半两(烧灰)

【用法】上为末,用葱津为丸,如梧桐子大。每服十丸,荆芥汤送下,不拘时候。

【主治】产后头痛。

25641 白僵蚕丸

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】白僵蚕一两(微炒) 干蝎一分(微炒) 白附子一两(炮裂) 天南星半两(炮裂) 乌蛇半两(酒浸,去皮骨,炙令微黄) 朱砂半两(细研,水飞过)

【用法】上为末,都研令匀,以粳米饭为丸,如麻子大。每服三丸,以薄荷温酒送下,不拘时候。

【主治】小儿中风痉,及天钓惊邪风痫。

25642 白僵蚕丸

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】白僵蚕(炒) 白附子(炮) 天南星(炮) 桑螵蛸(中劈破,炒) 藿香叶 干蝎(去土,酒炒) 天麻 乌蛇(酒浸,去皮骨,炙) 麝香(别研) 各一分 天雄(炮裂,去脐皮) 一枚

【用法】上十味,先将九味捣,入麝香再拌令匀,用糯米粥研如糊为丸,如大麻子大,别以膩粉为衣。每服七丸至十丸,以酒送下,日

二夜一。

【主治】卒中风。

25643 白僵蚕丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】白僵蚕(炒)半两 天南星(炮裂,汤洗)半两 附子(炮裂,去皮脐)一两 白附子(炮裂,汤洗)一两 干姜(炮裂,切)一分 膩粉半两 麝香一分(与膩粉同研为细末)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸至五丸,空心温酒送下。

【主治】肉苛。荣虚卫实,肌肉不仁。

25644 白僵蚕丸

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】白僵蚕(炒)三分 海荆子(炒)一两 白附子(炮)半两 干蝎(酒炒)二十一枚 蒺藜子(炒令角黄)二两 膩粉半两(一半入药同罗,留一半为衣)

【用法】上六味,先捣前五味,与膩粉二钱半同罗为末,冬用大枣(蒸)取肉研如膏为丸,夏炼白蜜为丸,春、秋研糯米饭膏为丸,并如梧桐子大,又于膩粉二钱半内滚令色匀,用密器收。每服五丸,空心、日午温酒送下。加至十丸。

【主治】风邪发狂,妄言躁闹。

25645 白僵蚕丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】白僵蚕(炒) 菊花 石膏(研)各四两

【用法】上为末,用葱白细研,绞取汁一大盏同拌和,入少面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,荆芥茶或温酒送下。

【主治】首风。每遇风时,即发头痛。

25646 白僵蚕丸

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】胆星二钱 僵蚕(炒) 地龙 全蝎(焙) 五灵脂各一钱

【用法】上为末,水煮生半夏糊为丸,如麻子大。每服五丸,生姜汤送下。

【功用】截风。

【主治】①《直指小儿》：慢脾，阳气未甚脱者。②《活幼口议》：慢脾风，痰涎潮盛不化。

25647 白僵蚕丹

【方源】《普济方》卷三七四引《医方妙选》。

【组成】白僵蚕一两(炒) 干全蝎二十一个 白附子半两 天麻半两 半夏半两(汤浸七次，以捣罗为细末) 朱砂半两(水飞) 金箔十片(研) 膩粉一钱(研)

【用法】上同拌匀，用枣肉为丸，如黍米大。每服七丸至十九，点麝香、荆芥汤送下。

【主治】惊风潮搐生涎，上喘急。

25648 白僵蚕散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】白僵蚕一两(微炒) 乌蛇肉半两(酒拌，炒令黄) 天麻半两 独活半两 天南星半两(炮裂) 川乌头半两(炮裂，去皮脐) 白附子半两(炮裂) 防风半两(去芦头) 犀角屑半两 蝉壳半两(微炒) 桑螵蛸半两(微炒) 朱砂半两(细研，水飞过) 麝香一分(细研)

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】妇人中风，如角弓反张，口噤不能言，皮肤顽麻，筋脉抽掣。

25649 白僵蚕散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】白僵蚕一两(微炒) 天麻一两 独活一两 麻黄一两半(去根节) 乌犀角屑二分 白附子半两(炮裂) 藿香半两 天南星半两(炮裂) 半夏半两(汤浸七遍，去滑，以生姜半两去皮，同捣令烂，焙干) 龙脑一钱(研入)

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以生姜、薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】妊娠中风口噤，心膈痰涎壅滞，言语不得，四肢强直。

25650 白僵蚕散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】白僵蚕(微炒) 天南星(炮裂) 干蝎(微炒) 桑螵蛸(微炒) 桂心 藿香 川乌头(炮裂，去皮脐) 乌蛇肉(酒拌，炒令黄) 各半两 防风一分(去芦头)

【用法】上为细散。每服半钱，以生姜酒调，拗开口灌之，不拘时候。

【主治】产后中风口噤。

25651 白僵蚕散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】白僵蚕一分(微炒) 蝉壳一分(微炒) 芦荟一分(细研) 蝎尾一分(微炒) 白附子一分(微炒，炮裂) 五灵脂一分 蟾头一枚(涂酥，炙令焦黄) 朱砂一分(细研) 牛黄半分(细研) 麝香半分(细研) 雄黄一分(细研) 壁宫子二枚(涂酥，炙令黄)

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服半钱，以薄荷汤调下，不拘时候。

【主治】小儿慢惊风，壮热，四肢拘急，痰涎壅滞，发歇不定。

25652 白僵蚕散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】白僵蚕二枚(微炒) 蜈蚣一枚(微炒) 蓖苰子十粒(炒令黄)

【用法】上为细散。用温酒调，注入口中。令睡，汗出即愈，如睡多不用惊起。如一二岁儿患急，即顿服之；稍慢，即分为三服。

【主治】小儿天钓，及急惊风搐搦。

25653 白僵蚕散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】白僵蚕(直者)不拘多少

【用法】上药生为末。每用生姜自然汁调，以鸡翎于疮口扫之，勿令干，斯须肿揭皮皱为效；仍服半钱匕，用生姜汁调下。

【主治】破伤风，身肿，牙关不开。

25654 白僵蚕散

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】白僵蚕(炒) 地龙(白色少泥者，

微炒) 腊茶(炙)各一两 甘草(炙)三分

【用法】上为散。每发时空心服两钱匕,午饭后服一钱匕,临卧服两钱匕,并用热酒调下。又先取蜡一两,铤子中熔成水,投桂末半两,搅匀摊于纸上,火炙令热,服第一药了,即贴向痛处,用熟帛裹之。

【主治】白虎风,痛不可忍。

25655 白僵蚕散

【方源】《圣济总录》卷一一。

【组成】白僵蚕八两(温水洗过,入盐末八两,逐旋入银石器内,趁润炒令黄,去盐不用,捣为细末) 麝香(细研)半两

【用法】上为末。每用少许揩齿,良久以荆芥汤稍热漱口,冷吐去。

【主治】风毒壅滞,齿龈虚肿出血,宣露疼痛。

25656 白僵蚕散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】白僵蚕(直好,白色者)一两(新瓦上炭火略炒微黄色) 天南星(白者)一两(炮裂,刮去粗皮,锉) (一方只用白僵蚕)

【用法】上为细末。每服一字,用生姜自然汁少许调药末,以熟水投之呷下,吐出涎痰即快,不拘时候。

【主治】缠喉风并急喉闭喉肿痛者。

25657 白僵蚕散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】白僵蚕(去丝嘴,炒) 粉草 细辛各半两 旋覆花(蒸熟,焙)半两 荆芥一分 木贼半两 黄桑叶一两(嫩者)

【用法】上锉散。每服三钱,水一盏半煎,食后温服。

【主治】①《得效》:肺虚受风,眼目冲风泪出。②《医学入门》:或暴伤风热,白睛遮覆黑珠,脸肿痛痒。

25658 白僵蚕散

《普济方》卷一〇五。即《普济方》卷一

〇四引《肘后方》“白僵蚕丸”改为散剂。见该条。

25659 白僵蚕散

【方源】《普济方》卷三七三。

【组成】白僵蚕半两(炒)

【用法】上为散。刮开疮头上,敷之。根烂即出。一方水调封之。

【主治】疗肿。

25660 白僵蚕散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】僵蚕 蝉退 防风 甘草 苍耳子 白芷 川芎 茯苓 荆芥 厚朴 陈皮 人参各等分

【用法】上为末。每服二钱,豆淋酒下。

【主治】冷风丹毒。

25661 白僵蚕膏

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】白僵蚕(炒)半两 白鱼十枚 白油脂 白附子(炮) 鹰屎各一分 腊月猪脂二两

【用法】上药除猪脂外,捣罗为末,细研,以猪脂和令匀,瓷盒中盛。旋取敷疮痕上。

【主治】面上癰痕。

【宜忌】避风。

25662 白鲫鱼膏

【方源】《全国中药成药处方集》(重庆方)。

【组成】北辛 姜虫 虫退 全虫 白芷 黄柏 薄荷 蓖麻子 地榆 生地 鲫鱼铅粉 麻油

【用法】先将各药用麻油熬煎取汁,去滓后加入铅粉制成膏药,用油纸分摊成张,包装成盒,每盒一百张,净药二两五钱。用开水或茶将患处洗净,膏药熨热贴上。

【功用】生肌敛口。

【宜忌】忌入口,孕妇忌贴脐下。

25663 白避瘟散

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【组成】绿豆粉 石膏(生)各八十两 滑石 白芷各八两

【用法】上为细末,每六十两细末,兑入麝

香六分,冰片六两 薄荷冰五两,甘油十二两,和匀,收贮勿令泄气。闻、服均可,内服二分,凉开水送下。

【功用】清暑散风,通窍解毒。

【主治】夏令暑热,头目眩晕,呕吐恶心,饮酒过度,晕车晕船,蝎螫虫咬。

【宜忌】孕妇忌服。

25664 白螺壳丸

【方源】方出《丹溪心法》卷四,名见《医学正传》卷四。

【组成】螺蛳壳(墙上年久者,烧) 滑石(炒) 苍术 山栀 香附 南星各二两 枳壳 青皮 木香 半夏 砂仁各半两

【用法】上为末,生姜汁浸蒸饼为丸,如绿豆大。每服三四十丸,生姜汤送下。春加川芎,夏加黄连,秋、冬加吴茱萸半两。有痰者,用明矾焙开,就丸如鸡头子大。每服一丸,热姜汤送下。

【主治】痰积胃脘作痛。

【备考】《医学正传》有莪术一两;《准绳·类方》有桃仁。

25665 白筋洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】白筋 15 克 水杨梅 15 克 三角泡 15 克

【用法】水煎,外洗。

【主治】慢性湿疹。

25666 白藕汁膏

【方源】《丹溪治法心要》卷三。

【组成】黄连末 生地汁 牛乳汁 自然藕汁各一斤

【用法】上将诸汁慢火熬膏,入连末为丸。每服二三十丸,温水送下,日服数次。

【主治】消渴。

25667 白腐粪散

【方源】《冯氏锦囊·痘疹》卷十四。

【组成】腐粪(取白色,烧灰) 马齿苋不拘多少

【用法】晒干烧灰。蜜水调涂臍上。

【主治】痘痂不落成癍痕者。

25668 白癜风酒

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】苦参五斤 露蜂房五两 刺猬皮一个

【用法】上咬咀。以水三斗,煮一斗,去滓用汁,细酒曲五斤,炊黍米三斗,作饭拌曲,同药汁,如酿酒法,酒成榨去糟。食前温服一二杯。

【主治】紫白癜风。

25669 白及枇杷丸

【方源】《准绳·类方》卷三引戴氏方。

【组成】白及一两 枇杷叶(去毛,蜜炙)藕节各五钱

【用法】上为细末,另以阿胶五钱锉如豆大,蛤粉(炒成珠)、生地黄自然汁调之,火上炖化,入前药为丸,如龙眼大。每服一丸,噙化。

【主治】咯血。

25670 白及莲须散

【方源】《准绳·类方》卷三引戴氏方。

【组成】白及一两 莲花须(金色者佳)侧柏叶 沙参各五钱

【用法】上为极细末。入藕节汁、地黄汁,磨京墨令黑,调药二钱,如稀糊吸服。

【主治】咯血。

25671 白及雄黄散

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】白及一两 雄黄末三钱

【用法】上各为末。掺之。自然生皮,且又不痛,即愈。

【主治】妊妇多食五辛热物,子患漏皮疮者。

25672 白云平安散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】净滑石粉五钱 杭白芷一钱 净绿豆粉 生月石各五两 薄荷冰 梅片各三钱

【用法】上为极细末,装瓷罐内,入土中埋三日,以去燥气,再加梅片四两,台麝香四

分,共研一处。每用少许纳入鼻孔中。

【功用】芳香解秽,避温祛暑。

【主治】鼻窍壅塞,头晕目痛。

25673 白云换肺丸

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】款冬花一两 半夏 明矾 寒水石各二两

【用法】上为细末,生姜汁糊为丸,如梧桐子大。每服三四十九,姜汤送下。

【主治】远年近日,喘嗽不止。

25674 白艾蒿酿酒

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】白艾蒿十束(每束如斗)

【用法】上粗锉。以水一石,煮取汁五斗,以曲十五斤,糯米一石,如常法酿酒至熟。每服暖一中盏,一日三次。

【主治】大风癰,身体面目有疮。

【备考】本方方名,《普济方》引作“蒿艾酒”。

25675 白玉化痰丸

《全国中药成药处方集》(沈阳方)。为《医方考》卷五引《本事》“白金丸”之异名。见该条。

25676 白玉夹纸膏

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】麻油四两 制好松香五钱 白蜡 黄蜡各二钱半 轻粉一两 冰片三分 麝香三分 鸡蛋白一个

【用法】将麻油熬成珠,加松香、白蜡、黄蜡,再熬去烟沫,用绢沥清;一加轻粉(研细),二加冰片,三加麝香,随搅随加,匀极,增鸡蛋白再搅匀,瓷瓶贮,蜡封口听用。如过两月后,药干无用矣。

【主治】夹棍疮、杖伤、刀斧伤、枪棍损伤。

25677 白玉霜药酒

《全国中药成药处方集》(吉林方)。为原书“白玉露”之异名。见该条。

25678 白玉蟾末药

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】草乌 白术 朱砂 细辛 雄黄

白芷 防风 苍术各五两 麻黄八两 川乌一大个

【用法】上为末。每服一钱,用葱白头七枚,陈酒一碗煎滚送下。重者用之,先以药汤洗,再进此药,临卧服。取汗避风。

【主治】麻风瘫痪软痿,冷麻困痹。

25679 白玉蟾浴汤

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】苍耳子 防风 荆芥 马鞭子草 紫苏 苦参 金银花 白芷 遍地香 泽兰

【用法】将各药烧汤洗涤,如烂者,一日洗一二次。

【主治】麻风,手足及遍身有肿块成疮,或冷麻者。

25680 白玉蟾遗方

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】防风 黄连 黄柏 苦参 牛膝 草乌 麻黄 紫风藤 荆芥穗 蔓荆子 升麻 川芎 大黄 当归 藁本 山梔

【用法】水煎服。大剂十服,内窍俱通,其外油光紫黑疙瘩皆退,随服白玉蟾丸。

【主治】痹麻诸风,瘫痪烂挛肿危,并大麻,鸡爪躄曳,蜈蚣冷麻。

25681 白玉蟾擦药

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】白芷 草乌 南星 半夏 诃子 杏仁 白及 白蔹 蛇床各等分

【用法】上为末。以姜片蘸药擦之,待皮活病退方止。

【主治】痲风,手足及遍身有肿块成疮,或冷麻者。

25682 白术丁香丸

《丹溪心法附余》卷二十二。为《幼幼新书》卷二十八引《家宝》“温白丸”之异名。见该条。

25683 白术丁香散

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】丁香 白术 舶上硫黄 肉豆蔻 各三钱 人参二钱 桂府滑石二两

【用法】上为末。大人每服二钱,小儿一钱,

食前温米饮调下。

【主治】大人、小儿吐利不止，烦渴，小便少。

25684 白术八味散

【方源】《外台》卷八引《删繁方》。

【组成】白术 厚朴(炙) 人参 吴茱萸 麦藷(炒) 茯苓 芎藭 橘皮各三两

【用法】上为散。每服方寸匕，食前暖酒送下，随性服。

【主治】胃虚苦饥寒痛。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、大酢。

25685 白术八宝丹

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】白术半斤(二两朝阳土炒，六两熬膏) 人参五钱 白茯苓(去皮木)一两半 远志(去骨)一两半 陈皮(去白)一两半 白芍药(酒炒)一两半 神曲(炒)一两 麦芽五钱

【用法】上为末，用白术膏为丸，如梧桐子大。每服一钱，或加至一钱五分，空心白沸汤送下。

【主治】一切虚损之症。

【加减】咳嗽，去人参。

25686 白术木香散

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】白术 木猪苓(去皮) 赤茯苓 甘草 泽泻各半两 木香 槟榔各三钱 陈皮二两(去白) 官桂二钱 滑石三两

【用法】上为末。每服五钱，水一盞，加生姜三片，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】喘嗽肿满，欲变成水病者，不能卧，不能食，小便闭。

25687 白术五味汤

《普济方》卷三八七。即《幼幼新书》卷十六引《医方妙选》“白术五味子汤”。见该条。

25688 白术止痢丸

《女科百问》卷下。为原书同卷“四味换肠丸”之异名。见该条。

25689 白术升麻汤

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】白术 黄耆各二钱 干葛五分 升麻 黄芩各一钱 甘草五分

【用法】水煎，食远服。

【主治】①《准绳·类方》：破伤风。②《杏苑》：破伤风大汗不止，筋脉搐搦。

25690 白术六一汤

《局方》卷三(宝庆新增方)。为《鸡峰》卷二十五“六一汤”之异名。见该条。

25691 白术甘草散

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】白术 甘草梢各一钱 人参 赤芍药 木通各五分 生地五分 瓜蒌子十二枚 黄连

【用法】上作一帖。水煎服。

【主治】口疮，舌强多痰。

【备考】方中黄连用量原缺。

25692 白术石斛汤

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】白术 石斛(去根，锉，酒炒)各半两 荆芥穗三钱 桔梗(锉，炒) 秦艽(去苗土)各一分 白芷 白芍药各三钱 黄耆(锉，炒) 当归(切，焙)

【用法】上为粗散。每服四钱匕，水一盞，加生姜五片，大枣三枚，煎至八分，去滓，食前温服，一日三次。

【功用】补虚益血，调荣卫，进饮食。

【主治】手足疼痛，肢体倦怠。

【备考】方中黄耆、当归用量原缺。

25693 白术四逆汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】白术三钱 附子三钱 干姜一钱 人参二钱 茯苓二钱 甘草五分 大枣三枚

【用法】水三钟，煎一钟，微温服。

【主治】厥心痛。手足厥逆，身冷汗出，便溺清利，甚则朝发夕死者。

25694 白术生犀散

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】白术 桔梗(微炒) 甘草(炙，锉) 马牙消(研)各半两 麝香(研)一

钱 生犀角(镑)半钱

【用法】上药捣罗四味为散,与二味研者和匀。每服半钱匕,蜜熟水调下;薄荷熟水亦得。

【主治】小儿一切风热。

25695 白术半夏丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】半夏半两(汤泡七次,洗去滑) 白术(炒) 人参(去芦) 甘草(炙) 干姜(泡洗)各二钱半

【用法】上为细末,生姜汁打面糊为丸,如绿豆大。每服十丸,乳食后稍空,煎生姜汤送下。

【功用】宽利胸膈,化痰进食。

【主治】小儿咳逆。

25696 白术半夏丸

【方源】《简明医彙》卷五。

【组成】白术五钱 半夏 砂仁 白芍 当归各三钱 桃仁 黄连 神曲(炒) 陈皮各二钱 吴茱萸一钱半 僵蚕 甘草各一钱

【用法】上为末,蒸饼糊为丸,如绿豆大。每服五十丸,生姜汤送下。

【主治】气血、痰热心痛。

25697 白术半夏汤

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】白术一两 丁香一两 赤茯苓(去皮)一两 半夏二两(汤洗七次,焙干) 肉桂(去粗皮)半两 陈橘皮(去白)一两半

【用法】上咬咀。每服五钱,水二盏,加生姜十片,同煎至一盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】胃虚停饮,痰逆恶心,中满疔刺,胁肋疼痛,头目昏运,肢节倦怠,全不思食。

25698 白术加减汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】陈皮一钱五分 白术(净)二钱 半夏(制)一钱 苍术(米泔水浸)一钱 茯苓一钱五分 杏仁(杵)一钱 炙草一钱 生姜三片

【主治】五脏受湿,咳嗽痰多,气喘身重。

25699 白术圣散子

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】御米壳二两(蜜炒) 当归 肉豆蔻 缩砂 石榴皮 诃子 干姜(炮) 陈皮 白术 甘草 芍药各等分

【用法】上为细末。每服二钱,水一大盏,入乳香少许,同煎和滓服。

【主治】一切泻痢久不愈,并妇人产后痢。

25700 白术芍药汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】白术一两 芍药一两 甘草五钱

【用法】上锉。每服一两,水二盏,煎至一盏,滤清温服。

【主治】太阴脾经受湿,水泄注下,体微重微满,困弱无力,不欲饮食,暴泄无数,水谷不化。

25701 白术芍药散

《医统》卷三十五。即《医学正传》卷二引刘草窗方“痛泄要方”。见该条。

25702 白术当归汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】白术 当归(切,焙) 芎藭 人参 阿胶(炙燥)各二两 艾叶(焙干)一两

【用法】上为粗末。每用五钱匕,以水一盏,酒半盏,加大枣三枚(拍碎),同煎至一盏,去滓,分二次温服,空心一服,午食前一服。

【主治】妊娠胎萎燥,胎漏,腹痛不可忍。

25703 白术安胃散

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】五味子 乌梅(取肉,炒干)各五钱 车前子 茯苓 白术各二两 米壳三两(去顶蒂穰,醋煮一宿,炒干)

【用法】上为末。每服五钱,水一盏半,煎至一盏,去滓,空心温服。

【主治】一切泻痢,无问脓血相杂,里急窘痛,日夜无度;男子小肠气痛;妇人脐下虚冷,并产后儿枕块痛;亦治产后虚弱,寒热不止者。

25704 白术防风汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】白术黄耆汤（《准绳·类方》卷五）。

【组成】白术一两 防风二两 黄耆一两

【用法】上咬咀。每服五七钱，水一盞半，煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】破伤风，服羌活防风汤后，脏腑和而有自汗者。

25705 白术防风汤

《叶氏女科》卷二。为《医学正传》卷二引刘草窗方“痛泄要方”之异名。见该条。

25706 白术苡仁汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】白术一钱 茅术一钱 苡仁八钱 茯苓三钱 当归一钱五分 赤芍一钱 薄荷一钱 连翘一钱五分 花粉三钱 甘草四分 鲜荷叶一角

【主治】柔痉。热邪为湿所留，身体重着，肢节拘挛，有汗而热不退。

25707 白术助胃丹

《医便》卷四。为《摄生众妙方》卷十“白术膏”之异名。见该条。

25708 白术沉香散

【方源】《百一》卷二。

【组成】沉香 人参（紫晕者） 白茯苓 半夏曲 诃子肉 木香 川姜各一两 白术 干山药各一两半 甘草六钱 丁香半两 附子二个（炮）

【用法】上为细末。每服二大钱，水一中盞，加生姜三片，枣子一个，木瓜一片，煎七分，食前服。

【功用】坠气，益脾胃。

25709 白术陈皮汤

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】白术（炒，去油）一分 陈皮（去白）七分 人参五分 附子（去皮，童便煮）五分 芍药（炒）五分 川归（酒制）六分 半夏（炮）五分

【用法】水一钟半，加生姜二片，煎七分，

食前服。滓再煎服。

【主治】久泻脾泄。

25710 白术附子汤

《金匱》卷上。为《伤寒论》“桂枝附子汤”去桂加白术汤”之异名。见该条。

25711 白术附子汤

《外台》卷十五引《近效方》。为《伤寒论》“甘草附子汤”之异名。见该条。

25712 白术附子汤

《鸡峰》卷五。为《金匱》卷上（附方）引《近效方》“术附汤”之异名。见该条。

25713 白术附子汤

【方源】《医学发明》卷五。

【组成】白术 附子（炮，去皮脐） 苍术 陈皮 厚朴（姜制） 半夏（汤洗七次） 茯苓 泽泻各二两 猪苓（去皮）半两 肉桂四钱

【用法】上锉，如麻豆大。每服半两，水三盞，加生姜三片，煎至半盞，去滓，食前温服。

【主治】寒中。阴盛生内寒，厥气上逆，寒气积于胸中，作中满腹胀，作涎，作清涕，或多溺，足下痛不能任身履地，骨乏无力，喜睡，两丸多冷，时作隐隐而痛，或妄见鬼状，梦亡人，腰、背、胛、眼、腰、脊皆痛，而不渴不泻，脉盛大以涩。

25714 白术附子汤

【方源】《永类铃方》卷十三引《济生》。

【组成】白术二两 附子（炮） 茯苓（去皮）各等分

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜七片，大枣一个，水煎，不拘时候温服。

【主治】肠胃虚湿，肠鸣泄泻，或多自汗。

【备考】方中附子、茯苓用量，《普济方》引作“各一两”。

25715 白术妙功丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】白术 蓬莪茂 泽泻 当归（去芦头） 厚朴（去粗皮，生姜制） 破故纸（炒）各半两 延胡索二钱 川苦楝 槟榔各

三钱 木香二钱 半夏一两(生姜汁制)

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,如豆大。每服七十丸,食前温水送下。

【主治】肾气久虚,上攻下注,脐腹久冷,腰背麻痛;及膀胱疝气,痃癖气闷,小肠作声,时时下坠。

25716 白术苦参汤

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】白术 白芍药 槟榔 诃子 柴胡 青皮各一钱 苦参一钱二分 鼠粘子 厚朴 陈皮 砂仁 乌药 紫草各一钱

【用法】上锉散。每服四五钱,水煎,食远服。

【主治】小儿患痘,不进乳食。

25717 白术和中汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】当归(酒洗)二钱五分 白芍(土炒)一钱 白术(去芦,土炒) 白茯苓(去皮)各二钱 陈皮一钱 黄芩(炒)一钱 黄连(炒)八分(有红者多加) 甘草五分 木香少许

【用法】上锉。水煎,食前服。

【主治】下痢白多,不拘新久者。

25718 白术和中汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生晒术一钱半 新会皮一钱半(炒) 焦六曲三钱 佛手花五分 浙茯苓四钱 春砂仁一钱(杵) 五谷虫三钱(漂净) 陈仓米三钱(荷叶包)

【功用】温和脾胃,条畅气机。

【主治】气虚中满,湿证夹食,腹中胀满,中空无物,按之不坚,亦不痛,或时胀时减。

【加减】若寒气盛,加炒干姜八分,淡吴萸五分,紫萸桂三分;若湿热盛,加川连六分,川朴一钱;兼大便闭结者,吞服枳实导滞丸三钱;若兼络瘀,加新绛一钱半,旋覆花三钱(包煎),青葱管五寸(冲)。

【方论选录】此证用药最难,纯补则胀满愈甚,分消则中气愈虚。故以苓、术培中化湿

为君;臣以陈皮、砂仁运中,神曲、谷虫导滞;佐以佛手花疏气宽胀;使以荷叶包陈仓米,升清气以和胃。补而不滞,疏而不削。此为温和脾胃,条畅气机之良方。

25719 白术和中汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】白术 陈皮 焦六曲 佛手花 茯苓 砂仁 木瓜 陈仓米 干姜 竹沥制半夏

【主治】妇人妊娠,暑秽从口鼻吸入,直至中焦,致霍乱吐泻,自汗肢冷,脉伏者。

【加减】治上证,须加当归、白芍。

25720 白术和胃丸

《内外伤辨》卷十。为《保命集》卷中“平胃丸”之异名。见该条。

25721 白术泽泻散

【方源】《医统》卷三十一引《医林方》。

【组成】白术 泽泻 陈皮(去白) 木香 槟榔 茯苓各等分

【用法】上吹咀。每服七钱,水二盏,加生姜三片,煎至八分,食前服。

【主治】痰病化为水气,传变水鼓,不能食。

【加减】痞,加枳实;肿,加牵牛。

25722 白术枳壳丸

【方源】《医方类聚》卷二二七引《医林方》。

【组成】白术 枳壳各等分

【用法】上为细末,烧饭为丸,如梧桐子大。每服三十丸至五十丸,温水送下。服药后,怀孕妇人其胎瘦小易生也,生下之后三两月,其子即长大。

【主治】妇人胎前,胎在胸腹痞闷。

25723 白术枳实散

《圣济总录》卷六十一。为《外台》卷十二引《深师方》“枳实散”之异名。见该条。

25724 白术胡椒丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】白术 胡椒 高良姜 半夏 干姜各一两 茯苓 陈皮各半两

【用法】上为细末,水浸蒸饼为丸,如梧桐

子大。每服五十丸，食前生姜、橘皮汤送下。

【功用】治痰助胃。

25725 白术茯苓丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】白术六两 赤茯苓(去皮) 干姜(炮) 肉桂(去粗皮) 半夏(汤洗七次) 人参(去芦头) 枳实(去瓢，麸炒) 肉豆蔻(面裹煨香) 各二两

【用法】上为细末，用神曲碾细，煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】脾胃不和，胸膈痞闷，心腹胀满，干哕噎酸，饮食不化，肠鸣泄泻，酒癖停饮，呕吐痰沫，头目昏运。

25726 白术茯苓丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】白茯苓 白术各半两(白者) 天南星 白附子各一两 白矾三分 半夏三两(并生用)

【用法】上为细末，白面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】三焦气滞，停痰不清，胸膈痞闷，腹胁胀满，咳嗽涎甚，咽嗝干痛，心忪悸动，头目眩运，寒热时作，肢节疼痛，呕吐清水，神昏多倦，不欲饮食。

25727 白术茯苓汤

【方源】《外台》卷八引《范汪方》。

【组成】白术五两 茯苓三两 橘皮 当归 附子(炮)各二两 生姜 半夏各四两(切) 桂四两 细辛四两(一作人参)

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，分三次服。服三剂良。

【主治】胸中结，痰饮癖结，脐下弦满，呕逆不得食；亦主风水。

【宜忌】忌羊肉、饴、桃、李、雀肉、猪肉、冷水、生葱、生菜、醋物。

25728 白术茯苓汤

《鸡峰》卷十八。为《伤寒论》“桂枝去桂加茯苓白术汤”之异名。见该条。

25729 白术茯苓汤

【方源】《鸡峰》卷十八。

【异名】白术汤(《医略六书》卷二十五)。

【组成】白术四两 茯苓 甘草各二两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞半，煎至八分，去滓，稍热服，不拘时候。

【功用】逐支饮，通利小便。

【主治】①《鸡峰》：饮积胸痞，痰停膈上，头痛目眩，噎醋吞酸，嗜烦忪悸，喘咳呕逆，体重胁痛，腹痛肠鸣，倚息短气，身形如肿。及时行若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，振振身摇。②《医略六书》：脾虚泄泻，脉缓者。

【方论选录】《医略六书》：泻由乎湿，脾土虚弱，不能制御于中，故偏渗大肠，泄泻不止焉。白术崇土燥湿，茯苓渗湿和脾，炙甘草缓中益胃，兼益中州之气也。水煎温服，使湿去土强，则脾能健运而敷化有权，泄泻无不自止矣。此健脾渗湿之剂，为脾亏泄泻之专方。

25730 白术茯苓汤

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】白术汤(《普济方》卷二十五)。

【组成】白术 白茯苓 半夏各一两 炒曲二钱 麦麩面五分(炒)

【用法】上咬咀。每服五钱，水二大盞，加生姜五片，煎至一盞，去滓，不拘时候服。

【功用】实脾胃。

【主治】胃气弱，风邪羁縻于脾胃之间，身重有痰，恶心欲吐。

25731 白术茯苓汤

【方源】《医统》卷三十五引《机要》。

【组成】白术 茯苓各五钱

【用法】上作一服。水煎，食前服。

【主治】①《医统》引《机要》：湿泻；或食积、湿热作泻。②《医方考》：脾胃虚弱，不能克制水谷，湿盛作泻者。

【方论选录】：《医方考》：脾胃者，土也。土虚则不能四布津液，水谷常留于胃而生湿

矣。经曰：湿盛则濡泻。故知水泻之疾，原于湿也。白术甘温而燥，甘则入脾，燥则胜湿；茯苓甘温而淡，温则益脾，淡则渗湿，土旺湿衰，泻斯止矣。

25732 白术茯苓散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】白术 白茯苓各一两

【用法】上为细末。每服一二钱，煎陈皮汤调下，不拘时候。

【主治】妊娠大小腿肿，及有黄水，小便或涩。

25733 白术茯苓散

【方源】《广嗣纪要》卷九。

【组成】白术 白茯苓各二两 防己 木瓜各三两

【用法】上为细末。每服一钱，食前沸汤调下，一日三次。肿消止药。

【主治】妊娠七八月后，两脚肿甚者。

25734 白术厚朴汤

【方源】《鸡峰》卷二。

【组成】厚朴三两 橘皮二两 人参二两 茯苓三两 生姜五两

【用法】水煎，分三次服。

【主治】不能食，腹内冷气。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、酢物。

25735 白术厚朴汤

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】白术 甘草（炙） 葛根各一两 厚朴半两

【用法】上为末。每服一二钱，水一大盏，加生姜五片，煎至六分，去滓，食前服。

【功用】利胸膈，除寒热，美饮食。

【主治】痰呕不散。

25736 白术厚朴汤

【方源】《三因》卷五。

【组成】白术 厚朴（姜炒） 半夏（汤洗） 桂心 藿香 青皮各三两 干姜（炮） 甘草（炙）各半两

【用法】上锉散。每服四钱，水一大盏，加生姜三片，大枣一枚，煎七分，去滓，食前

服。

【主治】脾虚风冷所伤，心腹胀满疼痛，四肢筋骨重弱，肌肉跳动痠痹，善怒，霍乱吐泻；或胸胁暴痛，下引小腹，善太息，食少失味。

25737 白术姜黄汤

【方源】《医方类聚》卷八十三引《澹寮》。

【组成】片子姜黄四两 白术二两（炒）羌活一两 甘草一两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一大盏半，煎至七分，食后服。

【主治】肘臂痛。

25738 白术神曲丸

【方源】《赤水玄珠》卷八引东垣方。

【组成】白术（炒）二两 白芍（酒炒）一两 神曲（炒）一两半 山楂二两 半夏（制）一两 黄芩（炒）五钱

【用法】上为末，用青荷叶烧饭为丸，如绿豆大。每服一百丸。

【主治】老人奉养太过，饮食伤脾，时常脾泄。

25739 白术神曲丸

【方源】《普济方》卷二一三。

【组成】白术 神曲末 甘草 干姜 枳实各等分

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空腹以温酒送下。

【主治】脾胃气微，不能下食，五内中冷及微下痢。

【宜忌】忌食海藻、菘菜、桃、李、雀肉等。

【加减】腹中痛者，加当归。

25740 白术除眩汤

【方源】《杂证大小合参》卷六。

【组成】甘草 川芎 附子 白术 官桂

【用法】加生姜，水煎，食前服。

【主治】感寒湿，头目眩晕。

25741 白术除湿汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】白术一两 生地黄（炒） 地骨皮 泽泻 知母各七钱 赤茯苓 人参 炙甘草

柴胡各五钱

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食远温服。

【主治】午后发热，背恶风，四肢沉重，小便或多或少、黄色；又治汗后发热。

【加减】如小便快利，减茯苓、泽泻一半；如有刺痛，一料药中加当归身（酒洗）七钱。

【方论选录】①《医方集解》：此足太阴、少阴、少阳药也。阳陷阴中，热在血分，故以生地滋其少阴，而以知母、地骨泻血中之伏火也。柴胡升阳以解其肌；苓、泽利湿兼清其热，参、术、甘草益气助脾，气足阳升，虚热自退，脾运而湿亦除矣。方名除湿，而治在退热，欲热从湿中而下降也。②《医林纂要》：午后发热，热在阳明经也；四肢沉困，太阴脾湿也，小便黄，湿兼热也；然而背恶风，则阳不足，汗后而仍发热，亦阳之不足；阳不足者，其湿热在阴，湿热在阴者，太阴脾主血分，其人血热而湿浸之。湿盛而阴之郁热转盛，阳不能拔，则反虚也。其过在湿，湿责之脾，热以湿深，故君白术；生地黄滋阴生血，且以胜热而能化湿为血；地骨皮甘淡补肺清金，而下生肾水；知母辛苦，泻肺逆即以生肾水，坚肾水亦转生肝血，此三味皆以泻血中之伏热也。泽泻泻肾之邪水，使由膀胱而出之；赤茯苓泻心下之水，使由小肠而出，此二味去湿而兼以清热。人参、甘草以补脾土，脾土厚则能胜湿，而血亦日滋，不生热矣。柴胡升阳气于至阴之下而达之膈中，布散经络以解沉阴郁热，东垣最长于用柴胡，此方妙亦在柴胡也。此以治湿热之在血分者。在血分则主于脾肾。凡治三焦者主行湿，湿行而热自消。此方名除湿，而治在去热，热平而湿自除。要尤在补脾胃而升阳，土厚阳升，则湿热皆息也。

25742 白术桂枝汤

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】白术三钱（炒） 桂枝一钱半 白芍一钱半 炙草八分 大枣三枚 生姜三片

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】风木干脾，身热泄泻，脉弦虚者。

【方论选录】风干胃腑，木旺乘脾，不能敷化而营卫乖和，故身热不解，泄泻不止焉。白术壮脾胃以杜风，桂枝散风邪以平木，白芍敛阴安脾土，炙草缓中益胃气也。更以姜、枣调和营卫，使风邪外解，则肝木和平，而胃阳不复陷，脾阴日渐充，何虑身热不解，泄泻不除乎。此培土杜风之剂，为土虚木乘风泄之专方。

25743 白术健脾饮

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】白术（炒） 白芍（炒） 扁豆（炒） 苡仁 白茯苓 神曲（炒） 甘草 陈皮 车前子

【主治】痘疮险症，结痂之时，大便泄泻者。

【加减】泻黄色者，加炒黄芩；泻红色者，加炒黄连；泻白色或如水者，加木香、莲肉、肉桂、黄耆。

25744 白术消肿散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】白术三两（炒黑） 枳实一两半（炒黑）

【用法】上为散。每服三钱，紫苏汤下。

【主治】产后浮肿，脉弦滞涩者。

【方论选录】产后气食伤脾，脾气不化，清阳不能上奉，而风邪乘之，故遍身浮肿，心下痞闷焉。白术炭健脾气以燥湿除满；焦枳实泻滞气以散闷消痞；为散，紫苏汤下，理血气以散风邪也。使风邪外散则滞气内消，而脾胃调和，经络通畅，安有心下痞闷，遍身浮肿之患乎。

25745 白术调元散

《痘疹全集》卷十三。为《局方》卷三（绍兴续添方）“参苓白术散”之异名。见该条。

25746 白术调中丸

《宣明论》卷十二。即原书同卷“白术调中汤”改为丸剂。见该条。

25747 白术调中丸

【方源】《普济方》卷二〇七引《瑞竹堂方》。

【组成】神曲四两(炒) 白术半两 人参(去芦) 白茯苓(去皮) 猪苓(去黑皮) 泽泻各三钱 木香二钱 官桂(去粗皮) 一钱半 甘草(去皮,炙)一两 干姜(炮)一两

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心淡姜汤送下。

【主治】脾胃不和,心下坚痞,两胁胀满,脐腹疼痛,噎宿腐气,霍乱吐泻,米谷不消,久痢赤白,脓血相杂,多日羸瘦,不思饮食。

25748 白术调中汤

【方源】《宣明论》卷十二。

【组成】白术 茯苓(去皮) 红皮(去白) 泽泻各半两 干姜(炮) 官桂(去皮) 缩砂仁 藿香各一分 甘草一两

【用法】上为末,每服三钱,白汤化蜜少许调下,一日三次。炼蜜为丸,每两作十丸,名白术调中丸。小儿一服分三服。

【主治】中寒,痞闷急痛,寒湿相搏,吐泻腹痛。上下所出水液澄彻清冷,谷不化,小便清白不涩,身凉不渴,或虽有阳热证,其脉迟者。

【宜忌】或有口疮、目疾、孕妇等吐泻者,以畏干姜、官桂,不服。

25749 白术调中汤

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】白术 人参 黄连 厚朴各八分 白芍 山药 陈皮 泽泻 山楂 茯苓各一钱 甘草三分 砂仁六分

【用法】水二钟,煎八分,温服。

【主治】①《良朋汇集》:妇人胎前血泻。②《妇科胎前产后良方注评》:妊娠期大便稀薄,腹痛肠鸣,或兼烦渴,少食,胸脘痞闷。

25750 白术理中汤

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】茯苓 白术 甘草(炙) 干姜各

等分

【用法】每服三四钱,水煎服。

【主治】脏中积冷,立夏后泄泻时作,或小腹疼痛。

【加减】寒甚,加附子;腹痛,加芍药;肾气动,去术,加桂。

25751 白术菊花散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】白术(米泔浸一宿,去皮,切,焙)一斤 菊花(焙)半两 荆芥穗四两 威灵仙(去土) 薄荷(焙)各二两 木贼(去节,焙) 黄连(去须) 黄芩(去黑心) 黄耆(锉,焙) 细辛(去苗叶) 仙灵脾 羌活(去芦头) 独活(去芦头)各一两半

【用法】上为散。每服二钱匕,食后、夜卧米饮调下;熟水亦得。

【主治】风热眼。

25752 白术黄芩汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十六。

【异名】白术黄芩散(《医方类聚》卷一四一)。

【组成】白术一两 黄芩七钱 甘草三钱

【用法】上哎咀,作三服。水一盂半,煎至一盂,温服。

【功用】①《玉机微义》:去湿热,和中活血。②《痘科类编释义》:调和脾胃。

【主治】①《卫生宝鉴》:服芍药汤痢疾除后,更宜此方调和。②《痘科类编释义》:疹后痢疾。

25753 白术黄芩散

《医方类聚》卷一四一。为《卫生宝鉴》卷十六“白术黄芩汤”之异名。见该条。

25754 白术黄耆汤

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】白术 黄耆(锉)各一两 山茱萸 五味子 人参 茯神(去木)各三分 半夏(汤洗七遍,炒) 前胡(去芦头) 山芋 桔梗(炒)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大（拍碎），同煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】伤寒后胃气虚乏，不思饮食，日渐羸瘦。

25755 白术黄耆汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】白术一两 黄耆七钱 甘草三钱

【用法】上咬咀，均作三服。水一盞半，煎至一盞，去滓，温清服之。

【主治】服芍药汤，痢虽已除，犹宜此药和之。

25756 白术黄耆汤

《准绳·类方》卷五。为《保命集》卷中“白术防风汤”之异名。见该条。

25757 白术黄耆散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】白术 黄耆 当归 黄芩（去皮）芍药各半两 石膏 甘草各二两 茯苓 寒水石各一两 官桂一分 人参 川芎各三分

【用法】上为末。每服三钱，水一盞，煎至六分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】五心烦热，自汗，四肢痿劣，饮食减少，肌瘦昏昧。

25758 白术猪肚粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】白术二两 槟榔一枚 生姜（切，炒）一两半

【用法】上为粗末，以猪肚一枚，治如食法，去涎骨，纳药于肚中缝口，以水七升，煮肚令熟，取汁入粳米及五味同煮粥。空腹食之。

【功用】《药粥疗法》：补中益气，健脾和胃。

【主治】①《圣济总录》：妇人腹胁血癖气痛，冲头面燥燥，呕吐酸水，四肢烦热腹胀。②《药粥疗法》：脾胃气弱，消化不良，不思饮食，倦怠少气，腹部虚胀，大便泄泻不爽。

25759 白术麻黄散

【方源】《幼幼新书》卷九引《石壁经》。

【组成】白术（炮） 干葛各一分 麻黄（去节）半两

【用法】上为末。每服半钱，荆芥汤送下。服后忌冲风，须有汗如水出，再进一二服。

【主治】小儿慢惊将发。

25760 白术舒脾散

《医略六书》卷二十八。为《本事》卷十“白术散”之异名。见该条。

25761 白术截疟饮

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】白术（一半生用，一半炒用）四钱 橘红 麦芽各二钱 乌梅一枚 姜五片

【用法】水煎，临发日五更服。

【主治】虚弱久疟，脾虚呕吐，不思饮食，不拘寒热。

25762 白术橘香散

《普济方》卷四十三。为《博济》卷二“橘香散”之异名。见该条。

25763 白术藿香汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】白术一两 藿香二两 丁香 人参 赤茯苓（去黑皮） 半夏（汤洗七遍，切，炒） 陈橘皮（汤浸去白，焙）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）一两 甘草（炙，锉）半两 前胡（去芦头）一两一分 槟榔（大者，锉）五枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，同煎至七分，去滓，空心、食前服，一日三次。

【主治】脾胃气弱，呕吐不下食。

25764 白术调暑饮

【方源】《秋症指南》卷一。

【组成】白术二钱 川连一钱 赤苓二钱 生扁豆一钱半 条芩二钱 麦冬二钱 滑石一钱 杏仁一钱 生甘五分 青蒿五分 川朴一钱 半夏一钱 陈皮一钱

【用法】生姜、大枣为引，水二碗，煎至一碗服。

【主治】暑症。足太阴脾之经气为病，寒热往来，令人不乐，好太息而不嗜食，寒热甚而汗出，病至则善呃吐。

25765 白石英浸酒

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】白石英(碎如大麻粒) 磁石(火煅令赤,醋淬,如此五遍,捣)各五两

【用法】上为粗末,生绢囊贮,以酒一升浸,经五六日。每服不拘时候,随性温服,服将尽,可更添酒浸之。

【功用】益精髓,保神守。

【主治】风湿周痹,肢节中痛,不可持物,行动无力,耳聋及肾脏虚损。

【备考】本方方名,《本草纲目》引作“白石英酒”。

25766 白龙捧疮膏

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】腊猪油一两七钱 白蜡 轻粉 定粉各五钱 黄蜡三钱 朝脑二钱五分 乳香一钱 没药二钱 冰片一分

【用法】上为末,先以猪油同二蜡化开,入群药末调。摊贴之。

【主治】杖疮。

25767 白皮小豆散

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】赤小豆半升 桑白皮二两(锉) 紫苏一握(锉) 生姜半两

【用法】水三升,煎至豆熟。取豆食;去滓,余汁饮之。

【主治】脚气,小便涩,两脚肿,气胀。

25768 白芍甘草汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】白芍一两(醋炒) 甘草三钱

【主治】胃气痛,证属阴虚血燥,肝气妄动,木克土者。其痛在脐腹以上,胸膈之间,时作时愈,愈则安然无恙,偶有拂逆,则复作。

【方论选录】方中醋炒白芍有滋阴敛肝之功;甘草味甘,甘先入脾,且能和中。

25769 白防活命饮

【方源】《痘疹全集》卷十四。

【组成】白芷 防风 乳香 没药 甘草 连翘 赤芍 穿山甲(炙焦) 归梢 天花粉 薄荷 皂刺 贝母各一钱 金银花三钱

陈皮一钱

【用法】水、酒各半,煎服。

【主治】痘痈毒。

25770 白芷升麻汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】炙甘草一分 升麻 桔梗各五分 白芷七分 当归梢 生地黄各一钱 生黄芩一钱五分 酒黄芩 连翘 黄耆各二钱 中桂少许 红花少许

【用法】上咬咀,分作二服。酒、水各一大盏半,同煎至一盏,去滓,临卧稍热服。

【主治】臂上手阳明大肠经分生痈。

【临证举例】臂痈 尹老家素贫寒,形志皆苦,于手阳明大肠经分出痈,幼小有癰疽,其臂外皆肿痛,在阳明左右,寸脉皆短,中得之俱弦,按之洪缓有力,此痈得自八风之变。以脉断之,邪气在表,其证大小便如故,饮食如常,腹中和,口知味,知不在里也;不恶风寒,只热燥,脉不浮,知不在表也。表里既和,邪气在经脉之中。《内经》云:凝于经络为疮痈,其痈出身半以上,故风从上受之,故知是八风之变为疮者也。故治其寒邪,调其经脉中血气,使无凝滞而已,白术升麻汤一服而愈。

【备考】《东垣试效方》无当归梢、生地黄、连翘、中桂。

25771 白芷升麻汤

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】白芷一钱半 升麻 桔梗各一钱 生黄芩三钱 酒黄芩四钱 红花 甘草(炙)各半钱

【用法】上作一服。水二钟,酒半钟,煎至八分,食后服。

【主治】①《奇效良方》臂上生痈。②《外科理例》:臂痈肿痛,右手脉大,未成脓者。

25772 白芷升麻汤

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】白芷 升麻 黄连 木通 当归 川芎 白术 茯苓

【用法】水煎服。更用塌肿汤浴洗之。

【主治】妇人阴内脓水淋漓，或痒或痛。

25773 白芷升麻汤

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】白芷 升麻 桔梗 甘草 黄耆 黄芩 红花 当归 连翘 羌活 黄柏 生姜一片 连须 葱白三茎

【主治】痘痢。

25774 白芷升麻散

《普济方》卷六十九。为《御药院方》卷九“白牙药升麻散”之异名。见该条。

25775 白芷石膏汤

《症因脉治》卷四。为《保命集》卷中“白芷汤”之异名。见该条。

25776 白芷立效散

【方源】《普济方》卷三八一引《傅氏活婴方》。

【组成】白芷 防风 白蒺藜(炒) 川当归 川芎 地龙(酒洗，炒) 黄连 龙胆草 甘草

【用法】上咬咀。每用二钱，水煎服。

【主治】疳疮湿痒、肋筋腿畔腐烂。

25777 白芷防风膏

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】炼油(香油十斤，桃、柳、槐枝各二十一寸，浸二十一日，熬枯去渣，入当归、木鳖、知母、细辛、白芷、文合、红吉、山慈菇、续断、巴豆肉合熬，去滓，枯)一斤半 白芷 防风各五两

【用法】熬时入鸡蛋一个熟时取起，去壳，同熬枯去滓，入蛋再熬，照见人影，出蛋收锅，加白蜡五两，黄蜡二两，熔化和匀，收锅。用时开水熏软，贡川纸乘热用竹片括匀，俟冷剪贴，日换数次。

【主治】追脓生肌。

25778 白芷护心散

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】白芷一两 乳香三钱 雄黄五钱 甘草五钱

【用法】上为细末。每服四钱，清酒调下。

【主治】毒蛇、蜈蚣咬伤。

【备考】外用明雄黄细末，用蒜捣烂敷之。

25779 白芷胃风汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【组成】白芷二钱五分 升麻二钱五分 葛根 苍术(米泔炒)各八分 炙草 当归各一钱五分 草豆蔻 柴胡 黄柏(炒) 藁本 羌活各四分 蔓荆子 白僵蚕各三分 麻黄(去节)七分

【用法】水煎服。

【主治】手足阳明经气虚风热，面目麻木，或牙关紧急，眼目瞬动。

25780 白芷独活汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】白芷 独活 防风 苍术 秦艽 干葛

【主治】阳明经风湿腰痛，不可顾，善悲，脉右关浮涩者。

25781 白芷黄连汤

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】白芷一两半 黄连(去须)一两 天雄(炮裂，去皮脐)一两半 地榆一两 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)一两半 桂(去粗皮)一两 当归(锉，焙)一两半 黄耆(细锉)一两 赤石脂一两半 白术一两 诃黎勒(煨)一两半 黄芩(去黑心)半两 龙骨一两半 吴茱萸(洗，焙炒)半两 芎藭一两半 干姜(炮)半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞半，煎至八分，去滓，空腹温服，一日三次。

【主治】伤寒后，下痢脓血，食物不得，气胀腹满。

25782 白芷黄连汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】白芷一两半 黄连(去须)一两 地榆一两半 当归(锉，焙)一两 附子(炮裂，去皮脐)一两半 木香一两 赤石脂一两半 黄芩(去黑心)半两 芎藭一两半

河黎勒皮(煨)一两 肉豆蔻一枚(煨,去壳) 白术一两 桂(去粗皮)一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,加生姜五片,煎至八分,去滓,空心温服,一日三次。

【主治】因伤水饮后,变成暴泄。

25783 白芷暖宫丸

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】禹余粮(制)一两 白姜(炮) 芍药 白芷 川椒(制) 阿胶(粉炒) 艾叶(制) 川芎各三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四十丸,米饮送下;或温酒、醋汤亦得。

【功用】暖血海,实冲任;常服温补胞室,和养血气,光泽颜色,消散风冷,退除百病,自成孕育。

【主治】子宫虚弱,风寒客滞,因而断绪不成孕育。及数尝堕胎,或带下赤色,漏下五色,头目虚晕,吸吸少气,胸腹苦满,心下烦悸,脐腹刺痛,连引腰背,下血过多,两胁牵急,呕吐不食,面色青黄,肌肤瘦瘠,寝常自汗。

25784 白芷螺蛳丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】白芷(炒黑)一两 海螺蛳三个(煨) 胎发一团(煨)

【用法】上为末。每服三钱,空心酒送下。

【主治】白带。

【备考】本方方名,据剂型,当作“白芷螺蛳散”。

25785 白花蛇浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】白花蛇一条(重半斤者,去皮骨,炙黄) 虎胥骨一条(涂酥炙微黄) 当归一两半 芎藭一两半 附子二两(炮裂,去皮脐) 桂心二两 熟干地黄二两 防风二两(去芦头) 山茱萸二两 萆薢二两 石斛二两(去根) 牛膝二两(去苗) 独活三两 细辛二两 黄耆二两 枳壳一两(麸

炒微黄,去瓤) 天麻二两 肉苁蓉二两半(酒浸一宿,刮去皱皮用)

【用法】上锉细,以生绢袋盛,以好酒三斗,于瓷甕子内密封。浸七日后,随性暖饮。常令熏熏,勿令大醉。其酒旋添,酒味稍薄即换药。

【主治】风,骨髓及腰脚疼痛,行步稍难,急风毒攻注皮肤,痒痛不知。

【宜忌】忌生冷、粘滑、动风物。

25786 白花蛇煮酒

【方源】《扶寿精方》。

【组成】全蝎(炒)一钱 当归一钱 防风(去芦)一钱 羌活一钱 芍药 升麻 白芷 天麻 独活 甘草各五钱

【用法】上锉片。用白花蛇温水洗净,去头尾各三寸及骨,刺取净肉一两,先用糯米二斗,如法造白酒,将前药囊贮置酒缸中,俟酒来,春五、夏三、秋七、冬十日,取酒同药囊一并煮熟,空心热饮,初饮一杯,至三日加半杯,三日后二杯,渐至三杯为常,不可多服,多则反生变。

【主治】诸风,无问新久,手足腰腿缓弱,行步不正,精神昏运,口眼喎斜,语言蹇涩,痰涎盛;或筋脉挛急,肌肉顽麻,皮肤燥痒,骨节烦疼;或生恶疮,疼痛无常;或风气上攻,面浮耳鸣,腰痛体重;一切风湿疮疥。

25787 白疔一号方

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地 30 克 生槐花 30 克 山豆根 9 克 白鲜皮 15 克 草河车 15 克 大青叶 15 克 紫草 15 克 黄药子 12 克

【功用】凉血清热,解毒治疮。

【主治】牛皮癣进行期。

【方论选录】生地、生槐花、紫草凉血清热;山豆根、草河车、大青叶清热解毒;白鲜皮消风止痒;黄药子凉血解毒。用于牛皮癣进行期,血热风燥之证。

25788 白疔二号方

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】土茯苓 30 克 忍冬藤 9 克 生甘草 6 克 板蓝根 15 克 威灵仙 15 克 山豆根 9 克 草河车 15 克 白鲜皮 15 克

【功用】清热解毒，祛风除湿。

【主治】牛皮癣早期。

【方论选录】土茯苓、白鲜皮、威灵仙祛风除湿；板蓝根、山豆根、草河车、忍冬藤、生甘草清热解毒。

25789 白沙草灵丹

【方源】《良朋汇集》卷二。

【异名】万安丹。

【组成】当归 生地 熟地 麦门冬（去心） 天冬 赤何首乌 肉苁蓉 白芍 大茴香（炒黄色） 白茯苓 枸杞子 山药 远志（去心） 菟丝子（酒炒，蒸为饼） 粉草 白何首乌 川芎各二两 苍术（酒浸洗） 川椒（去核）各四两 丁香三钱 人参一钱 川乌一两（炮）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五丸，食远盐汤送下；或黄酒送下更妙，一日三次。

【功用】补益。服一月身轻体健，百日唇红齿白，手足温暖，面容光彩，耳明目亮，百病消除。

25790 白附香连丸

《准绳·幼科》卷七。为《小儿药证直诀》卷下“白附子香连丸”之异名。见该条。

25791 白玫瑰露酒

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】白玫瑰花一两 玫瑰精少许 代代花二两 原高粱十斤 冰糖一斤

【用法】共入坛内，封固，一月余取出装瓶。

【功用】舒肝郁，止腹痛，悦脾胃，进饮食，理滞气，宽中宫。

【主治】诸般风痛。

25792 白茅根饮子

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】白茅根半两（锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 桂心三两 葛根一两

高良姜半两 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄）

【用法】上锉细，和匀。每服半两，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，不拘时候稍热服。

【主治】热病，因服凉药过多，致胃冷呕逆。

25793 白茅根饮子

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】白茅根一握（锉） 桑根白皮二两（锉） 麦门冬二两（去心） 赤茯苓一两 露蜂房一两（炙黄） 红雪二两

【用法】上锉细。每服半两，以水一大盏，加淡竹叶三七片，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】因服硫黄及诸丹石，热发，关节毒气不得宣通，心肺躁热，渴利不止，及发痈疽发背者。

25794 白矾半夏散

【方源】《三因》卷十。

【组成】白矾 半夏各等分

【用法】上为细末。醋调贴之。

【主治】蝎螫，痛不可忍。

25795 白虎人参汤

《金匱》卷上。为《伤寒论》“白虎加人参汤”之异名。见该条。

25796 白虎化斑汤

《卫生总微》卷八。为《伤寒论》“白虎加人参汤”之异名。见该条。

25797 白虎化斑汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】石膏（生用） 知母 生甘草 蝉蜕 麻黄 大黄（生用） 黄芩 连翘 黑参 竹叶

【用法】水煎，大剂频服。

【主治】痘为火闷，不得发出。

25798 白虎加苍汤

《医学入门》卷四。为《活人书》卷十八“白虎加苍术汤”之异名。见该条。

25799 白虎加味汤

【方源】《集成良方三百种》。

【组成】生石膏二钱 知母一钱 麦冬三钱 半夏一钱 生甘草一钱 防风五分 荆芥二钱 薄荷一钱 桑白皮二钱 葛根一钱 竹叶三十片

【用法】水煎服。

【主治】鬼火丹。手足阳明经风热，面上先赤肿，渐渐由头而下，蔓延至身亦赤肿。

【方论选录】白虎汤以泻胃热，加防风、荆芥、薄荷、桑白皮、葛根以散其风，引其从皮毛而外散也。然大肠亦热，何故不散大肠之火？不知胃之火甚于大肠，胃火散而大肠火亦散，不必又治之也。

25800 白虎加参汤

【方源】《玉案》卷二。

【异名】化斑汤。

【组成】石膏 知母 梗米 甘草 山栀 麦门冬 人参 五味子 天花粉 黄连 生姜 大枣

【主治】热病汗后烦渴，脉洪大，背恶寒者。

【加减】心烦，加竹叶、竹茹；小便短少，加滑石；背恶寒，渴，加茯苓，去山栀；呕，加姜汁炒半夏；头微疼，加葛根，去山栀。

25801 白虎加桂汤

《千金》卷十。为《金匱》卷上“白虎加桂枝汤”之异名。见该条。

25802 白虎地黄汤

【方源】《增订医方易简》卷三。

【组成】石膏三钱 生地二钱 当归三钱 枳壳一钱 大黄一钱五分 木通二钱 生甘草一钱 泽泻一钱

【用法】加灯心为引。

【功用】去实火，解邪热。

【主治】小儿出痘，发热不退，口渴喜冷，痘疮黑陷，小便赤燥，大便闭结，口鼻气热者。

【加减】酌加大黄，以行为度。

25803 白虎苍术汤

《保婴撮要》卷十八。为《活人书》卷十八“白虎加苍术汤”之异名。见该条。

25804 白虎快斑汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】官拣参 熟石膏 大麦冬 粉葛根 绿升麻 淡竹叶 生甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘值炎天暑月，误用盖覆，以致毒火郁遏，闭其腠理，不能起发。

【加减】昏迷者，加辰砂末；小便赤者，加木通；大便坚者，加生石膏、梗米一撮为引，以米熟为度，热服。

25805 白虎抱龙丸

【方源】《串雅补》卷四。

【组成】寒水石（生、熟）各四两 石膏（生、熟）各四两

【用法】上为细末，生甘草熬膏为丸，如芡实大，朱砂为衣。每服一丸，白汤化下。

【主治】小儿惊风发热，泄泻夜啼，不乳不食，牙疳口糜。

25806 白虎承气汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生石膏八钱（细研） 生锦纹三钱 生甘草八分 白知母四钱 元明粉二钱 陈仓米三钱（荷叶包）

【功用】清下胃腑结热。

【主治】邪火壅闭，堵其神明出入之窍，昏不识人，谵语发狂，大热大烦，大渴大汗，大便燥结，小便赤涩。

【方论选录】是方白虎合调胃承气，一清胃经之燥热；一泻胃腑之实火。此为胃火炽盛，液燥便闭之良方。

25807 白虎续命汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】小续命汤一料加石膏、知母各二两，甘草一两。

【主治】中风无汗，身热不恶寒。

25808 白虎葛根汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】知母 石膏 葛根 白芷

【主治】阳明里热头痛，有汗发热，脉洪而数，烦渴引水。

【加减】若带太阳表邪，加羌活、防风、川芎；症兼少阳者，加柴胡、川芎；小便黄赤，加木通、滑石；大便不通，有下症者，加酒煮大黄。

25809 白虎解毒汤

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】石膏 知母 黄连 黄芩 黄柏 梔子 甘草

【用法】上锉。水煎服。

【主治】麻疹已出，谵语烦躁，作渴者。

25810 白虎解毒汤

《麻科活人》卷二。为《准绳·幼科》卷六“白虎合解毒汤”之异名。见该条。

25811 白果定喘汤

《李氏医鉴》卷五。为《摄生众妙方》卷六“定喘汤”之异名。见该条。

25812 白果定喘汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生白果二十一个（杵） 姜半夏 生桑皮 款冬花 光杏仁各三钱 苏子二钱 橘红 片苓各一钱半 麻黄一钱 生甘草五分

【功用】豁痰下气。

【主治】痰喘。寒痰遏热，壅塞气管，咳逆气粗，咯痰稠粘，甚则目突如脱，喉间辘轳有声者。

25813 白牵牛子散

《医方类聚》卷一二九。即《圣济总录》卷八十引《膜外气方》“白牵牛散”。见该条。

25814 白蚕黄柏散

《景岳全书》卷六十。为《医统》卷六十三“黄柏白蚕散”之异名。见该条。

25815 白银透罗丹

【方源】《普济方》卷一七三。

【组成】寒食面七钱 巴豆三钱（去皮出油，研泥） 天南星 半夏各一钱半

【用法】上为末，滴水为丸，捏作饼子，如梧桐子大。每服七丸，食后熬煮二沸，冷浆淘过，冷水送下。

【主治】积块食积，大便不行，疼痛不忍。

【宜忌】忌食热物等。

25816 白麻蕪皮散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】白麻蕪皮一两 花胭脂半两

【用法】上为末。满填耳孔中。注一两度愈。

【主治】小儿通耳。

25817 白敬字眼药

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】白氏眼药（《中药制剂手册》）。

【组成】珍珠（豆腐炙）五钱 麝香二钱五分 熊胆二两 冰片十六两二钱 硃砂一钱 甘石（煅）十六两五钱 石决明（煅）十两 海螵蛸（去壳）九两四钱五分

【用法】上为极细末，过罗，混合均匀，装瓶重一分三厘。膏剂：加凡士林油六百四十两、液体石蜡六十四两，混合均匀后，装瓶管，每管重四分。用玻璃针沾冷开水点在大眼角内，然后再沾药粉少许（如米粒大），点入大眼角内，每日二至三次；膏剂挤出少许，点入大眼角内。

【功用】明目消肿，散风止痒。

【主治】暴发火眼，角膜赤红，眼边刺痒，溃烂肿痛。

25818 白薇煨药方

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】白薇 白及 白芷 碧芦皮（炙黄）各一两

【用法】上为末，鸡子清拌石灰炒干后，入前末研细。伤损处封之。

【功用】止血。

【主治】伤损。

25819 白薇薏苡汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】白薇 薏苡仁 芍药 桂心 牛膝 酸枣仁 干姜 甘草各一升 附子三枚

【用法】上咬咀。以醇酒二斗渍一宿，微火煎三沸。每服一升，不耐酒服五合，一日三次。扶杖起行。

【主治】风拘挛，不可屈伸。

【方论选录】《千金方衍义》：拘挛不可屈伸，首取白薇以除风热，散结气；薤苡、牛膝，《本经》皆主拘挛，枣仁治心腹邪气，疼痠湿痹；桂心、芍药专和营气；四逆汤三味开下焦痹着之邪，酒煎以行血脉之气。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“薤苡仁汤”。

25820 白薇十味丸

【方源】《外台》卷三引《许仁则方》。

【组成】白薇三两 知母四两 地骨皮三两 干地黄六两 麦门冬五两（去心）甘草四两（炙）蜀漆三两 萎蕤三两 橘皮二两 人参三两

【用法】上为散，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服十五丸，以饮送下，一日二次。稍加至三十丸。服经三数日后，自候腹中，若觉热则食前服，如不能以空饮下药，宜合乌梅饮下。

【主治】天行后不了了，体气虚羸，每觉头痛唇口干，乍寒乍热，发作有时。

【禁忌】忌菘菜、海藻、芜荑等。

25821 白薇人参丸

《圣济总录》卷一五三。为《千金》卷二注文引《古今录验》。“金城太守白薇丸”之异名。见该条。

25822 白薇芍药散

《三因》卷十七。为方出《外台》卷三十四引《小品方》，名见《医心方》卷十二引《令李方》“芍药散”之异名。见该条。

25823 白螺蛳壳丸

《保命歌括》卷三十。即方出《丹溪心法》卷四，名见《直指附遗》卷六“螺蛳壳丸”。见该条。

25824 白牙药升麻散

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】白芷升麻散（《普济方》卷六十九）。

【组成】川芎四钱 升麻 藁本 石膏 白芷各一两 皂角一两（烧存性用）二钱二分 细辛六钱

【用法】上为末，纱罗三度。每用牙刷蘸药少许刷牙，用温水漱之。

【主治】风牙疼痛，及牙龈肿硬不消。

25825 白牙药真珠散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】真珠一钱半 白檀三钱 石膏二两 乌鱼骨半两 白石英半两 浮石半两 朱砂 香白芷 川芎 川升麻各二钱半

【用法】上为细末。每用少许，以指蘸药擦牙。合口良久，吐津后用温水漱口。

【主治】齿龈宣露、牙黄黑不白。

25826 白玉蟾蜍遗方

《疡医大全》卷二十八。为《解围元藪》卷三“白玉蟾丸”之异名。见该条。

25827 白术五味子汤

【方源】《幼幼新书》卷十六引《医方妙选》。

【组成】白术（炮） 五味子 丁香 人参（去芦头） 款冬花各半两 细辛（去土）一分

【用法】上为细末。每服一钱，水八分一盞，加生姜三片，煎至四分，去滓，放温，令时时呷之。

【主治】小儿咳嗽，气逆上喘。

【备考】本方方名，《普济方》引作“白术五味汤”。

25828 白术当归煎丸

【方源】《幼幼新书》卷七引《王氏手集》。

【组成】白术 当归 木香各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一九，煎木香汤化下。

【主治】胎寒腹痛，遇夜啼叫，身体偃张，有如痼状，吐衄不止，大便酸臭，乳食虽多，不生肌肤。

25829 白头翁根敷方

【方源】方出《外台》卷三十六引《小品方》名见《圣济总录》卷一八二。

【组成】生白头翁根不问多少

【用法】捣之。随病处以敷之。一宿当作疮，二十日愈。

【主治】小儿阴癫。

25830 白花蛇造酒方

【方源】《普济方》卷一一〇引《瑞竹堂方》。

【组成】白花蛇一条 蒸米一斗

【用法】缸底先用酒曲，次将蛇用绢袋盛之，顿于曲上，用纸封缸口，候三七日，开缸取酒，将蛇去皮骨为末。每用蛇末少许，酒一盏温服。仍将酒脚并糟作饼食之。尤佳。

【主治】大风。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“白花蛇酒”。

25831 白芥子吹鼻散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】白芥子 舶上莎罗 芸苔子各一两

【用法】上为细散。每用一字，如患左边疼，即吹右鼻中；如患右边，即吹左鼻中。仍先洗净洗鼻中，吹药即验。

【主治】牙疼。

25832 白附子化痰丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】半夏（汤洗七次，生姜自然汁制）天南星（炮） 石膏 细辛（去叶土） 白茯苓（去皮） 肉桂（去粗皮） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 白附子（炮） 川芎各等分 香白芷一分 麝香一钱（别研）

【用法】上为细末，同麝香研匀，取生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后熟水送下。

【主治】风痰积于胸膈，头疼目运。

25833 白附子香连丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】白附子黄连丸（《普济方》卷三九七） 白附香连丸（《准绳·幼科》卷七）。

【组成】黄连 木香各一分 白附子（大者）二个

【用法】上为末，粟米饭为丸，如绿豆大或黍米大。每服十丸至二三十丸，食前清米饮

送下，日、夜各服四五次。

【主治】肠胃气虚，暴伤乳哺、冷热相杂、泻痢赤白，里急后重、腹痛扭撮、昼夜频并、乳食减少。

25834 白附子黄连丸

【普济方】卷三九七。为《小儿药证直诀》卷下，“白附子香连丸”之异名。见该条。

25835 白虎加人参汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】白虎人参汤（《金匱》卷上）、人参石膏汤（《袖珍》卷三引《圣惠》）、人参白虎汤（《玉机微义》卷九引《局方》）、白虎化斑汤（《卫生总微》卷八）、化斑汤（《丹溪心法》卷二）、人参化斑汤（《回春》卷三）。

【组成】知母六两 石膏一斤（碎，绵裹）甘草（炙）二两 粳米六合 人参三两

【用法】以水一斗，煮米熟，汤成去滓，温服一升，每日三次。

【功用】清热、益气、生津。

①《注解伤寒论》：生津止渴，和表散热。②《金鉴》：清热生津。③《伤寒论方解》：清热生津，兼益气阴。

【主治】伤寒、温病、暑病气分热盛，津气两伤，身热而渴，汗出恶寒，脉虚大无力；火热迫肺，上消多饮者。

①《伤寒论》：服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者；伤寒若吐若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者；伤寒无大热，口燥渴、心烦，背微恶寒者；渴欲饮水，无表证者。②《金匱》：太阳中热者，喝是也；汗出恶寒，身热而渴。③《袖珍》引《圣惠》：膈消，上焦燥渴，不欲多食。④《卫生总微》：小儿疮疹赤黑，出不快，毒盛烦躁者。⑤《得效》：太阳中喝，其脉弦细芤迟，小便已，洒然毛耸，口开，前板齿燥者。⑥《丹溪心法》：伤寒汗吐下后，斑发脉虚。⑦《回春》：斑已出，如脉洪数，热甚烦渴者。

⑧《景岳全书》：暑热脉虚者。⑨《温病条辨》：太阴温病，脉浮大而芤，汗大出，微喘，甚至鼻孔扇者。

【宜忌】①《伤寒论》：此方立夏后立秋前乃可服。立秋后不可服；正月、二月、三月尚凛冷，亦不可与服之，与之则呕利而腹痛；诸亡血虚家，亦不可与，得之则腹痛而利。②《外台》引《千金翼》：忌海藻、菘菜。

【方论选录】：①《金匱方衍义》：《内经》曰：心移热于肺，传为膈消。膈消则渴也，皆相火伤肺之所致，此可知其要在救肺也。石膏虽能除三焦火热、然仲景名白虎者，为石膏功独多于清肺，退肺中之火，是用为君；知母亦就肺中泻心火，滋水之源，人参生津，益所伤之气而为臣；粳米、甘草补土，以资金为佐也。②《伤寒贯珠集》：阳明者，两阳之交，而津液之府也。邪气入之，足以增热气而耗津液，是以大烦渴不解。方用石膏辛甘大寒，一直清胃热为君；而以知母之咸寒佐之；人参、甘草、粳米之甘，则以之救津液之虚，抑以制石膏之悍也。曰白虎者，盖取金气微热之义云耳。③《古方选注》：阳明热病化燥，用白虎加人参者，何也？石膏辛寒，仅能散表热；知母甘苦仅能降里热；甘草、粳米仅能载药留于中焦。若胃经热久伤气，气虚不能生津者，必须人参养正回津，而后白虎汤乃能清化除燥。④《衷中参西》：白虎汤中加入人参、不但能生津液，且能补助气分以助津液上潮，是以能立见其功也。白虎加人参汤所主之证，或渴，或烦，或舌干，固由内陷之热邪所伤，实亦由其真阴亏损也。人参补气之药非滋阴之药，而加于白虎汤中，实能于邪火炽盛之时立复其阴，此中盖有化合之妙也。凡遇其人脉数或弦硬，或年过五旬，或在劳心劳力之余，或其人身形素羸弱，即非在汗吐下后，渴而心烦者，当用白虎汤时，皆宜加人参、此立脚于不败之地，战则必胜之师也。

【临证举例】①伤寒发热《伤寒九十论》：从

军王武经病，始呕吐，俄为医者下之，已八九日，而内外发热。予诊之曰：当行白虎加人参汤。或云：既吐复下，是里虚矣，白虎可行乎？予曰仲景云：若下后七八日不解，热结在里，表里俱热者，白虎加人参汤。证相当也。盖吐者为其热在胃脘，而脉致令虚大，三投而愈。②消渴《生生堂治验》：草庐先生年七旬，病消渴引饮无度，小便白浊，周痺百治，而瘳疲日加焉。举家以为不愈，先生亦弟嘱后事，会先生诊之，脉浮滑，舌燥裂，心下硬。曰：可治矣。乃与白虎加人参汤，百余贴全愈。③风温《衷中参西》：赵印龙，年近三旬，于孟秋得风温病。胃热气逆，服药多呕吐，因此屡次延医服药，旬余无效。及愚诊视，见其周身壮热，心中亦甚觉热，五六日间饮食分毫不进，大便数日未行。问何不少进饮食？自言有时亦思饮食，然一切食物闻之皆臭恶异常。强食之即呕吐，所以不能食也。诊其脉弦长有力，右部微有洪象，一息五至。证脉相参，知其阳明腑热已实，又挟冲气上冲，所以不能进食，服药亦多呕也。欲治此证当以清胃之药为主，而以降冲之药辅之，则冲气不上冲，胃气亦必随之下降，而呕吐能止，即可以受药进食矣。生石膏三两（捣细），生赭石一两（轧细），知母八钱，潞党参四钱，粳米三钱，甘草二钱。共煎汤一大碗，分三次温服。将药三次服完，呕吐即止，次日减去赭石，又服一剂，大便通下，热退强半。至第三日减去石膏一两，加玄参六钱，服一剂，脉静身凉。

25836 白虎加元麦汤

【方源】《四圣悬枢》卷二。

【异名】白虎加元参汤（《治疫全书》卷五）。

【组成】石膏三钱 知母三钱 甘草二钱 粳米一杯 元参三钱 麦冬五钱

【用法】流水煎至米熟，取大半杯热服。

【主治】寒疫，太阳经罢，烦躁发渴者。

25837 白虎加元参汤

《治疫全书》卷五。为《四圣悬枢》卷二“白虎加元麦汤”之异名。见该条。

25838 白虎加白芷汤

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】白虎汤加吴白芷

【用法】以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，一日三次。

【主治】阳明头痛，发热，恶寒而渴。

25839 白虎加苍术汤

【方源】《活人书》卷十八。

【异名】苍术白虎汤（《宣明论》卷六）、白虎苍术汤（《保婴撮要》卷十八）、白虎加苍术汤（《医学入门》卷四）。

【组成】知母六两 甘草（炙）二两 石膏一斤 苍术三两 粳米三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水一盞半，煎至八九分，去滓，取六分清汁温服。

【功用】《成方便读》：清温燥湿。

【主治】湿温病。身热胸痞，汗多，舌红，苔白腻者。

①《活人书》：湿温，两胫逆冷，胸腹满，多汗，头目痛，苦妄言，其脉阳濡而弱，阴小而急。②《宣明论》：伤寒发汗不解，脉浮者。③《医方考》：湿温憎寒壮热，口渴，一身尽痛，脉沉细者。④《温热经纬》：湿热证，壮热口渴，自汗身重，胸痞，脉洪大而长者。⑤《治疹全书》：疹毒烦热渴泻者。

【方论选录】①《医方考》：温毒藏于肌肤，更遇于湿，名曰湿温。湿为阴邪，故憎寒；温为阳邪，故壮热；湿热入里，故口渴；湿流百节，故一身尽痛；湿为阴，故脉沉细。石膏、知母、甘草、粳米，白虎汤也，所以解温热；加苍术者，取其辛燥能治湿也。②《本事方释义》：知母气味苦寒，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴；石膏气味辛寒，入手太阴、足阳明；苍术气味苦辛温，入足太阴；白粳米气味甘平，入手足太阴。此治暑湿相搏而为湿温病者。以苦寒、辛寒之药清其暑；以辛温雄烈之药燥其湿，而以甘平之

药缓其中，则贼邪，正邪皆却，病自安矣。

【临证举例】湿温《本事》：癸丑年，故人王彦龙作崑陵仓官，季夏得疾，胸项多汗，两足逆冷，谵语。医者不晓，杂进药已经旬日。予诊之，其脉关前濡，关后数。予曰：当作湿温治。盖先受暑后受湿，暑湿相搏，是名湿温。先以白虎加人参汤，次以白虎加苍术汤，头痛渐退，足渐温，汗渐止，三日愈。

25840 白虎加苍术汤

【方源】《伤暑全书》卷下。

【组成】石膏二钱 知母（去粗） 苍术（米泔水浸，晒） 羌活各一钱 甘草五分

【用法】上作一剂。水二钟，加糯米一撮，煎八分，不拘时候服。

【主治】中暑无汗，脉虚弱，腹满身重，口燥面垢，谵语发狂。

25841 白虎加梔子汤

【方源】《此事难知》。

【组成】白虎汤加梔子一钱半

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水一盞半，煎至八分，米熟为度，去滓温服。

【主治】老、幼、虚人伤寒五六日，昏冒谵语，小便或淋或涩，或烦而不得眠。

25842 白虎加桂枝汤

【方源】《金匱》卷上。

【异名】白虎加桂汤（《千金》卷十）、知母汤（《圣济总录》卷三十四）、加减桂枝汤（《得效》卷二）。

【组成】知母六两 甘草二两（炙） 石膏一斤 粳米二合 桂（去皮）三两

【用法】上锉。每服五钱，水一盞半，煎至八分，去滓温服，汗出愈。

【主治】温疟。其脉如平，身无寒但热，骨节疼痛，时呕。

【方论选录】①《千金方衍义》：白虎以治阳邪，加桂以通营卫，则阴阳和，血脉通，得汗而愈矣。②《古方选注》：本方方义原在心营肺卫，白虎汤清营分热邪，加桂枝引领石膏、知母上行至肺，从卫分泄热，使邪之郁

于表者，顷刻致和而症已。

【临床举例】活动性风湿性关节炎（热痹）《江西医药》（1965；7：907）：12例活动性风湿性关节炎患者，临床表现为关节疼痛，局部灼热红肿，痛不可近，关节不能活动，遇寒则舒，得热痛加，常为迁移性痛，并兼有发热、口渴、烦闷不安等全身症状，生化检查：白血球计数增高，血沉加快。根据辨证，均属热痹，以白虎加桂枝汤为主进行治疗，并随患者体质及病情辨证加减用药；如热重则选用黄柏、黄芩、山梔等；湿重则选用苡仁、茯苓、六一散、蚕砂等；阴虚则酌加生地、石斛、麦冬；气虚则酌加黄耆、党参；祛风镇痛药用防风、桑枝、威灵仙、乳没；活血通络用当归尾、杭芍、丹皮、木瓜、络石藤等，12例均获得临床痊愈，一般均在服药二剂后；体温开始下降，关节疼痛减轻；服至6~10剂后体温正常，关节红肿疼痛显著减轻，其他症状也逐渐消失，平均治疗时间11天。

25843 白虎加葛根方

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】麻黄（去根节）一两 知母一两半 葛根（锉）一两半 石膏三两半 甘草（炙微赤，锉）一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒头痛，骨节烦疼，或已吐下，余热不尽，口干烦渴者。

25844 白虎合六一散

【方源】《治痢南针》。

【组成】知母四钱 石膏一两六钱 甘草一钱半 梗米一合 滑石三钱

【主治】伤暑霍乱，身热肢寒，自汗口渴，小便短赤者。

25845 白虎合解毒汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】白虎解毒汤（《麻科活人》卷二）。

【组成】石膏（研粗末）四钱 知母 天花粉 黄芩 黄连 山梔仁各一钱 生地黄

麦门冬各二钱

【用法】入淡竹叶十片，水二钟煎一钟，更磨入犀角汁，索汤水则与之。

【主治】①《准绳·幼科》：麻疹出而胃热渴甚者。②《中国医学大辞典》：温热及痘疹后余热，欲成牙疳。

【备考】按：本方方名，《中国医学大辞典》引作“白虎合黄连解毒汤”。

25846 白茯苓陈皮丸

【方源】《洁古家珍》。

【异名】缓中丸《卫生宝鉴》卷五。

【组成】白茯苓 陈皮 干生姜 人参各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一九，空腹白汤煎化下。

【主治】脾胃虚弱、六脉俱弦而指下虚。食少而渴不止，心下痞、腹中或痛，或窄狭如绳束之急，小便不利，大便不调，精神短少。

【加减】如脉弦或腹中急甚，加甘草三钱（炙）；秋减姜一半。

25847 白鲜皮七味汤

【方源】《外台》卷四引《许仁则方》。

【组成】白鲜皮三两 干葛五两 黄芩三两 郁金三两 豉五两 梔子十枚 芒消六两

【用法】上切。以水八升，煮取二升半，去滓纳芒消，分三次温服。相去如人行二十里久，更服此汤，当得利，利后将息一二日，则合后黄连丸服之。

【主治】黄疸初得，稍觉心中烦热，外状与平常无别，但举体正黄，甚者眼色如柏，涕、涎、小便及汗悉如柏汁，食消多于平常，稍觉瘦悴乏力者。

25848 白术半夏天麻汤

《扶寿精方》。为《脾胃论》卷下，“半夏白术天麻汤”之异名。见该条。

25849 白术茯苓干姜汤

【方源】《三因》卷五。

【组成】白术 干姜 茯苓 细辛 桂心

干葛 甘草(炙) 陈皮 乌梅 豆豉各等分

【用法】上为细末。每服二钱，白汤点下。

【主治】伏暑中风湿，烦渴引饮，心腹疼痛，闷，口干面垢，洒洒恶寒，渐渐恶风，微汗，饥不能食。

25850 白术茯苓泽泻汤

《医方考》卷六。为《本事》卷四“白术散”之异名。见该条。

25851 白芍黄芩木通汤

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】白芍二钱 黄芩二钱 木通八分 白术一钱 泽泻一钱 茯苓七分

【用法】水煎，温服。

【主治】水泻，小便短赤。

25852 白芷石膏三物汤

《丹溪心法》卷二。为《保命集》卷中“白芷汤”之异名。见该条。

25853 白芷细辛吹鼻散

【方源】方出《种福堂方》卷二，名见《医学从众录》卷四。

【组成】白芷 细辛 石膏 乳香(去油) 没药(去油) 各等分

【用法】上为末。吹入鼻中、左痛吹右，右痛吹左。

【主治】半边头痛，因风寒而起者。

25854 白虎青龙各半汤

【方源】《痰症论疏》。

【组成】柴胡(取银州者，去须及头，用银刀削去黄薄皮少许，粗布拭净，锉细，勿令犯火)七钱 升麻(不经雨阳者，形色翠碧，削去皮，用黄精汁浸一宿，晒干，锉，蒸，再晒)三钱 葛根(取洁白肥嫩者，用雪水或秋露润透，切片，阴干)九钱 羌活(去头，细锉，以淫羊藿拌沤三日，晒干，去藿)五钱 防风(勿用叉头叉尾者，叉头令人发狂，叉尾发人痼疾，取肥大柔润色黄通理者)五钱 甘草(取黄中通理者，去头尾尖处各四五寸，仅取中节，切作寸许长，入瓷器中好酒浸蒸，从巳至午，取出晒干，锉

细)七钱五分 知母(槐砧上锉细，于木臼杵捣数千下，勿犯铁器)七钱 石膏(取洁白如束针者，研极细，用甘草水飞三遍，澄清去水，晒干再研)三两 桃仁(去皮，同白术、乌豆置瓷器中，煮三伏时取出，劈开心黄如金色为度，晒干，捣烂)五钱 红花(粟米泔浸片刻取出，用布袋绞去黄汁，青蒿拌覆一宿，晒干)三钱五分 猪苓(铜刀削去黑皮，切作薄片，用东流水浸一宿取出，锉细，以升麻叶对拌蒸一日，去叶，晒干，如无叶，即升麻亦可)九钱 鲮鲤甲(取近尾甲，好酒浸一日，择高洁地上掘一土穴，用炭火烧赤，置甲于穴内，以净瓦覆之，瓦上实土，勿令气泄，俟冷取出研碎，另掘一土穴，埋甲过宿，次早取用)五钱五分 粳米一合(淘净)

【用法】上以水三升五合，先煮粳米减半升，去粳米，同诸药煮取一升半，去滓，分三次服。寅卯时取初服；再煮数沸，俟病者睡熟推醒服，服毕覆盖取微似汗；二服未发前半时许服，服毕温覆，勿使寒慄大作，热亦渐减；三服发后半时许服，服毕再半时许方吸热粥饮一盏许，以充营卫，勿食他物损伤药力也。

【主治】痰症

25855 白虎桂枝柴胡汤

【方源】《四圣心源》卷七。

【组成】石膏三钱 知母三钱 甘草二钱 梗米半杯 桂枝三钱 柴胡三钱

【用法】煎大半杯，热服。覆衣。

【主治】温症先热后寒，热多寒少，或但热不寒者。

【方论选录】《医学金针》：柴、桂散肝胆之邪；膏、知泄脾胃之热；甘草、梗米生津利水。洵属良方。

25856 白虎解毒养阴汤

【方源】《古今名方》引《喉科秘传十二方》。

【组成】石膏 24 克 知母 浙贝母 板蓝

根 山豆根各 9 克 紫花地丁 金银花 生地 玄参各 18 克 连翘 麦冬各 15 克 白芍 丹皮各 12 克 薄荷 甘草各 6 克 鲜橄榄 10 枚

【功用】清热解毒，养阴利咽。

【主治】白喉、喉痧（猩红热）、喉炎及一切喉痹、乳蛾。

【加减】若心气不足，加人参、玉竹各 9 克；心中烦躁，加黄连 6 克、灯心草 2 克；咳嗽不止，加牛蒡子、马兜铃各 9 克；鼻衄，加白茅根 24 克；目赤肿痛，加桑叶或赤芍 9 克；脘腹胀，加麦芽 9 克，枳壳 6 克；大便结，加大黄 9 克；小便热或痛，加木通 9 克，鲜车前草 1 株，或黄柏 6 克。

25857 白通加猪胆汁汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】白通加人尿猪胆汁汤（《医方考》卷一）。

【组成】葱白四茎 干姜一两 附子一枚（生、去皮、破）八片 人尿五合 猪胆汁一合

【用法】以水三升，煮取一升，去滓，纳胆汁、人尿，和令相得，分二次温服。若无胆亦可。

【主治】少阴病，阴盛格阳，下利不止，厥逆无脉，面赤干呕而烦躁；及寒湿腰痛。

①《伤寒论》：少阴病，下利利不止，厥逆无脉，干呕烦者。②《医方考》：久坐湿地伤肾，肾伤则短气腰痛，厥逆下冷，阴脉微者。③《医学心悟》：少阴中寒，阴盛格阳，热药相拒不入。

【方论选录】①《注解伤寒论》：《内经》曰，若调寒热之逆，令热必行，则热物冷服，下咽之后，冷体既消，热性便发，由是病气随愈，呕、烦皆除，情且不违，而致大益。此和人尿、猪胆汁咸苦寒物于白通汤热剂中，要其气相从，则可以去格拒之寒也。②《医方考》：干姜、附子，热物也，可以回阳燥湿。师曰：太阳中天，则寒者温，湿者燥。故姜、

附可以治寒湿；葱白辛温，可使通肾气；人尿，猪胆，性寒而质阴，用之者，一可以制姜、附之热而不使其燥烈于上焦无病之分，一可以同寒湿之性而引姜、附直达下焦受病之区。此佐以所利，和以所宜，乃兵家之向导也。③《医方集解》：此足少阴药也。葱白之辛以通阳气，姜、附之热以散阴寒。此白通汤也。服而不应者，乃阴盛格拒阳药，不能达于少阴，故加人尿、猪胆汁为引，取其与阴同类，苦入心而通脉，寒补肝而和阴。下咽之后，冷体既消，热性便发，性且不违，而致大益。《经》曰：逆而从之，从而逆之，正者正治，反者反治，此之谓也。

25858 白通加猪胆汁汤

【方源】《胎产秘书》卷三。

【组成】熟附子二钱 干姜八分 焦术二钱 茯苓二钱 炙甘草二钱 葱二茎（去尖白）

【用法】入猪胆汁三匙冲服。

【主治】产后类中风痉症。

25859 白虎加人参竹叶汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十五。

【组成】石膏 知母 粳米 甘草 人参 竹叶

【主治】中暑，平昔阴虚多火者。

25860 白虎加元麦青萍汤

【方源】《四圣悬枢》卷四。

【组成】石膏二钱（生） 知母二钱 甘草一钱（炙） 粳米半杯 元参三钱 浮萍二钱 麦冬二钱

【用法】流水煎至米熟，取半杯热服。覆衣取汗

【功用】清金而发表，绝其传府之源。

【主治】小儿疫疹初起，阳明素旺，烦热燥渴者。

25861 白虎加元麦紫苏汤

【方源】《四圣悬枢》卷三。

【组成】石膏二钱（生） 知母一钱 甘草一钱（炙） 粳米半杯 元参一钱 麦冬三

钱 紫苏三钱

【用法】流水煎至米熟，取半杯热服，覆衣取微汗。

【功用】清金发表。

【主治】痘病太阳经证未解，而见烦渴者。

25862 白虎加青萍地黄汤

【方源】《四圣悬枢》卷四。

【组成】浮萍三钱 生地三钱 石膏二钱 知母一钱 甘草一钱(生) 梗米半杯

【用法】流水煎半杯，热服。

【功用】清润肠胃，凉泄心肺，而透发表。

【主治】温疫热邪传府，表证未解者。

25863 白虎加犀角升麻汤

【方源】《温热经解》。

【组成】白虎汤加犀角一钱 升麻五分 鲜生地六钱 黑元参三钱

【主治】瘟疫，胃受邪则肌肤发赤，咽喉痛，口吐鲜血者。

25864 白虎合黄连解毒汤

《中国医学大辞典》。即《准绳·幼科》卷六“白虎合解毒汤”。见该条。

25865 白头翁加甘草阿胶汤

【方源】《金匱》卷下。

【异名】白头翁汤(《千金》卷三)、甘草汤(《千金翼》卷七)。

【组成】白头翁 甘草 阿胶各二两 秦皮 黄连 柏皮各三两

【用法】以水七升，煮取二升半，纳胶令消尽，分三次温服。

【主治】①《金匱》：妇人产后下利虚极。②《金匱要略集注》引东洞吉益：热利下重，大便血，心烦不得眠者。

【方论选录】①《金匱要略论注》：虚极不可无补，但非他味参、术所宜，恶其壅而燥也。亦非苓，泽淡渗可治，恐伤液也。唯甘草之甘凉，清中即所以补中；阿胶之滑润，去风即所以和血。以此治病即以此为大补，方知凡痢者湿热非苦寒不除，故类聚四味之苦寒不为过。若和血安中，只一味甘草及阿胶

而有余。治痢好用参、术者，政由未悉此理耳。②《金匱玉函经二注》：伤寒厥阴证下利重者，白头翁汤，四味尽苦寒以治热，苦以坚肠胃。此产后气血两虚，因加阿胶补气血而止利，甘草缓中通血脉。然下利，血沸也，夫人之血行则利自止，甘草尤为要药。此方岂独治产后哉。

【临证举例】痢疾 《中医杂志》(1980; 2: 58): 患者女，60余岁。痢下赤白，日数十遍，里急后重。曾服呋喃西林二日，效果不显，发热不高，口干，尚不作渴，舌质淡红，舌边呈细小赤点，干而无津，脉象细数。认为老年津血不足，又患热痢，津血更易耗损。拟白头翁加甘草阿胶汤：白头翁12克，黄连6克，川黄柏6克，秦皮9克，阿胶9克(烔)，甘草6克，煎至200毫升，分二次服。上午服第一剂，至晚大便已变粪，续进一剂病愈。

25866 白通加人尿猪胆汁汤

《医方考》卷一。为《伤寒论》“白通加猪胆汁汤”之异名。见该条。

25867 白头翁加甘草阿胶苓桂汤

【方源】《医学金针》卷八。

【组成】白头翁 茯苓各三钱 黄连 黄柏 秦皮 甘草 桂枝各一钱 阿胶二钱

【用法】流水煎，温服。

【主治】疹后频频泄利脓血。

25868 白虎加人参以山药代粳米汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生石膏(捣细)三两 知母一两 人参六钱 生山药六钱 粉甘草三钱

【用法】用水五钟，煎取清汁三钟，先温服一钟，病愈者，停后服；若未全愈者，过两小时，再服一钟

【主治】寒温实热已入阳明之府，燥渴嗜饮凉水，脉象细数者。

【方论选录】愚自临证以来，遇阳明热炽，而其人素有内伤，或元气素弱，其脉或虚数，或细微者，皆投以白虎加人参汤。实验既久，

知以生山药代粳米,则其方愈稳妥、见效亦愈速。盖粳米不过调和胃气,而山药兼能固摄下焦元气,使元气素虚者,不至因服石膏、知母而作滑泻。且山药多含有蛋白之汁,最善滋阴,白虎汤得此,既祛实火又清虚热,内伤外感,须臾同愈。

【临证举例】伤寒 一臾,年近六旬,素羸弱劳嗽,得伤寒证三日,昏愦不知人,诊其脉甚虚数,而肌肤烙手,确有实热。知其脉虚证实,邪火横恣,元气又不能支持。故传经犹未深入,而即昏愦若斯也。踌躇再四,乃放胆投以此汤。将药煎成,乘热徐徐灌之。一次只灌下两茶匙。阅三点钟,灌药两钟,豁然顿醒。再尽其余,而病愈矣。

25869 白虎去石膏加首乌当归和疟饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】知母三钱 生甘草一钱 鲜首乌八钱 当归五钱 青蒿三钱 柴胡一钱 青皮一钱五分 草薢仁一钱(研)

【用法】河、井水各半煎,露一宿,疟前二时服之。一服热除,二服疟去其八分,三服全愈。

【主治】疟症初病,但热不寒,邪气内藏于心,外舍分肉之间,肌肉消烁,脉弦有力者。

【加减】如热重烦躁口渴,加石膏八钱;恶心,加广藿香三钱;胸口饱闷作胀,加槟榔一钱五分,炒枳壳一钱五分。

瓜

25870 瓜饮

【方源】《外台》卷十八引《张文仲方》。

【组成】生瓜一枚(四破,水九升,煮取五升,去滓) 白术四两 甘草一两(炙) 生姜二两

【用法】上切三物,纳瓜汁中,煮取二升,去滓,温分三服。

【主治】脚气,呕逆不得食。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、海藻、菘菜。

25871 瓜丁散

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】瓜丁(细末)如一大豆许

【用法】纳鼻中,令病人深吸取入。鼻中黄汁出,愈。

【主治】黄疸,目黄不除。

25872 瓜丁散

《普济方》卷五十六。为方出《千金》卷六,名见《圣济总录》卷一一六“细辛散”之异名。见该条。

25873 瓜丁散

《普济方》卷一九五。即方出《证类本草》卷二十七引《经验方》,名见《卫生总微》卷十五“丁香散”。见该条。

25874 瓜子汤

《千金》卷二十三(注文)引《肘后方》。为《金匱》卷中“大黄牡丹汤”之异名。见该条。

25875 瓜子汤

《全生指迷方》卷四。为《医心方》卷十五引《集验方》“肠痈汤”之异名。见该条。

25876 瓜子散

【方源】《医心方》卷十八引《录验方》。

【组成】干姜二两 瓜子三两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕,先食酒下。

【主治】被箭,血内漏腹中瘀满。

25877 瓜子散

【方源】《千金》卷六。

【异名】十子散。

【组成】冬瓜子 青箱子 茺蔚子 枸杞子 牡荆子 蒺藜子 菟丝子 芫菁子 决明子 地肤子 柏子仁各二合 牡桂二两 蕤仁一合 细辛半两 蔓萸根二两 车前子一两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕,食后以酒调下,一日二次。

【功用】补肝。

【主治】眼漠漠不明。

【方论选录】《千金方衍义》:瓜子益气,令人悦泽好颜色;青箱子入肝明目;茺蔚子益精明目;枸杞子治肾虚目暗;牡荆子除风湿,

开经络，导痰涎，行血气；蒺藜子行恶血，破积聚，明目轻身；菟丝子去风明目，入肝肾气分；羌耆治热毒风肿，子专明目；决明子治青盲，目淫，肤赤，白膜眼赤泪出；地肤子久服耳目聪明；柏子仁除风湿，安五脏，令人耳目聪明；牡桂利关节，通神明；萆薢根即木通，去热翳，赤白障；薏仁治心腹邪热结气，目赤肿痛，毗烂泪出；车前子专治水轮不清；细辛明目利九窍。总取补肝明目之用，肝血清而肾水受荫矣。

25878 瓜子散

【方源】《千金翼》卷五。

【异名】甜瓜子散（《圣惠》卷四十一）。

【组成】瓜子一升 白芷（去皮） 当归 芎藭 甘草（炙）各二两（一方有松子二两）

【用法】上为散。每服方寸匕，食后用酒浆或汤饮调下，一日三次。

【主治】头发早白，虚劳。脑髓空竭，胃气不和，诸脏虚绝，血气不足，故令人发早白，少而篡发及忧愁早白。远视眈眈，风泪出，手足烦热，恍惚忘误，连年下痢。

25879 瓜子散

《普济方》卷二四八。即《圣惠》卷四十八“甜瓜子散”。见该条。

25880 瓜石汤

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】栝石汤（《金鉴》卷七十五）。

【组成】瓜蒌仁九钱 滑石一钱半 南星 苍术 赤芍 陈皮各一钱 黄连 黄柏 黄芩 白芷各五分 甘草二分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】破伤风，发热。

25881 瓜石汤

【方源】《刘奉五妇科经验》。

【组成】瓜蒌五钱 石斛四钱 玄参三钱 麦冬三钱 生地四钱 瞿麦四钱 车前子三钱 益母草四钱 马尾连二钱 牛膝四钱

【功用】滋阴清热，宽胸和胃，活血通经。

【主治】阴虚胃热所引起的月经稀发后错或血涸经闭。

【方论选录】本方以瓜蒌、石斛为主药，瓜蒌甘寒润燥，宽胸利气；石斛甘淡微寒，益胃生津，滋阴除热；合用共奏宽胸润肠，利气和胃之效。另加玄参、麦冬滋阴增液；用地滋阴生血；瞿麦、车前子活血通经；益母草偏寒，通经活血之中又能生津液；马尾连（或栀子）清胃热，热去则津液能以自生；牛膝引血下行，以期经行血至之目的。总之，全方以滋阴清热，宽胸和胃之力而达到活血通经的目的。

25882 瓜皮散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】冬瓜皮 牛皮胶各等分

【用法】上为细末。酒调服。

【功用】伤后发汗。

25883 瓜皮散

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】冬瓜皮（焙）

【用法】上为末，掺之；又治伤损腰痛，每服一钱，温酒调下。

【主治】多年恶疮，伤损腰痛。

25884 瓜皮煎

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】西瓜青皮 绿豆青皮各一两 肉蔻三钱（炒去油）

【主治】因伤热而泻。

25885 瓜竹汤

《医学入门》卷四。为《伤寒总病论》卷三“瓜蒌汤”之异名。见该条。

25886 瓜豆散

《普济方》卷一九五。为《外台》卷四引《延年秘录》“瓜蒂散”之异名。见该条。

25887 瓜连丸

【方源】《普济方》卷一七七引《经验良方》。

【组成】大冬瓜一枚（去瓢） 黄连

【用法】上用黄连细末实冬瓜内，浸十余日，觉冬瓜肉消尽为度，同研为丸，如梧桐

子大。每服冬瓜煎汤，随意服之。

【主治】消渴，骨蒸。

25888 瓜连丸

《医学入门》卷七。为《东医宝鉴·杂病篇》卷五引《丹心》“瓜蒌杏连丸”之异名。见该条。

25889 瓜矾散

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】瓜蒂甘遂丸（《明医指掌》卷八）

【组成】瓜蒂四钱 甘遂一钱 白矾（枯）螺壳（煨） 草乌尖各五分

【用法】上为末，用真麻油调令软硬得所，旋丸如鼻孔大。每日一次，以药入鼻内，令达痔肉上。其痔化为水，肉皆烂下即愈。

【主治】鼻痔。

25890 瓜砂丹

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】朱砂四两

【用法】以木瓜十数个，每木瓜开盖去瓢，底下根铺药末少许，中以绢片裹朱砂一两，蜜拌湿，坐于其间，仍盖药末令满，仍以木瓜盖子盖定，箴签签定，纱片裹木瓜全个不令散失，如此者二三十个。看其银合大小，坐于其中，上下仍铺药末封盖定，坐于银锅银甑中，勿用铁器，以桑柴烧文武火蒸七昼夜，再换木瓜末一次，又蒸七昼夜乃止，取出朱砂一味，摊干研细，以薏苡粉煮稀糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，茶、酒任下。

【主治】男子、妇人诸虚不足，心气不宁，梦寐不安，手足疼痛，腰膝拘挛，步履艰难；妇人脚气冲心，呕吐药食，不能下咽。

【备考】治疗上证，原书于本方下尚有煮药方：黄耆（炙） 当归 远志（去心） 柏子仁 川乌（炮） 木香 茯神（去木） 益智仁 人参 乳香 龙齿 五味子 石斛 川椒 熟地黄 麦门冬 白芍药 仙灵脾各一两 鹿茸（炙） 酸枣仁（炒） 附子（炮，去皮） 钟乳粉各二两

25891 瓜桂散

【方源】方出《百一》卷十二，名见《普济方》卷一九二。

【组成】冬瓜一枚 肉桂十两

【用法】上用着中冬瓜一枚，去瓢，以肉桂十两锉入冬瓜中，盖口湿纸裹数重，掘地坑，簇以炭火煨令存性为末。每服二钱，米饮调下，一日二次。

【主治】水气。

25892 瓜莲丸

《直指》卷十七。为《本事》卷六“三消丸”之异名。见该条。

25893 瓜盐煎

【方源】《医统》卷九十三。

【组成】吴茱萸 木瓜 食盐各五钱

【用法】上炒焦，用瓷罐盛水三升，煮令百沸，却入前药，同煎至一二升以下，倾一盞，随病人意，冷热服之。药入即醒。

【主治】霍吐泄泻。其证始因饮冷或冒寒暑，或失饥，或大怒，或弃舟车，伤动胃气，令人上吐不止，因而下泄，吐泻并作，遂成霍乱，头旋眼晕，手足转筋，四肢逆冷。

25894 瓜蒂丸

《圣济总录》卷六十。为《千金》卷十“牛胆丸”之异名。见该条。

25895 瓜蒂丸

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】瓜蒂（烧灰） 麝香（研） 蟾酥各半两 乌蛇尾（酒浸，炙） 黄连（去须）各一分 蛇蛻（烧灰） 熊胆各半分（研）

【用法】上为末，用粟米饭为丸，如麻子大。温熟水化破二丸，滴于鼻中。虫出为效。

【主治】小儿疳。

25896 瓜蒂汤

《金匱》卷中。为原书卷上“一物瓜蒂汤”之异名。见该条。

25897 瓜蒂汤

【方源】《外台》卷四引《延年秘录》。

【组成】瓜蒂一两 赤小豆四十九枚 丁香二七枚

【用法】上为末。以水一升，煮取四合，澄清，分为两度，滴入两鼻中。

【主治】①《外台》引《延年秘录》：诸黄。②《普济方》：身面四肢浮肿，有虫，鼻中息肉，阴黄、黄疸及暴急黄。

25898 瓜蒂散

【方源】《伤寒论》。

【组成】瓜蒂一分（熬黄） 赤小豆一分

【用法】上二味，各别捣筛，为散已，合治之。取一钱匕，以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁合散，温，顿服之。不吐者，少少加；得快吐，乃止。

【功用】涌吐。

【主治】痰涎宿食，壅塞上脘，胸中痞硬，烦懊不安，气上冲咽喉不得息，舌苔厚腻，寸脉浮，按之紧者。

①《伤寒论》：病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲咽喉不得息者，此为胸中有寒，当吐之；病人手足厥冷，脉乍紧者；邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者。②《金匱》宿食在上脘。③《肘后方》：胸中多痰，头痛不欲食。④《得效》：胸有寒痰。⑤《伤寒指掌图》：脉大，胸满，多痰涎，病头痛。⑥《保命歌括》：痰饮在膈上。⑦《张氏医通》：寒痰结于膈上及湿热头重鼻塞。

【宜忌】诸亡血、虚家，不可与。

【方论选录】①《注解伤寒论》：《千金》曰：气浮上部，填塞心胸，胸中满者，吐之则愈。与瓜蒂散，以吐胸中之邪。其高者越之，越以瓜蒂，豆豉之苦；在上者涌之以赤小豆之酸。《内经》曰：酸苦涌泄为阴。②《伤寒来苏集》：瓜为甘果，由熟于长夏，清胃热者也；其蒂，瓜之生气所系也，色青味苦，象东方甲木之化，得春升生发之机，故能提胃中之气，除胸中实邪，为吐剂中第一品药，故必用谷气以和之。赤小豆甘酸，下行而止吐，取为反佐，制其太过也。香豉本性沉重，糜熟而使轻浮，苦甘相济，引阳气以上升，驱阴

邪而外出。作为稀糜，调二散，虽快吐而不伤神，仲景制方之精义，赤豆为心谷而主降，香豉为肾谷而反升，既济之理也。③《千金方衍义》：瓜蒂之苦寒，以吐胸中寒实，兼赤小豆之甘酸，以清利心包余热，所谓酸苦涌泄为阴也。④《金鉴》：瓜蒂极苦，赤豆味酸，相须相益，能疏胸中实邪，为吐剂中第一品也。而佐香豉汁合服者，藉谷气以保胃气也。服之不吐，少少加服，得快吐即止者，恐伤胸中元气也。此方奏功之捷，胜于汗下。诸亡血虚家，胸中气液已亏，不可轻与也。

【临证举例】①胸胁痞满 《伤寒论今释》引《生生堂治验》：一男子，胸膈痞满，恶闻食气，动作甚懒，好坐卧暗所，百方不验者半岁。先生诊之，心下石硬，脉沉而数，即以瓜蒂散吐二升余，乃痊。②狂证 《伤寒论临床实验录》：张某，男，五十九岁。因平素性情暴躁，更加思考过度，经常失眠，后遂自言自语，出现精神失常状态，有时咆哮狂叫，有时摔砸杂物，喜笑怒骂变幻无常。如此情况延续月余，渐至见人殴打，百般医疗均无效果。遂疏瓜蒂散与之，瓜蒂 10 克、豆豉 10 克、赤小豆 10 克，煎汤顿服，连进两剂，共呕吐粘涎三次，毫不见效，竟将邻人咬伤并将所有杂物尽行砸碎。遂与大剂瓜蒂散，苦瓜蒂 21 克、赤小豆 31 克，煎汤顿服，服后隔半小时便开始作呕，连续两昼夜共呕二十余次，尽属粘涎，自呕吐开始便不思饮食，一天后现周身困顿不欲活动，困睡到第三天忽然清醒，后以豁痰通窍安神之剂，调理而愈。③痰厥 《广东中医》：某女。素无病，或一日气上冲，痰塞喉中，不能言语，此饮邪横塞胸中。当吐之，投以瓜蒂散，得吐后即愈。④笑证 《伤寒论今释》引《生生堂治验》：绵屋弥三郎之妻，善笑，凡视听所及，悉成笑料，笑必捧腹绝倒，甚则胁腹吊痛，为之不得息。常自以为患，请师治之，即与瓜蒂散，吐二升余，遂不再发。⑤性交疼痛，阴道出血 《伤寒论今释》引《生生堂治验》：一

妇人，年三十余。每于交接则小腹急痛，甚则阴门出血，而月事无常，腹诊脉象亦无他异。医药万方，一不见效。先生曰：所谓病在下者，当吐之于上。乃与瓜蒂散六分，吐粘痰升许迄，更与大柴胡汤缓缓下之，后全愈。

25899 瓜蒂散

【方源】《外台》卷一（注文）引《范汪方》。

【组成】瓜蒂 赤小豆各一两

【用法】上为散。服一钱匕，白汤调下。取得吐，病去愈止。

【功用】涌吐。

【主治】痰饮宿食填塞上脘，胸中痞塞，咽喉干而腹满，饮食则吐，气上冲喉，不得息，脉弦迟或微浮者。

①《外台》（注文）引《范汪方》：伤寒胸中痞塞。②《外台》引《集验方》：宿食结实及痰癖癖实。③《圣惠》：热病四日，咽喉干而腹满。④《医方类聚》引《伤寒括要》：少阴病，其人饮食则吐，心中温温欲吐，复不能吐，手足寒，脉弦迟，胸中实者。⑤《医方集解》：卒中痰迷，涎潮壅盛，癫狂烦乱，人事昏沉，五痫痰壅，及火气上冲喉不得息，食填太阴，欲吐不出；伤寒如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲喉不得息者；亦治诸黄，急黄。

【宜忌】《医方集解》：诸亡血虚家，老人，产妇，血虚脉微者，俱不可服。

【方论选录】《医方集解》：越以瓜蒂之苦，涌以赤小豆之酸，吐去上焦有形之物，则水得舒畅，天地交而万物通矣。当吐而胃弱者，改用参芦。

25900 瓜蒂散

【方源】《外台》卷四（注文）引《范汪方》。

【组成】瓜蒂二七枚 赤小豆三七枚 秫米二七粒

【用法】上为散。取如大豆粒，吹于两鼻中，

甚良；不愈，间日复服之。

【主治】热毒内蕴致成黄疸；小儿脐风撮口。

①《外台》（注文）引《范汪方》：天行毒热，通贯脏腑，沉鼓骨髓之间，或为黄疸、黑疸、赤疸、白疸、谷疸、马黄等疾，喘息须臾而绝。②《普济方》：酒疸，脉浮腹满，欲呕。③《保婴撮要》：脐风撮口。④《准绳》：小儿忽发心满坚硬，脚手心热，变为黄疸。

【宜忌】以筒使人极吹鼻中，无不死，大慎之。

25901 瓜蒂散

【方源】《外台》卷十三引《集验方》。

【组成】瓜蒂 赤小豆各一分 雄黄二分（研）

【用法】上为细散，一服五分匕，稍增至半钱匕，以酪服药。

【主治】①《外台》引《集验方》：飞尸。②《外台》引《广济方》：卒中恶，心腹绞刺痛，气急胀，奄奄欲绝。

【宜忌】《外台》引《广济方》：忌生冷，油腻，粘食，陈臭等。

25902 瓜蒂散

【方源】方出《千金》卷五，名见《圣济总录》卷一七四。

【组成】小豆三七枚 瓜蒂十四枚 糯米四十粒

【用法】上为末。吹鼻中。

【主治】①《千金》：小儿伤寒发黄。②《圣惠》：小儿诸黄，心胸壅闷。

25903 瓜蒂散

【方源】《外台》卷四引《延年秘录》。

【异名】瓜豆散（《普济方》卷一九五）。

【组成】瓜蒂二小合 赤小豆二合

【用法】上为散。年大人服一方寸匕，暖浆水五小合和散一服。一炊久，当吐不吐，更服五分匕，水亦减之。若轻病，直吹鼻中两黑豆粒大，亦得。当鼻中黄水出即歇。

【功用】吐。

【主治】黄疸，心下坚硬，手不可近，渴欲饮水，气息喘粗，上部有脉，下部无脉者。

①《外台》引《延年秘录》：急黄，心下坚硬，渴欲得水吃，气息喘粗，眼黄，但有一候相当者。《外台》引《救急方》：天行病不即愈，经四五日，渴引饮，心上急强，手不得近，又不得眠，慌乱，此则是黄。②《阴证略例》：大实大满，气上冲，填塞闷乱。③《卫生宝鉴》：饮食过度，填塞胸脘，上部有脉，下部无脉。

25904 瓜蒂散

【方源】《外台》卷四引《救急方》。

【组成】丁香 瓜蒂 赤小豆各十枚

【用法】上为细末。取暖水一鸡子许，和服。

【主治】诸黄。暗黄，眼暗及大角赤黑黄，先掷手足；内黄，患渴，疸黄，眼赤黄；肾黄，小便不通，气急心闷；五色黄。

25905 瓜蒂散

【方源】《外台》卷四引《广济方》。

【组成】赤小豆二七枚 丁香二七枚 黍米二七枚 瓜蒂二七枚 麝香 熏陆香各等分（别研） 青布二方寸（烧为灰）

【用法】上为散。饮服一钱匕。则下黄水，其黄则定。

【主治】急黄，身如金色。

【宜忌】忌生冷、热面、粘食、陈臭。

25906 瓜蒂散

【方源】方出《证类本草》卷二十七引《经验后方》，名见《奇效良方》卷六十一。

【组成】瓜蒂不限多少

【用法】上为细末。壮年一字，十五以下、老怯半字，早晨井花水下。一食顷，含沙糖一块，良久涎如水出，涎尽食粥一两日。如吐多困甚，即咽麝香汤一盞，即止矣，麝香研，温水调下。此药不太吐逆，只出涎水。

【主治】大人、小儿久患风痫，缠喉风，咽喉，遍身风疹，急中涎潮。

【临证举例】昔天平尚书觉昏眩，即服之，取涎有效。

25907 瓜蒂散

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】瓜蒂一两

【用法】上一味，捣罗为散。每服一钱匕，温热水调下，吐涎愈。

【功用】《直指》：吐痰。

【主治】①《圣济总录》：伤寒头疼，胸中满及发寒热，脉紧而不大者，是膈上有涎。②《直指》：风癫证。

25908 瓜蒂散

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】瓜蒂十四枚 丁香（大者）一枚 黍米四十九颗

【用法】上为细散。每服一字，先含水一口，以鼻搐药。取下黄涎为效。

【主治】黄疸，面目黄。

25909 瓜蒂散

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】瓜蒂一分 雄黄（醋煮，研）一钱 甘草（炙，锉）一两 女娄二两

【用法】上为细散。每服一字匕，用赤小豆二十粒，茯苓一分，水一盞，煎至六分去滓，调服。须臾当吐，吐止即愈。

【主治】黑疸，身体及大便并黑，及黄疸久不愈。

25910 瓜蒂散

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】瓜蒂二十七枚

【用法】上为散。以少许吹入鼻中。

【主治】鼻塞塞，气息不通。

25911 瓜蒂散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】瓜蒂七枚

【用法】上一味，炒黄，碾散。以麝香相和，新绵裹，病牙处咬之。

【主治】牙齿痛。

25912 瓜蒂散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】瓜蒂四十九枚 黄连（去须）三两 杏仁（去皮尖双仁，炒）二两半 腻粉一分

麝香一钱(研)

【用法】上为细末。用膩粉、麝香同调和令匀，以津唾调涂在疮上，更用纸面糊覆在药上贴，三五日一度，含盐水洗过，更贴。

【主治】恶疮。

25913 瓜蒂散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】瓜蒂七枚 全蝎一枚(微炒) 赤小豆二七粒

【用法】上为散。每服半钱匕，粥饮调下。服后以吐为效。

【主治】小儿口噤。

25914 瓜蒂散

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】瓜蒂 细辛(去苗) 藜芦(去苗) 各等分

【用法】上为细末。每用半字许，纳鼻中。以气通为度。

【主治】风湿鼻塞，气不通。

25915 瓜蒂散

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】瓜蒂七枚 穿山甲鳞一片(瓦上焙焦)

【用法】上为细末。欲发前，男左女右，鼻内搐一戟耳子。

【主治】①《杨氏家藏方》：疟疾。②《御药院方》：太阳经头痛寒热。

25916 瓜蒂散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】瓜蒂七十五个 赤小豆七十五粒 人参半两(去芦) 甘草半两或二钱五分

【用法】上为细末。每服一钱，或半钱，或二钱，量虚实加减用之，空心薑汁调下服之。

【主治】伤寒六七日，因下后，腹满无汗而喘。

25917 瓜蒂散

【方源】《普济方》卷一〇四引《经验良方》。

【组成】甜瓜蒂 轻粉

【用法】上甜瓜蒂，日干为细末。每用一二

钱匕，加轻粉一匕，以水半合，调匀灌之。候良久涎自出；如涎未出，含砂糖一块，下咽，涎即出。如吐多困，即咽麝香汤一盏即止。

【主治】风涎暴作，气塞倒卧，或有涎，用诸药化不下者。

25918 瓜蒂散

《普济方》卷一五二。即《圣惠》卷十七“吹鼻瓜蒂散”。见该条。

25919 瓜蒂散

《普济方》卷一八八。为《鸡峰》卷十“人参汤”之异名。见该条。

25920 瓜蒂散

【方源】《普济方》卷二五四。

【组成】麝香 皂荚(去皮子) 雄黄(细研) 藜芦(去芦头) 瓜蒂各一分

【用法】上为末，如大豆大。以竹筒吹入鼻中。得嚏则气通便活，若未嚏复吹之，以嚏为度。

【主治】鬼排、鬼刺下血。

25921 瓜蒂散

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】西瓜蒂一两 牙皂五钱

【用法】上为细末。每服二茶匙，白汤调灌下，以探吐痰为愈。

【主治】痰涎壅塞，不省人事。

25922 瓜蒂散

【方源】《保命歌括》卷四。

【组成】瓜蒂(君) 猪牙角 细辛各减半

【用法】上为细末。吹入鼻中。有水出，愈。

【主治】头中雾露寒湿之气，头痛鼻塞，无表里证。

25923 瓜蒂散

【方源】《温疫论》卷上。

【组成】甜瓜蒂一钱 赤小豆三钱(研碎) 生山梔仁二钱

【用法】用水二钟，煎一钟，后入赤豆，煎至八分。先服四分，一时后不吐，再服尽。吐之未尽，烦满尚存者，再煎服。如无瓜蒂以淡豆豉二钱代用。

【主治】①《温疫论》：温疫胸膈满闷，心

烦喜呕，欲吐不吐，虽吐而不得大吐，腹中满，欲饮不能饮，欲食不能食，此疫邪留于胸膈。②《温病条辨》：太阴病，得之二三日，心烦不安，痰涎壅盛，胸中痞塞，欲呕者，无中焦证。

25924 瓜蒂散

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】瓜蒂七枚 白茅根一两 芦根一两

【用法】水煎汁饮之。必大吐，吐后前证尽解，不必再服。

【主治】人有爱食河鲀，以致血毒中人，舌麻心闷，重者腹胀而气难舒，口开而声不出，若久不治，亦能害人。

25925 瓜蒂散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】瓜蒂（捣烂）一枚半 生甘草五分 当归三钱 乳香（灯心炒）五分 金银花三钱 青皮五分 白芷一钱 没药（灯心炒）五分

【用法】水煎服。

【主治】一切乳症。

25926 瓜蒂散

【方源】《内外科百病验方大全》第十九章。

【组成】陈年老南瓜蒂

【用法】烧成灰。酒冲服，再用麻油调灰敷之。立愈。如治乳岩，每服瓜蒂灰一个，重者四五服。

【主治】毒疽及一切无名恶症，并治乳岩。

25927 瓜蒂膏

《普济方》卷五十六。为《圣惠》卷三十七“敷鼻瓜蒂膏”之异名。见该条。

25928 瓜蒌丸

【方源】《得效》卷十二。

【异名】栝楼丸（《普济方》卷三九八）

【组成】黄瓜蒌一个 白矾半两

【用法】上将白矾入瓜蒌内，固济，火煨为末，米糊为丸。每服三十丸，米汤送下。

【主治】初病脱肛，鼻梁青脉，唇白，齿根焦黄，久病两颊光，眉赤，唇焦，多啼哭。

25929 瓜蒌丸

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】瓜蒌子 枳实 陈皮

【用法】取瓜蒌皮穰末熬为丸服。

【主治】胸痞或肋下逆抢心。

【加减】胸痞切痛，加梔子烧存性，附子炮各二两。

25930 瓜蒌丸

【方源】《普济方》卷三十三。

【组成】瓜蒌根 泽泻 土瓜根各二两

【用法】上为末，以牛膝和丸，如梧桐子大。每次服三十丸，食前服。

【主治】男子尿精。

25931 瓜蒌丸

【方源】《丹溪心法心要》卷二。

【异名】瓜蒌实丸（《杏苑》卷四）。

【组成】瓜蒌仁 半夏 山楂 神曲各等分

【用法】上为末，以瓜蒌水为丸。姜汤入竹沥，送下二十丸。

【主治】食积，痰壅滞喘。

25932 瓜蒌丸

【方源】《济阳纲目》卷三十三。

【组成】瓜蒌根（薄切，用人乳汁拌蒸，竹沥拌晒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大，噉化；或丸如绿豆大，每服一百丸，米饮下。

【主治】三消。

25933 瓜蒌丸

【方源】《医林纂要》卷七。

【组成】瓜蒌一枚（用面包裹煨熟，去面糊） 百部四两 麻黄二两 黄芩一两 杏仁一两

【用法】上为末，捣瓜蒌为丸，清晨服。

【主治】积年哮喘，偶触清寒即发。此有寒痰宿积于肺而胃气方实盛，故和缓则相安，更遇外寒触之，则阳气郁而忿争，积寒并发，气促而喘矣，此病小儿多有之者，不时喘咳，身有微热。

【方论选录】瓜蒌甘寒滑润，性质轻浮，入

肺能荡肺中之积热沉寒,此用面裹煨之者,杀其寒而资其润,且麦本金谷,亦能补肺而润燥也;百部苦甘温,功专入肺,以去沉寒宿冷;麻黄以祛肺寒,非此不徹;黄芩以泄肺火,清膈热;杏仁破结痰,润心肺,降逆气。

25934 瓜蒌方

【方源】方出《幼幼新书》卷十六引《吉氏家传》,名见《医部全录》卷四二三。

【组成】瓜蒌(大者)一个(大者,开一盖子) 阿胶一分 沙糖半两

【用法】二味入瓜蒌内,以盖子依旧封着,白纸都糊,入饭甑蒸两遍,倾出,随儿大小约多少,冷服。

【主治】小儿伤冷,气喘涎多。

25935 瓜蒌汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【异名】青竹茹汤(《活人书》卷十七引《百问方》)、瓜竹汤(《医学入门》卷四)。

【组成】瓜蒌根四两(无黄脉者) 淡竹茹半斤

【用法】水三升,煮一升三合,去滓一日二三服,温与之。

【主治】①《伤寒总病论》:病未平复后劳动,致热气攻胸,手足拘急,搐搦如中风状。②《医学入门》:瘥后劳复,阴阳易病,卵肿疼痛,手足不能动。

25936 瓜蒌汤

【方源】《传信适用方》卷三引周子明方。

【异名】栝楼汤(《普济方》卷二八八)。

【组成】瓜蒌一个(去皮,将瓢与子锉碎) 没药一钱(研) 甘草半两(生,锉)

【用法】上药用无灰酒三升,煎至一升。分三服,温饵。

【主治】五发:发脑、发须、发眉、发颐、发背;痈疽;瘰、瘤、癌。

25937 瓜蒌酒

【方源】《妇人良方》卷五。

【异名】栝楼汤(《普济方》卷一八七)。

【组成】枳壳四个 厚朴 薤白各一两

瓜蒌一个 桂枝一两(有热除此一味)

【用法】上咬咀。水七升,煎取四升,去滓温服。

【主治】①《妇人良方》胸痹。②《普济方》胸痹疼痛,痰迷,心膈不利。

【备考】《普济方》有生姜半两。

25938 瓜蒌汤

《普济方》卷二十八。为《圣济总录》卷五十“栝楼汤”之异名。见该条。

25939 瓜蒌汤

《普济方》卷一三一。为《千金》卷十“栝楼汤”之异名。见该条。

25940 瓜蒌汤

【方源】《济阳纲目》卷三十三。

【组成】瓜蒌根(薄切,炙)五两

【用法】以水五升,煮取四升,随意饮。

【主治】消渴,小便多。

25941 瓜蒌汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】瓜蒌仁 枳壳 青皮 苏梗 桔梗

【用法】水煎服。

【主治】感冒胁痛,表已散,里气不和作痛,审知是燥痰结饮,胁痛。

25942 瓜蒌汤

《医部全录》卷四四九。为《准绳幼科》卷七“栝楼汤”之异名。见该条。

25943 瓜蒌汤

【方源】《产科发蒙》卷四引《赤水医案》。

【组成】瓜蒌仁六两 桑白皮 杏仁 半夏 桔梗 紫苏子 枳壳各一钱

【用法】水煎,温服。

【主治】产后咳嗽,痰不易出,左肋疼痛,内热气壅,不能伏枕。

25944 瓜蒌酒

《备急灸法》。为《圣济总录》卷一三一“一醉膏”之异名。见该条。

25945 瓜蒌酒

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】瓜蒌二个 穿山甲(酥炙)一钱

甘草六钱

【用法】将瓜蒌挖一孔，将药分装入瓜蒌内，水、酒各二斤，同煮至一大碗，临卧热服，渣捣烂，水、酒再煎，连服。将渣乘热敷满乳，用布捆住，盖被出汗。

【主治】乳痈，不论已破、未破。

25946 瓜蒌酒

【方源】《仙拈集》卷四引《补遗》。

【组成】瓜蒌（大者）一个

【用法】切顶，装入妇人头发一团，明矾三钱，将原顶盖口，黄泥包裹，火煨存性，去泥研末，黄酒送下。未溃者内消，将溃即出脓，收口，重者不过三服。

【主治】肿毒初起。

25947 瓜蒌散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【异名】栝楼散（《卫济宝书》），乳香散（《医方类聚》卷二三六引《徐氏胎产方》），瓜蒌乳香散（《医医偶录》卷一）。

【组成】瓜蒌末一两 乳香一钱

【用法】上为末。温酒调二钱，不以时服。

【主治】①《鸡峰》：产后骨节、肌肤热痛。②《卫济宝书》乳痈。③《妇人良方》产后吹奶

25948 瓜蒌散

【方源】《传信适用方》卷三。

【异名】栝楼散（《普济方》卷二八九）。

【组成】黄耆四两（锉） 皂角刺八两（红者，拍碎，锉） 甘草六两 牛膝二两 黄瓜蒌十个（锉）

【用法】上用蜜一斤，旋入铛内，炒至紫色，见风吹脆为末，有滓再炒为末。酒调下二钱。

【功用】内消恶肉，生好肉。

25949 瓜蒌散

【方源】方出《百一》卷六，名见《得效》卷六。

【异名】栝楼散（《普济方》卷二一〇）。

【组成】瓜蒌不拘多少

【用法】焙干，研为细末。每服三钱，热酒

调下，不能饮者，以米饮调下，频进数服。以通为度。

【主治】①《百一》：腹胀，小便不通。②《朱氏集验方》：五色痢疾，久不愈。

【临证举例】小便不通 魏邨知明州时，宅库之妻患此疾垂殆，随行御医某人，治此药令服，遂愈。

25950 瓜蒌散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】瓜蒌 贝母 荆芥

【用法】上为末。水煎，连三服。

【主治】欲出痘疹。

25951 瓜蒌散

【方源】《得效》卷七。

【异名】栝楼散（《普济方》卷一七六）。

【组成】白茯苓（去皮） 天花粉 宣连 白扁豆 人参（去芦） 石膏 甘草节 寒水石 白术（去芦） 猪苓各等分

【用法】上为末。每服二钱，热汤调服。

【功用】除热补虚。

【主治】盛壮之时，不自谨惜，恣情纵欲，年长肾气虚弱，惟不能房，多服丹石，真气既尽，石气孤立，唇口干焦，精液自泄，小便赤黄，大便干实，小便昼夜百十行。

25952 瓜蒌散

【方源】《仙传外科集验方》。

【组成】瓜蒌（新旧皆可，和椒炒，碎） 川椒二十粒 甘草三四寸（锉） 乳香五粒（如皂角子大）

【用法】上用无灰酒三碗，煮作一碗，去滓温服。其毒立散，未成即破，已成者，脓自出，皆不用手。

【主治】痈疽。

25953 瓜蒌散

《普济方》卷一三五。为《圣惠》卷十一“栝楼散”之异名。见该条。

25954 瓜蒌散

《普济方》卷四〇四。为《活人书》卷二十一“决明散”之异名。见该条。

25955 瓜蒌散

【方源】《医方类聚》卷二三八引《徐氏胎产方》。

【组成】瓜蒌根 薄荷干各等分

【用法】上为末。酒调服。先吃羊骨汁一碗，次服药后再吃葱丝羊羹，少时微汗出。

【主治】乳汁少。

25956 瓜蒌散

《丹溪心法附余》卷十六。为《集验背疽方》“栝楼散”之异名。见该条。

25957 瓜蒌散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】瓜蒌仁 青皮各一钱 石膏二钱 甘草节 没药 归尾 皂刺 金银花各五分 青橘叶（取汁）二匙

【用法】水、酒各半盏煎。空心服。

【主治】乳痈未溃者。

【加减】如已溃者，去石膏、没药、皂刺、金银花，用当归身，加人参、黄耆、川芎、白芍，煎服。

【方论选录】瓜蒌仁消毒，青皮疏肝，石膏清胃，甘草节行瘀，没药止痛，归尾破血，青橘叶解毒。

25958 瓜蒌散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【异名】栝楼散（《准绳·幼科》卷五）。

【组成】瓜蒌根二钱 白僵蚕一钱

【用法】慢火同炒老黄色，为末。每服二三分，薄荷汤下。

【主治】痘，热极生风，发搐。

25959 瓜蒌散

《准绳·疡医》卷四。为《瑞竹堂方》卷五“栝楼散”之异名。见该条。

25960 瓜蒌散

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】瓜蒌一个（半生半炒） 粉草一寸（半生半炙） 生姜一块（半生半煨）

【用法】上锉。用酒二碗煎服。少顷，痛不可忍，即搜去败乳，临卧再一服，顺所患处乳侧，卧于床上，令其药行故也。无生姜，用麦芽。

【功用】令败乳自退。

【主治】乳初结胀不消。

25961 瓜蒌散

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【异名】瓜蒌乳没散（《胎产新书·女科秘要》卷七）、瓜蒌乳香散（《胎产秘书》）。

【组成】瓜蒌一个（连皮捣烂） 生甘草五分 当归三钱 乳香五分（灯芯炒） 没药五分（灯芯炒） 金银花三钱 白芷一钱 青皮五分

【用法】水煎，温服。

【主治】一切痈疽，乳瘤。

25962 瓜蒌散

《医部全录》卷四二三。为《圣惠》卷八十三“栝楼煎”之异名。见该条。

25963 瓜蒌散

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】大瓜蒌（连皮捣烂）一枚 粉甘草二钱 红花七分

【用法】水煎服。

【主治】肝气燥急而胁痛，或发水泡。

【方论选录】瓜蒌为物，甘缓而润，于郁不逆，又如油之洗物，滑而不滞，此其所以奏功也。

25964 瓜蒌煎

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】瓜蒌二两 茯神 石斛 人参 肉苁蓉各一两 甘草 黄连 当归 五味子 丹参各半两 知母 胡麻各一两 地骨皮 薏苡各二两 蜜五合 生地黄汁一升 牛髓一合 淡竹叶五十片 生麦门冬汁五合 生姜汁一合

【用法】以水三升，煮地骨皮、薏苡、胡麻、淡竹叶四味，去滓取汁一升，和地黄汁、麦门冬汁、牛髓、蜜、姜汁等，入前药末，搅令匀，又煎成膏，入于铜器中。每服不拘时候，以粥饮调下半匙。

【主治】虚劳燥渴，四体虚乏，羸瘦。

25965 瓜蒌煎

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】瓜蒌一两(打碎) 当归 穿山甲 没药 乳香 甘草节各一钱

【用法】水、酒各一钟，煎服。

【主治】乳汁不通。

25966 瓜蒌膏

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】青嫩瓜蒌

【用法】洗净，切片捣烂，用布绞取汁二碗，入砂锅内，慢火熬至一碗，加真竹沥一小盏，白蜜一碗，再熬数沸，瓷罐收贮。每用一小盏，倾茶瓯中，白滚汤，不拘时候。

【主治】上焦痰火。

25967 瓜霜散

【方源】《时疫白喉捷要》。

【组成】西瓜霜一两 人中白一钱(火煨) 辰砂二钱 雄精二分 冰片一钱

【用法】上为细末，再乳无声，用瓷瓶紧贮。凡患白喉、喉蛾及一切喉痧等症，急用此药吹入喉内患处，连吹十数次；凡一切红肿喉风之症均可吹之；凡牙疳、牙疳及风火牙痛，牙根肿痛，舌痛诸病，用此散擦敷其上，吐出涎水，再擦再吐。

【主治】白喉，喉蛾及一切喉痧，红肿喉风。牙疳，牙疳及风火牙痛，牙根肿痛。舌痛诸病。

【加减】此药专治白喉，若非白喉，须去雄精一味。

【备考】本方方名，《疫喉浅论》卷下引作“冰瓜雄朱散”。

25968 瓜子仁汁

【方源】《圣济总录》卷一二九。

【组成】瓜子仁三合(与水六合同研，绞取汁) 当归(切，焙)一两(捣末) 蛇蛻一条(烧灰，研)

【用法】上将当归、蛇蛻研末和匀，分作二服，空心、日午用瓜子仁汁调下。下脓血即愈。

【主治】肠痈。壮热恶寒，微汗气急，少腹痛，小便涩，或大便如刀锥刺痛，或腹中已成脓。

25969 瓜子仁汤

《外科发挥》卷四。为原书同卷“薏苡仁汤”之异名。见该条。

25970 瓜子眼药

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】炉甘石(煨)十七两 梅片四钱三分 硼砂四钱 牛黄二分 琥珀八钱 珍珠(豆腐炙)二分 熊胆一钱 麝香二分 黄连二两(熬汁浸炉甘石)

【用法】上为极细末，过筛，炼老蜜和匀，制成瓜子型锭剂，重一分。用药沾凉开水少许，点于大眼角内，每日四五次。

【功用】明目退翳，消肿止痒。

【主治】风火目疾，老眼昏花，暴发火眼，红肿赤烂。

25971 瓜子眼药

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】炉甘石一斤(用黄连一两，熬水过滤，浸煨甘石，飞净去渣晒干，每甘石粉十两兑下药) 冰片一两 麝香二分 熊胆二钱(化水)

【用法】上为极细末，和匀，用荸荠六两榨汁，和冰糖二两化水，作成瓜子式，每个千重一分。以药蘸凉水点眼角。

【功用】消炎明目，退翳。

【主治】暴发火眼，气蒙昏花，红肿痛痒，流泪怕光，外障云翳，眼边红烂。

25972 瓜蒌子汤

《外科正宗》卷三。为《外科发挥》卷四“薏苡仁汤”之异名。见该条。

25973 瓜蒌子散

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】瓜蒌子(微炒) 连翘 何首乌 皂荚子仁(微炒) 牛蒡子(微炒) 大黄(微炒) 白螺壳 梔子仁 漏芦 牵牛(微炒) 甘草(生)各一两

【用法】上为细末。每服二钱匕，食后温酒调下。

【主治】瘰癧初肿，疼痛寒热，四肢不宁。

25974 瓜蒌仁汤

《医统》卷八十一。为《外科发挥》卷四“薏苡仁汤”之异名。见该条。

25975 瓜蒌仁汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】桔梗二两 枳壳一两 瓜蒌仁四两（另研） 半夏五钱

【用法】上为末，以姜汁糊为丸。每服五七十丸，用蜜糖汤送下，一日三次。

【主治】七情气郁成痰，气噎痞痛，喘闷。

【方论选录】法宜和气豁痰为要，故用桔梗利气，瓜蒌、半夏豁痰。

25976 瓜蒌仁汤

【方源】《古今医彻》。

【组成】瓜蒌霜 米仁各二钱 川贝母（去心） 天门冬（去心） 金银花 麦门冬（去心） 百合各钱半 甘草节三分 桑白皮（蜜炙） 桔梗各一钱

【用法】水煎服。

【主治】肺病。咳唾稠痰，腥秽如脓，黄赤间杂，甚则咳出白血，手掌干涩，皮肤不泽，脉数而疾。

【加减】久而不敛，加白及、阿胶，去桑白皮；寒月加款冬花、紫菀；夏月加生地、牡丹皮。

25977 瓜蒌实丸

【方源】《医方类聚》卷一〇六引《济生》。

【组成】瓜蒌实（别研） 枳壳（去瓤，麸炒） 半夏（汤泡七次） 桔梗（炒）各一两

【用法】上为细末，姜汁打糊为丸，如梧桐子大，每服五十丸，食后用淡姜汤送下。

【主治】噎膈。胸痞，胸中痛彻背，喘急妨闷。

【方论选录】①《丹溪心法附余》：此方瓜蒌仁润肺降痰，枳壳破滞气，半夏豁痰燥湿，桔梗开膈载药，可谓善治痞闷喘急矣。痰因火动，加黄连尤妙，丹溪云：胸中痞，须用枳实炒黄连是也。②《医方考》：痰随气上，亦随气下，故瓜蒌、枳壳、桔梗皆下气药也；

痰以湿生，必以燥去，故半夏者，燥湿之品也。或问桔梗为诸药之舟楫，浮而不沉者也，何以下气？余曰：甘者恋膈，苦者下气，轻者上浮，苦者下降，此药之性也。桔梗甘而苦，为阳中之少阴，故初则恋膈，久则下气矣。

25978 瓜蒌实丸

《杏苑》卷四。为《丹溪治法心要》卷二“瓜蒌丸”之异名。见该条。

25979 瓜蒌根丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】瓜蒌根（薄切，以人乳汁拌蒸，竹沥拌晒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大，噙化；或如绿豆大，每服一百丸，米饮送下。

【主治】水亏火炎而成之三消。

25980 瓜蒌根汤

【方源】《妇人良方》卷二十一引《集验》。

【组成】瓜蒌根四两 麦门冬 人参各三两 生干地黄 甘草各二两 土瓜根五两大枣二十枚

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取二升半，分三服。

【主治】产后血渴。

25981 瓜蒌根汤

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】瓜蒌根 白茯苓 甘草（炙）各半两 麦门冬（去心）二钱半

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盂半，加大枣二枚（擘破），煎至七分服。

【主治】下痢。冷热相冲，气不和顺，本因下虚，津液耗少，口干咽燥，常思饮水，毒气更增，烦躁转甚。

25982 瓜蒌根汤

【方源】《治疫全书》卷四。

【组成】瓜蒌根 葛根 石膏各二钱 人参 香附各一钱

【用法】水煎，温服。

【主治】风温。喘渴多睡，痰气喘促等。

25983 瓜蒌煎丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】瓜蒌二个 杏仁一两二钱 半夏一两

【用法】上件药,并依法修事,先将瓜蒌瓤,用银石器内熬成膏,次入杏仁再熬,候冷,入半夏、瓜蒌皮末,为丸,如梧桐子大。每服三十丸,煎人参汤下,临卧服;食前亦得。

【主治】肺经攻注,面生风疮,上喘气促,咳嗽。

25984 瓜贝去瘀汤

【方源】《不居集》下集卷十一。

【组成】瓜蒌 贝母 当归 紫菀 梔子 丹皮 青皮 穿山甲 前胡 甘草

【主治】咳嗽吐红痰,夹瘀血。

25985 瓜贝养荣汤

《温疫论》(张以增校本)卷上。即原书(石楷校本)同卷“葵贝养荣汤”。见该条。

25986 瓜蒂二陈汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】甜瓜蒂二十粒 姜半夏 广橘红各钱半

【用法】以水煎成,冲生莱菔汁二瓢。

【功用】涌吐痰涎。

【主治】痰症类伤寒。寒痰在胸中,胸满气冲,憎寒壮热,恶风自汗,胸中郁痛,饥不能食,使人揉按之,反多涎唾,甚或下利日十余行,右脉微滑,左脉反迟。

25987 瓜蒂三味散

【方源】《外台》卷四引《许仁则方》。

【组成】瓜蒂七枚 丁香七枚 赤小豆七枚

【用法】上为末。取如大豆,分吹两鼻孔中。须臾当出黄水,正如煮黄柏汁,及出黄虫。亦可以新汲水和一方寸匕,与患人服,或利或吐,吐利所出亦如煮黄柏汁。

【主治】急黄,已进秦艽牛乳二味汤药,服后不觉病退,渐加困笃,势如天行最重者。

【宜忌】不可更服诸冷物。

25988 瓜蒂牙消散

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】藜芦一钱 瓜蒂三钱 牙消二钱 脑 麝各少许。

【用法】上为细末。吹少许入鼻。得嚏则愈。

【主治】伤寒头痛不止。

25989 瓜蒂甘遂丸

《明医指掌》卷八。为《医学入门》卷七“瓜矾散”之异名。见该条。

25990 瓜蒂吹鼻散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】瓜蒂二七枚 赤小豆二七粒 秫米二七粒 丁香二七粒

【用法】上为细散。取如豆大纳鼻中,痛搐之。须臾当出黄汁,或从口中出升余即愈。若病重者,如一豆不愈,即复纳鼻中,即效。

【主治】黄疸。面目爪甲皆黄,心膈躁闷。

25991 瓜蒂神妙散

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】瓜蒂 焰消 雄黄 川芎 薄荷叶 道人头 藜芦各一分 天竺黄一钱半(如无,以郁金代之)

【用法】上为细末。含水,鼻中搐一字。

【主治】头目昏眩,偏正头痛。

【备考】方中瓜蒂原缺,据《奇效良方》补。

25992 瓜蒌大麦饼

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】瓜蒌一斤(绞汁) 大麦面六两

【用法】合作饼。炙熟熨之。病愈即止,勿令太过。

【主治】中风咽斜。

【方论选录】本方以瓜蒌为主。瓜蒌甘苦寒,用其润燥开结,荡热涤痰,舒肝郁,缓肝急之性,以为外治。

25993 瓜蒌贝母饮

【方源】《增订胎产心法》卷五。

【组成】瓜蒌实 土贝母(去心) 甘草节各三钱

【用法】水煎服。

【主治】乳房结核,脓肿。

【加减】已溃,加忍冬一两。

25994 瓜蒌内托散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】瓜蒌一个(半生半炒) 人参 归尾 没药各五钱 甘草一钱

【用法】黄酒二碗,煎一碗,食前服。

【功用】活血消毒。

【主治】痢发于腿外侧者。

25995 瓜蒌半夏丸

【方源】《丹溪心法附余》卷五。

【组成】瓜蒌 杏仁(去皮尖) 枯矾各一两 半夏(汤泡)二两 款冬花一两半 麻黄(去根节)一两

【用法】上为末,用瓜蒌汁、生姜自然汁,用水糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后、临卧淡茶汤下。

【主治】咳嗽,喘满。

【宜忌】忌生冷咸酸。

25996 瓜蒌半夏丸

《医统》卷四十三。即《济生》卷二“半夏丸”。见该条。

25997 瓜蒌必效散

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】瓜蒌一个(捣烂) 金银花 当归 生甘草各五钱 乳香(去油) 没药(去油)各一钱(一方有白芷、青皮各一钱)

【用法】水煎服。

【主治】乳痈。初起肿痛发于肌表,肉色焮赤,其人表热或憎寒壮热,头痛烦渴。

25998 瓜蒌托里散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】黄瓜蒌一个(杵碎) 忍冬藤 乳香各一两 苏木五钱 没药三钱 甘草一钱

【用法】用酒三碗,煎二碗,空心、日午、临睡分三服。或以此为末,酒糊丸,弹子大,朱砂为衣。细嚼,用当归酒送下。

【功用】疮疡未成易消,已成易溃,既溃则生肌。

【主治】疮疡毒盛,打扑损伤。

25999 瓜蒌竹茹汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】瓜蒌根 青竹茹

【用法】用水煎,调烧焜散在内服。

【主治】阴阳易。热气上冲,胸中烦闷,手足挛拳,摘搦如风状。

26000 瓜蒌杏连丸

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷五引《丹心》。

【异名】瓜连丸(《医学入门》卷七)。

【组成】瓜蒌仁 杏仁 黄连各等分

【用法】上为末,以竹沥、姜汤煮糊为丸服。

【主治】酒痰嗽。

26001 瓜蒌牡蛎散

《普济方》卷一四二。为《金匱》卷上“栝楼牡蛎散”之异名。见该条。

26002 瓜蒌青黛丸

【方源】方出《丹溪心法》卷二,名见《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】瓜蒌仁一两 青黛三钱

【用法】蜜为丸。含化。

【主治】酒嗽。

26003 瓜蒌乳没散

《胎产新书》。为《傅青主女科·产后编》卷下“瓜蒌散”之异名。见该条。

26004 瓜蒌乳香散

《胎产秘书》卷下。为《傅青主女科·产后编》卷下“瓜蒌散”之异名。见该条。

26005 瓜蒌乳香散

《医医偶录》卷一。为《鸡峰》卷十六“瓜蒌散”之异名。见该条。

26006 瓜蒌枳壳汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】瓜蒌(去壳) 枳壳(麸炒) 桔梗 抚芎 苍术(米泔浸) 香附 杏仁(去皮尖) 片芩(去朽) 贝母(去心)各一钱 砂仁五分 陈皮一钱 木香(另研)五分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,水煎,入竹沥、姜汁少许,磨木香调服。

【主治】痰郁。

26007 瓜蒌枳实汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】瓜蒌(去壳) 枳实(麸炒) 桔梗(去芦) 茯苓(去皮) 贝母(去心) 陈皮 片芩(去朽) 山梔各一钱 当归六分 砂仁 木香各五分 甘草三分

【用法】上锉一剂,生姜煎,入竹沥、姜汁少许,同服。外用姜渣揉擦痛处。

【主治】痰结咯吐不出,胸膈作痛、不能转侧,或痰结胸膈满闷作寒热气急,并痰迷心窍不能言语者。

【加减】痰迷心窍,不能言语,加石菖蒲,去木香;气喘,加桑白皮、苏子。

26008 瓜蒌枳实汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】瓜蒌仁 枳实 贝母 桔梗 片芩 陈皮 山梔 麦门冬(去心) 茯苓(去皮) 人参 当归 苏子各等分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜一片,竹沥、姜汁少许,水煎同服。

【主治】痰火发痉。

26009 瓜蒌桂枝汤

《普济方》卷一三二。为《金匱》卷上“栝楼桂枝汤”之异名。见该条。

26010 瓜蒌犀角汤

《医统》卷四十二。为方出《千金》卷十二、名见《普济方》卷一八八“犀角汤”之异名。见该条。

26011 瓜蒌薤白汤

《医醇膳义》卷四。为《金匱》卷上“栝楼薤白半夏汤”之异名。见该条。

26012 瓜蒌瞿麦丸

《济阳纲目》卷九十二。为《金匱》卷中“栝楼瞿麦丸”之异名。见该条。

26013 瓜消拔毒丹

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】西瓜消一两 雄黄 石膏(煨)各六钱 地榆(炒) 蓬砂各五钱 藜芦(炒) 乌梅肉(炒炭)各五钱 僵蚕(炒)二钱 冰片 牛黄各一钱

【用法】上为末收贮。凡外疡初破,毒未化

者,四围以围药围之,将此药用麻油调涂疮孔,外以提脓化毒膏贴之,早晚一换。

【主治】痈疡初破。

26014 瓜霜紫雪丹

【方源】《湿温时疫治疗法》引方省庵方。

【组成】白犀角 羚羊角 青木香 上沉香各五钱 寒水石 石膏 灵磁石 飞滑石各五两 玄参 升麻各一两六钱 飞朱砂五钱 生甘草八钱 公丁香二钱 麝香一钱二分 金箔一两 西瓜消八钱 冰片三钱

【用法】照《苏恭方》紫雪。

【主治】时疫血热生风,热深厥深,手足反冷,咽干舌燥,头颈动摇,口噤齿齧,腿脚挛急,时发瘵痼,甚或睾丸上升,宗筋下注,少腹里急,阴中拘挛,或肠燥,有似板硬,按之痛甚,弯曲难伸,冲任脉失营养,当脐上下左右按之坚硬,动跃震手,虚里穴及心房亦必动跃异常。

26015 瓜蒌根桂枝汤

《幼幼集成》卷二。为《金匱》卷上“栝楼桂枝汤”之异名。见该条。

26016 瓜蒌半夏白酒汤

《医学金针》卷三。为《金匱》卷上“栝楼薤白半夏汤”之异名。见该条。

26017 瓜蒌薤白半夏汤

《济阳纲目》卷七十二。为《金匱》卷上“栝楼薤白半夏汤”之异名。见该条。

26018 瓜蒌薤白白酒汤

《冯氏锦囊·杂证》卷七。为《金匱》卷上“栝楼薤白白酒汤”之异名。见该条。

用

26019 用效润肠丸

【方源】《方症会要》卷一。

【组成】麻仁二两 郁李仁一两 陈皮三钱 当归梢一两五钱 枳壳三钱

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】老人及虚弱人便秘。

乐

26020 乐令汤

【方源】《易简方》。

【组成】黄耆 人参 橘红 当归 肉桂 细辛 前胡 甘草 茯苓 麦门冬 芍药各二两 附子 熟地黄各一两 半夏 远志各一两半

【用法】每服一盏半，加生姜五片，枣子一个，同煎，食前服。

【主治】下血过多，发为寒热。

26021 乐令建中汤

【局方】卷五。为《千金》卷十九“乐令黄耆汤”之异名。见该条。

26022 乐令黄耆汤

【方源】《外台》卷十七引《深师方》。

【组成】黄耆二两 当归三两 乌头三两（炮，去皮尖，四片，入蜜炙之，令黄色） 桂心三两 生姜四两 蜀椒二两（汗） 人参二两 芍药二两 大枣二十枚（劈） 茯苓二两 远志二两（去心） 半夏四两（洗）

【用法】上切。以水一斗五升，煮取四升，分服八合，日三夜再。

【功用】补诸不足。

【主治】虚劳少气，胸心痰冷，时惊惕，心中悸动，手足逆冷，体常自汗，五脏六腑虚损，肠鸣风湿，荣卫不调百病。又治风里急。

【宜忌】忌生葱、羊肉、饴、猪肉、冷水、大醋。

26023 乐令黄耆汤

【方源】《千金》卷十九。

【异名】乐令建中汤（《局方》卷五）、黄耆汤（《普济方》卷二三一）。

【组成】黄耆 人参 橘皮 当归 桂心 细辛 前胡 芍药 甘草 茯苓 麦门冬各一两 生姜五两 半夏二两半 大枣二十枚

【用法】上咬咀。以水二斗，煮取四升，一服五合，日三夜一服。

【功用】①《千金》：补诸不足。②《医方

集解》：退虚热，生气血。

【主治】①《千金》：虚劳少气，胸心痰冷，时惊惕，心中悸动，手脚逆冷，体常自汗，五脏六腑虚损，肠鸣，风湿荣卫不调百病。又治风里急。②《岭南卫生方》：岭南瘴毒，发热烦躁，引饮，大便不通，小便赤涩，或狂言内热，神昏不省人事。

【加减】加蜀椒一两、乌头五枚，名“乐令大耆汤”。

26024 乐令大耆汤

《千金》卷十九（注文）引《胡洽方》。即原书同卷“乐令黄耆汤”加蜀椒一两、乌头五枚。见该条。

冯

26025 冯夷琼浆

《解围元藪》卷四。为原书同卷“推云酒”之异名。见该条。

26026 冯氏秘传膏药

【方源】《青囊秘传》。

【组成】青槐嫩枝二百寸 香麻油一斤 鸡蛋四枚

【用法】先将麻油煎滚，入青槐枝熬至黄色，捞去；再入鸡蛋熬至枯，再捞去；再熬至滴水成珠，入铅粉一斤，收膏。

【主治】一切无名肿毒。

汉

26027 汉椒丸

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】汉椒一两（去目及闭口者，炒出汗） 猪牙皂角一两（去黑皮，酥炙黄，去子） 干姜三分（炮，锉） 甜葶苈三分（隔纸炒紫色）

【用法】上为末，用枣肉为丸，如梧子大。每服二十丸，以桑白皮汤送下，不拘时候。

【主治】咳嗽喘急，坐卧不得。

26028 汉椒散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】汉椒一两（去目及闭口者，微炒去

汗) 桂心三分 侧子一两(炮裂,去皮脐) 麻黄三分(去根节) 当归三分 木香三分

【用法】上为细散。每服半钱,以温酒调下,不拘时候。

【主治】风走注疼痛,及白虎历节风。

26029 汉防己丸

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】汉防己一两 商陆一两 麻黄一两(去根节) 赤芍药一两 桑根白皮一两半(锉) 甜葶苈一两(隔纸炒令紫色) 蛤蚧一对(头尾全者,涂酥炙微黄) 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为末。炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以生姜汤送下,粥饮下亦得,不拘时候。

【主治】肺脏气壅,面目四肢浮肿,喘促咳嗽,胸膈满闷烦热。

26030 汉防己丸

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】汉防己一两 干姜半两(炮裂,锉) 甜葶苈三分(隔纸炒令紫色) 猪牙皂荚一两(去黑皮,涂酥炙令焦黄,去子)

【用法】上为末。以枣肉为丸,如梧桐子大。每服十丸,煎桑根白皮汤送下,不拘时候。

【主治】肺气喘急,坐卧不得。

26031 汉防己丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】汉防己一两 苦葫芦子半两(微炒) 泽泻三分 陈橘皮半两(汤浸去白瓢,焙) 甜葶苈一两(隔纸炒令紫色)

【用法】上为末。炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以粥饮送下,一日三次。

【主治】咳嗽不愈,面目浮肿。

【备考】本方原名汉防己散,与剂型不符,据《医方类聚》改。《普济方》引作“防己丸”。

26032 汉防己丸

【方源】《圣惠》卷五十三。

【异名】防己丸(《圣济总录》卷五十九)。

【组成】汉防己三分 猪苓三分(去黑皮) 栝楼根一两 赤茯苓一两 桑根白皮一两半(锉) 白术半两 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 郁李仁一两半(汤浸,去皮,微炒) 甜葶苈一两(隔纸炒令紫色)

【用法】上为末。炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,于食前以温水送下。

【主治】消渴。已觉津液耗竭,身体浮气如水病者。

26033 汉防己丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】防己丸(《圣济总录》卷四十八)。

【组成】汉防己一两 陈橘皮半两(汤浸,去瓤,焙) 甜葶苈三分(微炒) 猪牙皂荚一两(去黑皮,涂酥炙黄)

【用法】上为末,煮枣肉为丸,如梧桐子大。每服十丸至十五丸,食后、临卧煎桑白根皮汤送下。

【主治】肺气咳嗽喘促,坐卧不得。

26034 汉防己汤

《活人书》卷十七。为《金匱》卷上“防己黄耆汤”之异名。见该条。

26035 汉防己汤

《普济方》卷三三九。为《外台》卷三十三引《小品方》“葛根汤”之异名。见该条。

26036 汉防己汤

《保命歌括》卷九。为《金匱》卷中“木防己汤”之异名。见该条。

26037 汉防己散

【方源】方出《外台》卷十一引《肘后方》,名见《普济方》卷一七九。

【组成】栝楼六分 黄连六分 汉防己六分 铅丹六分(研)

【用法】上为散。每食后取酢一合,水二合,和服方寸匕,一日三次。当强饮水,须臾恶水,不复饮矣。

【主治】①《外台》引《肘后方》:消渴,肌肤羸瘦,或虚热转筋,不能自止,小便数。②

《普济方》：消渴，饮水过多，不知厌足。

26038 汉防己散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】汉防己一两 芎藭一两 桂心一两 麻黄一两（去根节） 附子一两（炮裂，去皮脐） 赤茯苓一两 桑根白皮一两（锉） 赤芍药一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服。不拘时候。

【主治】肝风湿痹，四肢拘挛急痛，心胸壅，气喘促。

26039 汉防己散

【方源】《圣惠》卷六。

【异名】防己汤（《圣济总录》卷四十九）。

【组成】汉防己一两 赤茯苓一两 白前一两 桔梗一两（去芦头） 川大黄一两（锉碎，微炒） 陈橘皮一分（汤浸，去白瓤，焙） 木通一两（锉） 紫菀一两（去苗） 紫苏茎叶一两 天门冬一两（去心） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏壅热，烦躁喘粗，不思饮食。

26040 汉防己散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】汉防己一两 海蛤半两 滑石一两 葵子半两 猪苓半两（去黑皮） 瞿麦半两

【用法】上为细散。每服二钱，食前浓煎木通汤调下。

【主治】膀胱实热，小便不通。

26041 汉防己散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】汉防己半两 桂心三分 防风三分（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 生地黄酒二斤（研，绞取汁）

【用法】上为末。入地黄汁中，更入水一大盏，调令匀，入银器中盛，于甑中蒸半日取出；每服三合，以温水下之，不拘时候。

【主治】伤寒热毒逼心，谵语见鬼神不安。

26042 汉防己散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】汉防己三两 葛根三两（锉） 桂心二两 麻黄二两（去根节） 甘草一两（炙微赤，锉） 防风一两（去芦根） 赤芍药一两 独活一两 羚羊角屑一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加入生姜半分，煎至六分，去滓放温，开口灌之，不拘时候。

【主治】中风口噤不开，筋脉拘急，体热烦闷。

26043 汉防己散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】汉防己一两 麻黄一两半（去根节） 赤芍药三分 芎藭三分 黄芩一两 防风三分（去芦头） 羌活三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 当归三分（锉，微炒） 石膏一两半 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 半术半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】贼风。身体拘急，舌强难言，手足不遂。

26044 汉防己散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】汉防己一两 茯神一两 白鲜皮一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 白蒺藜一两（微炒去刺） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 黄芩一两 青羊角屑一两 羚羊角屑一两 沙参一两（去芦头） 秦艽一两（去苗） 麻黄一两（去根节） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热毒风攻头面，壅闷，口鼻干，皮肤痒痒。

26045 汉防己散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】汉防己一两 羚羊角屑三分 人参三分(去芦头) 荆芥二分 芎藭三分 半夏半两(汤洗七遍去滑) 赤茯苓三分 旋覆花半两 防风半两(去芦头) 前胡一两(去芦头) 细辛半两 麦门冬一两(去心焙) 枳实三分(麸炒微黄) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】上焦痰攻。头目眩晕，心神烦乱。

【宜忌】忌怕糖、羊肉。

26046 汉防己散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】汉防己一两 杜若一两 防风一两(去芦头) 细辛半两 虎掌半两(汤洗七遍，生姜汁拌炒令黄) 附子半两(炮裂，去皮脐) 桂心半两 甘草一分(炙微赤，锉) 芎藭三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】头风目眩，水浆不下，食辄呕吐，即眩倒。

26047 汉防己散

【方源】《圣惠》卷三十。

【异名】防己汤(《圣济总录》卷三十二)。

【组成】汉防己三分 猪苓三分(去黑皮) 海蛤一两 陈橘皮一两(汤浸去白瓤，焙) 木香半两 白术半两 桑根白皮三分(锉) 赤茯苓三分 槟榔一两 紫苏茎叶一两 木通一两(锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：虚劳，四肢浮肿，喘

息促，小便不利，坐卧不安。②《圣济总录》：伤寒或痢疾后，身体浮肿，喘息促急，小便不利，坐卧不安。

26048 汉防己散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】汉防己二分 桑根白皮一两(锉) 枳壳三分(麸炒微黄，去瓤) 赤茯苓三分 紫苏茎叶一两 木通二分(锉) 大腹皮一两(锉) 黄芩半两 半夏半两(汤洗七遍去滑) 甘草半两(炙微赤，锉) 前胡一两(去芦头)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加入生姜半分，煎至六分，去滓温服，一日三、四次。

【主治】乳石发动，痰结不食，身体浮肿，腹胁满闷，喘息气粗。

26049 汉防己散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】汉防己一两 麻黄一两(去根节) 赤茯苓一两 丹参一两 牛膝一两(去苗) 独活一两 黄耆一两(锉) 防风一两(去芦头) 人参半两(去芦头) 犀角屑一两 木香半两 桂心一两 石膏一两 半夏半两(汤洗七遍去滑) 槟榔一两 杏仁一两(汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄) 川大黄半两(锉碎微炒) 桑根白皮一两(锉) 附子一两(炮裂，去皮脐) 枳壳半两(麸炒微黄，去瓤)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气，缓弱顽痹，心神烦闷，语言窘涩，不欲饮食。

26050 汉防己散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】汉防己三分 赤茯苓一两 酸枣仁三分(微炒) 防风半两(去芦头) 桑根白皮一两(锉) 桂心半两 薏苡仁三分 羌活三分 赤芍药三分 麻黄三分(去根

节) 羚羊角屑三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气风毒痹挛，肿痛烦闷。

26051 汉防己散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】汉防己三分 桑根白皮一两(锉) 泽泻半两 赤茯苓半两 木通三分(锉) 郁李仁三分(汤浸去皮尖，微炒) 猪苓三分(去黑皮) 槟榔一两 紫苏茎叶一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】湿脚气，通身浮肿，小便不利，气壅烦闷，腹肋连膀胱虚胀，上气喘促，坐卧不得。

26052 汉防己散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】汉防己半两 赤茯苓三分 槟榔一两 桑根白皮三分(锉) 木通三分(锉) 猪苓三分(去黑皮) 紫苏茎叶三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加入生姜半分，葱白二七寸，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气肿满，小便不利，喘促不食。

【备考】本方方名，《普济方》引作“防己散”。

26053 汉防己散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】汉防己三分 桑根白皮一两(锉) 木通一两(锉) 赤茯苓一两 泽漆半两 百合一两 甜葶苈三分(隔纸炒令紫色) 郁李仁三分(汤浸，去皮，微炒)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏气壅，闭隔不通，致令面目浮肿，咳嗽喘急，坐卧不安。

26054 汉防己散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】汉防己一两半 石膏四两 桂心一两 人参一两(去芦头) 前胡一两(去芦头) 白术一两

【用法】上为散，每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸膈间支饮，数吐下之不愈。

26055 汉防己散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】汉防己一两 羚羊角屑一分 人参三分(去芦头) 桂心三分 芎藭三分 半夏半两(汤洗七遍去滑) 赤茯苓三分 旋覆花半两 防风半两(去芦头) 白术半两 细辛半两 麦门冬半两(去心) 赤芍药三分 羌活三分 枳实三分(麸炒微黄) 甘草半两(微炙赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】化痰，利胸膈，除头目旋眩，令思饮食。

【主治】风。

26056 汉防己散

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九二。

【组成】汉防己 桑根白皮(锉) 苍术(锉，炒) 郁李仁(去皮尖) 羌活各一两

【用法】上为散。每服五钱，水一盞，煎至五分，去滓温服，如人行十里再服之。

【主治】风水面肿，脉浮而紧者。

26057 汉防己散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【异名】防己散(《准绳·类方》卷二)。

【组成】汉防己一两 黄耆一两(锉) 桂心一两 赤茯苓二两 甘草半两(炙微赤，锉) 桑根白皮一两(锉)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盞，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】皮水肿。如裹水在皮肤中，四肢习习然动。

26058 汉防己散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【异名】防己汤（《圣济总录》卷八十）。

【组成】汉防己半两 桑根白皮一两（锉）木通一两（锉） 赤茯苓一两 郁李仁半两（汤浸去皮，微炒） 泽漆半两 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 百合一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加大枣四枚，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】水气，咳逆上气，四肢浮肿，坐卧不安。

26059 汉防己散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】汉防己一两 木通一两（锉） 桑根白皮一两（锉） 赤茯苓一两 甘草半两（炙微赤，锉） 大腹皮半两（锉） 牵牛子一两（微炒）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白七寸，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】水气，四肢肿满，上气喘急，小便秘涩。

26060 汉防己散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】汉防己三分 麦门冬三分（去心皮） 桑根白皮一两（锉） 赤茯苓一两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 地骨皮三分 前胡一两（去芦头） 黄耆一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺病，喘急咳嗽脓血，心神烦闷，咽干多渴。

26061 汉防己散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】汉防己三分 赤茯苓一两 桑根白皮一两（锉） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 槟榔一两 木通一两（锉） 川大黄一两（锉碎，微炒） 紫苏茎叶一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白七寸，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人头面及四肢浮肿，心胸满闷，喘息，小便赤涩。

26062 汉防己散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】汉防己半两 当归半两（锉，微炒） 赤茯苓三分 大腹皮三分（锉） 前胡三分（去芦头） 木通三分（锉） 赤芍药半两 桑根白皮一两（锉） 桂心半两 羚羊角屑半两 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 槟榔一两 川大黄一两（锉碎微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妇人血分，四肢浮肿，喘促，小便不利。

26063 汉防己散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】防己汤（《圣济总录》卷一五七）。

【组成】汉防己三分 桑根白皮一两（锉） 木香一分 大腹皮三分（锉） 紫苏茎叶一两 赤茯苓一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠通身浮肿，喘促，小便涩。

26064 汉防己散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】汉防己一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 猪苓一两（去黑皮） 商陆二分 桑根白皮一两（锉） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时

候。

【主治】产后风虚，虚壅上攻，头面浮肿。

【宜忌】《济阴纲目》：泻肺利水之急剂，此药虚人戒服。

26065 汉防己散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】汉防己 防风（去芦头） 川升麻 桂心 芎藭 羚羊角屑 麻黄（去根节）各半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一二沸，量儿大小，分减温服，不拘时候。

【主治】小儿中风，口喎斜僻。

26066 汉防己散

【方源】《博济》卷一。

【组成】汉防己 万州黄药各一两

【用法】上为细末。每服一钱，水一盞，小麦二十粒，同煎七分，食后温服。

【主治】咯血。

【备考】本方方名，《普济方》引作“防己散”、“黄药散”。

26067 汉防己散

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】官桂（去皮） 陈皮各一两（去白） 汉防己五钱 杏仁（汤浸，去皮尖）一两 紫苏 羚羊角（镑） 细辛各七钱半

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盞，加生姜三片，煎七分，去滓温服，一日二次。

【主治】五噎。

【宜忌】忌酸味生冷滑物。

26068 汉防己散

《普济方》卷一九四。即《千金》卷二十一引褚澄方“汉防己煮散”。见该条。

26069 汉防己散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】防己三两 猪苓两半 泽泻两半 商陆两半

【用法】上为散。生姜汤煎三钱，去滓温服。

【主治】浮肿，脉沉者。

【方论选录】产后离蓐太早，姿饮积湿而浸

渍中外，遍满皮肤，故周身浮肿谓之水肿。防己泻血分之水，猪苓泻气分之水；泽泻泻膀胱之水，商陆泻肠胃之水。为散，姜汤煎，使水湿顿去，则肠胃廓清而经络通畅，岂有遍身浮肿之患乎。此邪盛攻实之剂，亦急则治标之法。凡体虚邪气不实者，慎勿轻试。

26070 汉防己膏

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】汉防己一两 野葛一两半 犀角屑一两 莽草二两半 川乌头一两（去皮脐） 吴茱萸一两 川椒一两（去目） 丹参一两半 踯躅花二两 川升麻一两 干姜一两 附子一两（去皮脐） 白芷二两 当归一两 桔梗一两 巴豆一两（去皮心） 雄黄一两（细研） 蛇衔一两 防风一两（去芦头） 鳖甲一两

【用法】上锉细，用绵裹，以醋二升，浸一宿，以猪脂三斤，慢火煎令药色黄，膏成，绞去滓，盛瓷盒中。每取摩所患处。

【主治】脚气风毒，筋脉拘急，肿满疼痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“防己膏”。

26071 汉防己煮散

【方源】《千金》卷二十一引褚澄方。

【异名】防己煮散（《外台》卷二十引《古今录验》）。

【组成】汉防己 泽漆叶 石苇 泽泻各三两 白术 丹参 赤茯苓 橘皮 桑根白皮 通草各三两 郁李仁五合 生姜十两

【用法】上为粗散。以水一升半，煮散三方寸匕，取八合，去滓顿服，一日三次。取小便利为度。

【主治】水肿上气。

【备考】本方方名，《普济方》引作“汉防己散”。

立

26072 立马乌

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】定粉一钱 瓦粉一钱 密陀僧半钱 龙骨半钱 轻粉三钱 朴消一钱 铅白霜一钱 韶脑半两 花碱六钱 玉霜一两三钱

【用法】上为细末，先用白土黄丹敷过髭地，候干，将前项药水调，再上髭鬓上，用纸裹。候少时，其髭便黑，用新水洗去。

【功用】乌髭。

26073 立马消

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】川斑蝥(大者，川产者佳，去翅足，糯米拌炒) 全蝎尾各一百五十个 蜈蚣三十条 乳香(去油) 没药(去油) 各四钱 真蟾酥三钱(酒浸，研膏) 冰片 麝香各二钱

【用法】上为细末，用麻黄四两熬膏为丸，如梧桐子大，朱砂为衣，略晒干，瓷瓶密贮。凡遇发背、痈疽、肿毒，每用一丸，如势大者用二三丸，乳细掺于太乙膏。如疮未破，贴上以热手摸百余下，次日即消；如疮已破，先以薄棉纸盖疮上，再贴奏功。

【主治】发背，痈疽，肿毒。

26074 立马消

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】大斑蝥(去翅足，元米炒) 全蝎尾各一百五十个 蜈蚣三十条(炙) 土狗三十条(炙) 磁石(煨) 僵蚕(炙) 丁香(另研) 各四钱 蟾酥三钱 冰片 麝香各二钱

【用法】上为末，掺于膏上贴之，以手摸百余下。即消。

【功用】提毒败脓。

【主治】痈疮。

26075 立止丸

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】肥皂荚(去皮子，取肉) 草乌头(不去尖) 各一两 乳香(研) 一钱

【用法】上为末，薄面糊为丸，如梧桐子大。每用一丸，入虫孔中，涎出即吐。

【主治】风蛀牙痛。

26076 立止散

【方源】《普济方》卷二八一。

【组成】冬瓜皮(烧灰)

【用法】用小油调，搽疮上。立止。

【主治】牛皮癣。

26077 立正散

【方源】《普济方》卷三八一。

【组成】人中白 枯白矾各一分 铜绿一分 轻粉一分 麝香少许

【用法】上为细末。先洗净瘡，然后上药，每日三次二次贴之。

【主治】马疳、牙疳。

26078 立生丹

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】母丁香一两二钱 沉香四钱 茅苍术一两二钱 明雄黄一两二钱

【用法】上为细末，用蟾酥八钱，铜锅内加火酒一小杯，化开，入前药末为丸，如绿豆大。每服二丸，小儿一丸，温水送下。被蝎、蜂螫者调涂。

【主治】伤暑、霍乱、痧证、疔、痢、泄泻、心痛、胃痛、腹痛、吞吐酸水、及一切阴寒之证、结胸、小儿寒痉。蝎、蜂螫。死胎不下。

【宜忌】孕妇忌之。

【方论选录】此方妙在刚燥药中加芳香透络。蟾乃土之精，上应月魄，物之浊而灵者，其酥入络，以毒攻毒，而方又有所监制，故应手取效耳。

26079 立圣丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】枳壳(去瓢，麸炒) 二两半 五倍子(去灰土) 黄耆(蜜炙黄，锉) 槐花 槐荚各二两 猪垂蹄甲二十一枚(以上并各炒焦，拣令净) 木贼二两半 何首乌(米泔浸软，以竹刀切作片子，焙干，于石臼内捣末，和入诸药) 皂子各三两 臭橘一百枚 刺猬皮一枚 皂荚针四两 槿藤子三枚

(以上四味各用藏瓶一枚盛,用盐泥固济,各留一穴出烟,以炭火烧,守候逐件烟尽,退火,各放冷取出研细)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸至一百丸,空心温酒送下。

【主治】五痔及肠风下血。

26080 立圣丹

《普济方》卷三五六。为《百一》卷十八引朱炳方“立圣鹤顶丹”之异名。见该条。

26081 立圣散

【方源】《幼幼新书》卷五引张涣方。

【组成】干蝎梢七个(为末) 腻粉(末)一钱 干蜘蛛一个(去口足。先以新竹于火上炙,取竹沥一蚬壳许,浸蜘蛛一宿,炙令焦,取末)

【用法】上为极细末。每服一字,用乳汁调,时时滴口中。

【主治】小儿口噤。

26082 立圣散

【方源】方出《幼幼新书》卷五引《吉氏家传》,名见《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】金头蜈蚣一个 青州蝎梢四个 白僵蚕七个 瞿麦二钱

【用法】上为末。用一字许吹鼻内,啼时可医,更用薄荷水下一字在口。

【主治】小儿脐风锁口。

26083 立圣散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】黄连(去须)一斤

【用法】上为细末。每服一钱,空心、食前浓煎荆芥蜜汤调下。

【主治】肠风下血,或如鸡肝,日夜无度,全不入食,通体黄肿者;尿血。

26084 立圣散

【方源】《普济方》卷四十九引《余居士选奇方》。

【组成】橡斗子(实以盐,烧存性)

【用法】上为细末。早、晚用。

【功用】乌须发。

26085 立圣散

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【异名】立胜散(《疑难急症简方》卷二)。

【组成】鸡肝二个

【用法】用酒一升,煮熟食之。

【主治】妊娠下血不止。

26086 立圣散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效方》。

【组成】海带一两 白梅各等分

【用法】上为末。揩牙。少顷便开。

【主治】中风牙关紧急,口不能开。

26087 立圣膏

【方源】《幼幼新书》卷二十三引张涣方。

【组成】人乳半合 黄矾粟大 白矾枣大 石胆豆大

【用法】上为末,绵裹,纳乳汁中浸一宿,有味,慢火熬膏。涂口。如鼻疮,滴入。有肿处,以三棱针刺去血后涂。

【主治】小儿急疳侵蚀。

26088 立圣膏

【方源】《百一》卷十。

【组成】巴豆 齐州半夏各三七粒

【用法】将半夏轻捶,每粒分作四片,巴豆剥去心膜,于银铜石器内,用米醋三碗,文武火熬尽醋为度,用清醋微洗过,研为膏子。每患缠喉风,或喉闭,或痢疾,用一鞞耳,以生姜自然汁一茶脚化下。甚者,灌药少时,自然吐出恶涎如鱼冻相似,立愈。

【主治】缠喉风,喉闭,痢疾。

26089 立竹汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】立死竹(从地高二尺以上刮去皮,细劈如算子)三七茎

【用法】用水二盂,煎七分,去滓顿服。

【主治】诸鱼骨鲠在喉中。

26090 立行饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】官桂三钱 干姜 广木香 玄胡索各一钱 牛膝 蓬术 归尾 山楂各一钱五分

【用法】酒煎，空心热服。

【主治】闭经，因食生冷所致。

26091 立安丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】破故纸(生) 续断 木瓜干 牛膝(酒浸) 杜仲(去皮，锉，姜制，炒丝断) 各一两 萆薢二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤、盐酒任下。

【功用】温肾填精，强健腰脚。

①《三因》：补肾，强腰脚。②《证治汇补》：暖肾添精。③《全国中药成药处方集》(沈阳方)：健腰温肾，舒筋壮骨。

【主治】①《三因》：五种腰痛。脚气。②《全国中药成药处方集》(沈阳方)：腰腿疼痛，足膝无力，肾囊湿痒，四肢拘急，精神不振，形容憔悴，筋骨疼痛，腰肾虚寒。

26092 立安丸

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】川椒 淡豆豉各七十粒 巴豆(去壳油) 斑蝥六个(去翅)

【用法】上为末，醋糊为饼子，用米醋一碗，将饼子煮醋干，搜和为丸，如绿豆大。每服十五丸，空心冷盐水送下；更量虚实，加减小数服。

【主治】小肠气攻腹作疼。

26093 立安丸

【方源】《便览》卷一。

【组成】故纸(酒洗过，青盐炒)二两 川续断一两五钱 木瓜一两半 川萆薢二两 杜仲(姜汁炒断丝) 牛膝(酒浸)一两半 胡桃肉(汤浸，去皮)四两

【用法】研为膏，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心盐汤、盐酒任下。

【功用】壮筋骨。

【主治】虚老腰痛。

【备考】《证治宝鉴》有小茴香。

26094 立安丸

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】牛膝(去芦)四两 杜仲(盐炒)四两 破故纸(炒)四两 黄柏二两(酒炒) 大茴香(炒)二两

【用法】上为末，炼蜜为丸。淡盐汤送下。

【功用】补肾，止腰疼。

【主治】①《明医指掌》：腰痛。②《类证治裁》：老人虚人肾亏腰痛，不能转侧。肾虚湿着，足心及踝骨热痛者。

26095 立安饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】杜仲(盐水炒) 黄柏(炒) 破故纸(炒) 人参 菟丝子 牛膝各一钱五分 白茯苓 当归 川芎 生地各二钱

【用法】水煎，临服加盐三分。

【主治】肾虚腰痛。

26096 立安散

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】穿山甲不拘多少(用温水洗去原着肉皮膜，好醋醋浸，炙令焦)

【用法】上为细末，每发时，烂铤薤白一茎，抄药一钱，食后热酒调下。

【主治】脾疼正发。

26097 立安散

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】麻黄九两(去根不去节，炒焦黄) 石膏一两半(生用) 罂粟壳一两(蜜炒) 苦葶苈半两(微炒) 藿香半两 人参(去芦头)一分

【用法】上为细末。每服二钱，食后、临卧白沸汤调下。

【主治】一切咳嗽喘急，坐卧不宁。

26098 立安散

【方源】《医方大成》卷九引《济生》。

【组成】杜仲(去粗皮，锉，炒令丝断) 橘核(取仁，炒)各等分

【用法】上为末。每服入盐少许，食前温酒调服。

【主治】腰痛。

【备考】《医方类聚》引《济生续方》本方

用法：每服二钱。

26099 立安散

【方源】《普济方》卷一五八。

【组成】皂角一条（不蛀者，去黑皮并子）
江子三粒（去壳油） 半夏三粒 杏仁三粒
（去皮尖，炒焦黄色）

【用法】每服半钱，生姜汁调，放手掌中，
口衔吃。立效。

【主治】暴嗽。

【宜忌】忌炙煨油膩物。

26100 立安散

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】当归一两 官桂一两 玄胡索
（炒）一两 杜仲（姜炒）一两 小茴（炒）
一两 木香五钱 牵牛一钱（半生半熟）

【用法】上为末。每服二匙，空心陈酒调下。

【主治】气滞腰痛，并闪挫腰痛、肾虚腰痛。

26101 立极汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】党参四钱 附子六分 当归二钱
茯苓三钱 白术一钱 茅术一钱 破故纸一
钱五分 杜仲二钱 川断二钱 独活一钱
牛膝二钱 红枣五枚 生姜三片

【用法】苡仁一两，煎汤代水，煎诸药服。

【功用】补土燥湿。

【主治】着痹。

26102 立苏散

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】蝎蜥九个（去毒） 马蔺花二钱
（水浸一宿） 木香一钱 没药半钱 胡椒
（为末）半钱

【用法】上为末。麝香酒下。

【主治】小肠气。

【备考】方中胡椒用量原缺，据《普济方》
补。

26103 立住散

【方源】《普济方》卷六十五引《德生堂
方》。

【组成】荆芥 盐麸子 草茛各等分

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞，煎七

分，去滓温漱，吐去涎。

【主治】牙疼。

26104 立应丸

【方源】《普济方》卷六十引《十便良方》。

【组成】南星一个（刮去皮。一方炮，地埋
一夜出火毒） 白僵蚕七个

【用法】上挖南星心空作孔子，入蚕于内，
湿纸裹，文武火煨熟取出，等分为末，粥饮
为丸，如梧桐子大。如不丸，只用绵裹药末
吞之亦便。如开口不得，揩齿上亦妙。

【主治】缠喉风，急喉闭。

26105 立应丸

【方源】《百一》卷十。

【组成】白僵蚕 白矾各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸。含化。

【主治】缠喉风，急喉痹。

26106 立应丸

【方源】《神效名方》。

【组成】干姜一两（炮，另末） 百草霜一
两 巴豆（连皮，炒用）一两 杏仁一两
（同巴豆和皮炒黑色，杵为泥后，入霜研用）

【用法】用黄蜡四两，熔开蜡，次入前四味，
用铁器搅匀为丸，如梧桐子大。每服三五丸，
甘草汤送下；白痢，食前用干姜汤送下；若
水泻，温水送下。

【主治】脏腑泄痢，脓血不止，腹中疼痛。

26107 立应汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【异名】立应散（《鸡峰》卷四）。

【组成】大腹（煨，和皮用） 木香 诃黎
勒（煨，用皮） 防己 紫苏茎 羌活（去
芦头） 芍药 干木瓜 杉木节（锉） 沉
香各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，
煎至八分，去滓，空心、日午、夜卧温服。

【主治】干湿脚气，冲注四肢。

【备考】方中杉木节，《鸡峰》作“松木
节”。

26108 立应汤

【方源】《外科百效》卷五。

【组成】蔓荆子 防风 荆芥 苦参 苍耳 黄荆子 牛蒡子 胡麻仁 甘枸杞 余粮石 白芷梢 苍术 连翘 土茯苓 羌活 独活各三钱

【用法】水煎，早空心服。

【主治】白瘰癧并梅毒。

26109 立应汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【异名】立应四物汤（《妇科玉尺》卷四）。

【组成】熟地黄 当归各三钱 白芍二钱 五灵脂（半生半炒） 川芎各一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后血晕。产后气血暴虚，血随气上，迷乱心神，眼前生花，甚者闷绝口噤，神昏气冷。

26110 立应散

【方源】方出《证类本草》卷十九引《日华子本草》，名见《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】鹅粪

【用法】外敷。

【主治】诸毒蛇虫咬伤。

26111 立应散

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】井泉石 车前子 滑石各半两 葶苈（纸上炒）一分 海金沙一钱

【用法】上为散。每服一钱匕，食前新汲水调下。未通再服。

【主治】膀胱热结，小便不通。

26112 立应散

【方源】《幼幼新书》卷十五引张涣方。

【组成】石榴花（取末，焙干） 干葛根（为末） 蒲黄（研）各半两

【用法】上为细末。每服半钱，取生地黄汁调下。

【主治】小儿伤寒，血热妄行，鼻衄不止。

26113 立应散

《鸡峰》卷四。为《圣济总录》卷八十三“立应汤”之异名。见该条。

26114 立应散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】杨梅根皮（厚者，去粗皮）一两 川芎三钱 麝香少许（别研）

【用法】上为细末，研匀。每用一字，先含温水一口，次用药于两鼻内搐之。涎出痛止为效。

【主治】风虫牙疼。

26115 立应散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】麝香半钱（别研） 乳香半钱（别研） 黄柏末一钱 黄丹一钱（瓦上飞过，别研） 白矾半两（瓦上飞过，别研） 地龙粪一两（瓦上焙干，别研）

【用法】上为末。温水洗疮口，用绵挹干，用药掺患处，一日三次。

【主治】下疳疮。

26116 立应散

【方源】《普济方》卷七十八引《卫生家宝》。

【组成】鹅不食草（净洗） 香白芷（洗） 当归（去芦头，洗） 雄黄（别研） 川附子（炮）各等分 踯躅花减半

【用法】上为细末，入麝香少许和匀。含水搐鼻内，一日三次，食后少空用。去尽浊涕眼泪为度。

【主治】内外障翳，昏涩多泪，及暴赤眼，一切目疾。

26117 立应散

【方源】《百一》卷十六引朱保义方。

【组成】连翘 甘草（炙） 黄芩 赤芍药 川当归 滑石各半两 地胆半两（去翅足头，以糯米一合同炒赤黄色，去米） 白牵牛 土蜂窠一分（蜜水洗，饭上蒸） 川乌尖二十一个（生用）

【用法】上为细末。每服一大钱，浓煎木通汤调下，临睡服，次夜再一服。服药次日，毒随小便下，其色如血。疮已破者，先用云母膏贴定，然后服药。

【主治】①《百一》：瘰癧久不愈者。②《直指》：发瘰。

【宜忌】有孕不得服，或素来气血虚弱者亦不可服，大忌毒物。

【备考】方中白牵牛用量原缺。《直指》有川芎。

26118 立应散

【方源】《百一》卷八。

【组成】高良姜一分 五灵脂半两

【用法】上为细末。每用一钱半，以醋一茶脚调匀，用百沸汤投半盏，连滓急服。

【主治】急心痛。

26119 立应散

【方源】方出《百一》卷八，名见《医方类聚》卷九十二引《济生续方》。

【组成】玄胡索不拘多少（新瓦上炒微黄，不可焦）

【用法】上为细末。每服三钱，酒一盏，煎至七分服。不能饮者，以陈米饮调下，不拘时候；以酒调亦得。

【主治】妇人血刺心痛。

26120 立应散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】草乌头一个（拣光净极大者，去皮脐，生用） 香白芷一两

【用法】上为细末。每日二次，擦。如有热涎吐之，少时用温水漱。

【主治】齿痛。

26121 立应散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】大硼砂半铢

【用法】上为细末。用笔管吹入喉中。

【主治】咽喉肿痛，语声不出者。

26122 立应散

《医方类聚》卷一六六引《吴氏集验方》。为《杨氏家藏方》卷二十“必效散”之异名。见该条。

26123 立应散

【方源】《元戎》。

【组成】麝香少许 蝎梢二钱 金头蜈蚣（分开晒干）

【用法】上为细末。鼻内搐，随左右用之。

【主治】急慢惊风。

26124 立应散

《元戎》。为《医说》卷三引《类编》“一服饮”之异名。见该条。

26125 立应散

【方源】《普济方》卷三八一。

【组成】红枣三十个 信少许

【用法】上将红枣去核，却入信末少许，裹定，烧存性，放冷，为细末。每用少许，干粘牙疳疮上。

【主治】小儿走马疳。

26126 立应散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】盐二两 生姜一两

【用法】上同炒令转色。三岁半钱，童便半盏，煎三分，去滓温服。

【主治】小儿干霍乱，不吐不泻，腹胀如鼓，心胸痰壅。

26127 立应散

【方源】《玉机微义》卷十五引郭氏方。

【组成】寒水石一两半（煨） 花蕊石 龙骨 黄丹 没药各半两 黄药子七钱半（一方加白及 乳香 轻粉）

【用法】上为细末。如一切金刃刀镰伤者，用药敷上，绢帛扎之，不作脓；血疮、脓水，干贴。

【功用】生肌定疼。

【主治】金疮血出不止，并诸疮久不生肌。

26128 立应散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】橡斗子一个 甘草三钱

【用法】上为细末。每服二钱，熟水调下。

【主治】冷泪。

26129 立应散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】花斑蝥二十八个（同糯米炒黄，去米及头足） 僵蚕（炙） 黑丑（炒，头末）各四钱

【用法】上为末。每服一钱，五更初用好酒调服之。待恶物从小便中出，如未尽出，次

早再一服，必毒尽为妙；次用白糯米稀粥补之；后次再灯心汤调琥珀末一钱送下。以涤小便内恶毒，除根永不再发。

【主治】瘰癧。

26130 立应散

【方源】《济阴纲目》卷二。

【组成】香附三两（一半生，一半炒） 棕皮一两（烧存性）

【用法】上为细末。每服五钱，酒与童便各半盏，煎七分，不拘时候温服。

【主治】妇人血海崩败。肠风下血。

【加减】如肠风，不用童便。

26131 立应散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】棕灰三两 香附三两（醋炒）

【用法】上为散。每服三钱，米饮下。

【主治】血崩，脉弦涩者。

【方论选录】多怒多郁之人，肝气逆而不能摄血，故血不归经，崩下不止焉。香附调肝解郁，能行血中之气以调经脉；棕灰涩血固下，能止妄行之血以定血崩。为散，米饮调下，务使胃气调和，则肝郁自解，而天癸如度，血不妄行，何有崩下之患哉。

26132 立应膏

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】生柏叶（焙干）二两 糯米（焙干）三两

【用法】上为细末，冷水调如糊。涂肿处。频换即愈。

【主治】汤火所伤，皮肉已破烂者。

26133 立应膏

【方源】《古今医鉴》卷十五引刘水山方。

【组成】象皮（烧灰） 红枣（烧灰） 针末 黄柏末 熟皮烟 黄丹（研） 轻粉（研） 大风子（去壳）各等分

【用法】上为细末，炼香油调膏。涂癣上。

【主治】风癣疮。

26134 立灵散

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】炉甘石一钱（打成小块，放银罐内，

将火消拌匀，用火煅红取出，研极细，飞过，复研，以细绝为度） 冰片 麝香各一分 熊胆二分 蕤仁三分（去油净）

【用法】上为细末。点翳膜上。

【主治】目生翳膜。

26135 立金汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】杜仲五钱 故纸四钱 草薢三钱 半 当归一钱半 续断二钱 牛膝二钱 狗脊一钱 木瓜一钱半 炙草五分 胡桃肉一钱

【用法】酒二碗煎，加盐下，连二服。

【主治】腰痛。

【宜忌】戒房事。

26136 立定散

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】大皂角（一个，劈开去子，入巴豆在内，缚定，炙焦黄，去巴豆，为末）一钱 半夏（姜制） 杏仁各一钱（香油煮黄色）

【用法】上为末。柿饼蘸吃，百沸汤下。

【主治】哮喘。

26137 立胜散

【方源】《三因》卷十六。

【异名】立胜煎（《中医眼科学讲义》）。

【组成】黄连 黄柏 秦皮（去粗皮） 甘草等分

【用法】上为细散。每服四钱，水一盂，加大枣一枚，灯心七茎，煎数沸，去滓。以新羊毫笔蘸刷眼，候温，即用手沃之。

【主治】①《三因》：风毒攻眼，及时眼隐涩羞明肿痛。②《中医眼科学讲义》：风牵偏视。

【备考】《中医眼科学讲义》本方用法：加水 300 毫升，煎 30 分钟后，过滤浓缩到 150 毫升，再加缓冲溶液，以消除刺激性。

26138 立胜散

《直指》卷二十五。为《鸡峰》卷二十七“神效秘传立胜散”之异名。见该条。

26139 立胜散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】藜芦 猪牙皂角（去皮，炙） 白矾（生） 雄黄（研）各一分 细辛 蝎梢各半钱

【用法】上为末。每用一豆许，噙温水，随患左右鼻内搐。

【功用】宣泄诸阳毒气，行经络郁滞。

【主治】牙齿肿闷疼痛。

26140 立胜散

《普济方》卷一三〇。即《圣济总录》卷二十一“白术汤”。见该条。

26141 立胜散

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】胆矾一钱 轻粉少许

【用法】上为细末。用浆水半盏，小油一二点，打散灌之。

【主治】小儿咽喉作呀呷声不止。

26142 立胜散

《疑难急症简方》卷二。为《卫生宝鉴》卷十八“立圣散”之异名。见该条。

26143 立胜煎

《中医眼科学讲义》。为《三因》卷十六“立胜散”之异名。见该条。

26144 立神丹

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】茴香二两（用斑蝥二十一个，去头足翅，同炒香熟，去斑蝥十四个，留七个用） 香附子四两（去毛，入盐少许，同炒）

【用法】上为细末，用醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，盐汤或温酒任下，不拘时候。

【主治】下部膀胱疝气、小肠气等疾。

26145 立神丹

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】香附子不拘多少（去毛炒，再去毛，用无灰酒煮尽）

【用法】上为细末，薄荷酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，或三十丸，空心、日午盐汤或酒送下。

【主治】小肠气。

26146 立退丸

《眼科龙木集》。为原书“秘方琥珀膏”之异名。见该条。

26147 立效丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】铅丹（炒）半钱 草乌头一枚（炮裂；去脐皮） 巴豆三粒（去皮心膜，出油尽，研）

【用法】上三味，先捣乌头为末，与二味同研极匀，以面糊为丸，如绿豆大。每服一丸，煎陈粟米、甘草、乌梅汤放温服送下。

【主治】水泻不止。

26148 立效丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】豆豉四两（焙干） 川乌头二两（生，去皮脐尖） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 石膏（生）各一两 地龙（去土，炒） 葱子（生）各半两

【用法】上件为细末，葱汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生葱、茶清送下。

【主治】头疼不可忍者。

26149 立效丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】黄蜡（滤去滓，用浆水煮）八两 蛤粉四两

【用法】上件每两作十五丸，用前蛤粉为衣养药。每服一丸，胡桃瓤半个细嚼，临卧温水送下。

【主治】肺虚膈热，咳嗽气急，胸中烦满，肢体倦疼，咽干口燥，渴欲冷饮，肌瘦发热，减食嗜卧，音声不出。

26150 立效丸

【方源】《医方类聚》卷七十三引《经验秘方》。

【组成】真杏仁（烧灰存性） 蜜蜡

【用法】上溶蜡，入杏仁灰末为丸，如绿豆大。纳入蛀牙孔处。

【主治】蛀牙疼。

26151 立效丸

【方源】《得效》卷七。

【组成】百药煎

【用法】上为末，每服三钱，煮稀白粥搅匀服之。面糊为丸，米饮送下亦可。

【主治】痔。

26152 立效丸

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】蟾酥一钱 朱砂二口 龙脑一字 麝香五分

【用法】上为细末，用头首孩儿乳汁为丸，如黄米大。每服二丸，痢肿，温酒送下；鼻衄，芥子汤送下；心痛、小肠气，茴香汤送下；小便不通，雄鼠粪煎汤送下；泻血、咳嗽，生姜汤送下；小儿惊风，沙糖水送下；白痢，干姜汤送下；伤食，随所伤物送下；小儿泻，芝麻煎汤送下；走注疼痛，茶送下；噎食，米汤送下；小儿热风，薄荷汤送下；遍身疼痛，醋汤送下；人着鬼祟，桃李汤送下；浑身黄肿，木瓜汤送下；大小便不通，墨水送下；产后遍身疼痛，温酒乳香汤送下；产后发寒热，蜜水送下；产后发寒，煎金银花汤送下；胎死不下，童便、荆芥汤送下；经络不行，酒煎当归散汤送下；鼻衄不止，口噤水搐一丸；心痛，醋汤送下；脐下虚冷，温酒送下；浑身虚肿，气不通，酒送下；脐下水气，煎葶苈汤送下；若四肢冷，背强，空心酒送下三四丸，如人行四五里，再服四五丸，然后吃盐葱白粥后，盖覆出汗。脾胃虚弱，煎枳壳汤送下；血山崩，火烧蚕子灰，冷水送下；血迷，煎血见愁汤送下，或温酒丁香汤送下。

【主治】痢肿，鼻衄，心痛，小肠气，小便不通，泻血，咳嗽，小儿惊风，白痢，伤食，小儿泻，走疼走痛，噎食，小儿热风，遍身疼痛，人着鬼祟，浑身黄肿，大小便不通，产后发寒热，胎死不下，经络不行，鼻衄不止，心疼，脐下虚冷，浑身虚肿，脐下水气，四肢冷，背强，脾胃虚弱，血山崩，血迷。

26153 立效丸

【方源】《普济方》卷二七四。

【组成】雄黄一两 雌黄五钱 没药半两 巴豆一两（去皮，不出油，另研） 乳香五钱 木香一两

【用法】上为细末，面粉为丸，如梧桐子大。食后每服五丸，夏月清茶送下，冬月温水送下。

【主治】浸淫疮，疼痛动脏腑。

26154 立效丸

【方源】《奇效良方》卷十三。

【组成】木香 当归（酒浸） 橡斗子各一两 青蒿子（烧存性）四两 乌梅（焙干） 黄连（酒炒） 五倍子各二两 枳壳（去瓢）一两半（萝卜汁浸，炒）

【用法】上为细末，用神曲糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心用米汤送下，一日二三次。先须服丁香脾积丸。

【主治】痢疾。

26155 立效丸

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】桑皮 清夏 川芎 紫苏各六钱七分 白及四钱 橘红 薏仁各六钱七分 杏仁一两七分 麻黄一两三钱四分 甘草一两七分 米壳（半生半制）三两三钱四分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，开水送下。

【功用】清痰理气，止咳定喘。

【主治】一切风寒咳嗽，急气带痰，痰中带血。

26156 立效丹

【方源】《百一》卷十一。

【组成】附子

【用法】用面裹煨熟，去皮脐，葱自然汁为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心煎葱酒送下。吃少温粥、蒸饼压之。

【主治】脚膝软弱甚者。

【备考】又用生附子，去皮脐，为末，以葱白涎为丸，如梧桐子大，晒焙干，每服十五丸至二十丸，温酒盐汤送下。

26157 立效丹

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】艾二两 葱头一握 生姜一两五钱

【用法】共捣烂。用布包蘸极热烧酒搽患处，以痛止为度。

【主治】寒湿两腿作痛。

26158 立效丹

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】黄连五钱 槟榔 巴豆 木香各一钱 淡豉一两

【用法】上为末，水为丸，如小豆大，朱砂为衣。强人服下十五丸，弱人十丸。

【主治】痢疾初发。

26159 立效丹

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】朱砂三两 明雄黄 硼砂各一两八钱 梅冰 当门子各九钱 火消六钱 草茺 牛黄各三钱

【用法】上为细末，瓷瓶紧收，勿令泄气。每用分许，芦管吹入鼻内。若卒倒气闭重证，则七窍及脐中均可放置。凡暑月入城市，抹少许于鼻孔，可杜秽恶诸气。

【主治】诸痧中恶，霍乱五绝，诸般卒倒急暴之证。

26160 立效方

【方源】《圣惠》卷八十八。

【异名】立效散（《圣济总录》卷一七七）。

【组成】雄黄一分（细研） 梔子仁十枚 赤芍药半两

【用法】上为细散，研入雄黄令匀。每服半钱，以温水调下。

【主治】小儿尸疰，邪气入腹疔痛。

26161 立效方

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【异名】立效散（《济阴纲目》卷十四）。

【组成】梗米 糯米各半合 葛苳子一合（并淘净） 生甘草半两

【用法】上为细末。煎汁一升，去滓，分作三服。立下。

【功用】下乳汁。

26162 立效方

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷三引《丹心》。

【异名】立效散（《杂病源流犀烛》卷二十七）。

【组成】葛苳子 糯米各一合

【用法】上为细末。水一碗搅匀，加甘草末一字煎，频频呷服。

【主治】乳汁不行。

26163 立效汤

《圣济总录》卷九十七。为《局方》卷八“立效散”之异名。见该条。

26164 立效汤

【方源】《幼幼新书》卷三十二引张涣方。

【异名】立效散（《卫生总微》卷十五）。

【组成】川大黄（炮，铤） 干桃柳叶（洗，焙干）各一两 梔子仁 赤芍药各半两（以上捣罗为细末） 朱砂（细研，水飞）一两 麝香（研） 雄黄（研）各一分

【用法】上件都拌匀。每服一钱。用蜜汤调下。

【主治】小儿尸疰病。

26165 立效汤

《普济方》卷一四六。为《外台》卷二引《范汪方》“豉鼠粪汤”之异名。见该条。

26166 立效汤

【方源】方出《奇方类编》卷下，名见《仙拈集》卷三。

【组成】益母草一两 归身八钱 知母五钱 川芎三钱 旱三七三钱 陈棕灰三钱

【用法】用生酒二钟，煎一钟，食前服。

【主治】血崩。

26167 立效汤

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】常山 槟榔 茯苓 官桂 甘草各三钱 小黑豆四十九粒

【用法】酒、水共四碗，慢火煎两碗，当晚以一碗先服，盖暖而睡，留一碗至次日将发两个时辰前，顿顿服。盖暖卧，待疰至，即

至亦轻，亦有当日即愈者。

【主治】疔，不论久近。

【宜忌】忌荤。

26168 立效汤

【方源】《会约》卷十九。

【组成】生黄耆三钱 白术一钱半 当归身二钱 小川芎五分 白芷 苍术各一钱二分 净银花一钱半 茯苓 甘草各一钱 车前子（去壳）八分

【用法】水煎服。大疮悉愈，或小者复出，多服断根。

【主治】脓疮，遍身疮痛，脓汁盈满。

【加减】痛甚，加生地二钱。

26169 立效饮

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】净黄连一两 北细辛（去叶）二钱半 玄明粉二钱

【用法】上锉细，或晒或焙，为末，仍用玄明粉乳钵内杵匀。每用一字，干点患处，或以一钱新汲井水调涂疮上。儿小者畏苦，不肯点咽，用蜜水调抹烂处及舌上令其自化。咽痛，茶清调下。

【主治】口内牙根舌上发疮作痛，致语言、饮食不便；咽痛。

26170 立效饮

【方源】《普济方》卷三八八。

【异名】立效散（《婴童百问》卷八）。

【组成】木通 甘草 王不留行 竹胡荽 滑石 海金沙 山梔子 槟榔各等分

【用法】上咬咀。每服一钱，水半盏，煎三分，去滓服。

【主治】小儿诸淋不通，茎中疼痛。

26171 立效散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】川芎 当归 玄胡索 丹皮 姜黄 大茴香 红花各一钱五分 桂心 秦艽 赤芍各八分

【用法】临服加煮酒一钟。

【主治】妇人为房事所伤，阴户内胀疼痛难

忍。

26172 立效饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】白茯苓 车前子 木通各二钱 黄连一钱八分 泽泻 苍术各一钱

【用法】加灯心三十茎，水煎服。

【主治】脾经湿热作泻。

26173 立效饮

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】黄连二钱（一半生用，一半酒炒） 黄芩二钱 芒消一钱 薄荷叶三钱 大黄三钱（一半生用，一半酒炒） 连翘一钱 梔子二钱 甘草五分

【用法】水煎，食后温服。

【主治】时行赤眼症。一切实热，里急后重，脏毒下血，酒毒，膈热，肚疼。

26174 立效饮

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】川当归四两 炒甘草二两 赤芍药一两 酸榴皮一两 炒地榆一两 罂粟壳四两（炒黄）

【用法】上为细末。每服二钱，水一杯，煎至七分，去滓，空心、饭前温服。小儿酌量大小加减服之。

【主治】诸般恶痢，或赤或白，或脓血相杂，里急后重，脐腹绞痛，或下五色，或如鱼脑，日夜无度，或噤口不食。

【宜忌】忌食生冷，油腻、鱼腥。

26175 立效散

【方源】方出《千金》卷二十五，名见《普济方》卷三〇六。

【组成】马鞭梢长二寸 鼠屎二七枚

【用法】上药合烧为末。以猪膏和，涂之。

【主治】马啮人，及踰人作疮，毒肿热痛。

26176 立效散

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一八九。

【异名】龙骨散（《普济方》卷一八九）。

【组成】龙骨一两

【用法】上为散。以水一大盏，煎至半盏，

温温尽服之。

【主治】①《圣惠》：鼻衄。②《普济方》：咯吐血不止。

26177 立效散

《普济方》卷三四引通真子秘方。为原书同卷“芎归汤”之异名。见该条。

26178 立效散

【方源】《局方》卷八。

【异名】立效汤（《圣济总录》卷九十七）。

【组成】山梔子（去皮，炒）半两 瞿麦穗一两 甘草（炙）三分

【用法】上为末。每服五钱至七钱，水一碗，入连须葱根七茎、灯心五十茎、生姜五七片，同煎至七分，时时温服，不拘时候。

【主治】下焦结热，小便黄赤，淋闭疼痛，或有血出，及大小便俱出血者。

26179 立效散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】地龙（去土，炒，为末）一两 麝香（研）少许

【用法】上药再同研匀。每服半钱匕，渗纸上作纸拈，于灯上烧，随痛左右熏鼻。

【主治】偏头痛。

26180 立效散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】新山梔子不拘多少（去壳）

【用法】上药焙干，捣破，再焙，又研细，如油出成团，擘开，猛火焙干，手擦细罗取散，瓷器盛之。发时以新汲水调下二钱匕。

【主治】饮酒过度，肠风泻血，及风热泻血，出如红线。

26181 立效散

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】乳香一钱 灯花七枚

【用法】上为散。每服半字，涂奶母乳头上令服。

【主治】小儿夜啼。

26182 立效散

《圣济总录》卷一七七。为《圣惠》卷八十八“立效方”之异名。见该条。

26183 立效散

【方源】《中藏经·附录》

【组成】玄胡索 当归 官桂各等分

【用法】上为细末。每服二钱匕，酒调下。

【主治】腰痛。

26184 立效散

【方源】《幼幼新书》卷九引《王氏手集》。

【组成】藿香 蝎（略炒）各二两 麻黄（去节）一两 细辛半两

【用法】上为末。每服一字半钱至一钱，藿香汤调下。或先服至圣丸，次服此药。

【主治】小儿急慢惊风。

26185 立效散

【方源】方出《医方类聚》卷七十六引《卫生十全方》，名见《朱氏集验方》卷九引黎居士方。

【异名】槟粉散（《普济方》卷三〇〇）。

【组成】槟榔（烧存性）

【用法】上为末，入少水银粉。敷之。

【主治】口吻边生疮，浸淫不愈。

26186 立效散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】风化石灰一升

【用法】以酢醅三升，慢火煮令酢尽，更炒令干，细研。每服一钱，以棕灰末一钱，用温酒一盏同调匀，空心服之，药后复更进酒一盏以助药力。

【主治】崩漏下血不止。

26187 立效散

【方源】《续本事》卷三。

【组成】川芎 川楝子 青皮 舶上茴香 桃仁 黑牵牛各一两（焙）

【用法】上焙干，为细末。每服二钱，无灰酒一盏，煎至八分盏，温服。

【主治】①《续本事》：疝气。②《医统》：膀胱湿热相乘，阴囊肿胀，大小便不利。

26188 立效散

《卫生总微》卷十五。为《幼幼新书》卷三十二引张涣方“立效汤”之异名。见该条。

26189 立效散

《洪氏集验方》卷三。为原书同卷“比金散”之异名。见该条。

26190 立效散

【方源】《普济方》卷二九六引《卫生家宝》。

【组成】鼠粘子草根三两(碎切,熟捣) 柏皮一两

【用法】上为末。腊月猪脂封贴。

【主治】翻花痔疮,及一切久不瘥诸恶毒疮。

26191 立效散

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】芦荟(别研) 白矾(枯,研) 枣肉(焙干,为末) 芫荇仁(微炒,为末) 甘草(炙,为末) 各一钱 朱砂(别研) 麝香(别研) 乳香(别研) 各半钱

【用法】上为末。每用少许,贴牙烂处。

【主治】小儿牙疳齿烂,血出溃臭。

26192 立效散

《保命集》卷下。为方出《千金》卷四,名见《局方》卷九“芎藭汤”之异名。见该条。

26193 立效散

【方源】《普济方》卷六十四引《十便良方》。

【组成】酒 酥各一升 干姜十两(末)

【用法】以酒一合、酥一匕、姜末二匕相和,食后服,一日三次。

【主治】咽伤语声不彻;肺痛。

26194 立效散

【方源】《普济方》卷一八八引《十便良方》。

【组成】伏龙肝二两

【用法】新汲水一大盏,淘取汁,入蜜一匙,搅匀服之。

【主治】吐血、鼻衄不止。

26195 立效散

【方源】《普济方》卷一九〇引《十便良方》。

【组成】熟艾二弹子大 牛皮胶一两(炙黄燥)

【用法】以煎了豉汁一大盏,同煎至七分,去滓,分二次温服,不拘时候。

【主治】大衄。

26196 立效散

【方源】《集验背疽方》。

【组成】皂角刺半两(拣去枯者,细锉,炒赤色为度,须耐久炒) 甘草二两(合生用) 瓜蒌五个(去皮取肉并仁,捣研,炒黄,干者不必炒) 乳香半两(别研和入) 没药一两(别研和入)

【用法】上为末。每服二钱,酒调下。乳痈与沉痈汤间服。

【主治】发背,诸痈疽,瘰癧,乳痈。

26197 立效散

【方源】《百一》卷八。

【组成】零陵香(净洗,软火炙燥) 芫荇(洗,锉碎,火铍上炒燥) 各等分

【用法】上为末。先以炭一块为细末,搯痛处,连牙床并搯净,以药擦痛处。

【主治】牙痛,及老人风肿牙疼,小儿疳牙、走马牙疳。

26198 立效散

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】白附子(炮) 橘红各二两

【用法】上为细末。每服一钱,米饮下,未发以前三两时辰连进一二服。

【主治】疟。

26199 立效散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】大川楝子五个(炮,去核) 青皮(去瓤,切) 舶上茴香一两(炒) 木通(一把长,锉) 三把 巴豆五十粒(去壳)

【用法】上药同炒令黄色,净,拣去巴豆不用,将余药同为细末,再入海金沙一钱、滑石末一钱半,同研。每服一钱,疾作时热酒调下。

【主治】小肠气,或痛不可忍。

【备考】按:方中青皮用量原缺。

26200 立效散

【方源】方出《妇人良方》卷二十,名见

《医学纲目》卷二十二。

【组成】五灵脂（慢火熬）

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下。

【主治】产后儿枕痛不可忍。

26201 立效散

【方源】《续易简》卷三。

【组成】硫黄 辰砂各等分（研细）

【用法】上拌匀。每服一钱，人参汤调下。

【主治】久患疟疾不愈。

26202 立效散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】细辛二分 炙甘草三分 升麻七分 防风一钱 草龙胆（酒洗）四钱

【用法】上哎咀。都作一服，水一盞，煎至七分，去滓，以匙抄在口中，燥痛处，待少时则止。

【主治】牙齿痛不可忍，连及头脑项背，微恶寒饮，大恶热饮。

【方论选录】《杏苑》：阳明湿热壅盛牙疼，法当疏湿清热为主。经云风能胜湿，寒可胜热。故用细辛、防风以胜湿，胆草、升麻以解热，佐甘草和药泻火。

26203 立效散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】当归 莲花心 白绵子 红花 茅花各一两

【用法】上锉如豆大，白纸裹定泥固，炭火烧灰存性，为细末。如干血气，研血竭为引，好温酒调服，加轻粉一钱；如血崩不止，加麝香为引，好温酒调服。

【主治】①《兰室秘藏》：妇人血崩不止。②《医略六书》：血崩不止脉涩者。

【方论选录】《医略六书》：久郁伤肝，不能藏血，故血不归经，崩下不止焉。棉花子散滞气，力能解郁开结；莲花心凉心气，性善涩血固经；红花生新去宿，当归养血归经，茅花轻扬止血以定崩下也。为散，水煎，务使肝郁解散，则经脉调和而经气完复，血不妄行，何崩下之不除乎。

【备考】《医略六书》本方用法：为散煎服。

26204 立效散

【方源】《医方类聚》卷七十八引《济生》。

【组成】真陈橘皮（灯上烧黑，为末）一钱 麝香少许（别研）

【用法】上药和匀。每用少许，先用绵蘸耳内，脓净上药。

【主治】聤耳、底耳，有脓不止。

26205 立效散

【方源】《朱氏集验方》卷九引王子益方。

【组成】白矾一两 生姜三两（切片，同白矾炒干） 萆薢一两（焙干）各等分

【用法】上入烧盐少许，为末。搽牙痛处。

【主治】牙疼。

26206 立效散

【方源】《朱氏集验方》卷十四引萧南仲方。

【组成】铁蛟龙（一名水鼯，一名金莲花，取根）二两（锉片，焙干） 知母 贝母各一两 雄黄半两 天雄一个（生用） 紫河车三两 大川乌一个 真北细辛

【用法】上为细末。用生地黄酒调服。如鼻口血来，生地黄酒加雄黄丸下。

【主治】蛇伤垂死者。

【宜忌】孕妇忌食荤物。

【加减】如伤风，随脉证用发散药并服之。如有孕妇，则除天雄，少用川乌。

【备考】方中真北细辛用量原缺。

26207 立效散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷三引东垣方。

【异名】立效神散（《杂病源流犀烛》卷二十七）。

【组成】生姜（去皮）一两 大黄 甘草各五钱 黄瓜萎一个（去皮）

【用法】上共捣作一块，以水半碗同煎至七分，滤去滓，加没药、乳香末各一钱，通作一服。

【主治】吹奶。

26208 立效散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】百草霜(研细) 沧盐(研细) 各一钱 麝香(拣去皮毛,另研极细)半钱 乳香(研细)半钱

【用法】上为细末。每用少许,口噙温水,随牙疼一边鼻内搐之,不拘时候。

【主治】牙疼不可忍。

26209 立效散

【方源】《走马疳急方》。

【组成】羽涅灰(即枯矾) 片胚子(即干胭脂)各等分 即麝香少许

【用法】前二味研细后,加后一味,研匀用。吹之。

【主治】疳内生疔肿胀,脓血臭秽。

26210 立效散

《卫生宝鉴》卷十九。为《圣济总录》卷一七六“甜消散”之异名。见该条。

26211 立效散

【方源】方出《元戎》,名见《玉机微义》卷三十。

【组成】小椒 露蜂房 青盐各等分

【用法】上为细末。煎数沸,放温漱口。

【主治】牙疼。

26212 立效散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《经验秘方》。

【组成】灯草灰

【用法】加轻粉、麝香少许。干贴。

【主治】下疳。

26213 立效散

【方源】《医方大成》卷三。

【组成】上春茶末

【用法】调成膏,置瓦盏内覆转,以巴豆四十粒作二次烧烟熏之,晒干,用乳钵研烂,为末。每服一字,别入好茶末,食后点服。

【主治】气虚头痛。

26214 立效散

【方源】《得效》卷六。

【组成】罂粟壳六两(去蒂萼瓢,蜜炒赤) 当归一两 芍药 榴皮 地榆各二两 甘草一两

【用法】上锉散。每服三钱,水一盞,同煎温服。

【主治】下痢赤白,日夜无度,里急外重紧痛。

26215 立效散

【方源】《得效》卷七。

【组成】侧柏叶(焙干,如仓卒难干,新瓦焙)

【用法】上为末。每服三钱,食后米饮调下。

【主治】吐血。

26216 立效散

【方源】《普济方》卷三三〇引《经验良方》。

【组成】晚蚕沙(醋浸一宿,焙干称) 当归(酒浸,焙干) 女子头发(焙焦) 乌龙尾(即久尘灰,生姜自然汁浸,焙干。)各一两 旧棕叶(烧存性)二两

【用法】上为细末。每服二钱,热酒调下。

【主治】血崩,及赤白带下。

26217 立效散

【方源】《医方类聚》卷一六九引《经验良方》。

【组成】朴消二两(细研如粉) 硫黄一分(别研极细)

【用法】上和匀,清油调。临卧敷疮上,一夜三次。

【主治】疥疮经久不愈。

26218 立效散

【方源】《医方类聚》卷一八四引《经验良方》。

【组成】苦参 卷柏 泽兰叶各一两

【用法】上焙,为末。每服二钱,无灰酒调下。

【主治】蜂窠烂痔。

26219 立效散

【方源】《普济方》卷四十五引《德生堂方》。

【组成】蓖麻子不拘多少(去壳)

【用法】上捣烂,纸上摊,贴在左右太阳穴上。

【主治】偏正头疼。

26220 立效散

【方源】《普济方》卷四十九引《德生堂方》。

【组成】针砂五两(醋炒五次,另研极细)川百药煎三两 没石子七个。白及一两 诃子肉二两

【用法】上为细末,和匀,再研极细如泥。临卧先用浆水洗净,后用荷叶熬水,滤净调药,看多少用涂髭发上,用荷叶贴住,绢帛拴裹,次早用温浆水洗去。后涂须根出白色,再用前药,常用胡桃油润之,尤妙。

【功用】乌髭发。

26221 立效散

【方源】《外科集验方》。

【组成】滑石一两 甘草二钱

【用法】上为末。先将此末每服一钱半,米饮调下,临睡进一次,半夜再进一次。

【主治】瘰癧初发之时。

26222 立效散

【方源】《普济方》卷一一三。

【组成】乱发如鸡子大

【用法】上入无油器中熬焦黑,研为末。以好酒一盞沃之,何首乌末二钱同搅,候温灌之,下咽喉过一二刻,再灌。

【主治】破伤风。

26223 立效散

【方源】《普济方》卷二〇八。

【组成】乌梅肉 御米壳 白矾 甘草(炙) 夜叉头各等分

【用法】上为末。每服二钱半,空心米饮汤调下。

【主治】泻。

26224 立效散

【方源】《普济方》卷二四四。

【组成】大槟榔七枚(合子碎) 生姜二两 橘皮 吴茱萸 紫苏(焙) 木瓜各一两

【用法】上切,以水三升,煮取一升三合,分二次服。

【功用】散肿气。

【主治】①《普济方》:脚气攻心,及一切

暴肿。②《景岳全书》:脚气,寒湿壅肿,气滞不行,或冷或痛者。

26225 立效散

【方源】《普济方》卷二八一。即方出《圣惠》卷六十五,名见《局方》卷八(吴直阁增诸家名方)“油调立效散”。见该条。

26226 立效散

【方源】《普济方》卷二八三。

【组成】当归尾 苦参 南星 黄芩 黄柏 草乌尖各等分

【用法】上为末。煎茶清调敷患处。

【主治】背疽,疔疮,疖毒。

26227 立效散

【方源】《普济方》卷二九六。

【组成】皂角(火煨,去黑炭弦子,净取)半斤 沉香少许

【用法】上为末,醋糊为丸。每服三十丸,空心盐汤送下。

【主治】热痔。

26228 立效散

【方源】《普济方》卷二九六。即《圣济总录》卷一四一“熏敷立效散”。见该条。

26229 立效散

【方源】《普济方》卷三〇〇。即《卫生宝鉴》卷十一“多效散”。见该条。

26230 立效散

【方源】《普济方》卷三〇六。

【组成】蒜 杏仁各等分

【用法】上一处捣烂,次用消风、急风散一捻在蒜内,连疮口四畔敷讫,将艾柱灸之,次服消风,急风二散。

【主治】疯狗所伤。

【宜忌】忌鳝、鳗、发风等物。

26231 立效散

【方源】《普济方》卷三〇六。

【组成】饿老鹰胆一个

【用法】温酒调下

【主治】疯狗咬伤。

26232 立效散

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】枯白矾一两 黄丹(纸上飞)一两 白胶香一两(另研)

【用法】上为极细末。先用葱白、荆芥熬汤，洗净，揩干，上药，后用小油调搽。

【主治】小儿、大人粘疮浸彻，经年不效。

26233 立效散

【方源】《医方类聚》卷二一八引《仙传济阴方》。

【组成】青皮 陈皮 乌药 干姜 香附子 莪术 三棱

【用法】上醋煮，焙干为末。空心 陈皮汤调下。

【主治】妇人经年积血，腹中常痛，日夜呻吟不得眠。

26234 立效散

《婴童百问》卷八。为《普济方》卷三八八“立效饮”之异名。见该条。

26235 立效散

【方源】《幼科类萃》卷二十五。

【组成】硼砂 龙脑 雄黄 朴消各半钱

【用法】上为极细末。干掺。

【主治】小儿咽喉痹痛，不能吞咽。

26236 立效散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】全蝎三十枚 巴豆三十粒 皂角七个(炒焦)

【用法】上为粗末。以清油四两，熬至焦黄色，去滓，次入大风子、蛇床子、白矾末各一两，黄蜡二两，同煎成膏，以瓷器收贮。任意搽疮。

【主治】疥疮。

26237 立效散

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】青黛 黄柏末 白矾(煨) 五倍子末各一钱

【用法】上为细末。用米泔水搅，口内贴。

【主治】小儿走马疳。

26238 立效散

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二。

【组成】蒲黄 生地黄 生甘草 赤茯苓

(去皮)各等分

【用法】上咬咀。用水煎，入发灰调匀，食前服。

【主治】小儿溺血。

26239 立效散

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】牙消一厘 雄黄半厘 麝香半厘

【用法】上为极细末。以少许点入眼中，令人扶患者周围行数次数，腰疼如失。如未效，再点，再行，疼止为度。

【主治】闪挫腰疼，不能屈伸者。

26240 立效散

【方源】《保婴撮要》卷十一。

【组成】定粉末 松香末 黄柏末 黄连末 枯矾末各一两

【用法】上药各为末，用清油烛油调搽。

【主治】胎毒疮疥，鬓疮耳疮，及一切疮疥；黄水粘疮。

26241 立效散

【方源】《保婴撮要》卷十八。

【组成】大黄 黄柏 山梔 寒水石(煨)各等分

【用法】上为末。用清油烛调搽。若破而脓水淋漓，用当归膏。

【主治】一切胎毒疮疥未破者，及风疹痛。

26242 立效散

【方源】《医统》卷六十五。

【组成】白矾(为末) 净朴消(为末)各五分

【用法】土牛膝根洗净，捣汁半盏，入二味和匀。咽漱吐出，有物即随汁出，二三次愈。

【功用】开喉。

【主治】喉痹，卒不能言，水浆不入。

26243 立效散

【方源】《古今医鉴》卷五

【组成】黄连四两(酒洗，吴茱萸二两同炒，去茱萸用) 枳壳二两(麸炒)

【用法】上为末。每服三钱，空心酒送下。泄泻，米汤下；噤口痢，陈仓米汤下。

【主治】《古今医鉴》：痢，腹中疝痛，赤白

相兼。噤口痢，泄泻。

26244 立效散

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】黄丹（水飞） 枯矾 京枣（连核烧存性）

【用法】上为细末。敷之。

【主治】走马牙疳。

26245 立效散

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】雄黄 香白芷各等分

【用法】上锉。黄酒浓煎服之。如牙关紧急者，灌之。

【主治】破伤风。

26246 立效散

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】山楂一钱五分（醋炒） 青皮一钱二分（醋炒） 小茴香（盐水炒） 枳实（麸炒） 苍术（米泔浸一宿炒） 香附 吴茱萸 山梔（炒黑） 川楝肉各一钱

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】疝，因食积作痛。

26247 立效散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】水滚子 又名溪枫根、水杨柳。（多） 淡茶栝根（中） 晚祥西根（少）

【用法】水煎，入酒和服。或合六马散亦效。

【主治】马瘕。

26248 立效散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷四引《资生》。

【组成】全蝎七个 缩砂三七枚 茴香一钱

【用法】上为末。分三贴，空心热酒调下。

【主治】①《东医宝鉴·外形篇》引《资生》小肠气。②《杂病源流犀烛》：小肠气，有茎囊抽痛，不可忍耐者。

26249 立效散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】白芷 贝母各等分

【用法】上为末。每服二钱，好酒调服。若无乳行，加漏芦酒煎，调服。

【主治】吹乳。

26250 立效散

【方源】《济阴纲目》卷二。

【组成】香附（炒）三两 当归一两 赤芍药 良姜 五灵脂各半两

【用法】上为细末。每服三钱，酒一盞，童便少许，同煎服。

【主治】妇人血崩，脐腹痛。

26251 立效散

《济阴纲目》卷十四。为《云歧子保命集》卷下“立效方”之异名。见该条。

26252 立效散

【方源】《幼科折衷》卷下。

【组成】赤小豆 赤芍药 枳壳 风化消商陆

【用法】上为末。敷之，仍以五苓散加车前子、薏苡仁煎服。

【主治】小儿坐阴润之地，感风湿，以致阴茎缩入，阴囊光肿不痛。

26253 立效散

【方源】《嵩崖尊生》卷十

【组成】当归五钱 生地 茯苓 木通各三钱 故纸（盐炒）二钱 枸杞四钱 鹿茸（炙）五钱

【用法】上为末。作四服，酒调下。

【主治】痛风，浑身筋骨痛。

26254 立效散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】羊蹄躑花五分 鹅不食草一两 苏州薄荷五分 风化消五分 青黛一钱 细辛一钱 白芷一钱 黄连三分 荆芥五分 石膏（煨）一钱 当归一钱

【用法】上为极细末。先吸冷水一口，后吹入药末，左患吹左鼻孔，右患吹右鼻孔，一日二三次。打喷嚏而愈。

【主治】一切风火热毒，羞明多泪，疼痛难开，并左右头风。

26255 立效散

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】栝楼 乳香 没药 当归 甘草 皂角刺

【用法】上为末。酒调服。脓成者溃，未成者消。

【主治】吹乳结核不散。

26256 立效散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】木香三钱 胆矾一钱 麝香一分

【用法】葱汁调灌。即苏。

【主治】风痰危急，汤水不下。

26257 立效散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】当归 桂心 玄胡 天麻各等分

【用法】水煎服。

【主治】骨节疼痛。

26258 立效散

【方源】《疡医大全》卷十三。

【组成】蛇退（火烧存性）（一方加冰片）

【用法】上为末。鹅管吹入耳内。

【主治】耳内忽作大痛，如有虫在内奔走，殊痛，或出血，或出水，或干痛，不可忍者。

26259 立效散

【方源】《同寿录》卷三。

【组成】人中白（煨过）一钱 铜绿三分 麝香一分

【用法】上为细末。茶洗口、牙净，用指数药于上。

【主治】痘疹余毒，牙根破烂出血，或成走马牙疳者。

26260 立效散

《杂病源流犀烛》卷二十七。为《古今医鉴》卷十二“通草汤”之异名。见该条。

26261 立效散

《杂病源流犀烛》卷二十七。为《东医宝鉴·外形篇》卷三引《丹心》“立效方”之异名。见该条。

26262 立效散

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】诃子肉 文蛤 枯矾各等分

【用法】上为细末。搽贴唇上。

【主治】唇紧疮，喉痛。

26263 立效散

【方源】《履霜集》卷二。

【组成】真芝麻油 蜂蜜 童便各半茶盏 滑石二钱（为末）

【用法】共入一瓷壶内，顿二三滚，入碗内，入生鸡蛋清一个，遂搅即服，立产。若横生逆产，加葱汁半茶盏，搅匀服之，即正产矣。

【主治】难产，胎衣不下。

26264 立效散

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】当归二钱 通草一钱 桃仁二钱 穿山甲二钱 怀牛膝一钱五分 制大黄二钱五分 中青皮一钱 骨碎补（去毛净）二钱 乳香二钱 没药二钱 白芷一钱五分 苏子一钱 红花一钱五分 杜仲二钱 降香一钱 甘草一钱 血竭三钱 三七一钱五分 地鳖虫二钱（米店内多有） 石南枝头三钱

【用法】共煎汤，加童便一酒钟、老酒一酒钟温服。极重者二服即愈。今改为末子药，如遇病不重者，只需每服吃末子五钱，外加童便一杯、老酒一杯送下，轻者三服，重者仍照方煎服。

【主治】跌打内伤，并闪挫风气，疼痛。

26265 立效散

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】良姜 草乌 细辛 荆芥穗各等分

【用法】上为末。用少许擦牙。有涎则吐之。

【主治】风虫牙痛。

26266 立消丸

【方源】《玉案》卷四。

【组成】槟榔 草果（炒） 山楂肉 莱菔子（炒）各二两 阿魏（酒燉化）一两 三棱 莪术（醋煮） 广木香 青皮（醋炒） 香附各一两五钱

【用法】上为末，神曲六两，打糊为丸。每服三钱，姜汤送下。

【主治】饮食积聚成块。

26267 立消丹

《眼科全书》卷六。为《直指》卷二十“立消膏”之异名。见该条。

26268 立消汤

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】蒲公英一两 金银花四两 当归二两 玄参一两

【用法】水煎，饥服。

【功用】攻散诸毒。

【主治】痈疽发背，或生头项，或生手足臂腿腰脐之间、前阴粪门之际，以及肺痈、肠痈。

26269 立消汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】银花 15~31 克 当归 9 克 蒲公英 9~15 克 玄参 9 克 苡仁 12 克 茯苓 12 克

【用法】水煎，内服。

【主治】下肢溃疡。

26270 立消散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】赤芍药 赤小豆 枳壳（麸炒，去瓤）等分

【用法】上为细末。浓煎柏枝汤调药敷患处，干即以柏枝汤润之。

【主治】小儿阴肿胀痛。

26271 立消散

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】干马胡姜（细末，筛净）七分或八分

【用法】热酒调服。

【主治】腹痛。

26272 立消散

《医学入门》卷七。为《直指》卷二十“立消膏”之异名。见该条。

26273 立消散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】大虾蟆一个

【用法】剥去皮，连肠捣烂，入葱五钱再捣，敷患处，却用皮覆贴其口。

【主治】鱼口便毒。

26274 立消散

【方源】《赤水玄珠》卷三十。

【组成】全蝎（炒） 核桃（去壳肉，只用隔膜，炒）各等分

【用法】上为末。每服三钱，空心酒调下，下午再服。

【主治】便毒，痈肿。

26275 立消散

【方源】《准绳·幼科》卷二。

【组成】赤小豆 赤芍药 生枳壳 商陆 风化朴消（另研，后入）各半两

【用法】上药不过火，锉，晒，为末。柏枝煎汤候冷，调二钱或三钱涂肿处，仍咬咀五苓散加车前子、薏苡仁水煎服。

【主治】膀胱久受热毒，致阴器肤囊赤肿胀痛。

26276 立消散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】白礞砂 灯心灰（以灯心塞入罐内固济，煅之罐红为度） 风化消 黄柏 青黛 冰片各等分

【用法】上为极细末。以芦管吹入喉中。

【主治】喉痹。

26277 立消散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】皂角刺 朴消 黄连 冰片各等分

【用法】上为末。搽患处，再煎黄连汤时时呷之。

【主治】重舌。

26278 立消散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】草乌一两 白及 甘遂各一两 小良姜三钱 甘草三钱 麝香一钱

【用法】上为末。用苍术捣汁，加醋调匀，鸡翎蘸扫肿处。

【主治】大头风，头面虚肿如泡。

26279 立消散

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】豆腐皮(烧存性)

【用法】上为末。香油调搽。

【主治】小儿浑身起罗网蜘蛛疮，臊痒难忍。

26280 立消散

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】生地 龙胆草 柴胡 防风 荆芥穗 槐花 青木香各等分 升麻(上部加) 牛膝(下部加)

【用法】酒、水同煎，热服取汗。轻可立消，重者二剂。

【主治】痈疽肿毒。

【宜忌】如已成将溃，禁服。

26281 立消散

【方源】《疡医大全》卷八。

【异名】立消膏(《中医皮肤病学简编》)。

【组成】雄黄二钱二分 川山甲三钱 生大黄(锦纹者良) 芙蓉叶 倍子(炒)各五钱

【用法】上为极细末。滴醋调敷，中留一孔透气，如干又搽。

【主治】①《疡医大全》：痈疽。②《中医皮肤病学简编》：带状疱疹。

26282 立消散

【方源】《疡医大全》卷十。

【组成】龙胆草 藁本 西牛黄 白芷 地骨皮 雄黄 金银花藤各等分

【用法】上为极细末。生酒调敷，中留一孔透气。自消。

【主治】百会疽。

26283 立消散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】赤小豆不拘多少

【用法】晒磨为末。鸡子白调敷。

【主治】一切痰毒时毒，不论初起、将溃诸疮。

26284 立消散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】赤小豆 15 克 风化消 15 克 赤芍 15 克 枳壳 15 克

【用法】上为细末服。

【主治】女阴溃疡。

26285 立消膏

【方源】《直指》卷二十。

【异名】至妙立消膏(《活幼口议》卷二十)、立消散(《医学入门》卷七)、立消丹(《眼科全书》卷六)。

【组成】雪白盐(净器中生研)少许

【用法】上以大灯草蘸盐，轻手指定髻翳就点，凡三次。不疼痛，勿惊恐。

【主治】①《直指》：浮翳、粟翳，雾膜遮睛。②《活幼口议》：小儿眼患，初作粟翳、浮翳，或来或去，渐发差大，侵睛减明。

26286 立消膏

《中医皮肤病学简编》。为《疡医大全》卷八“立消散”之异名。见该条。

26287 立通丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【异名】青橘皮丸(《宣明论》卷二)。

【组成】京三棱(炮，锉) 黄连(去须) 青橘皮(汤浸，去白，焙) 蓬莪术(炮)各一两 巴豆霜一分

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服五丸，食后茶、酒任下。

【主治】①《圣济总录》：胃热肠寒，善食数饥，小腹胀痛。②《宣明论》：胃热肠寒，善食而饥，便溺，小腹胀痛，大便或涩。

26288 立通饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】黄芩三钱 石膏(煨)五钱 黄柏 山梔仁 麦冬各一钱 玄明粉 桃仁各二钱

【用法】水煎，不拘时候服。

【主治】内有积热，闭结不通。

26289 立通散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】蛭(阴干)二七条 矾石(半生半烧)一分 白梅肉(炒燥)二七枚

【用法】上为散。每用半钱匕，吹入喉内；或水调下。得吐立通。

【主治】咽喉闭塞不通。

26290 立验丸

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】葶苈十分(研,炒,为末) 贝母三分 杏仁一两半(炒,去皮尖) 赤茯苓紫菀 五味子各三分 人参一两 桑白皮一两(炙)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,日二服,甚者夜一服,加至三十丸,枣汤送下。肿甚者食后服。

【功用】消肿下气止嗽。

【主治】肺热而咳,上气喘急,不得坐卧,身面浮肿,不下饮食。

26291 立验散

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】芎藭 天南星(炮) 白芷 夜明沙(炒) 猪牙皂荚(炙)各三分 白丁香 百部 藜芦各四钱 草乌头半两 海金沙一分 砒霜(别研) 萆薢各二钱

【用法】上为散,与砒霜合和研匀,临时更用铅丹调色匀,瓷合收。如虫蜒入耳,取少许,用醋一两滴调化,以细翎毛蘸药,入耳窍,微吹令药气行立出,药不得多,多即化虫蜒成水不出。如蝎螫,先点少醋在螫处,渗药半字许,擦令热。

【主治】虫蜒入耳,蝎螫。

26292 立验膏

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】活黄鳝鱼一条 大活蜘蛛一枚

【用法】以刀断鳝鱼之首,沥热血于掌中,急以蜘蛛以手指只就掌中研,蜘蛛化为度,去蜘蛛皮,刮于瓷器内收。于发时涂敷。

【主治】痔漏正发,忽肠头不止,有血者。

26293 立患丹

【方源】《回春》卷五。

【组成】艾叶二两 葱头一根(捣烂) 生姜一两五钱(捣烂)

【用法】上用布共为一包,蘸极热烧酒擦患处。以痛止为度。

【主治】湿气两腿作痛。

26294 立愈丸

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】朱砂 硼砂 牙消各一钱

【用法】上为细末,醋煮面糊为丸,如麻子大。遇衄时,先用新汲水洗两脚心净,次用蒜二片研如泥贴在脚心上,次一药丸贴在蒜上,却以纸裹定,立地抬头三次。立止。

【主治】鼻衄不止。

26295 立愈汤

【方源】《春脚集》卷一。

【组成】何首乌三钱 土茯苓一两 天麻二钱 当归二钱 防风二钱

【用法】水煎服,连服三剂或四剂。

【主治】一切头痛,不拘正痛,或左或右偏痛。

26296 立愈饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】草果仁 肉豆蔻(面包煨)各一钱 红曲(炒) 山楂各一钱五分 苍术(米泔浸,炒) 白茯苓(去皮) 泽泻 厚朴(姜汁炒) 木通 益智仁(炒) 藿香 车前子各八分

【用法】生姜三片为引,水煎,食前服。

【主治】过伤生冷,以致脾胃不和,呕吐泄泻。

26297 立止灵丹

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】当门子二钱五分 川连五钱 白芷一两

【用法】上为细末,入瓷瓶封固。红痢用蜜为丸,白痢用姜汁为丸,红白痢用醋为丸,如黄豆大。纳脐中,外贴小膏药。止后,服调理药方。

【主治】痢疾泄泻,昼夜无数次者。

【宜忌】孕妇忌用。

26298 立效饼子

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】良姜 草乌 川芎 萆薢 胡椒各等分

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大,

捻作饼子。每用一饼，咬在患处。有涎出立愈。

【主治】一切风牙虫牙，疼痛不可忍。

26299 立效神散

《杂病源流犀烛》卷二十七。为《东医宝鉴·外形篇》卷三引东垣方“立效散”之异名。见该条。

26300 立马开关饮

【方源】《喉症指南》卷四。

【组成】生鸡子一枚（去壳，倾入碗内，不搅）生白矾五六分或一钱（研极细末，挑入鸡子黄内，勿搅）

【用法】将病者扶起正坐，囗囗灌下。立效。

【主治】喉闭肿痛，汤水不下诸急证。

26301 立马回疔丹

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】金脚信半钱 蟾酥半钱 血竭半钱 朱砂半钱 轻粉 龙脑 麝香各一字 没药半钱

【用法】上为细末，用生草乌头汁拌和为锭，如麦子长大。用时将疮顶刺破，将药一锭放疮口内。第二日疮肿为效。

【功用】《北京市中药成方选集》：化毒消肿。

【主治】疔疮。

①《瑞竹堂方》：疔疮走晕不止。②《外科方外奇方》：一切疔疮疔毒走黄险症。③《北京市中药成方选集》：疔毒初起，红肿疼痛。

26302 立马回疔丹

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】回疔丹（《全国中药成药处方集》（上海方））。

【组成】蟾酥（酒化） 硃砂 轻粉 白丁香各一钱 蜈蚣一条（炙） 雄黄 朱砂各二钱 乳香六分 麝香一字 金顶砒五分（用铅一斤，小罐内炭火煨化，投白砒二两于化烊铅上炼，烟尽为度，取出冷定打开，金顶砒结在铅面上，取下听用）

【用法】上为细末，糊成麦子大。凡遇疔疮，

针破，用此一粒插入孔内，膏盖之。追出脓血疔根为效。

【功用】《中药制剂手册》：消毒止痛。

【主治】疔疮。

①《外科正宗》：疔疮初起，失治误治，以致疔毒走散不住，走黄险恶症。②《慈幼新书》：痘疔初生紫点。③《药奁启秘》：疔疮初起，顶不高突，根脚不收者。④《中药制剂手册》：疔毒扩散内攻引起面甲青紫，呕吐神昏，麻痛烦闷。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（上海方）：忌猪肉荤腥食物。

【备考】《全国中药成药处方集》（上海方）：原方有白丁香，今已不用。

26303 立止牙疼药

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】蟾酥 细辛 萆薢 食盐各等分

【用法】用蟾酥糊为小丸。

【主治】牙疼。

26304 立止牙痛散

【方源】《全国中药成药处方集》（南京方）。

【组成】没食子四钱 生石膏四钱 煨硼砂三钱 玄明粉一钱五分 冰片五分 飞朱砂七分

【用法】上为细末，乳至极细。每用少许，擦患处。

【主治】风火牙痛。

26305 立止水泻方

【方源】《寿世新编》卷上。

【组成】车前 泽泻各一钱 厚朴一钱二分（姜汁炒）

【用法】上为末。滚水调服。

【主治】水泻。

26306 立止头痛散

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】大黄二两 全虫十个 朱砂三钱 麝香四分 冰片五分

【用法】上为细末，装三分，蜡壳封固。

【功用】《中药制剂手册》：清热，通窍，止痛。

【主治】①《全国中药成药处方集》：头痛。
②《中药制剂手册》：由风热上攻引起的头晕头痛，鼻塞不通，时发时愈。

【备考】《中药制剂手册》本方用法：每服三分，温开水冲下。外用可搽鼻少许。

26307 立止吐血散

【方源】《吉人集验方》

【组成】藕节炭一两 蒲黄炭五钱 血余炭五钱

【用法】上为末。每服三钱，开水调下。立止。

【主治】吐血。

26308 立止吐血膏

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鲜生地一斤 生绵纹三两 桑叶丹皮 血见愁 杜牛膝各二两 土三七 苏子 降香各一两

【用法】用冰糖四两收膏。每服八钱至一两，犀地清络饮去桃仁、姜、蒲二汁冲下。

【功用】引血下行，止血逐瘀。

【主治】伤寒夹血，呕血吐血，表邪虽解，血尚不止者。

26309 立止咳血膏

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】剪草一斤 地锦二斤 野百合黑木耳 白及 没石子各一两 鲜藕节二两 鲜枇杷叶（去毛筋，净） 鲜刮淡竹茹 鲜茛白根各八两

【用法】先煎，去滓滤净，加净白蜜一斤、奎冰糖八两，煎浓成膏。寻常咳血妄行，每服一小匙，日二夜一，空心服。如久病损肺咳血，五更服此，上下午服琼玉膏。

【功用】降气泻火，补络填窍。

【主治】咳血妄行，或久病损肺咳血。

26310 立止咳嗽丸

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】麻黄 杏仁各五钱 桔梗八钱 萎仁四钱 丹皮三钱 杭芍四钱 黄芩三钱 黄连二钱 栀子 花粉各三钱 茯苓五钱 清夏三钱 沙参四钱 橘红三钱 川贝 五味子 甘草各二钱 米壳一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每重一钱五分。每服二丸，小儿一丸，开水送下。

【主治】久嗽痰喘。

【宜忌】忌辛辣油腻。

26311 立止哮喘烟

【方源】《外科十三方考》。

【组成】曼陀罗花一两五 火消一钱 川贝一两 法夏八钱 泽兰六钱 冬花五钱

【用法】上为细末，用老姜一片，捣烂取汁，将药末合匀，以有盖茶钟一只，盛贮封固，隔水蒸一时久，取出，以熟烟丝十两和匀，放通风处吹至七八成干（不可过干，恐其易碎）时，贮于香烟罐中备用。每日用旱烟筒或水烟袋如寻常吸烟法吸之，哮喘即渐次痊愈。

【主治】哮喘。

26312 立生酥葵膏

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】酥一斤 秋葵子一升 白蜜半斤 滑石一两半 瞿麦一两 大豆黄卷二两

【用法】以清酒一升，细研葵子，入酥、蜜中，微火熬令熔，即下诸药，慢火煎，常令沸如鱼目，约半升，即以新绵滤，贮瓷器中。每服半匙，加至一匙，多恐呕逆。

【主治】妊娠数日不产，或生不顺理，百方不得安。

26313 立圣茵草散

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】茵草一两（生用） 琵琶叶一两（生用，去毛） 半夏一两（汤浸，焙干）

【用法】上为散。每服一钱，水一盞半，加生姜一块，同煎至半盞，去滓服。

【主治】中风涎盛，及气膈不粥。

26314 立圣鹤顶丹

【方源】《百一》卷十八引朱炳方。

【异名】立圣丹(《普济方》卷三五六)。

【组成】寒水石不拘多少(江南人谓之软石膏者,分作二处,一半生,一半炭火煨令通红)。

【用法】上为极细末,入朱砂再合研,色与桃花色相似即止。每用二大钱,以新汲水调下。

【主治】①《百一》:难产。②《济阴纲目》:难产横逆恶疾,死胎不下。

26315 立应四物汤

《妇科玉尺》卷四。为《叶氏女科》卷三“立应汤”之异名。见该条。

26316 立应金丝膏

《医方类聚》卷一八七引《经验良方》。为《得效》卷十九“金丝膏”之异名。见该条。

26317 立应玃珠丹

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】茅术八两 全蝎 石斛 明天麻 当归 甘草(炙) 川芎 羌活 荆芥 防风 麻黄 北细辛 川乌(汤泡,去皮) 草乌(汤泡,去皮尖) 何首乌各一两 明雄黄六钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大,每药一两分作四丸、一两作六丸、一两作九丸三等,做下以备年老壮、病势缓急取用,预用朱砂六钱,研细为衣,瓷罐收贮。诸疾有表证相兼者,用连须大葱白九支煎汤一茶钟,将药丸乘热化开,通口服尽。盖被出汗为效。如服后汗迟,再用葱白汤催之,后必汗如淋洗,渐渐退下覆盖衣物,其汗自收自敛,患者自然爽快,其病如失。但病未成者,随即消去;已成者,随即高肿溃脓。如诸疾无表证相兼,不必发散者,只用热酒化服。

【功用】发散疮毒,截解风寒,顺气搜风,通行经络。

【主治】恶疮初起二三日之间,或痈疽已成至十朝前后,但未出脓者,状若伤寒头痛,烦渴拘急,恶寒,肢体疼痛,恶心呕吐,四肢

沉重,恍惚闷乱,坐卧不宁,皮肤壮热;寒伤四时感冒,传变疫症,但恶寒身热,表证未尽者;痈疽疔毒,对口发颐,风湿风温,湿痰流注,附骨阴疽,鹤膝风症;左瘫右痪,口眼喎斜,半身不遂,气血凝滞,遍身走痛,步履艰辛,偏坠疝气,偏正头痛,破伤风牙关紧闭。

【宜忌】服后避风,当食稀粥。忌冷物、房事。孕妇勿服。

【方论选录】详观此方,治肿疡甚效者何也?凡疮皆起于营卫不调,气血凝滞,乃生痈肿,观此药性专发散,又能顺气搜风,通行经络,所谓结者开之,况疮毒乃又日积月累,结聚所发,苟非甘温辛热发泄以汗疏通,安能得效。所谓发散不远热,正合此方之意。

26318 立命开阳汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】干河车二钱(切) 破故纸一钱五分(合桃肉拌炒) 益智仁一钱五分 附子片八分 当归一钱五分 茯苓二钱 白术一钱 小茴香一钱 木香六分 乌药一钱 煨姜三片

【主治】肾气虚寒,腹痛下利,完谷不化,手足俱冷者。

26319 立竿见影方

【方源】《胎产秘书》卷中。

【组成】黄葵花三钱 牡丹花三分 真茺萸三分 寸香一分 桑牛半个 巴豆半粒(去油) 蓖麻半粒(去油)

【用法】上为末,醋糊为丸,如弹子大,大黄为衣。临用研碎一丸,热酒和香油少许送下。用葱汁打糊为丸更妙。

【功用】活水瘦胎,软骨。

【主治】死胎不下,横生逆产。

26320 立除冷哮喘散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】胡椒四十九粒

【用法】入活癞虾蟆腹中,盐泥裹,煨存性。分五七服,用小青龙汤送下。

【功用】散寒定喘。

【主治】冷哮痰喘，遇冷即发者。

【宜忌】若有伏热者忌用。

26321 立候下胎散

【方源】《胎产心法》卷中。

【组成】皮消一钱（少壮者一钱五分） 大附子三五分（煨，去皮。体弱者用，壮者不用）

【用法】用黄酒半钟，煎一二沸，温服。立下。

【主治】临产或横逆，或血海干涸，或胎死不下，死在顷刻。

【加减】如寒天，壮者亦加附子三五分。

26322 立效木香散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】生干地黄（洗） 木香（不见火） 麦门冬（去心） 升麻 羌活 芍药 白芷 川芎 肉桂（不见火，去粗皮） 木通（去皮） 当归（去芦） 黄耆（蜜炙） 桔梗 甘草（炙） 连翘各等分

【用法】上为细末。温酒调服。初用而患人大便未曾泄，即多加大黄服之。如以水合酒煎之尤佳。

【主治】诸般恶毒，发背痈疽，已破未溃者。

26323 立效咽喉散

【方源】《喉科紫珍集》补遗。

【组成】火消一两五钱 明雄黄二钱 硼砂五钱 僵蚕三钱 冰片三分 山豆根五钱 鸡内金二钱

【用法】上为细末，用瓷瓶贮。临时关开，吹患处。

【主治】一切喉证。

26324 立效济众丹

【方源】《济众新编》卷二。

【组成】紫檀香 槟榔 干姜各二十两 苍术 厚朴 便香附各十五两 神曲（炒） 陈皮 半夏 胡椒各十两 青皮 广木香各五两

【用法】上为末，面糊和，一两五钱为十锭，

朱砂为衣。或一两为二十丸。

【主治】寒食伤霍乱及关格。

26325 立消神效膏

【方源】《外科集腋》卷一。

【组成】大黄 五倍子 白蔹 半枝莲 黄柏 甘草 姜黄 紫金皮 南星 白芥子 官桂 白芷 草乌 苍术 巴豆肉 蓖麻肉 各一两 蜈蚣（炙） 土狗（炙）各三十枚 麻油三斤半 白凤仙梗汁 大蒜汁 葱汁 姜汁 韭菜汁各一饭碗 商陆六两 苍耳头二两 蛇蜕五钱 驴蹄甲一个 山羊角二只 虾蟆干一只 黄牛角腮 猪蹄甲 番木鳖 山甲 苏木 归尾 芫花 大戟各一两 大鲫鱼八两一个

【用法】上药煎枯去滓，再煎至滴水成珠，待冷，下银朱十二两，乳香、没药、轻粉、芸香末各五钱，麝香三钱，搅匀。摊贴。

【主治】阴阳肿毒。

26326 立验大圣散

《医学正传》卷六引《疮疡集》。为《杨氏家藏方》卷十二“神秘散”之异名。见该条。

26327 立溃拔毒膏

【方源】《玉案》卷六。

【组成】糯米一两（南星、当归、赤芍各三钱同炒） 硃砂 斑蝥各三钱 好石灰一两（皂角烧烟熏，共为末） 桑柴灰 真炭灰 皂角灰 毛竹（去青，煨灰） 脂麻楷灰各三两

【用法】上以五样灰淋汁，锅内慢火熬之，面上起白霜为度，调前四味。点于患处。

【主治】诸般恶毒，痈疽疮疖。

26328 立催芎归汤

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归一两 川芎五钱 益母草六钱 朴消三钱

【用法】水二碗，煎一碗，候温一气饮下。少顷即产。

【主治】临盆难产，或子死腹中。

26329 立马回疗夺命散

【方源】《普济方》卷二七四。

【组成】牡蛎 当归 牛蒡子 白僵蚕各五钱 大黄一两

【用法】每服五钱，用青石磨刀水、酒各一盞煎，去滓，连进二服。

【主治】疔疮，咽喉乳蛾肿痛，喉痹。

26330 立止牙痛即安丹

【方源】《吉人集验方》。

【异名】一粒笑。

【组成】蟾酥(酒化烊)二钱 萆薢(研末)一钱 五灵脂(酒飞)二钱 麝香(研末)二分

【用法】上药打匀为丸，如绿豆大，晒干，贮于玻璃瓶内塞好，不令出气。凡一二个牙齿痛者，乃风火牙痛是也，每用此丸一粒，嵌于痛处。待其涎流丸药化尽，其痛立止。

【主治】牙痛。

26331 立消斗大疝气方

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】沉香 紫苏 苏木 南星各五钱

【用法】多年香橼一个，切碎，雄猪尿胞洗净，入药扎紧，好酒四五斤，煮烂，面糊为丸，如梧桐子大。每服四五丸，酒送下。药尽胞缩。

【主治】疝气。

26332 立解咽喉肿塞方

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】夏枯草花十斤 甕水梨肉一百斤

【用法】同煮膏，贮甕中，埋地下，一年后取出。含少许即消。

【主治】咽喉肿塞。

26333 立消疔疮外治神效方

【方源】《种福堂方·附录》。

【异名】疔疮膏(《经验方》卷上)。

【组成】松香二十两 没药三两(研极细末) 白蜡二两(切，为粗末) 铜绿五两(研细，过绢筛，再研至无声为度) 黄蜡十两(刮取粗片) 百草霜五两(研细，过绢筛，再研至无声为度) 明乳香三两(研极细末) 麻油六两

【用法】用桑柴火先将麻油入锅煎滚，次下松香候稍滚，三下白蜡候稍滚，四下黄蜡候稍滚，五下乳香候稍滚，六下没药候稍滚，七下铜绿候稍滚，八下百草霜，滚过数次，于锅内冷透，搓成条子为丸，如龙眼核大，藏净瓷器内。临用时以一九呵软捻扁贴患处。顷刻止痛，次日肿消即愈，已走黄者贴之，亦无不霍然。

【主治】疔疮。

【宜忌】贴后忌食荤腥辛辣、沸汤大热食、生冷发物、面食、豆腐、茄子、黄瓜、酒，忌水洗，忌恼怒忧闷，大忌房事。

【备考】①制松香法：用桑柴灰煎汁澄清，入松香煮烂，取出入冷水中，少时再入灰水中煮，以色白如玉为度。②取百草霜法：先须刮净锅底，专烧茅柴百草，取烟煤用。如以别种柴烟煤用入，则不验。

玄

26334 玄霜

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】金五十两 寒水石六斤(研如粉) 磁石三斤(碎) 石膏五斤(碎) 升麻 玄参各一斤 羚羊角八两 犀角四两 青木香四两 沉香伍两 朴硝末 芒消各六升 麝香当门子一两(后入)

【用法】金、寒水石、磁石、石膏四味以两斛水煮取六斗，澄清；升麻、玄参、羚羊角、犀角、青木香、沉香六味切，纳上汁中，煮取二斗，澄清；朴硝末、芒消、麝香三味、纳前汁中渍一宿，澄取清，铜器中微微火煎取一斗二升，以匙抄看，凝即成，下，经一宿当凝为雪，色黑耳。若犹湿者，安布上晒干，其下水更煎，水凝即可停之如初，闭密器贮之。此药无毒，心热须利病出，用水三四合和一小两，搅令消服之，炊久当利，两行即愈；小儿热病服枣许大；毒风脚气、热闷赤热肿，身上热疮，水渍少许，绵贴取点上，即愈，频与两服。病属上热，食后服；属下热，

空腹服之。卒热淋，大小便不通，服一两。

【主治】诸热、风热、气热、瘴热、癰，恶疮毒，内入攻心热闷；服诸石药发动、天行时气、温疫，热入脏腑，变成黄疸；蛇螫虎啮、狐狼毒所咬，毒气入腹内攻，心热；小儿热病，毒风脚气，热闷赤热肿、身上热疮；卒热淋，大小便不通，原有患热者。

26335 玄霜

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】薄荷梗（烧存性）四两 硼砂 盆消 胆矾各二钱

【用法】上为末，以油二三点入水上，调点患处。

【主治】喉痹。

26336 玄霜

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】黑铅一斤

【用法】上烱成一薄饼，中穿一洞，以绳系之，将好米醋半瓮，即以铅饼悬挂瓮中，离醋约一寸许，瓮口用皮纸箬子扎紧，再以砖石压之，勿使泄气，放屋下阴处，待数日取起，铅饼上有白霜拭下，每铅一斤，取白霜二两为止。噎膈，每服五分；痰火咳嗽，每服三分，嚙口内，以白汤送下。

【主治】痰火噎膈，咳嗽。

26337 玄及膏

【方源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】北五味子一斤（水浸一宿，去核）白蜜三斤

【用法】五味子入砂锅，加河水煎之取汁，又将滓再煎，以无味为度，入蜜微火熬成膏，空心白汤下二三匙。

【功用】强阴壮阳。

【主治】火嗽，梦遗精滑。

【方论选录】北方之令主闭藏、神气虚怯则不能收固。五味子味酸，酸者束而收敛，能固耗散之精，有金水相生之妙，况酸味正入厥阴，厥阴偏善疏泄，乃围魏救赵之法也。一物单行，功专力锐，更无监制，故为效神速。

26338 玄门丹

《寿世保元》卷六。为《圣济总录》卷一一七“玄参丸”之异名。见该条。

26339 玄天散

【方源】《洞天奥旨》卷六。

【组成】玄参八两 天门冬四两 桔梗二两 炙甘草一两

【用法】水十五碗，煎二碗，再用蒲公英五钱、金银花五钱，饱食后服之。

【功用】消痈，化毒生肌。

【主治】①《洞天奥旨》：肺经痈疡。②《惠直堂方》：肺痈咳嗽，两肋疼痛。

26340 玄车丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】玄参 车前子各一两

【用法】水煎服。

【主治】血淋。

26341 玄归散

【方源】《济阴纲目》卷一。

【异名】元归散（《类证治裁》卷八）。

【组成】当归 玄胡索各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，加生姜三片，水煎，稍热服。

【功用】《类证治裁》：破瘀。

【主治】月经壅滞，脐腹疼痛。

26342 玄归散

《医级》卷九。为《圣惠》卷七十一“当归散”之异名。见该条。

26343 玄冬汤

【方源】《辨证录》卷四。

【异名】玄麦饮（《医学集成》卷一）。

【组成】玄参 麦冬各二两

【用法】水煎服。

【主治】①《辨证录》：心热虚烦，遇事或多言而烦心，常若胸中扰攘纷纭而嘈杂。②《医学集成》：伤寒下后，四肢热减，惟热如火者。

26344 玄白丸

【方源】《简明医毅》卷三。

【组成】黑丑 白丑 良姜各四两 砂仁

红豆蔻 陈皮 三棱 蓬术 干姜各二两
青皮 草豆蔻 肉桂 玄胡索 五灵脂各一
两

【用法】上为末，用真阿魏五钱铢细，米醋浸研化，拌入末内，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心姜汤送下。

【主治】五积六聚，胸膈胀满，痞闷吞酸，心绞痛，胁下刺痛。遇风寒、怒气，食生冷、发气之物，劳碌忧愁则积，攻动大痛，得热熨暖气痛减者。

26345 玄白散

【方源】《回春》卷三。

【组成】牵牛（赤痢用黑，白痢用白，赤白相杂黑白兼用。半生半炒，捣碎） 生地黄 赤芍 归尾 槟榔 枳壳（去瓢，麸炒） 莪术（煨） 黄连各一钱 大黄二钱 香薷一钱（炒，暑月加）

【用法】上铢一剂。水煎，空心温服。以利二三次为度。虚弱人初痢宜清之。

【主治】痢疾初起，里急后重，腹痛脓血窘迫。

26346 玄玄膏

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】番木鳖 两头尖 石菖蒲 五灵脂 骨碎补 穿山甲 淮生地 金钗草 白芷梢 赤芍药 金银花 真五加皮 吴茱萸 牡丹皮 威灵仙 刘寄奴 猪牙皂角 甘松 山柰 紫苏 蛇床子 良姜 艾叶 厚朴 三棱 降香 苍术 羌活 红花 苏木 桃仁 当归尾 防风 麻黄 草乌 乌药 甘草 牛膝 藁本 汉防己 枳壳 白芷 荆芥 续断 巴豆 猪苓 泽泻 川椒 大椒 干姜 南星 半夏 槟榔 姜黄 干漆 香附 藿香 前胡 蓬术 茵陈 巴戟 石斛 常山 独活 风藤 黄连 山梔 连翘 黄柏（各选道地精制，洗去沙土、芦头）各一两（上铢碎，用真正麻油十五斤浸，春五、秋七、夏三、冬十日，槐柳枝文武火熬成药枯黑色，油滴水成珠为度，住火滤去滓听

用）

蒜头五斤 葱五斤 千里光草十斤（打碎取汁，滓加水煎汁，慢火熬膏听用）

生姜五斤 广木香 大川乌 北细辛 大茴香 小茴香 自然铜 面蒲黄 小茨菇 明天麻 官桂 僵蚕 玄胡 大黄 乳香 没药 全蝎 牙皂 雄黄各三两（上为极细末、听用）

嫩白上好松香六十斤（用醋煮过，为末筛过） 好窑煤三斗（听用）

【用法】先用松香下净锅内溶化后，下蒜头葱头汁，次下药油候冷定，下细药末，入水缸中，令人抽扯色如黑漆为度，收贮大缸内，以井水浸一月可用。每药片五两，用生油一斤，熬熟滤过净油十两。每熟油一斤，下松香十七两，细药五两，煤一两为则。俱用姜擦，贴患处。痢疽、发背、痔漏、疔疮、瘰癧、便毒、杖丹、诸般无名肿毒、顽癣、湿毒、毒瘰、杨梅结毒，初起未破者，俱贴患处；如破久者，用花椒、葱白、甘草煎汤，洗去恶肉贴之，日洗三四次，换膏一次。凡贴膏先用生姜煨热，切开擦患处，将膏火边离远烘揉贴之，贴后以火烘手熨三百度为止。觉皮肤发痒，即揭去膏药，久则要起红垒。

【主治】男妇诸般风气寒热，手足拘挛，骨节痠痛，麻木不仁，走气刺痛，腰痛肋痛，结核转筋，痰核血瘰痞积，肚腹疼痛，九种心痛，小肠气，跌打挫闪损伤，痢疽、发背、痔漏，疔疮，瘰癧，便毒，杖丹，诸般无名肿毒，顽癣，湿毒、毒瘰，杨梅结毒，毒蛇、风犬所伤，恶虫及风中牙痛。

【宜忌】忌食鸡、鹅、羊肉、鱼鲜、椒、蒜辛辣发毒之物。

26347 玄麦饮

《医学集成》卷一。为《辨证录》卷四“玄冬汤”之异名。见该条。

26348 玄豆丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】玄豆一分（炙令焦，去皮子） 巴

豆五枚(去皮心,纸裹压去油) 香墨二钱

【用法】上为末,入巴豆研令匀,以醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服一丸,嚼干柿裹,以温水送下。

【主治】妇人夹宿食,大便不通。

26349 玄应丸

【方源】《医方类聚》卷九十引《经验秘方》。

【组成】沉香 木香 山茱萸(去核,取肉) 石茱萸 香附子(白盐炒) 吴茱萸 破故纸 橘皮 赤芍药各半两 桃仁(麦麸炒,去皮尖双仁) 茴香(生姜汁浸透,盐炒) 川楝子(去核,取肉) 苍术(米泔浸) 各一两 川椒(去目,闭口者不用) 半两 青盐一两(以甜醪草揉成团,放新瓦上,炭火煨成用) 糯米一合(用斑蝥七十个,去头足翅,巴豆七粒,去壳,同炒,以米黄色为度,去豆、蝥不用)

【用法】上为细末,以米醋煮米粉糊为丸,如梧桐子大。如见发,每服三十丸,空心以灯草煎汤调四苓散送下。盐汤、温酒任意送下者,乃常服之法也。

【主治】奔豚疝气,一应下部之疾。

【宜忌】服此如忌羊、鸡、面食,必可除根。

26350 玄灵散

【方源】《雕仙活人方》卷下。

【组成】稀莖草一两 蜚七个(烧灰) 乳香一钱

【用法】上为细末。每服二钱,用无灰酒调热服。如毒重,连进三服得汗为效。

【主治】诸般恶疮、发背发脑,发鬓发髭疔疮、鱼脐疮,一切肿毒。

26351 玄灵散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】败龟版一个(去筋、黄蜡炙透)

【用法】上为末。每服二钱,黄油冲下。

【主治】发背。

26352 玄附汤

《医方类聚》卷九十。即《济生》卷三“延

附汤”。见该条。

26353 玄妙饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】川黄连 天花粉 玄参各二钱 陈皮 桔梗 山梔各一钱五分 淡竹叶廿片

【用法】水煎服。

【主治】汤火所伤。

26354 玄妙饮

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】黄连 花粉 玄参 黑山梔 陈皮 桔梗 甘草 黄芩

【用法】用河水煎,温服。

【功用】解汤火之毒。

【主治】汤火伤。

26355 玄妙散

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】玄参一钱五分 丹参三钱 沙参四钱 茯神二钱 柏仁二钱 麦冬一钱五分(朱砂拌) 桔梗一钱 贝母二钱 杏仁三钱 夜合花二钱 淡竹叶十张 灯心三尺

【主治】心经之咳,痰少心烦,夜不成寐。

26356 玄青丸

【方源】《宣明论》卷十。

【异名】玄青丹(《赤水玄珠》卷五)。

【组成】黄连 黄柏 大黄 甘遂 芫花(醋拌炒) 大戟各半两 牵牛(四两取末) 二两(以上同细末) 轻粉二钱 青黛一两

【用法】上为末,水为丸,如小豆大。初服十丸,每服加十丸,空腹、日午、临卧三服。以快利为度。后常服十五、二十丸,数日后得食。久病未痊除者,再加取利,利后却常服,以意消息,病去为度,后随证止之。小儿丸如黍米或麻子大。退惊疳,热积不下者,须常服十丸。

【主治】下痢势恶,频并窘痛,或久不能止,须可下之,以开除湿热痞闷积滞而使气液宣行者。积热,酒食积,黄瘦中满,水肿腹胀。小儿惊疳,积热乳癖诸证。

【宜忌】唯泄泻者勿服。

26357 玄青丹

《赤水玄珠》卷五。为《宣明论》卷十“玄青丸”之异名。见该条。

26358 玄武丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】龟版二个 白占一钱

【用法】在临煅龟版时，将白占末掺于龟版上，存性研末，白糖调服。

【主治】流注。

26359 玄武汤

《千金》卷九。为《伤寒论》“真武汤”之异名。见该条。

26360 玄武豆

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】羊腰子五十个 枸杞二斤 补骨脂一斤 大茴香六两 小茴香六两 肉苁蓉十二两 青盐八两 大黑豆一斗(圆净者、淘洗净)

【用法】上用甜水二斗，以砂锅煮前药七味至半干，去药滓，入黑豆，匀火煮干为度，如有余汁，俱宜拌掺于内，取出用新布摊晾晒干，瓷瓶收贮。日服之。如无砂锅，即铁锅亦可。

【功用】补益。

【加减】大便滑者，去肉苁蓉，青盐加至十二两；若阳虚者，加制附子一二两更妙。

26361 玄武膏

【方源】《医方大成》卷八。

【组成】大巴豆(去壳膜，净)二两 木鳖子(去壳)二两 国丹四两(净飞过，研细) 清油十两 槐柳嫩枝各七寸长七条(锉细)

【用法】上将巴豆、木鳖、槐柳枝，用瓷器或铜铁器盛，油浸药一宿，慢火煎熬诸药黑色，用生绢帛滤出滓，复将所滤油于慢火上再熬，却将国丹入油内，用长条槐柳枝不住手搅，候有微烟起即提出，点药滴在水面上，凝结成珠不散，方成膏，倾在瓷器内收贮，置新汲水内三日，出火毒，然后用之。若疗肿，先用银篦或鹿角针于疮中间及四畔针破，

令恶血出，以追毒饼如小麦大擦入孔中，却以此膏贴之，若疮坏乱至甚，难以贴药，则将皂角二三片煎油，调匀此膏，如薄糊敷之。

【功用】①《医方大成》：排脓血，生肌肉。

②《得效》：排脓散毒，止疼生肌。

【主治】①《医方大成》：痈疽发背，疮疖。

②《得效》：疗肿，内外疔疮，阴疽下诸恶疮，及头项痈肿。

26362 玄武膏

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】大黄一两 梔子一两 硃砂一钱 木鳖子一两 硼砂一钱 雄黄一钱(以上共为细末) 皮消一撮 油核桃二个 大蒜(去皮)五片 白花菜(晒干)四钱 黑狗脑子一个

【用法】好烧酒一钟，将前六味药末掺入后药内，同捣为饼。每用一饼，贴患处，用热汤瓶熨饼上，如冷再换热瓶熨之，后用布帛扎住，贴二三日去药，再停一二日，再换一饼，依前方用。

【功用】退热。

【主治】小儿癖疾。

【宜忌】忌生冷、油腻、发物。

26363 玄直散

【方源】《名家方选》。

【组成】土茯苓六十钱(合为三生黄黑) 熟地黄三两 生地黄 当归 黄耆(各酒制)各一两 茯苓(蜜制)一两 甘草一钱 人参(茅野产)二两

【用法】上为细末，为二十帖。以土茯苓煎汁，一日服三帖。

【主治】一切痼疾，羸瘦虚弱，不可与峻剂者。

26364 玄英丸

【方源】《圣惠》卷二十五。

【异名】玄英丹(《普济方》卷一一四)。

【组成】雄黄一分(细研) 牛黄一分(细研) 龙脑半分(细研) 白附子一两(生用) 白花蛇一两(酒浸，去骨，炙微黄) 天

麻一两 白僵蚕一两(微炒) 半夏半两(汤浸七遍去滑) 天南星一两(生用) 天雄一两(去皮脐,生用) 麝香半分(细研) 独活一两 干蝎一两(微炒) 铅霜半两(细研) 蝉壳一分 芎藭十两 腻粉一分 犀角屑一分 马牙消一两(烧令通赤,放冷出火毒) 硫黄半两 水银半两(并硫黄结为砂子细研)

【用法】上为末,都研令匀,炼蜜为丸,如豇豆大。每服七丸,以薄荷酒研下,一日三四次。

【主治】一切风。

【宜忌】中风四肢缓弱,宜于淋浴后服,厚盖出汗,避风。忌猪鸡毒滑动风物。

26365 玄英丸

《产论》卷一。即原书同卷“玄英汤”改为丸剂。见该条。

26366 玄英丹

《普济方》卷一一四。为《圣惠》卷二十五“玄英丸”之异名。见该条。

26367 玄英汤

【方源】《产论》卷一。

【组成】干地黄一钱 薯蓣五分 茯苓一钱 山茱萸三分 牡丹皮三分 泽泻一钱 牛膝八分 车前子五分 桂枝一钱 附子八分

【用法】以水二合半,煮取一合半服。

【主治】妊娠转胞。

【备考】本方改为丸剂,名玄英丸。

26368 玄英散

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】川朴消五斤(瓦瓶烧令通赤,细研如粉) 淡竹沥一升

【用法】上将竹沥拌消,令匀湿,用大竹筒一枚,先以牡蛎粉半斤,筑入筒中,次下消后,又以牡蛎粉半斤筑之,以蜡纸三重封之,勿令通气,安在甑中,四面以黑豆埋之,令没筒口,蒸一复时,待冷,去豆开筒,去牡蛎粉,取消细研如粉。每日食后,水调一钱

服之。服至三二斤,渐耐寒暑少汗;服至五七斤,驻颜色,去百病,一生无汗,夏月可以衣裘,冒炎毒,履冰雪,无惧矣。

【功用】祛风热,利三焦,耐寒暑,驻容颜。

26369 玄明散

【方源】《医方类聚》卷六十九引《王氏集验方》。

【组成】蕤仁(去油)三钱 硼砂(明者)五钱 乌贼鱼骨(去骨) 玄明粉各五钱 朱砂(去石)二钱

【用法】上为极细末,入脑、麝各少许,再搗,用瓷盒盛。每用银箸点之。

【主治】眼目翳障。

26370 玄参丸

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】玄参三分 羚羊角屑三分 木香三分 羌活三分 白鲜皮三分 沙参三分(去芦头) 零陵香二分 槟榔三分 人参三分(去芦头) 赤茯苓三分 黄耆三分 白芷三分 马牙消三分 龙脑一分(研) 麝香一分(研) 铅霜一分(研)

【用法】上为末,入龙脑等,同研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,以薄荷汤嚼下,不拘时候。

【主治】肺脏风毒,皮肤生疮疹。

26371 玄参丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】玄参 羚羊角屑 川升麻 汉防己 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 沙参(去芦头) 车前子 桑根白皮(锉) 梔子仁各一两 大麻仁一两半 川大黄一两半(锉碎,微炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后以温水送下,夜临卧时再服。

【主治】肺脏积热,白睛肿胀,遮盖瞳人,开张不得,赤涩疼痛。

【备考】本方改为饮剂,名玄参饮(见《审视瑶函》)。

26372 玄参丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】玄参 决明子 黄耆(锉) 黄连(去须) 青箱子 露蜂房(微炒) 漏芦 羚羊角屑各一两 蕤仁一两半(汤浸,去赤皮) 珍珠粉 雄黄(细研) 朱砂(细研) 各半两

【用法】上为末,入研了药,一时研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后以温浆水送下,临卧再服之。

【主治】眼脓漏,眦头赤痒,日夜出脓水不止。

26373 玄参丸

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】玄参一两 川升麻三分 梔子仁半两 黄芩一两 黄耆三分(锉) 川大黄二两(锉碎,微炒) 沉香三分 甘草半两(生,锉) 蓝叶半两 犀角屑三分 木通三分(锉) 连翘三分 川芒消二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,煎竹叶汤送下,不拘时候。以通利为度。

【主治】发背,及诸痈肿,大小便不通,心腹壅闷烦躁。

26374 玄参丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】玄参半两 干蝎一分(微炒) 水银半两

【用法】上为末,以枣瓤研水银星尽,纳少炼蜜,入药末,为丸如绿豆大。三岁以下,每服三丸,用薄荷汤研破服之;三岁以上,即加丸数服之。

【主治】小儿天钩,惊风搐搦,牙关紧闭,口吐涎。

26375 玄参丸

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】玄参半两 汉防己半两 羌活半两 川大黄一两(锉碎,微炒) 木香半两 梔子仁半两 赤芍药半两 连翘一分 川升

麻半两 牛蒡子半两(微炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服五丸,以粥饮送下,一日三次。

【主治】小儿胸间积热毒,风气不散,连项生恶核,烦热不止。

26376 玄参丸

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【异名】玄门丹(《寿世保元》卷六)。

【组成】玄参 天门冬(去心,焙) 麦门冬(去心,焙) 各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每用一丸,绵裹含化咽津。

【主治】①《圣济总录》:口疮。②《寿世保元》:虚火口疮,连年不愈。

26377 玄参丸

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】玄参 白僵蚕 白矾(生用)各一分 甘草(生用)半分

【用法】上为细散,用鲤鱼胆汁为丸,如赤小豆大。每服十丸,食后温生姜汤送下,一日三次。

【主治】缠喉风。

26378 玄参丸

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】玄参一两 升麻 梔子仁 黄芩(去黑心)各半两 黄耆(细锉)三分 大黄(锉,炒)一两半 吴蓝半两 犀角(镑屑)三分 木通(锉)二两 连翘三分 朴消(研)一两半

【用法】上十一味,先以十味捣罗为细末,再同朴消研匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空心米饮送下。如不利,加至二十丸,取快利三两行为度,泻下脓化为黄水即愈。

【主治】发背,诸痈肿,丹石药毒,头痛壮热,大小便不利。

26379 玄参丸

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】玄参 赤芍药 生地黄 赤茯苓

荆芥 防风 木通 桔梗 黄芩 朱砂 青黛各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，薄荷汤送下。

【功用】解毒。

【主治】疹痘后余毒不散，遍身生疮不已。

26380 玄参汤

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】玄参三两 人参三两 杜仲四两 芍药四两 桂心一两 生姜二两 干地黄三两 白术三两 通草三两 当归三两 寄生四两 芎藭四两 防风二两 丹皮二两 独活二两

【用法】上咬咀。以水一斗二升，煮取三升，日三夜一服。

【主治】腰痛。

【宜忌】忌生葱、桃、李、雀肉、胡荽、芜荑等。

26381 玄参汤

【方源】《外台》卷二十三引《延年秘录》。

【组成】玄参 升麻 独活 连翘各二两 木防己 菊花各一两

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分服一升，一日三次。

【主治】恶核瘰癧风结。

26382 玄参汤

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】玄参(坚者) 白薇(微炒) 白茯苓(去黑皮) 山栀子仁各二两 石膏(捣碎)半两 生干地黄(切，焙)半两 人参(锉)一两 羚羊角(镑)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水二盏，煎取九分，去滓，入竹沥少许，更煎三沸，食后及夜卧服。

【主治】风惊恐怖，如物追逐，如有所失，悲伤志意不定。

26383 玄参汤

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】玄参(坚者)一两 羚羊角(镑)

升麻 射干各三分 芍药 木通(锉)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入生姜半分拍碎，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒咽喉痛，壅塞不通，口苦。

26384 玄参汤

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】玄参 白薇 茯神(去木) 山栀子仁 羚羊角(镑)各八两 石膏(碎)五两 人参一两半 生地黄(洗，控干)五两

【用法】上药咬咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，入竹沥一合，再煎三两沸，不拘时候服。

【主治】心实热，惊悸喜笑，心神不安。

26385 玄参汤

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】玄参 紫苏叶 木通(锉)各三分 枳壳(去瓢，麸炒) 防风(去叉)各半两 麦门冬(去心，炒)一两一分 羚羊角(镑)一分半 生干地黄三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】肺风热，鼻内生疮，烦闷胁满。

26386 玄参汤

《圣济总录》卷一〇四。为原书卷一〇三“羚羊角汤”之异名。见该条。

26387 玄参汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】玄参二两 升麻一两 防风(去叉)一两 羚羊角(镑)一两半 秦艽(去苗土) 紫菀(去苗土)一两半 赤芍药一两半 茯神(去木)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓、食后、临卧温服。

【主治】风目痛赤疹涩。

26388 玄参汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】玄参 柴胡(去苗) 决明子(炒) 石膏 羌活(去芦头) 细辛(去苗

叶)各一两 黄芩(去黑心) 地骨皮各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加竹叶七片,煎至八分,去滓,投芒消末半钱匕,食后、临卧温服。

【主治】目赤生翳。

26389 玄参汤

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】玄参 茅根(锉) 羌活(去芦头) 竹茹 木通(锉) 羚羊角(镑) 升麻各半两 黄连(去须) 人参 苦竹叶 半夏(汤洗去滑)各三分 甘草(锉)一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜三片,煎至六分,去滓,食后温服。

【主治】心肺壅热,口内生疮,胸膈痰逆。

26390 玄参汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】玄参 芍药 连翘(去梗) 防己 射干 升麻(锉) 芒消 白薇 大黄(锉,炒)各一两 杏仁(去皮尖双仁,炒)四十枚 甘草(炙)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞半,煎一盞,去滓,不拘时候温服。

【主治】产后妒乳,乳汁不泄,结成痈肿。

26391 玄参汤

【方源】《济生》卷五。

【组成】生地黄(洗) 玄参 五加皮(去木) 黄芩 赤茯苓(去皮) 通草 石菖蒲 甘草(炙) 羚羊角(镑) 麦门冬(去心)各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱,水一盞半,加生姜五片,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肾脏实热,心胸烦闷,耳听无声,四肢拘急,腰背俯仰强痛。

26392 玄参汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】玄参 生地黄(洗) 枳壳(去瓢,麸炒) 车前子 黄耆(去芦) 当归(去芦,酒浸) 麦门冬(去心) 白芍药各一

两 甘草(炙)半两

【用法】上㕮咀。每服四钱,水一盞半,加生姜五片,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《医方类聚》引《济生》:骨实极,耳鸣,面色焦枯,隐曲膀胱不通,牙齿脑髓苦痛,手足痠痛,大小便秘。②《杏苑》:气实极。

26393 玄参汤

【方源】《永乐大典》卷一三八七八引《风科集验方》。

【组成】玄参(去芦) 地骨皮各一两 升麻 前胡各一两半(去芦) 酸枣仁二钱 羚羊角屑二两

【用法】上㕮咀。每服五钱,水二盞,煎至一盞半,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】风寒湿三气合而成痹,常汗恶风,目睛而动,走注四肢,皮肤不仁,屈伸不便。

26394 玄参汤

《普济方》卷八十四。即《圣济总录》卷一〇三“洗眼蕤仁汤”。见该条。

26395 玄参汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】川芎 玄参各七分 石膏(煨)一钱 甘草 黄连 防风 黄芩各五分 白芷三分 白芍 牛蒡子各八分

【用法】水煎服。

【主治】瘡后齿腮肿痛,流涎。

26396 玄参汤

《幼科类萃》卷十一。为《活人书》卷十八“玄参升麻汤”之异名。见该条。

26397 玄参汤

【方源】《慈幼新书》卷七。

【组成】生地 丹皮 甘草 玄参 牛膝 赤芍 荆芥 花粉

【主治】胃中郁热,赤白游风,往来不定,无色可观。

26398 玄参汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】玄参 山梔 麦冬 天花粉 桔梗 知母 薄荷 甘草 黄芩

【功用】清肺润燥。

【主治】实火咽痛。

【加减】阳明有热，加升麻、石膏，即合玄参升麻汤；少阳有热，加柴胡、胆星；外冒风邪，加防风、荆芥。

26399 玄参汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】玄参 黄芩 麦冬 白茯苓 丹皮 桔梗 陈皮 甘草 连翘 薄荷 柴胡 当归

【用法】水煎服。兼服犀角丸。

【主治】肝肺火盛，耳中作痒，以致挖伤耳聾者。

26400 玄参饮

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】玄参 钩藤 甘草（炙，锉） 升麻 山梔子仁 黄芩（去黑心） 犀角（镑，微炒） 麦门冬（去心，焙）各半两

【用法】上为粗末。三四岁儿每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓服，一日三四次。

【主治】小儿风痫。

26401 玄参饮

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】玄参 升麻各五钱 川乌（炮裂，去皮脐） 草乌（炮裂，去皮） 当归（酒洗） 川芎 赤葛 生干地黄 赤芍药各二钱半 甘草三钱 大黄（半生半炮）四钱

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盞，加生姜二片，煎七分，不拘时候温服。

【主治】小儿瘰癧证，及颈上生恶核肿痛。

26402 玄参饮

《审视瑶函》卷三。即《圣惠》卷三十三“玄参丸”改为饮剂。见该条。

26403 玄参饮

【方源】《医学摘粹》。

【组成】玄参一两

【用法】水煎，当茶饮。

【主治】火盛头痛。

26404 玄参剂

【方源】《袖珍小儿》卷七。

【异名】黑参剂（《医部全录》卷四五四）。

【组成】生地黄 玄参各一两 大黄五钱（煨）

【用法】上为末，炼蜜为丸。灯心、淡竹叶汤送下；或入砂糖少许。可加防风、羌活、川芎、赤芍药、连翘。

【功用】解诸热，消疮毒。

【主治】①《袖珍小儿》：小儿痈毒肿疔。②《婴童百问》：小儿痈疮，惊毒疔肿热甚者。

26405 玄参剂

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】芍药 玄参 升麻 地黄 甘草 黄芩 龙脑叶 山梔 连翘各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大，辰砂为衣。每服一丸，薄荷汤送下。

【主治】小儿疮疹。

26406 玄参酒

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】玄参三斤（细锉） 磁石三斤（烧令赤，醋淬七遍，细研，水飞）

【用法】以生绢袋盛，酒三斗，浸六七日。每服一盞，空心临卧温服。

【主治】瘰癧寒热，先从颈腋诸处起者。

26407 玄参散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】玄参一两 射干一两 黄药一两

【用法】上为末。每服五钱，以水一大盞，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，上焦虚，毒气热壅塞，咽喉连舌肿痛。

26408 玄参散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】玄参 射干 川升麻 百合 前胡（去芦头） 白蒺藜（微炒，去刺） 犀角屑 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 甘草（炙微赤，锉） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桔梗（去芦头） 木通（锉） 麦门冬（去心）各三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盞，

煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气热毒上攻咽喉，噎塞肿痛。

26409 玄参散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】玄参一两 羚羊角屑一两 黄耆一两（锉） 川升麻一两 大青一两 漏芦二两 地骨皮一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，遍身生热毒疮，痒痛，有脓水。

26410 玄参散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】玄参半两 甘菊花半两 地骨皮半两 川升麻半两 黄连半两（去须） 麦门冬一两（去心，焙） 梔子仁半两 柴胡半两（去苗） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，热毒攻睛，额角偏痛，两眼涩痛，心神烦闷。

26411 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】玄参一两 麦门冬一两（去心） 防风一两（去芦头） 地骨皮一两 远志一两（去心） 川大黄一两（锉碎，微炒） 车前子一两 茺蔚子一两 决明子一两 蔓荆子一两 细辛一两 黄芩一两 黄连一两（去须） 犀角屑一两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】眼风赤痛，生障翳，乍好乍恶，多有泪出，见日不得，涩肿疼痛，心神烦热。

【宜忌】忌炙煨热面。

26412 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】玄参一两 甘菊花三分 防风一

两（去芦头） 羚羊角屑三分 蔓荆子三分 赤芍药三分 马牙消一两 子芩一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服，临卧再服之。

【主治】针眼赤肿，心躁，风热壅滞，眼开即涩痛。

26413 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】玄参一两半 桔梗（去芦头） 川大黄（锉碎，微炒） 羚羊角屑 赤芍药 防风（去芦头） 黄芩各一两 茺蔚子二两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】眼忽然突出睛高。

26414 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】玄参一两 牛蒡子一两（微炒） 川升麻一两 木香半两 犀角屑一两 甘草一两（炙微赤，锉） 桑根白皮一两（锉） 黑豆皮半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不拘时候温温灌之。

【主治】热毒伏在心脾，攻于咽喉，心胸胀满，口噤胀。

26415 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】玄参一两 川升麻半两 射干半两 川大黄半两（锉碎，微炒） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，放温，时时含咽。

【主治】悬壅肿痛，不下饮食。

【方论选录】《本事方释义》：玄参气味咸苦，入手足少阴；升麻气味辛温，入足阳明；射干气味苦平，入手足厥阴；大黄气味苦寒，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴。治悬

痈痛咽阻不能下食者，以苦降之品，少佐辛温，再少使以甘平，则上逆之热缓缓下行，病自减矣。

26416 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】玄参三分 川升麻三分 独活三分 麦门冬三分（去心） 黄芩三分 黄柏三分 川大黄三分（锉碎，微炒） 梔子仁三分 前胡三分（去芦头） 犀角屑三分 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】口舌生疮，连齿龈烂痛。

26417 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】玄参三分 川升麻三分 川大黄三分（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 犀角屑三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心脾壅热，生木舌肿胀。

【方论选录】《本事方释义》：玄参气味咸苦，入手足少阴；升麻气味辛温，入足阳明；大黄气味苦寒，入足阳明；犀角气味苦酸咸，微寒，入手足厥阴；甘草气味甘平，入足太阴，能缓诸药之性。因心脾气壅痹不宣，非下行不能杀其势，速下犹恐热不尽，故以甘平之品缓其下行之势，则壅热去而无不尽矣。

26418 玄参散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】玄参二两 紫雪二两 川升麻一两 沉香一两 犀角屑三分 川大黄一两（锉碎，微炒） 甘草半两（生，锉） 黄芩三分 葳蕤三分 地骨皮三分 梔子仁三分 连翘三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加竹叶三七片，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】乳石发动烦热，生痈肿疼痛。

26419 玄参散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】玄参一两 犀角屑一两 川芒消一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 黄耆一两（锉） 沉香一两 木香一两 羚羊角屑二两 甘草三分（生，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，以温水调下，不拘时候。

【主治】渴利烦热，发痈疽，发背，焮肿疼痛。

26420 玄参散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】玄参一两 梔子仁三分 黄芩一两 白薇半两 川升麻一两 连翘一两 犀角屑半两 葳蕤一两 木香半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】渴利后，头面身上遍生热毒疮。

26421 玄参散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】玄参半两 甘草半两（生，锉） 麦门冬三分（去心） 前胡（去芦头） 枳实（麸炒微黄） 人参（去芦头） 赤芍药 生干地黄 黄耆 芍药 赤茯苓 黄芩各一两 石膏二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片、小麦一百粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痈肿始发，热毒气盛，寒热心烦，四肢疼痛。

26422 玄参散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【异名】玄参膏（《圣济总录》卷一八二）。

【组成】玄参半两 紫葛半两（锉） 川大黄半两（生用） 木香半两 卷柏半两 川芒消半两 黄药半两 紫檀香半两（锉）

【用法】上为细散。以鸡子白调和，稀稠得所，薄涂所患处。

【主治】①《圣惠》：痈肿，毒热疼痛。②

《圣济总录》：小儿脑热结瘰癧，连两耳下肿痛，身体寒热，坐卧不安，食饮不下。

【加减】有疮肿已破者，去芒消。

26423 玄参散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】玄参一两 川升麻三分 白鲜皮一两 黄连一两（去须） 土瓜根一两 麦门冬一两（去心） 赤芍药一两 川大黄一两半（锉碎，微炒） 大麻仁一两半 川朴消一两半

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生地黄一分，细切，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痈肿成脓水，不能下食，心热口干，烦渴饮水多，四肢羸瘦。

26424 玄参散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】玄参一两 黄芩一两 当归一两 赤芍药一两 麦门冬一两（去心） 犀角屑一两 甘草一两半（锉） 远志一两（去心） 生干地黄一两 赤茯苓一两半 川升麻一两半 人参一两半（去芦头）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片、小麦五十粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热毒气攻冲背上，初觉疼痛，烦闷，经月不瘥。

26425 玄参散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】玄参一两 黄耆二两（锉） 露蜂房一两（微炒） 地榆三两（锉） 白藜一两 赤芍药二两 黄芩三两 川升麻一两 漏芦一两 桑根白皮二两（锉） 梔子仁一两 川大黄二两（锉碎，微炒） 川朴消三

两
【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】发背溃后，脓血不止，渐渐疮大，疼痛，身体壮热。

26426 玄参散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】玄参一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 木通一两（锉） 独活一两 犀角屑半两 川大黄一两（锉碎，微炒） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服。一日三四次。

【主治】瘰癧初生结肿，发歇寒热。

26427 玄参散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】玄参三分 连翘三分 知母三分 当归三分 雄黄三分（细研） 牵牛子三分（微炒） 黑豆三分（炒熟） 黄芩三分 犀角屑三分 赤芍药三分 石三分（泥裹烧半日，细研） 地胆一分（以糯米拌炒，末黄为度，去翅足） 斑蝥一分（以糯米拌炒，米黄为度，去头翅足） 空青三分（烧过细研） 桂子三分（微炒）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，空腹以温酒调下。三五服后，小便出烂肉为效。

【功用】散热毒。

【主治】热毒瘰癧，壅肿疼痛。

26428 玄参散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】玄参二两 川升麻二两 独活二两 汉防己一两 甘菊花一两 连翘三两 犀角屑半两 川大黄半两（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】蛎螬瘰，结核肿痛。

26429 玄参散

【方源】《普济方》卷一四〇引《博济》。

【组成】川大黄 玄参 朴消 白药子各半两 甘草二分

【用法】上为末。每服一钱，水一盞，煎至八分，放冷服。再服愈。

【主治】伤寒汗后，余热未解。

26430 玄参散

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】玄参(洗,切) 犀角(镑屑) 芒消(研细) 黄耆(细锉) 沉香(锉) 木香 羚羊角(镑屑) 各一两 甘草(生,锉) 三分

【用法】上为细散。每服二钱匕,温水调下,不拘时候。

【主治】渴利后,经络痞涩,营卫留结成痼疽。

26431 玄参散

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】玄参 大黄(锉,炒) 各二两半 决明子(炒) 菊花 车前子 升麻 黄连(去须) 枳壳(去瓢,麸炒) 各二两 栀子仁(炒) 防风(去叉) 各一两半 苦参(锉) 半两

【用法】上为散。每服三钱匕,食后、临卧蜜水调下,一日三次。

【主治】上膈壅滞,风邪毒气攻目,令目睛疼痛;目赤痛,胥肉满急。

26432 玄参散

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】玄参 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒) 甘草(炙) 赤茯苓(去黑皮) 白术 桔梗(炒) 人参各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,热汤调下,一日三五次。

【主治】狗咽气塞。

26433 玄参散

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】玄参 黄芩(去黑心) 羊蹄根 芍药 白芷 丁香 木香 消石(碎) 半夏(汤洗七遍) 白薇 木鳖子(去壳) 莽草各一两

【用法】上为散。醋调涂疮上,一日三四次,肿消为度。

【主治】一切痈疽 疮肿。

26434 玄参煎

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】玄参一两 川升麻半两 苦参半两(锉) 人参三分(去芦头) 秦艽一两(去苗) 马牙消半两

【用法】上为散。每服五钱,用水一大盏,煎至五分,去滓,入炼蜜一合,相和令匀,不拘时候,徐徐含咽服之。

【主治】伤寒,咽喉内痛,满口生疮,吃食不得。

26435 玄参煎

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】生玄参汁 生葛汁各三升 银一两 寒水石(捣末) 石膏(捣末) 滑石(捣末) 磁石(煨,醋淬七遍,捣末) 各一斤 升麻 羚羊角(镑) 犀角(镑) 甘草(锉) 各二两 芒消一斤 牛黄(研为细末) 二两

【用法】上十三味,除银、玄参、生葛、芒消、牛黄外,并粗捣筛,以水三斗,煎银、寒水石、石膏、滑石、磁石,取汁二斗,去滓;别以水五盏,煎升麻、羚羊角、犀角、甘草至二盏,去滓,与玄参并生葛汁,一处都和,再煎如稀汤,然后下芒消搅匀,倾入瓷器中盛,却入牛黄末,再搅取匀停,令黄黑色。每取两大匙,入蜜一合和匀,分四服,热汤调下,不拘时候。

【主治】热毒发动,口疮,心烦躁。

26436 玄参膏

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】玄参一两 紫葛一两(锉) 黄柏一两 川大黄一两 木香一两 卷柏一两 川芒消一两 紫檀香一两

【用法】上为末。以鸡子白和,稀稠得用,涂于肿上。

【主治】小儿脑热,结瘰癧,连两耳肿痛,身体寒热,坐卧不安。

【加减】若疮肿破时,则去芒消涂之。

26437 玄参膏

《圣济总录》卷一八二。为《圣惠》卷六十一“玄参散”之异名。见该条。

26438 玄胡丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】玄胡索 青皮(去白) 陈皮(去白) 当归 木香 雄黄(别研) 荆三棱 生姜各一两

【用法】上为末，酒面糊为丸，如小豆大。每服五七丸，生姜汤送下。

【功用】解中外诸邪所伤。

【主治】积聚癥瘕。

26439 玄胡丸

【方源】《御药院方》卷三。

【异名】玄胡索丸(《医学纲目》卷二十五)。

【组成】玄胡 当归 青皮(去白) 雄黄(飞) 蓬莪术(纸煨) 槟榔 木香各四两 荆三棱六两

【用法】上为细末，入雄黄匀，水面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【功用】解化伤滞，内消饮食。调顺三焦，安和脾胃。

【主治】①《御药院方》：吐利腹胀，心腹刺痛，癥瘕结气，虫烦不安。②《普济方》引《德生堂方》：中焦不和，脾胃积冷，心下虚痞，肠腹中疼痛，或饮食过多，胸胁逆满，噎塞不通，咳嗽无时，呕吐冷痰，妇人血气，肚腹疼痛。

26440 玄胡饼

【方源】《医统》卷五十三。

【组成】玄胡索十枚 猪牙皂角(肥实者)二枚 青黛二钱

【用法】上为末，水和成小饼子，如杏仁大。用时令患人仰卧，以水化开，用竹管送入鼻中，男左女右，觉药至，喉心酸，令患人坐，却令咬定铜钱一个于当门齿，当见涎出，成盆便愈。

【主治】头痛不可忍。

26441 玄胡酒

《医方考》卷五。方出《圣惠》卷八十，名

见《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》“玄胡散”之异名。见该条。

26442 玄胡散

【方源】方出《圣惠》卷八十，名见《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》。

【异名】玄胡酒(《医方考》卷五)。

【组成】玄胡索末

【用法】以温酒调下一钱

【主治】妇人血气痛，产后恶露不尽。疮肿。

①《圣惠》：产后恶露不尽，腹内痛。②《医方类聚》引《施圆端效方》：疮肿无头，闷痛。③《医方考》：妇人攻刺疼痛，连于胁膈者。

【方论选录】《医方考》：玄胡索，味苦辛，苦能降气，辛能散血，淬之以酒，则能达手经脉矣。

26443 玄胡散

【方源】方出《百一》卷十五，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】玄胡索五文 轻粉五文 石膏五文(猛火煨过) 枇杷叶四文(净洗去毛) 活田螺二个(烧灰，以壳白为度，并肉用)

【用法】上为末。敷之。

【主治】下疳疮。

26444 玄胡散

【方源】《女科万金方》。

【组成】当归 川芎 赤芍 熟地 桃仁 枳壳 木香 官桂 玄胡

【用法】生姜二片为引，水煎，食前服。

【主治】胎前、产后血气攻心腹痛。

26445 玄胡散

【方源】《普济方》卷二五一。

【组成】玄胡索 知母 贝母 款冬花各一两

【用法】上为细末。每服二钱，猪肉一两，薄批掺药卷定，精火炙熟，食后细嚼，生姜汤下，一日二次。

【主治】虚劳喘嗽，咳唾脓血，肌热盗汗困弱。

26446 玄胡散

【方源】《奇效良方》卷二十六。

【异名】玄椒散（《仙拈集》卷二）。

【组成】玄胡索（炒） 胡椒各等分

【用法】上为细末。每服二钱，食前用温酒调服。

【主治】冷气心痛，及疝气，心腹疼痛。

26447 玄胡散

《赤水玄珠》卷九。为《普济方》卷二一五引《活人书》“玄胡索散”之异名。见该条。

26448 玄胡散

【方源】《准绳·幼科》卷三。

【组成】玄胡索一两 天南星二两 朴消半两 巴豆二七个（去油）

【用法】上为末，芸苔汁调。毛翎扫之。

【主治】小儿赤流。

26449 玄胡散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】玄胡索（生）

【用法】上为末。用葵藜汤漱过，以此敷之。

【主治】牙宣。

26450 玄胡散

【方源】《蒿崖尊生》卷十四。

【组成】玄胡三钱 归身一钱 乳香五分 甘草一钱

【用法】加盐卤一滴服。少顷愈。

【主治】妊娠心痛。

26451 玄胡散

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】玄胡索四两 头发灰四钱

【用法】上为末。酒调下。服半月可愈。

【主治】经来小腹结成块，如皂角一条横过，痛不可忍，面色青黄，不思饮食。

26452 玄荆汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参二两 荆芥三钱

【用法】水煎服。

【主治】心肾不交，寒热时止时发，一日四五次以为常，热来时躁不可当，寒来时颤不能已。

26453 玄剑散

【方源】《施圆端效方》引张君玉方（见《医方类聚》卷一三六）。

【组成】皂角（大者，去皮子，炙黄）

【用法】上为细末，葱蘸经肛内。立通。或吹亦得。

【主治】大便后结，服紧转药不通者。

26454 玄珠膏

【方源】《外科大成》卷一。

【异名】元珠膏（《金鉴》卷六十二）。

【组成】木鳖子肉十四个 斑蝥八十一个 柳枝四十九寸（或加驴甲片三钱 草乌一钱 麻油一两）

【用法】浸七日，文火燥枯，去滓，入巴豆仁三两，煎豆黑倾于钵内，研如泥，加麝香一分搅匀，入罐内收用。肿疡将溃涂之，脓从毛孔吸出，已开针者，用拈蘸送孔内呼脓，瘀腐不净，涂之立化。

【功用】《金鉴》：呼脓化腐。

【主治】肿疡将溃。

26455 玄素散

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】百草霜 天花粉各等分

【用法】上为细末。每服一钱，大麦煮汁送下，一日二次。

【主治】产后乳汁少。

26456 玄桂丸

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《直指附遗》卷六。

【异名】玄胡索丸（《医学入门》卷七）。

【组成】玄胡一两半 桂 滑石 红花 红曲各五钱 桃仁三十个

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸服。

【主治】死血留胃脘作痛者。

【备考】《直指附遗》本方用法：为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服四十丸，姜汤送下。

26457 玄桔汤

【方源】《玉案》卷六。

【组成】玄参 桔梗 牛蒡子 连翘 天

花粉 甘草各一钱

【用法】加淡竹叶二十片，水煎服。

【主治】痧症，咽喉肿痛。

【备考】《幼科证治大全》引《玉案》：淡竹叶七片，生姜水煎服。

26458 玄梅散

【方源】《普济方》卷三八〇。

【组成】玄胡索 乌梅一钱

【用法】上咬咀。每一钱，水八分，甘草一寸，煎四分服。

【主治】小儿疳病，腹中疼痛。

【备考】方中玄胡索用量原缺。

26459 玄菟丸

《痘疹仁端录》卷十三。为《赤水玄珠》卷二十七“玄菟丹”之异名。见该条。

26460 玄菟丹

【方源】《三因》卷十。

【异名】玄菟煎（《易简方》）、茯菟丹（《直指》卷十七）、茯菟丸（《丹溪心法》卷三）。

【组成】菟丝子（酒浸通软，乘湿研，焙干，别取末）十两 白茯苓 干莲肉各三两 五味子（酒浸，别为末）七两

【用法】上为末，别碾干山药末六两，将所浸酒余者，添酒煮糊，搜和得所，捣数千杵，丸如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前米汤送下。

【功用】常服禁精，止白浊，延年。

【主治】消渴、遗精、白浊。

①（三因）：三消渴利，白浊。②《医方大成》：肾水枯竭，心火上炎，津液不生，消渴诸证。③《济阳纲目》：肾气虚损，目眩耳鸣，四肢倦怠，遗精尿血，心腹胀满，脚膝痠痿，股内湿痒，小便滑数，水道涩痛，时有遗溺等证。④《证治宝鉴》：下焦虚而不能摄水，以致小便多而有降无升。

【宜忌】《易简方》：须是戒酒，并火上炙煨之物。

26461 玄菟丹

【方源】《赤水玄珠》卷二十七。

【异名】玄菟丸（《痘疹仁端录》卷十三、卢氏元菟丹（《痘疹辑要》卷一）。

【组成】玄参（酒洗）五两 菟丝子（水淘净，酒煮，研烂为末）

【用法】上为末，俱不犯铁器，黑砂糖为丸，如弹子大。每日与儿服三丸，砂糖汤送下。

【功用】稀痘。

【备考】方中菟丝子用量原缺。《简明医彙》玄参用四两，菟丝子用八两。

26462 玄菟散

【方源】《慈幼新书》卷六。

【组成】菟丝子一斤（淘净，用无灰酒砂锅内煮一日，入石臼内捣成薄片晒干）玄参斤半

【用法】上为末，和匀，入瓷罐收贮，常晒。每遇二十四节以砂糖汤调下，量儿大小，或五分，或一钱二钱。如邻近出痘，即日服之。

【功用】预服稀痘。

26463 玄菟煎

《易简方》。为《三因》卷十“玄菟丹”之异名。见该条。

26464 玄黄丹

【方源】《医方考》卷六。

【组成】硫黄（制）一斤 青黛（飞）一两六钱

【用法】用硫黄为丸，青黛为衣服。

【主治】老人寒痰内盛者。

【宜忌】凡服硫黄者，忌猪血、羊血、牛血及诸禽兽之血，慎之。

【方论选录】硫黄，火之精也，人非此火不能以有生，故用之以益火；以青黛为衣者，制其燥咽云尔。

26465 玄黄散

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】玄参三钱 黄耆钱半 羌活一钱 独活一钱 防风二钱 前胡一钱 柴胡一钱 白芍一钱 陈皮一钱 白芷一钱 牛子一钱

桔梗二钱 茯苓二钱 甘草八分

【用法】内服。并吹绿云天散，敷鼎足方。

【主治】脚跟喉风初起，证从脚跟发起，直至喉间，或一年一发，或半年一发，其病日行一穴者。

26466 玄椒散

《仙拈集》卷二。为《奇效良方》卷二十六“玄胡散”之异名。见该条。

26467 玄犀饮

【方源】《简明医毅》卷五。

【组成】玄参 升麻 大黄 犀角（若无，用黄连） 生地 黄芩 黄柏各等分 甘草减半。

【用法】水煎服。

【主治】心脾热壅，木舌肿胀。

26468 玄精丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】太阴玄精二两 白矾半斤 黄丹二两 青盐半两

【用法】上为细末，入生铁铤子内，烧白矾汁尽为度，后以不蛀皂荚三挺，存性烧熟都研为末，用糯米饭为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以粥饮送下。

【主治】休息痢久不愈，面色青黄，四肢逆冷，不思饮食。

26469 玄精丹

【方源】《准绳·类方》卷八。

【异名】元精丹（《医部全录》卷一六四）。

【组成】血余（自己发及父子一本者，及少壮男女发，拣去黄白色者，用灰汤洗二三次，再以大皂角四两捶碎，煮水洗净，务期无油气为佳，将发扯碎晒干，每净发一斤用川椒四两，拣去梗核，于大锅内发一层，椒一层和匀，以中锅盖之，盐泥固济，勿令泄气，桑柴慢火煨三炷香，退火待冷取出，于无风处研为细末）四两 何首乌（用黑豆九蒸九晒，拣去豆，取净末）一斤 黑脂麻（九蒸九晒，取净末）八两 破故纸（炒，取净末）四两 生地黄（怀庆沉水者，酒浸杵膏）八两 熟

地黄（酒浸杵膏）八两 桑椹（取净汁熬膏）四两 女贞实四两 旱莲草（取净汁熬膏）四两 胡桃肉（研膏）二两 胶枣肉（研膏）二两 槐角子（入牛胆内百日）四两

【用法】上以药末入诸膏和匀，加炼蜜一斤成剂，入石臼内春千余下，如梧桐子大。每服六十丸，空心用何首乌酿酒每温二三杯送下，一日三次。

【功用】乌须发。

【主治】《医级》：肝肾不足，精血枯涸，凡虚损在真阴水火者。

26470 玄精汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】盐卤水

【用法】用盐 水温洗之，或食盐一碗，滚水冲化洗之，洗去腐肉以出红筋为度，则好肉自生，次用雄黄、黄柏各二两，轻粉三钱和匀敷之，绢帛扎之，半月方解。

【主治】血风疮，并疔疮痒至彻骨者。

26471 玄蝎散

《医学入门》卷七。为《朱氏集验方》卷三引朱仁卿方“元胡索散”之异名。见该条。

26472 玄霜散

《活幼心书》卷下。为原书同卷“玄霜膏”之异名。见该条。

26473 玄霜散

【方源】《简明医毅》卷八。

【组成】黑铅五钱 水银二钱五分 软石膏（火煨）三钱五分 真轻粉二钱五分 明礞砂一钱 珍珠（另研极细）五分 冰片三分

【用法】黑铅铜勺溶化，入水搅匀，倾出，研不见星，再入余药共研匀，入瓷瓶内。用时葱、椒、艾煎汤，入坛先熏至温，洗净敷药。干者，猪胆润湿掺上。

【主治】下疳蛀梗，茎烂，及诸疮毒瘰疬，久不愈者。

26474 玄霜膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】玄霜散。

【组成】好糯米五升(或不拘多少)

【用法】上用坚硬铁器盛贮,见天处以雪水浸一二月,不问腐烂,仍用竹器捞出于大笊箕内,别取净水淋过,晒干焦炒,研为细末,新汲井水调涂患处,如干燥,又以软鸡翎蘸水添拂疮上,使之滋润痛减,药少再添用,自然效速。未久成团,再研细,炒透黑色烟清为度。敷上痛止,更无瘢痕。

【主治】汤火疮。

26475 玄霜膏

【方源】《医便》卷三。

【组成】乌梅(煎浓汁)四两 姜汁一两 萝卜汁四两 梨汁四两 柿霜四两 款冬花 紫菀各二两(俱为末,已上药制下听用)

【用法】另用白茯苓十两,取净末半斤,用人乳三斤,将茯苓末浸入,取出晒干,又浸又晒,乳尽为度,却将前冬花、紫菀末、柿霜、白糖并各汁,再加蜜糖四两和匀,入砂锅内,慢火煎熬成膏,丸如弹子大。每服一九,临卧时噙化,薄荷汤漱口。半月即效而愈。

【主治】吐血虚嗽。

26476 玄霜膏

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】乌梅汁 红梨汁 萝卜汁 柿霜 甘蔗糖 白蜜 鲜姜汁各四两 白茯苓 款冬花 天冬各二两

【用法】前七味熬膏,搅合后三味,瓷器收贮。每服二钱,徐徐噙化。

【功用】滋润肺脏,清利气道。

【主治】虚劳肺痿,咳嗽便秘,吐血咯痰,肺热哮喘,咽干舌裂,喉头炎症,口粘膜炎。

26477 玄明粉丸

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】罂粟壳

【用法】上为末,再入玄明粉一钱,麝香少许,再取猪胆汁煮粉为丸。每服五十丸,陈皮汤送下;如水泻,米饮送下;烦渴,罂粟壳汤送下;涩,石榴皮汤送下。

【主治】小儿疳泻。

26478 玄明粉散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】玄明粉半两

【用法】每服二钱匕,将冷茶磨木香,入药顿服。即通。

【主治】大便不通。

26479 玄明粉散

【方源】《痘疹金镜录》卷四。

【组成】玄明粉三钱

【用法】当归尾五钱煎汤,冷调服。

【主治】血热便秘。

【方论选录】《医方考》:玄明粉咸寒,取其软坚;当归尾辛利,取其破血。此攻下之剂也,宜量人之虚实而用之。

【备考】方中当归尾用量原缺,据《医方考》补。

26480 玄明粉散

【方源】《治疫全书》卷四。

【组成】玄明粉二钱 寒水石一钱五分 黄连一钱五分 辰砂一钱 珍珠八分

【用法】上为末。用鸡子清一枚,白蜜一匙,新汲水调服。

【主治】温疫发狂,身如火烙,齿黑舌刺,面赤眼红,大便秘结等证。

26481 玄胡索丸

《医学纲目》卷二十五。为《御药院方》卷三“玄胡丸”之异名。见该条。

26482 玄胡索丸

《医学入门》卷七。为方出《丹溪心法》卷四,名见《直指附遗》卷六“玄桂丸”之异名。见该条。

26483 玄胡索汤

《得效》卷十五。为《济生》卷六“延胡索汤”之异名。见该条。

26484 玄胡索汤

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】玄胡索一钱 当归(酒洗)一钱 白芍(酒炒)一钱 厚朴(姜炒)一钱 莪术(煨)一钱 川楝子一钱 三棱(煨)一

钱 木香一钱(煨) 川芎一钱二分 桔梗一钱二分 黄芩(炒)八分 甘草七分(炙) 槟榔一钱

【用法】上锉一剂。水二盏，煎八分，空心时热服。

【主治】产后七情伤感，血与气并，心腹疼痛。

26485 玄胡索汤

《产科发蒙·附录》。为《普济方》卷三二八引《卫生家宝方》“玄胡苦楝汤”之异名。见该条。

26486 玄胡索散

【方源】《普济方》卷二一五引《活人书》。

【异名】延胡散(《医统》卷十四)、玄胡散(《赤水玄珠》卷九)。

【组成】玄胡索一两 朴消三分

【用法】上为末。每服四钱，水二盏，煎至八分，温服。

【主治】热入下焦尿血。

①《普济方》引《活人书》：溺血。②《医方考》：阳邪陷入下焦，令人尿血。③《赤水玄珠》：尿血作痛。

【方论选录】《医方考》：阳邪者，热病、伤寒之毒也。下焦者，阴血所居，阳邪入之，故令尿血。玄胡索味苦而辛，苦，故能胜热；辛，故能理血。佐以朴消，取其咸寒，利于就下而已。

26487 玄胡索散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【异名】元胡索散(《朱氏集验方》卷十)。

【组成】蓬莪术半两(油煎，乘热切片子) 玄胡索一分

【用法】上为细末。每服半钱，食前淡醋汤调下。

【主治】妇人血气攻心，痛不可忍，并走注。

26488 玄胡索散

【方源】《卫生总微》卷十七。

【组成】玄胡索(去皮)一两 甘草(生)白矾(生)各半两

【用法】上为末。每服半钱，水一小盏，煎至六分，去滓，放温时呷服。

【主治】小儿诸药毒，烦躁闷乱，吐利呕血。

26489 玄胡索散

【方源】《普济方》卷一五六引《海上方》。

【组成】玄胡索 牛膝 当归 破故纸各等分

【用法】上为末。每服三钱，空心温醋汤调下。

【主治】腰腿疼痛。

26490 玄胡索散

【方源】《得效》卷四。

【组成】玄胡索一两 甘草二钱

【用法】上为散。水一碗，煎至半碗，顿服。如吐逆，分作三五次服。

【主治】卒心痛。

26491 玄胡索散

《医学纲目》卷二十一。为《博济》卷四“延胡散”之异名。见该条。

26492 玄胡索散

【方源】《普济方》卷六十五。

【组成】玄胡索一钱 斑蝥三个(去头尾，炒) 白丁香三十个

【用法】上为细末，新汲水调为丸，如小豆大。新绵裹，左疼入左耳，右疼入右耳。

【主治】牙疼。

26493 玄胡索散

【方源】《普济方》卷三三五。

【组成】玄胡索三两 当归二两

【用法】上为末。每服三钱，用好红花酒半碗，热调下。未服药前，以硬炭半段烧红，好醋五升，作醋炭熏患人，方服药。

【主治】妇人血晕，冲心欲死者。

26494 玄胡索散

《医学入门》卷八。为《博济》卷四“延胡索散”之异名。见该条。

26495 玄胡索散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】玄胡索 当归 川芎 桂心 木香 赤芍药 枳壳 桃仁各一钱 熟地黄三

钱

【用法】上咬咀。水二钟，加生姜三片，煎一钟，不拘时候服。

【主治】血气攻注，心腹疼痛。

26496 玄胡索散

《东医宝鉴·外形篇》卷三。为《济生》卷六“延胡索汤”之异名。见该条。

26497 玄胡索散

【方源】《济阴纲目》卷一。

【组成】当归（酒浸） 赤芍药（炒） 玄胡索 蒲黄（隔纸炒） 桂皮 乳香（水研） 没药各一钱

【用法】上为细末。每服三钱，空心温酒调服。

【主治】经行血气攻刺疼痛，及新旧虚实腹痛；产后恶血攻刺腹痛。

26498 玄精石方

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】石膏 太阴玄精石各一两 麻黄二两 甘草半两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盂，加竹叶二七片，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒头痛。

26499 玄精石散

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】玄精石半两（研如粉） 黄柏（去粗皮，炙，捣末）一两

【用法】上为极细末。点两眦头。

【主治】眼赤涩。

【备考】无玄精石，以马牙消代之。

26500 玄精石散

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】太阴玄精石不拘多少（锅子内大火煨，纸衬子地坑内，出火毒一宿）

【用法】上为细末。每看多少，用冷水调，鸡翎扫之。疼痛立止。

【主治】汤火伤，疼痛不可忍。

26501 玄精石散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】太阴玄精石 寒水石各一分（研）

轻粉 麝香各少许

【用法】上为细末。先以淡浆洗去疮痂，拭干，油调药涂之，甚者不过再。

【主治】小儿头疮。

26502 玄精石散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】玄精石一两 甘草半两

【用法】上为细末。每服半钱，竹叶汤调下。

【主治】小儿眼生赤脉。

26503 玄丹升麻汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参半斤 丹皮三两 升麻三钱

【用法】水煎一碗服。一剂即愈。

【主治】心火内热，热极发斑，目睛突出，两手冰冷。

26504 玄丹麦冬汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参 丹参 麦冬各一两

【用法】水煎服。

【主治】相火妄动，口舌红肿，不能言语，胃中又觉饥渴之甚。

26505 玄石花粉散

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】石膏二钱 白术三钱 茯苓五钱 天花粉 玄参各三钱

【用法】水煎服。

【主治】热气入胃，胃火未消，火郁成痰，痰色黄秽，败浊不堪。

26506 玄石紫粉丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】磁石三斤（好者）

【用法】上以炭火烧令赤，投一斗米醋中淬之，以醋尽为度，更烧，投一斗好酒中，以酒尽为度；有拆破者，一一收之细研，以水飞过，泣干，入瓶子中，以大火煨令通赤，用盐花三两，同研令匀，于地上铺纸匀摊，以盆盖三日，出火毒，以蒸饼为丸，如梧桐子大。每服七丸，空心以盐汤或酒送下，渐加至十丸。

【功用】补暖下元，强壮筋骨，聪耳明目，

保神益气，祛风冷，利腰脚。

26507 玄母菊英汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参二两 甘菊花一两 知母三钱 熟地二两

【用法】水煎服。

【主治】太阴脾火之痿，善用肥甘之物，食后即饥，少不饮食，便觉头红面红，两足乏力，不能行走。

26508 玄牝太极丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术四两（用米泔、盐水、酒、醋各浸炒一两） 当归 熟地各三两 川芎一两 葫芦巴 芍药各一两二钱 磁石一两三钱 黄柏（用盐浸） 知母（水炒） 五味子 巴戟 白术各一两半 枸杞 故纸 小茴 白茯苓（盐酒蒸）各二两半 木瓜（用牛膝水浸） 杜仲 苁蓉各二两 没药一两 阳起石一两（用黄芩水浸，装入羊角内，以泥封固，火煨青烟起，取出以指研，对日不坠为度，如坠复煨）

【用法】上为末，择壬子庚申旺日，用鸡子六十个。打开一孔，去内试干，以末入内，用纸糊住，令鸡抱子出为度，取药，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十一丸，空心盐汤送下。

【功用】久服神清气爽，长颜色，填骨髓，倍进饮食，和平脏腑，精浓能施，生子。

【方论选录】苍术补脾，当归、熟地补血，葫芦巴益阳气，磁石补阳，黄柏、知母治相火，五味子去痰收肺气，巴戟佐肾，白术补脾，枸杞补肝，故纸补肾，小茴治小肠气，白茯苓补心，木瓜、杜仲、苁蓉、没药治肾损，益心血。

26509 玄麦地黄汤

【方源】《中国医学大辞典·补遗》。

【组成】玄参 麦门冬（去心）各二钱 熟地黄八钱 白茯苓 牡丹皮 泽泻各三钱 山药 山茱萸各四钱

【用法】水煎服。

【功用】降火益水。

【主治】阴虚，心火狂躁，肾水不足。

26510 玄麦至神汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】玄参一斤 麦冬半斤

【用法】煎汤服。

【主治】发狂。

【备考】发狂服救胃自焚汤，饮尽必睡；急再用本方煎汤候之，一醒即以此汤与之，彼必欣然自饮，服完必又睡，又将滓煎汤候之，醒后再饮，彼即不若从前之肯服，亦不必强，听其自然可也；后用胜火神丹，此生治之一法也。

26511 玄苓二陈汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】陈皮钱半 半夏二钱 茯苓二钱 甘草一钱 玄参一钱三分 黄芩二钱 连翘一钱 马兜铃五分

【用法】水煎服。

【主治】痰多咳嗽夜甚，脾湿及肺有微火者。

【备考】加枳壳、桔梗各一钱更佳。

26512 玄武天地煎

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】天地煎加玄武胶

【主治】肝肾气虚劳伤。

26513 玄明春雪膏

《医统》卷六十一。为《朱氏集验方》卷九“春雪膏”之异名。见该条。

26514 玄参贝母汤

【方源】《古今医鉴》卷九引陈白野方。

【组成】防风 天花粉 贝母 黄柏（盐水炒） 白茯苓 玄参 蔓荆子 白芷 天麻 各一钱 生甘草五分 半夏一钱（泡）

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，食后温服。

【主治】肾火上炎；痰火耳热出汁作痒。

26515 玄参化毒汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【异名】玄参解毒汤（《幼幼集成》卷六）。

【组成】赤芍 玄参 归尾 石膏 连翘 生地 地骨皮 红花(酒炒) 荆芥穗 防风 木通

【用法】加淡竹叶，水煎服。

【主治】①《万氏家抄方》：痘疹余毒，发赤火丹瘤。②《痘疹仁端录》：痘疹发斑，内外挟热。

【备考】《赤水玄珠》本方诸药用各等分。

26516 玄参化毒汤

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】玄参 天花粉 连翘 黄芩 枳壳 大黄(酒炒) 栀子 防风 甘草 苦参 紫花地丁

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】痘后赤火丹瘤。

26517 玄参化毒饮

【方源】《慈航集》卷下

【组成】玄参八钱 麦冬五钱(去心) 桔梗三钱 生甘草一钱五分 连翘一钱五分(去心) 升麻一钱五分 荆芥穗一钱五分 白僵蚕三钱(炒)

【功用】解斑疹毒热。

【主治】瘟疫斑疹之毒俱已发透。

【加减】心烦，加竹叶五十片，灯心五分为引；热重口渴，斑疹尽透，加生石膏五钱、知母三钱；咽喉痛，加牛蒡子三钱；烦躁，加犀角一钱五分、川连五分；腮颊肿，加马勃五分、旋根三钱、大贝母一钱五分；如有伏风恶寒，加羌活八分、葛根二钱、薄荷六分。

26518 玄参升麻汤

【方源】《活人书》卷十八。

【异名】阳毒玄参升麻汤(《元戎》)、玄参汤(《幼科类萃》卷十一)、玄参甘草汤(《杏苑》卷三)。

【组成】玄参 升麻 甘草(炙)各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盞半，煎至七分，去滓服。

【功用】《医方集解》：清咽散斑。

【主治】热毒发斑，咽喉肿痛。

①《活人书》：伤寒发汗吐下后，毒气不散，表虚里实，热发于外，身斑如锦文，甚则烦躁谵语。喉闭肿痛。②《准绳·幼科》：痘疹后，余毒咽喉肿痛。③《杏苑》：冬时瘟疫应寒而大温抑之，身热，头疼，咽痛。④《简明医彙》：温毒发斑。

【方论选录】①《医方考》：升麻能散斑，甘草、玄参能清咽。散斑者，取其辛温，谓辛能散而温不滞也；清咽者，取其甘苦，谓甘能缓而苦能降也。②《医方集解》：此足阳明少阴药也。发斑者，阳明胃热也；咽痛者，少阴相火也。升麻能入阳明，升阳而解毒；玄参能入少阴，壮水以制火；甘草甘平，能散能和。故上可以利咽，而内可以散斑也。③《医方论》：玄参清上焦浮游之火，升麻升阳而解毒，甘草清热而解毒。药只三味，简而能到。

26519 玄参升麻汤

【方源】《济生》卷五。

【组成】玄参 赤芍药 升麻 犀角(镑) 桔梗(去芦) 贯众(洗) 黄芩 甘草(炙)各等分

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《济生》：心脾壅热，舌上生疮，木舌重舌，舌肿或连颊两边肿痛。②《景岳全书》：咽喉肿痛，痘疹疮疡。

26520 玄参升麻汤

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】升麻 黄连各五分 黄芩(炒)四分 连翘 桔梗各三分 鼠粘子 玄参 甘草 白僵蚕各二分 防风一分

【用法】上咬咀，作一服。水二盞，煎至七分，去滓，稍热噙漱，时时咽之。

【主治】①《卫生宝鉴》：中风后咽喉中妨闷，会厌后肿，舌赤，早晨语言快利，午后微湿。②《古方选注》：喉痹。

【方论选录】《古方选注》：咽喉诸证，历考汤方，皆辛散咸软，去风痰，解热毒，每用

喻化咽津法，急于治标而缓于治本，即喉痹之急证亦然。牛蒡散时行风热，消咽喉壅肿；升麻散至高之风，解火郁之喉肿；白僵蚕得清化之气，散浊结之痰；玄参清上焦氤氲之热，连翘散结热消壅肿，防风泻肺经之风邪，芩、连清上中之热毒，甘、桔载引诸药上行清道。

26521 玄参升麻汤

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】玄参(去芦) 升麻 葛根 芍药 甘草(炙) 各等分

【用法】上吹咀。每服五钱，水一大盏，同煎至七分，去滓热服，乳母宜多服。

【功用】小儿触冒，必传疮疹，未发之前预服之。

26522 玄参升麻汤

【方源】《医统》卷五十五。

【组成】玄参 升麻 白芷各一钱 蝉蜕 防风 甘草 黄耆各七分

【用法】葱一寸为引，水煎服。

【主治】皮风瘙痒不能忍。

26523 玄参升麻汤

【方源】《痘疹传心录》卷十九。

【组成】玄参一钱 升麻五分 防风七分 荆芥七分 牛蒡子七分(炒，研) 甘草三分(生，去皮)

【用法】水煎，温服。

【主治】①《痘疹传心录》：痘夹斑、夹丹。②《金鉴》：表邪郁遏，疹毒不能发舒于外，咽喉作痛者。

【加减】夹麻疹而出者，加桔梗七分、酒炒黄芩七分。

26524 玄参升麻汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】玄参 升麻 甘草各二钱 石膏知母各二钱五分

【用法】水煎服。

【主治】热毒发斑，咽痛，烦躁谵语者。

26525 玄参甘草汤

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】生地 归身 玄参 白芍 甘草 各一钱 麦冬二钱

【用法】水煎服。

【功用】救真水，清神火。

【主治】神思火动，真水不足，病飞走狂越，用诸寒而火愈炽。

26526 玄参甘草汤

《杏苑》卷三。为《活人书》卷十八“玄参升麻汤”之异名。见该条。

26527 玄参甘桔汤

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】玄参 甘草 桔梗 薄荷 连翘 牛蒡子 天花粉 远志 密陀僧各等分

【用法】水煎服。

【主治】热肿喉痹。

26528 玄参甘桔茶

【方源】《中药制剂手册》。

【组成】玄参一钱五分 麦门冬一钱五分 桔梗一钱 甘草五分

【用法】上为粗末，和匀过筛，每袋重四钱五分。每次一袋，用开水冲泡代茶饮。

【功用】润肺生津止渴。

【主治】由肺阴不足引起的喉痒，咳嗽无痰，口渴咽干。

26529 玄参地黄汤

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【组成】玄参 生地黄 牡丹皮 梔子仁 甘草 升麻各一钱半 白芍药一钱

【用法】上锉细。加炒蒲黄半钱，水一盞，煎七分，去滓服。

【主治】痘疹衄血。

【备考】《麻科活人》无蒲黄。

26530 玄参地黄汤

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】怀生地 润玄参 粉丹皮 绿升麻 黑梔仁 炒蒲黄 生甘草

【用法】灯心十茎为引，水煎，热服。

【主治】妇女痘疹作热，经水不依期而至。

26531 玄参地黄汤

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】尖生 玄参 丹皮 黑梔 益母 甘草 炒蒲黄

【用法】加灯心为引，水煎服。

【主治】麻出作热，经水不依期而至。

26532 玄参泻肝散

《准绳·类方》卷七。为《圣济总录》卷一〇五“麦门冬汤”之异名。见该条。

26533 玄参莲枣饮

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】玄参三两 丹皮 炒枣仁各一两 丹参五钱 柏子仁 莲子心各三钱

【用法】水煎服。

【主治】人有过于欢娱，大笑不止，而阳旺火炎，唾干津燥，口舌生疮，渴欲思饮，久则形容枯槁，心头出汗。

26534 玄参救苦膏

【方源】《梅氏验方新编》卷一。

【组成】大玄参五两 甜桔梗三两 净梅片八分 枇杷肉五两（如无此，以浙贝母一两五钱代之） 生甘草一钱

【用法】上为末，或煎膏，或为丸均可。大人重者五钱，轻者四钱，小儿减半。

【主治】一切咽喉急症之体气虚弱者。

26535 玄参清肺饮

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】玄参八分 银柴胡 陈皮 桔梗 茯苓 地骨皮 麦门冬各一钱 薏苡仁二钱 人参 甘草各五分 槟榔三分

【用法】水二钟，加生姜二片，煎八分，临入童便一杯，食后服。

【主治】肺痈，咳吐脓痰，胸膈胀满，上气喘急，发热者。

26536 玄参犀角汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】玄参 犀角 连翘 花粉 丹皮 鲜生地

【主治】疹后，及暮加喉痛而咳。

26537 玄参解毒汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【异名】玄参解毒散（《痘疹仁端录》卷

九）。

【组成】玄参 生地 黄芩 山梔仁（炒） 桔梗 甘草 葛根 荆芥穗

【用法】水煎，入茅根汁，磨京墨服。

【主治】痘疹火热，迫血妄行而鼻衄。

①《万氏家抄方》：痘疹口鼻出血。②《片玉痘疹》：痘疹之火，熏蒸于内，迫血妄行，但从鼻出。③《种痘新书》：麻焦紫，肺胃实热，黑暗毒盛，衄血，邪火入里者。

【备考】《痘疹仁端录》无京墨。

26538 玄参解毒汤

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】玄参 山梔 甘草 黄芩 桔梗 葛根 生地 荆芥各一钱

【用法】水二钟，加淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食后服。

【主治】咽喉肿痛，已经吐下，饮食不利，及余肿不消。

26539 玄参解毒汤

《幼幼集成》卷六。为《万氏家抄方》卷六“玄参化毒汤”之异名。见该条。

26540 玄参解毒散

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】玄参一两 麦冬八钱 生甘草二钱 花粉三钱 天冬五钱 冬瓜子三钱

【用法】竹叶一百片、灯心一钱为引。

【主治】瘟疫专表失里，邪毒入心，内毒化火，舌如镜面，光赤无苔，其脉坚，人事昏沉，面赤。

26541 玄参解毒散

《痘疹仁端录》卷九。为《万氏家抄方》卷六“玄参解毒汤”之异名。见该条。

26542 玄参解毒散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】玄参 梔炭 酒芩 尖生 桔梗 甘草 荆芥 知母 竹叶 麦冬

【主治】麻症，肺胃实热，黑晦毒盛，衄血，邪火入里。

【加减】加茅根、京墨，无血不加。

26543 玄胡六合汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】四物苦楝汤（《医学纲目》卷二十二）。

【组成】四物汤加玄胡 苦楝（炒）各一两

【主治】妇人脐下冷，腹痛腰脊痛。

26544 玄胡四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【异名】延胡四物汤（《金鉴》卷四十六）。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地各七钱半 玄胡索（酒煮）二两

【用法】上为细末。每服三钱，酒调下。

【功用】《金鉴》：定痛保胎。

【主治】①《济阴纲目》：血癖腹痛，及血刺腰痛。②《金鉴》：胎动下血。

26545 玄胡当归散

《景岳全书》卷六十一。为《圣惠》卷七十一“当归散”之异名。见该条。

26546 玄胡苦楝汤

【方源】《普济方》卷三二八引《卫生家宝》。

【异名】延胡苦楝汤（《兰室秘藏》卷中）、玄胡索苦楝汤（《医学纲目》卷十四）、玄胡索汤（《产科发蒙·附录》）。

【组成】肉桂三分 附子三分 熟地黄一钱 炙甘草五分 玄胡二分 黄柏三分（为引用） 苦楝子二分

【用法】上咬咀，都作一服，水四盏，煎至一盏，去滓，空心、食前稍热服。

【主治】①《普济方》引《卫生家宝》：妇人脐下冷撮痛，阴冷大寒。②《兰室秘藏》：白带下。

【备考】本方改为丸剂，名“延胡苦楝丸”（见《妇科大略》）。

26547 玄胡琥珀散

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】川芎五钱 川归 赤芍药 木香 玄胡索 没药 莪术 蒲黄 牡丹皮 肉桂 生地各五钱 琥珀三钱 枳壳五钱 桃仁五钱

【用法】上为末。每服三钱，豆淋酒下。

【主治】产后恶血，烦闷寒热，及行经疑乱，腹胁作痛。

26548 玄菟固本丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十九。

【异名】固本丸（《竹林女科》卷四）。

【组成】生地黄（酒浸） 熟地黄（酒浸，蒸，俱不犯铁器） 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 五味子（去皮） 茯神（去皮木）各四两 干山药三两（白者，微炒） 莲肉 人参（去芦） 枸杞子二两（甘州者佳） 菟丝子一斤（酒煮数沸，捣烂，捻作饼子，晒干，净称八两）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至八九十丸，空心滚白汤送下，或淡盐汤、温酒送下亦可。

【功用】①《丹溪心法附余》：补肾。②《东医宝鉴·杂病篇》：滋阴助阳。

【主治】《东医宝鉴·杂病篇》：虚劳下元衰弱。

26549 玄黄解热散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】半夏 花粉各二钱 甘草 人参 各一钱 玄参一两 生地 茯苓各五钱 枳壳五分

【用法】水煎服。

【主治】春月伤风，谵语潮热，脉滑。

26550 玄黄辟毒散

【方源】《嵩崖尊生》卷十。

【异名】玄黄避毒丹（《一见知医》卷四）。

【组成】玄参 大黄 连翘 牛蒡各一钱 酒黄芩 酒黄连各二钱五分 羌活 荆芥 防风各五分 石膏 桔梗各钱半 甘草一钱

【用法】食后作二十次频服。

【主治】肿头伤寒。

26551 玄黄避毒丹

《一见知医》卷四。为《嵩崖尊生》卷十“玄黄辟毒散”之异名。见该条。

26552 玄霜雪梨膏

【方源】《古今医鉴》卷七。

【异名】元霜雪梨膏(《杂病源流犀烛》卷十七)、元霜紫雪膏(《类证治裁》卷二)。玄霜紫雪膏(《全国中药成药处方集》(沈阳方))。

【组成】雪梨(六十个,酸者不用,去心皮,取汁)三十钟 藕汁十钟 新鲜生地黄(捣取汁)十钟 麦门冬(捣烂,煎汁)五钟 萝卜汁五钟 茅根汁十钟

【用法】上药,再重滤去滓,将清汁再入火煎炼,加蜜一斤、饴糖半斤、柿霜半斤、姜汁一盞,入火再熬如稀糊,则成膏。

【功用】①《古今医鉴》:生津止渴,消痰止嗽,清血归经。②《全国中药成药处方集》(沈阳方):滋润肺燥,清热止血,滋阴养肺,清胃热。

【主治】肺燥津伤,咳嗽,咯血,吐血。

①《古今医鉴》:咯血吐血,及劳心动火,劳嗽久不愈。②《类证治裁》:劳心动火,口津干,能食,脉洪数。③《全国中药成药处方集》(沈阳方):吐血咳痰,肺痿干咳,便秘便血,赤淋溺血。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(沈阳方):忌五辛发物。

【加减】如血不止,咳嗽,加侧柏叶捣汁一钟、韭白汁半钟、茜根汁半钟,俱去滓,入煎汁内,煎成膏服之。

【备考】《全国中药成药处方集》(沈阳方):每服三匙,一日三次。

26553 玄霜紫雪膏

《全国中药成药处方集》(沈阳方)。为《古今医鉴》卷七“玄霜雪梨膏”之异名。见该条。

26554 玄参寒水石汤

【方源】《保命歌括》卷六。

【组成】羚羊角 大青各五钱 玄参二两 升麻七分半 寒水石一两二钱半 射干七分半 芒消七分半

【用法】水四升,煎一升半,入消化,分三四服,时时呷之。

【主治】大头瘟病不退。

26555 玄参羚羊角汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】玄参 五加皮 生地黄 赤茯苓 各一钱 羚羊角 黄芩各八分 石菖蒲 麦门冬 通草各五分 甘草(炙)四分

【用法】上咬咀。加生姜五片,水煎八分,食远热服。

【主治】肾脏邪热,心下烦闷,耳听无声。

26556 玄胡索苦楝汤

《医学纲目》卷十四。为《普济方》卷三八引《卫生家宝》“玄胡苦楝汤”之异名。见该条。

主

26557 主气散

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】陈皮二两 粉草 沉香 白豆蔻 人参各半两

【用法】上为细末。每服一大钱,早晨烧盐少许,百沸汤点服有效。

【功用】快气宽膈,下痰进食。

26558 主肾丸

【方源】《普济方》卷二十九引《余居士选奇方》。

【组成】磁石六分(研) 木香六分 青盐六分(研) 石亭脂一分(研) 蜀椒一分(研末) 羊肾一付

【用法】上以酒煮羊肾令烂。和诸药捣为丸,如麻子大。每服二十丸,空心温酒送下。

【主治】肾气虚弱及积日月,有块,上下不定,牵引心胸胀满,吃食无味,时时发动,四肢少力。

26559 主胜丸

【方源】《幼幼新书》卷十引《王氏手集》。

【组成】蜈蚣三条 饭瓮儿虫 全蝎各七个 粉霜 朱砂 硫黄 水银各一钱 白面三钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一丸,看虚实加减。

【主治】小儿一切惊。

26560 主眼汤

《普济方》卷八十一。为《外台》卷二十一引《必效方》“洗眼汤”之异名。见该条。

26561 主聪汤

【方源】《诚书》卷七。

【组成】川芎 枸杞子 丹皮 生地 当归 龙胆草 黄柏 甘草 沙苑蒺藜 知母 白芍药 连翘

【用法】加龙眼，水煎服。

【主治】血虚气闭，耳胀胸痛，若虫咬或流脓。

【加减】齿痛，加石膏；鼻痛，加梔子。

兰

26562 兰台散

【方源】《幼幼新书》卷八引《保生信效方》。

【组成】乌梅肉（焙）一两 蛇黄二两（醋淬二十遍）

【用法】上为末，每服二钱，蜜汁调下。儿睡起不了了，为神不聚，此能收。

【主治】小儿骨蒸劳热，骨肉、五心烦躁，或大病大下后多睡，或全睡。

26563 兰草汤

【方源】《素问》卷十三。

【组成】兰草。

【主治】脾瘕。内热口甘，中满。

【备考】《增补内经拾遗》：方虚谷言，古之兰草，即今之千金草，俗呼为孩儿菊。其说可据。丹溪以为幽兰，谬孰甚焉。黄山谷一枝一花为兰，一枝数花为蕙。盖不识兰蕙而强生分别，不是兰草是孩儿菊，蕙草是零陵香。《乐府》有云，兰蕙蓬蒿，算来都是草。《经》曰，治之以兰，除陈气也，正此兰草耳。按《圣济总录》：本方用兰草一两（切），以水三盏，煎取一盏半，去滓，分温三服，不拘时候。

26564 兰香散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】白兰香叶（阴干） 百合 黄柏（蜜炙，锉） 胡粉（研） 黄蜀葵花（焙） 各一两

【用法】上为末。以醋调涂疮上，如有汁，即干敷。

【主治】一切风毒恶疮，及下注疮，或痛或痒。

26565 兰香散

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】兰香 人粪 白狗粪 虾蟆 白矾 蜘蛛 蚯蚓 蜗牛子（八味并烧灰） 芦荟（研） 蛎蛇胆（研） 各一分

【用法】上为散。以苇管斜批，吹少许入鼻中及齿上，更以蜜和涂纸上贴之；如下部，即纳之。

【主治】小儿一切疳痢。

26566 兰香散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】兰香叶（菜名，烧灰）二钱 铜青五分 轻粉二字

【用法】上为细末，令匀。看疮大小干贴之。

【主治】疳气，鼻下赤烂。

26567 兰香散

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】轻粉一钱 兰香（末）一钱 密陀僧半两（醋淬为末）

【用法】上为末。敷齿及龈上。立效。

【主治】小儿走马牙疳，牙齿溃烂，以至崩砂出血齿落者。

26568 兰香散

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】兰香（焙干烧灰）

【用法】上为细末。加麝香少许同研匀，贴宣露处。有涎吐了，误咽无妨。

【主治】大人小儿疳齿宣露。

26569 兰覆散

【方源】《卫生总微》卷二十。

【组成】黄连（末，去须）三钱 铜绿一钱 水银一钱（用煮枣一个，同研） 麝香一字（研）

【用法】上为细末。先净漱口了，以药敷疮上，用生兰香叶覆之，蚀肉成坎者，一敷肉生。

【主治】走马急疳，蚀口齿，恶血臭气，不喜所闻，牙齿脱落。

26570 兰香饮子

《兰室秘藏》卷上。为原书同卷“甘露膏”之异名。见该条。

宁

26571 宁中膏

【方源】《普济方》卷三四九引《如宜方》。

【组成】人参 酸枣仁各一两 辰砂半钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下。又宜研琥珀、麝香、灯心汤送下。

【主治】产后心志不宁，心血耗散，狂乱见鬼。

26572 宁气丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】猪牙皂荚（去皮，酥炙）五挺 马兜铃半两 甜葶苈（炒）二钱半 槟榔（锉）一枚 半夏（汤洗七遍，切、焙）二钱半

【用法】上为末，用枣肉为丸，如绿豆大。每服五丸至七丸，喘满浮肿，煎桑根白皮汤送下；咳嗽痰涎，煎灯心蜜汤送下；吐逆，煎藿香汤送下。看虚实加減。

【主治】肺嗽痰涎，喘满浮肿。

26573 宁气汤

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】御米壳二两半（蜜水淹一宿，炒黄） 甘草（炙） 杏仁（去皮尖，麸炒） 紫菀（去土） 桔梗各七钱半 五味子 甜葶苈（隔纸炒） 人参 半夏（生姜制） 桑白皮（锉，炒） 紫苏叶 陈橘皮（去瓤）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一大盏，加生姜七片，煎至六分，去滓，食后稍热服。

【主治】肺气不利，咳嗽声重，咽嗑干燥，痰唾稠粘，少得睡眠。

26574 宁气汤

【方源】《奇效良方》卷三十。

【组成】佛耳草 白茯苓（去皮） 款冬花 陈皮（去白） 知母 贝母 桔梗各一两 汉防己 猪牙皂角（去皮弦，酥炙）各一两半

【用法】上为细末。每服三钱，水一大盏，入黄蜡、乌梅各少许，同煎至五分，去乌梅，和滓温服。

【功用】调肺止嗽，顺气消痰。

【主治】咳嗽不得息者。

26575 宁气散

【方源】《普济方》卷一五八。

【组成】麻黄（去根节）二两 杏仁（去皮尖，炒）三两 石膏一两半 御米壳（去蒂，蜜炒）四两 甘草（炒）半两

【用法】上为细末。每服二钱，食后白汤调下。

【主治】肺感风寒，咳嗽涎喘。

26576 宁火丹

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】玄参一两 甘草一钱 生地三钱 青蒿五钱

【用法】水煎服。

【主治】春月伤风脉浮，发热口渴，鼻燥衄血。

【方论选录】玄参、生地以解其胃中之炎热，泻之中仍是补之味；青蒿同甘草用之，尤善解胃热之邪，使火从下行而不上行也，且青蒿更能平肝经之火。脉浮者，风象也，肝火既平，则木自安，而风何动哉！

26577 宁心丸

【方源】《幼科铁镜·附录》。

【组成】麦冬五钱（去心） 寒水石一两 白茯苓 甘草 牙消 山药各五钱 朱砂一两 龙脑一字

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服半丸，砂糖水磨下；如慢症，用人参、白

术煎浓汁化下。

【主治】心痞者，面黄颊赤，小便赤涩，口舌生疮，烦渴。

26578 宁心片

【方源】《中医方剂临床手册》引《中药知识手册》。

【组成】生地 麦冬 丹参 党参 玄参 当归 枣仁 柏子仁 五味子 远志 朱砂

【用法】上为片，每服6片，一日二至三次。

【功用】滋阴补血，养心安神。

【主治】阴血虚，失眠，心悸。

26579 宁心丹

【方源】《普济方》卷十八引《卫生家宝》。

【组成】人参一两 茯神一两 朱砂(细研) 乳香(细研) 白附子(微炮)各半两 雄黄一分 紫石英一分 真珠末一分(细研) 桃奴一分 脑子半钱(细研) 麝香一钱(细研) 金箔五十片(研入药)

【用法】上为末，酒煮半夏糊为丸，如鸡头子大，别以金箔为衣。每服一丸，先用灯心汤浸，至睡时磨化，暖水温服；小儿半丸。

【主治】思虑悲忧伤心，惊悸怔忡，睡卧不宁。

26580 宁心汤

《活幼心书》卷下。为原书同卷“三解散”之异名。见该条。

26581 宁心汤

【方源】《诚书》卷十六。

【组成】琥珀(为末)三分(另加) 石菖蒲 远志 当归 小柴胡 麦冬各六分 前胡 茯神 南星(泡)各五分

【用法】水煎服。

【主治】一切夜啼诸惊。

26582 宁心散

【方源】《普济方》卷三七四。

【组成】辰砂(光明有墙壁者，研极细)一两 酸枣仁(微炒，为末) 乳香(光莹者，细研)各半两

【用法】上为末。小麦煎汤调下。

【主治】小儿惊风，手足动摇，精神不爽，

一切惊邪，狂叫不宁，发热。

26583 宁心膏

【方源】《普济方》卷三七三引《全婴方》。

【组成】人参 白术 白茯苓 茯神 山药 羌活 甘草(炙)各一钱 朱砂一钱 麝香一分 脑子一分

【用法】上为米，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，薄荷汤化下。

【功用】①《普济方》引《全婴方》：镇心，除百病。②《奇效良方》：定神定志。

【主治】①《普济方》引《全婴方》：小儿精神不定，恍惚不宁，夜里多哭，怯人怕物，眠睡惊厥。②《奇效良方》：小儿惊悸不宁，心经有热，多啼。

【备考】《奇效良方》有金箔二十片为衣。

26584 宁心膏

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】白茯神(去木) 白茯苓 白术(土蒸)各二两 山药二两 枣仁二两(炒) 寒水石(煨，研末)二两 远志 甘草(炙)各一两五钱 辰砂一两 人参五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。临卧灯心汤化下。

【主治】通宵不寐者。

26585 宁生汤

【方源】《诚书》卷六。

【组成】琥珀三分 白术(炒)三分 枳壳四分 茯苓三分 防风五分 远志四分 天麻(煨)五分 车前子五分 石菖蒲二分

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】卵疝，锁肚，胎惊壮热。

26586 宁血汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】当归七钱 芍药三钱 熟地五钱 生地三钱 丹皮一钱 地骨皮五钱 沙参三钱 白芥子一钱 甘草一钱 炒枣仁一钱

【用法】水煎服。

【主治】血燥乃血热之故，往往鼻中衄血，心烦不寐，不能安枕，怔忡。

【加减】加荆芥五分，血动者最宜服之。

26587 宁血汤

【方源】《中医眼科学》。

【组成】仙鹤草 旱莲草 生地黄 栀子炭 白芍 白及 白蔹 侧柏叶 阿胶 白茅根

【主治】云雾移睛。

26588 宁志丸

【方源】《百一》卷一。

【组成】好辰砂一两 人参 白茯苓 当归（去芦，洗去土） 石菖蒲 乳香（别研） 酸枣仁各半两（用酸枣仁五两 汤浸去皮，可剥半两净仁，炒令赤，香熟为度）

【用法】好辰砂一两，将熟绢一小片包裹，以线扎定，猪心一枚，以竹刀子切破，不得犯铁，用纸拭去血，入朱砂包子在猪心内，却用麻线缚合猪心，又以甜笋壳再裹了，麻皮扎定，无灰酒二升，入砂罐子或银器内，煮令酒尽为度，去线并笋壳，取辰砂别研，将猪心以竹刀细切，砂盆内研令烂，却入后药末并辰砂、枣肉为丸，如梧桐子大，留少辰砂为衣；药末须隔日先碾下，枣肉于煮猪心日绝早煮熟，剥去皮核，取肉四两用。每服五十丸，人参汤送下，不拘时候。

【主治】①《百一》：心气、心风。②《景岳全书》：心风癫痫。

【临床举例】心风 濮十太尉之子六将使传，乃姪尝患心风，服此一料，病减十之八矣。

26589 宁志丸

【方源】《直指》卷十一。

【异名】宁神定志丸（《北京市中药成方选集》）。

【组成】人参 白茯苓 茯神 柏子仁 琥珀 当归 酸枣仁（温酒浸半日，去壳，隔纸炒香） 远志（酒浸半日，新布裹，捶取肉、焙）各半两 乳香 朱砂（别研） 石菖蒲各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后枣汤送下。

【功用】《北京市中药成方选集》：滋阴补气，益智宁神。

【主治】心虚血少、惊悸怔忡，癫痫。

①《直指》：心虚血虚，多惊。②《景岳全书》：心虚血少，神志不宁而惊悸者；怔忡，癫痫。③《北京市中药成方选集》：气血虚弱，神志不宁，心虚多梦，烦躁盗汗。

【备考】《北京市中药成方选集》无茯神。

26590 宁志丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】枣仁五两 人参一两 黄耆一两 白术三两 茯神三两 当归身三两五钱 莲须二两 远志二两 朱砂一两 益智仁一两 甘草一两 乳香五钱

【用法】炼蜜为丸。每服二三钱，早、晚空腹灯心汤送下；无睡，用陈酒送下。

【主治】性情抑郁，志气不扬，精神虚惫，形容枯萎，昼则贪眠，夜反不寐，虽寐而惊悸易醒，或谋虑不遂，劳烦过度，气逆膈中，而怔忡痞闷，彻夜无睡，及睡而神昏气惰，甚至饮食不思，肢体懈弛，盗汗怯寒，梦遗滑泄。

26591 宁志膏

【方源】《本事》卷二。

【组成】人参（去芦）一两 酸枣仁（微炒，去皮，研）一两 辰砂（水飞）半两 乳香一分（以乳钵坐水盆中研）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下。

【功用】《普济方》：宁神定志，安眠止痛。

【主治】惊恐失志，心气虚耗，健忘，失眠，癫狂，赤白浊。

①《本事》：失心。②《局方》（淳祐新添方）：心脏亏虚，神志不守，恐怖惊惕，常多恍惚，易于健忘，睡卧不宁，梦涉危险，一切心疾。③《直指》：因惊失心。④《普济方》：心气虚耗，赤白浊甚。⑤《寿世保元》：癫狂失心不寐。

【方论选录】①《寿世保元》：此方朱砂能

镇心安神；酸可使收引，故枣仁能敛神归心；香可使利窍，故乳香能豁痰达心志；许学士加人参，亦谓人参能宁心耳。②《本事方释义》：人参气味甘温，入脾胃；枣仁气味苦平，入心；辰砂气味苦温，入心；乳香气味辛微温，入手足少阴。以薄荷汤送药，乃手太阴之引经药也；甘温护持中土，佐以苦味入心，辛香开窍，使以轻扬为引，表里皆得安妥矣。

【临证举例】失心 予族弟姻缘兵火失心，制此方与之，服二十粒愈。

【备考】本方方名，据剂型，当作“宁志丸”。

26592 宁志膏

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】琥珀一两（炼成收用） 茯神三两 枣仁（炒）三两 丹皮三两 熟地五两 归身三两 川芎一两 白芍二两 半夏一两 麦冬一两 竹叶百片 丹参六两 郁金七钱

【用法】加生姜三片，辰砂一钱、金饰二钱，煎汤化一盞服。

【功用】补心血，安心神，定心气，兼消瘀祛痰清火。

【主治】产后心血虚，败血、瘀火、瘀血冲心，心神恍惚怖畏，乍见鬼神。

【方论选录】四物加茯神、枣仁养血安神，佐以丹参生新去旧，丹皮泻火通经，半夏行痰，麦冬清心，竹叶降火；琥珀消瘀破结，郁金入心，专治败血攻心，癫狂错乱，而行以辛温之姜，引以重镇之辰砂、金饰。心神安，心血充，心气定，瘀火、败血不攻而自退矣。

26593 宁志膏

【方源】《百一》卷十八。

【异名】宁神膏（《医学入门》卷八）

【组成】辰砂（研） 酸枣仁（炒） 人参 茯神（去木） 琥珀各一分 滴乳香一钱（别研）

【用法】上为细末，和匀，每服一钱，浓煎灯心、枣汤调下。

【主治】①《百一》：妇人因出血多，心神

不安，不得睡，语言失常。②《女科指掌》：产后言语颠倒，狂言谵语者。

26594 宁志膏

【方源】《普济方》卷一九〇引《如宜方》。

【组成】人参 酸枣仁各一两 辰砂半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤送下。一方灯心汤调琥珀末送下。

【主治】出血失血过多，心神不安，睡卧不得，语言失常。

26595 宁坤丸

《采艾编翼》卷二。即《回春》卷六引孙奎亭方“回生丹”。见该条。

26596 宁坤丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】党参二钱 白术五钱 茯苓五钱 炙甘草一钱五分（姜汁炒） 生地五钱 白芍五钱（姜汁炒） 熟地五钱 炒当归五钱 炒川芎五钱 沉香五分 广木香二钱五分 制香附五钱 西砂仁一钱五分 乌药五钱 炒广皮五钱 川牛膝二钱 琥珀二钱五分 黄芩二钱 苏叶二钱五分 阿胶二钱五分 益母膏一两二钱

【用法】上药除阿胶、益母膏外，其余共为细末，阿胶、益母膏烊化，加白蜜四两炼熟，与诸药打和为丸，分做四十四粒，每粒约千重二钱。每服一丸，开水化服。

【功用】和气血，调月经。

【主治】血虚气滞，经闭经少。

26597 宁坤錠

【方源】《吉林省中药成药集》。

【组成】雄黄五两 冰片五两 青盐五两 五倍子五两

【用法】冰片、雄黄单包，先将雄黄、冰片各为细末，青盐、五倍子共轧为细末，另取大枣十两，煮烂，去核取肉，与上药末搓揉为丸。用白绸一寸五分方块、做成袋，将药装袋内，以白线扎紧。每次一丸，同时将药袋纳入阴道内，留线在外，三日一换。

【功用】去湿止痒。

【主治】湿热下注引起的妇人阴痒、带下。

【宜忌】外用药品，切勿内服。

26598 宁肺丸

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】乌梅（蜜拌蒸，取肉）八钱（捣膏） 罂粟壳（去膜，蜜拌炒，为末）一两

【用法】用乌梅膏加生蜜少许，调为丸。每服二钱，乌梅汤送下，不拘时候。

【主治】①《外科正宗》：久嗽咯吐脓血，胸膈不利，咳嗽痰盛，坐卧不安，言语不出，甚则声音哑咽者。②《灵验良方汇编》：咳嗽吐血，痰中有血，胸膈、两肋作痛，口燥喉干，烦闷多渴，或吐臭浊。

26599 宁肺汤

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】人参（去芦头） 白术 当归（去芦头，洗，焙） 熟干地黄 芎藭 白芍药 甘草（炙） 麦门冬（去心） 五味子 桑白皮 白茯苓（去皮）各半两 阿胶一两（蚌粉炒）

【用法】上哎咀。每服五钱，水一盏半，加生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】①《杨氏家藏方》：安肺消痰，定喘止嗽。②《历代名医良方注释》：养阴培元，止咳化痰。

【主治】①《杨氏家藏方》：荣卫俱虚，发热自汗，气短怔忡。②《普济方》：肺气喘急，咳嗽痰唾。

26600 宁肺汤

【方源】《传信适用方》卷上。

【组成】罂房半两（去枝梗、铍，蜜炒黄脆） 五味子（去枝梗）半两 乌梅（去核）四两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，同煎至七分，去滓食服。

【主治】咳嗽喘急，不问久新。

26601 宁肺汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】知母 牛蒡子（炒） 马兜铃 桔梗 杏仁 软石膏 地骨皮 甘草

【主治】痘毒入肺，咳嗽喘气者。

26602 宁肺汤

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】麦冬五钱 桔梗三钱 甘草一钱 天花粉一钱 陈皮三分 玄参五钱 百部八分

【用法】水煎服。

【主治】燥病初起，咽干口燥，嗽不已，痰不能吐，面目红色，不畏风吹者。

26603 宁肺汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷五。

【组成】黄芩 桑皮 贝母 花粉 杏仁 知母 天冬 沙参 枇杷叶

【主治】毒归于肺，肺焦叶举，疹后嗽，气喘息高，连声不止，甚至咳血，或呛出饮食，而或体实者；手足肿至腹，病为从外入内，或朝宽暮急，或朝急暮宽，或先喘后胀。

26604 宁肺汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】沙参 归身 尖生 麦冬 阿胶 力子 川贝 酒芍 丹参 蒺藜 桑皮 甘草

【主治】疹后气血俱虚，肺热喘嗽，发热自汗。

26605 宁肺饮

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】天冬 知母 紫苏 桔梗 炙甘草

【主治】风寒客肺之咳嗽。

【加减】寒，加杏仁、桑皮；多痰，加姜汁、竹沥、陈皮；热，加黄芩；心不舒畅，加百合、川贝；虚，加人参、紫菀。

26606 宁肺散

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【异名】宁神散。

【组成】乌梅八钱 罂粟壳一斤（制）

【用法】上为末，每服二钱，煎乌梅汤调下，

不拘时候。

【主治】久新肺气不通，渐咯脓血，壅滞不利，咳嗽粘涎，坐卧不安，语言不出。

26607 宁肺散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】御米壳四两 木瓜三两(同御米壳一处用蜜二两水化，同炒微黄) 五味子一两 人参一两 皂角二两

【用法】上为末。每服二钱，乌梅同煎，临卧含服。

【主治】一切寒热痰盛，久新咳嗽不止者。

26608 宁肺散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】御米(蜜炒，去糠) 甘草 干姜 当归 白矾 陈皮各一两

【用法】上为末。每服三钱，煎芥汁调下。

【主治】寒嗽。

【加减】贫乏之人，多感风冷寒湿咳嗽，加白术之类。

26609 宁肺散

【方源】《得效》卷五。

【组成】玄胡索一两 枯矾二钱半

【用法】上为末。每服二钱，用软饴糖一块和药含化；小儿一钱，用蜜亦可。

【主治】咳嗽。

26610 宁肺散

《普济方》卷一六〇。为原书同卷“宁神散”之异名。见该条。

26611 宁肺散

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】桑白皮(炒) 葶苈子(炒) 赤茯苓 车前子 山梔仁各等分 炙甘草减半

【用法】加生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】病后热在心肺，发热喘咳，身热饮水，鼻干唇燥，脉疾有力。

26612 宁肺散

【方源】《种痘新书》卷九。

【组成】知母 牛子 桔梗 陈皮 马兜铃 杏仁 全地 川贝 桑皮 橘红 炒芩 甘草

【功用】清金降火。

【主治】痘疮余毒流入于肺，肺热生痰咳嗽者。

26613 宁肺膏

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】枇杷叶 款冬花 紫菀 杏仁 木通 桑皮各五两 大黄(蒸熟)二两五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。用白滚水化服。

【主治】漏疮。

【备考】本方方名，据剂型当作“宁肺丸”。

26614 宁沸汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬三两 山茱萸三两 茯苓一两

【用法】水煎服。一剂渴少止，再剂渴又止，饮半月痊愈。

【功用】纯补其水。

【主治】肾火上沸之消渴，口干舌燥，吐痰如蟹涎白沫，气喘不能卧，但不甚大渴，渴时必须饮水，饮之后，即化为白沫。

【方论选录】此方用山茱萸三两，以大补肾水，尽人知之。更加入麦冬三两者，岂滋肺以生肾乎！不知久渴之后，日吐白沫，则熬干肺液。使但补肾水，火虽得水而下降，而肺中干燥无津，能保肺之不告急呼！肺痿、肺癰之成，未必不始于此。故补其肾而随滋其肺，不特子母相生，且防祸患于未形者也。加入茯苓者，因饮水过多，膀胱之间必有积水，今骤用麦冬、山茱萸至六两之多，不分消之于下，则必因补而留滞，得茯苓利水之药以疏通之，则补阴而无臃滞之忧，水下趋而火不上沸，水火既济，消渴自除矣。

26615 宁波汤

【方源】《四圣心源》卷五。

【组成】甘草二钱 桂枝 芍药 阿胶 茯苓 泽泻 梔子 发灰(猪脂煎，研)各三钱

【用法】水煎，温服。

【主治】溺血。

【加减】膀胱之热，若瘀血紫黑，累块坚阻，加丹皮、桃仁之类行之。

【方论选录】溺血与便血同理，而木郁较甚，故梗涩痛楚。苓、泽、甘草培土泄湿，桂枝、芍药达木清风，阿胶、发灰滋肝行瘀，梔子利水泄热。

26616 宁毒丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地 300 克 当归 90 克 荆芥 90 克 蝉衣 60 克 苦参 90 克 白蒺藜 90 克 知母 90 克 生石膏 150 克 紫草 90 克 桃仁 90 克 生甘草 60 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。每服二丸，一日二次。

【功用】凉血活血，消风止痒。

【主治】急性荨麻疹、玫瑰糠疹、脂溢性皮炎。

26617 宁毒丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生黄耆 310 克 防风 250 克 炒白术 250 克 桂枝 310 克 白芍 310 克 生姜 150 克 甘草 150 克 大枣 310 克

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重 9 克。每服二丸，一日二次。

【功用】固卫御风。

【主治】慢性荨麻疹，遇风冷即起。

26618 宁胃汤

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】牛膝五钱 当归二钱 山梔 侧柏叶 降香 青荷叶各一钱

【用法】童便一盞，磨好墨和服。

【主治】血溢胃脘，呕吐成盆。

26619 宁胃散

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷四引《必用》。

【异名】芩连芍药汤。

【组成】白芍二钱 黄芩 黄连 木香 枳壳各一钱半 陈皮一钱 甘草(炙)五分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】赤白热痢。

26620 宁神丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】白茯苓(去皮) 五味子(炒) 干山药 杏仁(去皮尖，麸炒，别捣) 阿胶(炒珠子) 熟干地黄各一两 柏子仁(别捣) 麦门冬(去心) 杜仲(炒丝断) 百部 肉桂(去粗皮) 川芎 当归(去芦头) 细辛(去苗) 人参(去芦头) 甘草(炙，锉) 贝母(去心) 各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作二十丸。每服一丸，含化咽津，不拘时候。常令咽喉中药气不歇益佳。

【主治】一切咳嗽。

26621 宁神丸

《普济方》卷二一八。即《杨氏家藏方》卷十“灵砂宁神丸”。见该条。

26622 宁神丹

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】天麻 人参 陈皮 白术 归身 茯神 荆芥 僵蚕 独活 远志(去心) 犀角 麦门冬(去心) 酸枣仁(炒) 辰砂各半两(另研) 半夏 南星 石膏各一两 甘草(炙) 白附子 川芎 郁金 牛黄各三钱 珍珠三钱 生地黄 黄连各半两 金箔三十片

【用法】上为末，酒糊为丸。每服五十丸，空心白汤送下。

【功用】清热养气血。

【主治】痫症，不时潮作者。

26623 宁神丹

【方源】《普济方》卷一六二。

【组成】防风一斤 乌梅肉 桔梗 甜葶苈各半斤 人参 知母 紫苏叶各四两

【用法】上为末。用麻黄五斤，去根，切作二寸，水洗过，用长流水三斗，运取于银石器内，同麻黄熬水至五升，将麻黄就于水内，一把搓尽，去麻黄，将麻黄水用罗子隔去净，

再于银石沙器内，熬成膏，点些入水中，不散为度；将前项药末，同麻黄膏子相和匀，杵一千之上，然后为丸，如弹子大。每服一丸，水一盞半，煎至四五沸化开，如不开时，用匙杓研开，卧时热服。汗出为度。

【主治】远年近日，咳嗽喘满，不得眠卧，或因风寒入腠理，不得眠者。

【宜忌】煎药可用银石沙瓷器内，不用铜铁器；服药后，忌房室、驴马肉、雁鸡猪肉、鱼鸭、湿面、油腻、发病等物及嗔怒。

26624 宁神丹

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】天麻 人参 陈皮 白术 茯神 荆芥 僵蚕 独活 远志 防风 麦冬 黄连 枣仁各五钱 归身 南星 石膏 生地 各一两 琥珀 珍珠 牛黄 黄芩 川芎 白附子 甘草各三钱 辰砂五钱(另研) 金箔三十片

【用法】酒糊为丸。每服五十丸，空心白汤送下。

【功用】清热养气血。

【主治】痢，不时潮作者。

26625 宁神丹

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】胆星一两 天竹黄八钱 僵蚕(炒)五钱 全蝎(炙)四钱 钩藤四钱 明天麻五钱 山药四钱 琥珀 珍珠各三钱 牛黄二钱 雄黄 麝香各一钱五分

【用法】上为细末，甘草煎膏为丸，如芡实大，辰砂为衣。每服一丸，薄荷汤送下；慢脾风，四君子汤送下。

【主治】小儿急慢惊风。

26626 宁神丹

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】莲须 石莲肉各一斤 芡实十二两 麦冬四两

【用法】用公猪肚一个，入芡莲肉一斤，放砂锅内，水煮烂，去肚，将莲肉晒干，同前药为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一

百丸，空心莲须汤送下。

【功用】壮阳固精。

26627 宁神汤

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【组成】人参 当归身 生地黄 麦门冬 各一钱 山梔仁 甘草(炙) 黄连(炒) 各五钱 石菖蒲三分 辰砂(末)一分

【用法】上锉细。加灯心半钱，水一盞，煎七分，去滓，调辰砂末搅匀，食后温服。

【功用】《痘疹传心录》：养血安神。

【主治】①《痘疹心法》：痘疹收靥之后，真气虚弱，火邪内攻，发惊者。②《景岳全书》：心虚火盛，热躁惊搐。

26628 宁神汤

【方源】《片玉痘疹》卷六。

【组成】石菖蒲 茯神 梔子仁(酒炒) 甘草(炙) 黄连 木通

【用法】灯心为引，水煎，加竹沥服之。

【主治】痘已收靥，余热不退而发搐者。

【加减】虚，加人参。

【备考】《痘疹全书》有麦门冬；《痘疹传心录》有人参。

26629 宁神汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】人参 青皮各五分 黄耆二钱 神曲七分 黄柏 当归 柴胡 升麻各三分 苍术 炙草各一钱

【用法】水煎服。

【主治】食后昏沉，懒动嗜卧。

26630 宁神汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】川芎一钱 当归三钱 炮姜四分 炙草四分 茯神一钱 桃仁十二个 人参二钱 益智八分 柏子仁一钱 陈皮三分

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】产后气血两虚，妄言妄见，神魂无依，而痛未止者。

【加减】真知瘀血不行，合失笑散。

26631 宁神汤

【方源】《会约》卷二十。

【组成】人参 当归 熟地各二钱 茯神 石菖蒲各一钱 枣仁(炒,研)八分 远志六分 炙草五分

【用法】上为末,猪心血为丸,辰砂(水飞)为衣。灯心汤送下。

【主治】痘成浆之时,气血外出,自心舍空虚,神无所依,或昏睡不醒,口中喃喃,狂言如祟。

26632 宁神汤

【方源】《证治宝鉴》卷二。

【组成】四物加甘草 参 神 远 枣 连

【用法】加姜汁、竹沥煎服。

【主治】痢证血虚神昏者。

【加减】有痰,加姜汁、炒南星。

26633 宁神饮

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】茯苓 陈皮 瓜蒌各八分 黄芩 远志 枣仁各六分 半夏 贝母各一钱 甘草五分

【用法】生姜三片为引,水二钟煎,食远服。先服化痰丸,后服本方。

【主治】风狂痰迷心窍。

【加减】心热,加麦冬、黄连。

26634 宁神散

《袖珍》卷一引《圣惠》。为原书同卷“宁肺散”之异名。见该条。

26635 宁神散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】御米囊一斤(生醋炒) 乌梅四两

【用法】上为末。每服二三钱,食后沸汤点下,一日三次,常服。

【主治】①《宣明论》:一切痰嗽不已。②《玉机微义》:咳嗽多年不已,常自汗,服药不效者。

26636 宁神散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】御米壳二两(蜜炙) 人参 苦苧 蒴各一两

【用法】上为末。入乌梅同煎三五沸,去滓,

食后稍热服。

【主治】寒嗽,风冷寒湿咳嗽。

26637 宁神散

【方源】《普济方》卷一六〇。

【异名】宁肺散。

【组成】甜葶苈(炒) 木瓜各一两半 御米壳(蜜炒)四两 乌梅(切,炒) 五味子 人参各一两

【用法】上为末。每服二钱,食后白汤调下。

【主治】一切肺虚咳嗽,涎喘不止。

26638 宁神膏

【方源】《普济方》卷三七四。

【组成】茯神 朱砂各一两 麦门冬(去心)半两 麝香一分

【用法】上为细末,炼蜜为小饼子。每服一饼,临睡同薄荷汤化服,一夜一服。

【主治】小儿初惊,服防风导赤散其搐止者。

26639 宁神膏

《医学入门》卷八。为《百一》卷十八“宁志膏”之异名。见该条。

26640 宁神膏

【方源】《诚书》卷八。

【组成】人参 茯苓 川芎 羌活 天麻(煨) 防风 甘草(炙)各二钱 朱砂五分 麝一字

【用法】上为末,炼蜜为丸。麦冬汤送下。

【功用】镇心,退热,定惊。

【备考】本方方名,据剂型,当作“宁神丸”。

26641 宁神膏

【方源】《幼科释谜》卷六。

【组成】人参半两 茯神二两 葛根 甘草 五味子 知母 花粉各三钱

【用法】另将生地浸一夜,捣烂,绞取汁一碗,熬膏。入药末,至可丸,每服二三十丸,枣汤送下。

【主治】急惊风服导赤散加地黄、防风,其搐止者。

26642 宁眠散

【方源】《幼幼新书》卷九引张涣方。

【组成】天南星(炮裂) 人参(去芦头) 白附子各半两 干蝎二十一个 干赤头蜈蚣一条(酒浸, 酥炙微黄)

【用法】上为细末。次用乳香、血竭各研一分, 同诸药拌匀。每服一字至半钱, 用好酒少许, 浸薄荷煎汤调下。每儿潮搐, 服之得眠是验, 次用辰砂膏相兼服之。

【主治】小儿慢惊潮搐, 不得安卧。

26643 宁眠膏

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】甜消 人参 朱砂各一两 茯苓山药各二两 甘草(炙) 寒水石(煨) 各五钱

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如芡实大。每服一丸, 薄荷汤送下, 不拘时候。

【主治】小儿惊热, 心神恍惚, 谵语, 睡卧不稳。

26644 宁眠膏

【方源】《诚书》卷八。

【组成】甜消 人参 辰砂 茯苓 山药各一两 甘草(炙) 寒水石(煨) 各二钱半 龙脑一分 麝五分

【用法】上为末, 加坏胭脂一钱, 炼蜜为丸。薄荷汤送下。

【主治】小儿惊热痰盛, 心神恍惚。

【备考】本方方名, 据剂型, 当作“宁神丸”。

26645 宁静汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参一两 白术三钱 白芍一两 熟地一两 玄参一两 生枣仁五钱 白芥子三钱 麦冬五钱

【用法】水煎服。

【主治】怔忡之症, 扰扰不宁, 心神恍惚, 惊悸不已者。

【方论选录】此肝肾之虚, 而心气之弱也, 若作痰治往往杀人。盖肾虚以致心气不交, 心虚以致肝气益耗。故方用一派补心、肝、肾

之药, 三经同治, 则阴阳之气自交, 上下相资, 怔忡自定, 而惊悸恍惚之症亦尽除矣。

26646 宁嗽丸

【方源】《集验良方》卷四。

【组成】瓜蒌仁(略炒熟)一两 花椒一钱五分(去椒目) 麦面一钟(炒熟)

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如小指头顶大。不时噙化。

【主治】咳嗽。

26647 宁嗽丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】南沙参 桑叶 杏仁 茯苓 川贝 姜夏 前胡 薄荷各二两 苏子一两五钱 橘红一两 米仁三两 炙草五钱

【用法】上为末。用川斛一两, 生谷芽二两, 煎汤法丸。每服三四钱, 淡姜汤送下。

【功用】清热润肺, 止咳化痰, 定喘。

①《饲鹤亭集方》: 止咳宁嗽, 清热消痰。
②《重订通俗伤寒论》: 防变肺痿肺癆。③《药庵医学丛书》: 润肺定喘, 降有余之邪火。

【主治】①《重订通俗伤寒论》: 咳尤不止, 痰中兼有血丝血珠者。②《鳞爪集》: 邪留肺经, 久嗽不宁。

【备考】方中杏仁、姜夏, 《重订通俗伤寒论》作“甜杏仁”、“竹沥半夏”。

26648 宁嗽丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】薄荷一两五钱 苦杏仁一两五钱 黑苏子二两 炙甘草五钱 桔梗二两 制半夏二两 川贝母二两 广皮一两 茯苓二两 谷芽一两 桑白皮一两五钱 川石斛二两

【用法】上药除桑白皮、川石斛外, 其余共为细末, 用桑白皮、川石斛煎汤为丸, 如绿豆大, 约成丸十三两。每服一钱五分, 开水送下, 一日二次。

【功用】宣肺利气。

【主治】风热咳嗽。

26649 宁嗽丹

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】苏叶 甘草 天花粉 天冬 款冬花各一钱 桔梗 生地各三钱 麦冬五钱

【用法】水煎服。二剂愈。

【主治】骤感风寒，一时咳嗽，鼻塞不通，嗽重，痰必先清后浊，畏风畏寒。

26650 宁嗽丹

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬二两 五味子二钱 天冬三钱 生地一两 桑白皮二钱 款冬花 紫菀 桔梗各一钱 甘草五分 牛膝三钱

【用法】水煎服。

【主治】肺燥咳嗽，吐痰不已，皮肤不泽，少动则喘。

26651 宁嗽汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】桑白皮(炒) 紫苏 细辛 北五味子 橘皮 半夏(制) 茯苓 杏仁(去皮) 缩砂仁 枳壳(制) 北梗 甘草(炒) 各等分

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜四片，乌梅半个，水煎，食后服。

【主治】诸嗽。

26652 宁嗽汤

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】五味子十五粒 茯苓一钱 桑白皮一钱二分 陈皮一钱 知母一钱 马兜铃一钱五分 川芎一钱 麦冬一钱二分 粉草五分

【用法】水煎服。

【主治】咳血。

26653 宁嗽汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】桔梗 半夏 枳壳 陈皮 前胡 葛根 桑皮 茯苓 苏叶 杏仁 甘草

【用法】加生姜、葱。服此方后，再用加味二陈汤一剂。

【主治】表病嗽。

【加减】冬，加麻黄取汗。

26654 宁嗽汤

【方源】《麻疹集成》卷三。

【组成】葶苈 桔苈 米仁 石膏 甘草 桑皮 百合 花粉 梔子

【主治】麻疹后，肺胃实火喘促。

26655 宁嗽煎

【方源】方出《奇方类编》，名见《仙拈集》卷一。

【组成】知母一钱(去皮毛，切片，隔纸炒) 杏仁(姜汁泡，去皮尖，焙) 五钱

【用法】水一钟半，煎一钟，次以萝卜子、杏仁等分(为末)，米面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远姜汤送下。绝病根。

【主治】久嗽气急。

26656 宁嗽膏

【方源】方出《圣惠》卷四十六，名见《医部全录》卷二四五。

【组成】紫苏子三两(微炒) 生姜汁一合 白蜜一中盏 鹿角胶三两(捣碎，炒令黄燥) 杏仁三两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄) 生地黄汁一盞

【用法】上药都捣令熟，入生姜、地黄、蜜相和，以慢火熬成膏，于不津器中，密收之。每服半匙，以温粥饮调下，一日三四次。

【主治】久咳嗽上气，心胸烦热，吐衄血。

26657 宁嗽膏

【方源】《古今医鉴》卷七。

【异名】如神宁嗽膏(《寿世保元》卷四)。

【组成】天冬(去心)半斤 杏仁(去皮)四两 贝母(去心)四两 百部四两 百合四两 款冬花五两 紫菀三两 白术四两

【用法】上锉，用长流水二十碗煎五碗，滤滓再煎，如是者三次，共得药汁十五碗，入饴糖半斤，蜜一斤再熬，又加阿胶四两、白茯苓细末四两，和匀如膏。每服三五匙。

【功用】①《古今医鉴》：敛肺。②《仙拈集》：止咳化痰。

【主治】①《古今医鉴》：阴虚咳嗽，火动咯血。②《回春》：阴虚火动发热，咯血吐血。

【备考】《寿世保元》无白术。

26658 宁嗽膏

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】麻黄 杏仁(去皮尖) 桔梗(去芦) 甘草 知母 贝母 款冬花 黄芩 紫菀各五钱 黄连一钱 香附二钱(童便炒) 牛胆南星一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如芡实大。每服一丸,食后白汤化下。

【主治】小儿一切咳嗽不已。

26659 宁嗽膏

【方源】《简明医毅》卷四。

【组成】天冬 麦冬各一两 粟壳(去麸,取衣) 陈皮各七钱 五味子 萝卜子 贝母各五钱 冬花 百合 百部 天花粉 枳壳 兜铃 紫菀各三钱

【用法】加白果三十个(打碎),新砂锅煎首汁,滤滓煎二汁,再煎三汁;麻布绞去滓,滤第三汁,入锅煎减半,入二汁,又减半,下首汁熬;加饴糖八两,熬稠,倾瓷碗内,生水中一日。每服半杯,重汤顿温服。

【主治】嗽久,诸邪服药已清,唯嗽不止者。

【宜忌】邪未清切忌。

26660 宁嗽糖

【方源】《济众新编》卷七。

【组成】百合二两 天门冬一两 桂皮 胡椒 橘皮各三钱 桔梗二钱

【用法】上为细末,糯米一斗造稀糖,同和再熬成软糖。随量服,不拘时候。

【功用】补虚乏,益气力,润五脏,消痰止咳;镇心神。

【主治】肺气喘嗽,肺痿咳嗽。

26661 宁嗽金丹

《十药神书》(陈修园注解本)。为《修月鲁般经后录》引《劳证十药神书》(见《医方类聚》卷一五〇)“太平丸”之异名。见该条。

26662 宁心生一散

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】柏子仁四钱 石菖蒲三钱 生龙骨五钱 远志三钱 茯神三钱 磁石二钱 生牡蛎五钱 生龟版四钱 枣仁三钱(炒)

甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】两眼白光自现。

26663 宁心益智丸

【方源】方出《丹溪心法》,名见《丹溪治法心要》卷四。

【异名】人参丸(《景岳全书》卷五十三)。

【组成】人参 茯苓 茯神 牡蛎 酸枣仁 远志 益智各半两 辰砂二钱半

【用法】上为末,枣肉为丸服。

【功用】宁心益智。

【备考】《丹溪治法心要》无茯苓。

26664 宁志内托散

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】柴胡八分 茯神六分 葛根一钱 人参五分 当归八分 枣仁六分 远志六分 橘红六分 贝母八分 益智仁五分

【用法】加生姜、大枣,同煎服。

【主治】外感寒邪,内伤情志,忧思抑郁,矜持恐怖,神情不畅,意兴不扬,恶寒发热,身胀头疼者。

【加减】阳分虚者,加黄耆、白术各一钱;阴分虚者,加熟地、白芍一钱;气滞者,加木香三五分;虚火,加丹皮、梔子七分;肝脾两虚者,加何首乌、圆眼肉。

【方论选录】盖情志之病,本无用疏解之理,而外邪客之,不得不藉人参之大力,以助柴、葛之托提。茯神、当归养血宁神,远志、枣仁交通心肾,益智启脾,贝母开郁,橘红除痰利气,姜、枣调和营卫,再与人参、柴、葛并用,则邪无不透也。

26665 宁志化痰汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】胆星一钱 半夏(制)一钱 陈皮一钱 茯苓一钱 天麻一钱 人参一钱 黄连(姜汁炒)一钱 酸枣仁一钱 石菖蒲一钱

【用法】上锉一剂。加生姜五片,水煎服。再服养血清心汤。

【主治】癫狂，心虚痰盛之症。

26666 宁坤至宝丹

【方源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】嫩黄耆(蜜炙)三两 白术(陈壁土炒) 枣仁(炒香) 归身(酒炒) 香附(杵，米酒制) 川断(酒炒) 条芩(酒炒) 甘枸杞 血余(煅不见火) 阿胶(蛤粉炒) 杜仲(盐水炒) 各二两 茯苓(乳制) 白芍(酒炒) 丹参(酒炒) 各一两半 北五味(焙)六钱 甘草(蜜炙) 朱砂(飞为衣) 各一两 大生地(酒煨) 四两

【用法】上药各为细末，和匀，炼蜜为丸，每重三钱。按症照引调服：凡久不坐孕，经脉不调，腹痛痠胀，或赤淋白带，腰痛胃痛，夜热心烦，食少，日服一丸，莲子汤送下；胎气失调，恶心呕吐，虚烦阻食，浮肿气急，腰腹痠痛，胎漏下血，或伤胎见红，每服一丸，莲子汤送下；甚者服数丸，人参汤送下；临产阵作时，服一丸，白汤送下，胎自顺下；如有横逆异产，每服数丸，汤和童便送下，保全母子；或难产者，冬葵子三钱，煎汤调下；产后下血过多，汤和童便送下；恶露不行，腹痛块瘀，山楂三钱，红花一钱，煎汤调下；或寒热往来，有外感者，荆芥穗一钱，煎汤调下；兼虚汗者，人参汤送下；虚烦狂躁，腹满气急，俱白汤送下；无论老少妇女，血崩尿血，或因血虚，周身筋骨疼痛者，白汤送下。

【主治】妇人经脉不调，带下，崩淋，虚劳，胎前产后百病。

26667 宁坤至宝丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】益母草三十两 香附(炙)五两 白芍五两 川芎五两 当归五两 橘红五两 熟地五两 生地五两 黄芩五两 乌药五两 茯苓五两 白术(炒)五两 阿胶(炒)二两五钱 木香二两五钱 苏叶二两五钱 砂仁二两五钱 甘草二两五钱 川牛膝二两(共研为细粉，过罗) 每十六两细粉加人参

(去芦)三钱 沉香八钱 琥珀四钱

【用法】上为细末，过罗，混合均匀，炼蜜为丸，重三钱，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功能】益气和荣，调经养血。

【主治】月经不调，胸膈不舒，食欲不振，身体瘦弱，腰痛腿痠。

26668 宁坤至宝丹

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】益母草八两 香附八两 当归四两 川芎四两 台乌药四两 黄芩四两 生地四两 白术四两 茯苓四两 丹参四两 砂仁四两 青皮四两 广木香四两 杜仲(炒)四两 肉桂二两 党参八两 甘草四两 元胡四两 枸杞四两 柴胡二两 沉香四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸三钱重，蜡皮封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】调经养血，顺气开瘀。

【主治】经血不调，腰腹疼痛，赤白带下，四肢浮肿，胸口疼痛，呃逆胀满。

26669 宁坤养血丹

【方源】《北京市中药成方选集》。

【处方】当归一百两 人参(去芦)十两 茯苓二十八两 丹参一百两 川芎七十两 橘皮二十二两 红花六十九两 白芍八十七两 生地十六两 甘草二十二两 白术(炒)十六两 柴胡六十两 肉桂(去粗皮)八两 香附(炙)一百两 厚朴(炙)八两

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重二钱五分。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】补气和荣，调经养血。

【主治】妇女月经不准，赶前错后，经期腹痛，腰痛腿痠。

26670 宁肺止咳饮

《胎产新书》卷四。为《胎产心法》卷上“宁肺止咳散”之异名。见该条。

26671 宁肺止咳散

【方源】《胎产心法》卷上。

【异名】宁肺止咳饮(《胎产新书》卷四)。

【组成】麦冬二钱（去心） 知母一钱 桔梗 紫苏各五分 杏仁十粒（去皮尖） 桑白皮六分 甘草四分

【用法】水煎服。

【主治】孕妇风寒咳嗽。

【加减】有痰，加橘红四分、竹沥、姜汁；火嗽，加黄芩八分；虚嗽，加紫菀一钱、款冬花六分；寒甚，加麻黄；虚损，加瓜蒌一钱、竹沥、姜汁；嗽而心胸不舒，加去心贝母、百合各一钱、紫菀八分。

【备考】方中麦冬，《胎产新书》作“天冬”。

26672 宁肺生化汤

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】川芎一钱 当归二钱 杏仁十粒 知母六分 甘草 干姜（炙） 桔梗各四分

【主治】产后半月内，感风寒而嗽，鼻塞声重。

【加减】痰，加天花粉八分；虚人有汗，加人参一钱，不可偏重散寒之药。

26673 宁肺桔梗汤

《外科正宗》卷二。为《外科枢要》卷四“桔梗汤”之异名。见该条。

26674 宁肺清金丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】前胡二两 苦杏仁二两 天花粉二两 象贝二两 桔梗二两 枳壳二两 茯苓三两 桑白皮三两 莱菔子三两 瓜蒌霜三两 黑苏子四两 橘红一两五钱

【用法】上药除桑白皮外，共为细末，将桑白皮煎汤为丸，如绿豆大，约成丸二十二两。每服二钱，开水送下，一日二次。或绢包煎服一两。

【功用】宣肺止咳。

【主治】感冒咳嗽。

26675 宁神内托散

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】丹参一钱 人参五分 续断一钱 远志六分 茯神八分 甘草三分 柴胡八分

枣仁六分 当归八分 干葛八分 生姜 大枣

【主治】食少事烦，劳心过度，兼感外邪，寒热交作者。

【加减】若用心太过者，加丹参一钱、柏子仁一钱；若兼用力太过者，加秦艽、续断各一钱；若食少心烦者，加莲肉、扁豆、谷芽各一钱；若心虚不眠，多汗者，加五味子三分；若邪盛不能解散，加秦艽、羌活五七分。

【方论选录】方中茯神、丹参以宁神，枣仁、当归以补肝血，柴胡、葛根以托外邪，远志交通心肾，续断专理劳伤，更有人参、甘草驾驭，为之主宰，则客邪无容身之地矣。

【备考】方中生姜、大枣用量原缺。

26676 宁神化毒汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】人参 归身 生地 麦冬 木通 赤芍 石菖蒲 山梔子 灯心

【用法】上改咀。水煎服。

【主治】痘疹成浆后，脓血过多，心虚神无所主，口中谵语。

26677 宁神生化汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎二钱 当归四钱 茯苓 枣仁 柏仁各一钱 桃仁十粒 炮姜 炙甘草各五分 红枣二枚（去皮）

【用法】水煎服。

【主治】产后气血两虚，轻则睡中呢喃，重则不睡妄言，或因痰客于上焦，视听言动虚妄，块痛者。

【加减】虚，加人参。

26678 宁神生化汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】人参二钱 当归三钱（酒洗） 干姜（炙黑） 炙草各四分 茯神 柏子仁 川芎各一钱 桃仁十粒（去皮、尖） 益智仁八分 陈皮三分

【用法】加大枣二个，龙眼肉五个，水煎服。

【主治】产后块痛不止，妄言妄见，未可用

香、术者。

【加减】瘀血不行，合失笑散。

26679 宁神安卧丸

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】人参五两 远志二两 枣仁(炒)二两 熟地八两 山茱萸四两 茯神三两 柏子仁一两 麦冬三两 陈皮五钱

【用法】上药各为末，炼蜜为丸。每日服一两，白滚水送下。五日即安。

【主治】卧不安枕。

26680 宁神导痰汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】导痰汤加远志 菖蒲 芩 连 朱砂

【功用】宁神导痰。

【主治】①《医学入门》：癫狂，怒伤肝者。②《杏苑》：怒动肝火，风痰上盛，发狂叫呼者。

26681 宁神固精丸

《寿世保元》卷五。为《直指·附遗》卷十“固精丸”之异名。见该条。

26682 宁神定志丸

《北京市中药成方选集》。为《直指》卷十一“宁志丸”之异名。见该条。

26683 宁嗽太平丸

《北京市中药成方选集》。即《修月鲁般经后录》引《十药神书》(见《医方类聚》卷一五〇)“太平丸”。见该条。

26684 宁嗽化痰丸

【方源】《医方类聚》卷一一七引《修月鲁般经后录》。

【组成】半夏五钱 陈皮(去白)二钱半 人参 薄荷各一两 麦门冬(去心)三钱 桑白皮(蜜炙)半两 贝母(去心)三钱 黄芩(片子者)半两 甘草(炙)七钱 青黛三钱 五味子二钱 干姜(炮)二钱

【用法】上为末，水糊为丸，如梧桐子大。每服二十至三十丸，食少远以白汤送下。

【主治】肺经有热，咳嗽喘急，痰涎壅盛。

26685 宁嗽化痰饮

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄芩十六两 冬花十六两 桑皮十六两 法半夏八两 贝母八两 麦冬八两 天冬八两 杏仁(去皮，炒)八两 阿胶(炒珠)四两 五味子(炙)四两 甘草四两

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重二钱五分。每服一九，温开水送下，一日二次。

【功用】清金宁嗽，化痰定喘。

【主治】肺经虚热，咳嗽痰盛，气促喘满，久嗽不止。

26686 宁嗽化痰汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】桔梗 枳壳(麸炒) 半夏(姜汤泡七次) 陈皮 前胡 干葛 茯苓各一钱 紫苏一钱二分 麻黄一钱(冬月加，夏月减) 杏仁(炒，去皮尖) 桑皮各一钱 甘草四分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，食远热服。

【主治】感冒风寒、咳嗽鼻塞。

26687 宁嗽百花膏

【方源】《活人方》卷三。

【组成】乌梅二两 粉甘草二两 知母二两 紫菀三两 肉桂一两 杏仁霜二两 广陈皮二两 麻黄二两 嫩桑皮三两 粟壳二两 前胡二两 苏叶三两 款冬花三两

【用法】上为细末，炼白蜜烂和。不拘时候噙化。

【主治】腠理不密，易于伤风受寒，寒痰伏于肺窍，气道不清，痰涎壅闭，咳嗽不已，积久遂成喘嗽，不时举发。

26688 宁嗽抑火汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】知母 瓜蒌仁(去油) 贝母各二钱 玄参 麦门冬 黄芩 天花粉 山梔仁 枳实各一钱 竹茹 桔梗各八分

【主治】肺火上炎，咳嗽痰多，午后面赤。

【用法】生姜三片，煎服。

26689 宁嗽定喘饮

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生怀山药两半 甘蔗自然汁一两 酸石榴自然汁六钱 生鸡子黄四个

【用法】先将山药煎取汤一大碗,再将余三味调入碗中,分三次温饮下,约两点钟服一次。若药已凉,再服时须将药碗置开水中温之,然不可过热,恐鸡子黄熟、服之即无效。

【主治】伤寒温病,阳明大热已退,其人或素虚或在老年,益形怯弱,或喘,或嗽,或痰涎壅盛,气息似甚不足者。

【临证举例】喘嗽 一周姓叟,年近七旬,素有劳疾,且又有鸦片嗜好,于季秋患温病,阳明府热炽盛,脉象数而不实,喘而兼嗽,吐痰稠粘。投以白虎加人参汤,以生山药代粳米,一剂,大热已退,而喘嗽仍不愈,且气息微弱,似不接续。其家属惶恐,以为难愈。且言如此光景,似难再进药。愚曰:勿须用药,寻常服食之物即可治愈矣。为开此方,病家视之,果系寻常食物,知虽不对证,亦无妨碍。遂如法服之,两剂痊愈。

26690 宁嗽润肺丸

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】桑皮六钱 麻黄五钱 杏仁二两 阿胶五钱 款花三两 乌梅肉二两 栗壳一两(去筋蒂)

【用法】炼蜜为丸,如芡实大。姜汤磨服。

【功用】止嗽定喘。

26691 宁嗽琼玉散

【方源】《医学启蒙》卷三。

【组成】诃子肉一两(煨,去核) 白桔梗一两 百药煎五钱 五倍子一两(炒) 罂粟壳五钱(蜜水泡,去筋) 生甘草五钱 乌梅肉五钱(炕)

【用法】上为细末。每服一钱,食后、临卧蜜汤调下。白汤嗽口,服后仰卧片时。

【主治】久嗽。

【宜忌】忌油腻、荤腥、酒醋、盐酱、炙博之物七日。

26692 宁心志济经丹

【方源】《普济方》卷三十三引《卫生家宝》。

【组成】朱砂 乳香 没药 白茯苓 白芍药 当归各二两 酸枣仁 远志(去心) 菖蒲 人参 白茯神各一两 熟地二两

【用法】上除朱砂别研外,并为末,同和炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后熟水送下。

【主治】心肾气不足。

【宜忌】忌猪、羊血。

26693 宁和堂暖脐膏

【方源】《串雅内编》卷一。

【组成】香油一升(或麻油) 生姜一斤(切片) 黄丹(飞过)半斤

【用法】熬膏。摊布贴脐上。

【主治】水泻、白痢。

【宜忌】孕妇忌贴。

26694 宁心定魄茯神汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】人参 当归(酒洗) 熟地各二钱 川芎 黄耆(蜜炙) 白术(土炒) 枣仁(炒,去壳) 柏子仁 茯神 益智仁 麦冬(去心)各一钱 陈皮三分 五味子十粒(碎) 炙甘草四分

【用法】加大枣二个,建莲肉(去心)八枚,龙眼肉八分,水煎服。

【主治】产后块痛已止,妄言妄见。

永

26695 永安汤

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】人参一钱 熟地三钱 当归三钱 芎藭二钱 阿胶一钱五分 白术二钱 续断一钱五分 桃仁 乌贼骨各一钱 吴茱萸四分

【用法】上作一服。食前温进,一日一次。

【主治】产后有宿疾者。

26696 永寿丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】苍术(米泔浸一宿)十六两 熟干地黄四两 天门冬(去心)八两 白茯苓四两 何首乌 地骨皮四两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温粥饮汤送下。渐加至八十丸。

【功用】补阴气,益子精。

【备考】方中何首乌用量原缺。

26697 永固孕汤

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】地黄 川芎 黄芩各五分 归身尾 人参 白芍药 陈皮各一钱 白术一钱半 甘草三钱 黄柏少许 桑上羊食藤(圆者)七叶 糯米十四粒

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】胎动不安。

26698 永和公主药澡豆

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】白芷二两 白藜三两 白及三两 白附子二两 白茯苓三两 白术三两 桃仁半升(汤浸,去皮) 杏仁半升(汤浸,去皮) 沉香一两 鹿角胶三两 麝香半两(细研) 大豆面五升 糯米二升 皂荚五挺

【用法】先煎好浆水三大盏,消胶为清,即取糯米净淘,和胶清煮作粥,薄摊,晒之令干,和药一时,捣细罗为散。取大豆面重和之,令匀,又用酒半盏,白蜜二两,火上焙之,令蜜消,即一时倾入澡豆内,拌之令匀,晒干。常用洗手面佳。

【主治】面黑不净。

必

26699 必孕汤

【方源】《仙拈集》卷三引《全生》。

【组成】续断 沙参 杜仲 当归 香附 益母各二钱 川芎 橘皮各二钱 砂仁五分

【用法】水煎服。服四剂,下期再服四剂,必无不孕者。

【主治】经期准而不孕。

26700 必圣膏

《普济方》卷四〇三引《谭氏殊圣》。为《圣济总录》卷一六九“夺命煎”之异名。见该条。

26701 必应汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】延胡索 香附 艾灰 归身 砂仁 姜

【主治】类心痛。或寒或痰或虫或食,上干包络,脂膜紧急作痛。

26702 必应散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】枳壳四两(去瓢,麸炒) 甘草二两(炙) 阿胶二两(炙) 黄耆一分(细锉,蜜炙) 川芎半两(不见火)

【用法】上为末。每服一大钱,空心茶点下,有孕五个月外,一日三次。能除产后诸痛。

【功用】安胎养气,和血辟邪。

【主治】难产。

26703 必应散

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】熟地 槟榔 陈皮 草果(去皮) 当归 砂仁 甘草(炙) 柴胡各等分

【用法】上为粗末。每服三钱,水二盏,加生姜五片,煎八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】久寒热如症状。

26704 必应散

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】黄牛角觮一枚(捶碎) 白蛇蜕一条 猪牙皂角七挺 穿山甲一斤(七十鳞) 蛴螬一两

【用法】上锉。入砂瓶内,以盐泥封固,候干,先少着火烧令烟出后,用大火煨令通赤为度,取出摊冷为末。每服三钱,先以胡桃肉一枚,分四分,一分临卧时,细研如糊,酒调下便睡,先引出虫;至五更时一服;次日辰时一服。久患不过三服,即效。

【主治】五种肠风下血。外痔,内痔,脱肛,鼠奶痔,痔漏。

26705 必应散

【方源】《类证治裁》卷六。

【组成】延胡 香附 艾灰 归身 砂仁 生姜

【主治】五脏之邪干心包致痛。

26706 必胜丸

【方源】《三因》卷十五。

【组成】鲫鱼一个(去肠肚并子,入雄黄一粒鸡子大、硃砂一钱,在腹内,仰安鱼于炭火上烧烟尽,取出以全蜈蚣一条、蓬术半两、梔子五个、皂角二挺并烧、蓖麻子五个去皮,灯上烧,更用黄明胶三文、皂角二挺去皮,酥炙)

【用法】上为末。别用皂角二挺,去皮,捶碎,以水三碗,揉汁去滓,煮精羊肉四两烂软,入轻粉五厘,男子乳汁半两,同研成膏,和药末,丸如绿豆大,朱砂为衣。每服十丸,侵晨温酒送下,一日一次。至晚,下肉疙瘩子。若项有五个,则以五服药取之,视其所生多少,以为服数,既可更进数服。如热毒疮疖未有头脑者,一服亦须消散。

【主治】瘰癧,不以年深日近,及脑后两边有小结,连后数个,兼瘰癧腹内有块。

26707 必胜汤

《圣济总录》卷一六九。为《博济》卷四“解毒必胜散”之异名。见该条。

26708 必胜汤

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】大黄(小剂七分至三钱,大剂三钱至一两,势急者以一半同煎,一半临起投下) 青皮五分至钱半 桃仁二钱至四钱 红花五分至钱半 赤芍钱半 木通三分至八分 荆芥穗三分至钱半 葛根三分至钱半 生地二钱至两半 牛蒡七分至二钱 白项地龙三条至二十一条 紫花地丁(小剂三钱,中剂七钱,大剂一两五钱) 蝉蜕二分至六分 山楂(大剂一两五钱,中剂一两,小剂五钱) 芦根三两

【用法】煎汤代水服。

【主治】痘,血瘀气滞,颗粒实而不松,痘

色滞而不活,或干红,或紫暗,或斑点,诸般痛楚,或贯珠,或攒簇,毒火两伏。

26709 必胜汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】苞二(《痧症全书》卷下)、三十四号小畜方(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】红花 香附各四分 桃仁(去皮尖) 大黄 贝母 山楂 赤芍 青皮 五灵脂各一钱

【用法】水二钟,煎七分,微温服。

【功用】《重订通俗伤寒论》:破血散结。

【主治】痧有因于血实者。

26710 必胜饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】生地 当归各三钱 川芎一钱 蒲黄(炒黑)二钱 小蓟(取汁)半酒杯

【用法】加乌梅五个,空心服。

【主治】男子妇人,血妄流溢,或吐或咳、衄血。

26711 必胜饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】半夏 枳实各二钱 石膏(煨)三钱 杏仁(去皮尖) 茶叶 麻黄 瓜蒌霜(去油) 甘草各一钱

【用法】生姜五片为引,不拘时候服。

【主治】哮喘久久不愈。

26712 必胜饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】陈皮 厚朴 苍术 白茯苓 牛蒡子 泽泻 木通各八分

【用法】生姜一片为引,水煎,食前服。

【主治】痧已出,而泻不止。

26713 必胜散

【方源】《局方》卷八。

【组成】熟干地黄 小蓟(并根用) 人参 蒲黄(微炒) 当归(去芦) 芎藭 乌梅(去核)各一两

【用法】上为粗散。每服五钱,水一盞半,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《局方》:男子妇人血妄流溢,吐

血、衄血、呕血、咯血。②《普济方》：妇人下血过多，致发虚热。

26714 必胜散

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】白术 甘草(炙) 五味子(微炒) 各四两 干姜(炮) 三两半

【用法】上为散。每服二钱匕，加盐少许，沸汤点服，不拘时候。

【主治】脾气虚弱，不思饮食。

26715 必胜散

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】天南星(炮) 轻粉(研) 甘遂全蝎(炒) 各一分 巴豆(去皮心膜出油) 七粒 丹砂(研) 一钱 麝香(研) 半钱

【用法】上为散。每服一字匕，要吐泻，酒调下；取涎，薄荷汤调下。未周辟儿减之。

【主治】小儿急惊风。

26716 必胜散

《幼幼新书》卷十八。即《博济》卷四“解毒必胜散”。见该条。

26717 必胜散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】芎 归 芍 生地 熟地 阿胶 前胡 甘草 天冬 麦冬 陈皮 黄耆 白术 茯苓 刺藜 马勃 醉苓

【功用】清热凉血，养血安胎。

【主治】妊娠吐血衄血者，皆由平日忧思惊恐伤于肝脾，结于经络，久则气逆以致经血妄行，口出白吐，鼻出白衄。心胸烦满，甚或喘急，胎气上逼则难治。

【方论选录】古人云：胎前见血，十不活一，此甚言经血之不可伤也。夫血以养胎，胎藉血长，一有渗漏，胎元必伤，妄行过甚，孕妇有损，吐衄，从口鼻而出血，热极矣。清热凉血，胎或可安。芎、归、胶、芍、二冬、二地所以清血分之热，可养血固胎；醉苓、刺藜、马勃专除血中之伏火；黄耆、术、苓、陈、甘补阳以生阴之道。微嫌川芎辛散上行，宜慎之。

26718 必胜散

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【异名】必效散(《易简方》)。

【组成】附子一枚(端正重八钱者，生，去皮脐，切为四段，生姜自然汁一大盏，浸一宿，慢火炙干，再于生姜汁内蘸，再炙再蘸，渗尽姜汁为度) 高良姜 附子各等分

【用法】上为细末。每服二钱，腊茶清调下，食后连进二服。

【主治】一切风寒客搏阳经，偏正头痛不可忍，及阳虚头痛，连绵不愈。

【宜忌】忌热物少时。

26719 必胜散

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】蟾酥 轻粉(别研) 定粉 人中白各一钱 麝香一字(别研)

【用法】上为细末。临卧盐汤漱口了，贴药末在患处，用薄纸盖之。

【主治】一切牙疳，齿断蚀烂，口臭出血。

26720 必胜散

【方源】《济生续方》卷五。

【组成】蒲黄(略炒) 螺儿青各等分

【用法】上为细末。每用少许擦患处，少待，用温盐水漱之。

【主治】齿衄。

26721 必胜散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】川白芷不拘多少

【用法】上锉，晒或焙，研为细末。抄一字及半钱于舌上，令其自化，或用掌心盛之，以舌舐咽。儿小者，温净汤浓调，少与含化，并不拘时候。至六七次即效。

【主治】小儿、大人病中闻饮食药气，即恶心干呕，不能疗者。

26722 必胜散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效方》。

【组成】雄黄 川芎各等分

【用法】上药各为细末。含水漱之。立效。

【主治】偏正头痛，夹脑风。

26723 必胜散

【方源】《普济方》卷三四四。

【组成】马勃

【用法】以生布擦为末。浓米饮调下。

【主治】妊娠吐血、衄血。亦治吐血不止。

26724 必胜散

《本草纲目》卷十五。即《局方》卷十“消毒散”。见该条。

26725 必胜散

【方源】《外科正宗》卷四。

【异名】柳霜串（《串雅内编》卷三）。

【组成】大黄 槟榔 白牵牛各一钱 粉霜一钱五分

【用法】上药各为细末。年壮者作五服，中年久虚者作七服。用生姜四两捣汁，赤砂糖三钱，加水一大杯，三味和匀，临睡时腹中稍空，顿温通口服之即睡。至三更，遍身麻木如针刺，头目齿缝俱痛，此药寻病之功已达，行出大小二便，或青白黑黄，又或红虫之类，此乃病根也。一月内服药三次渐痊，眉发俱生，肌肤如旧。

【主治】大麻风，血热秘结，脏腑不通。

26726 必胜散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】赤槟榔 皂角刺（炒）各五钱 大黄（酒煨）一两 白牵牛（生，取头末）六钱（以一半炒） 甘草（生、炙）各一钱 轻粉二钱

【用法】上为散。壮年者分五服，中年者分七服。每服入黑糖或白蜜二匙，姜汁五匙调服。临卧时腹中稍空，姜汤送下。至三更，遍身麻木如针刺，头目齿缝俱痛。此药寻病根，重者，七日行一次，稍轻者，十日半月行一次，以三五遍为度。病退后，眉发渐生，肌肉如故。如齿缝中有血，以黄连贯众汤漱之。

【主治】痲风恶疾，营卫俱病，上下齐发。

26727 必胜膏

【方源】方出《本草纲目》卷二十六引《圣济总录》，名见《玉案》卷六。

【异名】葱蜜膏（《绛囊撮要》）、葱蜜掩（《医林纂要》卷十）。

【组成】老葱

【用法】将患处刺破，加生蜜杵贴之。两时疔出，以醋汤洗之。

【主治】疔疮恶肿。

26728 必胜膏

《小儿药证直诀》卷下。为《圣济总录》卷一六九“夺命煎”之异名。见该条。

26729 必胜膏

【方源】《医学正传》卷八。

【异名】拔毒膏（《准绳·幼科》卷六）。

【组成】马齿苋（杵汁） 猪油脂 石蜜

【用法】上药共熬为膏。涂肿处。

【主治】疮后余毒。毒气流于太阴脾经，则痈发四肢手腕并膝腠肿痛。

26730 必胜膏

《痘疹心法》卷二十三。为原书同卷“拔毒膏”之异名。见该条。

26731 必胜膏

【方源】《医部全录》卷四九一引《幼科全书》。

【异名】拔毒膏。

【组成】马齿苋（杵汁成膏） 赤石脂（为末）

【用法】上药并蜜共熬成膏。涂上肿处。

【主治】痘后痈毒。

26732 必效丸

【方源】《普济方》卷四十六引《博济》。

【组成】巴豆（去皮，出油）一分 丹砂（研） 乳香（研） 细辛（去苗叶） 当归（切，焙） 槟榔各半两 丁香 桂（去粗皮） 龙脑（研）各一钱（一方有麝香）

【用法】上为末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每发日服一丸，用好茶清送下。须是当门齿嚼，冷茶下之。十年病只用一粒，额上汗出即愈。

【主治】头风眩暈。

26733 必效丸

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【异名】散结丸（《普济方》卷二九六引《经验良方》）。

【组成】枳壳(去瓢,麸炒) 黄耆(锉) 各一两

【用法】上为末。以陈米饭为丸,如梧桐子大,每服三十丸,空心、食前米饮送下。

【主治】气痔脱肛不收,或生鼠乳时复血出,久不愈者。

26734 必效丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】枳壳一两半 黄耆 葶藶 菟丝子各二两 杜蒺藜 乌蛇各三两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,每服三十丸,空心、晚食前米饮送下。

【主治】一切痔瘻,不问浅深。

26735 必效丸

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】川黄连(去须)二两 大枣半斤 干姜一两 肉豆蔻一分(面裹,煨香,去面)

【用法】上为细末,面糊为丸,如黍米大。每服五七丸,乳食前米饮送下。

【主治】热利下血,频并不愈,腹痛不可忍,后重努膈肛脱。

26736 必效丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】桃仁半斤(用茱萸四两炒桃仁令紫色,去茱萸,令碾桃仁为细末,却入和后众药) 茴香(炒) 破故纸(炒香熟)各二两 延胡索 穿山甲(用蛤粉炒赤色,不用蛤粉) 地胆虫(洗,去泥土头翅足,焙干)各一两

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五丸,空心温酒盐汤送下。仍用前件炒药,茱萸捣为细末,用津液调敷患处。

【主治】偏坠膀胱疝气,小肠气痛不可忍者。

26737 必效丸

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】白术四两 川芎二两 熟地二两 全蝎一两 白茯苓二两 防风二两 僵蚕一

两 羌活一两 独活二两 猪苓一两 皂角一两 白蒺藜半两 人参二两 当归三两 龙胆草一两 皂角刺一两 荆芥一两 胡黄连二钱 大风子半斤(去壳) 黄连一两 薄荷一两 大黄四两(酒蒸) 辰砂三钱

【用法】陈米饭为丸,如梧桐子大。每服七十丸,温酒送下。

【主治】癩病。

26738 必效丹

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【组成】川黄连二两 大枣半升 干姜一两 矾半两

【用法】瓦器盛,泥盐固济,留一窍,木炭火烧,烟息为度,取出为末。面糊为丸,如黍米大。每服十丸,米饮送下。

【主治】血痢频并。

26739 必效丹

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】黄连一钱 黄芩一钱 大黄一钱 梔子一钱 青黛一钱 细辛三分 干姜三分

【用法】上为细末。吹之。

【主治】口舌破烂作疼。

26740 必效酒

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】蒜(四破,去心顶)一升

【用法】以无灰酒四升,煮蒜令极烂。每服五合,并滓顿服之。得汗即愈。

【主治】金疮中风。

26741 必效散

【方源】《圣济总录》卷六。

【异名】海神散(《杨氏家藏方》卷十四)。

【组成】鳔胶不拘多少(白色者,炙令焦黄)

【用法】上为细散。每服三钱匕,热酒调下。如不醒灌之。一方,用童便调服亦可。

【主治】①《圣济总录》:破伤风。身项强硬,不省人事。②《普济方》:打扑损伤。

26742 必效散

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】生地黄 生地胆草 生龙胆(并研

绞取汁，三停共一盞，同浸横纹甘草末一两，候汁尽阴干）蒺藜（紫叶肥者，去茎阴干）半两 龙脑一钱（研） 牛黄半钱（研）

【用法】上药甘草、蒺藜为末，与龙脑、牛黄合研。每服二钱匕，研林檎绞取汁，新汲水相和调服。如心烦躁热，及欲发黄，即别入龙脑少许，和鸡子清调服。小儿服一钱或半钱匕。

【主治】伤寒热盛，狂躁闷乱，欲发黄及发疹，热毒气盛，口干烦渴。

26743 必效散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】鲫鱼一条（去肠，入头发不拘多少，烧为灰）

【用法】上为散。先用葱洗疮口，次以药敷之。

【主治】下注疮烂肉陷。

26744 必效散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【异名】熏痔必效散（《普济方》卷二九八）。

【组成】黄牛角四寸（细锉） 鯪鲤甲二两（细锉） 铅丹一两（研） 乳香一分（研）

【用法】上为末，拌匀。每用三五钱匕，如烧香法，安盆器内，用板盖上，开窍坐，就疮熏之，烟尽即止。

【主治】痔瘻久不愈者。

26745 必效散

【方源】《产乳备要》。

【组成】棕皮（烧） 木贼（去节，烧存性）各二两 麝香一钱（研）

【用法】上为末。每服二钱，空心酒调下。

【主治】妇人月水不调，及崩漏不止。

26746 必效散

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】川乌头一两（生） 天南星半两（生）

【用法】上为末。每服二钱，萝卜八块，如

母指大，以水煮熟，去滓，食后嚼服。

【主治】五劳七伤，劳役肌瘦，不思饮食，喘嗽不已。

26747 必效散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】立应散（《医方类聚》卷一六六引《吴氏集验方》）。

【组成】槟榔（鸡心者）不拘多少

【用法】上为细末。每服二钱，用东引石榴根煎汤调下。于平旦盥漱讫，先食炙肥肉数片，然后服药。若于上旬服药尤佳，盖虫头向上故也。

【主治】久下寸白虫，日渐羸瘦。

【宜忌】忌食牛肉、白酒。

26748 必效散

《易简方》。为《杨氏家藏方》卷二“必胜散”之异名。见该条。

26749 必效散

【方源】方出《百一》卷十四，名见《普济方》卷三十八。

【异名】霜柿散（《普济方》卷三十八）。

【组成】干柿不拘多少（烧存性）

【用法】上为末。每服二钱，空心米饮调下。一方用糊丸。

【主治】肠风脏毒。

【临床举例】肠风曾茂昭通判之子，年十余岁时，曾苦此。凡治肠风药，如地榆之类，遍服无效，因阅书见此方用之，一服而愈。是干柿烧灰者，曾与予合肥同官亲言之云尔。

26750 必效散

【方源】《直指》卷十六。

【组成】葶苈子（隔纸炒） 龙胆草 山梔仁 山茵陈 黄芩各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，新水煎服。

【主治】黄疸。

26751 必效散

【方源】《医方类聚》卷八十一引《澹寮方》。

【组成】附子一只（生，去皮，切作数片，用生姜自然汁一大盞浸一宿，慢火炙干，再

浸再炙，候渗尽姜汁为度）高良姜各等分

【用法】上为末。腊茶调服。

【主治】气虚头疼，呕吐。

【宜忌】忌热物少时。

26752 必效散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】南硼砂二钱五分 轻粉一钱 麝香五分 斑蝥四十个（去头翅） 巴豆五个（去皮心膜） 白槟榔一个

【用法】上为极细末，取鸡子清二个去黄，调药匀却，倾在鸡子壳内，湿纸数重糊定，无令透气，坐饭甑内与饭一处蒸，饭熟取药，晒干，为极细末。用时相度虚实，虚人每服半钱，实人每服一钱，并用炒生姜酒下。五更初服药，至平明取下恶物，如觉小腹内疼痛，便用苘麻子烧灰入没药等分，同研细，用茶调下一钱，便入大肠。其取下恶物，如烂肉老鼠儿及新成卵内雀儿，是药之效。

【主治】久患瘰癧不效。

【宜忌】妇人有胎，不可服。

【临证举例】瘰癧《外科理例》：小水涩滞，或微痛，此病欲下也。进益元散一服，其毒即下。斑蝥、巴豆似为峻利，然巴豆能解斑蝥之毒，用者勿畏。尝遇富商项有痼痕颇大，询之，彼云，因怒而致，困苦二年，百法不应，方与药一服，即退二三，再服顿退，四服而平，旬日而痊。以重礼求之，乃是必效散。

26753 必效散

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】盐豉（炒干）

【用法】上为细末。每用油调涂之。

【主治】蜘蛛咬着疼痛。

26754 必效散

【方源】《卫生宝鉴》。

【组成】白矾 大黄各等分

【用法】上为细末。临卧干贴。涎涎尽，温水漱之。

【主治】口糜。

26755 必效散

【方源】《普济方》卷七十六。

【组成】苍术 木贼（去节）各二两 青盐一钱 川椒一两（童便浸一宿）

【用法】上为末。每服一大钱，空心以温酒或沸汤调下。

【主治】冷泪不止。

26756 必效散

《普济方》卷一六三。为原书同卷“独圣散”之异名。见该条。

26757 必效散

【方源】《普济方》卷一九九。

【组成】青橘皮（去白） 陈橘皮（去白） 常山 神曲 地龙（去土） 槟榔 括楼 甘草（炙） 秦艽各等分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盞半，煎至七分，通口服。

【主治】山嵐瘴症。

【宜忌】忌生冷、油腻、猪、犬、鱼、腥、羊肉。

26758 必效散

【方源】《医统》卷十八。

【组成】葶苈（隔纸炒） 草龙胆 山梔子 茵陈 枳实 甘草各五分

【用法】水二盞，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】黄疸。

26759 必效散

【方源】《医统》卷八十。

【组成】斑蝥（去头足，面炒）二十一个 荆芥穗 黑牵牛 直僵蚕（炒去丝嘴）

【用法】上为细末。每服一钱，五更好酒调下。日中当利，恶物如不下，次日五更再进一服；更或不下，第三日五更先吃秫米粥一碗，次服此药，其毒决下；如小便痛涩，以葱茶解之，或煎木通灯心汤利之。

【主治】瘰癧。

【备考】方中荆芥穗、黑牵牛、直僵蚕用量原缺。

26760 必效散

【方源】《古今医鉴》卷十五引黄宾江方。

【组成】川槿皮四两 斑蝥一钱 半夏五钱 木鳖子(去壳)五钱 槟榔五钱 雄黄三钱 白砒一钱

【用法】上切成片,另将雄、砒细研,共合一处。用井水一碗,河水一碗浸,晒三日,露三夜,将药水用鹅翎扫疥上,百发百中。

【主治】风湿癬疮,并年久顽癬。

26761 必效散

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归 生地黄(酒洗) 赤茯苓(去皮) 滑石 牛膝(去芦) 山梔 麦门冬(去心) 枳壳 黄柏(酒炒) 知母(酒炒) 扁蓄 木通各等分 甘草减(生)

【用法】上锉一剂,灯草一团,水煎,空心服。

【主治】淋症。

【加减】血淋,加菖蒲、茅根汁;膏淋,加草薢;气淋,加青皮;劳淋,加人参;热淋,加黄连;肉淋,加连翘;石淋,加石韦;尿淋,加车前;死血淋,加桃仁、牡丹皮、玄胡索、琥珀、黄柏、知母;老人气虚作淋,加人参、黄耆、升麻少许,去黄柏、知母、滑石、扁蓄。

26762 必效散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】麦冬三两(去心,糯米拌蒸) 乌梅肉五两

【用法】上为散。每服五钱,米饮下。

【主治】痢后大渴,脉虚数者。

【方论选录】产妇痢后亡阴,津液枯涸不能上敷而大渴引饮,难以稍忍焉。麦冬生津润液燥,以滋金水之上流,乌梅敛液收津,以固津液之下亡。为散,米饮下,务使胃气调和,则津液上敷而大渴自解,何引饮不已之有哉。

26763 必效散

【方源】《金鉴》卷七十四。

【组成】川槿皮四两 海桐皮 大黄各二两 百药煎一两四钱 巴豆(去油)一钱五

分 斑蝥一个(全用) 雄黄 轻粉各四钱

【用法】上为细末。用阴阳水调药,将癬抓损,薄敷。药干必待自落。

【功用】《北京市中药成方选》:清毒杀虫,祛湿止痒。

【主治】诸久年顽癬。

【宜忌】《北京市中药成方选》:忌入口。

26764 必效散

【方源】《梅氏验方新编》第七集。

【组成】芥穗 防风 连翘 防己 银花 槐花 花粉 皂刺 白芷 木通 木瓜 白鲜皮 大枫藤 制苍术各一钱 甘草 番白草各五分 大黄二钱 土茯苓四两

【用法】酒为引,服后静卧以取汗下。

【主治】梅疮高肿稠密,湿热盛,形气实者。

26765 必效煎

【方源】《仙拈集》卷一引《斗门方》。

【组成】干姜四钱 粟壳(蜜炙)八钱 地榆 甘草各三钱 白芍(炒)三钱 黑豆(炒)一两半

【用法】分四剂,水一钟半,煎七分,食远服。

【主治】痢疾,脓血日夜不息,里急后重,及噤口恶痢,百药不效者。

26766 必效膏

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】油一斤 铅丹(研)六两 麝香(研)一钱 膩粉(研) 蜡各三分 枫香脂一两半 丹砂(细研)半两 盐半两 白芷(锉) 乳香(研) 当归(炙、锉) 桂(去粗皮,锉) 芎藭(锉) 蒿本(去苗土,锉) 细辛(去苗叶,锉) 密陀僧(研)各一两

【用法】先将油煎令沸,次下白芷等六味锉药,候煎白芷赤黑色漉出,下蜡枫香脂,候熔尽,以绵滤去滓,下铅丹、密陀僧、乳香,以柳篦搅煎,候变黑色,滴水中成珠子,即下盐、丹砂、麝香粉等搅匀,倾于瓷盆内,安净地上一宿,除火毒。用故帛上摊贴,一日

一次，以愈为度。

【主治】乳石痈疽，发背疮毒，止痛吮脓。

26767 必消散

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】五木大杨树上木耳菌

【用法】拭净，净瓦上炙焦存性，为细末。每服三钱，砂糖调陈酒送下。即消。

【主治】妇人乳肿，不论内外。

26768 必救丹

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】赤足蜈蚣一条（去头足） 蝎梢七个 生犀尖（锉末）一钱 染坏半钱 朱砂半钱（研，水飞） 麝香一字

【用法】上为细末。煎猪脂油为丸，如黍米大。每服三五丸，用大金散送下，不拘时候。

【主治】阴痛，慢惊痲疯。

26769 必捷丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】斑蝥一分（去头翅足，糯米炒） 薄荷叶三分

【用法】上为细末。乌鸡子汁为丸，如梧桐子大。空心服二丸，午时后服三丸，临卧服四丸，次日空心服五丸，茶清送下。脐下痛，小便中取下恶物是效。如小便涩，吃葱茶少许。

【主治】瘰癧多年不效者。

26770 必捷散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】白花蛇（酒浸三宿，去皮骨，炙）二两 蕤藜子（炒，去角） 蔓荆实（酒浸一宿，焙）各一两 白附子五枚（酒浸一宿，切作片子，炒干） 草澄茄二十枚

【用法】上为散。每服一钱匕，食后用薄荷自然汁和酒半盏调下。

【主治】脑风头痛甚者。

【宜忌】《奇效良方》：忌发风之物。

26771 必效饮子

【方源】《传信适用方》卷二引王景明方。

【组成】罂粟壳二钱半 木香二钱半 甘草二钱（炙） 地榆二钱

【用法】上为末。每服二钱，米饮调下。

【主治】赤白痢。

26772 必效饮子

【方源】《百一》卷六。

【组成】白术 甘草（蜜炙） 罂粟壳（蜜炙）各等分

【用法】上为粗末。每服三大钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】久新赤白痢。

【宜忌】忌油腻之物。

【加减】白痢，加白术；赤痢，加甘草。

26773 必用四圣散

【方源】《医方大成》卷十引《简易方》。

【组成】紫草茸 木通（去节） 甘草 枳壳（去白 麸炒）各等分

【用法】上哎咀。每服二钱，水一盏，煎服。

【主治】小儿疮疹出不快透，及倒压一切恶候。

【备考】本方方名，《袖珍》引作“必用四神散”。

26774 必用四神散

《袖珍》卷四。即《医学大成》卷十引《简易方》“必用四圣散”。见该条。

26775 必效四物汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】四物汤加蒲黄

【用法】水煎服。

【主治】产后衄血。

头

26776 头风散

《千金》卷十三。为《金匱》卷上“头风摩散”之异名。见该条。

26777 头瓶糝

【方源】《徐评外科正宗》卷二。

【组成】丁香一钱 血竭三钱 白芷三钱 儿茶五钱 草乌五钱 山奈五钱 甘松五钱 草茛一钱 乳香一钱（去油） 没药一钱（去油）

【用法】上药各为细末，再称准，共研极匀，

瓷瓶收贮，勿令泄气。肿疡初起，掺膏上贴之，未成者消，已成者溃。

【主治】溃疡。

26778 头痛丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】乳香(炙)二两 白芷二两 柴胡二两 没药(炙)二两 川芎二两 黄连一两五钱 黄芩一两五钱 防风一两五钱 薄荷一两五钱 菊花一两五钱 生栀子二两五钱 羌活一两 甘草五钱(共十三味，计二十一两五钱)

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重二钱五分。每服二丸，温开水送下，一日二次。

【功用】活血散风，清热止痛。

【主治】伤风感冒，风热上炎，偏正头痛，眩晕目赤。

26779 头瘟汤

【方源】《类证治裁》卷一。

【组成】川芎一钱 荆 防 桔各钱半 柴胡七分 黄芩 归尾各二钱

【主治】大头瘟。湿热伤颜，肿大如斗，赤瘟无头，或结核有根，令人多汗气蒸。初起憎寒壮热，体重，头面痛，目不能开，上喘，咽喉不利，甚则堵塞不能饮食，舌干口渴，恍惚不安。

26780 头风饼子

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】五倍子 全蝎 土狗各七分

【用法】上为末，醋糊作如钱大饼子。发时再用醋润透贴太阳穴上，炙热贴之。验甚。仍用帕子缚之，啜浓茶睡觉则愈。

【主治】头风。

26781 头风痛膏

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】青黛 决明子 黄连 黄芩 桑叶 归身 红花 细生地 防风 紫苏叶 川贝母(去心)各等分

【用法】除青黛外，为粗末，油煎，用朱砂十分之三，红丹十分之七，同青黛末收膏。青

布摊贴，再另用黄菊花晒干为细末，收贮，用时将菊花末少许，掺膏上贴之。左痛贴右太阳，右痛贴左太阳，两首痛俱贴。

【主治】头风痛。此病甚则害眼。

26782 头风摩散

【方源】《金匱》卷上。

【异名】头风散(《千金》卷十三)。

【组成】大附子一枚(泡) 盐各等分

【用法】上为散。沐了，以方寸匕，已摩疾上，令药力行。

【主治】①《金匱》：中风历节病。②《张氏医通》：大寒犯脑，头痛。

26783 头号化毒丹

【方源】《朱仁康临床经验集》引《章氏经验方》

【组成】红升丹(红粉)1.5克 水银3克 大枣肉10枚

【用法】先将大枣剥去核，在石臼内捣烂如泥，再加入红粉(研细)、水银再捣至极烂，以不见星为度。每日摘粟粒大小粒，开水送下。

【功用】清化解毒。

【主治】小儿胎毒，胎疮疮(婴儿湿疹)。

【宜忌】服药期间，忌吃花生、鸡蛋、鱼腥发物。

26784 头号虚痰丸

【方源】《朱仁康临床经验集》引《章氏经验方》。

【组成】斑蝥末30克 炮山甲250克(研末)

【用法】用糯米粽，捣烂成糯米浆，用糯米浆加药末捣和为丸，如绿豆大。每服一至二丸，开水送下。不可多服，不要嚼碎。

【功用】内消肿核。

【主治】痰核、瘰疬、阴疽、无名肿毒。

【宜忌】有泌尿系统病者禁服，服丸后如发生小便刺痛、尿闭或尿血等情况，应立即停服，并服生鸡蛋清可解。

半

26785 半丁丸

【方源】《活幼口议》卷十九。

【组成】半夏(半服者)半夏(汤洗七次,为末) 丁香一钱(重碾碎)

【用法】上将半夏末水搜作剂,包丁香,再以面裹煨令熟,去面为末,生姜自然汁为丸,如麻子大。每服三二十丸,淡生姜汤送下。

【主治】婴孩小儿风痰在膈,痰盛咳嗽,作热烦闷,神不安稳,睡眠不宁,可进饮食或欲饮食,食之即呕。

26786 半天丸

【方源】《医方类聚》卷二十三引《医林方》。

【组成】半夏二两 天南星一两 皂角(炙)二两 白附子 白矾各一两(生)

【用法】上为细末,生姜汁打面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后生姜汤送下。

【主治】风痰。

26787 半贝丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生半夏 生川贝各三钱

【用法】上为细末,姜汁捣匀为丸。每服三厘至五厘,生熟汤送下。

【主治】①《重订通俗伤寒论》:疟疾。②《饲鹤亭集方》:风痰暑湿疟疾,咳嗽多痰,饮食无味,痛眩。

26788 半贝散

【方源】《经验各种秘方辑要》引《格言联璧》。

【组成】真川贝母(去心)一两二钱 生半夏八钱

【用法】上为极细末,炒微黄色,候冷装入瓷瓶,将瓶口塞紧,勿令泄气。每服一分五厘,开水半酒杯,搀入姜汁三茶匙,于疟未来先一时辰,和药温服,迟服则不效,重者三服。此散端午日午时制尤妙。

【主治】疟疾。

【宜忌】愈后戒发物及鸡蛋、南瓜、芋艿等。

26789 半仙丸

《济阳纲目》卷一〇二。为《朱氏集验方》

卷十五引南岳魏夫人方“半夏丸”之异名。见该条。

26790 半白散

《产宝诸方》。为《圣济总录》卷一五九“半夏散”之异名。见该条。

26791 半瓜丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】半夏 瓜蒌仁各五两 贝母 桔梗各二两 枳壳一两半 知母一两

【用法】上为末,生姜汁浸,蒸饼糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,生姜汤送下。

【主治】痰嗽。

26792 半边散

【方源】《本草纲目》卷四十一引《普济方》。

【组成】芫花(醋浸,焙干) 大戟 甘遂 大黄各三钱 土狗七枚(五月内取会飞的)

【用法】上先以葱捣烂为饼,摊新瓦上,却将土狗安葱上焙干,去翅足嘴,每个剪作二片,分左右成对记之,再焙干为末,欲退左边肿,即以左边七片为末,入前药调服;右边依前四味末。每服二钱,入土狗末和匀,用淡竹叶、天门冬煎汤调,五更服。候左边退,至第四日服右边,如或未动,只以大黄三钱,煎至一半助之,如更不动,茶清助之。

【主治】水病。

26793 半字散

【方源】《医方类聚》卷八十二引《吴氏集验方》。

【组成】川乌一个(炮去皮尖) 草乌七个(炮去皮尖) 川芎半两 石膏一两(煨) 荆芥一两

【用法】上为末。每服半钱,好茶点下。

【主治】头痛。

【宜忌】忌鲑鱼。

26794 半苏丸

【方源】《赤水玄珠》卷十一。

【组成】半夏 紫苏叶各等分

【用法】上为末,加蛤粉、神曲、蜆壳灰各等分,为末,以桃仁泥五钱,瓜蒌瓢一枚为

丸。先服三拗汤三帖，却服此三十丸，临卧白汤送下。

【主治】夏月无汗成久嗽病。

【备考】本方原名半苏散，与剂型不符，据《医部全录》改。

26795 半杏丸

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】半夏 杏仁（去皮尖）各等分

【用法】上为末，生姜汁为丸，如绿豆大。每服一钱，姜汤送下。

【主治】小儿咳嗽。

26796 半两丸

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】巴豆（去皮） 大戟（锉碎）各半两

【用法】上药同入桃内，油炒焦黄，为细末，面糊为丸，如麻子大。每服三丸，乳食前、临卧米饮送下。

【主治】五积六聚。

26797 半角丸

【方源】《传家秘宝》卷下。

【组成】蛤蚧二对（涂酥炙） 人参 芸桔梗 知母 紫苏 猪牙皂角（酥炙） 甜葶苈（炒）各六分 鳖甲八分（酥炙） 槟榔 白前六分 柴胡八分 汉防己 杏仁（炒，去皮尖） 羚羊角（炒） 郁李仁（炒，去皮） 紫菀 猪苓各六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，食后煎糯米、人参汤送下，一日二三次。

【主治】肺劳嗽久患，咯吐脓血，及暴嗽，肺痿羸瘦，涎涕稠粘。

26798 半附汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】生附子 半夏各二钱半 生姜十片

【用法】水煎，空心服。

【主治】胃冷生痰，呕吐。

【备考】或加木香少许尤妙。

26799 半苓丸

【方源】《医学正传》卷六。

【组成】神曲 半夏 猪苓各等分

【用法】曲糊为丸服。

【主治】白浊。

【加减】虚劳者，用补阴药；胃弱者，兼用人参及升麻、柴胡升胃中之清气。

26800 半苓丸

《东医宝鉴·内景篇》卷一。即《本事》卷三“猪苓丸”。见该条。

26801 半苓汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】半夏五钱 茯苓块五钱 川连一钱 厚朴三钱 通草八钱（煎汤煮前药）

【用法】水十二杯，煮通草成八杯，再入余药煮成三杯，分三次服。

【主治】足太阴寒湿，痞结胸满，不饥不食。

【方论选录】半夏、茯苓培阳土，以吸阴土之湿；厚朴苦温以泻湿满；黄连苦以渗湿；重用通草以利水道，使邪有出路也。

26802 半金丹

【方源】《痧喉汇言》。

【组成】巴豆七粒（去壳，三生四熟） 明雄黄（皂子大许） 蝉肚郁金一枚

【用法】上为极细末。每服二分，茶调下。

【主治】缠喉风，急喉痹，牙关紧急，痰涎壅盛。

26803 半金散

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】乌蛇肉（酒浸，去皮骨，焙）一两 天麻一两 全蝎（去毒）一两（炒） 僵蚕（去丝嘴，炒）一两（为末） 朱砂半两（研飞） 龙脑一钱（研）

【用法】上为末，拌匀细。每服半钱，温汤调下，不拘时候。

【主治】心肺中风，昏困不省，心胸满闷，抽掣短气，汗出不休。

26804 半金散

【方源】《普济方》卷三六七。

【组成】南星（微炮）二钱 木香一钱 橘

皮一钱 全蝎二个(焙) 甘草(炒)半钱

【用法】上锉细。每服一钱，加生姜三片，慢火煎熟与之。

【主治】心肺中风。

【加减】虚冷者，加熟附子、川芎少许，生姜一钱。

26805 半夜散

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】未生毛小鼠(捣烂，搭在壁上风干，焙黄香，研细) 土鳖虫(灰) 钻粪虫(灰) 白占各五钱

【用法】掺之。

【主治】风癩。

26806 半夏丸

【方源】《普济方》卷一六五引《经效济世方》。

【组成】南星 半夏各四两

【用法】上为末，烂姜半斤研捣，锉半、星为丸，以楮叶裹缚却，于草中罨之，曲法候干，入去皮香附子四两为末，姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，食后生姜汤送下。

【主治】痰。

26807 半夏丸

《医统》卷二十四。即方出《丹溪心法》卷三，名见《医学正传》卷三“软石膏丸”。见该条。

26808 半桂汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】半夏 桂枝 甘草二钱 生姜五片

【用法】水一盏半，煎至七分，徐徐咽之。

【主治】少阴客寒下利，脉微弱而咽痛。

26809 半桃丸

《三因》卷十二。为《局方》卷六“半硫丸”之异名。见该条。

26810 半夏丸

【方源】方出《肘后方》卷一，名见《圣济总录》卷五十五。

【组成】半夏五分 细辛五分 干姜二分

人参三分 附子一分

【用法】上为末，苦酒为丸，如梧桐子大。每服五丸，酒送下，一日三次。

【主治】①《肘后方》：久患心常痛，不能饮食，头中疼重。②《圣济总录》：卒心痛。

26811 半夏丸

【方源】方出《外台》卷二十五引《肘后方》，名见《普济方》卷二一一。

【组成】半夏(洗) 乌头(炮) 甘草(炙)各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，饮送下，一日二次。

【主治】寒下，下利色白，食不消者。

【宜忌】《普济方》：忌猪、羊肉、海藻、菘菜、饧。

26812 半夏丸

【方源】方出《外台》卷八引《古今录验》，名见《普济方》卷二〇四。

【组成】半夏一分(削去皮，熬) 甘草(炙) 远志(去心)各四分 干姜 桂心 细辛 椒(去目，炒出汗) 附子(炮)各二分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，先饮酒，用梗米饮送下，一日三次。稍增至十丸。

【主治】胸痛达背，膈中烦满，结气忧愁，饮食不下。

【宜忌】忌海藻、菘菜、羊肉、饧、猪肉、冷水、生葱、生菜。

26813 半夏丸

【方源】方出《千金》卷五，名见《医部全录》卷四二二。

【组成】半夏二斤(去皮，河水洗六七度，完用) 白矾一斤(末之) 丁香 甘草 草豆蔻 川升麻 缩砂各四两(粗捣)

【用法】上七味，以好酒一斗与半夏拌，和匀同浸，春、冬三七日，夏、秋七日，密封口，日足取出，用冷水急洗，风吹干。每服一粒，嚼破，用姜汤送下，或干吃。候六十日干，方

得服。

【主治】大人、小儿咳逆上气。

26814 半夏丸

【方源】《千金》卷五。

【组成】半夏随多少(微火炮)

【用法】上为末，酒和为丸，如粟米粒大。每服五丸，一日三次。

【主治】小儿暴腹满欲死。

【方论选录】《千金方衍义》：半夏一味专涤顽痰，火炮酒服治腹痛，全在炮治得宜。

26815 半夏丸

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】半夏一两(汤浸七遍去滑，微炒)白矾二两(烧令汁尽)干姜半两(炮裂，锉)

【用法】上为末，都研令匀，用蒸饼为丸，如梧桐子大。每服十丸，煎生姜汤送下，不拘时候。

【主治】风痰脾胃冷气，吐逆不止，食饮不下。

26816 半夏丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】半夏半两 天南星半两 干蝎半两 乌头半两(去皮脐)

【用法】上药并生为末，以黑豆面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，以温生姜酒送下，不拘时候。

【主治】急风吐涎，四肢拘急，腰背强硬。

26817 半夏丸

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑)白矾二两(烧令汁尽)朱砂三两(细研，水飞过)黄丹三两

【用法】上为末，都研令匀，以粟米饭为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以人参汤送下，不拘食前后。

【主治】积痰不散，上冲心脏，变为风痫，不问长幼。

26818 半夏丸

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】半夏二分(汤洗七遍去滑)河黎勒皮一两 款冬花三分 桂心半两 附子一两(炮裂，去皮脐)紫菀一两(去苗土)人参三分(去芦头)枳壳一两(麸炒微黄，去瓤)陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)甘草三分(炙微赤，锉)杏仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研如膏)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以生姜汤送下，不拘时候。

【主治】咳嗽痰滞，呕吐不下食。

26819 半夏丸

《圣惠》卷四十九。为《千金》卷十一“狼毒丸”之异名。见该条。

26820 半夏丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑)陈橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙)薯蓣一两 干姜半两(炮裂，锉)甘草一分(炙微赤，锉)黄丹一两(炒令黄)

【用法】上为末，入黄丹同研令匀，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前煎人参生姜汤送下。

【主治】膈气，痰结气逆，不能下食。

26821 半夏丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏一两(汤浸七遍去滑)木香一两 枳壳二两(麸炒微黄，去瓤)羚羊角屑一两 桂心一两半

【用法】上为末，以生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎木瓜汤送下，不拘时候。

【主治】噎，心膈短气，烦闷不能下食。

26822 半夏丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】半夏二两(汤洗七遍去滑)干姜一两(炮裂，锉)白矾一两(烧令汁尽)草豆蔻一两(去皮)

【用法】上为末，以生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，以姜、枣汤送下，一

日三次，不拘时候。

【主治】痰结实不消，见食欲呕。

26823 半夏丸

《圣惠》卷七十五。为方出《医心方》卷十二引《深师方》，名见原书同卷引《产经》“人参丸”之异名。见该条。

26824 半夏丸

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】皂荚丸（《普济方》卷三六二）。

【组成】半夏半分（生姜汤洗七遍去滑）皂荚子仁半两

【用法】上为末，用生姜汁为丸，如麻子大。每服三丸，以温水送下，不拘时候。

【主治】小儿脾热，乳食不下，胸膈多涎。

26825 半夏丸

【方源】《医方类聚》卷一〇三引《简要济众方》。

【组成】半夏二两（汤浸去滑，焙干）丁香半两 干姜一分（炮裂）

【用法】上为末，以生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，煎木瓜盐汤送下，不拘时候。

【主治】①《医方类聚》引《简要济众方》：上焦冷气，吞酸吐沫，呕逆。②《圣济总录》：不思饮食。

26826 半夏丸

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】半夏（汤洗去滑）人参 白茯苓 麦门冬（去心） 酸枣仁（微炒） 甘菊花 各一两 朱砂三分（研入） 龙脑一分（研入）

【用法】上药除别研药外，同杵罗为末，入研了药，再研和匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，乳香汤嚼破；薄荷汤送下亦得。

【主治】肝实热上攻，头目昏眩，风痰。

26827 半夏丸

【方源】《医方类聚》卷一一七引《神巧万全方》。

【组成】半夏三分 诃黎勒皮 紫菀 附

子 枳壳 杏仁 黄耆 陈橘皮（去瓤） 各一两 肉桂半两 人参 甘草（炙赤） 款冬花各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。

【主治】脾嗽，痰滞呕吐，不下食。

26828 半夏丸

【方源】方出《证类本草》卷八引杨文蔚方，名见《御药院方》卷五。

【组成】栝楼（肥实大者，割开，子洗净，捶破，括皮细切，焙干） 半夏四十九个（汤洗十遍，捶破，焙干）

【用法】上为末，用洗栝楼熟水并瓤同熬成膏，研细为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。

【功用】利胸膈。

【主治】痰嗽。

26829 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】半夏（汤洗去滑，生为末）五两 白矾（生为末）二两 丹砂（研） 铅丹（研） 各一两

【用法】上为末，以粟米饭为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜汤送下。

【主治】风痼痰盛癱痲，口吐涎沫。

26830 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】半夏（汤洗七遍，焙） 伏龙肝各一两 白矾（煨令汁枯） 铅丹（研） 各三分

【用法】上为末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，生姜、橘皮汤送下。

【主治】胃反，呕逆不下食。

26831 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】半夏（用生姜同捣烂作饼子阴干）二两 山芋一两 矾石（飞过）二两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。

每服十丸至二十丸，食后、临卧生姜汤送下。

【主治】上膈痰滞，吞酸吐沫，涕唾稠粘，胸膈不利。

26832 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】半夏（汤洗七遍去滑，捣罗为末，用生姜自然汁和作饼，焙干）三两 前胡（去芦头）一两 赤茯苓（去黑皮） 槟榔（锉碎） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 诃黎勒皮 枳壳（去瓢，麸炒） 人参 桔梗（炒） 五味子各半两 附子（炮裂，去皮脐）一两

【用法】上为末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食后温生姜汤送下。

【主治】肾脏壅塞，唾液不休，心胸痞闷。

26833 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】半夏（汤洗七遍去滑） 桔梗各二两 桂（去粗皮）一两半 木香 枳壳（去瓢，麸炒）各一两

【用法】上为末，生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，木瓜汤送下。

【主治】心胸噎塞壅闷，食不下。

26834 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】半夏（汤洗七遍，焙）五两 皂荚五挺（去皮子，捶碎，水一升煮，焙） 生姜（切，焙）五两

【用法】上为末，入生姜汁，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后炮皂荚汤送下。

【主治】膈痰结实，胸中痞闷，咳嗽喘急。

26835 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】半夏六两（去脐，浆水五升、生姜半斤薄切，甘草、桑白皮一两，锉，银石铫内慢火煮一复时，只取半夏，余药不用） 郁李仁一两（去皮尖，焙） 青橘皮（汤浸去白，焙） 木香 槟榔（锉）各一分

【用法】上为末，面糊为丸，如豌豆大。每服十丸，稍加至二十丸，食后、临卧淡生姜汤送下。

【功用】化痰涎，止咳嗽。

【主治】胸膈热壅。

26836 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】半夏曲（炒）二两 白茯苓（去黑皮）一两 干姜（炮） 丁香 矾石（熬令汁枯）各半两

【用法】上为细末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温米饮送下，一日三次。

【主治】肺胃有寒，咳嗽呕吐。

26837 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】半夏（汤洗去滑，生姜汁制，焙干） 芎藭各半两 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）一分 附子（炮裂，去皮脐） 贝母（去心，微炒） 桑根白皮（锉碎，炒） 款冬花（去枝梗，焙） 细辛（去苗叶）各半两 紫菀（去苗土，焙）一两 干姜（炮裂）半两 钟乳（研）一两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，研细）半两

【用法】上药先将前十味捣罗为细末，与钟乳、杏仁同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸至五丸，粥饮送下，一日三次，不拘时候。

【主治】上气胸满，昼夜不得卧。

26838 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】半夏（汤浸去滑，生姜汁制，切，焙） 紫菀（去苗土） 桑根白皮（锉）各一两 款冬花 射干 陈橘皮（汤浸去白，焙） 百部 五味子各三分 细辛（去苗叶）半两 赤茯苓（去黑皮） 贝母（炒，去心）各三分 皂荚（酥炙黄，去皮子）三分 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，食后煎灯心、生姜、枣汤送下，一日二次。

【主治】上气咳嗽，喉中作声，坐卧不得。

26839 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑，晒干)二两

【用法】上为末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前生姜汤送下，一日三次。

【主治】风湿脚气，痰壅头痛。

26840 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑，麸炒)一两 牵牛子四两(一半生，一半炒) 青橘皮(汤浸去白，焙) 木通(锉)各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，夜卧时淡生姜汤送下。

【功用】疏风转气，下痰。

【主治】大便不通。

26841 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】半夏(汤浸去滑七遍)一两 人参二两 枳实(去瓢，麸炒)半两 诃黎勒(煨，去核)三分

【用法】上为末，用生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜、紫苏熟水送下，一日三次，不拘时候。

【主治】产后短气。

26842 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】半夏(生姜汁洗去滑，晒干)一分

【用法】上为末，用酒面糊为丸，如黍米大。一月及百日儿，每服三丸，用薄荷汤送下；半年至一岁儿，每服五丸，一日三五次。

【主治】腹中卒痛，啼呼闷绝。

26843 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】半夏七枚(圆大者，汤洗七遍，切。生姜汁浸一宿，焙) 定粉(研) 白矾(烧令汁尽)各一钱

【用法】上为末，面糊为丸，如麻子大。每服三丸至五丸，食后浓煎白茅根汤送下。

【主治】小儿痰嗽。

26844 半夏丸

《圣济总录》卷一七五。为《局方》卷十“辰砂半夏丸”之异名。见该条。

26845 半夏丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】半夏二两(汤洗七遍，入猪苓四两，锉，同炒令猪苓紫色，去猪苓，用半夏)

【用法】上为末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心温粥饮送下。

【功用】除痰，利胸膈。

【主治】梦泄。

26846 半夏丸

【方源】《幼幼新书》卷十六引丁时发方。

【组成】大萝卜一个 半夏半两 朱砂雄黄各一钱

【用法】大萝卜一个开小窍成罐，入半夏在内，好醋煮透赤色，取出，细研萝卜、半夏如泥，入别研朱砂、雄黄各一钱为丸，如绿豆大。每服五七丸至十丸，生姜汤送下。

【主治】痰鸣涎响，咳嗽喘逆。

26847 半夏丸

【方源】《幼幼新书》卷十六引丁时发方。

【组成】半夏 南星(皂角煮)各一两 白矾 川乌头(炮)各一分

【用法】上为末，生姜自然汁为丸，如绿豆大。每服十丸，生姜汤送下。

【主治】久嗽，痰吐，头疼。

26848 半夏丸

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】藿香叶 白薇 白术 人参各一两 半夏一两 干姜 甘草各一分 丁香一钱

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以沸汤煮三五沸，用人参汤送下，不拘时候。

【主治】妇人阻病，心中愤闷，恶闻食臭，食则呕逆，息堕少力，头眩嗜卧。

26849 半夏丸

【方源】《保命集》卷下。

【组成】半夏一两(汤洗,切) 雄黄(研)三钱

【用法】上为细末,生姜汁浸,蒸饼为丸,如梧桐子大。每服三十丸,生姜汤送下。小儿丸如黍米大。

【主治】因伤风而痰作喘逆,兀兀欲吐,恶心欲倒。

【加减】已吐,加槟榔三钱。

26850 半夏丸

【方源】《普济方》卷四十六引《十便良方》。

【组成】半夏四两(以醋一升煮,候醋干为度) 甘草一两

【用法】上为细末,姜汁煮糊为丸。每服四十丸,以米汤送下,不拘时候。

【主治】头风吐痰。

26851 半夏丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】天南星 半夏各四两

【用法】上为细末,生姜半斤,研细拌作大丸子,以楮叶裹缚于草中,毫如毫面之状,候干入橘皮、香附子四两,并为末,姜汁煮神曲糊为丸,如梧桐子大。每服三四十丸,食后生姜汤送下。

【主治】痰。

26852 半夏丸

《妇人良方》卷七。为《外台》卷六引许仁则方“半夏二味丸”之异名。见该条。

26853 半夏丸

【方源】《济生》卷二。

【组成】瓜蒌子(去壳别研) 半夏(汤泡七次,焙,取末)各一两

【用法】上为末,和匀,生姜自然汁打面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后用生姜汤送下。

【主治】肺脏蕴热,痰嗽,胸膈塞满。

【备考】本方方名,《医统》引作“瓜蒌半夏丸”。

26854 半夏丸

【方源】《直指》卷七。

【组成】圆白半夏 老生姜各等分(捣如泥,焙干)

【用法】上为末,煮姜汁糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,生姜汤送下。

【功用】消下痰涎。

26855 半夏丸

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】圆白半夏(刮净,捶扁,以生姜汁调和飞白面作软饼,包拌半夏,慢火炙令色黄,去面,取半夏为末)

【用法】上为末,米糊为丸,如绿豆大,晒干。每服三四十丸,温热水送下。

【功用】消宿痰。

【主治】吐血下血,崩中带下,喘急痰呕,中满虚肿。

26856 半夏丸

【方源】《朱氏集验方》卷十五引南岳魏夫人方。

【异名】半仙丸(《济阳纲目》卷一〇二)。

【组成】半夏一两

【用法】上为末,水为丸,如豆大。纳鼻孔中。

【主治】五绝:自缢、墙压、溺水、魇魅、产乳。

26857 半夏丸

【方源】《局方》(续添诸局经验秘方)卷四。

【组成】白矾(枯过)十五两 半夏(汤洗去滑,姜汁霉一宿)三斤

【用法】上为细末,生姜自然汁为丸,如梧桐子大。每服二十丸,加至三十丸,食后、临卧时生姜汤送下。

【主治】肺气不调,咳嗽喘满,痰涎壅塞,心下坚满,短气烦闷,及风壅痰实,头目昏眩,咽膈不利,呕吐恶心,神思昏愤,心忪而热,涕唾稠粘。

【备考】本方方名,《普济方》引作“止嗽丸”。

26858 半夏丸

【方源】《活幼心书》卷二。

【组成】半夏(生用)二两 赤茯苓(去皮) 枳壳(同土制)各一两 风化朴消二钱半

【用法】上药前三味锉，焙为末，入乳钵，同朴消杵匀，用生姜自然汁煮糯米粉糊为丸，如绿豆大。每服三十九至五十丸，食后、临睡以淡姜汤送下。儿小者，丸如粟米大。

【主治】痰证，惊搐后风涎潮作。

26859 半夏丸

【方源】《得效》卷十一。

【组成】半夏五两 白矾(枯过)一两二钱半 人参一两

【用法】上为末，生姜自然汁糊为丸，如粟米大。每服二十丸，食后、临卧生姜汤送下。

【主治】风壅痰盛，咽膈不利。

26860 半夏丸

《丹溪心法》卷三。为《本事》卷三“猪苓丸”之异名。见该条。

26861 半夏丸

《普济方》卷一六四。即原书同卷引《卫生家宝》“半夏化痰丸”。见该条。

26862 半夏丸

《普济方》卷一六六。为《圣济总录》卷六十四“小半夏丸”之异名。见该条。

26863 半夏丸

《普济方》卷一八三。为《外台》卷十引《深师方》“钟乳丸”之异名。见该条。

26864 半夏丸

【方源】《普济方》卷二〇六。

【组成】半夏一两 干姜半两

【用法】上为末，白面糊为丸，如梧桐子大。以陈皮汤送下，不拘时候。

【主治】久吐不止。

26865 半夏丸

《普济方》卷二〇六。即原书同卷引《澹寮方》“胡椒丸”。见该条。

26866 半夏丸

【方源】《普济方》卷三二七。

【组成】半夏 赤石脂各一两六铢 蜀椒 干姜 吴茱萸 当归 桂心 丹参 白薇 防风各一两 藿芦半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心酒送下。不知，稍加，以知为度。

【主治】因与夫卧起，月经不去或卧湿冷地，及以冷水洗浴，或疮痍未愈，便合阴阳，及起早作劳，衣单蓆薄，寒从下起，至妇人怀中十二疾：经水不时、经来如清水、经水不通、不周时、生不乳、绝无子、阴阳减少、腹苦疼如刺、阴中寒、子门相引痛、经来冻如葵汁状、腰急痛。

26867 半夏丸

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】半夏二十一粒 蓖麻子二十一粒 巴豆(去油)五两 杏仁七枚 牛蒡子一钱 鸡内金七个 皂角子七粒

【用法】上为丸。生姜汤送下。

【主治】小儿胸腹。

26868 半夏丸

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】半夏四两(一两十八者，泡七次，姜制) 猪苓四两(去皮为末，用一半，将半夏银石器内，微火同炒，于地铺纸出火毒，去苓不用) 破故纸(酒浸干，同芝麻炒爆，去芝麻不用) 沉香各一两(与半夏，故纸为末)

【用法】上用无灰酒糊为丸，如梧桐子大，次日将所存一半苓末，银石器慢火炒干，依前法与苓炒，出火毒，同苓末收。每服五十丸，空心酒送下。

【功用】宽胸膈，化痰饮，降心火，补肾水真阴，进饮食，健行步，黑髭发，明耳目。

【主治】心火狂燥，肾水虚羸。

26869 半夏丸

【方源】《济阳纲目》卷二十四。

【组成】半夏不拘多少(香油炒)

【用法】上为末，粥为丸，如梧桐子大。每

服三五十丸，生姜汤送下。

【主治】湿痰喘急，亦治心痛。

26870 半夏丸

《简明医毅》卷三。为方出《丹溪心法》卷三，名见《医学正传》卷三“软石膏丸”之异名。见该条。

26871 半夏丸

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】生半夏一个

【用法】上为末，葱白半寸，捣和为丸。绵裹塞鼻，左乳病，塞右鼻；右乳病，塞左鼻。一夜即愈。

【主治】乳痈初起。

26872 半夏丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】大半夏一斤

【用法】泉水浸七日，逐日换水，搅动渐去其涎，晒干，再以芒消、文蛤、大黄各五钱，甘草、明矾各一两，姜四两，煎汤二碗，再入半夏，缓火煮干，晒燥为末，另研丁香五钱，茯苓末四两和匀，水法为丸。每服一钱五分，开水送下。

【主治】痰饮停滞，胸膈呕吐恶心，吞酸噎腐，不思饮食。

26873 半夏曲

【方源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】生半夏(漂净)一百六十两

【用法】上为细末，用麦粉拌和成曲。每次三钱，包煎服汤。

【主治】咳嗽痰涌，痰多作恶。

26874 半夏曲

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】白面三斤 苦杏仁六两 鲜辣蓼草八两 半夏(姜制)一斤 赤小豆六两 鲜青蒿八两 鲜苍耳草八两

【用法】以鲜草三味，煎水和成曲服。

【主治】咳嗽痰多，停食作呕。

26875 半夏汤

【方源】《灵枢》卷十。

【组成】秫米一升 治半夏五合

【用法】以流水千里以外者八升，扬之万遍，取其清五升，煮之，炊以苇薪火，沸，置秫米一升，治半夏五合，徐炊令竭为一升半，去其滓，饮汁一小杯，一日三次。稍益，以知为度。病新发者，覆杯则卧，汗出则已矣；久者，三饮而已矣。

【主治】痰湿内阻，胃气不和之失眠。

①《灵枢》：厥气客于五脏六腑，卫气不得入于阴，阴虚，目不瞑。②《张氏医通》：痰饮客于胆府，自汗不得眠。③《温病条辨》：温病愈后，嗽稀痰而不咳，彻夜不寐。

【方论选录】①《温病条辨》：半夏逐痰饮和胃，秫米秉燥金之气而成，故能补阳明燥气之不及，而渗其饮，饮退则胃和，寐可立至。②《古方选注》：今厥气客于脏腑，卫气独行于阳，阳跷气盛不得入于阴，阴虚目不瞑。用秫米汤者，以药石不能直入阳跷，故治胃以泄卫气也。半夏辛温，入胃经气分。秫，糯也，北地之膏粱茹粟也，甘酸入胃经血分。千里水扬之万遍，与甘澜水同义，取其轻扬，不助阴邪。炊以苇薪，武火也。火沸入药，仍徐炊令减。寓升降之法，升以半夏，从阳分通卫泄邪，降以秫米，入阴分通营补虚，阴阳通，卧立至，汗自出，故曰汗出则已矣。

【临证举例】不寐 《新中医》(1983, 11, 22):笔者以半夏秫米汤加味治疗失眠收到满意效果。因药房不备秫米，遵吴鞠通意，用薏苡仁代之。方药组成：法半夏、苡仁各60克。加减：心脾亏虚加党参，心阴不足加麦芽，痰热扰心加黄连，胃不和加神曲。

【备考】本方方名，《景岳全书》引作“秫米半夏汤”、《兰台轨范》引作“半夏秫米汤”。

26876 半夏汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】半夏桂枝甘草汤(《活人书》卷十七)、半夏桂枝汤(《直指》卷二十一)。

【组成】半夏(洗) 桂枝(去皮) 甘草(炙) 各等分

【用法】以水一升，煎七沸，纳散两方寸匕，

更煮三沸，下火令小冷，少少咽之。

【功用】《伤寒论讲义》：散寒通阳，涤痰开结。

【主治】少阴客寒咽痛，伏气咽痛。

①《伤寒论》：少阴病，咽中痛。②《活人书》：伏气之病，谓非时有暴寒中人，伏气于少阴经，始不觉病，旬日乃发，脉微弱，法先咽痛，似伤寒，非喉痹之病，次必下利者。③《伤寒来苏集》少阴病，咽中痛，恶寒呕逆。④《伤寒经注》：少阴病，为寒邪所客，痰涎壅塞，其人但咽痛而无燥渴、心烦、咽疮、不眠诸热证。

【方论选录】①《古方选注》：少阴之邪，逆于经脉，不得由枢而出，用半夏入阴散郁热，桂枝、甘草达肌表，则少阴之邪，由经脉而出肌表，悉从太阳开发，半夏治咽痛，可无劫液之虞。②《伤寒经注》：方中半夏辛温涤痰，桂枝辛热散寒，甘草甘平缓痛。

【临证举例】咽痛 《广东中医》(1962, 7, 36)：郑某某，女。身体素弱，有痰嗽宿疾，因娶媳期届，心力俱劳，引起恶寒、发热、头痛等证，咽喉疼痛尤剧，卧床不起，吞咽困难，脉象两寸浮缓，咽部颜色不变。治以《伤寒论》半夏汤原方，嘱徐徐咽下，服二剂；寒热、痰嗽、咽痛等顿消，继以扶正而愈。

26877 半夏汤

【方源】《外台》卷八引《范汪方》。

【组成】半夏一升(洗) 生姜一斤 橘皮四两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】心腹虚冷，游痰气上，胸胁满，不下食，呕逆，胸中冷。

【宜忌】忌羊肉、饴。

【加减】心中急及心痛，加桂枝四两；腹痛，加当归四两。

26878 半夏汤

【方源】《医心方》卷九引《范汪方》。

【组成】人参 茯苓各二两 生姜三两

白蜜五合 半夏三升(洗)

【用法】以蜜纳六升水中，烧之百过，以余药合投中煮得三升，分四服。

【主治】胸中乏气而呕欲死，及干呕。

【宜忌】忌冷食。

26879 半夏汤

【方源】《外台》卷七引《小品方》。

【组成】半夏一升(洗) 生姜一斤 桂心六两 吴茱萸三十颗

【用法】上切细。以水八升，煮取二升四合，绞去滓，分温五服。服别相去如人行六七里，进一服，快利为度。

【主治】胸膈不利，腹中胀，气急妨闷。

【宜忌】忌羊肉、饴、生葱、油腻。

26880 半夏汤

【方源】《千金》卷十六引《集验方》。

【组成】干姜 石膏各四两 桔梗 人参 桂心各二两 半夏一升 吴茱萸二升 小麦一升 甘草一两 赤小豆三十粒

【用法】上咬咀。以酒五升，水一斗煮，加大枣二十个，去滓，合煮取三升，分三服。

【主治】饮食辄噎。

26881 半夏汤

【方源】《外台》卷十引《古今录验》。

【组成】当归 防风 黄耆各二两 柴胡半斤 细辛 麻黄(去节) 人参各一两 杏仁五十粒 桂心三两 半夏一升(洗) 大枣二十枚 生姜五两 黄芩一两

【用法】上切。以水一斗，先煮麻黄一沸，去上沫，更入水一升及诸药，煮取五升，分为五服，日三夜二。

【主治】上气，五脏闭塞，不得饮食，胸中肋下支胀，乍去乍来，虚气结于心中，伏气住胃管，唇干口燥，肢体动摇，手足疼痛，梦寐若见人怖惧。

【宜忌】忌羊肉、生葱、生菜、饴等。

26882 半夏汤

【方源】《外台》卷十二引《延年秘录》。

【组成】半夏三两(洗) 生姜四两 桔梗

二两 吴茱萸二两 前胡三两 鳖甲三两
(炙) 枳实二两(炙) 人参一两 槟榔子
十四枚

【用法】上切。以水九升，煮取二升七合，
去滓，分温三服，如人行八九里久。

【主治】腹内左肋痠癖硬急气满，不能食，
胸背痛者。

【宜忌】忌猪羊肉、饴、苋菜等。

26883 半夏汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】半夏 麦门冬各五两 吴茱萸
当归 阿胶各三两 干姜一两 大枣十二个

【用法】上咬咀，以水九升，煮取三升，去
滓，加白蜜八合，微火上温，分四服，痢即
止。一方用乌雌鸡一只，煮汁以煎药。

【主治】妊娠九月，卒得下痢，腹满急急，
胎上冲心，腰背痛不可转侧，短气。

【方论选录】《千金方衍义》：今以孕母卒得
下痢，腹满急急，故用半夏以辟肠垢；姜、萸
以散腹满；归、胶以护荣血；冬、枣以行津
液，此皆恒用之品，其理易明。独是白蜜奥
旨崇古未讲，盖蜜能通肠，而利反用之，必
四服痢止肠垢去而正气复，胎自安矣。

26884 半夏汤

【方源】《千金》卷七。

【组成】半夏一升 桂心八两 干姜五两
甘草 人参 细辛 附子各二两 蜀椒二合

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分
为三服。初稍稍进，恐气冲上，格塞不得下，
小小服，通人气耳。

【主治】脚气上入腹胸，急上冲胸，气急欲
绝。

【方论选录】《千金方衍义》：脚气用补，乃
证治之变。此以病久正气伤惫，浊邪亢剧，不
得已而用四逆加人参汤，更加半夏、蜀椒、桂
心、细辛专散入腹冲胸浊阴之气为急，若兼
攻外毒，则救里势分不能克济专攻矣。观方
后服法，一以元气式微，难胜骤补；一以病
气悍逆，虑其格塞；一以药力峻温，恐其借

上，所以只宜小小服之，以通人气，非洗心
体会，不知凉人元气之奥。

26885 半夏汤

【方源】《千金》卷八。

【组成】半夏 生姜各一升 芍药 茯苓
桂心 橘皮 五味子各三两 附子五两 白
术四两 甘草二两 大枣三十个 大麻仁一
升(熬研为脂)

【用法】上咬咀。以水一斗二升，煮取三升，
去滓，下大麻脂，更上火一沸，分三服。

【功用】温中下气。

【主治】脾寒，言声忧惧，舌本卷缩，噤喜
无度，昏闷恍惚，胀满。

【方论选录】《千金方衍义》：合《近效》白
术附子汤、桂枝汤、二陈汤三方，但加麻仁、
五味以滋术、姜、半夏之燥，而风毒化脾寒
散矣。

26886 半夏汤

【方源】《千金》卷十。

【组成】半夏一升 生姜 黄芩 茵陈
当归各一两 前胡 枳实 甘草 大戟各二
两 茯苓 白术各三两

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分
三服。

【主治】酒癖荫胸，心胀满，骨肉沉重，逆
害饮食，乃至小便赤黄。

【方论选录】《千金方衍义》：茯苓丸治胸中
寒饮，故用蜀椒、干姜；半夏汤治胃中热痰，
故用黄芩、生姜。此方中前胡、甘草则前方
杏仁之意，此方中大戟即前方甘遂之意，其
余则两方并用，总皆健运中气之品，中气健
运虽根本，虚劳药无不应，酒疸无容留之患
矣。

26887 半夏汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】半夏 宿姜各八两 茯苓 白术
杏仁各三两 竹叶(切)一升 橘皮 芍药
各四两 大枣二十个。

【用法】上咬咀。以水一斗，煮取三升，分

四服。

【功用】承气，泄实热。

【主治】脾劳实，四肢不用，五脏乖反胀满，肩息，气急不安。

【方论选录】《千金方衍义》：脾劳津耗则浊气逆满不安，故以橘、半、苓、术涤痰，宿姜、大枣安中，杏仁、竹叶泄热，芍药收敛阴气。

26888 半夏汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】半夏 宿姜各八两 杏仁五两 细辛 橘皮各四两 麻黄一两 石膏七两 射干二两

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三服。须利，下芒消三两。

【功用】除喘。

【主治】肉实，坐安席不能动作，喘气。主脾病，热气所加关格。

【方论选录】《千金方衍义》：肉虚则宜温养，肉实则宜温散，实乃肌表之盛，故借越婢、青龙、射干麻黄等法，以麻、杏、细辛开泄肺气，姜、半、橘皮涤除胃湿，射干解散内结，石膏化导标热，里气通而表气松，实从外解之法也。

26889 半夏汤

【方源】《千金》卷十六。

【异名】小茯苓汤。

【组成】半夏一升 生姜一斤 茯苓 桂心各五两

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取二升半，分三服。

【主治】逆气，心中烦闷，气满呕吐，气上。

【加减】少气，加甘草三两。

【方论选录】《千金方衍义》：《金匱》小半夏加茯苓汤治心下痞，膈间有水气，眩悸。《千金》祖《胡洽方》加桂一味，上摄虚阳，下导水逆，岂但治呕吐而已哉。

【备考】本方方名，《普济方》引作“小半夏茯苓汤”。

26890 半夏汤

【方源】《千金》卷十六。

【组成】半夏一升 桂心四两 生姜八两

【用法】上㕮咀，以水七升，煮取二升，一服七合，一日三次。

【主治】胸满有气，心腹中冷。

【方论选录】《千金方衍义》：以姜、半开胸中痰满，桂心散腹中冷气。

26891 半夏汤

【方源】《千金》卷十六。

【组成】半夏一升 生姜八两 前胡四两 茯苓五两 甘草一两 黄芩 人参各二两 杏仁 枳实各三两 白术五两（一方用梔子仁二两）

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三服，胸中大热者，沉冷服之。

【主治】胸中客热，心下烦满，气上，大小便难。

【加减】大小便涩，加大黄三两。

【方论选录】《千金方衍义》：胸中客热，良由风热内陷所致，故以前胡、黄芩、杏仁开提于上，枳实、半夏、生姜疏豁于中，参、术、苓、甘护持正气，不使伤犯津液，自然胃气安和，二便如常矣。

26892 半夏汤

【方源】《千金》卷十七。

【异名】人参厚朴汤（《三因》卷八）。

【组成】半夏一升 生姜一斤 桂心四两 甘草 厚朴各二两 人参 橘皮 麦门冬各三两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取四升，分四服。

【主治】肺劳虚寒，心腹冷，气逆游气，胸胁气满，从胸达背痛，忧气往来，呕逆，饮食即吐，虚乏不足。

【加减】腹痛，加当归二两。

【方论选录】《千金方衍义》：劳乏而胸中阳气不布，浊阴上攻逆满，原非本虚之谓，故用参、桂、姜、半温中，麦冬、甘草滋肺，即

兼厚朴、橘皮开泄滞气，胸中阳气得人参、姜、桂守护之力，则浊阴不复上矣。

26893 半夏汤

【方源】《千金》卷十七。

【组成】半夏一升 生姜 桂心各五两 橘皮四两

【用法】上咬咀。以水七升，煮取三升，分四服，日三夜一。人强者，作三服。

【主治】逆气心腹满，气上胸胁痛，寒冷心腹痛，呕逆及吐不下食，忧气结聚；亦治霍乱后吐逆腹痛。

【方论选录】《千金方衍义》：此方专以破气为主，故于七气汤中除去人参、甘草，易入橘皮以破滞气。

26894 半夏汤

【方源】《千金》卷十八。

【组成】半夏 吴茱萸各三两 生姜六两 附子一枚

【用法】上咬咀。以水五升，煮取二升半，分三服。老少各半，一日三次。

【主治】痰饮，辟气，吞酸。

【方论选录】《千金方衍义》：此以曲直作酸，故用吴茱萸通达肝气以佐半夏、附子，仍用生姜开豁痰滞也。

26895 半夏汤

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】半夏一升(洗) 生姜五两 茯苓 厚朴各四两

【用法】上咬咀。以水六升，煮取三升，分三服。

【主治】妇人胸满，心下坚，咽中贴贴如有炙腐，咽之不下，吐之不出。

26896 半夏汤

【方源】《外台》卷八引《必效方》。

【组成】生姜四两 半夏一升(洗) 石膏四两(碎) 小麦一升(完用) 吴茱萸一升 赤小豆二十颗 大枣二十一个 人参 甘草(炙) 桔梗 桂心各二两

【用法】上切。以酒二升，水八升，煮取三

升，分三服。

【主治】噎。

【宜忌】忌猪羊肉、海藻、菰菜、饴、生葱等。

26897 半夏汤

【方源】方出《外台》卷十引《必效方》，名见《普济方》卷一八三。

【组成】半夏(洗) 茯苓各四两 橘皮 白术各三两 生姜五两 槟榔十颗

【用法】上切。以水一斗，渍一宿，煮取二升七合，分三服。更加甘草三两，人参二两，前胡二两，紫苏一两。

【主治】上气。

【宜忌】忌羊肉、桃李、雀肉、醋物。

26898 半夏汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】半夏一升(洗) 生姜一斤 桂心 六两 槟榔二两(末)

【用法】上切细。以水八升，煮取二升四合，绞去滓，分温五服，服别相去如人行六七里，进一服。快利为度。

【主治】胸胁不利，腹中胀，气急妨闷。

【宜忌】忌羊肉、饴、生葱、油腻。

26899 半夏汤

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《婴童方》。

【组成】半夏四分 黄芩 甘草各二分 干姜 橘皮 当归 人参各三分

【用法】水四升，煮取一升半，二百日儿服三合。

【主治】①《幼幼新书》引《婴童方》：心结坚实，饮不下，呕逆欲死，并霍乱后吐下不止，短气烦满。②《普济方》：小儿大吐下。

【加减】腹痛，加当归三分；呕逆甚，加陈皮三分。

26900 半夏汤

【方源】《幼幼新书》卷三十四引《婴童方》。

【组成】半夏八个 棘刺(西者)半升 麦

门冬半两 人参 甘草(炙)各一两

【用法】上切。水三升，煮一升，稍稍服。

【主治】咽喉不利乳。

26901 半夏汤

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】半夏三分(汤洗七遍去滑) 甘草半两(炙微赤，锉) 人参一两(去芦头) 厚朴二两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】脾胃痰滞，伤寒四日呕哕频频，头疼大渴。

26902 半夏汤

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】半夏三分(汤洗七遍去滑) 黄芩三分 干姜半两(炮裂，锉) 赤茯苓三分 人参三分(去芦头) 甘草半两(炙微赤，锉) 黄连一分(去须)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣二个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒三四日，不能卧，但欲起，胸中结热烦闷，脉洪大者。

26903 半夏汤

【方源】方出《圣惠》卷四十五，名见《圣济总录》卷八十二。

【组成】半夏(汤洗七遍，切，焙)二两 桂(去粗皮)一两半 槟榔(锉)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜半分(拍碎)，同煎至七分，去滓温服。以微利为度。

【主治】脚气冲心，烦闷气急，坐卧不安。

26904 半夏汤

【方源】《苏沈良方》卷五。

【组成】齐州半夏七枚(炮裂，四破之) 皂角(去皮，炙)一寸半 甘草一寸 生姜二指大

【用法】水一碗，煮去半，顿服。

【功用】①《苏沈良方》：急下涎。②《普济方》引《仁存方》：定喘下痰。

26905 半夏汤

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【组成】半夏一两(汤洗七遍) 葛根二两 桂心一两 麻黄(去节)一两 芍药一两 甘草半两(炙)

【用法】上为散。每服四钱，水一盞，加生姜、大枣，煎五分，热服。

【主治】太阳与阳明合病，不利但呕者。

26906 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】半夏(汤洗七遍，炒干)一两 桂(去粗皮)半两 甘草(炙)一分 槟榔(锉)三分 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 枳壳(去瓢，麸炒)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盞半，加生姜一分(拍碎)，同煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒后上气，咽喉不利，胸膈多痰，气逆。

26907 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】半夏(汤洗去滑，炒)一两 附子(炮裂，去皮脐)半两 款冬花 麻黄(去根节)各一两 干姜(炮)一分

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，加生姜半分(拍碎)，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒咳嗽，头痛。

26908 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】半夏(汤洗七遍，切，焙干) 芦根 淡竹茹 麦门冬(去心，焙) 人参 白茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一分(拍碎)，同煎至一盞，去滓温服，一日二次。

【主治】伤寒干呕，不下食。

26909 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】半夏一两(汤洗七遍，炒干) 白茯苓(去黑皮)一两 枳壳(去瓢，麸炒) 人参各半两 白术一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜一分(拍碎)，煎至七分，去滓温服，一日二次。

【主治】伤寒后胃气逆冷，食已呕哕，即欲吐。

26910 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】半夏(汤洗七遍，炒令干) 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 白术各三分 枳壳(去瓢，麸炒) 半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一分(拍碎)，同煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒痞满呕哕，心下悸，不能食。

26911 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】半夏(汤洗七遍，炒干) 木通(锉) 桃仁(汤浸，去皮尖双仁，炒) 附子(炮裂，去皮脐) 桂(去粗皮) 葛根 枳壳(去瓢，麸炒) 黄芩(去黑心) 各半两 羚羊角(镑) 一分 升麻一分半 麻黄(去根节) 三分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大(拍碎)，煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒发汗不解，变成狐惑，寒热无常，心中燥闷，不欲饮食。

26912 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】半夏三两(汤洗七遍，焙令干) 黄芩(去黑心) 百合各一两半 干姜(炮裂) 黄连(去须，微炒) 人参各一两 甘草(炙令赤，锉) 半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，

加生姜半分(拍碎)，大枣三个(擘破)，煎至七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】伤寒百合，兼下利不止，心中懊恼，坚而烦呕。

26913 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】半夏(汤洗七遍，焙干) 枳壳(去瓢，麸炒) 茯苓(去黑皮) 前胡(去芦头) 木通(锉) 各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜一分(拍碎)，同煎至半盞，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后脚气，心烦满闷，不下饮食，呕逆多痰。

26914 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】半夏(汤洗七遍，焙，切) 三两三分 人参一两三分 白茯苓(去黑皮) 二两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加生姜半分，切，煎至一盞，去滓温服，如人行八九里再服。

【主治】霍乱，心下坚满，妨闷。

26915 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】半夏(汤洗去滑七遍) 四两 厚朴(去粗皮，姜汁炙) 三两 赤茯苓(去黑皮) 二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一枣大(拍碎)，煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱，心下逆满，吐逆胃闷。

26916 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】半夏(汤洗七遍，焙) 二两 甘草(炙) 人参 前胡(去芦头) 桂(去粗皮) 各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一分(切)，豉五十粒，煎至七分，去

滓温服。

【主治】霍乱气厥，呕哕不得息。

26917 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑，切，焙)三两 人参二两 赤茯苓(去黑皮)四两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，加生姜一枣大(拍碎)，煎至六分，去滓温服。

【主治】霍乱，心下痞满。

26918 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑，切，焙) 人参各三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，加生姜三片，白蜜半匙，水一盞，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱，心下痞逆。

26919 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】半夏(为末，生姜汁和作饼，晒干) 酸枣仁各一两半 黄芩(去黑心)半两 远志(去心) 山梔子(去皮) 赤茯苓(去黑皮)各一两 秫米三大合

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜五片，生地黄半分(切)，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】胆实热，口苦，胃气满，食饮不下，咽干心胁痛，不能转侧，头目连缺盆皆痛。

26920 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑，焙)三两 生地黄五两 远志(去心) 赤茯苓(去黑皮)各二两 黄芩(去黑心)一两 酸枣仁(生用)一两半

【用法】上锉，如黑豆大。每服先以长流水三盞，加秫米半合，煎去一盞半，去米，扬之千遍，入药五钱匕，煎取八分，去滓温服。

【主治】胆热，精神不守，昏困多睡。

26921 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】半夏(汤洗七遍，切，焙) 枳实(去瓢，麸炒) 梔子(去皮) 赤茯苓(去黑皮) 芒消各三两 细辛(去苗叶)五两 白术 杏仁(去皮尖双仁，炒)各四两 淡竹叶(切)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生地黄、生姜各半分(切)，同煎至一盞，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾实热，面黄目赤，季肋痛满。

26922 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】半夏(白矾水煮，焙) 白扁豆各一两 人参 枳壳(去瓢，麸炒)各半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盞，加生姜三片，大枣一个(擘破)，同煎至七分，去滓温服。

【主治】脾胃虚冷，饮食不化，呕逆多痰。

26923 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】半夏(汤洗七遍，焙) 麦门冬(去心，焙) 人参 白茯苓(去黑皮) 桔梗(炒) 青橘皮(汤浸去白，焙) 柴胡(去苗) 防风(去叉) 前胡(去芦头) 细辛(去苗叶) 白芷 紫菀(去土) 款冬花各一两 厚朴(去粗皮，生姜汁炙) 枳壳(去瓢，麸炒)各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，加生姜三片，煎至一盞，去滓，稍热服。

【主治】胃热肠寒，冷热不匀，善食数饥，入腹胀痛。

26924 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】半夏(汤洗去滑七遍，焙)二两半 干姜(炮)二两 麻黄(去根节，煮去沫，焙) 枳实(去瓢，麸炒) 前胡(去芦头) 泽泻(锉) 杏仁(去皮尖双仁，

炒)各一两半 细辛(去苗叶)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,入竹叶少许,水一盞半,煎至八分,去滓温服,一日三次,不拘时候。

【主治】三焦咳,腹满不欲食。

26925 半夏汤

《圣济总录》卷五十四。为《博济》卷三“半夏煮散”之异名。见该条。

26926 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】半夏(汤洗七遍,晒干) 干姜(炮)各三分 槟榔(半生半炮,锉) 桂(去粗皮) 旋覆花(微炒) 高良姜各半两 丁香 木香各一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜一分(拍碎),同煎至八分,去滓温服。

【主治】痰饮在心,久不散,痛不可忍。

26927 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】半夏(汤洗去滑,焙) 甘草(炙,锉) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 桂(去粗皮)各半两 人参 白术各一两 大腹皮并子二枚(微煨)

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盞半,加生姜三片,煎至七分,去滓,空心温服,一日二次。

【主治】心腹卒胀痛,吐痰不止。

26928 半夏汤

《圣济总录》卷五十七。为《圣惠》卷四十一“半夏散”之异名。见该条。

26929 半夏汤

《圣济总录》卷六十。为《圣惠》卷五十五“小半夏散”之异名。见该条。

26930 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】半夏(汤洗七遍,切,焙)二两半 栝楼实一枚 薤白(切)二合

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水二盞,加生姜一分(切碎),煎至一盞,去滓温服,一日三次。

【主治】胸痹,心下坚痞,急痛彻背,短气烦闷,自汗出。

26931 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】半夏(汤洗七遍,焙)半两 赤茯苓(去黑皮) 人参 前胡(去苗)各三两 甘草(炙,锉)一分 桂(去粗皮)三分 柴胡(去苗)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水二盞,加生姜五片,大枣三个(擘破),用煎至一盞,去滓温服,不拘时候。

【主治】胸痹短气。

26932 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】半夏(汤洗七遍,焙) 人参 柴胡(去苗) 麦门冬(去心,焙)各三分 赤茯苓(去黑皮) 竹茹 桂(去粗皮) 芦根(锉)各半两 甘草(炙,锉)一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜五片,同煎至八分,去滓温服。

【主治】上焦壅热,食饮不下,呕吐,两胁痛。

26933 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】半夏(汤洗七遍)五两 白术三两 赤茯苓(去黑皮) 人参 桂(去粗皮) 甘草(炙) 附子(炮裂,去皮脐)各二两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盞半,加生姜半分(切),同煎取一盞,去滓温服,一日二次。

【主治】留饮不除,胸中痰冷。冷痰癖饮,胸膈痞满,呕逆不止。

26934 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】半夏(汤洗去滑,焙干为末,以姜汁和作曲,焙干) 杏仁(去皮尖双仁,麸炒,研)各二两 木香半两 桂(去粗皮) 陈橘皮(去白,炒)二两 甘草(炙,锉)一两 干姜(炮)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜三片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】消食，温胃，止逆。

【主治】冷痰。

26935 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】半夏(汤洗七遍，姜汁制，焙) 前胡(去芦头) 紫菀(去苗土) 各一两 人参 诃黎勒(煨，取皮) 杏仁(去皮尖双仁，炒) 各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕。水一盞，加生姜一枣大(拍碎)，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽呕吐，心胸满闷，不下饮食。

26936 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑，切，焙) 生姜 陈橘皮(汤浸，去瓢，焙) 各二两 桂(去粗皮) 一两

【用法】上咬咀，分作二剂。每剂水五盞，煎取二盞，去滓，分温二服，空腹饮之。

【主治】气逆，食则呕吐。

26937 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑) 一两 干桑叶六两 干姜(炮) 一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，加生姜五片，浆水一盞，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】上气，呕逆不食。

26938 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑，焙) 三分 白术 人参一两 桂(去粗皮) 甘草(炙，锉) 陈橘皮(汤浸，去白，焙) 各半两 厚朴(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟) 二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜五片，大枣三个(擘破)，煎至七分，

去滓温服，一日三次

【主治】上气呕吐，不能下食。

26939 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】半夏(陈者，汤洗去滑，焙干) 葶苈(纸上炒) 各一两 麦门冬(去心，焙干) 二两 芦根(锉碎) 三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加小麦净淘半合，生姜半枣大(切)，同煎至八分，去滓，空心、日午、夜卧各一服。

【主治】脾积，冷气痞结，胸满痰逆，四肢怠堕。

【加减】如病人瘦弱，加桂心、柏子仁各一两。

26940 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】半夏(汤洗七遍，焙干) 桑根白皮(炙，锉) 细辛(去苗叶) 前胡(去芦头) 各一两半 桔梗(炒) 甘草(炙，锉) 贝母(去心) 柴胡(去苗) 人参 诃黎勒(微煨，去核) 白术各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加大枣三个(擘破)，生姜半分(拍碎)，煎至七分，去滓温服，食后、夜卧各一次。

【主治】肺积，息贲咳嗽。

26941 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】半夏二两(汤洗去滑，炒黄) 桂(去粗皮) 三两 干姜(炮) 一两 蜀漆一两半 甘草(炙，锉) 人参 附子(炮裂，去皮脐) 各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至六分，去滓温服，空腹、日午，晚间各一次。初服稍停药力，恐气上不得下，宜减之。

【主治】脚气冲上入腹，腹急，气上胸膈，真气欲绝。

26942 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】半夏(汤洗去滑,切,焙)一升 槟榔仁七枚

【用法】上咬咀,如麻豆大,以水七升,煮取二升,去滓,分温三服,如人行四五里一服。

【主治】脚气冲心,烦闷气急,坐卧不安。

26943 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】半夏(汤洗去滑,炒)一两半 陈橘皮(汤浸去白,炒)一两 白术一两半 人参 羚羊角(镑)各半两 吴茱萸(汤浸三度,焙干,炒)二两半 白茯苓(去黑皮)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜一枣大(拍碎),同煎至六分,去滓,空心、食前温服,一日三次。

【主治】脚气,因热频服冷药伤胃,胃中痰冷,呕逆不下食,心下坚满。

【加减】气未散者,加槟榔五枚(锉),旋覆花三分。

26944 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】半夏(汤洗去滑,姜汁制) 黄芩(去黑心)各二两 旋覆花三分 赤茯苓(去黑皮) 麦门冬(去心) 桑根白皮各二两大腹(连皮子,锉)五颗

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加大枣二个(擘破),生姜一分(拍碎),煎取七分,去滓,空腹服。

【主治】江东脚气,始脚胫痠重,恶心,头旋呕吐,腹中刺痛,胸中塞闷,时憎寒壮热如疟状。

26945 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】半夏一两(汤洗去滑)

【用法】上咬咀,如麻豆大。以生姜汁一升,煎取四合,空心顿服。间日服一剂。

【主治】脚气。

26946 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】半夏(汤洗七遍,切,焙)二两 麻黄(去节煎,掠去沫,焙) 杜薤 芍药 枳实(去瓢,麸炒) 细辛(去苗叶) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒) 乌梅肉(炒)各三分 松萝半两 淡竹叶(切)三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜一分(拍碎),煎至八分,去滓温服,空腹、食后各一次。

【功用】下气除热。

【主治】肝劳实热,闷怒,精神不守,恐畏不能独卧,目视不明,气逆不下,胸中满塞。

26947 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】半夏(汤洗去滑,焙) 桔梗(锉)各三分 槟榔二枚(煨,锉) 桑根白皮(炙,锉) 百部(焙) 贝母(去心,炒) 甘草(炙,锉) 款冬花 吴茱萸(水浸一宿,焙干,炒) 紫菀(去苗土)各半两 泽漆叶 旋覆花各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜半分(拍碎),大枣二个(擘),煎至七分,去滓,空腹温服,日午、夜卧再服。

【主治】虚劳上气咳嗽,兼肺劳涕唾稠粘,及有脓血,皮肤干焦,作则寒热,饮食不下,喘息不调,日渐瘦悴,坐卧不得。

26948 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】半夏(汤洗去滑,焙干) 槟榔各半两 柴胡(去苗) 桔梗(炒) 人参 赤茯苓(去黑皮) 白术各一两 陈橘皮(去白)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜一分(拍碎),煎至一盞,去滓,空腹分温二服。

【主治】虚劳。寒热进退,痰饮不消,四肢拘急,手足时冷。

26949 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】半夏(汤浸去滑,焙干)一两 陈橘皮(汤浸去白,炒)二两 芍药 白茯苓(去黑皮) 白术 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,别研)各一两半

【用法】上六味,除杏仁外,粗捣筛和匀。每服五钱匕,用水一盏半,加大枣两个(擘破),生姜一分(拍碎),煎至一盏,去滓,分温二服。

【主治】虚劳。脾胃气滞,胸膈痰壅,食即呕吐。

26950 半夏汤

《圣济总录》卷九十。为《千金》卷十二“千里流水汤”之异名。见该条。

26951 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】半夏(汤洗去滑七遍,炒干)二两 白茯苓(去黑皮)四两 糯米(炒黄)一合

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以东流水一盏半,加生姜半分(拍碎),煎至一盏,去滓,空腹温服,一日二次。

【主治】虚劳,发烦不得眠。

26952 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】半夏(汤洗去滑,焙干)三两 芎藭 细辛(去苗叶) 附子(炮裂,去皮脐) 干姜(炮) 人参 当归(切,焙)各一两半 桂(去粗皮) 甘草(炙,锉) 白茯苓(去黑皮)各一两 杏仁三十枚(汤浸,去皮尖双仁,生研)

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盏半,加生姜一枣大(拍碎),煎至一盏,去滓,分温二服,早、晚、食后各一次。

【功用】止痛益气。

【主治】脉极虚寒,咳嗽心痛,喉中介介如梗,甚则咽肿喉痹。

26953 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】半夏(汤洗去滑,焙)三两 白术 赤茯苓(去黑皮) 人参 甘草(炙,锉) 附

子(炮裂,去皮脐) 陈橘皮(去白,焙)各一两 桂(去粗皮)一两半

【用法】上为粗末。每用五钱匕,水一盏半,加生姜半分(拍碎),煎至一盏,去滓,分温二服。

【主治】肉极虚寒,脾咳右胁下痛,阴阴引肩背痛,不可以动,动则咳,脾胀满,留饮痰癖,大小便不利,少腹切痛,膈上寒。

26954 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑) 细辛(去苗叶)各一两 枳壳(去瓢,麸炒令黄) 前胡(去芦头)各二两 乌梅肉(细切)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加生姜一枣大(拍碎),同煎七分,去滓,食后、临卧再服。

【主治】眼赤肿痛;偷针,热客目眦,结成肿疱。

26955 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】半夏(汤洗七遍,焙)五两 前胡(去芦头)四两 枳实(炒)二两 细辛(去苗叶)一两 乌梅七枚

【用法】上锉,如麻豆大。每用五钱匕,水二盏,加生姜五片,煎取一盏,去滓,食后温服,一日三次。

【主治】目暴肿痒痛。

26956 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】半夏(汤浸去滑七遍)二两 射干 干姜(炮) 紫菀(去苗土) 桂(去粗皮) 当归(切,焙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 独活(去芦头)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓温服。

【主治】咽喉生疮,嗽唾如鲠,语声不出。

【加减】病久者,加大黄一两半;初秋夏月暴雨冷,及天行暴热,喜怒伏于内,宜加生姜二两,干姜、茱萸、枳实各一两。

26957 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】半夏(汤洗七遍,切,焙)一两 人参 甘草(炙,锉) 栝楼根(锉) 桂(去粗皮)各三分 石膏一两一分 小麦一两半 赤小豆一分 吴茱萸(汤洗,焙干)一两半

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,加生姜三片,大枣二个(擘破),同煎至八分,去滓温服。

【主治】咽喉中如有物妨碍。

26958 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】半夏(汤洗去滑,生姜汁制,晒干)一两 人参 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)各一两半 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 细辛(去苗叶) 白茯苓(去黑皮) 枳壳(去瓢,麸炒) 槟榔(锉)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜半分(切),同煎七分,去滓温服。

【主治】妇人数经分娩,血风委积,肌体羸瘦,面无颜色。

26959 半夏汤

《圣济总录》卷一五四。为《千金》卷二“半夏茯苓汤”之异名。见该条。

26960 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】半夏(汤洗七遍)二两 麦门冬(去心,焙)二两 甘草(炙,锉) 当归(微炙) 黄耆(锉)各一两半 阿胶(炙令燥)二两 人参一两 黄芩(去黑心)一两 旋覆花一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加葱白二寸,生姜半分(切),同煎至七分,去滓,空心温服。

【主治】妊娠卒下血不止,腹痛,手足寒热,腰背痠疼。

26961 半夏汤

《圣济总录》卷一五六。为《圣惠》卷七十四“半夏散”之异名。见该条。

26962 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】半夏半两(生姜汁淹浸一宿,切,焙) 贝母(去心)一两 柴胡(去苗)一两 猪牙皂荚(炙,去皮) 甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜五片,同煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后咳嗽痰壅。

26963 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】半夏(汤洗去滑,切,焙)一两 白薇(炒)二两 干姜(炮) 甘草(炙,锉)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至七分,去滓,空心温服。

【主治】乳石发热,干呕烦热。

26964 半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】半夏(汤浸七遍,焙) 黄芩(去黑心) 土瓜根各二两 赤茯苓(去黑皮)三两 桂(去粗皮) 枳壳(去瓢,麸炒) 白术各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水两盞,加生姜一枣大(拍碎),大枣两枚(擘),煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】乳石发,体黄瘦,不能饮食,心腹痞结,起居腰背急痛,嗜卧。

26965 半夏汤

《卫生总微》卷七。为《金匱》卷中“小半夏汤”之异名。见该条。

26966 半夏汤

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】半夏(好者)一两(汤浸洗七次,切,焙干) 陈粟米三分(陈粳米亦得)

【用法】上吹咀。每服三钱,水一大盞,加生姜七片,煎至四分,不拘时候温服。

【主治】脾胃虚寒,吐泻,及有冷痰。

26967 半夏汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】茯苓 白术 杏仁(麸炒,去皮尖)各二两 橘皮 芍药各二两 半夏(汤浸七遍)四两

【用法】上锉散。每服四钱,水一盞半,加生姜七片,大枣二个,煎七分,不拘时候服。

【主治】脾劳实热,四肢不和,五脏乖戾,胀满喘息,气急不安。

26968 半夏汤

【方源】《普济方》卷一九八引《卫生家宝》。

【组成】半夏(汤洗七次) 白茯苓 青皮(去白) 陈皮(去白) 枳壳(去瓢,炒) 桔梗(炒)各一两

【用法】上为锉散。每服三钱,水一盞半,加生姜十片,煎至七分,温服。

【功用】消痰逐饮。

【主治】疟疾,暑毒。

26969 半夏汤

【方源】《保命集》卷中。

【组成】半夏曲 茯苓 白术各半两 淡桂一钱半 甘草(炙)二钱半

【用法】上为细末。渴者凉水调下,不渴者温水调下,不拘时候。

【主治】霍乱转筋,吐泻不止。

26970 半夏汤

【方源】《保命集》卷下。

【组成】半夏曲一两半 桂七钱半(去皮) 大黄五钱 桃仁三十个(去皮尖,炒)

【用法】上为细末,先服四物汤三两服,次服半夏汤三钱,加生姜三片,水一盞,煎去三分。食后如未效,次服下胎丸。

【主治】胎衣不下,或子死腹中,或血冲上昏闷,或暴血下,及胞干而不能产者。

26971 半夏汤

【方源】《续易简》卷三。

【组成】半夏(汤洗) 藿香(洗,去梗) 羌活 川芎各二钱半 黑牵牛半两

【用法】上为细末。每服二钱半,食后熟汤

调下,和滓服。以吐涎为度;未吐更进一服。

【主治】痰疟,头痛,才食即吐。

26972 半夏汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】半夏(汤泡七次) 白术 茯苓(去皮) 人参 橘皮(去白) 附子(炮,去皮脐) 木香(不见火) 桂心(不见火) 大腹皮 甘草(炙)各等分

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盞半,加生姜五片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肉虚极,体重,脇引肩背不可以动,动则咳嗽,胀满,留饮痰癖,大便不利。

26973 半夏汤

【方源】《朱氏集验方》卷五引罗监税方。

【组成】南星 半夏各四两 生姜半斤 皂角二挺

【用法】上以白水淹过得药一寸许,同煮干,仍用温水浴过,锉片,晒干为末,加丁香、缩砂各半两,甘草一两半,再入熟粟米粉半升,空心,沸汤点服。

【主治】痰饮。

26974 半夏汤

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】半夏二十一个(每个切作四块,煨) 姜一块(煨) 甘草一寸(煨) 皂角一寸(煨,无虫蛀者,去皮)

【用法】上为粗末。水二碗,煎一碗服。

【主治】嗽。

26975 半夏汤

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】制半夏一两 茯苓二两

【用法】上咬咀。每服一两,水一盞,加生姜七片,煎至一半,去滓食后服。不呕吐者止,不止者再服。

【主治】呕逆,寒在上焦,脉缓者。

26976 半夏汤

【方源】《医方类聚》卷一一九引《王氏集验方》。

【组成】半夏 干姜各等分

【用法】以浆水一升半,煮取一半,顿服之。

【主治】干呕吐逆痰沫出者。

26977 半夏汤

《瑞竹堂方》。为《局方》卷四“桔梗汤”之异名。见该条。

26978 半夏汤

《普济方》卷二十七。即《金匱》卷上“越婢加半夏汤”。见该条。

26979 半夏汤

【方源】《普济方》卷一六五。

【组成】半夏曲一两 神曲一两（微炒）
麦蘖半两（炒） 甘草二两 生姜六两（去皮，湿纸裹，慢火煨熟，切作片子，烂研，同上四味捏作饼子） 杏仁一两半 丁香半两（焙） 陈皮 盐四两（炒）

【用法】上为细末。每服一二钱，沸汤点之。

【主治】痰饮不利，胸膈痞闷，不思饮食。

26980 半夏汤

【方源】《普济方》卷一八七。

【组成】半夏（汤洗七次，切，焙）二两半 栝楼实一枚。

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水二盏，加生姜一分（拍碎），煎至一盏，去滓温服，一日三次。

【主治】胸痹，心下坚痞，急痛彻背，短气烦闷，自汗出。

26981 半夏汤

《普济方》卷二三二。为《圣济总录》卷八十八“温脾半夏汤”之异名。见该条。

26982 半夏汤

【方源】《普济方》卷二三三。

【组成】半夏三两（洗） 麦门冬三两（去心） 酸枣仁 甘草各二两（炙） 桂心三两 黄芩 草薢 人参各二两 茯苓四两 远志半两 秫米一合 生姜半分

【用法】水煎服。

【主治】虚劳，闷不得眠。

26983 半夏汤

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】五苓散加生姜 半夏

【用法】水煎服。吐了痰，泻亦止，惊自退。

【主治】小儿吐泻发搐，觉有痰者。

26984 半夏汤

《玉机微义》卷九。为《千金》卷十二“半夏千里流水汤”之异名。见该条。

26985 半夏汤

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【组成】半夏一钱五分 黄芩一钱 远志一钱 生地黄二钱 秫米一合 酸枣仁（炒）三钱 缩砂一钱五分

【用法】长流水煎服。

【主治】胆腑实热，精神恍惚，寒热泄泻，或寝汗憎风，善太息。

26986 半夏汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】白术三钱 生姜三片 半夏八分 茯苓一钱 泽泻八分

【用法】上哎咀。水煎熟，空心服。

【主治】中气亏败，以致津液凝聚成痰，阻塞经络，妨碍升降，以致水液不能回渗，独流大肠，而为溏泄，小便短少。

26987 半夏汤

【方源】《叶氏女科》。

【组成】陈皮（去白，盐水炒） 半夏（姜制，炒黄） 茯苓各一钱 子芩（酒炒） 枳壳（麸炒） 紫苏各八分 甘草（炙）五分

【用法】加生姜一片，水一钟，煎七分，食远服。

【主治】妊娠二月，气血不足，胎气始盛，逆动胃气，恶心呕吐，饮食少进。

26988 半夏汤

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】半夏一钱 茯苓一钱 炙甘草三分 桑白皮一钱 广皮一钱 泽泻七分 白术一钱

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】水逆而喘。

26989 半夏汤

【方源】《古今医彻》卷四。

【组成】半夏一钱 茯苓一钱 厚朴五分 炙甘草三分 广皮一钱

【用法】加竹茹一团，生姜三片，熟砂仁末七分，水煎服。

【主治】妊娠阻恶不食。

【加减】内热，加条芩一钱；胃寒，加藿香一钱；虚，加人参一钱。

26990 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】半夏（汤洗去滑） 大腹皮（锉） 麦门冬（去心，焙） 赤茯苓（去黑皮） 白术 桔梗 青橘皮（汤浸，去白，焙） 前胡（去芦头）各三分 厚朴（去粗皮，涂姜汁炙令香）一两 防风（去叉） 枇杷叶（拭去毛，炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加生姜一枣大（拍碎），煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】风痰，心腹烦满，呕吐不欲饮食。

26991 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】半夏（为末，生姜汁制饼，晒干） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各二两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参 白术各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞半，加生姜五片，大枣二个（擘），同煎至八分，去滓温服。

【主治】脾胃虚弱，不能饮食，干哕恶心，或水谷不化。

26992 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】半夏（生姜汁炒黄） 干姜（炮）各一两 枣肉（焙） 附子（炮裂，去皮脐） 青橘皮（汤浸，去白，焙）各半两 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 红豆蔻（去皮）各一分 木香半分 草豆蔻（去皮）二枚

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水一盞，加蜜半匙，煎至七分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】脾胃不和，不能饮食，见食吐逆。

26993 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】半夏（汤洗七遍去滑尽，焙）二两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两半 糯米二合 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两 生姜（切，焙）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，加大枣二个（擘破），水一盞半，煎至一盞，去滓，空腹温服，如人行五里再服。

【主治】反胃不食，食即吐逆，羸瘦少力。

26994 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】半夏（生姜汤洗七遍去滑） 麦门冬（去心，焙）各一两半 升麻 前胡（去芦头）各一两 槟榔（锉）二枚 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 大黄（蒸三度，炒）各半两 箴竹叶三十片（水洗） 生地黄三两

【用法】上哎咀，如麻豆大。每服五钱匕，水二盞，加生姜一枣大（拍碎），同煎至一盞，去滓温服，一日二次。

【主治】肺气胀满，咳嗽痰壅，四肢痿弱，积渐虚羸。

26995 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】半夏三分（姜汁浸，炒） 白术一两 槟榔五枚（生，锉） 甘草（生，锉）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞，煎至八分，去滓热服，不拘时候。

【主治】脾胃虚寒，痰涎壅滞，呕吐不止。

26996 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】半夏一两（汤洗去滑，用生姜二两同捣作饼子，焙干） 丁香 木香各一分 白术 沉香（锉） 陈橘皮（汤浸去白，炒）各半两 草豆蔻五枚（去皮） 甘草（炙） 青橘皮（汤浸，去白，炒）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盞半，加生姜半分，煎取一盞，去滓温服。

【主治】虚劳胃气寒，中脘痞闷，呕吐多痰，

不思饮食。

26997 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】半夏(汤洗七遍,焙)二两 大黄(锉,炒)一两 芎藭 当归(炒,焙) 赤芍药 桂(去粗皮)各一两 吴茱萸(洗,焙,微炒)一两半 桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)一两 桑寄生一两半 槟榔(煨)三枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜一枣大(切),煎至七分,去滓,空腹温服。

【主治】妇人月经不调,腰腹冷痛,面无血色,日见消瘦,胸腹满闷,欲成骨蒸,及已成者宜服。

26998 半夏饮

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】半夏(汤洗去滑,生姜汁制过) 白茯苓(去黑皮)各三分 细辛(去苗叶) 旋覆花 桔梗 赤芍药 陈橘皮(去白,焙) 甘草(炙)各半两 熟干地黄(焙)一两一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,加生姜五片,同煎至七分,去滓,空心、食前温服。

【主治】妊娠恶阻,心中愤闷,闻食气即吐逆,肢节痠疼,多汗黄瘦。

26999 半夏酒

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】半夏二十枚

【用法】水煮了,炮及热,用好酒一升浸,密封头。良久,取酒乘热含之。冷即吐却,又含热者,以愈为度。

【主治】重舌满口。

27000 半夏酒

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】半夏十枚

【用法】以苦酒一升,煮取八合,稍稍漱口,热含冷吐。半夏动人咽喉,以生姜汁解之。

【主治】舌肿满口,气息不通,须臾杀人,

急以手指刺破,渍出恶血,亦可用微针决破,次用此药。

27001 半夏散

【方源】《伤寒论》。

【组成】半夏(洗) 桂枝(去皮) 甘草(炙)各等分

【用法】上三味,各别捣筛已,合治之。每服方寸匕,白饮调下,一日三次。

【主治】少阴病,咽中痛。

【方论选录】《伤寒集注》:方有执曰,此以风邪热甚,痰上壅而痹痛者言也。故主之以桂枝祛风也,佐之以半夏消痰也,和之以甘草除热也。

27002 半夏散

【方源】《外台》卷二引《深师方》。

【组成】半夏(洗,焙干)

【用法】上为末,每服一钱匕,生姜汤调下。

【主治】伤寒病咽不止。

【宜忌】忌羊肉、饴。

27003 半夏散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】半夏半两(汤浸七遍去滑) 旋覆花半两 防风三分(去芦头) 赤茯苓三分 前胡三分(去芦头) 桑根白皮三分(锉) 麦门冬三分(去心) 枳实半两(麸炒) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盞,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾脏风壅痰滞,睡即多涎,头目胸膈不利。

27004 半夏散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 红豆蔻三分(去皮) 茅香花三分 人参一两(去芦头) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 白术一两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盞,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍

热服，不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱，见食呕吐。

27005 半夏散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】半夏半两（汤洗七遍去滑） 细辛三分 桔梗半两（去芦头） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 麻黄三分（去根节） 桂心二两 前胡半两（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓢） 紫菀半两（洗去苗土） 桑根白皮半两（锉） 贝母半两（煨令微黄） 柴胡半两（去苗） 甘草一分（炙微赤，锉） 木通半两（锉） 诃黎勒皮半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】肺脏外伤风冷，声嘶言不能出，胸膈气滞。

【宜忌】忌生冷、热面。

27006 半夏散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】半夏一两（汤洗七遍去滑） 木香半两 人参一两（去芦头） 槟榔三分 桔梗半两（去芦头） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 前胡一两（去芦头） 赤茯苓二两 桂心半两 旋覆花半两 麦门冬一两（去心） 枇杷叶三分（拭去毛，炙微黄） 细辛三分 甘草半两（炙微赤，锉） 枳壳二两（麸炒微黄，去瓢）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏久积痰毒于胸膈不散，少思饮食。

【宜忌】忌炙煨、热面、猪犬肉。

27007 半夏散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】半夏一两（汤浸七遍去滑） 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 防风半两（去芦

头） 旋覆花一两 前胡一两（去芦头） 赤茯苓一两 桂心一两 白术半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】肾脏虚损，上热下冷，心胸壅滞，痰毒结实，唾如筋胶，饮食减少。

27008 半夏散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】半夏一两（水煮一伏时，晒干） 泽泻一两 桂心一两 干姜一分（炮裂，锉） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服一钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，和滓热服，不拘时候。

【主治】伤寒二日，痰逆头疼，四肢壮热。

27009 半夏散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】半夏二两（汤洗七遍去滑） 葛根一两（锉） 白术一两 人参一两（去芦头） 柴胡二两（去苗） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓢，焙） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 黄芩一两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三个，生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒九日不解，往来寒热，状如温疟，胸膈满闷，时有痰逆不止。

27010 半夏散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】半夏三分（汤洗七遍去滑） 芦根一两（锉） 赤茯苓三分 泽泻三分 桂心半两 甘草一分（炙微赤，锉） 麦门冬三分（去心）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒呕吐，烦渴欲饮水。

27011 半夏散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 甘草半两(炙微赤,锉) 人参半两(去芦头) 葛根半两(锉) 麦门冬三分(去心) 枇杷叶半两(拭去毛,炙微黄)

【用法】上为散。每服二钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒干呕,不纳饮食,心神虚烦。

27012 半夏散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 甘草半两(炙微赤,锉) 人参三分(去芦头) 枳实半两(麸炒令黄) 前胡半两(去芦头) 诃黎勒一两(用皮)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热频服,不拘时候。

【主治】伤寒后呕哕,心胸不利,头目昏重,不下饮食。

27013 半夏散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 人参一两(去芦头) 赤茯苓一两 泽泻一两 附子半两(炮裂,去皮脐) 干姜半两(炮裂,锉) 甘草半两(炙微赤,锉) 陈橘皮三分(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒头痛,壮热痰壅,心膈不利,食久不消。

27014 半夏散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】半夏三分(汤洗七遍去滑) 前胡三分(去芦头) 诃黎勒皮三分 赤芍药三分 桂心半两 人参三分(去芦头) 木香

半两 槟榔半两 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】伤寒,心腹胀满疼痛,胸膈壅滞,或呕哕不能饮食。

27015 半夏散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 黄芩一两 百合三两 干姜半两(炮裂,锉) 黄连一两(去须微炒) 甘草一两(炙微赤,锉) 人参一两(去芦头)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加大枣三个,生姜半分,煎至六分,去滓,稍热频服,不拘时候。

【主治】伤寒百合病,下利不止,心中悸坚而呕。

27016 半夏散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 人参半两(去芦头) 木香三分 枳实半两(麸炒微黄) 木通半两(锉) 川大黄一两(锉碎,微炒) 杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 百合一两 桑根白皮三分(锉)

【用法】上为散,每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒百合病,久不愈,大小便涩,腹满微喘,时复痰逆,不下食。

27017 半夏散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 黄芩三分 人参三分(去芦头) 干姜三分(炮裂,锉) 黄连三分(去须,微炒) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时

候。

【主治】伤寒不经发汗后成狐惑，下利，腹中痞坚，干呕肠鸣。

27018 半夏散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】半夏半两（汤洗七遍去滑） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 白术三分 甘草半两（炙微赤，锉） 高良姜半两（锉） 桂心半两 人参三分（去芦头）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒后脾胃不和，不思食饮，心膈痰逆。

27019 半夏散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】半夏一两（汤洗七遍去滑） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 前胡一两（去芦头） 赤茯苓一两 槟榔一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 白术一两 郁李仁一两（汤浸，去皮尖，微炒）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒后，宿食不消，痰逆气胀。

27020 半夏散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】半夏二两（汤洗七遍去滑） 人参一两（去芦头） 柴胡二两（去苗） 黄芩一两 甘草一两（炙微赤，锉） 栝楼根二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒十余日不解，往来寒热，发如疟，胸膈满闷。

27021 半夏散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】半夏三分（汤洗七遍去滑） 枳壳三分（麸炒，去白瓤） 赤茯苓三分 前胡三分（去芦头） 木通三分（锉） 人参三分（去芦头）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后脚气，心烦满闷，不下饮食，呕逆痰唾。

27022 半夏散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】半夏（汤洗七遍去滑） 柴胡（去苗） 黄耆（锉） 赤芍药 人参（去芦头） 桂心 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 大腹皮（锉） 各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气，腹胁虚胀，心膈壅滞，呕逆不能食。

27023 半夏散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】半夏（汤洗七遍去滑） 白术 甘草（炙微赤，锉） 赤茯苓 桂心 人参（去芦头） 河黎勒（用皮） 前胡（去芦头） 各一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气，若吐下发汗后，心下痞满，气上冲胸，起即头眩，脉沉者。

27024 半夏散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】半夏半两（汤洗七遍去滑） 赤芍药一两 前胡半两（去芦头） 黄芩半两 人参一两（去芦头） 知母一两 麦门冬半两（去心） 栝楼根半两 黄耆一两（锉） 赤茯苓半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，

加粳米、小麦各一百粒，生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病七日，烦躁而渴，胸中痰热。

27025 半夏散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】半夏一两（汤洗七遍去滑） 麦门冬一两（去心） 甘草半两（炙微赤，锉） 青竹茹半两 葛根一两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓢，焙）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，客热在脏，干呕，口中多痰，喘急烦闷，不能饮食。

27026 半夏散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】半夏三分（汤浸七遍去滑） 柴胡一两（去苗） 黄芩半两 赤芍药三分 甘草一分（炙微赤，锉） 桂心半两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓢，焙） 大腹皮三分（锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，腹胃虚胀，心膈壅滞，呕哕不能食。

27027 半夏散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】半夏一两 川大黄一两 乳香一两

【用法】上为细散。以葱白三两（细切），入诸药，同捣为膏。涂肿上，可厚三分，干即重换。

【主治】热病，毒气壅为疮肿。

27028 半夏散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】半夏半两（汤洗七遍去滑） 芎藭三分 甘草半两（炙微赤，锉） 汉防己半两 干姜半两（炮裂，锉） 防风三分（去

芦头） 桂心半两 川椒五十枚（去子及闭口者，微炒去汗） 附子三分（炮裂，去皮脐）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痰呕逆，汤饮不下，起则眩倒。

27029 半夏散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】半夏一两（汤洗七遍去滑） 前胡一两（去芦头） 人参三分（去芦头） 赤芍药二分 枳实三分（麸炒微黄） 细辛三分 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬一两半（去心，焙）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，空腹温服，晚食前再服。

【主治】肝劳实热，易怒，精神不守，恐畏不能独卧，目视不明，胸中满闷。

【宜忌】忌饴糖、羊肉、生菜。

27030 半夏散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】半夏一两（汤浸七遍去滑） 白术二两 赤茯苓一两 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓢，焙） 赤芍药一两 柴胡一两（去苗） 大腹皮二两（锉） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓢） 木香一两 诃黎勒一两半（煨，用皮）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】脾劳实，四肢不举，五脏不调，胀满气急。

【宜忌】忌饴糖、苋菜。

27031 半夏散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】半夏一两（汤洗七遍去滑） 白术

一两 赤茯苓一两 人参三分(去芦头) 甘草半两(炙微赤, 锉) 附子三分(炮裂, 去皮脐) 陈橘皮三分(汤浸, 去白瓢, 焙) 桂心三分 木香三分 大腹皮一两(锉) 诃黎勒一两半(煨, 用皮) 前胡三分(去芦头)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓, 食前温服。

【主治】肉极, 虚寒则胁下阴引背痛, 不可以动, 动则咳嗽胀满, 留饮痰癖, 大便秘不利, 小腹切痛, 膈上有寒。

【宜忌】忌饴糖。

27032 半夏散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】半夏三分(汤洗七遍去滑) 防风半两(去芦头) 大腹皮三分(锉) 麦门冬三分(去心, 焙) 枇杷叶半两(拭去毛, 炙微黄) 白茯苓三分 白术三分 桔梗三分(去芦头) 青橘皮三分(汤浸, 去白瓢, 焙) 前胡三分(去芦头) 人参三分(去芦头) 厚朴一两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓热服, 不拘时候。

【主治】虚劳痰饮, 心腹烦满, 不欲饮食。

27033 半夏散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 鳖甲一两(涂醋炙令黄, 去裙襕) 白术一两 人参一两(去芦头) 黄耆一两(锉) 赤茯苓一两 桔梗半两(去芦头) 桂心一两 前胡一两(去芦头) 陈橘皮一两(汤浸去白瓢, 焙) 甘草半两(炙微赤, 锉) 木香半两

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓, 稍热服, 不拘时候。

【主治】虚劳心腹痞满, 胸膈壅闷, 不思饮食。

【宜忌】忌生冷、油腻、菹菜。

27034 半夏散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑) 五味子半两 前胡一两(去芦头) 木香三分 桂心半两 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 甘草半两(炙微赤, 锉) 赤茯苓一两 桔梗三分(去芦头) 麦门冬三分(去心) 人参一两(去芦头) 枳壳一两(麸炒微黄, 去瓢)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】虚劳, 胸中烦热, 心下痞满, 不欲饮食。

27035 半夏散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 玄参一两 川升麻一两半 犀角屑一两 黑豆皮一两 牛蒡子一两(微炒) 甘草一两(炙微赤, 锉) 木香半两 枳壳半两(麸炒微黄, 去瓢)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓, 温温灌之, 不拘时候。

【主治】心脾风热, 咽喉闭塞, 口噤。

27036 半夏散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】半夏一两半(汤洗七遍去滑) 厚朴一两半(去粗皮, 涂生姜汁炙香熟) 赤茯苓一两 紫苏叶一两 诃黎勒皮一两半 枳壳一两(麸炒微黄, 去瓢)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】咽喉中如有炙膏。

27037 半夏散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 射干一两 牛蒡子一两(微炒) 杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 羚羊角屑三分 木通三分(锉) 桔梗三分(去芦头) 昆布三分(洗去咸味) 槟榔三分 枳壳半两(麸炒微黄,去瓢) 赤茯苓三分 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】瘰气,咽喉肿塞,心胸烦闷。

27038 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十一。

【异名】半夏汤(《圣济总录》卷五十七)。

【组成】半夏一两半(汤洗七遍去滑) 桂心一两 槟榔一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】胸胁气不利,腹胀急痛。

27039 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】半夏一两(汤浸七遍去滑) 前胡一两(去芦头) 紫苏子一两(微炒) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 桂心一两 甘草半两(炙微赤,锉) 赤茯苓一两

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,大枣三个,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】上气,胸心满塞,不下食。

27040 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】半夏三分(汤洗七遍去滑) 白术半两 人参一两(去芦头) 桂心半两 甘草半两(炙微赤,锉) 陈橘皮半两(汤浸,去白瓢,焙) 厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,

加生姜半分,大枣三个,煎至五分,去滓温服,一日三四次。

【主治】上气呕吐,不能下食。

27041 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 赤茯苓一两 陈橘皮三分(汤浸,去白瓢,焙) 人参三分(去芦头) 前胡三分(去芦头) 紫苏茎叶一两 木通半两(锉) 木香半两 白术三分 槟榔三分

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,大枣三个,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】上气腹胀满,不能下食。

27042 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 人参一两(去芦头) 白术一两 厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 陈橘皮三分(汤浸,去白瓢,焙) 附子一两(炮裂,去皮脐) 沉香一两 桂心一两

【用法】上为散。每服五钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前稍热服。

【主治】七气,脏腑虚冷,心胸气上,劳乏不能饮食。

27043 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】半夏二两(汤洗七遍去滑) 吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒) 桂心一两 人参一两(去芦头) 白术一两 当归一两 厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟) 枳实半两(麸炒微黄)

【用法】上为散。每服五钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】气上奔,胸中逆满,喘息短气,不得安卧,腹中冷气,肠鸣相逐。

27044 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 前胡一两(去芦头) 射干一两 白术一两 桂心一两 人参一两(去芦头) 枳壳一两(麸炒微黄, 去瓤)

【用法】上为散。每服五钱, 以水一大盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至五分, 去滓, 稍热服, 不拘时候。

【主治】胸痹噎塞, 心下烦满。

27045 半夏散

【方源】方出《圣惠》卷四十二, 名见《普济方》卷一八七。

【组成】半夏(汤浸七次去滑) 桂心各一两 赤茯苓 白术 枳实(麸炒黄) 木香 陈橘皮各三分 甘草一分(炙微赤)

【用法】上为散。每服二钱, 水一盞, 加生姜半分, 去滓温服。

【主治】胸痹, 心下坚痞, 胸背缓急疼痛, 不能下食。

27046 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 桂心半两 赤茯苓一两 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓤, 焙) 人参半两(去芦头) 白术半两 大腹皮三两(锉) 桔梗三分(去芦头) 枳壳一两(麸炒微黄, 去瓤)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】腹虚胀, 两胁妨闷, 喘促, 不思食。

27047 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 黄芩三分 前胡三分(去芦头) 芎藭半两 防风半两(去芦头) 枳壳三分(麸炒微黄, 去瓤) 紫苏茎叶一两 羚羊角屑三分 甘草半两(炙微赤, 锉) 旋覆花半两 赤茯苓一两 石膏二两 桑根白皮三分(锉) 独活三分 槟榔一两

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏,

加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】脚气上攻, 心胸痰壅, 头痛目眩, 背膊烦痛, 不欲饮食。

27048 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】半夏三分(汤浸七遍去滑) 赤茯苓一两 人参一两(去芦头) 紫苏茎叶一两 前胡一两 桂心三分 槟榔一两 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓤, 焙)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 淡竹茹一分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】脚气, 烦闷呕逆, 心胸壅闷, 不能下食。

27049 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 前胡一两(去芦头) 紫菀一两(去苗土) 陈橘皮三分(汤浸, 去白瓤, 焙) 人参三分(去芦头) 诃黎勒皮三分 杏仁三分(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】咳嗽呕吐, 心胸满闷, 不下饮食。

27050 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 白茯苓二两 泽泻一两 桂心半两 甘草半两(炙微赤, 锉) 麦门冬二两(去心)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】反胃, 呕啰吐食, 渴欲饮水。

27051 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 麻黄一两(去根节) 细辛一两 枳实二两(麸

炒微黄) 杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 前胡二两(去芦头) 泽泻二两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【功用】理中,通膈,破寒。

【主治】上焦虚寒,短气不续,膈间厌闷,饮食先吐而后下。

27052 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】半夏一两半(汤洗七遍去滑) 川大黄一两(锉碎,微炒) 桂心一两 前胡一两(去芦头) 京三棱一两(炮,锉) 当归一两(锉,微炒) 青橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 鳖甲一两半(涂醋炙令黄,去裙襕) 槟榔一两 诃黎勒皮一两 木香一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】伏梁气,心下硬急满闷,不能食,胸背疼痛。

27053 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】半夏二两(汤洗七遍去滑) 桔梗三分(去芦头) 前胡一两(去芦头) 吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干微炒) 人参三分(去芦头) 槟榔七枚 鳖甲一两半(涂醋炙令黄,去裙襕) 枳壳二分(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】胁肋下有癖急硬,气满不能饮食,胸背疼痛。

27054 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】半夏三分(汤浸七遍去滑) 桔梗一两(去芦头) 大腹皮一两(锉) 前胡

一两(去芦头) 鳖甲一两半(涂醋炙令黄,去裙襕) 枳壳一两(麸炒微黄) 人参三分(去芦头) 槟榔一两 赤芍药一两 吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干微炒)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】痰癖气,急硬满胀,心肋多痛,不能食物,气攻胸背壅闷。

27055 半夏散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】半夏一两(汤浸七遍去滑) 前胡二两(去芦头) 白术一两 甘草三分(炙微赤,锉) 枳壳一两(麸炒微黄,去瓤) 赤茯苓一两 黄芩一两半 当归三分(锉,微炒) 茵陈一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】酒癖,宿食不消,胸心胀满,呕逆,不纳饮食,小便赤黄。

27056 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 木通一两(锉) 桂心一两 赤茯苓二两 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 槟榔二两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】五膈气,噎闷,饮食不下。

27057 半夏散

【方源】方出《圣惠》卷五十,名见《普济方》卷二〇四。

【组成】半夏一两(汤洗七次去滑) 干姜一两(炮制,锉) 昆布二两(洗去咸味)

【用法】上为散。每服三钱,水一盞,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气,咽喉噎塞,饮食不下。

27058 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 人参一两(去芦头) 赤茯苓一两 陈橘皮一两(汤浸,去白瓢,焙) 射干半两 桂心半两 草豆蔻一两(去皮) 旋覆花半两 枳实半两(麸炒微黄)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气,胸中壅滞,痰毒上攻,呕逆不能下食。

27059 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 槟榔半两 红豆蔻半两(去皮) 桂心三分 木香半两 白术三分 陈橘皮一两(汤浸去白瓢,焙) 赤茯苓三分 当归半两(锉,微炒) 高良姜半两(锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】五膈气,呕吐酸水,脾胃虚寒,不能下食。

27060 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒) 桂心一两 人参一两(去芦头) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服二钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气,心胸中积冷气痛,心中满闷,不能下食,或时呕吐。

27061 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 槟榔一两 前胡一两(去芦头) 枳壳一两(麸

炒微黄,去瓤) 吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒) 人参一两(去芦头) 甘草半两(炙微赤,锉) 桔梗一两(去芦头) 桂心一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,小麦、小豆各五十粒,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】五噎,心胸不利,痰壅食少。

27062 半夏散

【方源】方出《圣惠》卷五十,名见《普济方》卷二〇五。

【组成】半夏半两(汤泡七次) 芦根一两(锉) 甜葶苈半两(隔纸炒令紫色)

【用法】上为散,以水二大盏半,加生姜半两,同煎至一盏半,去滓,不拘时候服。

【主治】五噎。

27063 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏三分(汤洗七遍去滑) 柴胡一两(去苗) 羚羊角屑一两 射干三分 赤茯苓一两 桔梗三分(去芦头) 昆布一两(洗去咸味) 甘草半两(炙微赤,锉) 木香半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】气噎不通,心悸喘急,胸背疼痛,咽喉壅塞。

27064 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 干姜半两(炮裂,锉) 石膏二两 人参一两(去芦头) 栝楼根一两 桂心一两 甘草半两(炙微赤,锉) 吴茱萸半两(浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣二个,小麦、小豆各五十粒,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】饮食喜噎。

27065 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 人参一两(去芦头) 赤茯苓一两 甘草半两(炙微赤, 锉) 吴茱萸半两(汤浸七遍, 焙干, 微炒) 诃黎勒皮二两

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓, 稍热服, 不拘时候。

【主治】醋咽, 胸中气塞, 食饮不下。

27066 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【异名】豆蔻汤(《圣济总录》卷六十四)。

【组成】半夏二两(汤浸七遍去滑) 陈橘皮三两(汤浸去白瓢, 焙) 草豆蔻二两(去皮)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】痰饮, 冷气上冲, 胸膈满闷, 吐逆, 不下饮食。

27067 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 赤茯苓一两 诃黎勒皮一两 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 附子一两(炮裂, 去皮脐) 枳实半两(麸炒微黄) 紫苏茎叶一两 皂荚一挺(去皮, 涂酥炙令焦黄, 去子) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服五钱, 以水一大盏, 加生姜半分, 煎至七分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】痰饮积聚, 食不消化。

27068 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 防风半两(去芦头) 大腹皮半两(锉) 麦门冬三分(去心) 枇杷叶半两(拭去毛, 炙微黄) 赤茯苓三分 白术三分 桔梗三分

(去芦头) 枳壳三分(麸炒微黄, 去瓢) 前胡三分(去芦头) 人参半两(去芦头) 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服五钱, 以水一盏, 加生姜半分, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】溢饮, 胸膈痰壅, 头痛呕逆, 不下饮食。

27069 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 陈橘皮三分(汤浸去白瓢, 焙) 桂心一两 赤茯苓一两 人参三分(去芦头) 白术一两 细辛三分 甘草三分(炙微赤, 锉) 干姜三分(炮裂, 锉)

【用法】上为粗散。每服五钱, 以水一大盏, 加生姜半分, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】胸中冷痰饮, 气满, 不欲食饮。

27070 半夏散

【方源】方出《圣惠》卷五十一, 名见《普济方》卷一六七。

【组成】半夏一两(汤洗七次去滑) 干姜一两(炮) 丁香一两

【用法】上为散。每服一钱, 以姜汤、粥饮调下, 不拘时候。

【主治】冷痰饮, 胸膈气满吐逆, 不思饮食。

27071 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 赤茯苓一两 人参一两(去芦头) 白术三分 木香半两 甘草半两(炙微赤, 锉) 陈橘皮一两(汤浸去白瓢, 焙)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 竹茹一分, 大枣二个, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】消渴, 饮水腹胀, 烦热呕吐, 不思食。

27072 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 前胡三分(去芦头) 槟榔三分 杏仁三分(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 川大黄一两(锉碎, 微炒) 枳壳半两(麸炒微黄, 去瓢)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】癖黄。

27073 半夏散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 射干一两 川升麻一两 犀角屑一两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】蚰蜒黄。

27074 半夏散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】半夏一两 莽草一两 川大黄一两 白藜一两 川芒消一两

【用法】上为末。以水和如泥, 涂之, 干即再涂。

【主治】卒热毒风肿。

27075 半夏散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 白藜一两 牡丹一两 桑根白皮二两(锉)

【用法】上为细散。每服一钱, 以温酒调下, 一日三次。

【主治】金疮, 箭头在肉中不出。

27076 半夏散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 前胡一两(去芦头) 防风半两(去芦头) 旋覆花半两 大腹皮一两(锉) 桂心半两 人参三分(去芦头) 白术三分 甘草半两

(炙微赤, 锉) 枳壳半两(麸炒微黄, 去瓢) 桑根白皮半两(锉) 陈橘皮半两(汤浸, 去白瓢, 焙)

【用法】上为粗散。每服三钱, 以水一中盏, 加入生姜半分, 煎至六分, 去滓温服。不拘时候。

【主治】妇人风痰气逆, 胸膈壅闷, 难下饮食。

27077 半夏散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】半夏三分(汤洗七遍去滑) 赤茯苓一两半 陈橘皮三分(汤浸去白瓢, 焙) 木通三分(锉) 人参三分(去芦头) 大腹皮三分(锉) 槟榔一两 紫苏茎叶一两半 桂心三分

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妇人脚气发动, 心腹胀满, 饮食不下, 呕逆不止。

27078 半夏散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 知母半两 桔梗半两(去芦头) 黄耆一两(锉) 柴胡二两(去苗) 鳖甲一两(涂醋炙令黄, 去裙襕) 人参半两(去芦头) 赤茯苓半两 秦艽半两(去苗) 麦门冬半两(去心) 赤芍药半两 甘草一分(炙微赤, 锉) 乌梅肉半两 大腹皮三分(锉)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妇人热劳, 烦渴口干, 体瘦无力, 四肢疼痛, 或时寒热, 痰逆不欲饮食。

27079 半夏散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】半夏三分(汤浸七遍去滑) 旋覆花半两 当归三分(锉, 微炒) 黄耆三分(锉) 人参三分(去芦头) 麻黄三分(去

根节) 麦门冬三分(去心) 甘草一分(炙微赤, 锉) 阿胶一两(捣碎, 炒令黄燥)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妊娠四五月伤寒, 壮热头痛, 心胸烦闷, 呕吐痰涎, 不思食。

27080 半夏散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】半夏汤(《圣济总录》卷一五六)。

【组成】半夏三分(汤浸七遍去滑) 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 人参三分(去芦头) 芎藭三分 赤茯苓一分 赤芍药三分 甘草半两(炙微赤, 锉) 桑根白皮三分(锉) 生干地黄三分

【用法】上为散。每服四钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】妊娠心中烦闷, 恶闻食气, 头眩重, 四肢骨节疼痛, 多卧少起, 胸中痰逆, 不欲饮食。

27081 半夏散

《圣惠》卷七十五。为《千金》卷二“半夏茯苓汤”之异名。见该条。

27082 半夏散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 芎藭三分 人参半两(去芦头) 草豆蔻半两(去皮) 阿胶一两(捣碎, 炒令黄燥) 白术半两 高良姜半两(锉) 艾叶半两(微炒) 厚朴一两(去粗皮, 涂生姜汁炙令香熟) 陈橘皮一两(汤浸, 去白瓢, 焙) 甘草一分(炙微赤, 锉)

【用法】上为散。每服三钱, 以水一中盏, 加生姜半分, 大枣三个, 煎至六分, 去滓稍热服, 不拘时候。

【主治】妊娠伤冷, 心腹痛, 或痰逆, 不纳饮食。

27083 半夏散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑) 人参(去芦头) 赤芍药 细辛 白术 桔梗(去芦头) 桂心 陈橘皮(汤浸, 去白瓢, 焙) 前胡(去芦头) 甘草(炙微赤, 锉) 各半两 杏仁三分(汤浸, 去皮尖双仁, 麸炒微黄) 麻黄一两(去根节)

【用法】上为粗散。每服四钱, 以水一盞, 加生姜半分, 煎至六分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】产后伤寒咳嗽, 咽喉不利, 四肢烦疼。

27084 半夏散

【方源】方出《圣惠》卷八十二, 名见《圣济总录》卷一六七。

【组成】半夏一两(汤洗七遍去滑) 芎藭一两 细辛二两 桂心一两 川乌头五枚(炮裂, 去皮脐)

【用法】上锉细。以酒四升, 渍一宿, 绵裹入器中煮令微热, 温熨儿胸门上。朝暮熨二三十遍。

【主治】小儿脑长头大, 凶开不合, 臂胫小, 不能胜头, 三岁不合。

27085 半夏散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】半夏一分(汤洗七遍去滑) 桂心一分 紫菀半两(洗去苗土) 细辛一两 五味子半两 甘草半两(炙微赤, 锉)

【用法】上为粗散。每服一钱, 以水一小盏, 加生姜少许, 煎至五分, 去滓温服, 不拘时候。

【主治】小儿咳逆上气, 心胸痰壅, 不欲乳食。

27086 半夏散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】半夏一分(汤洗七遍去滑) 前胡半两(去芦头) 川大黄一分(锉碎, 微炒) 甘草一分(炙微赤, 锉) 川朴消一

两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，加生姜少许，煎至五分，去滓温服，一日三次。

【主治】小儿痰气结实，烦壅。

27087 半夏散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】半夏半两(汤洗七遍去滑) 黄连半两(去须) 黄芩一分 干姜半两(炮裂，锉) 陈橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙) 人参半两(去芦头) 当归半两(锉，微炒) 甘草一分(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿霍乱后，吐泻不止，烦闷。

27088 半夏散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑) 海藻(洗去咸味) 龙胆(去芦头) 昆布(洗去咸味) 土瓜根 射干 小麦面各一分

【用法】上为细散。每服半钱，以生姜酒调下，一日三四次。

【主治】小儿瘰气，心胸烦闷。

27089 半夏散

【方源】《博济》卷二。

【组成】半夏半两(姜汁浸一宿，焙干) 厚朴半两(去皮，姜汁炙) 枇杷叶(炙去毛) 半两 肉豆蔻一个(去壳) 母丁香二十五枚 青木香一块，枣大

【用法】上为细末。每服一钱，水八分，煎六分，和滓热服；酒后服，尤妙。

【主治】五膈气噎，心胸不利，涕唾稠粘，饮食进退。

27090 半夏散

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】半夏(汤洗去滑，为末，生姜汁和作饼，晒干) 藿香(去梗) 羌活(去芦头) 芎藭 牵牛各半两

【用法】上为细散。每服三钱匕，食后白汤

调下。以吐为度，未吐再服。

【主治】痰疟，发作有时，热多寒少，头痛，额角并胸前肌肉跳动，食才入口即吐出，面色带赤。

27091 半夏散

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】半夏(为末，姜汁调作饼，焙干) 阿魏(研) 各一钱

【用法】上研匀。以温酒半升，未发前调匀，旋旋服之。

【主治】脾疟。足少阴疟呕吐。

27092 半夏散

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】半夏(汤洗去滑，生姜汁制，焙) 干姜(炮) 各半两 绿矾(研) 一钱

【用法】上为末。每服半钱匕，未发日，以醋汤调下。

【主治】足少阴疟呕吐。

27093 半夏散

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】生姜(切作片子，盐淹一宿，焙干称) 十二两 甘草八两(炙，锉) 陈曲二十四两(炒) 草豆蔻(去皮) 三两 陈橘皮(汤浸，去白) 三两 丁香二两 半夏曲一两半

【用法】上为散。每服三钱匕，入盐少许，沸汤点服，不拘时候。

【主治】五饮酒癖，忪悸动气，心下痞满，呕逆吐酸，背寒中冷，身体寒战，心腹注痛，不思饮食，腹内虚鸣，便往滑利，胃虚气弱，心下有冷痰者。

27094 半夏散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】半夏(汤洗七遍) 白薇各二两

【用法】上为散。每服半钱匕，酒调下，一日三次。半夏戟人喉，以生姜汁解之。

【主治】铁棘竹木，诸铍在喉中不下，及刺在肉中拆不出，箭镞毒药在内不出。

27095 半夏散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】半夏二两

【用法】上为散，以陈酱汁调和如糊，涂摩癣上。一日两三次即愈。

【主治】一切癣。

27096 半夏散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【异名】半白散、二奇散（《产宝诸方》）。

【组成】半夏（为末，用生姜汁制作饼，晒干）半两 白薇一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，产难一服，横产二服，倒生三服，胎死衣不出四服。此方加麦一三两煎服尤佳。

【主治】横产及倒生，胎死腹中，及衣不出，母欲绝。

27097 半夏散

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】半夏（汤洗七遍，薄切片，姜汁浸三日，炒干）

【用法】上为末。每服一钱，温酒调下。不能饮酒者用汤。

【主治】胎死腹中，其母面赤舌青者，亦治横生逆产。

27098 半夏散

【方源】《幼幼新书》卷十六引丁时发方。

【组成】半夏（姜制）一两 贝母三分 柴胡 杏仁 川升麻 桑白皮（炙） 地骨皮 款冬花 麦门冬 马兜铃 青橘皮各半两 甘草（炙）一分

【用法】上为末。每服一钱，薄荷一叶，绵裹，水一盞，加生姜一片，大枣半个，煎五分，盞盛放火上，时时温服。

【功用】止泻润肺。

【主治】肺热咳嗽。

【宜忌】忌生冷毒物。

27099 半夏散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】半夏 天南星各半两 朱砂 乳香 滑石各一分 五灵脂二钱

【用法】上为细末，先将温浆水洗净疮，令

软，看有欲破处，以白丁香蚀之成，用熟针子探作孔子，用纸捻子红药在内。得脓出之愈。

【主治】诸疮肿，结实不散，或有脓出。

27100 半夏散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【异名】半粟散（《普济方》卷三九五）。

【组成】齐州半夏一两 陈粟米三分（陈梗米亦可）

【用法】上吹咀。每服三钱，水一大盞半，加生姜十片，同煎至八分，食前温服。

【主治】小儿脾胃虚寒，吐泻及冷痰。

27101 半夏散

【方源】《本事》卷十。

【异名】破棺散（《得效》卷十）、散生散（《医部全录》卷三二八）。

【组成】半夏

【用法】上为末，每用如豆大许，以竹管吹入鼻中，立醒。

【主治】①《本事》：妇人血晕血迷，败血冲心，昏闷不省人事。②《三因》：厥厥卒死，及为墙壁、竹木所压，水溺、金疮，卒致闷绝，产妇恶血冲心，诸暴绝证。

【方论选录】《本事方释义》：半夏气味辛温，入足阳明。妇人产后瘀浊内闭，致神识如绝，吹入鼻中而醒，以其辛能开窍也。

27102 半夏散

【方源】《普济方》卷二九六引《卫生家宝》。

【组成】半夏（生，为末）

【用法】先以生姜汁浴谷道，次以半夏末泡汤洗。

【主治】痔疾初生。

27103 半夏散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】半夏一两（锉） 桂一字 草乌头一字

【用法】上同煎一盞水，作二服。

【主治】少阴口疮，若声绝不出者，是风寒

退绝，阳气不伸也。

27104 半夏散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】半夏 南星 白僵蚕(直者)各一钱

【用法】用巴豆七粒(去皮油)，合上药为细末。用少许生姜自然汁调涂外面肿处。

【主治】肿腮。

27105 半夏散

【方源】《医方类聚》卷二四五引《医林方》。

【组成】苍耳子 半夏各等分

【用法】上打破，炒黄色，为细末。每服一钱，猪鬃子一个，灯焰上烧热，与药在上，又烧三四次，临卧口中噙之。

【主治】小儿哑病，咽喉中有声者。

27106 半夏散

【方源】《普济方》卷一六七。

【组成】半夏(汤浸去滑，焙干为末，姜汁和作曲，焙干) 杏仁(去皮尖双仁，麸炒，研)各二两 木香半两 桂心(去粗皮)一两 陈橘皮一两(汤洗浸) 甘草(炙，锉)一两 干姜(炮)三分

【用法】上药治下筛。每服三钱，水一盞，加生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【功用】消食，温胃止逆。

【主治】冷痰。

27107 半夏散

【方源】《普济方》卷二〇五。

【组成】半夏一两(汤洗七次) 桂心三分 木香半两

【用法】上为散。每服二钱，以水一盞，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】气噎，饮食不下，腹中雷鸣，大便不通。

27108 半夏散

【方源】《普济方》卷三〇七。

【组成】麝香 雄黄 半夏 巴豆各等分

【用法】上为末。敷之。

【主治】蛇咬。

27109 半夏散

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】半夏三分(生) 黄葵子 防风 远志 款冬花 桂心 前胡 干姜各一分

【用法】上为散。每服一钱，空心米饮调下。服之立效。

【主治】小儿吃食太多，伤脾，即不食吐逆。

【宜忌】乳母不可服。

27110 半夏散

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】半夏五钱(酢煮) 赤茯苓(去皮) 甘草(生)各二钱 陈梗米五十粒

【用法】上锉，焙。加生姜，水煎服。不止，调姜茹服。

【主治】暑伏热生痰，呕吐中痞。

27111 半夏散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】生半夏 杏仁各等分

【用法】上捣烂，与白面等分，新汲水调膏涂之。

【功用】消肿止痛。

27112 半夏膏

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】半夏一两(捣罗为末) 鳅鱗鱼脂二两(煎了者)

【用法】上药一处调如膏。旋取敷疮上。

【主治】鼠瘻。

27113 半钱散

【方源】《普济方》卷二一八。

【组成】大川芎二枚(锉作四块) 大附子一个(和皮生捣为细末)

【用法】上以水和附子末如面剂，裹芎作四处。如附子末少入面，裹半以针穿数孔子，用真脑、麝熏有穴处内香，再捏合穴内，如穴内未觉有香，再熏一柱，细罗灰，用罐子内热炭炮熟，为细末。每服半钱，葱茶调下，不拘时候。

【主治】气虚头痛。

27114 半消丸

【方源】《医学入门》卷五。

【组成】半夏二两 风化消一两

【用法】上为末，生姜自然汁打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下。

【主治】中脘停伏痰饮，致臂痛不能举，左右时复转移。

27115 半黄丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷一。

【组成】黄芩一两半 南星 半夏各一两

【用法】姜汁打糊为丸。姜汤下三五十丸。

【主治】热痰嗽。热痰留滞于内，咳嗽面赤，胸满，胸肋常热，惟足乍有时冷，其脉洪滑者。

27116 半粟散

《普济方》卷三九五。为《鸡峰》卷二十四“半夏散”之异名。见该条。

27117 半硫丸

【方源】《局方》卷六。

【异名】半桃丸（《三因》卷十二）、硫半丸（《良朋汇集》卷二）。

【组成】半夏（汤浸七次，焙干，为细末）硫黄（明净好者，研令极细，用柳木槌子杀过）各等分

【用法】以生姜自然汁同煎，加干蒸饼末入臼内杵为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心温酒或生姜汤送下；妇人醋汤送下。

【功用】温肾逐寒，通阳开秘，泄浊祛痰，温胃进食，止泻。

①《局方》：除积冷，暖元脏，温脾胃，进饮食。②《圣济总录》：温胃去痰。③《普济方》引《仁存方》：止泄泻。④《良朋汇集》，润大肠。

【主治】肾阳衰微，阴寒内结，命门火衰，阳气不运所致虚人、老人虚冷便秘或阳虚久泻；脾胃气弱，津液停积，湿久浊凝，痰浊咳嗽吐逆；或湿阻三焦，二便不通。

①《局方》：心腹一切痼癖冷气，及年高风秘冷秘，或泄泻。②《圣济总录》：痼癖冷气吐逆。③《普济方》：小儿泄泻注下，或手足

冷者，亦治咳嗽。④《温病条辨》：湿凝气阻，三焦俱闭，二便不通。

【方论选录】①《温病条辨》：湿阻无形之气，气既伤而且阻，非温补真阳不可，硫黄热而不燥，能疏利大肠，半夏能入阴。燥胜湿，辛下气，温开郁，三焦通而二便利矣。②《成方便读》：此为命火衰微，胃浊不降而致，故以半夏和胃而通阴阳，硫黄益火消阴，润肠滑便，然后胃与大肠皆得复其常，所谓六腑皆以通为用也。

【临证举例】虚风便秘 《临证指南医案》：吴，二气自虚，长夏大气发泄，肝风鸱张，见症类中，投剂以来诸恙皆减，所嫌旬日犹未更衣，仍是老人风秘。半硫丸一钱，开水送下，三服。

27118 半提丹

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】红升丹加珍珠散

【功用】收口。

【主治】疮疡。

27119 半解汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白芍一两 柴胡二钱 当归三钱 川芎五钱 甘草一钱 蔓荆子一钱 半夏一钱

【用法】水煎服。

【主治】郁气不宣，又加风邪袭于少阳之经，遂至半边头痛，时重时轻，遇顺境则痛减，遇逆境则痛重，遇拂抑之事，而更加之风寒之天，则大痛不能出户，痛至岁久，眼必缩小。

27120 半豆饮子

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】半夏 白豆蔻 苍术 干姜 藿香 陈皮 归尾 川芎 人参 白术 甘草 猪苓 砂仁 莲子

【主治】产后霍乱，由脏腑虚损，触冒风冷，阴阳不和，饮食失调，或冷或热，致成上吐下泻，肚腹疼痛，或腹中一条梗起，上冲心

胸甚绞而痛，昏闷，面黑，唇青，手足厥逆，自汗，与寻常霍乱无异，但属产后血虚。

【方论选录】参、术、陈、甘、半，去茯苓加猪苓也；砂仁、莲子以止利；苍、藿、干、葱、陈、夏、砂仁温中止吐；加芎、归以养血；不用地、芍者，以其酸寒也。

27121 半枝莲饮

【方源】《纲目拾遗》卷五引《百草镜》。

【组成】鼠牙半枝莲一两

【用法】捣汁，陈酒和服。渣敷留头，取汗而愈。

【主治】大毒，发背，对口、冬瓜、骑马等痈。初起者消，已成者溃，出脓亦少。

27122 半夏汤散

【方源】《普济方》卷一八七。

【组成】半夏（汤浸七次去滑）青橘皮（汤浸，去白瓢）木通 桂心各一两 吴茱萸一分（汤浸七次，焙，炒）

【用法】上为散。每服五钱，水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】胸痹，气噎塞痛闷。

27123 半夏饮子

【方源】《外台》卷八引《万全方》。

【组成】制半夏八分 厚朴（炙） 人参白术 生姜（切） 枣各六分 梗米二合 橘皮四分

【用法】上切细。以水二大升，煎取一升，去滓，分温四服，空肚服二服。

【主治】胃反，饮食吐逆，水谷不化。

【宜忌】忌羊肉、饴。

27124 半夏饮子

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】半夏一两（汤洗七遍去滑） 黄耆一两 人参一两（去芦头） 黄芩半两 麦门冬一两（去心） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上锉细。每服半两，以水一大盏，加生姜半分，葱白一寸，煎至五分，去滓温

服，不拘时候。

【主治】妊娠七八月，或因惊恐，或是伤寒烦热，腹肚满胀，气促腰重。

27125 半夏任

《普济方》卷三二五。为《圣济总录》卷一九〇“半夏拔刀”之异名。见该条。

27126 半夏拔刀

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【异名】半夏任（《普济方》卷三二五）。

【组成】大麦面四两 半夏（汤洗去滑，尽炒）半两（为末） 桂（去粗皮）一钱（为末）

【用法】以生姜汁并米醋少许和，切作拔刀，熟煮。如常法，空心食之。

【主治】妇人痿痹，血气，口吐酸水。

27127 半夏拔刀

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】半夏（以汤洗七遍后以生姜汁半盏煮半夏，令汁尽再炒干）一两 人参半两

【用法】上为末，加小麦面六两，以水搜作团，切如拔刀，以新生鸡子二枚（去壳），汤内煮，旋以箸剔破，加葱、薤白各三五茎，劈破，以盐酱调和，候汤沸，下拔刀煮令熟，任意分三次热食之。

【主治】初妊娠恶阻，择食痰逆，服诸汤药并皆无效。

27128 半夏根散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】半夏根（五月五日取）一两 木瓜根 乌头各一两

【用法】上药阴干并锉细，捣罗为散，每取枣核许大，以绵裹，纳谷道中。一日二次。

【主治】月蚀湿虫疮匿。

27129 半夏煮散

【方源】《博济》卷三。

【异名】半夏汤（《圣济总录》卷五十四）。

【组成】半夏十六分（汤洗十度） 木通十六分 前胡六分（去头） 旋覆花五分（去萼称） 陈皮六分（浸，去白） 槟榔六分（生杵，煎汤药成膏后斟酌入） 官桂五分

(去粗皮) 枳壳五分(麸炒) 茯苓六分 白术六分

【用法】上为散。每服三钱，加生姜三片，水一大盏，同煎八分，去滓，空心服；余滓再煎，日午服。

【主治】①《博济》：胃冷有酸，呕逆不思饮食，及中酒后。②《圣济总录》：三焦咳，腹满不欲食。

27130 半夏熨方

【方源】《千金》卷五。

【组成】半夏 生姜 芎藭各一升 细辛三两 桂心一尺 乌头十枚

【用法】上哎咀。以淳苦酒五升渍之，辟时，煮三沸，绞去滓，以绵一片浸药中，适寒温以熨患处，冷更温之，复熨如前，朝暮各三四熨乃止，二十日愈。

【主治】小儿脑长，解颅不合，羸瘦色黄，至四五岁不能行。

27131 半贝姜茶饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】姜半夏 川贝 生姜 细芽茶各三分

【用法】用阴阳水两茶钟，煎成一钟服。

【主治】胎疟，寒热平均者。

27132 半术天麻汤

《简明医毅》。为《脾胃论》卷下“半夏白术天麻汤”之异名。见该条。

27133 半附理中汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】半夏(上) 附子 人参 白术 干姜(各中) 甘草(下)

【用法】以水一盞半，煎至一盞，温服。

【主治】胃中虚冷，呕吐不止。

27134 半苓平胃散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】半夏 白茯苓 熟苍术 厚朴 广皮 甘草

【主治】呕吐清水，胸前饱闷。

27135 半夏二味丸

【方源】《外台》卷六引许仁则方。

【异名】半夏丸(《妇人良方》卷七)。

【组成】半夏一升(制) 小麦面一升

【用法】上捣半夏为散，以水搜面为丸，如弹子大，以水煮令面熟则是药成。初服四五丸，一日二次，稍稍加至十四五丸，旋煮旋服。服此觉病减，欲更重合服亦佳。

【主治】积冷在胃，呕逆不下食。

【宜忌】忌羊肉、饧。

27136 半夏十味汤

【方源】《外台》卷三引许仁则方。

【组成】半夏五两(熊州者，汤洗去滑，汁尽) 干姜三两 吴茱萸二两 桂心一两 白术三两 细辛三两 柴胡三两 牡丹皮三两 大黄五两 芒消二两

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，纳芒消，搅令消尽，分温三服，每服如人行十里久。若服一服利后，须伺候将息，勿更进汤药，但研好粟米作汁饮，细细与之。如觉利伤多，可以酢饭止，稠酢浆粥亦得。

【主治】天行病。服生芦根等八味饮子饮之，诸状不歇，渐不下食，心腹结硬，不得手近，有时触着，痛不可忍，既是热病，体气合热，骨肉疼痛，脉合洪数，口合苦爽，食合呕逆，体气反凉，脉反沉细，饭食反下，反不知痛恼，大小便秘塞，心上如石，痛不可近，视唇急鼻张，手眼寻绎，狂言妄语，此由热极，将息酷冷，饮食寝寐，唯冷是求，热结在心，无因通泄。但加身体黄，眼白睛色如黄柏，此是急黄。

【宜忌】忌羊肉、饧、生葱、生菜、桃李、雀肉、胡荽等。

27137 半夏丁香丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】半夏二两(水浸七日，晒干) 白矾(烧令汁尽) 半两 丁香一分

【用法】上为末，姜汁煮糊为丸，如小豆大。每服五丸至七丸，盐汤送下。

【主治】中焦寒痰。

27138 半夏丁香丸

《景岳全书》卷五十四。即《局方》卷四“丁香半夏丸”。见该条。

27139 半夏人参汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】半夏（为末，姜汁搜作饼，焙干）人参各三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加白蜜一匙，煎至七分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】霍乱逆满，心下痞塞。

27140 半夏干姜汤

【方源】《张氏医通》卷五。

【组成】半夏 甘草 干姜各等分

【用法】上为散。每取方寸匕，浆水煎服。

【主治】干呕，吐涎沫。

27141 半夏干姜汤

【方源】《疟气证治论》。

【组成】干姜 桂枝 半夏 苍术 生姜各等分

【用法】水煎服。

【主治】心胃痛不可忍。

27142 半夏干姜散

【方源】《金匱》卷中。

【组成】半夏 干姜各等分

【用法】上为散。每服方寸匕，浆水一升半，煎取七合，顿服之。

【主治】干呕吐逆，吐涎沫。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》：赵以德：干呕吐涎沫者，由客邪逆於肺，肺主收引，津液不布，遂聚为涎沫也。用半夏、干姜之辛热，温中燥湿；浆水之寒，收而行之，以下其逆，则其病自愈矣。②《金匱要略心典》：干呕吐逆，胃中气逆也；吐涎沫者，上焦有寒，其口多涎也。此是阳明寒气逆气不下而已。故以半夏止逆消涎；干姜温中和胃；浆水甘酸，调中引气止呕也。

27143 半夏天麻丸

《北京市中药成方选集》。即《脾胃论》卷下“半夏白术天麻汤”改为丸剂。见该条。

27144 半夏天麻汤

《杏苑》卷四。为《脾胃论》卷下“半夏白术天麻汤”之异名。见该条。

27145 半夏木通汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】半夏半两（汤洗七遍，切，焙干）木通（锉）一两 芦根（锉）一两半 陈橘皮（去白，焙）半两 柴胡（去苗）一两 麦门冬（去心，焙）半两 枇杷叶（拭去毛）半两（姜汁炙）

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盞半，加生姜一分（拍碎），同煎至一盞，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后，胃间余热，干呕不止。

27146 半夏木通汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】半夏（汤洗七遍去滑，焙）木通（锉，炒）干姜（炮）各半两 芍药 桑根白皮（炙，锉）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，加盐少许，煎至六分，去滓热服。一方捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食后生姜汤送下，渐加至二十丸。

【主治】咽喉如有物噎塞，饮食妨闷。

27147 半夏五香丸

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】半夏（汤洗七遍去滑，捣罗为末，姜汁和作饼，晒干）三两 丁香 沉香（锉）各半两 麝香（研）龙脑（研）丹砂（研）各一钱 藿香叶半两 槟榔（尖者）二颗（锉）木香 甘草（炙）各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心、食前生姜盐酒嚼下。

【功用】和胃气，进饮食。

【主治】膈气痰结。

27148 半夏中和汤

【方源】《普济方》卷一四七引《保生回春论》。

【组成】半夏二两（汤浸七次，切片，焙干）厚朴四两（刮去粗皮，锉碎）苍术

四两(刮去粗皮,锉令极碎) 独活二两(锉碎) 草豆蔻十五个(去壳,锉碎。以上四味一处杵碎,生姜屑一斤同杵糜烂后,又慢火炒紫色) 甘草三两(炒令紫色)

【用法】上为粗散。每服四钱,水一盞半,加生姜三片,大枣二个,同煎至七分,去滓,食前温服,一日三次。胃虚人可常服。

【主治】伤寒,岚瘴诸邪。

27149 半夏化痰丸

【方源】《普济方》卷一六四引《卫生家宝》。

【异名】半夏丸。

【组成】半夏(去滑)一两 赤茯苓半两(去皮) 白矾一分(枯) 铅白霜半两

【用法】上为末,生姜汁打面糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,生姜汤送下。

【主治】痰实,恶心呕吐,头目昏晕,心忪背寒,臂痛涎嗽,胸膈不快。

27150 半夏平胃散

【方源】《普济方》卷二十三引《保生回春论》。

【异名】安中散。

【组成】半夏二两(汤浸洗七次,切片,焙干) 厚朴四两(姜制) 陈皮六两(去瓤,焙干) 甘草二两(炙焦黄) 苍术六两(米泔浸一伏时,去皮,切,焙干)

【用法】上锉,慢火炒焦,为粗散。每服三钱,水一盞,加生姜三片,大枣一个,同煎六分,去滓,食前温服,一日三次。

【主治】胃虚,寒热百病,脾寒痰盛,不思饮食。

27151 半夏正气丹

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】硫黄 半夏 藿香叶各一两 大附子半两 水银砂子一分(水银砂子即取方内硫黄少许坩埚内盛,慢火上结砂子用)

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大,以朱砂为衣。每服二十丸至三十丸,煎正气活命散送下,不拘时候。

【主治】下虚,阴阳错逆,霍乱吐逆,粥食不下。

27152 半夏甘桂汤

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】桂枝 半夏 茯苓 桔梗 米仁 骨脂 干姜 泽泻

【用法】水煎服。

【主治】少阴伤寒,咽痛,下痢,脉沉细,舌白不渴。

27153 半夏左金汤

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】半夏 干葛 细辛 白术 茯苓 桂 柴胡 麦冬

【主治】脚气,邪中少阳,口苦胁痛,面垢,体无膏泽,头目颌锐痛。

27154 半夏左经汤

【方源】《三因》卷三。

【组成】半夏(汤去滑) 干葛 细辛 白术 茯苓 桂心(不见火) 防风 干姜(炮) 黄芩 小草 甘草(炙) 柴胡 麦门冬(去心)各三分

【用法】上锉散。每服四大钱,水一盞半,加生姜三片,大枣一个,煎七分,去滓,空腹服。

【主治】足少阳经为风寒暑湿流注,发热,腰胁痛,头疼,眩晕,呕吐宿汁,耳聋,惊悸,热闷心烦,气上喘满肩息,腿痹,缓纵不随。

【加减】热闷,加竹沥,每服半合;喘满,加杏仁、桑白皮。

27155 半夏生姜汤

《活人书》卷十八。为《金匱》卷中“小半夏汤”之异名。见该条。

27156 半夏生姜汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】半夏(汤洗去滑七遍,焙)五两 生姜半斤 人参一两半 陈橘皮(汤浸,去白,焙)三两

【用法】上锉细,如麻豆大。每服五钱匕,水一盞半,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】上气腹胀。

27157 半夏生姜汤

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】半夏 陈皮 黄芩 生姜

【用法】水煎服。

【主治】噎气，热毒郁于中，欲发而不得发。

27158 半夏白术丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】白术二两 半夏 干姜 枳实 赤茯苓各一两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】酒癖留滞，胁肋坚痛，胸腹满闷，饮食进退及呕逆恶心。

27159 半夏白芷散

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】半夏(汤洗七遍) 白芷各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，水调下。即呕出。

【主治】诸鲋。

27160 半夏曲芽汤

【方源】《医统》卷二十四。

【组成】半夏 陈皮 茯苓 枳壳 槟榔 神曲 麦芽 甘草各等分

【用法】加生姜五片，大枣一个，水煎服。

【主治】饮食积滞，痰涎壅盛，呕吐不已。

27161 半夏曲芽汤

【方源】《简明医彙》卷三。

【组成】半夏 陈皮 茯苓 枳壳 槟榔 神曲 麦芽 香附 厚朴 苍术各一钱 甘草三分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】饮食积滞，痰涎壅盛，呕吐不已。

27162 半夏竹茹汤

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】半夏 竹茹 茯苓 伏龙肝各□钱

【用法】水一盞半，加生姜五片，煎取一盞服。

【主治】产后呕吐。

27163 半夏苍术汤

【张氏医通】卷十四。为《兰室秘藏》卷中“补肝汤”之异名。见该条。

27164 半夏苍术汤

【方源】《医钞类编》卷十六引东山妇科方。

【组成】半夏 苍术 当归 白芍 熟地 川芎 川朴 甘草

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】妇人经水如黄浆汁，心中嘈杂，属脾湿者。

27165 半夏苏子汤

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】半夏五两(洗) 苏子一升 生姜五两 大枣四十个(擘) 橘皮 桂心各三两 甘草二两

【用法】上切。水七升，煮取二升七合。分三服。

【主治】卒上气，胸心满塞。

【宜忌】忌海藻、菰菜、羊肉、饴、生葱。

27166 半夏杏仁汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】半夏一钱 杏仁八分 枳壳五分 桔梗五分 片芩(炒)五分 紫苏五分 麻黄六分 甘草四分

【用法】上咬咀。加生姜五片，水煎熟，食前服。

【主治】风痰哮喘，喉中痰声不断者。

27167 半夏利膈丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】白术 人参 白茯苓(去皮) 白矾(生) 滑石 贝母各一两 天南星(生用)一两半 白附子(生)二两 半夏(汤洗)三两

【用法】上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后生姜汤送下。

【功用】止嗽化痰。

【主治】风痰郁甚，头疼目眩，咽膈不利，涕唾稠粘，胸中烦满，酒癖停饮，呕逆恶心，胁下急痛，腹中水声，神思昏愤，心忪面热。

27168 半夏利膈丸

【方源】《御药院方》卷五。

【异名】槟榔利膈丸。

【组成】黑牵牛四两(一半生,一半炒) 皂角(不蛀肥者,去皮子,酥涂炙)二两 槐角子半两 齐州半夏(汤浸洗七次,切,焙干)一两 青橘皮(汤浸,去瓢称)二两 槟榔一两(面裹煨熟,性)

【用法】上为细末,生姜自然汁打面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后生姜汤送下。如要疏风痰,加至四五十丸。

【主治】①《御药院方》:风上攻,痰实喘满咳嗽。②《普济方》引《德生堂方》:风痰、酒痰、茶痰、食痰、气痰诸痰为苦,致令手臂、肩背、胸膈俱痛,吐出痰如结核,黑色腥臭者。

27169 半夏利膈丸

【方源】《普济方》卷一〇四引《医方集成》。

【组成】防风(去芦头) 半夏(汤洗七遍去滑)各一两

【用法】上为末,入膏中,和捣百余杵为丸如梧桐子大。每服十丸,以荆芥、薄荷汤送下,不拘时候。

【功用】止嗽化痰。

【主治】风痰壅甚,头疼目眩,咽膈不利,涕唾稠粘,胸中烦满,酒癖停饮,呕逆恶心,胁下急痛,肠中水声,神思昏愤,心忪面热。

27170 半夏补心汤

【方源】《千金》卷十三。

【组成】半夏六两 宿姜五两 茯苓 桂心 枳实 橘皮各三两 白术四两 防风 远志各二两

【用法】上咬咀。以水一斗,煮取三升,分三服。

【主治】心虚寒,心中胀满悲忧,或梦山丘平泽。

【方论选录】《千金方衍义》:半夏补心汤兼调脾气,方中桂心、宿姜温补心脾,枳、术、橘、半温理胃气,茯苓佐桂心下导虚阳,防

风佐白术上散浊湿,远志一味通心气之专药。

27171 半夏苦酒汤

《类聚方》。为《伤寒论》“苦酒汤”之异名。见该条。

27172 半夏苓术汤

【方源】方出《丹溪心法》卷四,名见《东医宝鉴·外形篇》卷四。

【组成】苍术二钱 白术一钱半 半夏 南星 酒黄芩 香附各一钱 陈皮 赤苓各五分 威灵仙三分 甘草二分

【用法】上咬咀。加生姜三片,水煎服。

【主治】①《丹溪心法》:臂痛。②《东医宝鉴·外形篇》:痰饮臂痛不能举。

27173 半夏肺痿汤

【方源】《外台》卷十引《删繁方》。

【组成】半夏一升(汤洗) 母姜一斤 橘皮一斤 白术八两 桂心四两(一方有桑白皮一升)

【用法】上切。以水九升,煮取三升,去滓,分温三服。

【主治】虚寒喘鸣多饮,逆气呕吐。

【宜忌】忌羊肉、饴、桃李、雀肉、生葱。

27174 半夏泻心汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】泻心汤(《千金》卷十)。

【组成】半夏半升(洗) 黄芩 干姜 人参 甘草(炙)各三两 黄连一两 大枣十二个(擘)

【用法】以水一斗,煮取六升,去滓,再煮取三升,温服一升,一日三次。

【功用】和胃降逆,开结除痞。

①《金鉴》:补虚降逆,祛寒泻热。②《金匱玉函经二注》赵以德注:分阴阳,升水降火。③《金匱要略心典》:交阴阳,通上下。

【主治】伤寒痞证。胃气素虚,或吐下伤正,肠胃不和,升降失序,心下痞满,按之柔软而不痛,干呕,肠鸣下利,舌苔薄黄而腻,脉弦数。现用于急慢性胃炎、肠炎,消化道溃疡,胃功能失调等属肠胃不和,升降失调者。

①《伤寒论》：伤寒五六日，呕而发热，柴胡汤证具，而以他药下之，心下但满而不痛者，此为痞。②《金匱》：呕而肠鸣，心下痞者。③《外台》引《删繁方》：上焦虚寒，肠鸣下利，心下痞坚。④《千金》：老小下利，水谷不化，肠中雷鸣，心下痞满，干呕不安。⑤《三因》：心实热，心下痞满，身黄发热，干呕不安，溺澀不利，水谷不消，欲吐不出，烦闷喘息。⑥《类聚方广义》：痢疾腹痛，呕而心下痞硬；或便脓血，及饮汤药后，下腹部每漉漉有声而转泄者；瘕瘕积聚，痛浸心胸，心下痞硬，恶心呕吐，肠鸣下利者。

【方论选录】①《金匱玉函经二注》赵以德注：自今观之，是证由阴阳不分，塞而不通，留结心下为痞，于是胃中空虚，客气上逆为呕，下走则为肠鸣，故用是汤分阴阳，水升火降，而留者去，虚者实。成注是方：连、芩之苦寒入心，以降阳而升阴也；半夏、干姜之辛热，以走气而分阴行阳也；甘草、参、枣之甘温，补中而交阴阳，通上下也。②《伤寒来苏集》：伤寒五六日，未经下而胸胁苦满者，则柴胡汤解之；伤寒五六日，误下后，心下满而胸胁不满者，则去柴胡、生姜，加黄连、干姜以和之。此又治少阳半表半里之一法也。然倍半夏而去生姜，稍变柴胡半表之治，推重少阳半里之意耳。君火以明，相火以位，故仍名曰泻心，亦以佐柴胡之所不及。③《医方集解》：苦先入心，泻心者，必以苦，故以黄连为君，黄芩为臣，以降阳而升阴也；辛走气，散痞者必以辛，故以半夏、干姜为佐，以分阴而行阳也；欲通上下交阴阳者，必和其中，故以人参、甘草、大枣为使，以补脾而和中。④《金匱要略心典》：是虽三焦俱病，而中气为上下之枢，故不必治其上下，而但治其中。黄连、黄芩苦以降阳，半夏、干姜辛以升阴，阴升阳降，痞将自解；人参、甘草则补养中气，以为交阴阳，通上下之用也。⑤《成方便读》：所谓彼坚之处，必有伏阳，故以芩、连之苦以降之，寒以清之，且二味

之性皆燥，凡湿热为病者，皆可用之。但湿浊粘腻之气，与外来之邪，既相混合，又非苦降直泄之药所能去，故必以干姜之大辛大热以开散之。一升一降，一苦一辛。而以半夏通阴阳行湿浊，散邪和胃，得建治痞之功。用甘草、人参、大枣者，病因里虚，又恐苦辛开泄之药过当，故当助其正气，协之使化耳。

【临证举例】①痞证 《伤寒论通俗讲话》：张某某，男，36岁。素有酒癖，因病心下痞闷，时发呕吐，大便不成形，日三四行，多方治疗，不见功效，脉弦滑，舌苔白。拟方：半夏12克，干姜6克，黄连6克，党参9克，炙甘草9克，大枣七个。服一剂，大便泻出白色粘涎甚多，呕吐遂减十分之七，再服一剂，痞、利俱减，又服二剂，病则痊愈。②不寐 《伤寒解惑论》：李某某，女性，年约六旬。失眠症复发，屡治不愈，日渐严重，竟至烦躁不食，昼夜不眠，服安眠药片才能勉强睡一时。就诊时，按其脉涩而不流利，舌苔黄厚粘腻，胃脘满闷，大便数日未行，但腹无胀痛。处方：半夏泻心汤原方加枳实。傍晚服下，当晚就酣睡了一整夜，满闷烦躁，都大见好转，又服几剂，大便畅行，一切基本正常。③痢证 《伤寒今释》引《成绩录》：一人年十八，患痢，发则郁冒，默默不言，但能微笑，恶与人应接，故用屏风，重蚊帐，避人蒙被卧。汗之，心下痞硬，腹中雷鸣，服半夏泻心汤，痢减七八。④腹泻 《广东中医》(1959; 6: 226)：余某，女，26岁。热病五天，发热，口苦，渴而引饮，自取“狗干菜”煎服，热渴口苦虽减，惟不饮食。翌日晚，食干饭钟余，胃脘不舒，夜半忽腹泻，完谷不化，延医服药二剂，无效，而后下利频数，日十余行，肠鸣漉漉，脉小数。诊断：脏热肠寒，宜半夏泻心汤，一剂而愈。《浙江中医杂志》(1985; 4: 155)：本方治疗急性肠炎100例，其中日泻25次以下28例，10次以下24例，5次以上48例；发热低于38℃

者 38 例, 高于 38℃ 者 23 例; 腹痛者 70 例; 恶心呕吐者 44 例; 大便镜检: 白细胞 0~2 者 70 例, 红细胞 0~2 者 33 例。治疗三日后, 痊愈者 78 例, 好转 14 例, 无效 8 例。⑤胃及十二指肠溃疡出血 《上海中医药杂志》(1984; 2: 23): 笔者对 48 例经西医诊断为胃及十二指肠溃疡出血和慢性胃炎等病人治以半夏泻心汤, 均取得满意效果。临床症状为脘腹痞满, 隐痛, 吐血色鲜, 或紫暗色血水, 杂有食物残渣, 或排大便如墨, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。其加减法: 呕血者以炮姜炭易干姜, 加小蓟根 10 克; 大便隐血试验阳性者加阿胶 10 克; 呕血兼便血者, 加小蓟根 10 克, 阿胶 10 克; 脘疼隐痛者, 加延期胡索 10 克。每日一剂, 服 3 剂后止血者 31 例, 服 5 剂后止血者 15 例, 服 10 剂后止血者 2 例。⑥口腔粘膜溃疡 《浙江中医杂志》(1980; 11、12 合刊: 55): 笔者用半夏泻心汤原方对口腔溃疡病久, 舌质偏红, 兼有热象, 溃疡部位呈灰白色, 属心火与脾湿搏结者 20 例进行治疗, 取得满意效果。

27175 半夏枳术丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】半夏(汤泡七次, 焙干) 枳实(麸炒黄色) 白术各二两

【用法】上为极细末, 荷叶裹烧饭为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 添服不妨, 无定法。如热汤浸饼蒸为丸亦可。

【主治】因伤食内伤。

【加减】如食伤寒热不调, 每服加上三黄丸十丸, 白汤送下; 小便淋者, 加泽泻一两为丸服。

27176 半夏草果散

【方源】《普济方》卷一九九。

【组成】半夏七个(汤泡七次, 每次百沸, 候冷用手搓去滑) 全青橘皮四个 枣子五个 乌梅五枚 草果子二枚 生姜二块(草果大) 甘草二寸(炙黄)

【用法】上并洗净, 烂捶碎。同入砂瓶内,

用水一大碗, 以湿纸盖头及嘴, 以文武火煮至一盏, 去滓, 通口服, 又将滓再依前作一服。

【主治】岚瘴及一切疟疾。

27177 半夏茯苓丸

【方源】《女科指掌》卷三。

【组成】茯苓 半夏 橘皮 枳壳 人参 甘草 干姜

【用法】炼蜜为丸。每服二十丸。

【主治】妊娠恶阻, 甚者寒热呕吐, 胸膈烦满。

27178 半夏茯苓汤

【方源】方出《肘后方》卷二, 名见《外台》卷二。

【组成】半夏三两(洗) 秫米一斗 茯苓四两

【用法】以千里流水一石, 扬之万遍, 澄取二斗半, 合煮诸药得五升, 分五服。

【主治】大病愈后, 虚烦不得眠, 腹中疼痛, 懊恼。

27179 半夏茯苓汤

【方源】《外台》卷七引《小品方》。

【组成】半夏五两(洗) 生姜五两 茯苓三两 旋覆花一两 陈橘皮 人参 桔梗 芍药 甘草(炙) 各二两 桂心一两

【用法】上切。以水九升, 煮取三升, 分三服。

【主治】胸膈心腹中痰水冷氣, 心下汪洋, 嘈烦, 或水鸣多唾, 口清水自出, 胁肋急胀, 痛不欲食, 其脉喜沉弦细迟。

【宜忌】忌羊肉、饴、酢物、生葱、猪肉、海藻、菰菜。

【加减】欲得利者, 加大黄; 须微调者, 用干地黄; 病有先时喜水下者, 加白术三两, 除旋覆花; 若大便不调, 宜加大黄及干地黄, 并用三两。

27180 半夏茯苓汤

【方源】《千金》卷二。

【异名】半夏散(《圣惠》卷七十五)、半

夏汤(《圣济总录》卷一五四)。

【组成】半夏三十铢 茯苓 干地黄各十八铢 橘皮 细辛 人参 芍药 旋覆花 芎藭 桔梗 甘草各十二铢 生姜三十铢

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服。

【主治】妊娠阻病，心中愤闷，空烦吐逆，恶闻食气，头眩重，四肢百节疼痛沉重，多卧少起，恶寒汗出，疲极黄瘦。

【宜忌】忌生冷醋滑油腻、菰菜、海藻。

【加减】若病阻，积月日不得治，及服药冷热失候，病变客热烦渴，口生疮者，去橘皮、细辛，加前胡、知母各十二铢；若变冷下痢者，去干地黄，入桂心十二铢；若食少胃中虚，生热，大便闭塞，小便赤少者，宜加大黄十八铢，去地黄，加黄芩六铢。

【方论选录】①《医方考》：是方半夏、生姜能开胃而醒脾；地黄、芍药、芎藭能养阴而益血；人参、茯苓、甘草能和中而益气；及橘皮、桔梗、旋覆、细辛皆辛甘调气之品，可以平恶逆之气而进饮食者也。或问半夏为妊娠所忌，奈何用之？余曰：昔人恐久用而燥阴液，故云忌尔；若有恶阻之证，则在所必用也，故孙真人方之圣者也，其养胎之剂，用半夏者盖五方焉。②《千金方衍义》：方用人参鼓舞二陈之制，以运痰止呕，兼旋覆、桔梗以升散结气，芎、芍、地黄以保护荣血，用细辛者协济芎、地以升血分经脉窍隧之邪也。倘服后烦热下痢或二便闭塞，是必兼理客气，其加桂心，加大黄，当效前大黄丸及后方茯苓丸之制，庞安常言桂不伤胎，且熬令黑，则专散气而无壮火食气之患，大黄熬黑，但能泄热，而无苦寒伤中之虑。世俗每谓半夏辛散，胎未形成时，为之切禁。若妊娠肥盛多痰者，不去其痰，则胎不安。癰瘕多火者，不清其火，则胎不稳。时师咸谓黄芩、白术为安胎专药，孰知半夏、大黄、桂心有安胎妙用乎！历观《千金》诸方，每以大黄同姜、桂任补益之用，人参协消、黄佐克敌之功，不

由《千金》之门，何以求应变之策耶？

【备考】①方中桔梗，《医心方》卷二十二引《产经》作“泽泻”。《圣济总录》有大枣。②本方方名，《玉机微义》引作“茯苓半夏汤”。

27181 半夏茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑，焙干) 赤茯苓(去黑皮) 麦门冬(去心，焙)各三两 酸枣仁 桂(去粗皮) 黄芩(去黑心) 远志(去心) 人参各二两 甘草(炙，锉)一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盂半，加生姜五片，秫米一匙头许，同煎至一盂，去滓温服，不拘时候。

【主治】谋虑不决，胆气上溢，虚热口苦，神思不爽。

27182 半夏茯苓汤

【方源】《产育保庆》卷上。

【组成】半夏(汤洗)三两 茯苓 熟地各一两 陈皮 细辛 苏叶 川芎 人参 芍药 桔梗 甘草各六钱

【用法】上㕮咀。每服四大钱，水二盂，加生姜七片，煎七分，去滓，空心服。

【主治】产后眩暈，胸中宿有痰饮，阻病不除，产后多致眩暈，又血盛气弱，气不使血，逆而上攻。

【加减】有客热烦渴，口生疮者，去陈皮、细辛，加前胡、知母；腹冷下利者，去地黄，入桂心(炒)；胃中虚热，大便秘，小便涩，加大黄一两八钱，去地黄，加黄芩六钱。

27183 半夏茯苓汤

《鸡峰》卷十八。为《金匱》卷中“小半夏加茯苓汤”之异名。见该条。

27184 半夏茯苓汤

【方源】《妇人良方》卷十二引张氏方。

【异名】茯苓半夏汤(《赤水玄珠》卷二十一)。

【组成】半夏(泡洗七次，炒黄) 陈皮各

二两半 白茯苓二两 缩砂仁一两 甘草四两

【用法】上咬咀。每服四钱，水二盏，加生姜十片，大枣一个，乌梅半个，煎至七分，食前温服。

【主治】①《妇人良方》：妊娠痰逆不思食。②《永类铃方》：妊娠恶阻，恶闻食气，胸膈痰逆，呕吐恶心。

27185 半夏茯苓汤

【方源】《得效》卷十四。

【组成】半夏(汤洗) 白茯苓(去皮) 陈皮(去白) 白术各一两 丁香 缩砂各五钱 粉草三钱

【用法】上锉散。每服四钱，加生姜三片，乌梅一个，水煎，食前温服。

【主治】产前胸中宿有痰饮，产后多致眩晕。

27186 半夏茯苓汤

《东医宝鉴·外形篇》卷三。为《圣惠》卷十一“茯苓散”之异名。见该条。

27187 半夏茯苓汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】熟半夏 白茯苓

【主治】头汗，中焦闭塞，则周身不能敷布，但头有汗。

27188 半夏茯苓汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】白术(蜜炙) 半夏(汤泡，炒黄) 陈皮 砂仁各一钱(炒) 茯苓二钱五分 炙甘草五分 生姜三片 大枣二个 乌梅一个

【用法】水煎服。

【主治】妊娠恶阻，痰涎壅滞。

27189 半夏茯苓汤

【方源】《金匱翼》卷五。

【组成】半夏二钱 赤苓一钱 陈皮(去白) 甘草各五分 黄芩五分 生姜三片

【用法】煎作一服。

【主治】热痰，呕逆头痛。

27190 半夏茯苓散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】半夏 茯神各一两二钱 天麻(煨) 胆星 远志肉 枣仁(炒) 广皮 乌药 木香 礞石(煨)各八钱

【用法】上为散。每服三钱，水一盏，煎数沸，加生姜汁数匙，空心和滓服。

【主治】癫妄，因思虑不遂，妄言妄见，神不守舍，初病神气未衰者。

27191 半夏茯神散

【方源】《医略六书》卷二十二。

【组成】半夏二两(制) 茯神一两半(去木) 枣仁三两 远志一两半 胆星二两 天麻二两(煨) 陈皮一两半 木香一两 磁石三两 乌梅三两

【用法】上为散，水一盏，煎数沸，加姜汁一匙，调服三钱。

【主治】癫妄，脉弦滑者。

【方论选录】心虚，痰扰神明，不能安于神舍，故癫妄失伦，语言无绪焉。枣仁养心宁神，茯神安神定志，半夏燥湿痰醒脾，胆星清热痰快膈，远志通肾交心，磁石镇虚坠热，天麻祛风化痰，木香调和气化，陈皮利中气以化痰也，更以生姜散豁痰涎，乌梅收敛耗散之气而安神明也。为散煎服，使痰化气清，则神志得养而癫妄无不宁，语言无不清矣。

27192 半夏厚朴汤

【方源】《金匱》卷下。

【异名】厚朴汤(《圣济总录》卷一二四)、大七气汤(《三因》卷八)、四七汤、厚朴半夏汤(《易简方》)、七气汤(《直指》卷五)、四七饮(《杏苑》卷四)。

【组成】半夏一升 厚朴三两 茯苓四两 生姜五两 干苏叶二两

【用法】以水七升，煮取四升，分温四服，日三夜一服。

【功用】《中医方剂学讲义》：行气开郁，降逆化痰。

【主治】①《金匱》：妇人咽中如有炙脔。②《易简方》：喜、怒、悲、思、忧、恐、惊之

气结成痰涎，状如破絮，或如梅核，在咽喉之间，咯不出，咽不下，此七气所为也。或中脘痞满，气不舒快，或痰涎壅盛，上气喘急，或因痰饮中结，呕逆恶心。

【方论选录】①《金鉴》：此病得于七情郁气，凝涎而生，故用半夏、厚朴、生姜辛以散结，苦以降逆，茯苓佐半夏，以利饮行涎，紫苏芳香，以宣通郁气，俾气舒涎去，病自愈矣。②《金匱方歌括》：方中半夏降逆气，厚朴解结气，茯苓消痰；尤妙以生姜通神明，助正祛邪；以紫苏之辛香，散其郁气。郁散气行，而凝结焉有不化哉。

【临证举例】①梅核气 《临证偶拾》：张某，女，52岁，半年来咽部似有所塞，犹如梅核，如絮如膜。咽不下，咯不出，腹部作胀，有气攻冲，大便秘结，得矢气则舒，苔薄腻，脉沉弦。气机失畅，痰凝气滞，化痰导滞为主，半夏厚朴汤加枳实9克、姜竹茹9克、莱菔子9克、全瓜蒌12克、生甘草1.5克，二剂后咽部阻塞感消失，精神好转。②胃脘痛 《江苏中医》(1964; 10: 18)：谢某，男，21岁，脘痛牵引两胁，胸膈暖气频频，纳谷乏味，口渗清涎，脉象弦滑，舌苔薄腻。病起肝郁气滞，痰湿内阻，胃失和降，拟半夏厚朴汤损益，姜半夏一钱半、制厚朴六分、云茯苓四钱、苏叶一钱半、大麦芽四钱、炒枳壳一钱半、新会皮一钱半、粉甘草八分。服上方二剂后，脘痛大减，惟负重力屏气后又致胸膈且痛，原方加竹茹三钱，红枣四枚，二剂后愈。③眩晕 《江苏中医杂志》(1980; 6: 32)：徐某，男，46岁，头晕，目眩，耳鸣，作泛呕吐两天，视物旋转，头不能转侧，动则眩晕更甚，不思食，食入作泛呕吐。西医诊断为美尼尔氏综合症。中医会诊，除上述症状外，观形体稍胖，闭目怕睁，时有干恶，苔白腻，舌质稍胖淡，脉弦滑。拟下气消痰，降逆和胃，佐平肝熄风。取半夏厚朴汤加减：制半夏10克、川厚朴10克、云茯苓10克、老苏梗10克、珍珠母

(先煎)30克、双钩藤(后入)15克、代赭石(先煎)15克、广皮5克、炒苍术10克、建泽泻10克，五剂。服三剂后，自觉眩晕好转，能进些饮食，五剂毕，行动自如。

27193 半夏厚朴汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】红花 苏木各五厘 吴茱萸 干生姜 黄连各一分 木香 青皮各二分 肉桂 苍术 白茯苓 泽泻 柴胡 陈皮 生黄芩 草豆蔻仁 生甘草各三分 京三棱 当归梢 猪苓 升麻各四分 神曲六分 厚朴八分 半夏一钱 桃仁七个 昆布少许

【用法】上咬咀，作一服。水三盏，煎至一盏，去滓，稍热服。

【功用】《济阳纲目》：消胀化积。

【主治】中满腹胀，内有积聚，坚硬如石，其形如盘，令人不能坐卧，大小便涩滞，上喘气促，面色萎黄，通身虚肿。

【加减】渴，加葛根三分。

【备考】服广茂溃坚汤二服之后，中满减半，止有积不消，再服此药。

27194 半夏厚朴汤

【方源】《直指附遗》卷七。

【组成】半夏(汤泡七次) 厚朴(姜汁制) 山梔(去皮，炒黑) 川黄连(姜汁炒) 各一钱 广陈皮(去白) 八分 茯苓(去粗皮) 八分 甘草(生用) 三分 黑枳实(麸炒) 一钱 苍术(泔浸，炒) 八分 泽泻 香附子 青皮各五分 当归 白豆蔻各六分

【用法】上咬咀。用水一钟半，加生姜三片，煎八分，不拘时候服。

【主治】翻胃吐痰，胸满肋痛，嘈杂吐涎。

27195 半夏神曲汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】陈皮一钱 白术一钱五分 半夏一钱二分 干姜(炒) 八分 神曲(炒) 一钱 三棱(醋炒) 莪术(醋炒) 白茯苓(去皮) 山楂(去核) 枳实(炒) 各一钱 砂仁七分(炒) 麦芽(炒) 八分

【用法】加生姜三片，水煎，热服，不拘时候。

【主治】过食寒冷硬物及生瓜果，致伤太阴、厥阴、或呕吐、痞闷、肠癖，或腹痛恶食。

27196 半夏桂甘汤

【直指】卷二十一。为《伤寒论》“半夏汤”之异名。见该条。

27197 半夏桂枝汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】半夏六钱 秫米一两 白芍六钱 桂枝四钱 炙甘草一钱 生姜三钱 大枣二枚（去核）

【用法】水八杯，煮取三杯，分温三服。

【主治】饮退得寐，舌滑，食不进食。

27198 半夏桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】半夏（浆水煮四五沸，切，焙）三钱 桔梗（炒） 桑根白皮（锉，炒） 天南星（洗过）各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水二盏，加生姜一枣大（细切），同煎至半盏，去滓，食后、临卧温服。

【主治】脾肺寒热劳咳，痰盛呕逆。

27199 半夏栝楼丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】半夏（生姜制） 栝楼 杏仁（去皮尖） 麻黄 白矾（枯称） 疑冬花各等分

【用法】上为末，生姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎生姜汤送下，不拘时候。

【主治】远近痰嗽，烦喘不止者。

27200 半夏秫米汤

《兰台轨范》卷七。即《灵枢》卷十“半夏汤”。见该条。

27201 半夏涤痰汤

【方源】《锦京直指》卷二。

【组成】半夏曲一钱半（川制，另吃） 枳实钱半（炒） 白前二钱 旋覆花三钱

（包） 炒腹子六钱（杵，包） 橘红一钱 炙甘草五分 白茯苓三钱

【主治】泄泻忽来忽止，或溏水粘涕，兼乎滞痛。

27202 半夏通气散

《施圆端效方》引《简要济众方》（见《医方类聚》卷八十九）。为《外台》卷八引《广济方》“通气汤”之异名。见该条。

27203 半夏麻黄丸

【方源】《金匱》卷中。

【组成】半夏 麻黄各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三丸，饮送下，一日三次。

【主治】心下悸。

【方论选录】①《伤寒补正》：《伤寒论》心下悸用桂枝以宣心阳，用茯苓以利水邪。此用半夏、麻黄非故歧而二之也。盖水气凌心则心下悸，用桂枝者，助心中之火以敌水也；用麻黄者，通太阳之气以泄水也。彼用茯苓，是从脾利水以渗入膀胱，此用半夏，是从胃降水以抑其冲气，冲降则水随而降，方意各别。②《伤寒论注》：徐彬曰，阴邪者，痰饮也，故以半夏主之，而合麻黄，老痰非麻黄不去也。

【临证举例】心悸 《上海中医药杂志》（1984；12：21）：余治顾男，58岁，入冬以来，自觉心窝部跳动，曾作心电图无异常，平时除有老慢支及血压略偏低外，无他病，脉滑苔白。予以姜半夏、生麻黄各30克，研末和匀，装入胶囊。每日三次，每次二丸，服后心下悸即痊愈。

27204 半夏温肺汤

【方源】《医学发明》卷九。

【组成】细辛 橘皮 桂心 人参 旋覆花 甘草 桔梗 芍药 半夏各半两 赤茯苓三分

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】胃气虚冷，心腹中脘痰水冷氣，心

下汪洋,嘈杂肠鸣,多唾,口中清水自出,胁肋急胀痛,不饮食,脉沉弦细迟。

27205 半夏棋子粥

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】半夏二钱(汤洗七遍去滑) 干姜一钱(炮裂) 白面三两 鸡子白一枚

【用法】上为末,与面及鸡子白相和,搜,切作棋子,熟煮,别用熟水淘过。空腹食之。

【主治】脾胃气弱,痰多呕逆,不下饮食。

27206 半夏解毒汤

【方源】《校注妇人良方》卷七。

【组成】黄柏(炒) 黄芩(炒) 山梔子(炒) 半夏各等分

【用法】每服五钱,水煎服。

【主治】一切暑热毒,五心烦躁,口舌咽干。

27207 半夏橘皮汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】半夏(汤洗七遍去滑,切,焙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 厚朴(去粗皮,姜汁炙) 各一两 人参 白术 高良姜各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盞半,加生姜五片,大枣二个(去核),煎至一盞,去滓温服。

【主治】霍乱,心下痞满,饮食吐逆,水谷不化。

27208 半夏橘皮汤

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】半夏(汤洗十遍,切,焙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 杏仁(去皮尖双仁,麸炒,别研) 各一两 麻黄(去根节) 赤茯苓(去黑皮) 柴胡(去苗) 各一两一分 生姜(切,焙) 甘草(炙,锉) 各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盞,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾咳。

27209 半夏橘皮汤

【方源】《直格》卷下。

【组成】半夏(炮如法) 陈皮(汤浸洗去瓤) 甘草(炙) 人参 茯苓 黄芩(去其腐心) 各一两 葛根半两 厚朴(去皮)一

分

【用法】上锉,麻豆大。用水三盞,生姜一分(切),煎至一盞半,绞取汁,分作四份,食后温服。

【主治】伤寒杂病,呕逆,风眩,痰逆咳嗽,头痛,并风热反胃吐食诸证。

27210 半夏橘皮汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】四君子汤加陈皮 半夏 紫苏十一叶 砂仁五粒

【用法】加生姜三片,水煎,食远服。

【主治】头昏呕吐。

【备考】方中陈皮、半夏用量原缺。

27211 半夏橘皮汤

【方源】《准绳·伤寒》卷二。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 黄芩 半夏 厚朴 藿香叶 葛根 橘皮各等分

【用法】上咬咀。每服一两,水一碗,煎七分,去滓,加生姜自然汁少许温服,不拘时候。

【主治】呕吐不止。

27212 半夏橘皮汤

【方源】《医寄伏阴论》卷上。

【组成】半夏二钱 橘皮一钱 茯苓一钱 人参一钱 甘草一钱(炙) 干姜一钱

【用法】加大枣三个(擘),开水三杯煎,去滓顿服,不已再服。或加生姜八分。

【功用】温胃散水,涤痰降气。

【主治】伏阴病,呕利止,厥回而哕,或咳逆者。

【方论选录】方中以人参、甘草、大枣补益胃气;干姜、茯苓温胃散水;半夏、橘皮涤痰降气,故水虚相搏,痰饮塞胃,皆能已之。

27213 半夏橘皮饮

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】半夏(洗去滑,焙) 陈橘皮(去白,焙) 甘草(炙) 桂(去粗皮) 各三分 人参一两一分 大腹一枚(锉)

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，加生姜二片，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃虚寒痰盛，呕吐不食。

27214 半夏礞石丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】半夏四十枚(汤浸七遍) 巴豆四十粒(去皮心膜) 杏仁(去皮尖双仁)四十枚 猪牙皂荚(去皮)四十挺(四味用好醋浸七日取出，以布绞取汁熬成膏，入众药) 礞石(研细，炒)五钱 丁香 木香 沉香各二钱 槟榔半两 腻粉 硃砂 粉霜各一分

【用法】上十二味，将后八味捣研为末，入在前膏子内，一处再捣细令匀，丸如小豆大。看虚实，每服二丸，煎枣汤送下。烂嚼干柿，干咽下亦得。

【功用】下结胸、一切积滞。

【主治】痰块气积。

27215 半夏藿香丸

【鸡峰】卷十八。为《局方》卷四“丁香半夏丸”之异名。见该条。

27216 半夏藿香汤

【方源】《瘟疫论》卷上。

【组成】半夏一钱五分 真藿香一钱 干姜(炒)一钱 甘草五分 白茯苓一钱 广陈皮一钱 白术一钱(炒)

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】①《瘟疫论》：痰邪留于胸膈，胃口热甚，皆令呕不止，下之呕当去，今反呕者，此属胃气虚寒，少进饮粥，便欲吞酸者。②《会约》：瘟疫下后，脉静身凉，不渴不燥，胃寒呕逆。

27217 半温半热汤

【济阳纲目】卷三十四。为《医学正传》卷六引《活人》“半温半热汤”之异名。见该条。

27218 半温半热汤

【方源】《医学正传》卷六引《活人》。

【异名】半湿半热汤(《济阳纲目》卷三十四)。

【组成】半夏 茯苓 白术各七分 前胡 枳壳(麸炒黄色) 甘草(炙) 大戟各五分 黄芩 茵陈 当归各三分

【用法】上切细，作一服。加生姜三片，水二盏，煎至一盏，温服。

【主治】酒疸，身黄无热，靖言了了，腹满欲呕，心烦足热，或有癥瘕，心中懊恼，其脉沉弦紧细。

27219 半夏东流水汤

《圣济总录》卷四十二。为《千金》卷十二“半夏千里流水汤”之异名。见该条。

27220 半夏加茯苓汤

《外台》卷二。即《金匱》卷中“小半夏加茯苓汤”。见该条。

27221 半夏茯苓饮子

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】半夏二两 附子 赤茯苓 白术 人参 黄橘皮 丁香各一分

【用法】上为细末。每服五钱，加生姜，水煎，空心服。

【主治】痰饮呕吐。

【加减】心躁者，去丁香；饮甚者，加细辛，葶苈一分、枳实四个。

27222 半夏羚羊散

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】羚羊角(镑细末) 薄荷 羌活 半夏(炙)各钱半 白菊花 川乌(炮) 川芎 防风 车前子各五钱 细辛二钱

【用法】上为末。每服三钱，加生姜三片，水二钟，煎一钟，去滓服，或荆芥汤下。

【主治】痰湿攻伤，绿风内障。

27223 半夏半里中和汤

【方源】《疡科选粹》卷二。

【组成】人参 陈皮各二钱 黄芩 当归 白术 白芷各一钱五分 川芎 茯苓 皂角刺 乳香 没药 金银花 甘草节

【用法】水、酒各半煎服。

【主治】痈疡半阴半阳，似溃非溃，似肿非肿，此皆元气虚弱，失于补托所致。

27224 半夏千里流水汤

【方源】《千金》卷十二(注文)引《集验方》。

【组成】半夏 宿姜各三两 酸枣仁五合 黄芩一两 茯苓二两 秫米一升 麦门冬 桂心各二两 甘草 人参各二两

【用法】上㕮咀。以长流水五斗煮秫米，令蟹目沸，扬之三千遍，澄清取九升煮药，取三升半，分三服。

【主治】虚烦闷不得眠。

27225 半夏千里流水汤

【方源】《千金》十二。

【异名】半夏东流水汤(《圣济总录》卷四十二)、半夏汤(《玉机微义》卷九)。

【组成】半夏 宿姜各三两 生地黄五两 酸枣仁五合 黄芩一两 远志 茯苓各二两 秫米一升

【用法】上㕮咀。以长流水五斗煮秫米，令蟹目沸，扬之三千遍，澄清，取九升煮药，取三升半，分三服。

【功用】泻热。

【主治】①《千金》：胆腑实热，精神不守。②《圣济总录》：胆实生热，腹中气满，饮食不下，咽干头重，洒洒恶寒，两胁胀痛。

【方论选录】《千金方衍义》：实则邪气之凑，热则阳气之并。《千金》半夏千里流水汤本乎《灵枢》治阳气盛满不得入于阴、阴虚则目不瞑，故用半夏涤除痰涎，秫米滋培气化，加宿姜、茯苓佐上二味洁净胆腑，生地黄滋水制阳，枣仁敛津化热，黄芩外疏风木，远志内通壮火，逐流水以下趋，是无可借苇薪之炊矣。

27226 半夏天麻白术汤

《医方集解》。即《脾胃论》(人卫本)卷下“半夏白术天麻汤”。见该条。

27227 半夏生姜大黄汤

【方源】《准绳·类方》卷三。

【组成】半夏二两 生姜一两半 大黄二两

【用法】水五升，煮取三升，分二次温服。

【主治】①《准绳·类方》：反胃。②《证治汇补》：邪实呕吐，便秘可下者。

27228 半夏白术天麻汤

【方源】《脾胃论》(人卫本)卷下。

【异名】半夏茯苓天麻汤(《卫生宝鉴》卷九)、白术半夏天麻汤(《扶寿精方》)、半夏天麻汤(《杏苑》卷四)、半术天麻汤(《简明医彙》)。

【组成】黄柏二分 干姜三分 天麻 苍术 白茯苓 黄耆 泽泻 人参各五分 白术 炒曲各一钱 半夏(汤洗七次) 大麦蘖面 橘皮各一钱五分

【用法】上㕮咀。每服半两，水二盏，煎至一盏，去滓，食前带热服。

【功用】①《脾胃论》：温凉并济，补泻兼施。②《中医方剂学讲义》：补脾燥湿，化痰息风。

【主治】痰厥头痛，咳痰稠粘，头眩烦闷，恶心吐逆，身重肢冷，不得安卧，舌苔白腻，脉弦滑。现用于美尼尔氏综合征见有上述症状者。

【方论选录】①《脾胃论》：此头痛苦甚，谓之足太阴痰厥头痛，非半夏不能疗；眼黑头旋，风虚内作，非天麻不能除，其苗为定风草，独不为风所动也；黄耆甘温，泻火补元气；人参甘温，泻火补中益气；二术俱苦温甘，除湿补中益气；泽、苓利小便导湿；橘皮苦温，益气调中升阳；曲消食，荡胃中滞气；大麦蘖面，宽中助胃气；干姜辛热，以涤中寒；黄柏苦大寒，酒洗以主冬天少火在泉发燥也。②《医略六书》：脾气大亏，痰食滞逆，不能统运于中，故厥逆头痛眩暈不已焉。苍术燥痰湿以强脾；白术健脾元以燥湿；人参扶元补气，黄耆补气固中，天麻祛风湿以豁痰；泽泻泻浊阴以却湿；神曲消食积开胃，麦芽化湿和中；茯苓渗脾湿；半夏燥湿痰；橘红利气和胃；生姜快膈散痰；黄柏清湿热，干姜温中气也，使气健脾强，则自能为胃行其津液，而痰厥自平，食远温服，俾

痰化气行，则胃气融和而清阳上奉，头痛眩晕无不保矣。此温凉并济，补泻兼施之剂，为气虚痰厥头痛眩晕之专方。

【**临证举例**】①痰厥头痛 《脾胃论》：范天暎之内，素有脾胃之证，时显烦躁，胸中不利，大便不通，初冬出外而晚归，为寒气怫郁，闷乱大作，火不得伸故也。医疑有热，治以疏风丸，大便行而病不减，又疑药力小，复加七八十丸，下两行，前证仍不减，复添吐逆，食不能停，痰唾稠粘，涌出不止，眼黑头旋，恶心烦闷，气短促上喘，无力不欲言，心神颠倒，兀兀不止，目不敢开，如在风云中，头苦如裂，身重如山，四肢厥冷，不得安卧。余谓前证乃胃气已损，复下两次，则重虚其胃而痰厥头痛作矣，制半夏白术天麻汤主之而愈。②不寐 《吉林中医药》(1986; 6: 20): 丁某某，男，46岁。失眠已三月余，精神恍惚，头晕乏力，心悸气短，胸闷脘胀，嗳气泛恶，纳谷无味，大便不爽，舌质红，苔腻微黄，脉滑数。治拟和胃宁心，用半夏白术天麻汤加减：天麻10克，清半夏、白术、枳壳、黄连、橘皮各7.5克，茯苓、远志、麦芽、瓜蒌、枣仁、竹茹各15克，水煎服。共进24剂，能正常入睡，追访至今，未见复发。③美尼尔氏综合征 《安徽中医学院学报》(1985; 1: 17): 张某某，女，70岁。冬月冒寒，头昏头痛，视物旋转十天。西医诊为“美尼尔氏综合征”，服药罔效。刻下眩晕未减，泛恶干呕吐涎沫，心悸气短，胸痞纳差，口中粘腻，舌尖发麻，屢欲更衣，大便量少而细软，形体丰腴，舌苔白腻，六脉濡弱，诊为风痰上犯，中气蒙匿。处方：法半夏、天麻、陈皮各10克，白术12克，茯苓、党参、山楂各15克，吴茱萸5克，生姜6克，炙甘草3克。服药三剂，诸症大减，已不泛恶，继服三剂而愈。

【**备考**】①本方方名，《济生拔萃》本作“制半夏白术天麻汤”，《医方集解》引作“半夏天麻白术汤”。②改为丸剂，名“半夏天麻

丸”(见《北京市中药成方选集》)。

27229 半夏白术天麻汤

【**方源**】《奇效良方》卷二十五。

【**组成**】半夏一钱半 白术二钱 天麻茯苓(去皮) 橘皮 苍术 人参 神曲(炒) 麦蘖(炒) 黄耆 泽泻各一钱 干姜 草果各半钱

【**用法**】上作一服。水二钟，加生姜三片，煎至一钟，食远服。

【**主治**】头眩恶心烦闷，气喘短促，心神颠倒，兀兀欲吐，目不敢开，如在风云中，苦头痛眩晕，身重如山，不得安卧。

27230 半夏白术天麻汤

【**方源**】《古今医鉴》卷七。

【**组成**】半夏(制)一钱半 白术(炒)二钱 天麻一钱半

【**用法**】上锉一剂。加生姜三片，水二钟，煎八分，食后温服。

【**主治**】头眩眼黑，恶心烦闷，气促上喘，心神颠倒，目不敢开，头痛如裂，身重如山，四肢厥冷，不能安睡。

27231 半夏白术天麻汤

【**方源**】《医学心悟》卷三。

【**组成**】半夏一钱五分 白术 天麻 陈皮 茯苓各一钱 甘草(炙)五分 生姜二片 大枣三个 蔓荆子一钱

【**用法**】水煎服。

【**主治**】痰厥头痛者，胸膈多痰，动则眩晕。

【**加减**】虚者，加人参。

27232 半夏南星白附丸

【**方源**】《医钞类编》卷十。

【**组成**】半夏 南星 白附各等分

【**用法**】上药生用，为末，水为丸，以生面为衣，阴干。生姜汤送下。

【**主治**】痰眩冒，头痛，恶心，吐酸水。

27233 半夏茯苓天麻汤

《卫生宝鉴》卷九。为《脾胃论》(人卫本)卷下“半夏白术天麻汤”之异名。见该条。

27234 半夏茯苓陈皮汤

【方源】《济阳纲目》卷十八。

【组成】半夏(泡) 茯苓 陈皮(去白) 生姜各一钱半

【用法】上咬咀。水二盏半，煎一盏，去滓，临卧服。

【功用】消饮止呕，和中顺气。

27235 半夏桂枝甘草汤

《活人书》卷十七。为《伤寒论》“半夏汤”之异名。见该条。

27236 半夏黄连解毒汤

【方源】《直格》卷下。

【组成】黄连(去须) 黄柏 黄芩 大梔子各半两 半夏三枚 厚朴三钱(锉) 茯苓(去皮，锉)

【用法】水一盏半，加生姜三片，煎至半盏，绞汁温服。

【主治】火热狂躁，喘满，或腹满呕吐，或欲作利者。

27237 半夏茯苓汤加丁香汤

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】半夏三钱 茯苓二钱 丁香一钱 生姜三钱

【用法】水煎服。

【主治】伏饮虚者。

27238 半夏理中续膈破寒汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】半夏半升(制) 生姜四两 麻黄三两(去节) 前胡三两 泽泻三两 竹叶一升 细辛三两 枳实三两(炙) 杏仁三两(去皮尖)

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，分三服。

【主治】上焦气不续，胸膈间仄闷，饮食先吐而后下。

【宜忌】忌羊肉、饴、生菜。

27239 半夏泻心汤去干姜甘草加枳实杏仁方

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】半夏一两 黄连二钱 黄芩三钱 枳实二钱 杏仁三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。

【主治】阳明暑温，脉滑数，不食不饥不便，浊痰凝聚，心下痞者。

【方论选录】半夏、枳实开气分之湿结；黄连、黄芩开气分之热结；杏仁开肺与大肠之气痹。暑中热甚，故去干姜。非伤寒误下之虚痞，故去人参、甘草、大枣，且畏其助湿作满也。

27240 半夏泻心汤去人参甘草干姜大枣加枳实生姜方

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】半夏六钱 黄连二钱 黄芩三钱 枳实三钱 生姜三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。

【主治】呕甚而痞者。

【加减】虚者，复纳人参、大枣。

闪

27241 闪痛煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】枳壳 桔梗各八分 防风 乌药 当归 杏仁 半夏 木通各一钱 甘草 红花各五分

【用法】水煎服。

【主治】闪挫腰痛。

肝

27242 肝张膏

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】蓖麻仁八钱 大黄 红花 白芷 木鳖仁 生地 当归各三钱 黄柏 甘草 牡丹皮 赤芍药 黄芩 全蝎 蝉蜕 防风 穿山甲 白僵蚕 独活 乳香(去油) 没药(去油) 肉桂 川黄连 元参各二钱

【用法】共炒黑色。用真麻油八两，浸三日，入锅内熬百沸，用大肝张纸放油内，提透铺地上，出火毒，随疮大小剪贴。

【功用】长肉。

【主治】肿毒已溃者。

【加减】如杨梅疮，加活蜈蚣二条同熬。

加

27243 加干散

【方源】《医方类聚》卷二二引《仙传济阴方》

【组成】没药 当归 北芍药各三钱 桂二钱 麝香一分 川乌 茴香各三钱

【用法】上为末。酒调下。次服立效散。

【主治】妇人肌肉如针刺，或时呕吐者，因月经伤冷血痛。

27244 加皮酒

【方源】《医级》卷八。

【组成】加皮八两 当归 牛膝 白芍 川断各二两 木瓜 远志各一两

【用法】用酒十斤，和药纳瓷瓶内，重汤煮三炷香，日服之。

【主治】劳伤血风，男妇脚气及骨节皮肤疼痛。

27245 加皮露

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林方)。

【组成】五加皮 熟干地黄 丹参 杜仲(去粗皮，炙微黄) 蛇床子 干姜各三两 地骨皮二两 天门冬一两 钟乳石四两 白酒二十斤 冰糖一斤八两

【用法】上锉细，生绢袋盛，浸酒内二宿后，滤清，加入冰糖。每服一大杯，空腹时及晚食前烫温饮之。

【功用】疏风化湿。

【主治】肾风虚寒，小便余沥，妇人阴冷癖瘦，腰膝时痛，及瘫痪拘挛。

【宜忌】孕妇忌之。

27246 加吊藤散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】加吊藤叶(烘干，加黄酒少许炒焙) 62克 煅牡蛎 31克 白疔散 15克 氧化锌 9克

【用法】上为细末，调匀即成，或以清油、花生油制成油膏。外用。

【主治】急性湿疹。

【备考】加吊藤为大戟科植物石岩枫，俗名木梗梨头草、马西草、吊钩藤。

27247 加生化肾汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】熟地四两 生地二两 肉桂三分

【用法】水煎服。

【主治】阴亏之至，小便不通，目睛突出，腹胀如鼓，膝以上坚硬，皮肤欲裂，饮食不下，口不渴者。

27248 加连生化汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎一钱五分 当归三钱 白芍一钱(炒) 川连六分(姜汁炒) 枳壳五分 茯苓一钱 甘草四分 木香三分

【用法】水煎服。

【主治】产后痢症。

【加减】积重者，加山楂一钱。

27249 加苓调脾散

【方源】《医钞类编》卷十九引聂氏方。

【组成】白术 茯苓 神曲(炒) 白芍(酒炒) 扁豆(去壳，姜汁浸炒) 砂仁(炒) 香附(炒) 厚朴 炙草

【用法】加煨姜、大枣，水煎服。

【主治】痘疹，脾气虚弱，泄泻。

【加减】可加人参。

27250 加味二冬汤

【方源】《证治汇补》卷五。

【组成】天冬 麦冬各一钱半 生地 熟地各二钱 款冬 桔梗 贝母 紫菀 茯苓 甘草 沙参 瓜蒌霜各一钱

【用法】水煎服。

【主治】火盛水亏之咳嗽，痰涎腥秽，将成痼疾者。

【方论选录】《医略六书》：麦冬清心润肺燥，天冬润肺燥益阴、生地滋阴壮水以制火，熟地补阴益肾以填精，沙参泻热补肺，川贝清肺化痰，萎霜搜涤燥痰，桔梗清利咽喉，紫菀泄肺以肃金，款冬润肺以散结，茯苓清肺和脾，生草泻火缓中也。俾水旺火平，则肺

金自润，而肺气宣通，无不痰消咳止。

27251 加味二母丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】知母 贝母(用巴豆同炒黄色，去巴豆) 白矾 白及各等分

【用法】上为末，姜汁和蜜为丸。含化。

【主治】久嗽、癆嗽、食积嗽。

27252 加味二陈汤

【方源】《普济方》卷一三〇引《活人书》。

【组成】陈皮二钱 茯苓三钱 半夏三钱(泡洗) 甘草三钱 枳实二钱 竹茹三钱

【用法】上咬咀。每服三钱，以水二盏，加生姜七片，煎至七分，去滓。徐徐一口，服毕，再服一口，以尽为度，不可急咽。

【主治】伤寒三五日之内，发热发寒，干呕，饮水即吐，粥食入口即吐。

27253 加味二陈汤

【方源】《直指》卷五。

【组成】半夏 陈皮 茯苓 甘草 黄芩 枳壳 真苏子 桔梗 白豆蔻仁 山栀子仁 各等分

【用法】上咬咀。每服五钱，加生姜一片，水一盞，煎六分，食后徐徐服。

【主治】梅核气。

27254 加味二陈汤

【方源】《直指》卷七。

【组成】半夏(姜汁)一钱五分 白茯苓 白术各一钱 香附一钱二分 连翘 黄芩 枳实(麸炒) 前胡 甘草 瓜蒌仁 桔梗 麦芽 神曲(炒) 陈皮(盐水浸，炒)各一钱

【用法】上咬咀。水二盞，加生姜三片，煎一盞服。

【主治】湿痰。

27255 加味二陈汤

【方源】《医部全录》卷二四〇引《直指》。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 姜黄 枳壳各少许

【用法】用水二盞，加生姜五片，大枣二枚，煎八分。食远服。

【主治】酒面积热成疾，手臂痛，并痰攻眼肿，身麻痹。

27256 加味二陈汤

【方源】《医方类聚》卷一〇五引《澹寮》。

【组成】半夏 橘红各五两 茯苓(去皮) 三两 甘草二两 丁香二两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜七片，乌梅一个，煎至六分，热服。

【主治】①《医方类聚》：痰生呕吐。②《济阳纲目》：痰饮为患，呕吐头眩，心悸，或因食生冷硬物，脾胃不和，时吐酸水。

【加减】恶甜者，减甘草。

27257 加味二陈汤

【方源】《得效》卷三。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓各一两 甘草五钱 丁香 胡椒各三钱

【用法】上锉散。每服四钱，加生姜三片，乌梅一个同煎，不拘时热服。

【主治】痰晕，或因冷食所伤。

27258 加味二陈汤

【方源】《得效》卷十四。

【组成】陈皮 白茯苓各一两半 半夏一两 白术七钱半 粉草三钱

【用法】上锉散。每服四钱，加生姜三片，乌梅一个，水煎，食前服。未效，加生姜汁。

【主治】妇人中脘宿有痰饮，受胎一月或两月，因经停气滞，呕吐择食，为恶阻者。

27259 加味二陈汤

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】半夏 陈皮各五两 白茯苓三两 甘草(炙)一两半 砂仁一两 丁香五钱 生姜三两

【用法】水煎服。

【主治】停痰结气而呕。

27260 加味二陈汤

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】二陈汤加砂仁一钱 青皮半钱

【主治】闻食气则呕。

27261 加味二陈汤

【方源】《医学正传》卷二引丹溪方。

【组成】橘红 茯苓各七分 半夏(汤泡洗)一钱 甘草(炙)三分 川芎 苍术 白术各八分 山楂肉一钱五分 砂仁五分 神曲(炒)七分 香附子一钱 麦蘖面(炒)五分

【用法】上除神曲、麦蘖面细研炒，另包，余细切，作一服，加生姜三片，大枣一枚，水二盏，煎至一盏，调神曲，麦蘖入内服。

【功用】导痰补脾，消食行气。

27262 加味二陈汤

【方源】《医学正传》卷三引丹溪方。

【组成】陈皮(去白)一钱 半夏一钱五分(炮) 茯苓一钱 甘草(炙)三分 梔子(炒)一钱 黄连(姜汁拌炒)一钱五分 川芎一钱 白术一钱 干姜(炒)五分 苍术一钱 香附一钱 牡荊子(炒另研)一钱半

【用法】上切细，作一服。水二盏，加生姜三片，煎至一盏，稍热服。

【主治】胃中有伏火，膈上有稠痰，时常胃口作痛，及恶心吐清水不快。

【加减】如胃口疼甚，加生姜自然汁一合；挟虚者，加人参一钱。

27263 加味二陈汤

【方源】《景岳全书》卷五十四引丹溪方。

【组成】苍术(米泔浸) 白术(炒) 橘红 半夏(泡) 茯苓 川芎 香附各八分 枳壳 黄连(姜炒) 甘草各五分

【用法】水一盏半，煎八分，食前稍热服。

【主治】食郁痰滞，胸膈不快。

27264 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷十八引丹溪方。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄连(姜汁炒) 梔子(炒) 苍术 川芎 香附 砂仁 神曲(炒) 山楂 木香少许

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【主治】胃中有火，膈上有痰，令人时常恶心，呕吐清水，作噎气吞酸等证。

【加减】久病虚者，加人参、白术；胃寒者，加益智、草豆蔻、干姜、桂心之类，去黄连、

梔子，又甚者加丁香、附子；如胁痛，或脾痛，右关脉弦，呕吐不已，此木来侮土，加人参、白术、升麻、柴胡、青皮、芍药、川芎、砂仁、神曲之类；如时常吐清水，或口干，不喜食，冷涎自下而涌上者，此脾热所致，加白术、芍药、升麻、土炒芩连、梔子、神曲、麦芽、干生姜；如时常恶心，吐清水，心胃作痛，得食则暂止，饥则甚者，此胃中有虺也，加苦楝根、使君子煎服即愈，或用黑锡灰、槟榔各等分，米饮调下。

27265 加味二陈汤

【方源】《普济方》卷二〇六引《经效良方》。

【组成】半夏(汤泡七次) 陈皮 茯苓各半两 甘草一钱半(炙，锉) 刮竹青四两

【用法】上为末。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎七分，去滓温服。不拘时候。

【主治】胃热呕吐不已。

27266 加味二陈汤

【方源】《普济方》卷一五七引《德生堂方》。

【组成】人参 半夏 白茯苓 甘草 陈皮 紫菀 紫苏 枳壳(炒，去瓤) 桑白皮 缩砂仁 白豆蔻各一两 木香半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎至八分，去滓。临卧服之。

【主治】远年近日，气虚咳嗽，喘逆呕吐，不得安眠，甚危困者。

27267 加味二陈汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】茯苓 半夏 陈皮 枳实 甘草 桔梗 杏仁 贝母 瓜蒌仁 黄连

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】痰实结胸。喘咳，胸胁满痛，作寒热，脉洪滑，心烦口渴者。

【加减】胸腹满，加砂仁，去甘草；痰渴，去半夏，加知母，天花粉；嗽，加五味；喘，

加桑皮、苏子；胁满痛，加青皮、白芥子、木香；有热痰结，加柴、芩、竹沥、姜汁少许，去半夏；有寒痰结，加干姜、姜汁，去贝母、黄连；风痰结，加南星、竹沥、姜汁；火痰，加山栀、黄芩、竹沥、姜汁少许，去半夏。

27268 加味二陈汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】橘红（盐水浸）八分 半夏（姜汁炒）一钱五分 白茯苓（去皮）白术各一钱三分 香附（盐水拌炒）七分 连翘 黄芩（炒）枳实（麸炒）前胡 甘草各五分（炙）瓜蒌仁 桔梗 麦蘖（炒）各一钱

【用法】上切细。用水二盏，加生姜三片，水煎，临服入姜汁三匙，竹沥一杯服。

【功用】治痰，理脾胃。

【备考】《明医杂著》无枳实，主治脾胃气盛，痰多或喘。

27269 加味二陈汤

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】陈皮（去白）半夏（汤泡）桔梗（米泔水浸）川芎各五分 白术一钱 黄芩（酒炒）薄荷各三分 防风 甘草（炙）各四分 白茯苓（去皮）桑白皮（蜜炙）各七分

【用法】上切细。用水一盏半，加生姜三片，煎至八分，去滓服。

【主治】小儿感冒发热，鼻流清涕，或咳嗽痰吐，病情沉重者。

27270 加味二陈汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】陈皮一钱五分 半夏六分 茯苓八分 甘草三分 香附 木通 贝母 知母

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】痰气壅塞，小便不通。

27271 加味二陈汤

【方源】《丹溪心法附余》卷九。

【组成】半夏 橘红 茯苓 甘草（炙）黄连（姜汁炒）黄芩（姜汁炒）各一钱半

【用法】上作一服。水二钟，加生姜五片，

煎八分，温服。

【主治】恶心因痰有热者。

27272 加味二陈汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓 白术 苍术 益智仁（盐水炒）各一钱 炙草五分 升麻四分 柴胡七分

【用法】加生姜为引，水煎服。

【主治】白浊。

27273 加味二陈汤

【方源】《广嗣纪要》卷十二。

【组成】陈皮一钱半 白茯苓 半夏（炒）各一钱 甘草三分 黄连（姜汁炒）吴萸（炮，去皮）三分

【用法】水一钟半，加生姜五片，煎服。

【主治】吐酸水同食物出者，热也。

27274 加味二陈汤

【方源】《医统》卷二十四。

【组成】陈皮 茯苓 半夏曲各一钱 甘草 藿香 砂仁各五分 白术 神曲 人参各七分

【用法】水二盏，加生姜五片，大枣一枚，煎八分。温服。

【主治】冷热不调，气逆冲上，呕吐者。

27275 加味二陈汤

【方源】《医统》卷五十三。

【组成】陈皮 半夏 人参 茯苓 黄芩 川芎各一钱 甘草 木香各五分（磨汁）

【用法】用水二盏，加生姜三片，煎七分，食后服。

【主治】气郁痰火眩运。

27276 加味二陈汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】陈皮一钱 半夏一钱半（姜泡）茯苓一钱半（盐水炒）白术一钱 桔梗一钱 石菖蒲七分 黄柏二分 知母三分 梔子（炒黑）一钱半 升麻一钱（酒炒）柴胡一钱（酒炒）甘草一钱

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】遗精。

27277 加味二陈汤

【方源】《保命歌括》卷三十二。

【组成】二陈汤加南星 苍术 川芎

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】湿痰流注，胁内作痛。

27278 加味二陈汤

【方源】《医方考》卷五。

【组成】半夏 陈皮 茯苓 黄芩（酒炒）
甘草 川芎 细辛 黄连（酒炒） 薄荷 苍
耳子 胆南星

【主治】头风，偏头风。

【方论选录】是方也，半夏、陈皮、茯苓、
甘草，治痰之二陈汤也；加南星之燥，皆所以
治痰耳；而黄芩、黄连者，用其苦寒以治
热也；若川芎、细辛、薄荷、苍耳，皆治风
之品也。高巅之上，惟风可到，是故用之。

【备考】《济阳纲目》本方用法：上锉。加
生姜，水煎服。

27279 加味二陈汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 酒芩
羌活 苍术

【用法】用水二钟，加生姜三片，水煎服。

【主治】诸湿。

【加减】湿在上部，加苍术；在下，加升麻；
内湿，加猪苓、泽泻；中焦湿与痛热，加黄
连，有实者亦用之；肥白人因湿沉困倦怠是
气虚，加苍术、白术；黑瘦人沉困倦怠是湿
热，加黄芩、白术、芍药。

27280 加味二陈汤

【方源】《便览》卷二。

【组成】二陈汤加白术 山楂 川芎 苍
术

【用法】水煎服。

【功用】导痰健脾。

【主治】伤食恶食，胸中有物。

27281 加味二陈汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】陈皮 半夏（姜制） 白茯苓（去
皮） 当归 枳实（麸炒） 桔梗（去芦） 杏

仁（去皮尖）各一钱 良姜 砂仁各七分 木
香 官桂 甘草各三分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】痰厥晕倒。

【加减】气逆，加苏子；元气虚弱，去枳实。

27282 加味二陈汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮二钱 半夏（姜炒）二钱 白
茯苓（去皮）三钱 苍术一钱五分 厚朴
（姜汁炒）八分 砂仁八分 山药（炒）一钱
半 车前子二钱 木通二钱 甘草八分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，乌梅一个，
灯心十茎，水煎，温服。

【主治】因痰而致泄泻，或多或少，或泻或
不泻者。

27283 加味二陈汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮二钱 半夏（姜炒）二钱 枳
实（麸炒）一钱 黄连（姜炒）六分 山楂
（去子）二钱 木香八分 青皮（去瓢）二钱
白茯苓（去皮）三钱 砂仁八分 甘草八分

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【主治】痰气郁结，或饮食停滞而为痞满，
按之，无块者。

27284 加味二陈汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄芩
各八分 黄连 薄荷各五分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎八分，食
前服。

【主治】痰饮流注舌下，发肿作痛，针刺已
破者。

27285 加味二陈汤

【方源】《痰火点雪》卷一。

【组成】陈皮（去白） 半夏（姜泡） 茯
苓（去皮） 南星（牛胆制佳） 香附（去
毛，童便炒） 青皮（去白） 青黛各等分

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】咳嗽胁痛。

27286 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷十一。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄连 干葛各一钱

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】伤酒恶心，呕逆，吐出宿酒，昏冒眩晕，头痛如破。

27287 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷十五。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 山楂 神曲 桔梗 南星 枇杷叶 黄连 竹茹

【用法】上锉。加生姜煎，临熟入姜汁一匙调服。

【主治】痰火停食，腐化酸水，吐出黄臭，或醋心不安。

27288 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷十八。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 人参 白术 升麻 柴胡 青皮 芍药 川芎 砂仁 神曲

【用法】上锉。加生姜五片，水煎服。

【主治】木乘土，胁痛或脾痛，右关脉弦，呕吐不已。

27289 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷二十。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓 甘草 苍术 防风 川芎 白芷（一云白术）

【用法】上锉。加生姜五片，水煎服。

【主治】外邪霍乱。

27290 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷二十四。

【组成】陈皮（去白） 杏仁（去皮尖）各一钱半 白茯苓 贝母（去心） 半夏（汤泡） 瓜蒌仁 桔梗 前胡（去芦） 片苓 各一钱 枳壳（麸炒） 石膏各八分 甘草（炙）三分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，食远服。

【功用】泻肺胃火，消痰止嗽。

27291 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】陈皮（去白） 半夏 茯苓 甘草（炙） 桔梗 桑白皮 瓜蒌仁 杏仁

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】嗽动有痰，痰出嗽止。

【加减】如胸膈作闷，加枳壳、紫苏；春，加薄荷、荆芥；夏，加黄芩、黄连，有火，亦加芩、连。

27292 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷五十一。

【组成】陈皮 半夏 当归 干葛 元参 各一钱 黄芩 茯苓各八分 黄连七分 甘草五分

【用法】上锉，作一服。加生姜三片，水煎服。

【主治】内热恶寒。

27293 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷五十四。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 白术 黄连 远志

【用法】上水煎，加竹沥、生姜汁服。

【主治】怔忡惊悸，时作时止，心下有痰。

27294 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷七十三。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 人参 白术 苍术 川芎 神曲（炒） 麦芽（炒）

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【功用】补泻兼施。

【主治】气虚之人，因饮食过伤而腹痛者。

27295 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷七十三。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄芩 黄连 山梔子

【用法】上锉。水煎服。

【主治】肠鸣。因火动其水，腹中水鸣作痛。

27296 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷七十五。

【组成】南星（姜制） 半夏（姜制）各一钱半 苍术（米泔浸炒） 黄柏（煨） 陈

皮各一钱 茯苓八分 甘草五分 (一方二陈汤加南星、香附、乌药、枳壳)

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】痰积腰痛，脉滑者。

27297 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷七十八。

【组成】陈皮 半夏 茯苓各一钱 甘草三分 酒芩 羌活各一钱 威灵仙三钱 南星 香附各一钱 苍术一钱半 白术一钱

【用法】上锉一服。加生姜三片，水煎服。

【主治】臂痛，乃上焦湿痰横行经络所致。

27298 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷七十八。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄芩 (酒洗) 羌活 红花

【用法】上锉。水煎服。

【主治】痰热客于太阳经，项强不能回顾，动则微痛，其脉弦而数矣。

27299 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷八十二。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 苍术 白术 桃仁 红花各一钱 附子少许

【用法】上锉。水煎服。

【主治】十指麻木，属胃中有湿痰死血者。

27300 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷九十二。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 香附 木通各等分

【用法】上锉。水煎服，后煎滓探吐，以提其气。

【主治】忿怒气结，闭遏不通。

27301 加味二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷一〇五。

【组成】半夏 (姜制) 一钱三分 茯苓 黄连 青竹茹各一钱 生地黄 (酒洗) 一钱半 当归 (酒洗) 陈皮 (去白) 各八分 桔梗五分 甘草梢二分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，食后服。

【功用】清火化痰。

【主治】舌下肿结如核，或重舌、木舌及满口生疮。

27302 加味二陈汤

【方源】《医学正印》。

【组成】当归 (酒洗) 一两 茯苓二两 川芎七钱五分 白芍药 白术 半夏 (汤洗) 香附米 陈皮各一两 甘草五钱

【用法】上作十帖。每帖加生姜三片，水煎服。

【主治】妇人肥盛不能孕育者。

27303 加味二陈汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】甘草八分 半夏一钱 茯苓一钱 陈皮一钱五分 南星 枳实 黄芩 白术 黄连 瓜蒌仁 桔梗 杏仁 山楂 柴胡 (少佐) 贝母 金沸草 姜汁 竹沥

【用法】年力壮盛者，先吐去痰，后服此药。

【主治】食积夹痰，憎寒恶风，自汗，胸膈满闷，气上攻冲，头不昏痛，项不强，无热者。

27304 加味二陈汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】半夏 陈皮 白茯苓 甘草各八分 藿香梗 砂仁 厚朴 香附各一钱 山楂肉 红豆蔻各六分

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】气郁伤脾，饮食停胃，以致呕吐。

27305 加味二陈汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白茯苓 陈皮 半夏各一钱 厚朴 桔梗 枳实 黄芩 贝母 (去心) 苏子各一钱二分 甘草 肉桂各二分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】梅核气。六郁七情神思所伤，结成痰核，介介喉中，咯之不出，咽之不下。

27306 加味二陈汤

【方源】《证治宝鉴》卷二。

【组成】二陈汤加僵蚕 全蝎 荆芥 天麻 菖蒲 远志 制南星

【用法】水煎，入姜汁、竹沥，早、晚服。七帖后加贝母、白术 (土炒)。

【主治】痢症，痰盛而不矜下者。

【宜忌】忌猪、羊、鱼、面、鸡、鹅、酒色、猪肝、猪首、蹄爪、煎炒。

27307 加味二陈汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】陈皮 半夏 甘草 茯苓 山楂 香附 川芎 苍术 砂仁

【用法】水煎服。

【主治】妊娠气不调和，饮食伤而气实者。

27308 加味二陈汤

【方源】《幼科铁镜》卷六。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓 甘草 厚朴 香薷 黄连 山楂 麦芽 神曲 木通 泽泻

【主治】夹暑伤寒吐泻。

27309 加味二陈汤

【方源】《胎产要诀》卷上。

【组成】二陈加苍术三钱 白芷 黄芩各二钱 黄连 黄柏各一钱半 白芍 椿根皮(炒) 茵肉各二钱半

【主治】带下属湿痰者。

27310 加味二陈汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】麦门冬(去心) 前胡 栝蒌仁 陈皮 半夏(姜制) 茯苓 甘草(生) 枳壳(麸炒) 桔梗 杏仁(炒，去皮尖) 黄芩

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】疮痘之火，炼液成痰，上壅气道。喉中作声。

27311 加味二陈汤

【方源】《吴氏医方类编》卷三。

【组成】二陈汤加羌活 荆芥各一钱 防风二钱 白芍二钱 苍术二钱 归身四钱 麦冬二钱 草薢一钱

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】痞瘕。

27312 加味二陈汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓 防风 天

麻 连翘 甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻后有痰。

【备考】麻后有痰而不吐痰者，宜用加味二陈汤去半夏、甘草，加贝母、栝蒌霜主之。

27313 加味二陈汤

【方源】《经验广集》卷一。

【组成】陈皮五钱 半夏二钱 茯苓一钱半 生甘草七分 白芥子一钱

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】《外科证治全书》：流注、癰核、皮里膜外之凝痰。

【备考】《外科证治全书》：宜兼阳和丸用。

27314 加味二陈汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】陈皮(去白)一钱半 半夏二钱 茯苓二钱 甘草一钱 川芎八分 蔓荆子一钱 北细辛三分

【用法】姜汁为引。

【主治】痰厥头痛；或呕恶咳嗽，寸关脉滑者。

【加减】如兼虚者，加白术一钱半，山药(炒黄)三钱；如兼火者，加黄芩、花粉各一钱半，石膏二钱。

27315 加味二陈汤

【方源】《会约》卷八。

【组成】半夏二钱半 茯苓三钱 陈皮二钱 甘草一钱 苍术一钱三分 桔梗一钱

【用法】加生姜六分，大枣一枚，水煎服。

【主治】脾经湿滞，痰甚而脉弦滑者。

【加减】若呕吐吞酸，胃脘痛，呃逆，加丁香九粒；若胸膈不快，加香附八分，枳壳一钱；食滞，加神曲一钱。

27316 加味二陈汤

【方源】《会约》卷九。

【组成】陈皮(去白)一钱半 半夏二钱 茯苓一钱半 甘草一钱 桔梗二钱 枳壳一钱半 桂枝一钱 杏仁(去皮)一钱 苍术一钱 当归一钱 紫苏叶七分 北细辛三分

【用法】加生姜八分，水煎，热服。

【主治】四时感冒，咳嗽，寒热，身痛，鼻塞；或病愈而咳痰，久不止者。

【加减】肺寒而邪不散者，加麻黄（留节）六七分；肺有火者，加黄芩一钱，甚者，再加梔仁（炒黑）七八分；如痰盛气滞，胸胁不快者，加白芥子七八分；如咳嗽遇秋冬即发者，此寒包热也，但解其寒，其热自散，宜用此方加麻黄（去节）七八分。

27317 加味二陈汤

【方源】《会约》卷九。

【组成】陈皮（去白）一钱 半夏一钱半 茯苓二钱 甘草一钱 桔梗 枳壳各一钱半 麻黄（去节）八分 杏仁二十粒（去皮尖） 桂枝一钱

【用法】水煎，加生姜汁合服。

【主治】肺感风寒，痰稠喘急，脉浮紧者。

27318 加味二陈汤

【方源】《医钞类编》卷十。

【组成】陈皮 法夏 白术 白茯苓 苍术 厚朴 砂仁 车前 木通 淮药 甘草

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】痰泄或多或少，时泄时止。

27319 加味二陈汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】橘红一钱 半夏一钱五分 茯苓二钱 白术一钱 苡仁四钱 枳壳一钱 砂仁一钱 苏梗一钱 花椒子二十四粒 生姜三片

【主治】胃咳。咳而呕恶，甚则呕虫。

27320 加味二陈汤

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】陈皮二钱 法夏二钱（研） 茯苓二钱 党参二钱 炙甘草二钱 川朴二钱（捣）

【主治】痰证呃逆。因痰结于胸，丹田之气不能上升而然。

27321 加味二陈汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】陈皮二钱 法夏一钱半 茯苓三

钱 甘草五分 茅术一钱 枳壳二钱 生姜一片

【用法】水煎服。

【功用】燥湿化痰，兼能止呕。

【主治】妊娠恶阻属于痰湿者。症见胸脘胀闷，不欲食，食则呕吐涎沫，恶油腻，舌质淡，脉濡而滑。

【加减】气虚及曾经有过流产的，去枳壳，加续断三钱，泡参三钱，薪艾三钱，砂仁一钱。

27322 加味二妙丸

《寿世保元》卷五。为《医学正传》卷四“加味三妙丸”之异名。见该条。

27323 加味二妙丸

【方源】《简明医彙》卷二。

【组成】苍术四两 黄柏（酒炒）二两 牛膝 防己 当归（俱酒浸） 川草薢 龟版（酥、酒炙） 熟地（捣）各一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心盐酒送下。

【主治】两足感湿热，肿痛如火，渐至胯腹，或脚气常发。

27324 加味二妙丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】苍术四两 黄柏二两 归尾 苡仁 牛膝 草薢 防己 龟版各二两

【用法】酒糊为丸。生姜盐汤送下。

【主治】脚气，嗜酒致痛，脚如火燎。

27325 加味二妙汤

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】防己 当归 川草薢 黄柏 龟版 牛膝 秦艽 苍术

【主治】湿热痿痹，两足痿软，局部发热难当。

27326 加味二妙汤

【方源】《金鉴》卷七十。

【组成】黄柏（生） 苍术（米泔浸，炒） 牛膝各三钱 槟榔 泽泻 木瓜 乌药各二钱 当归尾一钱五分

【用法】用黑豆四十九粒，生姜三片，水三

钟,煎一钟;再煎滓,水二钟半,煎八分服。

【主治】青腿牙疳,两腿起紫黑云片,牙龈腐烂如疳,行步艰难。

27327 加味二妙散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】黄柏七分 苍术 归尾 赤芍 桃仁 南星 牛膝 胆草各一钱 黄芩 连翘 羌活各五分 红花 木通 甘草各三分 金银花二钱

【用法】用水一钟,煎八分,加姜汁二匙,食前服。

【主治】膝肿初起者。

27328 加味二妙散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】苍术一两(炒) 黄柏二两(盐水炒) 龟版二两(盐水炒) 萆薢二两 知母二两(盐水炒)

【用法】上为散。每服三钱,人中白煎汤调下。

【主治】阴内生疮,脉细数者。

【方论选录】湿热内甚,浸淫不化而下注阴中,故阴内生疮焉。苍术燥湿强脾以治疮,黄柏清热燥湿以存阴,知母清热壮水,萆薢利湿分清,龟版滋阴壮水,以清湿热下注之源也。人中白汤调下,使小便清利,则湿热自化,而经府清和,何阴内生疮之患哉?

27329 加味二妙散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】黄柏二钱 苍术三钱 藿香二钱 茯苓四钱 车前子三钱 冬瓜皮四钱 莲须三钱 白芷一钱半

【用法】水煎服。

【功用】导湿化浊,兼以清热。

【主治】湿热带下,湿邪偏重,白带量多而稠粘,头胀胸闷,面目及四肢略显浮肿,脉濡,苔垢腻。

27330 加味二妙散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】苍术 黄柏 土茯苓各三钱 白

芷 蛇床子各二钱 银花四钱

【用法】水煎,食远服。

【功用】清理下焦湿热,兼可杀虫。

【主治】湿热下注,阴内或外阴部瘙痒异常,时时出水,甚或疼痛,坐卧不宁,小便黄赤短涩,淋漓不断,或便时疼痛,食欲减少,咽干口苦心烦,睡眠不安,舌苔黄腻,脉弦滑而数。

【加减】白带色黄量多者,加莲须、贯仲各三钱。

27331 加味二黄散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】生地黄 熟地黄 旱莲草 女贞子各三钱 白术二钱

【用法】水煎,温服。

【功用】养血滋阴。

【主治】妊娠血虚,胎漏下血,量少色淡,头晕目眩,手心热,心烦、腹微痛,舌质红,苔薄黄,脉虚数而滑。

27332 加味十全汤

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】人参 黄耆(盐水炒) 熟地黄(自制) 当归身(酒洗) 茯苓各一钱 川芎七分 粉草五分 桂心三分 橘红一钱 乌药五分 白芍药一钱 白术(炒)一钱五分 五味子五分

【用法】水煎服。

【功用】补气血,进饮食。

【主治】痢疽溃后,气血虚弱者。

27333 加味十奇散

《得效》卷十九。为原书同卷“固垒元帅”之异名。见该条。

27334 加味十宣散

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】人参一钱 当归二钱 黄耆一钱 甘草一钱 白芷一钱 川芎一钱 桔梗一钱 厚朴(姜制)五分 防风三分 肉桂三分 忍冬藤五分

【用法】水煎服。

【主治】疮疡因外感风寒，内因气血虚损者。

【加减】如脉缓涩而微，加黄耆、白术、人参；如脉弦身倦，加当归、白芍、麦冬；如脉紧细，加桂枝、生地、防风；如脉洪大而虚，加黄耆、黄连。

27335 加味七子丸

【方源】《医学正印》

【组成】菟丝子（淘洗，酒蒸） 川牛膝（去芦，酒蒸） 麦门冬（去心，酒蒸） 山茱萸（取肉） 原蚕蛾 五味子各一两三钱 蛇床子（酒蒸）一两六钱 车前子（淘洗）一两七钱 大甘草（炙）一两 沙苑蒺藜子（马乳浸蒸） 覆盆子各二两二钱 补骨脂子二两二钱（淘洗，炒） 肉苁蓉二两五钱（酒浸，去鳞膜）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸或四十丸，淡盐汤送下，早、晚皆服。

【主治】肾虚无子。

27336 加味七气汤

【方源】《济生》卷二。

【组成】半夏（汤泡七次）三两 桂心（不见火） 玄胡索（炒去皮）各一两 人参 甘草（炙）各半两 乳香三钱

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盂半，加生姜七片，大枣一枚，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七气为病，发则心腹刺痛不可忍；时发时止，发则欲死；或外感风寒湿气作痛。

【加减】妇人血痛，加当归。

【备考】本方方名，《观聚方要补》引作“加味四七汤”。

27337 加味七气汤

【方源】《准绳·类方》卷四引《医学统旨》。

【组成】蓬术 青皮 香附（俱米醋炒）各一钱半 延胡索一钱 姜黄一钱 草豆蔻仁

八分 三棱（炮）七分 桂心五分 益智仁七分 陈皮八分 藿香七分 炙甘草四分

【用法】水二钟，煎八分，食前服。

【主治】七情郁结心腹痛，或因气而攻痛。

【加减】死血胃痛加桃仁、红花各一钱。

27338 加味七气汤

【方源】《风劳腋膈四大证治》。

【组成】木香 厚朴 半夏 青皮 苍术 枳壳 陈皮 茯苓 甘草

【主治】气郁，胃口结聚痰涎，呕吐，胸膈痞闷，不思饮食。

【备考】原书用本方治上证，加山栀、沉香。

27339 加味七味丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】熟地黄八两（清水煮，捣烂入药） 山茱萸（去核）四两（酒蒸，晒干，炒） 牡丹皮三两（炒） 茯苓三两（人乳拌透，晒干，焙） 怀山药四两（炒黄） 泽泻二两（淡盐酒拌，晒干，炒） 五味子一两（每个用铜刀切作二片，蜜酒拌蒸，晒干，焙） 麦冬（去心）三两（炒） 肉桂（临磨刮去粗皮）一两（不见火）

【用法】上为末，用熟地捣烂入药，加炼蜜为丸。每早空心服四钱，淡盐汤送下；或生脉饮送服。

【功用】清肺火，补肾水，纳气藏源，引火归源。

27340 加味七神丸

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】肉豆蔻（面裹煨） 吴茱萸（去梗，汤泡七次） 广木香各一两 补骨脂（盐酒炒）二两 白术（陈土炒）四两 茯苓（蒸）二两 车前子（去壳，蒸）二两

【用法】大枣煎汤送为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】肾泻。

【方论选录】《证因方论集要》：此是少阴太阴药也。补骨脂辛苦大温，能补相火以通君火，火旺乃能生土，故以为君；肉豆蔻辛温，

能行气消食，暖胃固肠；吴萸辛热，除湿燥脾，能入少阴厥阴气分而补火；白术、茯苓苦甘补土，所以防水；木香辛苦，功专调气散滞；车前子味甘渗湿治泻。盖久泻皆由肾命火衰，不能专责脾胃，故大补下焦元阳，使火旺土强，则能制水而不复妄行矣。

27341 加味七福饮

【方源】《会约》卷十一。

【组成】人参随便 熟地 当归各二三钱 白术 枸杞各一钱半 甘草(炙) 肉桂 附子 枣皮各一钱 枣仁二钱 远志六分

【用法】空心温服。

【主治】阳痿，忧思恐惧太过者。

【加减】如梦遗虚滑，加牡蛎、莲须、龙骨之属。

27342 加味八正散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】瞿麦 篇蓄 滑石 车前子 甘草 梔子 木通 大黄 桑白皮 灯心 苦竹叶 生地黄

【用法】水煎，食后服。

【主治】心热冲眼，赤肿涩痛，热泪羞明。

27343 加味八正散

【方源】《济阳纲目》卷九十二。

【组成】车前子 瞿麦 篇蓄 滑石 甘草 山梔子 木通 大黄 木香各等分

【用法】上锉。每服三钱，入灯心十茎，水煎，食前服。

【主治】膀胱不利为癃，小便闭而不通。

27344 加味八正散

【方源】《玉案》卷五。

【组成】车前子 瞿麦 篇蓄 滑石 生甘草各一钱五分 山梔仁 木通 大黄 赤茯苓 黄柏各一钱

【用法】加灯心三十茎，水煎，空心服。

【主治】小便气滞淋涩，初起茎中作痛。

27345 加味八正散

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】篇蓄 木通 瞿麦 梔子 滑石 甘草 车前子 大黄 石苇 木香 冬葵子

沉香

【主治】肺热而气淋。

27346 加味八仙汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归(酒浸)七分 川芎七分 白芍八分 熟地(酒浸)七分 人参六分 白术(酒浸)四钱 茯苓(去皮)一钱 陈皮八分 半夏(姜制)七分 桂枝三分 柴胡四分 羌活五分 防风五分 秦艽六分 牛膝六分 炙甘草四分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎，食远服。

【主治】手足麻木。

27347 加味八仙膏

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】人参一两 山药 茯苓 芡实 莲肉各六两 糯米三升 粳米七升 冰糖 白蜜各一斤

【用法】将人参等五味各为细末，又将糯米、粳米亦为粉，与药末和匀，将白糖和蜜汤中炖化，随将粉药乘热和匀，摊铺笼内，切成条糕，煮熟，火上烘干，瓷器密贮。每日清早用白滚汤泡用数条，或干用亦可。

【功用】培养脾胃，壮助元阳。

【主治】脾胃虚弱，精神短少，饮食无味，食不作饥，及平常无病。久病若脾虚食少呕泻者，尤妙。

27348 加味八味丸

《直指》卷二十二。为《集验背疽方》“加减八味丸”之异名。见该条。

27349 加味八味丸

《医学入门》卷七。为《济生》卷四“加味肾气丸”之异名。见该条。

27350 加味八味丸

【方源】《冯氏锦囊·药按》卷二十。

【组成】熟地黄一斤(用八两，水煎汁，去渣，将八两入汁内煮烂，捣烂入药) 淮山药四两(炒微黄色) 牡丹皮四两(焙) 白茯苓三两(入乳拌透，晒干，焙) 山茱萸(去核)四两(酒拌蒸，晒干，焙) 泽泻二

两(淡盐水拌,晒干,炒) 五味子二两(每个铜刀切作两片,蜜酒拌蒸,晒干,焙燥) 牛膝三两(淡盐酒拌炒) 肉桂(取近里一层有油而滋润甜极者)一两五钱(即入药,勿出气,不见火) 制附子一两五钱(切薄片,微火焙)

【用法】上为末,用熟地捣烂入药,加炼蜜杵好,集群手丸,晒干,藏瓷器瓶中。每早空心服四钱,淡盐汤送下,随后进服煎剂。

【主治】痢症,脉洪弦有力,尺弱者。

【临证举例】痢症一金姓儿,年十四而患痢病,群医不效,针灸继之,消痰镇坠之品,备尝尽矣。其发更频而更甚。诊其脉洪弦有力,惟两尺则弱。此阴道亏极,孤阳无斂,火性上炎,僵仆诸候乃发,理所然也。若用消痰镇坠之饵,不几更耗阴分乎?乃令空心淡盐汤吞加味八味丸四五钱,以使其真阳藏纳。随以重浊大料壮水一剂继之,以助主蛰封藏之势。用大熟地一两,丹参一钱五分,麦冬(去心)三钱,生白芍二钱,茯苓一钱五分 丹皮一钱五分,远志肉(甘草煮透)一钱二分,牛膝三钱,五味子六分,水二盏,灯心十根,莲子十粒(去心衣),煎八分,温和服。下午乃服调补气养血清肺和肝之膏滋丸。方用酸枣仁四两(炒熟捣碎),当归身三两(酒拌炒),怀熟地八两,金石斛二两,白芍药三两(蜜水拌晒干炒),制麦冬三两(拌黄米同炒,炒燥去米),牛膝二两(水洗),制远志肉二两(用甘草浓汁煮透晒干焙)。先以建莲肉一斤(去心衣),煎取浓汁三十余碗,去滓入前药在内,煎取头汁、二汁去滓,熬成极浓膏滋,再入拣人参三两(研极细),白茯苓四两(研极细),白茯苓三两(研极细),丸成大丸,每枚重四钱。下午食远白汤化下。如是调理两月,精神倍长,痢症不治而愈矣。

27351 加味八味汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】熟地三钱 山药三钱(炒) 山萸肉一钱半 丹皮一钱 云苓二钱 泽泻一钱

巴戟三钱(去心,盐水炒) 菟丝子一钱半 远志一钱半(去心,盐水炒) 韭子一钱(炒) 茵陈五分 附子五分 上元桂五分(去皮,研) 芡实五钱(炒)

【用法】竹叶、灯心为引,水煎服。

【主治】肾虚受寒,而带虚火,一切遗精,白浊。

27352 加味八物汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】人参 白茯苓 小茴 熟地各三钱 白术 川芎 当归 白芍 香附 甘草 黄芩 柴胡各一钱

【用法】分六服。加生姜三片,水煎去滓,空心服。

【主治】产后遍身浮肿,气急潮热。

27353 加味八物汤

【方源】《痘科金镜赋集解》卷六。

【组成】阿胶 归身 人参 炙黄耆 熟地 白术 条芩 白茯苓 白芍 炙甘草

【用法】元米为引。

【主治】孕妇痘疮六七日,灌浆时用。

27354 加味八物汤

《胎产要诀》卷上。为《回春》卷六“加减八物汤”之异名。见该条。

27355 加味八物汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】人参 白术(蜜炙) 茯苓 甘草(炙) 熟地黄 当归 川芎 白芍各一钱二分 黄耆(炙) 香附(四制)各一钱

【用法】生姜为引,水煎服。

【主治】血虚经来色淡者。

27356 加味八物汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】人参 白术(蜜炙) 茯苓 甘草(炙) 熟地黄 当归 白芍 川芎 木香 香附(童便制) 青皮

【用法】生姜、大枣为引,水煎,食前服。

【主治】经后腹痛。

27357 加味八物汤

《会约》卷十五。为《叶氏女科》卷三“加

味八珍汤”之异名。见该条。

27358 加味八宝丹

【方源】《回春》卷五引李沧溪方。

【组成】旱莲膏四两 何首乌半斤(生用) 没石子四两 天门冬(去心,捣膏)四两 麦门冬(去心,捣膏)四两 莲心二两 苘麻子(新瓦上炒香)四两 胡桃仁四两(去皮) 鱼鱉四两(切断,锅内炒成珠) 鲜生地黄半斤(捣汁) 熟地黄四两(捣成泥) 槐角豆四两(黑牛胆浸透,瓦上焙干)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,空心盐水、黄酒化下。

【功用】乌须黑发。

27359 加味八珍丸

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归(酒洗)二两 南芎一两二钱 白芍(酒炒)一两半 熟地黄(酒蒸,晒干)二两 人参(去芦)二两 白术(去芦,炒)二两 白茯苓(去皮)二两 粉草(蜜炙)七钱 陈皮二两

【用法】上为细末,用首男胎衣一具,长流水洗净,次入麝香二三分,再揉洗,用布绞干,以好酒二升,煮极烂如泥,和前药,如干,再入酒,糊为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心盐汤送下;或酒亦可,晚上米汤下。

【功用】大补血气,壮脾胃,益虚损。

【加减】惊悸怔忡,加远志(甘草水泡去骨)二两、酸枣仁(炒)一两;阴虚火动属虚劳者,去人参一两,加黄柏、知母(俱酒炒)各一两。

27360 加味八珍汤

【方源】《医统》卷八十二引《集验方》。

【组成】人参 白术 茯苓 炙甘草各四分 当归 生地黄各一钱 黄耆 川芎 白芍药 软柴胡各五分 牡丹皮 香附米(制)各八分

【用法】用水一盞半,大枣一枚,煎七分,

食前服。

【主治】妇人思虑过伤,饮食日减,气血两虚,月经不调,夜梦交感,或出盗汗,寝成癆瘵。

27361 加味八珍汤

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】黄耆二钱 白术(去芦)一钱 甘草(炙)三分 防风七分 熟地黄(酒洗)一钱 川芎七分 白芍(酒炒)一钱 人参二钱 知母一钱 当归(酒洗)一钱 山药一钱 益智仁(研)八分 升麻四分 黄柏(酒浸炒)一钱

【用法】上锉一剂。水煎,温服。

【主治】妇人曾经小产,今有孕,预先培补为妙。大凡妇人堕胎,只是奇经废弛,冲任带脉受亏而然,宜服此汤大有益。

27362 加味八珍汤

《济阴纲目》卷三。为《回春》卷六“加减八物汤”之异名。见该条。

27363 加味八珍汤

【方源】《济阴纲目》卷十二。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草(炙) 当归 川芎 芍药 熟地 远志 茯神各二钱

【用法】上锉。加生姜、大枣,水煎服。

【功用】补养元气。

【主治】产后癫狂,乃血虚神不守舍而然。

27364 加味八珍汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】八珍汤八钱 黄耆一钱 防风 升麻各五分

【用法】上锉一服。水煎服。外以荆芥、藿香、梣皮煎汤熏洗。

【主治】产后子肠不收。

27365 加味八珍汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】白术一钱五分 人参 茯苓 当归 川芎 白芍 熟地 陈皮 贝母 桔梗 何首乌 射干各一钱 黄耆八分 连翘七分 玄参七分 金银花一钱 夏枯草二钱 山慈

菇 甘草各五分

【用法】用水二钟，酒一钟，煎八分，卧时服。

【主治】瘰癧虚弱者。

27366 加味八珍汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 当归 川芎 白芍 生地 防风 白芷 僵蚕 白鲜皮 桂枝（少用） 麻黄（少用）

【用法】加葱白三根，生姜二片，水二钟，煎八分服。有虫者，兼服蜡矾丸。

【主治】风癬痒如虫行。

27367 加味八珍汤

《郑氏家传女科万金方》卷二。为《女科万金方》“八物汤”之异名。见该条。

27368 加味八珍汤

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】人参八分（虚者一钱二分） 白术（陈土炒）一钱 茯苓八分 当归五钱 炙甘草三分 川芎一钱五分 白芍（酒炒）二钱 大熟地一钱五分 明乳香五分 丹参（酒炒）三钱 益母草二钱

【用法】水煎服。虚甚者速服二三剂。

【功用】补养气血，保产顺生。

【主治】临产误自惊惶，用力太早，致浆水去多，干涩难生者。

【加减】岁月天寒，加黑姜五分；服药而呕，加生姜二片，砂仁五分。

27369 加味八珍汤

【方源】《金鉴》卷四十七。

【组成】八珍汤加黄耆 附子 肉桂 防风

【主治】产后血气不足，脏腑皆虚 多汗出，腠理不密，风邪乘虚袭中经络，头项、肩背强直，状如角弓反张。

27370 加味八珍汤

【方源】《金鉴》卷四十七。

【组成】八珍汤加丹皮 生地 钩藤钩

【主治】产后血去太多，阳气炽盛，筋无所养而致痙痲抽搐，发热恶寒，心烦口渴。

27371 加味八珍汤

【方源】《金鉴》卷四十七。

【组成】八珍汤加钩藤 菖蒲 远志

【主治】产后不语，属气血两虚而郁冒神昏者。

27372 加味八珍汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【异名】加味八物汤（《会约》卷十五）。

【组成】人参 白术（蜜炙） 茯苓 炙甘草 熟地黄 当归 川芎 白芍 诃子（煨） 瞿麦 粟壳（蜜炙）

【用法】水煎服。

【主治】宿有盘肠产，复孕临月再服。

27373 加味八珍汤

《会约》卷十四。为《传信适用方》卷二“十全散”之异名。见该条。

27374 加味八珍汤

【方源】《医钞类编》卷十六。

【组成】人参 茯苓 当归 生地 白术 川芎 白芍 甘草 香附（炒） 青皮各等分

【用法】水煎服。

【主治】经水过期，性急多怒，其气逆血少。

27375 加味八将丹

【方源】《增订治疗汇要》卷下。

【组成】穿山甲七片（炙） 全蝎 蝉衣各七个 僵蚕 蜈蚣各七条（炙） 五倍子 腰黄各三钱 冰片 西黄各五分 麝香三分 公丁香 母丁香各一钱五分

【用法】上为极细末。掺用。

【功用】拔毒生肌。

【主治】疔疮外证。

27376 加味人地汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】熟地二两 人参一两 白术一两 附子一钱

【用法】水煎，入生姜汁一合调服。

【主治】冬月伤寒，身热十一日，而热反更甚，发厥不宁，一日而三四见。此邪在少阴，未入厥阴，厥似热而非热也。乃内寒之甚，逼

阳外见而发厥。

27377 加味三才汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】天冬二钱 生地四钱 沙参四钱 丹参二钱 柏仁二钱 草薢二钱 泽泻一钱五分 车前二钱 甘草四分

【用法】用藕三两，苡仁三两，同煎汤代水。

【主治】虚体夹湿，淋浊不痛。

27378 加味三才汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】天冬二钱 生地五钱 人参二钱 龟版八钱 女贞子二钱 旱莲一钱 茯苓二钱 丹皮二钱 泽泻一钱五分 黄柏一钱 杜仲二钱 牛膝一钱五分 红枣五枚

【主治】酒色太过，下元伤损，腰膝无力，身热心烦，甚则强阳不痿。

27379 加味三仙饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】焦三仙各一钱五分 枳壳一钱五分(炒焦) 广陈皮一钱 酒连八分(研) 细生地三钱 甘菊三钱 鲜芦根二枝(切碎) 竹叶八分

【用法】水煎，温服。

【功用】消食健胃，清热生津。

【主治】饮食停滞，噎气吞酸，或病后余热，津伤烦渴。

27380 加味三仙饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】焦三仙各六钱 橘红二片(老树)

【用法】水煎服。

【功用】消食化痰。

【主治】食积，伤酒。

27381 加味三仙饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】焦三仙各三钱 炒槟榔三钱 郁金二钱(研)

【用法】水煎，温服。

【功用】行气消食。

【主治】肠胃积滞，脘腹胀痛，大便不爽，泻痢后重者。

27382 加味三仙饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】焦三仙各一钱 毛橘红八分 竹茹三钱 干青果七个(研)

【用法】水煎，温服。

【功用】清热化痰，利咽止呕。

【主治】肺胃壅热，咽喉肿痛，咳嗽痰稠者。

27383 加味三仙饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】焦三仙六钱 枳壳二钱(炒) 槟榔炭二钱 腹皮三钱 厚朴一钱五分(炙) 酒芩二钱 赤茯苓四钱 藿梗八分

【用法】水煎，温服。

【主治】脾胃气滞之胀满、恶心。

27384 加味三仙饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】焦三仙各三钱 金石斛三钱 干青果十五个(捣碎)

【用法】水煎服。

【功用】滋养肺胃，清热生津。

【主治】肺胃阴虚，干呕，干咳，纳谷不香。

27385 加味三仙饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】焦三仙各一钱 橘红一钱五分(老树) 酒芩二钱 厚朴一钱五分(炙) 甘菊花三钱 羚羊一钱五分 竹茹三钱 枳实一钱五分(炒焦)

【用法】水煎，温服。

【功用】消食理气，清热明目。

27386 加味三仙饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】三仙饮各三钱 炙桑皮三钱

【用法】水煎服。

【功用】泻肺止咳化痰。

27387 加味三仙饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】焦三仙各二钱 竹茹二钱 菟丝饼三钱

【功用】消食和胃，清热止呕。

【主治】饮食积滞，呃逆。

27388 加味三生丸

【方源】《普济方》卷一〇四引《瑞竹堂方》。

【组成】南星 半夏 天麻 白附子 人参各一两

【用法】上并生用，研为细末，生姜自然汁糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食后、临卧姜汤送下。

【主治】风痰气壅。

27389 加味三生饮

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参 白术各一两 附子 南星 半夏 菖蒲 远志各一钱 生枣仁三钱

【用法】水煎服。

【主治】身忽猝倒，两目紧闭，昏晕不识人。

27390 加味三白丹

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】三白丹加滴乳石一两 天灵盖二两

【用法】上药以瓷碗合定封固，文火煨，出火毒。每服三分，入飞面三钱，壮者分三服，中者分五服，羸者分七服。每日以土茯苓半斤，捣碎，用水七碗，煮至五碗，去滓，入前丹一服，再煎至三碗，一日服尽；次日如前法再服，二三日后，喉膈肿痛，齿龈出水，七日毒尽自愈。肿甚者，用黄连、犀角、骨碎补各一钱，黑豆一合，煎汤漱之。

【主治】元气虚寒人之梅毒结毒。

27391 加味三白散

【方源】《医学启蒙》卷四。

【组成】白术一钱 白芍一钱 白茯苓一钱 神曲 麦芽 苍术 陈皮 猪苓 泽泻 豆蔻 木香 黄连各五分

【用法】水煎服。

【主治】泄泻。

27392 加味三白散

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】白术(蜜炙) 茯苓各三钱 白芍二钱 厚朴(姜制) 苍术(米泔浸，炒) 砂仁(炒去壳)各一钱 甘草五分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】妊娠泄泻不渴，小便清白者。

27393 加味三圣丸

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】白术二两 川连一两 陈皮 半夏曲 白芍各七钱

【用法】上为末，老米糊为丸服。

【主治】嘈杂吞酸痞满。

27394 加味三圣丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】於术二两(炒嫩) 川连二钱五分(炒) 橘红五钱(细果) 羚羊三钱 胆星二钱 小枳实五钱(炒) 苏叶子三钱 姜皮 姜子各四钱

【用法】上为细末，神曲糊为丸，如绿豆大。每服一百五十丸，白开水送下。

【功用】消化化食，清肝化痰。

【主治】脘中嘈杂、胀满兼外感表证。

27395 加味三豆饮

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】生黄豆 生黑大豆 生绿豆 生甘草 金银花

【用法】水煎服。

【功用】稀痘。

27396 加味三花汤

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】当归二两 川芎一两 天花粉三钱 紫花丁一两 甘菊花五钱

【用法】水煎服。

【主治】对口初起。

27397 加味三补丸

【方源】《济阳纲目》卷五十。

【组成】黄芩 黄连 白芍药

【用法】上为末，粥为丸服。

【主治】湿痲夜热。

27398 加味三补丸

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】黄芩(酒炒) 黄连(酒炒) 黄柏(酒炒) 制香附 白芍(酒炒)各一钱

【用法】水煎，温服。

【主治】胎漏血黑成片者。

27399 加味三补丸

【方症会要】卷二。为《寿世保元》卷三“加味三黄丸”之异名。见该条。

27400 加味三补丸

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 紫地丁 椿根皮

【用法】水煎服。

【主治】湿热赤白带。带下赤白相杂，质粘气秽，量多，绵绵不断，外阴湿痒，甚或肿痛，少腹坠胀而痛，小便赤涩，或频数而痛，胸闷心烦，口干口苦，舌苔滑腻而黄，脉滑数。

27401 加味三妙丸

【方源】《医学正传》卷四。

【异名】经验加味二妙丸（《医学六要·治法汇》卷五）、加味二妙丸（《寿世保元》卷五）。

【组成】苍术四两（米泔浸） 黄柏二两（酒浸，晒干） 川牛膝一两（去芦） 当归尾一两（酒洗） 川草薢一两 防己一两 龟版（酥炙）一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心姜盐汤送下。

【主治】两足湿痹疼痛，或如火燎，从足跗热起，渐至腰膝，或麻痹痿软。

27402 加味三妙丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术六两 黄柏四两 牛膝二两 当归 防己 虎胥骨 龟版各一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸至一百丸，空心姜汤或盐汤送下。

【主治】三阴血虚，足心如火热，渐烘腰膝，及湿热麻痹，疼痛痿软。

【加减】血虚，加血药；气虚，加气药。

27403 加味三苓散

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】猪苓 木通 车前子 赤茯苓各七分 泽泻八分 黄芩（酒炒） 牛蒡子

（炒，研）各五分 黄连（酒炒）二分

【用法】灯心五十寸为引，水煎，食后服。

【主治】麻疹出尽或已收之后，内有伏热，大便泻红黄色粪，或泄泻过甚者。

27404 加味三拗汤

【方源】《得效》卷五。

【组成】杏仁（去皮尖）七钱半 陈皮一两 甘草三钱半 麻黄一两二钱 北五味子七钱半 辣桂五钱

【用法】上锉散。每服四钱，水一盂半，加生姜三片，水煎服。

【主治】肺感寒邪发喘。

【加减】喘甚，加马兜铃、桑白皮；夏月，减麻黄。

27405 加味三拗汤

【方源】《医林绳墨大全》卷四。

【组成】杏仁（去双仁，不去皮尖）二钱半 麻黄二钱 生甘草五分 羌活 桔梗各八分 防风（去芦）一钱 生姜三钱（切细）

【用法】水煎，带热服。

【主治】咳嗽因于寒，误服凉药失声者。

27406 加味三拗汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】麻黄（不去节）三钱 杏仁（不去皮尖油）二十粒 生甘草 荆芥穗 桔梗

【用法】水煎服。

【主治】春冬寒月，麻症初起，壮热无汗，疹毒内攻，或肚腹胀痛，或发喘促。

【备考】原书用本方治上症，去桔梗、甘草。

27407 加味三鞭汤

【方源】《得效》卷五。

【组成】大川乌 绵附 天雄（三味并炮，盐水浸，去皮脐） 木香 肉豆蔻（煨裂） 诃子（去核）各一两

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜十片、红枣二枚，盐梅一个，陈米一撮同煎，空腹热服。未效，仍服来复丹。

【主治】洞泄不止。

27408 加味三厘汤

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】金银花二两 蒲公英一两 生甘草三钱 玄参一两

【用法】水数碗，煎八分服。

【主治】阳疽。

27409 加味三星汤

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】公英五钱 银花三钱 茯苓三钱 米仁一两 牛膝二钱 当归三钱 贝母一钱 山甲二片 甘草一钱 紫花地丁三钱

【用法】水煎服。

【主治】三里发，生膝眼下三寸，外侧前廉两筋间，初肿形如牛眼，拘急冷痛，由劳力伤筋，胃热凝结而成，渐增肿痛，其色青黑，溃出紫血，次出稀脓。

27410 加味三星汤

【方源】《增订治疔汇要》卷下。

【组成】金银花三两 蒲公英一两 赤首乌二两（鲜） 甘草三钱（生） 茄蒂十四个（白者更佳） 夏枯草四钱（鲜者佳）

【主治】对口、痈疽、疔毒等证初起或已破者。

【加减】初起加穿山甲；口渴加元参；寒热头痛，加防风、前胡。

27411 加味三黄丸

《丹溪心法附余》卷十。为《袖珍方》卷三“含化三黄丸”之异名。见该条。

27412 加味三黄丸

【方源】《保命歌括》卷二十二。

【组成】大黄 黄连 黄芩 黄柏 枳壳 白芍药 当归 滑石 甘草 白术 桃仁（另研泥）各等分

【用法】上为细末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】湿热痢，血痢。

27413 加味三黄丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【异名】加味三补丸（《方症会要》卷二）。

【组成】黄芩二两（去朽，酒炒） 黄连六钱（去毛，姜炒） 黄柏一两五钱（去皮，童便炒） 香附二两（米醋浸透，炒） 苍术

一两五钱（米泔浸透，搓去黑皮，切片，炒）

【用法】上为细末，打稀糊为丸，如绿豆大。每服七八十丸，卧时清茶送下。

【主治】嘈杂属郁火者。

27414 加味三黄汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】黄连五分 黄芩一钱 黄柏一钱 连翘一钱五分 丹皮二钱 山梔一钱五分 赤芍一钱 薄荷一钱

【用法】水三钟，煎一钟，热服。

【主治】实火。气分偏盛，壮火升腾，发热错语，口燥咽干，阳狂烦躁。

27415 加味大补汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】黄耆（蜜炙） 人参（去芦） 白术（去芦） 白茯苓（去皮） 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 大附子（面裹煨，去皮脐） 沉香 木香各三分 川乌 牛膝（去芦，酒洗） 杜仲（去芦，酒洗） 木瓜 防风（去芦） 羌活 独活 薏苡仁各五分 肉桂 甘草各三分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】中风，血气大虚，左右手足皆瘫痪者。

27416 加味大补汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】人参 黄耆（蜜炒）三钱 白术二钱 当归二钱 附子一钱 防风八分 麻黄根（蜜炒）一钱半 白芍（酒炒）一钱

【用法】以浮麦一合煎就，去麦，入药煎之，调牡蛎（煨，研粉）三钱顿服。

【主治】产后荣血不足，卫气失守，不能敛皮毛，固腠理，汗易泄而出者。

27417 加味大造丸

【方源】《胎产指南》卷七。

【组成】当归 川芎 熟地 天冬 五味子 杜仲 续断 山药 牛膝 故纸（炒） 小茴（炒） 丹皮 胡桃 人参各等分

【用法】为丸服。

【主治】产后日久，肾虚腰痛。

27418 加味大造丸

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】紫河车一具 生地一两 人参当归 山药 杞子各一两 知母一钱五分 石斛(酒蒸) 麦冬各八分 银胡六钱 龟版五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。早、晚服。

【主治】产后热蒸成癆瘵症。

27419 加味大造丸

【方源】《胎产要诀》卷上。

【组成】紫河车 人参 山药 当归 熟地 天冬 麦冬 五味子 杜仲 牛膝(酒浸一宿，炒) 黄柏(盐水炒，泄泻不用)

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】妇人血弱，不能摄元，或成胎屡堕，或孕后虚热，盗汗，少食，带多等。

27420 加味大造丸

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】人参一两 当归一两 麦冬八分 石斛八分(酒蒸) 柴胡六钱 生地二两 胡连五钱 山药一两 枸杞一两 黄柏七分(炒)

【用法】先将麦冬、地黄捣烂，后入诸药同捣为丸，加蒸紫河车另捣，焙干为末，炼蜜为丸。

【主治】产后骨蒸劳热。

【备考】若服清骨散、梅连丸不效，服此方。

27421 加味上清丸

【方源】《回春》卷二。

【组成】南薄荷叶四两 柿霜四两 玄明粉五钱 硼砂五钱 冰片五片 寒水石五钱 乌梅肉五钱 白粉八两

【用法】上为细末，甘草水熬膏为丸，如芡实大。每服一九，噙化茶汤送下。

【功用】清声润肺，宽膈化痰，生津止渴，爽气凝神。

【主治】咳嗽烦热。

27422 加味小承汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】枳实(麸炒) 厚朴(姜炒)各二钱 大黄(酒炒)二钱五分 槟榔一钱半 炙草一钱 生姜二片

【用法】水煎服。以快便为度，中病即止。后用四君子汤加陈皮和之。

【主治】新产之时，饮食过伤，致痢疾腹中胀痛，里急窘迫，身热口渴，六脉数实。

27423 加味小胃丹

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】南星 半夏各二两五钱(用白矾、皂角刺及姜汁水煮十五次) 桃仁 杏仁(用白矾、皂角水泡) 红花 陈皮 枳实(用白矾水泡半月，炒) 白术 白芥子 苍术各二两(用米泔、白矾、皂角水浸一宿，炒)

【用法】上为末，姜汁、竹沥煮神曲为丸服，中风痰、痞积、眩晕、喉痹，淡姜汤送下；瘫痪不语，浓姜汤送下；惟痞块、头风、头痛宜临卧、食后服。

【主治】痰核生在下体，兼湿热者。

【宜忌】属火燥证者，断不可用。

27424 加味元冬汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】元参一两 丹参三钱 麦冬一两 北五味子一钱

【用法】水煎服。

【主治】心火克肺，口渴，舌上无津，两唇开裂，喉中干燥，遂致失音。

27425 加味天水散

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两 滑石六钱 粉甘草三钱

【用法】水煎服。

【主治】暑日泄泻不止，肌肤烧热，心中烦渴，小便不利，或兼喘促。

【方论选录】此久下亡阴，又兼暑热之证

也。故方中用天水散以清滯暑之热。而甘草分量，三倍原方（原方滑石六，甘草一，故亦名六一散），其至浓之味，与滑石之至淡者相济，又能清阴虚之热。又重用山药之大滋真阴，大固元气者以参赞之。真阴足则小便自利，元气固则泄泻自止。且其汁浆稠粘，与甘草之甘缓者同用，又能逗留滑石，不至速于淡渗。俾其清凉之性，由胃输脾，由脾达肺，水精四布，下通膀胱，则周身之热，与上焦之燥渴喘促，有不倏然顿除乎！

【临证举例】泄泻 一孺子，泄泻月余，身热燥渴，嗜饮凉水，强与饮食即恶心呕吐，多方调治不愈。投以此汤，一剂，烦渴与泄泻即愈其半；又服一剂，能进饮食，诸病皆愈。

27426 加味天地散

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】青木香藤（略抄） 香附 紫苏各六分 陈皮四分 乌药五分 人参八分 当归一钱 白术一钱 甘草四分 木香二分

【主治】妊娠腰脚肿。

【备考】或兼服补中益气汤。

27427 加味天麻散

【方源】《医部全录》卷四三二引《幼幼近编》。

【组成】天麻 柴胡 僵蚕 半夏 南星 白茯苓 白术 黄连 钩藤 枳实 生甘草

【主治】小儿急惊初起，悸动有痰。

27428 加味天麻散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】天麻四钱 白附子（炮） 天南星（炮） 半夏（烫洗七遍，姜制）各三钱 干蝎（炒）二钱 钩藤三钱 广皮二钱

【用法】水煎，温服。如为散，可酌加分量，研为细末，每服一钱，用生姜、薄荷酒调下，不拘时候。

【功用】燥湿祛风。

【主治】产后发痉。产妇形体肥胖，言语窘涩，或口噤不语，痰涎壅盛，喉间如曳锯，胸脘痞闷，四肢瘫痪，舌苔白腻，脉象弦滑，证

属风痰而偏于痰湿者。

27429 加味天然散

【方源】《外科十三方考》。

【组成】乳香 没药 儿茶 血竭各一钱 赤石脂 海螵蛸各三钱 冰片一分

【用法】上为细末。加入天然散中用之。

【主治】瘰癧溃后。

【加减】冬月，加龙骨，象皮各三钱。

27430 加味木通汤

【方源】《广嗣纪要》卷十二。

【组成】木通 生地黄 赤芍药 条芩 甘草梢各等分

【用法】上锉。加淡竹叶十二片，水煎服。

【主治】妊妇奉养太厚，喜食炙烤酒面辛热之物，以致内热，小便赤涩作痛者。

27431 加味木通汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】木通二钱 橘红一钱 半夏一钱 五分 赤苓二钱 贝母二钱 桑皮二钱 杏仁三钱 瞿麦二钱 牛膝二钱 车前二钱 灯心三尺

【主治】肠痹。渴而数饮，小溲不得出，中气喘争，时发殄泄。

27432 加味五仙散

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】知母 贝母各二钱 款冬花四钱 桑白皮七钱 桔梗七钱 芽茶五钱

【用法】上为末。每用一钱，杏仁煎汤调下。

【主治】咳嗽不止。

27433 加味五仙散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】川贝 知母 款冬 茯苓 桔梗 桑皮 杏仁 栝楼 甘草 雨茶

【主治】肺胃虚火咳嗽。

27434 加味五皮汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】大腹皮 生姜皮 桑白皮 白茯苓皮 白术 紫苏（茎叶等分）各一钱

【用法】大枣为引，水煎，木香磨浓汁三匙，入内同服。

【主治】孕妇面目四肢浮肿者，谓之子肿。

27435 加味五皮汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】桑白皮 陈皮 生姜皮 茯苓皮 大腹皮 汉防己 枳壳(炒) 猪苓 炙草

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】产后虚肿，腠理不密，调理失宜，外受风湿，面目虚浮，四肢肿者。

27436 加味五皮汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】羌活 五加皮 苍术 桂枝 木通 防风 猪苓 桑白皮 甘草 生姜皮 灯草

【主治】痘靥之后，或面目虚浮，四肢肿满者。

27437 加味五皮汤

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】五皮散加五加皮 木瓜 防己

【主治】脚肿。

【加减】水土不服者，入胃苓汤。

27438 加味五皮饮

【方源】《幼科类萃》卷十二。

【组成】五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 茯苓皮各一钱 姜黄一钱 木瓜 (一方无木瓜，用五加皮，用陈皮、桑皮)

【用法】上作一服。水煎服。

【主治】小儿四肢肿满，阳水或阴水。

27439 加味五皮散

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】陈皮 桑白皮 赤茯苓皮 生姜皮 大腹皮 姜黄 木瓜各一钱 (一方无陈皮、桑白，有五加、地骨皮)

【用法】上作一服。水煎服。

【功用】《衡要》：行气散水。

【主治】四肢胀满，不分阴水、阳水。

【方论选录】《衡要》：陈皮、生姜、大腹皮、姜黄等诸辛温以散郁气，赤茯苓、木瓜等以行水湿。

27440 加味五苓汤

《医方类聚》卷一四三。即《济生》卷五

“加味五苓散”。见该条。

27441 加味五苓汤

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】猪苓七分 泽泻七分 白术五分 赤茯苓一钱 天花粉二钱 干葛一钱 香薷 黄连 甘草各等分

【用法】用水一钟半，加生姜三片，煎至七分，温服。

【主治】暑热伤中，口渴身热。

【加减】泄极，加升麻、黄芩、石膏；如热极，加石膏、知母；痛，加炒芍药五钱、桂三分；寒痛，亦如此。

27442 加味五苓散

【方源】《济生》卷五。

【组成】赤茯苓(去皮) 泽泻 木猪苓(去皮) 肉桂(不见火) 白术各一两 车前子半两

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伏暑热气，及胃湿泄泻注下，或烦或渴，或小便不利。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“加味五苓汤”。

27443 加味五苓散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】猪苓 赤茯苓 白术 泽泻各一两 木香 沉香 槟榔各三钱 白豆蔻一钱 缩砂仁五钱

【用法】上为末。煎樟柳、木通、灯心汤调下。

【主治】肿满，因积而得，既取积而肿再作，小便不利者。

27444 加味五苓散

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】猪苓 泽泻 白术 茯苓 桂各一钱 桃仁(去皮尖) 红花各二钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人产后恶露不来，败血停滞，闭塞水洩，小便不通，其症小腹胀满刺痛，乍

寒乍热，烦闷不安。

27445 加味五苓散

【方源】《医统》卷十八。

【组成】山茵陈 山梔子各一钱 白术 赤茯苓 猪苓 泽泻 黄连各七分 甘草三分

【用法】用水二盏，加灯草十根，煎八分，食远温服。

【主治】湿热郁滞为疸，烦渴引饮，小便不利。

27446 加味五苓散

【方源】《回春》卷四。

【组成】猪苓 泽泻 白术（去芦） 赤茯苓（去皮） 肉桂 当归 枳壳 牛膝（去芦） 木通各等分 甘草梢减半

【用法】上锉一剂。加灯心一团，水煎，空心服。

【主治】虚寒小便不通。

27447 加味五苓散

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】五苓散加羌活

【用法】上为细末。每服二钱，白汤调下，日三服；或以水煎服。

【功用】解表渗利。

【主治】湿胜身痛，小便不利，体痛发渴。

27448 加味五苓散

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】白术一两半（炒） 厚朴一两半（制） 干姜一两半 猪苓一两半 茯苓三两 泽泻一两半 肉桂一两半（去皮）

【用法】上为散。用茵陈一钱半，水煎三钱，去滓温服。

【主治】寒湿发黄，腹满疼痛，脉紧细者。

【方论选录】寒湿内滞，脾弱不能健运，而郁遏成黄，故腹中满闷，疼痛不已焉。白术健脾元以燥湿，厚朴散腹满以除闷，干姜温中气散寒，肉桂暖营血散寒，猪苓通利三焦，茯苓渗利脾肺，泽泻通利膀胱以退黄也。使湿化寒消，则小便清利，而腹满无不退，疼

痛无不除，何阴黄之足虑哉？复用茵陈汁清湿热退黄疸，且以防姜、桂之僭上也。此温中渗湿之剂，为寒邪郁湿发黄之专方。

27449 加味五苓散

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】金铃子 白术（土炒） 泽泻 木通 茴香（炒） 赤茯苓 橘核仁 肉桂 槟榔 猪苓

【用法】引用生姜、灯心，水煎服。

【主治】阴肿。心热移于小肠，外肾肤囊肿痛光亮。

27450 加味五苓散

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】漂白术 白云苓 结猪苓 宣泽泻各二钱 青化桂 藿香梗 宣木瓜 西砂仁各一钱

【用法】生姜一片，大枣一枚，灯心十茎为引，水煎，热服。

【主治】暑月不慎口腹，过食生冷瓜果，凉茶冷水，以致寒凉伤脏，而为呕吐、泻利、腹痛。

27451 加味五苓散

【方源】《会约》卷十五。

【组成】白术 茯苓各三钱 泽泻 猪苓 肉桂各二钱

【用法】半酒半水（水须顺流取之），煎就，加朴消四钱，再煎二三沸，热服。

【主治】子死腹中；胞衣不下。

27452 加味五苓散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】白术 茯苓 泽泻 猪苓 肉桂 木通 瞿麦 腹皮 滑石 甘草

【主治】疹后泻肿，小便不利。

【加减】气喘者，加桑白皮。

27453 加味五苓散

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 木通 枳壳 槟榔 甘草 滑石 川芎 当归尾 香附

【主治】难产，因腹有积水，渗入胞中，致

临产而去水不止，恶露不下者。

27454 加味五苓散

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】桂枝 白术 茯苓 猪苓 泽泻 桃仁 黑白丑

【用法】水煎服。

【功用】温化活血利水。

【主治】膨胀，腹胀大如鼓，腹筋起，二便不利者。

【方论选录】本方为温化活血利水之剂。以桂枝合苓术猪泽利水，合桃仁活血通瘀，合二丑温中攻下，共奏理气活血逐水之功。

27455 加味五苓散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】白术 茯苓皮各三钱 猪苓二钱 泽泻一钱半 肉桂 生姜皮各一钱 五加皮二钱 炒远志一钱半

【用法】水煎，温服。

【功用】温化行水。

【主治】妊娠子痢。怀孕数月，因阳虚湿泛，致面浮肢肿，气促尿短，心累神倦，发病时骤然昏昧，不知人事，牙关紧闭，有时抽搐，舌淡苔白，或微有紫色，脉滑重按无力。

27456 加味五苓散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】赤苓 猪苓 泽泻各二钱 茅术一钱半 桂枝木（黄连水炒）一钱 青木香一钱半 滑石三钱 甘草一钱 车前仁二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】燥湿行水。

【主治】转胞。妊娠小便不通，胸中痞闷，头重而痛，苔白腻，脉濡，两尺微滑，属湿热而偏湿盛者。

27457 加味五宝丹

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】真珠（豆腐煮）三钱 琥珀三钱 钟乳石（煨，为细末，人乳浸，饭上蒸过）四钱五分 辰砂（为末，飞）二钱五分 冰片一钱 牛黄二钱五分 山慈姑二钱五分 海

参二钱五分（一方加麝香五分，旧琉璃烧存性，为末二钱）

【用法】每丹一两，配飞罗面五钱。如下部，易真绿豆粉五钱；如中部，则飞面、豆粉各用二钱半。每服三分，每日五服，土茯苓汤调下。每日用土茯苓一斤，随症加饮，煎汤五碗，每服一碗为率。

【主治】杨梅风毒，筋骨疼痛，破脑崩鼻，蚀阳烂喉，肺伤口臭；及癩癣，鹅掌风、身面出红黑白斑；并小儿遗毒。

【加减】伤鼻，加辛夷三钱；咽喉腐烂，加升麻三钱，桔梗二钱；玉茎腐烂，加真僵蚕三钱，牙皂二钱；上部，加白芷一钱；胸腹，加白芍药一钱；下部，加牛膝一钱；四肢，加羌活、金银花、蒲公英各二钱。服前丹作呕者，生姜五钱取汁，煮鲫鱼食之，以助胃气；二便涩滞不通者，用百草霜二钱，并花水调服即解。如补鼻柱，长阳道，前古方五味，加制胎元一具，熏生蟹脚焙末七分，服如法。

【备考】制胎元法：干胎元大者一具。用粉甘草、人参各五钱，水三钟，煎钟半，涂抹胎元，炙汁尽为度。次用砂坛一个，入石膏末少半坛，入胎元于中，再入石膏，以满坛为度，封口，用金粟火煨一宿，取出胎元，如乌金纸色为佳，白色者不用。

补鼻柱法：用油纸，以甘草水煮过，于好人鼻子上印一塑子，合患者鼻上，外以膏药盖之，俟长完，去纸，用皮消煎汤洗鼻三二次，则见风不痛。

27458 加味五积饮

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 芍药 人参 半夏 枳壳 香附 白芷 桔梗 麻黄 当归 川芎 茯苓 肉桂 木香

【用法】加生姜、木瓜，入盐少许，水煎服。

【主治】经病疼痛。

27459 加味五积散

【方源】《得效》卷十五。

【组成】厚朴（去粗皮，姜汁炒） 半夏

(洗) 扬芍药 枳壳(去瓢,炒) 木香 肉桂各一两 陈皮 白姜一两三钱 苍术六两(米泔浸炒) 桔梗 香附子(炒去毛) 茴香(炒) 粉草 人参(去芦) 茯苓(去皮) 川芎 当归(去尾) 川白芷各一两

【用法】上锉散。加生姜、木瓜,入盐煎服。

【主治】产后败血不散,阴阳相胜,作为寒热;或外感寒邪,头痛体疼,发热不退。

【备考】原书用本方治产后败血不散,作为寒热,入米醋半合煎;治外感寒邪,头痛体疼,去木香、茴香,加生姜、枣子煎。

27460 加味五积散

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归 川芎 白芍(酒炒) 陈皮 半夏(姜炒) 苍术(米泔浸) 茯苓(去皮) 厚朴(姜汁炒) 羌活 独活 枳壳(麸炒) 桔梗 白芷各八分 干姜 肉桂 麻黄 甘草各五分 穿山甲(随所痛取甲,烧灰) 一钱

【用法】上锉一剂。加生姜三片,大枣一枚,麝香少许,水煎,温服。

【主治】四肢骨节疼痛,因于虚寒者。

27461 加味五积散

【方源】《宋氏女科》。

【组成】陈皮 干姜 肉桂 当归 枳壳 白茯苓 麻黄 甘草 厚朴 半夏 桔梗 白芷 芍药 苍术 川芎

【用法】加生姜、葱,水煎服。

【主治】触经感冒。经行身体麻痹,寒热头痛者。

【备考】原书治触经感冒,用本方去干姜,加羌活、独活、牛膝。

27462 加味五积散

【方源】《济阳纲目》卷七十七。

【组成】苍术 肉桂各二钱 麻黄 陈皮各一钱 桔梗九分 厚朴 甘草(炙) 枳壳(麸炒) 茯苓 当归 芍药 干姜(炮)各八分 白芷 半夏(汤泡七次) 川芎各七分 木瓜一钱

【用法】上锉一服。加生姜三片、葱白三茎,水煎,不拘时服。

【主治】脚气,寒湿流注,两腿痠疼,兼痰气者。

27463 加味五积散

【方源】《胎产要诀》卷上。

【组成】五积散加香附 小茴香 黄肉

【主治】带下属虚寒者。

27464 加味五益膏

【方源】方出《古方汇精》卷二,名见《卫生鸿宝》卷二。

【组成】玉竹 炙耆 白术(炒)各一斤 熟地(酒洗) 枸杞子(酒洗)各八两

【用法】文火熬成膏,用牛膝一两半,当归一两,虎胥骨五钱,浸无灰酒三斤。每晚一杯,化膏五钱服。

【主治】鹤膝风属虚损者。

【备考】原书用本方治上证,须外敷皂倍丹,乃可取效。

27465 加味五黄锭

【方源】《理渝》。

【组成】黄连 黄芩 黄柏 大黄(皆生用) 黄丹(炒)各一两 薄荷 羌活 防风 生地 当归 川芎 赤芍 皮消各五钱 雄黄 铜绿各三钱 枯矾一钱

【用法】以牛胶五钱,化水为锭。临用一锭,醋蜜磨敷眼胞上下;亦可一锭煎水洗。此方可预合备用。

【主治】赤眼肿痛;并治热毒。

27466 加味五淋散

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】黑梔 赤茯苓 当归 白芍 黄芩 甘草 生地 泽泻 车前子 滑石 木通

【功用】清热利水。

【主治】子淋。孕妇小便频数窘涩,点滴疼痛。

27467 加味五痹汤

【方源】《赤水玄珠》卷十二。

【异名】五痹汤(《医宗必读》卷十)、五

痹散(《杂病源流犀烛》卷五)。

【组成】人参 茯苓 当归(酒洗) 白芍药(煨) 川芎各一钱(肝、心、肾痹倍之) 五味子十五粒 白术一钱(脾痹倍之) 细辛七分 甘草五分

【用法】水二钟 加生姜一片,煎八分,食远服。

【主治】①《赤水玄珠》:五脏痹证。②《杂病源流犀烛》风寒湿气,客留肌体,手足缓慢,麻痹。

【加减】肝痹,加酸枣仁、柴胡;心痹,加远志、茯苓、麦门冬、犀角;脾痹,加厚朴、枳实、砂仁、神曲;肺痹,加半夏、紫菀、杏仁、麻黄;肾痹,加独活、官桂、杜仲、牛膝、黄耆、萆薢。

【备考】《杂病源流犀烛》:壮实人而患鼓症,不妨攻之,宜先服五痹散二剂,再按法服石干散。

27468 加味太一膏

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】肉桂 白芷 当归 玄参 赤芍 生地 大黄 土木鳖各二两 真阿魏三钱 轻粉四钱 槐枝 柳枝各一百段 血余一两 东丹四十两 乳香末五钱 没药末三钱

【用法】上药前十味并槐柳枝,用真麻油足称五斤,将药浸入油内,春五、夏三、秋七、冬十,候日数已毕,入洁净大锅内,慢火熬至药枯浮起为度,住火片时,用布袋滤净药渣,将油称准足数,将锅展净,复用细旧绢,将油又滤入锅内,要清静为美,将血余投下,慢火熬至血余浮起,以柳棒挑看似膏溶化之象,方算熬熟。净油一斤,将飞过黄丹六两五钱徐徐投入,火加大些,夏、秋亢热,每油一斤,加丹五钱,不住手搅,候锅内先发育烟,后至白烟,叠叠旋起,气味香馥者,其膏已成,即便住火,将膏滴入水中,试软硬得中,如老,加熟油,若稀,亦加炒丹,各少许,渐渐加火,务要冬、夏老嫩得所为佳,候烟尽,端下锅来,方下阿魏,切成薄

片,散于膏面上化尽,次下乳、没、轻粉搅均,倾入水内,以柳棍搂成一块,再换冷水浸片时,乘温每膏半斤,扯拔百转成块,又换冷水投浸。随时每取一块,铜杓内复化,随便摊贴至妙。

【主治】发背痈疽及一切恶疮,跌扑伤损,湿痰流毒,风湿风温,遍身筋骨走注作痛,内伤风郁,心腹胸背攻刺作疼,腿脚痠软,腰膝无力,汤泼火烧,刀伤棒毒,五损内痢,七伤外症(俱贴患处);男子遗精,妇人白带(俱贴脐下);脏毒肠痈(亦可丸服);诸般疮疖血气癰痒,诸药不止痛痒者。

27469 加味太乙膏

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】当归 生地黄 芍药 玄参 大黄各二两 甘草四两

【用法】用麻油二斤煎丹收膏。外贴患处。

【主治】一切疮疡。

【备考】《灵验良方汇编》有白芷。

27470 加味太乙膏

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】黄柏 防风 元参 赤芍 白芷 生地 大黄 归身 肉桂 海藻 昆布 苍术各五钱 金银花一两 皂角刺 山慈姑 桂枝各五钱 土贝母 何首乌 苦参 连翘 花粉各一两

【用法】上药用麻油五斤浸,春五、夏三、秋七、冬十日,熬枯去渣,入飞过红丹四十两收膏,离火入血竭末五钱。摊贴。

【功用】拔毒收口。

【主治】跌打损伤,风寒湿痹,腰腹心胃疼痛,并已溃疮疡。

27471 加味太乙膏

【方源】《冯氏锦囊·外科》卷十九。

【组成】真麻油二十四两 乱发一大团(黑润者佳) 蓖麻子二百粒(去壳,捣碎) 大生地四两(切片) 黑玄参 大黄(切片) 全当归各三两 赤芍 白芷 肉桂(去尽粗皮,切碎)各二两 明松香一斤(捣碎,入大葱

管内，以线缚好，放碗内，隔汤蒸化，取出候冷，去葱研细八两）真黄丹二十两（其色黄者为真，水飞晒干，炒黑色十两）滴乳香（箬上烘去油，研细）二两 真没药二两（箬上焙去油，研细）

【用法】先将麻油煎滚，零入乱发，以桃柳枝不住手搅，令发熔化，再入蓖麻子煎枯，再入生地、大黄、当归、赤芍、白芷、肉桂，慢火煎熬，至药色枯黑，滤去渣，慢火熬浓，方入松香、黄丹、乳香、没药收之成膏，欲软硬得所，滴水成珠为度，夏天宜略老，冬天宜略嫩。膏藏瓷器中。旋用旋摊，外贴。

【主治】一切肿毒，已溃未溃，跌打损伤，风湿气痛。

27472 加味太极丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】黄柏（去皮，盐酒浸三日，微炒褐色，净末）三两六钱 知母（去毛，酒浸一宿，微炒，净末）二两四钱 破故纸（新瓦炒香，净末）二两八钱 胡桃仁（去皮，研烂）三两二钱 砂仁（去壳）一两（分作二分，五钱生用，五钱同花椒一两，炒香去椒不用）橘红（盐水拌炒）半夏（沸汤泡七次，锉片晒为末，姜汁拌为饼，阴干）

【用法】上七味，米糊为丸服。

【主治】诸虚。

27473 加味太极丸

【方源】《寒温条辨》卷三。

【组成】白僵蚕一钱（酒炒）全蝉蜕（去土）一钱 广姜黄三分 川大黄四钱 天竺黄一钱 胆星一钱 冰片一分

【用法】上为细末，糯米浓汤为丸，如芡实大。每服一九，冷黄酒和蜜泡化，冷服。薄荷熬酒亦可。

【主治】小儿温病。

27474 加味化肾汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】熟地二两 山茱萸一两 肉桂三钱 巴戟天五钱

【用法】水煎服。二剂吐轻，十剂痊愈。

【主治】肾中无火，朝食暮吐，或暮食朝吐，或食之一日至三日而尽情吐出者。

27475 加味化毒丹

【方源】《霉疮证治秘鉴》卷下。

【组成】牛黄（真者）四分 琥珀五分 血竭 雄黄 辰砂 虎胥骨 鲛甲各一钱半 钟乳石二钱 犀角 乌蛇各一钱半 龙脑三分 麝香二分 熟大黄一钱 轻粉五分

【用法】上药以神曲糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，沙糖汤送下，虚者人参汤送下。

【主治】牛皮癣。其初多生内股阴囊而痒痒最甚，其色紫黑如牛皮。渐渐漫衍小腹、尻臀，久则至于胸背肋肋，其形宛如铁甲，其症小便赤色，大便燥黑，气逆上冲，或头痛多怒，此皆郁热所致。

27476 加味化毒饮

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】汉防己 当归 忍冬花 白鲜皮 连翘 羌活 川芎各三两 牙皂五钱

【用法】上切片，分作七帖。每帖加奇良四两，猪胰子一枚，水四碗，煎至二钟，分二次服，渣再煎一钟服。七帖后不效，当服化毒丸收功。

【主治】下疳疮腐烂陷下有凹，或包皮肿如鸡肫，或肌肤见形如斑如疹，将发疮者。

27477 加味化斑汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】人参 知母各一钱 石膏二钱 甘草 黄芩 梔仁 生地各一钱 淡竹叶三片 豆豉半合

【用法】水煎，食远服。

【主治】妊娠伤寒，热病不解，遍身发斑，赤如锦文者。

27478 加味化斑汤

【方源】《疹科正传》。

【组成】知母 石膏 甘草 麦冬 花粉 滑石 竹叶 梗米 干葛 薄荷 牛蒡

【主治】疹子，咳嗽，口渴，热毒内蒸，津

液消烁。

27479 加味化痰丸

【方源】《明医杂著》卷四。

【组成】半夏(汤泡七次,姜汁水拌渗透)橘红(盐水洗)各三两 桔梗 海蛤粉(另研) 瓜蒌仁(另研) 各一两 香附米(淡盐水炒) 枳壳(麸炒) 连翘 枯黄芩(炒) 各五钱 贝母(去心,炒)各一两 诃子皮 枯矾各二钱五分

【用法】上为末,炼蜜、姜汁为丸,如黍米大。每服四五十丸,淡姜汤送下。

【主治】痰满胸膈,咽喉不利。

【宜忌】不可过服,恐伤上焦元气。

27480 加味化痰丸

【方源】《赤水玄珠》卷六。

【组成】人参 白术 半夏(制) 茯苓 桔梗各一两 枳实 香附 前胡 甘草各半两

【用法】上为细末,用半夏末、姜汁糊为丸。每服五十丸,白姜汤送下。

【功用】理气化痰。

27481 加味牛黄散

【方源】《奇效良方》卷一。

【组成】牛黄(另研) 麝香(另研) 犀角屑 羚羊角屑 龙齿(另研) 防风(去芦) 天麻 独活(去芦) 人参(去芦) 茯神(去木) 川升麻 甘草(炙) 白鲜皮 远志(去心) 天竺黄各二钱半(另研) 朱砂(水飞) 铁粉(另研) 麦门冬(去心) 各半两

【用法】上为细末,研匀。每服二钱,煎麦门冬汤调下,不拘时服。

【主治】①《奇效良方》:心脏中风,恍惚恐惧,闷乱不得睡卧,志意不定,语言错乱。

②《校注妇人良方》:骨蒸肌热,烦躁,劳热口干;或恍惚恐乱,睡卧不得,志意不定。

27482 加味升降散

【方源】《温疫条辨摘要》。

【组成】白僵蚕二钱(酒炒) 全蝉退十个

姜黄五分(去皮) 川贝二钱 川厚朴钱半 麦冬三钱 生大黄四钱

【用法】上为散。用绍酒、白蜜共一酒杯和匀,兑入冷服。

【主治】时行瘟疫,周身大热,时忽恶寒,口渴饮冷,舌苔白厚干枯,神昏目赤,大便秘结,小便短赤。

【宜忌】胎妇勿忌,小儿减半。

【加减】如体虚,用大黄二钱,或用酒另炒。

27483 加味升麻汤

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】升麻五钱 玄参五钱 柴胡五钱 黄芩五钱 干葛四钱 赤芍四钱 独活一钱 甘草二钱

【用法】每铤三四钱,水煎服。

【功用】预防麻疹。

【主治】小儿麻疹初起。

27484 加味升麻汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】升麻 葛根 赤芍 甘草各一钱 石膏二钱 薄荷三分

【用法】加灯心二十节,水煎服。

【主治】头痛属胃火上冲者,其脉洪大,口渴饮冷,头筋扛起。

27485 加味升麻汤

【方源】《种痘新书》卷十一。

【组成】升麻 干葛 防风 荆芥 牛蒡 连翘 桔梗 木通 赤芍 甘草 柴胡 黄芩 陈皮 蝉退 玄参

【用法】加葱白,水煎,热服。令取微汗。一二服间,其麻即出。

【主治】麻症初热,为风寒所束,身重鼻塞,肌慄恶寒者。

27486 加味升麻汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】连翘 升麻(俱酒洗) 葛根 梔子(酒炒) 黄芩(酒炒) 桔梗(米泔水炒) 麦冬(去心) 木香(酒洗磨调) 滑石 牛蒡(酒炒) 淡竹叶各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘后身热，月余不除。

27487 加味升麻汤

【方源】《医钞类编》卷十四。

【组成】升麻 白芍 甘草 羌活 防风 黄芩 黄连

【用法】水煎服。

【主治】大肠热甚，脱肛肿痛。

27488 加味升麻汤

【方源】《治疹全书》卷中。

【组成】升麻（痰喘不用） 葛根 枳壳 桔梗 橘红 桑皮 茯神 甘草 杏仁 薤仁（痰喘、大便闭者，可用四五钱）

【用法】水煎服。

【主治】麻疹难发者。

【加减】头痛，加川芎；发紫黑斑，磨入犀角二三分；风寒阻闭，加苏叶、麻黄；伤食不食，加山楂；微热而不发，少加桂枝；腹痛，药汁磨槟榔少许；焦紫加红花二三分；表面不起，加僵蚕；发痒，加蝉蜕；疹不起发，风寒甚急者，加全蝎（洗净）；发呕，加藿香；鼻衄，去升麻，加茅花。

27489 加味升葛汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】升麻一钱半 葛根 白芍 甘草 黄芩 梔子各一钱

【用法】水煎服。加犀角汁更妙。

【主治】伤寒阳毒发斑。

【加减】如咽痛，加元参一钱半。

27490 加味乌沉汤

【方源】《得效》卷四。

【组成】人参 当归（大者去芦） 白术（炒）各一两 沉香半两 天台乌药 白茯苓（去皮） 附子（煨，去皮脐）各一两 肉桂（去粗皮）半两

【用法】上锉散。每服三钱，水一盞，加生姜五片，大枣一枚，水煎，空心服。

【功用】生气补血。

【主治】肾虚虚损之心痛。

27491 加味乌沉汤

【方源】《奇效良方》卷六十三。

【异名】加味乌药汤（《济阴纲目》卷一）。

【组成】乌药 缩砂 木香 玄胡索各一两 香附（炒去毛）二两 甘草一两半

【用法】上锉细。每服七钱，水一盞半，加生姜三片，煎至七分，不拘时温服。

【主治】妇人经水欲来，脐腹疼痛。

27492 加味乌金散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】川芎 远志各二钱半 白术 茯神 枣仁 香附 芍药 辰砂（另研） 羌活 防风各二钱 半夏 当归 白芷 广皮 熟地各一钱半 人参 麦冬 牛膝 天麻 甘草各一钱

【用法】上为一剂。水一钟半，加生姜三片，葱三头，金银器内煎服。

【主治】产后三四日或半月，血气虚弱，脏腑无气，忽狂言乱语，妄见鬼神者。

27493 加味乌荆丸

【方源】《三因》卷十六。

【组成】川乌（汤洗，浸三五次，去皮尖，焙干秤） 荆芥穗各半斤 杜当归（水浸三日，洗，焙干称）一斤 薄荷五两

【用法】上为细末，好醋煮米粉糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒茶清送下。

【主治】瘾疹，上攻头面，赤肿瘙痒，搔之皮便脱落作疮，作痒或痛，淫液走注，有如虫行。

27494 加味乌荆丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】荆芥二两 天麻 附子 白附子 乌药 当归 川芎各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大，朱砂为衣。每服一九，食后细嚼，茶送下。

【主治】形寒伤风头痛，鼻塞声重；或老人头风宿疾，发而又感风寒；一切虚风上攻，头目咽喉不利。

27495 加味乌药汤

《济阴纲目》卷一。为《奇效良方》卷六十

三“加味乌沉汤”之异名。见该条。

27496 加味乌药汤

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】乌药 缩砂仁 木香 延胡索 香附(制) 甘草 槟榔各等分

【用法】上锉细。每服七钱，加生姜三片，水煎，温服。

【主治】血气凝滞，经前腹胀痛，胀过于痛。

27497 加味匀气散

【方源】《普济方》卷一一六引《德生堂方》。

【组成】白芷一两 乌药二两 沉香七钱半 白术四两(去芦头) 人参一两 陈皮一两 甘草半两

【用法】上为细末。每服三钱，用紫苏、木瓜熬水调服，不拘时候。

【功用】顺气助脾。

【主治】诸风疾。

27498 加味丹栀汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】丹皮二钱 山栀一钱五分 赤芍一钱 龙胆草一钱 夏枯草一钱五分 当归一钱五分 生地四钱 柴胡一钱 木通一钱 车前二钱

【用法】加灯心三尺，水煎服。

【主治】肝胆火盛，胁痛耳聋，口苦筋痿，阴痛，或淋浊溺血。

27499 加味风流饮

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】防风 荆芥 川芎 升麻 牛蒡子 花粉 白鲜皮 僵蚕 甘草 穿山甲 牛膝 何首乌 白芍 木通 五加皮各等分

【用法】水三大钟，加猪胰半只，奇良一两，煎至一碗，热服。取微汗为度，渣再煎服。

【主治】霉疮初起，未生疔疮、便毒者。

27500 加味六一散

《东医宝鉴·杂病篇》卷十一。为《医统》卷九十一“辰砂六一散”之异名。见该条。

27501 加味六一散

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】滑石三钱 车前一钱 甘草梢四分

【用法】加生柏叶、生藕节捣汁半茶杯，冲药服。

【主治】血淋。

27502 加味六一散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生地 30 克 六一散 9 克 石决明 9 克 忍冬藤 9 克 茯神 6 克 当归 9 克 茯苓 9 克 赤芍 6 克 山栀 4 克

【用法】水煎，内服。

【主治】皮肤瘙痒症。

27503 加味六一散

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生地 31 克 连翘 9 克 银花 9 克 六一散 9 克 苡仁 9 克 丹皮 6 克 赤芍 4 克

【用法】水煎，内服。

【主治】皮肤瘙痒症。

27504 加味六子丸

【方源】《便览》卷三。

【组成】菟丝子(酒煮)一两五钱 五味子五钱 枸杞(甘州产)二两 车前子二两 白蒺藜(炒去刺)二两 黄耆(蜜炒)一两 覆盆子一两五钱 破故纸(青盐炒)二两 麦冬(去心)二两 苁蓉(酒洗，去甲)二两 三钱 大甘草五钱 牛膝(去苗)二两 山茱萸(去核)一两 杜仲(炒去丝)一两五钱 熟地黄(酒洗)一两 牡蛎(盐泥固煅)一两

【用法】上为细末，捣饭为丸，如梧桐子大。空心盐汤送下，午间、临卧温酒送下。

【主治】男子阳痿，及妇人久不孕育。

【加减】夏，加黄柏(炒)二两；冬，加干姜(炒)五钱。

27505 加味六皮煎

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】大腹皮 桑白皮 五加皮 茯苓皮 生姜皮 木瓜 橘皮 姜黄 灯草

【用法】以水二盏，煮取一盏，温服。

【主治】产后肿满，腰以下更甚，而无光泽，小便短少者。

27506 加味六合汤

《宋氏女科》。为《回春》卷六“加减六合汤”之异名。见该条。

27507 加味六君汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参八分 白术三钱 茯苓二钱 甘草 半夏各三分 陈皮 黄连各二分 神曲 麦芽 防风各五分

【用法】水煎服。

【主治】小儿因风热湿三者合之成痉，头摇手劲，眼目上视，身体发颤，或吐而不泻，或泻而不吐。

27508 加味六君汤

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】熟人参八分 冬白术一钱半（炒）法半夏一钱半 白茯苓一钱半 全当归一钱半 小川芎八分 新会皮一钱半 广木香八分 炙甘草五分 纯钩藤三钱（迟入）生姜汁三匙（冲） 甜竹沥三匙（冲）

【用法】水煎去滓，冲二汁服。

【主治】虚风，手足指麻，脉弦虚浮者。

【方论选录】气虚血滞，不能运行于经络，且挟痰涎凝滞，故手足麻木不随焉。参、术补脾益气，苓、夏渗湿化痰，会皮、炙草缓中理气，木香、当归调气和营，川芎、钩藤舒筋活血，竹沥、姜汁豁痰通经。洵为虚风挟痰，手足指麻之专方。

27509 加味六君汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】人参 白术（土炒） 茯苓 陈皮 半夏（制）各一钱五分 甘草（炙）五分 藿香叶 枇杷叶（炙）各一钱 缩砂仁 枳壳（炒）各八分

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【主治】妊娠平素胃虚，中停痰饮，而为恶阻，吐多痰水，心烦头目眩晕。

【加减】胃热便秘，加黄芩、大黄以利之；胃寒喜热，加肉桂、干姜以温之。

27510 加味六君汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术（蜜炙）各一钱半 茯苓 陈皮（去白） 半夏（制，炒黄） 苏叶 枳壳（麸炒）各八分 炙甘草五分 生姜三片 大枣二枚

【用法】水煎服。

【主治】妊娠饮食不甘，呕吐不止，或体肥痰盛恶阻。

27511 加味六君汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】人参一两 黄耆 焦术各二两 茯苓五钱 半夏三钱 附子 陈皮 甘草各一钱

【主治】中风，右手不仁。

27512 加味六郁汤

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】香附 山梔（姜制） 苍术 神曲 川芎 当归 山甲 乳香 没药 半夏 茯苓 生姜

【功用】顺气宽中。

【主治】流注因暴怒所伤，抑郁所致，胸膈痞闷，中气不舒者。

27513 加味六神汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】橘红 半夏 胆星 菖蒲 茯神 旋覆 川贝 玉金

【主治】痰郁胸中，清气不升，经脉壅遏，遂成漏下者。

27514 加味火炊丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】火炊草九斤 枯松枝二两 石膏三两（煨） 石楠叶一斤 萆薢半两（醋煮七次，晒干）

【用法】上为末，醋糊为丸。每服三十丸，空心服。

【主治】阳证脚气。

【备考】方中枯松枝用量原脱，据《普济

方》补。

27515 加味火轮丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】肉豆蔻(面裹煨) 附子(炮, 去皮脐) 干姜(泡, 洗) 良姜(薄切, 滴少油炒) 天雄(炮, 去皮脐) 诃子(紧小者, 湿纸裹煨, 去核) 茱萸各半两

【用法】上为细末, 陈米粉煮糊为丸, 如梧桐子大。每服七十丸, 空心饮送下。

【功用】大暖脏气, 固养元阳, 进美饮食。

27516 加味火府汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】木通 生地 条芩 甘草梢 麦冬 人参 赤芍各一钱 淡竹叶十五片

【用法】加灯心, 水煎, 空心服。

【主治】孕妇小便少, 又涩痛者, 谓之子淋; 亦治溺血。

27517 加味双和汤

【方源】《得效》卷七。

【组成】白芍药三两半 当归(洗净, 酒炒) 熟地黄(洗, 酒蒸) 黄耆(去芦, 蜜炙) 各一两半 甘草(炙) 一两一钱半 川芎(去芦) 一两五钱 肉桂一两一钱 侧柏叶三钱(炒过)

【用法】上锉散。每服三钱, 加生姜三片, 大枣二枚, 乌梅一个, 水煎, 空心服。

【主治】肠风下血属虚者。

27518 加味艾附丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】艾叶四两(醋焙干) 当归(酒洗) 川芎 白芍(酒炒) 熟地二两(姜汁炒) 玄胡索二两 生甘草八钱

【用法】上为末, 水糊为丸, 如梧桐子大。每服七八十丸, 空心米汤送下。

【主治】妇人子宫虚寒, 经水不调, 小腹时痛, 赤白带下。

27519 加味平胃散

【方源】方出《百一》卷十六引魏监方, 名见《普济方》卷二九九。

【组成】平胃散加膩粉

【用法】清油调敷。

【主治】一切恶疮, 头上疮。

27520 加味平胃散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】平胃散五帖

【用法】用酒煎马蓝草, 去滓, 空心点服平胃散。

【主治】妇人脾血不固, 崩漏。

27521 加味平胃散

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】生料平胃散(术、朴不制)加神曲麦芽(炒)各半钱

【用法】每服五钱, 加生姜三片, 水煎服。

【功用】《医方考》: 宽中下气, 健脾消食。

【主治】①《丹溪心法》: 吞酸或宿食不化。

②《医方考》: 呃臭, 右关脉滑。

【方论选录】《医方考》: 食经宿而不化, 有热则令人吞酸, 无热则但呃臭而已; 右关主脾胃, 脉滑主停食。治此者, 宜宽中下气, 健脾消食。辛者可宽中, 故用苍术、陈皮; 苦者可下气, 故用厚朴; 甘者可健脾, 故用甘草; 盒造变化者能消食, 故用神曲、麦芽。

27522 加味平胃散

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】苍术(米泔水浸, 焙) 厚朴(姜炒) 陈皮 香附(醋炒) 人参各一钱 炙草 生姜(焙) 各五分 神曲(炒) 一钱

【用法】水煎, 热服。

【主治】产后伤食, 腹胀, 呕逆食臭, 脉弦滑。

27523 加味平胃散

《育婴秘诀》卷三。为《博济》卷二“平胃散”之异名。见该条。

27524 加味平胃散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】苍术(米泔浸, 炒) 一钱 陈皮一钱 厚朴(姜炒) 八分 半夏(姜炒) 八分 川芎五分 香附一钱 炒枳实一钱 木香八分 神曲(炒) 一钱 山楂一钱 干姜七分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【主治】食积腹痛，脉弦，其痛在上，以手重按愈痛，甚欲大便，利后痛减。

27525 加味平胃散

【方源】《痘疹活幼至宝》卷末。

【组成】苍术（米泔水浸） 厚朴（去皮，姜汁炒） 山楂肉各六分 陈皮（去白） 青皮 炒麦芽 炒香附 砂仁（研） 小川芎各四分 炙甘草三分 生姜三片

【用法】水一钟半，煎七分，分二三次服。

【主治】小儿伤食吐泻。

【备考】《慈幼新书》有藿香，无生姜。

27526 加味平胃散

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】厚朴（姜炒） 苍术（米泔浸，炒） 陈皮 甘草（炙） 人参各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】产后腹胀。

27527 加味平胃散

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 白术 茯苓 半夏 神曲 山楂 泽泻

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】食积泄泻。

27528 加味平胃散

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】平胃散加黄连 木香 槟榔

【用法】水煎服。

【主治】毒滞上攻，痢兼呕吐。

27529 加味平胃散

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 白术 枳实 山楂 神曲 青皮 草果 砂仁

【用法】上锉。水煎服。

【主治】食症。寒已复热，热已复寒，寒热交并，苦饥不食，食则吐痰，胸膈胀满。

27530 加味平胃散

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】苍术四钱 厚朴 陈皮各三钱 草果 槟榔各二钱 甘草一钱

【用法】上锉，作二剂。加生姜煎服。

【主治】瘴症。寒热作而指甲青黑者。

27531 加味平胃散

【方源】《济阳纲目》卷三十七。

【组成】厚朴 陈皮 苍术各一钱 甘草（炙）三分 枳实 砂仁 麦芽 神曲 山楂 木香 白豆蔻各五分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】饮食停滞，胸腹痞闷。

27532 加味平胃散

《玉案》卷二。为《伤寒六书》卷三“加减调中饮”之异名。见该条。

27533 加味平胃散

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】平胃散加 神曲 山楂 香附 木香 砂仁 枳壳 肉桂 干姜

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】食滞腹痛。气口脉紧盛或沉而实，有形在中脘，痛甚恶食，或泻之后痛减者，甚则手不可近，而欲吐不吐。

27534 加味平胃散

【方源】《痘疹仁端录》卷十。

【组成】陈皮 苍术 厚朴 甘草 藿香 砂仁 小茴香 煨姜

【主治】痘疹呕吐，面青白，手足冷，二便自利，心腹作痛，或渴喜热饮者。

27535 加味平胃散

【方源】《证治汇补》卷六。

【组成】平胃散加干葛 香附 木香 槟榔

【主治】酒积腹痛。

27536 加味平胃散

【方源】《证治汇补》卷七。

【组成】平胃散加木香 檀香 乌药 砂仁

【主治】尸厥。

27537 加味平胃散

【方源】《证治汇补》卷八。

【组成】苍术 陈皮 甘草 黄芩 黄连 槟榔 茯苓 木香 泽泻 木通

【主治】湿蒸热郁而致下痢。

27538 加味平胃散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷五。

【组成】留白广皮(炒) 白扁豆(炒黄) 各二两四钱 苍术(炒深黄) 三两二钱 厚朴(姜汁炒) 一两六钱 甘草一两(炒) 木通(炒) 八钱

【用法】上为细末。姜汤调下。

【主治】水泻，脾胃不和，不进饮食。

27539 加味平胃散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】苍术(制) 厚朴(炒) 陈皮 木香 白芍 山楂肉 槟榔 泽泻

【用法】生姜为引。或兼用和中丸。

【主治】小儿伤食泻，肚痛作渴，或泻糟粕恶臭。

27540 加味平胃散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】苍术(制) 厚朴 陈皮 甘草 黄芩 车前子 山楂肉 泽泻 白芍(炒) 木香

【用法】水煎服。或兼服加味香连散。

【主治】小儿痢疾，兼泄泻腹痛，唇红作渴者。

27541 加味平胃散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】防风 陈皮 制苍术 厚朴 木香 枳壳 白豆蔻 制香附 甘草 槟榔

【用法】生姜为引。

【主治】小儿胃脘积冷作痛，呕吐痰水者。

27542 加味平胃散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】陈皮 苍术 厚朴 炙草 藿香 砂仁 或加小茴(炒)

【用法】上加煨姜，同煎服。

【主治】痘疹虚寒呕吐。

27543 加味平胃散

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】陈皮 厚朴 苍术 甘草 草果 枳壳 神曲

【主治】孕妇胞阻，伤食停滞，心胃作痛者。

【加减】若大便秘结日久，则加芒消、大黄以攻之，然必倍甘草以缓其峻性，庶不伤胎。

27544 加味平胃散

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】南苍术(炒) 厚朴(姜炒) 大腹皮(制) 甘草(生) 陈皮 莱菔子(焙) 山楂 麦芽(炒) 神曲(炒)

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】小儿饮食过度，胃中停滞，以致腹胀，大便不利者。

27545 加味平胃散

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】陈皮 厚朴(姜炒) 神曲(炒) 南苍术(米泔水浸，炒) 麦芽(炒) 甘草(生) 香附米(制) 南山楂

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】小儿因食滞郁塞，痘出之时原无腹痛，忽然一时作痛者。

27546 加味平胃散

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】防风 升麻 枳壳(麸炒) 葛根 苍术(炒) 陈皮 厚朴(姜炒) 南山楂 麦芽(炒) 生甘草

【用法】引用生姜、灯心，水煎服。

【功用】消滞解毒。

【主治】小儿麻疹腹痛。食滞凝结，毒气不得宣发于外，故不时曲腰啼叫，两眉频蹙。

27547 加味平胃散

【方源】《金匱翼》卷七。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 缩砂 草果 山楂子 麦芽

【用法】水煎服。

【主治】食积泄泻，噎气作酸，泄而腹痛甚，泻后痛减，臭如抱坏鸡子。

27548 加味平胃散

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】苍术八分 芍药一钱 白术 神曲 陈皮 厚朴各五钱 白芷 甘草各三分

【用法】上为细末。人参汤调服；吐泻相兼，

用木香汤下；饮食不思，山楂汤下；烦躁口渴，麦冬汤下；二便不利，木通汤下；夜间啼哭，元胡青皮汤下；诸般杂证，米汤下；肚痛不止，芍药花粉汤下。

【主治】小儿吐乳吐食，泄泻伤寒。

27549 加味平胃散

【方源】《会约》卷三。

【组成】苍术一钱半 厚朴（姜炒）一钱 陈皮八分 甘草（炙）八分 扁豆（炒，研）二钱 白芍一钱半 半夏一钱半 大腹皮（去黑皮及粗，洗净）一钱 砂仁一钱（炒，研） 生姜一钱三分 大枣三枚（去核）

【用法】水煎服。

【主治】伤寒，太阴脾经病，腹满而吐，食不下，噤干，手足自温，或自利，腹痛，不渴，脉沉而细。

【加减】如泄，加肉豆蔻八分，白术一钱半，或再加煨木香三分；如腹痛拒按者，去生姜，加葛根一钱半；如噤干，加元参、桔梗。

27550 加味平胃散

【方源】《医学从众录》卷五。

【组成】苍术二钱 陈皮 甘草各一钱 厚朴一钱五分 猪苓 黄芩 泽泻各一钱五分 干姜五分 白芍三钱 陈仓米一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】痢疾。

【加减】痢下色红，去干姜，加当归三钱，黄连一钱。

27551 加味平胃散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】苍术一钱 厚朴一钱 陈皮六分 甘草六分 茯苓二钱 姜夏一钱 香附一钱 荷叶一钱二分

【主治】眼胞痰核。由湿痰气郁而成，结于上下眼胞，皮里肉外，其形大者如枣，小者如豆，推之移动，皮色如常，硬肿不疼。

27552 加味玉泉散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】石膏一两 青蒿五钱 香薷四钱 扁豆三钱 甘草一钱 侧柏叶四钱（炒） 荷叶

【主治】伤暑吐血。

【备考】方中荷叶用量原缺。

27553 加味玉烛散

【方源】《会约》卷四。

【组成】当归一钱三分 川芎一钱 白芍一钱 生地黄一钱半 大黄一二钱 桃仁（去皮）一钱 红花一钱 甘草一钱 牛膝一钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒蓄血。血分有滞，小腹胀痛，热蓄下焦。

【加减】血不下，加芒消三钱，化溶服，并重加大黄。

【备考】老弱妇人血虚者皆可服，以代仲景抵当汤。

27554 加味玉露散

【方源】《全国中药成药处方集》。

【组成】桂枝一钱半 石膏一两 猪苓 泽泻各四钱 藿香三钱 朱砂 琥珀 甘草各二钱 滑石八钱 白术 云苓 寒水石各六钱

【用法】上为极细末。成人每服二钱，小儿三分至一钱，白开水送下。

【功用】和胃止呕，利湿止泻。

【主治】胃肠诸热，暑湿吐泻，头晕自汗，腹痛口渴。

【宜忌】孕妇忌服。

27555 加味术附汤

【方源】《得效》卷二。

【组成】白术（去芦） 甘草（炒）各一两 附子（炮）一两半 赤茯苓一两

【用法】上锉散。每服五钱，加生姜七片，大枣二枚煎，一日三次。才见身痹又三服，当如冒状，勿怪，盖术、附并行皮中逐水气故尔。

【主治】中湿，脉沉而微缓，腹腹胀，倦怠，

四肢关节疼痛而烦，或一身重着，久则浮肿胀满，昏不知人，挟风头晕呕逆，兼寒则挛拳掣痛。

【加减】如有冒状，加桂一两，大便坚，小便利则勿加。

27556 加味术附汤

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】附子 白术各一两 肉豆蔻一个 木香 甘草各五钱

【用法】每服二钱，加生姜、大枣，水煎服。

【功用】温寒燥湿，行气健脾。

【主治】小儿吐泻后脾虚，变成慢惊，身弓发直，吐乳贪睡，汗多。

27557 加味术附汤

【方源】《医部全录》卷四三二引《幼幼近编》。

【组成】人参 白术(炒) 茯苓 甘草(炙) 肉果(煨) 附子(炮)(一方加木香)

【用法】每服三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿慢惊吐泻身凉，或因脏寒洞泄。

27558 加味术苓汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参 白术各五钱 茯苓三钱 半夏二钱 竹沥一合 附子三分

【用法】水煎服。

【主治】气虚呃逆，时作时止。

27559 加味术苓汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白术二两 茯苓五钱 半夏三钱 肉桂二钱 生姜一两 白豆蔻三粒

【用法】水煎服。

【主治】脾胃虚寒而得疟症者。发疟之时，先寒后热，寒从腹起，善呕，呕已乃衰，热过汗出乃已。

27560 加味术苓汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】白术五钱 茯苓一两 贯众一两 甘草二钱 车前子五钱

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫，鼻中出血后，饮水泻痢。

27561 加味术苓汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】苍术(炒) 厚朴(炒) 木瓜(炒) 腹皮 柴胡 陈皮 猪苓

【用法】生姜一片为引。

【主治】小儿受湿，腿腹肿胀。

27562 加味术桂汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】白术一两 肉桂一钱 甘草一分 人参二钱 丁香一钱

【用法】水煎，加人尿半碗，探冷服之。一剂即安。

【主治】格阳不宣，肾经寒邪太盛，上假热而下真寒，致一时关格，大小便闭结不通，渴饮凉水，少顷即吐，又饮之又吐，面赤唇焦，粒米不能下胃，饮一杯吐出杯半，脉亦沉伏。

27563 加味甘桔汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】甘草 桔梗 款冬 贝母 前胡 枳壳 白茯苓 五味 麦冬各等分

【用法】加淡竹叶十五片，水煎，食后温服。

【功用】《会约》：清肺宽中。

【主治】产后咳久不止，涕唾稠粘。

【宜忌】如产后吃盐太早者难治。

27564 加味甘桔汤

【方源】《保命歌括》卷六。

【组成】桔梗 甘草 升麻 连翘 防风 牛蒡子 黄芩(酒炒)各一钱

【用法】水煎，加薄荷三叶，煎八分，食后细细呷之。

【主治】大毒流行，咽痛喉痹。

27565 加味甘桔汤

【方源】《片玉痘疹》卷五。

【组成】桔梗 甘草 牛蒡子(炒，研) 射干 荆芥 升麻

【主治】痘疮咽喉肿痛。

27566 加味甘桔汤

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】桔梗八分 甘草一钱二分 牛蒡子 射干各六分 防风 玄参各四分

【用法】水一钟煎服。或加生姜一片。

【主治】咽喉肿痛。

【加减】热甚者，加黄芩，去防风。

27567 加味甘桔汤

【方源】《济阳纲目》卷一〇六。

【组成】桔梗三钱 甘草 防风 荆芥 薄荷 黄芩 元参各一钱

【用法】上锉。水煎，食后频频噙咽。

【主治】喉痹。

【加减】咳逆，加陈皮；咳嗽，加知母、贝母；发渴，加五味子；唾脓血，加紫苑；肺痿，加阿胶；面目肿，加茯苓；呕，加半夏、生姜；少气，加人参、麦门冬；肤痛，加黄耆；目赤，加梔子、黄连；咽痛，加鼠粘子、竹茹；声哑，加半夏、桂枝；疫毒，头痛肿，加鼠粘子、大黄、芒消；胸膈不利，加枳壳；心胸痞，加枳实；不得卧，加梔子；发斑，加荆芥、防风；酒毒，加干葛、陈皮之类。

27568 加味甘桔汤

【方源】《医林绳墨大全》卷八。

【组成】甘草 桔梗 诃子 木通

【用法】水煎，入生地汁少许服。

【主治】风寒失音。

27569 加味甘桔汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】桔梗 川芎 天花粉 麦冬各三钱 甘草 黄芩各一钱

【用法】水煎服。

【主治】春温。春月伤风，头痛鼻塞，身亦发热。

27570 加味甘桔汤

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】桔梗三钱 甘草一钱 甘菊二钱 青黛二钱 茯苓三钱 白附子八分 天花粉二钱 白芷五分

【用法】水煎服。

【主治】肺风，渣鼻疮。

27571 加味甘桔汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】甘草 桔梗 桑皮 丹皮 陈皮 黄芩 白芍 乌梅肉 使君子肉

【用法】生姜一片为引。兼服抱龙丸。

【主治】小儿肺胃湿热，鼻内出虫者。

27572 加味甘桔汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】甘草五分 桔梗 川贝母 百部 白前 橘红 茯苓 旋覆花各一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】表寒束其内热，致成哮喘。

27573 加味甘桔汤

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】甘草(炙)三钱 桔梗 荆芥 牛蒡子(炒) 贝母各一钱五分 薄荷三分

【用法】水煎服。

【主治】外感风热，咽喉肿痛，或生悬痈、口菌及大头天行。

①《医学心悟》：喉痹，君相二火冲击，咽喉痹痛；缠喉风，咽喉肿痛胀塞，红丝缠绕，口吐涎沫，食物难入，甚则肿达于外，头如蛇缠；走马喉风，又名风杨，喉舌之间，暴发暴肿，转肿转大；缠舌喉风，硬舌根而两旁烂；悬痈，脾经蕴热所致，生于上腭，形如紫李；虾蟆瘟，颊下漫肿无头；大头天行，头面尽肿。②《外科证治全书》：口菌，由火盛血热气滞而生，多生在牙龈肉上，隆起形如菌，或如木耳，紫黑色。③《证因方论集要》：风火郁热初起之咳嗽。

【加减】若内热甚，或饮食到口即吐，加黄连一钱；若口渴，唇焦舌燥，便闭溺赤，更加黄柏、黄芩、山梔、黄连；若有肿处，加金银花五钱。

【方论选录】《证因方论集要》：方中荆芥、薄荷消风，牛蒡、土贝散热，甘、桔清火，治风热咳嗽最稳。

27574 加味甘桔汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】牛蒡子(炒) 苦桔梗 生甘草 射干

【用法】水煎服。

【主治】痘疹呛水。火盛热毒壅于会厌，咽门肿痛，水不易入，溢于气喉，气喷作呛。

27575 加味甘桔汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】射干 牛蒡子(炒) 元参 连翘(去心) 麦门冬(去心) 栀子(炒) 苦桔梗 甘草(生)

【用法】水煎服。

【主治】痘疹热毒壅遏肺窍，痘未灌浆而音已先哑者；或痘毒不能发越于外，火热壅塞膈间，上冲咽喉肿痛，甚而不能呼吸，饮食难入。

27576 加味甘桔汤

【方源】《痘麻紺珠》。

【组成】甘草一钱 桔梗三钱

【用法】加猪肤皮，水煎服。

【主治】痘疹咽喉肿痛，不能饮食者。

27577 加味甘桔汤

【方源】《会约》卷七。

【组成】甘草一钱半 桔梗一钱半 元参一钱 赤药 生地 防风各一钱 荆芥七分 薄荷七分 山豆根 连翘 黄芩各一钱 北细辛三分 羌活六分 独活七分 白芷八分

【用法】水煎服。

【主治】喉肿痛。

【加减】肝胆火，加白芍、栀子、胆草；胃火，加石膏三钱；若大便秘结者，加大黄、芒消；毒甚而烂者，加牛蒡子，金银花。

27578 加味甘桔汤

【方源】《会约》卷二十。

【组成】连翘 甘草 桔梗 射干 牛蒡子 黄连(酒炒) 黄芩(酒炒) 各一钱

【用法】水煎服。外用苦参三钱，僵蚕二钱为末吹之。

【主治】麻疹后余毒喉病。

27579 加味甘桔汤

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】生地一钱 元参一钱 枳壳一钱 桔梗一钱 牛子一钱 丹皮一钱五分 防风一钱 连翘一钱 山甲二片 银花一钱 公英三钱 甘草五分

【用法】水煎内服。外敷洪宝膏，溃后用乌云散盖膏。

【主治】结喉痛，生于项前结喉之上，肿甚则堵塞咽喉，汤水不下。

27580 加味甘桔汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】荆芥 贝母 大力 薄荷 细辛 桔梗 甘草

【用法】水煎服。外用指甲煨、研，吹上即破。

【主治】乳蛾，喉生大白泡。

【加减】热甚，加芩、连；肿甚，加银花。

27581 加味甘桔汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】甘草 豆根 力子 麦冬 菱仁 桔梗 元参 连翘 荆芥

【主治】麻症咽喉肿痛不食。

27582 加味甘桔汤

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】桔梗 白及片 橘红 甜葶苈(炒) 各一钱 甘草节 川贝母各一钱五分 米仁 银花各五钱 (加丝瓜筋二三钱亦佳)

【用法】水煎服。

【主治】肺病咳嗽，吐脓血，胸中及右肋疼痛，不能右卧者。

【加减】如肺病初起，加荆芥、防风各一钱；如溃后者，加人参、绵黄耆各一钱。

27583 加味甘桔汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生甘草五分 苦桔梗 嫩苏梗 紫菀 白前 橘红 制香附 旋覆花各一钱半

·【功用】散结活痰。

【主治】梅核气，咳逆无痰，喉间如含炙膏，

咯之不出，咽之不下，燥痰粘结喉头。

27584 加味甘桔汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生地 15 克 元参 15 克 桔梗 9 克 枳壳 9 克 银花 31 克 连翘 31 克 丹皮 9 克 蒲公英 31 克

【用法】水煎服。

【主治】口炎。

27585 加味甘露饮

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】熟地 生地 天冬 麦冬 枇杷叶（去毛） 黄芩各一两 茵陈 枳壳 石斛 甘草各一两 犀角三钱

【用法】上为粗末。每服三五钱，水煎，食后、临卧温服。

【主治】男、妇、小儿胃经客热，口臭牙宣，赤眼，口疮，一切疼痛，及上焦消渴，喉腥。

27586 加味甘露饮

【方源】《引经证医》卷四。

【组成】生地黄 玉竹 五味子 白蜜沙参 鲜石斛 麦冬 甘蔗汁

【主治】消渴，脾胃热，阴虚者。

27587 加味石膏汤

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】石膏八钱 山梔 人参 茯苓 知母各三钱 生地黄 淡竹叶各一两

【用法】每服一两，水煎去滓，下蜜半合，煮二沸，食前服。

【主治】膀胱实热，脬转不得小便，苦烦满，难于俯仰。

【加减】欲利，加芒消三钱。

27588 加味石膏汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】煅石膏 柴胡 陈皮 甘草

【用法】竹叶十片为引。

【主治】症在盛暑之时，唇红面赤，烦躁作渴，欲饮冷水，或热多寒少者。

27589 加味右归饮

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】大熟地（姜汁炒）八钱 杞子（酒

炒）三钱 净萸肉（酒炒）四钱 怀山药四钱 泽泻二钱 丹皮（酒炒）二钱 熟附子三钱 肉桂心一钱 白茯苓二钱 鹿角胶三钱 巴戟肉三钱 炮姜八分

【用法】水煎服。

【功用】补气壮阳。

【主治】产后风寒入于腠理，经络不和，而致手足搐搦，眼目上视，角弓反张，口眼歪斜，舌瘖不语，痰涎上涌，不省人事者。

27590 加味左归饮

【方源】《医学从众录》卷四。

【组成】熟地七钱 山茱萸 怀山药 茯苓 枸杞各三钱 肉苁蓉（酒洗，切片）四钱 细辛 炙草各一钱 川芎二钱

【用法】水三杯，煎八分，温服。

【主治】肾虚头痛，及眩晕目痛。

27591 加味左金丸

【方源】《集验良方》卷三。

【组成】黄连（姜汁炒）半斤 吴萸（汤泡）三两 青皮（醋炒）二两 木香二两 槟榔四两 川芎二两

【用法】水为丸，如梧桐子大。

【主治】因酒食怒气所伤，致肝火郁结，两胁胀痛，及胃脘当心痛，吐酸，不思饮食。

27592 加味左金丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄连（姜炙）六两 吴茱萸（炙）二两 柴胡二两 青皮（炒）二两 黄郁金二两 香附（炙）三两 白芍四两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸。每十六两用滑石细粉四两为衣，晒干。每服二钱，一日二次，温开水送下。

【功用】舒郁宽中，平肝止痛。

【主治】气郁肝旺，胸膈堵塞，两胁刺痛，多发急怒。

27593 加味左金丸

【方源】《中医内科临床治疗学》引《冰玉堂经验方》。

【组成】柴胡 3 克 枳实 6 克 白芍 9 克

元胡 9 克 川楝子 9 克 青黛 9 克 竹茹 9 克 香附 9 克 黄连 18 克 吴萸 3 克 甘草 6 克

【用法】蜜为丸。每服 3 克，一日三次。

【功用】疏肝清热，降逆止呃。

【主治】呃逆连声，因情志不舒而诱发，气冲引胁，脘闷纳呆，两胁胀痛，咽中不利，肠鸣矢气，舌苔薄白，脉弦。

【方论选录】柴胡、延胡、枳实、竹茹、香附舒肝气；青黛、白芍、川楝清肝热；黄连、吴萸降逆止呃。诸药合用，共奏疏肝清热，降逆止呃之功。

27594 加味左金汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】黄连五分 吴萸二分 瓦楞子三钱（煨，研） 革澄茄一钱 蒺藜三分 郁金二钱 青皮一钱 柴胡一钱（醋炒） 延胡索一钱 木香五分 广皮一钱 砂仁一钱 佛手五分

【主治】肝气郁结，气火俱升，上犯胃经，痛连胁肋。

27595 加味龙石散

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】寒水石（烧）四两 朱砂（飞研）二钱 马牙消（枯）一钱 铅白霜半钱 硼砂半钱 脑子二钱半 或加甘草（末）二钱

【用法】上为极细末。每用少许，干掺患处，吐津，误咽了，不妨。

【主治】口舌生疮，时时血出，咽喉肿塞，疼痛妨闷。

27596 加味龙石散

【方源】《济众新编》卷三。

【组成】乳香 没药 麝香 朱砂 石雄黄 寒水石 白矾 龙脑各等分

【用法】上为末。掺之，一日三五次。

【主治】牙疳。

27597 加味龙虎散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷三引《得效》。

【组成】苍术一两 全蝎五钱 草乌 附子（并炮制）各二钱 天麻三钱

【用法】上为末。每服一钱，空心豆淋酒调下。

【功用】《医学入门》：养肾气。

【主治】①《东医宝鉴·外形篇》引《得效》：风寒腰痛，筋骨拳挛。②《医学入门》：积聚癥瘕，内伤生冷，外中风寒，腰脚膝肢曲折拳挛，筋骨疼痛，经年不能常履者。

27598 加味龙胆汤

《外科枢要》卷四。为《外科发挥》卷六“加减龙胆泻肝汤”之异名。见该条。

27599 加味戊己汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】白芍 甘草 黄柏 知母

【主治】脾阴不足，土中之火刑金，而致内伤嗽血。

27600 加味归芍汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】当归 白芍各一两 生地 麦冬各五钱 天花粉 炒栀子各二钱

【用法】水煎服。

【主治】肝血不足，肝燥而气逆，稍逢拂意之事，便觉怒气填胸，不能自遣，嗔恼不已。

27601 加味归芎汤

《笔花医镜》卷四。为《得效》卷十四“加味芎归汤”之异名。见该条。

27602 加味归芎饮

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】焦术 当归 生地各一两 川芎五钱 升麻一钱

【主治】妇人经行后阴。

27603 加味归宗汤

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】归宗汤加紫草 石膏 犀角 黄连 归尾

【主治】痘疹毒火迅烈，莫能约束，热未三朝，发热或半日或一日，痘疹涌出不循序。

27604 加味归宗汤

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】归宗汤加归尾 红花 紫草 犀角 黄连 穿山甲 地丁

【主治】毒火炽盛，气血稠滞，痘疹灌浆之时，地界红紫，痘形焦黑，而浆不行。

27605 加味归宗汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】当归尾 赤芍药 元参 大黄(生) 羌活 荆芥穗 青皮(炒) 穿山甲(炙) 生地 东山楂 牛蒡子(炒，研) 木通

【用法】水煎服。

【主治】毒火亢极，真阴不能胜邪，痘当出而未出，发热，腰频频作痛者。

27606 加味归脾丸

【方源】《金鉴》卷七十二。

【组成】香附 人参 酸枣仁(炒) 远志(去心) 当归 黄耆 乌药 陈皮 茯神 白术(土炒) 贝母(去心) 各一两 木香 甘草(炙) 各三钱

【用法】上为细末，合欢树根皮四两煎汤，蒸老米糊为丸，如梧桐子大。每服六十九，空腹白滚水送下。

【功用】理脾宽中，疏通戊土，开郁行痰，调理饮食。

【主治】郁结伤脾，肌肉浇薄，土气不行，逆于肉里，致生肉瘤、肉瘤。

27607 加味归脾汤

【方源】《口齿类要》。

【组成】归脾汤加柴胡 丹皮 山栀

【用法】水煎服。

【主治】①《口齿类要》：思虑动脾火，元气损伤，体倦发热，饮食不思，失血牙痛。②《嵩崖尊生》：思虑之过，血伤火动，口舌生疮。

27608 加味归脾汤

【方源】《正体类要》卷下。

【组成】归脾汤加柴胡 山栀

【主治】妇人血虚，心脾郁结，经闭发热，产门不闭，及乳岩初起。

①《景岳全书》：脾经血虚发热。②《张氏医通》：心脾郁结，经闭发热。③《叶氏女科》：妇人乳岩初起，因肝脾二脏郁怒，气血亏损者，伴有内热，夜热，五心发热，肢体倦瘦，月经不调；及产后忧思伤脾而血热，产门不闭者。

27609 加味归脾汤

【方源】《保婴撮要》卷三。

【组成】人参 黄耆 茯神(去木) 甘草 白术(炒) 各一钱 木香五分 远志(去心) 酸枣仁 龙眼肉 当归 牡丹皮 山栀(炒) 各一钱

【用法】水煎服。婴儿为患者，令子母俱服之。

【主治】乳母忧思伤脾，以致小儿血虚发热，腹痛发抽，怔忡失眠，自汗盗汗，口舌生疮；及妊娠吐衄。

①《保婴撮要》：因乳母郁怒积热，婴儿腹痛发搐者。②《准绳·幼科》：小儿因乳母忧思郁怒，胸胁作痛，或肝脾经分患疮疡之证，或寒热惊悸无寐，或便血盗汗，口疮不敛。③《证治宝鉴》：思虑过甚，脾经血伤火动，口舌生疮，咽喉不利。④《叶氏女科》：妊娠忧思郁结伤脾，而致吐衄。⑤《外科真诠》：思虑伤脾，心火上炎所致之舌岩。

【临证举例】①内钩 一小儿因乳母怀抱郁结，腹痛发搐，久而不愈，用加味归脾汤加漏芦，母子并服渐愈。②胁痛 一小儿四岁，胁间漫肿一块，甚痛，色如故，服流气败毒等药，加寒热作呕，食少作泻，此禀肝脾气滞之症，元气复伤而甚耳。乃择乳母气血壮盛者，与加味归脾汤、加味逍遥散服之，儿饮其乳半载而消。

27610 加味归脾汤

【方源】《医部全录》卷三九九引《薛氏医案》。

【组成】白术(炒) 人参 茯苓各一钱 柴胡 川芎 山栀(炒) 芍药(炒) 甘草(炒) 各五分 熟地黄 当归各八两

【用法】水煎服。

【功用】内消乳岩。

【主治】妇人乳岩初起。

27611 加味归脾汤

《古今医鉴》卷十一。为《正体类要》卷下“归脾汤”之异名。见该条。

27612 加味归脾汤

【方源】《医宗必读》卷八。

【组成】人参 炙黄耆 白术 当归 茯苓 酸枣仁各一钱半 远志肉八分 木香 甘草(炙)各五分 龙眼肉二钱 大枣二枚 煨姜三片 菖蒲八分 桂心五分

【用法】水二钟，煎一钟，食后服。

【主治】虚寒心悸而痛。

27613 加味归脾汤

《种痘新书》卷十二。即原书同卷“归脾汤”加柴胡、山梔。见该条。

27614 加味归脾汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】归脾汤加朱砂 龙齿

【主治】妇人产后，忧愁思虑伤心脾，惊悸恍惚者。

27615 加味归脾汤

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】归脾汤加伏龙肝

【用法】水煎服。

【主治】妇人心、脾伤损，每交接辄出血者。

27616 加味归脾汤

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】归脾汤加辰砂 琥珀末

【用法】上将归脾汤水煎，调辰砂、琥珀末服之。

【主治】妇人七情内伤，心脾亏损，神无所护，致夜梦鬼交，独笑独悲。

27617 加味归脾汤

【方源】《叶氏女科》卷二

【组成】人参 黄耆 白术(蜜炙) 茯苓 枣仁各二钱 远志(制) 当归各一钱 柴胡 山梔仁 枳壳(麸炒)各八分 木香(不见火) 炙甘草各五分

【用法】加龙眼肉七枚，水二钟，煎七分，空腹服。

【主治】子悬。妊娠四五月，因脾郁而致胎气不和，逆上心胸，胀满疼痛不安者。

27618 加味归脾汤

【方源】《一盘珠》卷五。

【组成】人参 黄耆 当归 白术 枣仁 志肉 茯神 甘草 川郁金 香附 木香 牛膝

【主治】脱疽脾虚，兼郁火下注，饮食减少。

27619 加味归脾汤

【方源】《盘珠集》卷上。

【组成】人参 白术(炒) 茯神(去皮木) 当归(去尾) 枣仁(去壳，炒) 莲肉(去心) 黄耆(蜜炙) 远志 木香

【主治】子肿，血少气滞者。

【备考】远志辛散而上升，不宜多用，四五分足矣。

27620 加味归脾汤

【方源】《疫疹一得》卷下。

【组成】人参一钱 黄耆一钱半(炒) 白术一钱(炒) 茯神三钱 枣仁二钱(炒) 远志一钱半(炒) 甘草五分 当归一钱半 麻黄根二钱 牡蛎三钱 红枣三枚 浮麦三钱

【主治】自汗，盗汗。

27621 加味归脾汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】潞党参 炙黄耆 生晒术 茯神 归身各三钱 枣仁 远志各二钱 阿胶 焦山梔 丹皮各一钱 清炙草 广木香各五分 龙眼肉五枚

【功用】补脾养阴。

【主治】夹血伤寒后期，出血已止，阴液亏虚者。

27622 加味四七汤

【方源】《直指》卷十一。

【组成】半夏(制)二两半 白茯苓 厚朴(制)各一两半 茯神 紫苏叶各一两 远志(姜汁蘸湿，取肉，焙) 甘草(炙)各半两

【用法】上锉。每服四钱，加生姜七片，石

菖蒲半寸，大枣二枚，水煎服。

【功用】豁痰散惊。

【主治】①《直指》：心气郁滞，惊悸。②《杂病源流犀烛》：心悸痛，劳役则头面赤而下重，自烦发热，脉弦，脐上跳。

27623 加味四七汤

【方源】《得效》卷四。

【组成】桂枝 白芍药 半夏(洗)各一两 白茯苓 厚朴(去粗皮，姜汁炒) 枳壳(面炒) 甘草(炙)各半两 人参 紫苏叶各一两 (一方加明乳香、玄胡索各半两)

【用法】上锉散。每服四钱，加生姜七片，大枣二枚，水煎，食前服。

【主治】寒邪客搏心痛。

27624 加味四七汤

【方源】《疮疡经验全书》卷九。

【组成】紫苏叶 白茯苓各五钱 半夏(姜汁浸，炒) 桑皮各三钱 木香二钱 枳实 厚朴各三钱 甘草二钱

【用法】分四服。加生姜七片，水煎服。

【主治】疮疡喘嗽多痰。

27625 加味四七汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】白茯苓(去皮) 川厚朴(去皮，姜炒) 苏梗 半夏(姜汁炒) 广橘红 青皮 枳实 砂仁 南星(姜汁炒) 神曲(炒)各一钱 白豆蔻 槟榔 益智仁各五分

【用法】上锉一剂。加生姜五片，水煎，临卧服。

【主治】七情之气结成痰气，状如梅核，或如破絮，在咽喉之间，咯不出，咽不下；或中脘痞满，气不舒快；或痰涎壅盛，上气喘急；或因痰饮，恶心呕吐。

27626 加味四七汤

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】半夏(汤洗七次)一两 厚朴(姜汁制) 赤茯苓 香附子(炒)各五钱 紫苏 甘草各二钱

【用法】上咬咀，分四帖。每服水二钟，加

生姜五片，煎八分，去滓，加琥珀末一钱，调服。

【主治】①《准绳·女科》：妇女小便不顺，甚者阴户疼痛。②《女科指掌》：思虑伤脾，导致白浊白淫，胸痞虚浮，面色黄，多眠少食。

【方论选录】《济阴纲目》：此方治四气七情，故以为名。然以半夏为君，则知内外二因，皆能令气郁而生湿生痰也，香附治内，紫苏治外，其余又兼内外，以佐其成功，然不有琥珀为之通窍燥湿，则亦不能为效也。

27627 加味四七汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】半夏(汤泡)五两 白茯苓(去皮)四两 川厚朴(姜炒)三两 紫苏二两 桔梗二两 枳实(麸炒)二两 甘草一两

【用法】上锉作十剂。加生姜七片，大枣一枚，水煎，热服。

【主治】七情之气，结成痰涎，状如破絮，或如梅核，在咽喉之间，咯不出，咽不下；或中脘痞闷，气不舒快，或痰涎壅盛，上气喘急；或因痰饮，恶心呕吐。

27628 加味四七汤

《观聚方要补》卷五。即《济生》卷二“加味七气汤”。见该条。

27629 加味四七汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】紫苏叶二钱 厚朴三钱 茯苓四钱 半夏三钱 白芷 木香各二钱 建菖蒲七分

【用法】水煎，温服。

【功用】疏郁化痰。

【主治】气郁痰阻，白带稠粘，时多时少，中脘痞闷，平日痰多，或有气喘，呕逆恶心。

27630 加味四斤丸

【方源】《三因》卷九。

【异名】加减四斤丸(《准绳·类方》卷四)。

【组成】苡蓉(酒浸) 牛膝(酒浸) 天麻 木瓜干 鹿茸(燎去毛，切，酥炙) 熟

地黄 菟丝子(酒浸通软, 别研细) 五味子(酒浸) 各等分(一法不用五味子, 有杜仲)

【用法】上为末, 蜜为丸, 如梧桐子大。每服五十丸, 食前温酒或米汤送下。

【主治】肝肾脏虚, 热淫于内, 致筋骨痿弱, 不自胜持, 起居须人, 足不任地, 惊恐战掉, 潮热时作, 饮食无味, 不生气力, 诸虚不足。

【备考】《普济方》引鲍氏方有当归身。

27631 加味四斤丸

【方源】《济生》卷三。

【组成】虎胥骨(酥炙)二两 天麻 宣木瓜(去皮瓤, 蒸) 川乌(炮, 去皮) 各一两 肉苁蓉(酒润, 焙) 没药(别研) 乳香(别研) 各半两 川牛膝(洗, 去芦, 酒润) 一两半

【用法】上为细末, 入木瓜膏杵和, 入少酒糊为丸, 如梧桐子大。每服七十丸, 空心、食前温酒、盐汤任下。

【主治】肝肾俱虚, 精血不足, 足膝痿弱, 步履无力, 及受风寒湿气, 致脚痛脚弱者。

27632 加味四生饮

【方源】《医编》卷一。

【组成】生荷叶 生艾叶 生柏叶 生地 黄各等分

【用法】加降香、童便煎服。元气虚弱, 即将童便浸前药, 水为丸, 独参汤送下。

【主治】吐血属火者。

27633 加味四圣散

《简明医彙》卷六。为《得效》卷十一“加味四圣散”之异名。见该条。

27634 加味四圣散

【方源】《直指小儿》卷五。

【组成】紫草茸 木通 南木香 黄耆(微炒) 川芎 甘草各等分

【用法】上为粗末, 煎一钱, 不拘时候服。

【主治】小儿疮痘出不快, 及变陷者。

【加减】大便秘, 加枳壳少许; 大便如常, 加糯米一百粒(糯米解毒, 能酿而发之)。

27635 加味四圣散

【方源】《得效》卷十一。

【异名】加味四圣饮(《简明医彙》卷六)。

【组成】紫草茸 木通(去皮节) 南木香 黄耆(炒) 川芎 甘草 人参各等分 蝉蜕(去足翼)十个

【用法】上锉散。每服二钱, 水一盏煎, 不拘时候温服。

【主治】①《得效》: 小儿疮痘出不快, 及变陷倒靥, 小便赤涩, 余热不除, 一切恶候; 或被风吹, 复不见, 入皮肤内者。②《张氏医通》: 小儿痘灌浆时, 热渴引水或作痒。

【加减】大便秘, 加枳壳少许; 大便如常, 加糯米一百粒(性解毒, 能酿而发之)。

27636 加味四圣散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】紫草 木通(去皮)各二钱 川芎四分 甘草二分 白术 茯苓各三分 糯米 木香(另磨)

【用法】水煎服。

【主治】痘疹大便秘结。

27637 加味四圣散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】紫草 木通(去节) 枳壳(炒) 黄耆 桂枝 大黄(酒制)各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疹, 便秘。

27638 加味四圣膏

【方源】《医学碎金录》。

【组成】紫河车八两 龟版胶八两 麋角胶八两 茯苓八两 天麦冬共十六两 生熟地共十六两 地骨皮八两

【用法】先熬二地、二冬、茯苓、地骨三次, 河车焙干研末, 将三次药汁再熬, 入二种胶、河车末收膏。

【功用】峻补精血。

【主治】消耗性慢性疾病及贫血患者(如肺结核等)。

27639 加味四君汤

《景岳全书》卷五十三。为《三因》卷十五

“加味四君子汤”之异名。见该条。

27640 加味四君汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】人参 白术各五钱 甘草 香薷各一钱 茯苓二钱 炮姜三分

【用法】水煎服。

【主治】中暑。膏粱子弟，多食瓜果以寒其胃，忽感暑气，一时猝倒。

27641 加味四君汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参 小茴香各三钱 白术 山药各一两 肉桂一钱 萝卜子一钱 甘草一钱 肉豆蔻一枚 茯苓五钱

【用法】水煎服。

【主治】泄泻，饥渴思饮食，饮食下腹便觉饱闷，必大泻后快，或早或晚，一昼夜数次以为常，面色黄瘦，肢肉减削。

27642 加味四君汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参 远志 山药各三钱 白术五钱 甘草 枳壳各一钱 茯苓五钱 菖蒲一钱 山楂二十粒 神曲一钱

【用法】水煎服。

【主治】心疑而物不化，食蔬菜之类，觉胸膈有碍，遂疑有虫，因而作痞。

27643 加味四君汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参 甘草 桂枝各一钱 白术茯苓各五钱 半夏二钱

【用法】水煎服。

【主治】疟疾，先腰痛，头疼且重，寒从背起，先寒后热，热如火炽，热止汗出，不能即干，遍身骨节无不痠疼，小便短赤，乃太阳膀胱经之症。

27644 加味四君汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参 白芍各三钱 白术 茯苓各五钱 陈皮五分 益智仁一钱 甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】痰证。胃气怯弱，水流胁下，咳唾

引痛，吐痰甚多，不敢用力。

27645 加味四君汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】白术三钱 茯苓三钱 人参 谷芽各一钱 甘草 神曲各五分 砂仁一粒

【用法】水煎服。

【主治】胃气虚弱，饥饿之后，腹中肠鸣，手按之鸣少止者。

27646 加味四君汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术(蜜炙) 茯苓各一钱五分 炙甘草 香附(制)各一钱 砂仁五分(炒)

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】妊娠五月，禀赋虚弱，胎萎不长，由于气虚者。

27647 加味四君汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术(蜜炙) 茯苓 枳壳(麸炒) 柴胡 黄芩 山梔仁(炒)各一钱 甘草五分

【用法】加生姜三片，葱白三茎，水煎服。

【主治】子悬。妊娠四五月，胃热而致胎气不和，逆上心胸，胀满疼痛不安者。

27648 加味四苓汤

《医钞类编》卷十九引聂氏方。为《痘疹传心录》卷十九“加味四苓散”之异名。见该条。

27649 加味四苓汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】茯苓三钱 白术一钱半(炒黑) 猪苓一钱半 柴胡梢五分 泽泻一钱半 青皮一钱半(炒) 陈皮一钱半 橘核三钱(炒)

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】女子前阴漫肿，脉弦者。

【方论选录】脾土虚衰，不能制湿而肝气滞于厥阴，故前阴两拗漫肿焉。方中白术专培脾土以制湿，茯苓渗利湿邪以安中，猪苓利三焦之湿，泽泻利膀胱之湿，青皮破滞气以

平肝，陈皮利中气以和胃，柴胡梢达下以升阳散滞，广橘核入肝以散结消肿也。水煎温服，使土强制湿则湿化气调而肝脾无滞结之患，何阴肿之不退哉！

27650 加味四苓散

【方源】《便览》卷三。

【组成】白术 赤茯苓 猪苓 泽泻 海金沙 木通 车前子

【用法】水煎服。

【主治】小便不通。

27651 加味四苓散

【方源】《痘疹传心录》卷十九。

【异名】加味四苓汤（《医钞类编》卷十九引聂氏方）。

【组成】猪苓七分 木通七分 泽泻八分 黄芩五分（酒炒） 黄连二分（酒炒） 赤茯苓七分 牛蒡子五分（炒，研） 车前子七分（炒）

【用法】加灯心五十寸同煎，食前服。

【主治】①《痘疹传心录》：痘疹毒气猖盛，行浆时作泻，小便红黄。②《医钞类编》：痘疹已回水结痂，脱落大半，余毒未尽，大渴大泻，每夜饮水三五碗，饮一次，泻一次，一二十次不止。

【宜忌】《验方新编》：虚泄者断不可服。

27652 加味四苓散

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】白术一钱五分 白茯苓（去皮）二钱 猪苓二钱 泽泻二钱 木通二钱 栀子三钱 黄芩二钱 白芍三钱 甘草八分

【用法】上锉。加灯心十茎，水煎，空心服。

【主治】泄泻属火证者，腹痛，泻水如热汤，痛一阵，泄一阵。

27653 加味四苓散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】人参减半 白术（去芦） 赤茯苓（去皮） 猪苓 泽泻 香薷 石莲肉 麦冬（去心）各等分

【用法】上锉。水煎，空心温服。

【主治】心经伏暑，小便赤浊而有热。

27654 加味四苓散

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】茯苓 猪苓 泽泻 白术 黄芩 木通（一方再加滑石、梔子）

【用法】上锉。水煎服。

【主治】火多泄泻。

27655 加味四苓散

【方源】《济阳纲目》卷九十一。

【组成】茯苓 猪苓 泽泻 白术各五分 滑石 梔子各一钱 甘草二分 灯心三十茎

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】诸淋。

27656 加味四苓散

【方源】《证治汇补》卷八。

【组成】茯苓 白术 猪苓 泽泻各等分 加山梔 麦冬 木通 黄芩

【用法】水煎服。

【主治】湿热不清便浊。

【方论选录】《医略六书》：湿热内伏，气化不清，不能分泌渗道，故溲溺浑浊，涩痛不已焉。方中生术利湿以清中道，泽泻通窍以利膀胱，猪苓利三焦之湿，山梔清三焦之热，茯苓渗脾肺之湿，黄芩清脾肺之热，麦冬清心润肺以滋水源，木通清心降热以利小便也。使湿热分化，则水府清和，而小便自长，何涩痛便浊之不痊哉！此清利之剂，为湿热白浊之专方。

27657 加味四苓散

【方源】《种痘新书》卷四。

【组成】白术一钱 茯苓（用赤者）八分 猪苓 泽泻各七分 木通 车前 牛蒡子各六分 黄芩三分

【功用】分清浊，利阴阳。

【主治】小儿痘疹初热，热着于中，水道不分，而致热泻，小便赤而不利，其粪或黄或赤或黑，其气甚臭，泄时有声，直射而远。

【加减】腹痛，加木香；后重出肠，加升麻；若素有食积而作泄，加厚朴、陈皮、山楂、神

曲、木香、胡连；若泄带红色，加百草霜；若身热烦渴，加柴胡、黄芩、麦冬；若痘隐隐不起，在皮间而不出见，加升麻以提气上升。

27658 加味四苓散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】猪苓 泽泻 赤茯苓 木通 黄芩 黄连 车前 白芍 金银花

【主治】疹后热毒积火移于大肠而致泻痢者。

27659 加味四苓散

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】羌活二钱 白术(净) 泽泻(盐水炒) 猪苓 茯苓各一钱五分

【功用】利湿。

【主治】湿胜身痛，小便不利而渴。

【加减】如体质寒者，加肉桂三分，或四五分。

27660 加味四味汤

《杏苑》卷七。为《医学正传》卷四引丹溪方“加味四物汤”之异名。见该条。

27661 加味四物汤

【方源】方出《妇人良方》卷二引张声道方，名见《观聚方要补》卷九引《选奇后集》。

【组成】四物汤加吴茱萸。

【用法】水煎服。若阳脏，少使茱萸；若阴脏，多使茱萸。

【主治】妇人百疾。

27662 加味四物汤

【方源】《产乳备要》。

【组成】当归 地黄 芍药 川芎各一两 柴胡半两 黄芩二钱半

【主治】①《产乳备要》：妇人冲任不调，脐腹疼痛，月事入时不来，及冲任太过，致使阴阳不和，或发寒热，渐减饮食，欲成劳病。②《医方大成》：冲任虚损，月水不行，肌肤发热如瘰状。

【备考】《御药院方》本方用法：上为粗末。每服四钱，水一盂半，入乌梅半枚，同煎至一大盂，去滓，食后温服。

27663 加味四物汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】熟地 当归 川芎 白芍各一两 枳壳五两

【用法】水二钟，煎一钟半，水中沉冷服。

【主治】新产血虚血晕，败血冲心，昏迷不省。

【备考】方中枳壳用量，《郑氏家传女科万金方》作“二两”。

27664 加味四物汤

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【异名】加减四物汤（《得效》卷十一）。

【组成】当归尾 芍药 川芎 苍术 白菊花 干葛 羌活各等分

【用法】上每用二钱，水一盂，入生地黄少许，杵碎，同煎半盂，乳食后服。

【主治】斑疮入目；或疮痘收后，目有翳膜。

【宜忌】忌一切动风毒物，虽愈后忌二三月方可。

27665 加味四物汤

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】四物汤加菊花

【用法】水煎服。

【主治】妇人肝血热证，经候不通，口干头晕。

27666 加味四物汤

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】四物汤加琥珀

【用法】水并加醋一合煎服。

【主治】经候不调，腹中疼痛，或脚气冲心。

27667 加味四物汤

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】四物汤一帖加橘红 香附子 元胡索各半两

【主治】妇人欲念不遂，心膈迷闷刺痛。

27668 加味四物汤

【方源】《玉机微义》卷三十一引《元戎》。

【异名】桃红四物汤（《金鉴》卷四十四）、四物加桃仁红花汤（《方症会要》卷二）。

【组成】四物汤加桃仁 红花

【主治】瘀血所致腰痛麻木，月经不调，吐

蛆屎黑，及血肿，下利脓血。

①《玉机微义》引《元戎》：瘀血腰痛。②《医级》引《元戎》：血滞经闭，或吐蛆屎黑，喜忘，瘀痛及下利脓血。③《济阳纲目》：麻木，纯属死血者。④《金鉴》：妇人内有瘀血，月经血多有块，色紫稠粘。⑤《方症会要》：血肿。

【备考】①本方方名，《医级》作“红桃四物汤”。②《医部全录》本方用法：水煎，空心热服。

27669 加味四物汤

【方源】《玉机微义》卷四十三引《元戎》。

【组成】四物汤加川山甲

【用法】水煎服。

【主治】虚人损伤。

27670 加味四物汤

【方源】《得效》卷十五。

【组成】四物汤加人参 茱萸

【用法】加生姜、红枣，水煎服。兼用熟附丸。

【主治】妇人经断后多年，忽然再行，遂成崩漏，腹痛寒热。

27671 加味四物汤

【方源】《医学正传》卷四引丹溪方。

【异名】加味四味汤（《杏苑》卷七）。

【组成】四物汤加桃仁（煮数次，去皮尖）牛膝（酒浸） 陈皮 茯苓 甘草 白芷 龙胆草各等分

【用法】上切细，作一服。水二钟，煎至一钟，去滓，温服。

【主治】白虎历节风证。

【加减】如痛在上者属风，加羌活、桂枝、威灵仙；在下者属湿，加牛膝、防己、木通、黄柏；气虚者，加人参、白术、龟板；有痰者，加南星、半夏、生姜；血虚者，倍当归、川芎，佐以桃仁、红花。

27672 加味四物汤

【方源】《医学正传》卷四引丹溪方。

【组成】当归身一钱 熟地黄三钱 白芍药 川芎各七分半 五味子九枚 麦门冬一

钱 人参五分 黄柏一钱 黄连五分 知母三分 杜仲七分半 牛膝三分 苍术一钱

【用法】上细切，作一服。水二盏，煎至一盏，空心温服；亦可酒糊为丸服。

【主治】①《医学正传》引丹溪方：诸痿，四肢软弱，不能举动。②《医钞类编》：瘰癧，肝血虚者。

【加减】足不软者，去牛膝。

【备考】方中熟地黄，《医钞类编》作生地。

27673 加味四物汤

《玉机微义》卷五。即《妇人良方》卷二引陈氏方“六物汤”。见该条。

27674 加味四物汤

《玉机微义》卷四十九。为《易简方》“六合汤”之异名。见该条。

27675 加味四物汤

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】川芎 当归 芍药 生地 槐花 黄连 桃仁

【用法】水煎服。

【主治】下痢纯血，久不愈，属阴虚者。

27676 加味四物汤

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】当归 芍药 侧柏各一钱半 川芎 生地 梔子（炒）各一钱

【用法】水二钟，煎八分，入水研京墨汁一二匙，童便一小钟，姜汁少许，徐徐服之。

【主治】吐血。

【加减】若吐血挟痰积，吐一二碗者，加黄柏、知母。

27677 加味四物汤

【方源】《产科家蒙》卷四引汪石山方。

【组成】当归 川芎 芍药 地黄各二钱半 胡黄连 秦艽 青蒿各五钱

【用法】以水五盏，煮取二盏半服。

【主治】产后蓐劳，四肢无力，睡而汗出，日晡潮热，口干，五心如炙，热炽而脉弦大有力者。

27678 加味四物汤

【方源】《内科摘要》卷上。

【组成】四物汤加白术 茯苓 柴胡 丹皮

【主治】《张氏医通》：血虚发热。

27679 加味四物汤

【方源】《校注妇人良方》卷一。

【组成】四物汤加柴胡 丹皮 山栀

【主治】妇人血虚火燥，致月经不调，蜚唇，及血风疮，产后大便秘涩。

27680 加味四物汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】归尾 川芎 赤芍 生地 肉桂 玄胡索 枳壳 香附 槟榔各一钱

【用法】水煎，调益元散三钱内服。以子生为度。

【主治】产妇胞浆干涩，难产，过二三日不生，但人事强实，饮食能进。

27681 加味四物汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】归身 人参 川芎 赤芍 生地 桔梗 甘草 麦冬 白芷各一钱

【用法】水煎，食后服。更煮猪蹄汤食之，则乳汁自通。猪蹄一对，洗尽煮烂，入葱调和，并汁食之。要是入香油炒过穿山甲共煮，去甲食之，更效。

【主治】初产之妇，乳方长，乳脉未行；或产多之妇，气血虚弱，乳汁短少。

【加减】如因乳不行，身体壮热，胸膈胀闷，头目昏眩者，加木通、滑石各一钱。

27682 加味四物汤

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】当归 川芎 赤芍 生地（俱酒洗） 柴胡 升麻 麦冬 木通（去皮） 黄芩（酒炒） 桔梗各五分 薄荷一分

【用法】加灯心十根，水煎，乳母食后服，儿服母乳。

【主治】小儿疳疾，并发惊痫，久则成疳。

27683 加味四物汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】四物汤加天冬 麦冬 黑蒲黄 香附 杜仲 故纸各一钱半 青盐一钱 甘

草四分

【用法】加荷叶、蒲扇叶各二钱，烧灰为引。

【主治】酒毒湿热，染血成瘀，牙缝涌血如泉。

27684 加味四物汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】当归 川芎 白芍（炒） 生地 熟地黄 黄耆（蜜炙） 人参 白术（去芦） 陈皮 白茯苓（去皮） 荆芥 甘草（炙） 各等分

【用法】上锉。加大枣二枚，乌梅一个，水煎服。

【主治】血虚眩晕卒倒，脉微涩。

【宜忌】不可艾灸、惊哭叫动，动则乘虚而死。

【加减】饱闷，加香附、砂仁，去黄耆、白术。

27685 加味四物汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归 川芎 生地 黄柏（酒炒） 知母（酒炒） 蔓荆子 黄芩（酒炒） 黄连（酒炒） 梔子（炒） 各等分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】血虚阴火冲上，头痛偏左者。

27686 加味四物汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归 川芎 黄柏（盐水浸） 知母（去毛） 天花粉各一钱 熟地 白芍各一钱二分 桔梗 甘草各三钱

【用法】上锉一剂。水煎，入竹沥一钟同服。

【功用】降火。

【主治】虚火上升，喉痛，并生喉疮、喉痹。

27687 加味四物汤

【方源】《产科发蒙》卷二引《胎产须知》。

【组成】四物汤加炒阿胶 炒黑香附 白术 黄芩 砂仁 糯米

【主治】胎气不固，常小产者。

27688 加味四物汤

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地黄

防风 荆芥各等分

【用法】上为散。每服三钱，水一盞半，煎至一盞，再入生地黄汁少许，去滓温服。再以生地黄一两，杏仁二十粒（去皮尖）研细，用绵子裹药敷在眼上，令干，再将瘦猪肉薄片，粘于眼上，再服《局方》黑神散。

【主治】①《准绳·类方》：打损眼目。②《准绳·幼科》：疮毒入目，血热不散，两毗皆赤，及疮疖。

27689 加味四物汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】黄连三钱 槐花二钱 川归一钱 川芎六分 粟壳七分 生地一钱 白芍八分 阿胶一钱 艾叶七分

【用法】上咬咀。水煎，食前温服。

【功用】清热凉血。

【主治】大肠经血热，下痢，鲜血不止。

【方论选录】方中用黄连、槐花理大肠经热，用归、芎、地、芍以补血凉血，阿胶、艾叶以止下痢之血，粟壳以固脱滑。

27690 加味四物汤

【方源】《宋氏女科》。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地 郁李仁 白术 丁香 桑皮 甘草 赤苓 陈皮 香附子

【用法】水煎服。

【主治】产后浮肿。

27691 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷一。

【组成】当归（酒洗） 川芎各一钱半 芍药（炒） 熟地黄 玄胡索 蓬术（醋煮） 香附（醋煮）各一钱 砂仁八分 桃仁（去皮尖）七分 红花（酒炒）五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】经水将来，作疼不止。

【方论选录】《医略六书》：血亏挟滞，不能统营气于经，故脐腹疼痛，然后经行。方中熟地补血以滋冲任，白芍敛阴以益肝肾，川芎行血海以调经，当归养血脉以荣经，蓬术破气中

之血，香附理血中之气，桃仁破瘀血以通经，延胡活滞血以止痛，红花活血生新，砂仁醒脾行气。水煎温服，使滞化气行，则经血调和而脐腹疼痛无不退，天癸循环无不自如。

27692 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷四。

【组成】当归 白芍药（炒） 川芎 生地 地骨皮 牡丹皮各等分（一方加白术）

【用法】上咬咀。每服六钱。水煎服。

【主治】妇人骨蒸。

【方论选录】《济阴纲目》汪淇笺：此方以四物生四脏之阴，以地骨、牡丹解骨蒸之热。其加白术者，以土为万物之母也。

27693 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷六。

【组成】当归 川芎各二钱 白术（微炒） 熟地黄（酒洗）各一钱半 白茯苓 芍药（微炒） 续断 阿胶各一钱 香附（醋煮）八分 橘红七分 甘草（炙）三分

【用法】上锉。水二钟，煎八分，空腹服。

【功用】久服有子。

【主治】血虚不孕。

27694 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷六。

【组成】当归（酒洗） 白芍药（炒） 肉苁蓉各二钱 熟地黄（酒洗） 白术 白茯苓各一钱 人参五分 川芎一钱

【用法】上锉。水煎服。每月经前三服，经正行三服，经行后三服。

【主治】气血两虚不孕。

27695 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷七。

【组成】当归 川芎 芍药 生地黄 柴胡 山梔子 牡丹皮 龙胆草

【用法】上锉。水煎服。

【主治】妇人阴户肿痛。

27696 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷八。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地黄

香附子各等分

【用法】上为末。每服三钱，紫苏汤调下。

【主治】妇人血少胎痛。

27697 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷九。

【组成】四物汤加香附 桃仁 枳壳 缩砂 紫苏

【用法】水煎服。

【功用】补血行滞。

【主治】妊娠过月不产者。

27698 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】川芎 当归 芍药 生地 蒲黄 阿胶 蓟根 白芷

【用法】水煎服。

【主治】产后血崩如豆汁，紫黑过多者。

27699 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地 白芷 升麻各一钱 血余炭（另入）

【用法】上锉。水煎服。

【主治】产后月余，经血淋漓不止。

【临证举例】产后下血 汪淇：族弟妇产后半月，离蓐过劳，下血倾盆，急以求救，余用此药，一服立止，其效如神。

27700 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地各一钱 香附（炒） 五灵脂（炒，二味另为末）各一钱（临服调入）

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】产后恶露不尽，腹痛。

【加减】痛甚者，加桃仁泥四分。

27701 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】当归 川芎 人参 芍药 熟地 白术 干姜（炮）各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】产后血虚身痛。

27702 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十二。

【组成】当归 川芎 白芍（炒） 熟地（酒洗） 茯神（去木）各一钱 远志（去心） 枣仁（炒）各七分

【用法】上咬咀。水煎，空腹服。

【主治】产后血少，怔忡无时。

27703 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地黄 白茯苓各一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后阴虚血弱，发热。

【加减】热盛，加炒干姜；虚烦，加茯神、远志。

27704 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】当归 川芎 赤芍药 生地 甘草梢 杜牛膝 木通各一钱 桃仁（去皮尖）五个 滑石一钱半 木香

【用法】上锉。水煎服。

【主治】诸淋属于热者。

【备考】方中木香用量原缺。

27705 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】四物汤四钱 龙骨（另研少许，临服入）

【用法】上锉。水煎服。

【主治】因产用力过多，阴门突出。

【加减】阴痛者，加藁本、防风，去龙骨。

27706 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】当归 川芎 白芍药（酒炒） 生地 木通 王不留行 天花粉各等分

【用法】上锉一剂。同猪蹄旁肉四两，煎汤二钟，入药同服。先将葱汤频洗乳房。

【主治】产后气血虚，乳汁不通。

27707 加味四物汤

【方源】《济阴纲目》卷十五。

【组成】当归 川芎 芍药 地黄 陈皮 黄芩 黄连 桃仁 红花 麻仁 甘草

【用法】上锉。水煎服。

【主治】血虚火盛，朝食甘美，至哺心腹刺酸吐出。

【加减】大便闭结，加大黄；气虚，合四君子汤。

27708 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地黄 知母 黄柏 人参 麦门冬 五味子 桑白皮 地骨皮

【用法】上锉。水煎服。

【主治】咳嗽吐红。

【备考】或云不宜用人参。

27709 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地黄 桔梗 黄柏(炒)各一钱

【用法】上锉。水煎，加竹沥服。

【功用】补阴降火。

【主治】痰郁火邪在肺，干咳嗽。

27710 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】当归 川芎 芍药 地黄(酒炒) 桃仁 诃子 青皮

【用法】上锉。水煎，加竹沥、姜汁服。

【主治】痰挟瘀血，致肿胀而嗽，或左或右不得眠。

27711 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷三十一。

【组成】当归 川芎 生地(姜、酒炒)各一钱 芍药倍用 人参五分 五味子五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】血虚，阳无所依附，上奔而喘。

27712 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷三十六。

【组成】当归 川芎 芍药 地黄 陈皮(带白) 甘草(生用) 桃仁(留尖) 红花(酒制)

【用法】上锉。水一钟半，煎八分，入驴尿，以防生虫。

【主治】血虚枯燥及妇人翻胃。

27713 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷三十六。

【组成】当归 川芎 芍药(酒炒) 生地 黄 牡丹皮 韭汁

【用法】上锉。水煎服。

【主治】血虚生火，致患噎膈。

【加减】大便闭，加桃仁、红花。

27714 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷五十二。

【组成】当归 芍药 川芎 生地(酒炒) 人参 茯神 麦门冬 竹叶

【用法】上锉。水煎服。

【主治】阴血不足，烦躁者。

27715 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷五十四。

【组成】当归 芍药 生地(酒炒) 川芎 茯神 熟地黄 黄连 甘草(炙) 朱砂(另研) 少许

【用法】上锉。水煎成，入朱砂末，食后服。

【主治】心血虚怔忡。

27716 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷五十九。

【组成】生地黄(酒洗)一钱半 当归(酒洗) 川芎 赤芍药(酒洗)各七分 山梔子(炒黑) 麦门冬(去心)各一钱半 牡丹皮 元参各一钱 知母(酒炒) 白术(炒)各五分 甘草 陈皮各三分 黄柏(酒炒)二分

【用法】水煎，温服。

【主治】吐血、呕血初起。

【加减】如身热，加地骨皮、枳实、黄芩各一钱，软柴胡(酒洗)五分；呕吐血，加知母、石膏，以泻胃火；咳血，加茅根、黄芩，以泻肺火；唾咯血，加梔子、黄柏、肉桂少许，以泻肾火；吐衄不止，加炒黑干姜、柏叶、茜根、大小蓟各一钱；大便血不止，加炒槐花、地榆、百草霜各一钱半；小便溺血不止，倍加梔子，更加车前子、小蓟、黄连，

俱炒半黑，各八分；诸失血久，加升麻、阿胶、人参，入童便、姜汁、韭汁。

27717 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷六十二。

【组成】当归 川芎 芍药 生地黄 牛膝 梔子（一方加黄连 棕炭）

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】①《济阳纲目》：血虚尿血。②《幼科金针》：小儿血淋。

27718 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷六十三。

【组成】当归 川芎 芍药 生地（酒炒）山梔（炒） 升麻 秦艽 阿胶珠

【用法】上锉。水煎服。

【主治】便血有热。

【加减】血过多不止者，加黄连、红花。

27719 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷八十三。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地黄（砂仁、沉香炒） 羌活 防风 陈皮 甘草

【用法】上锉。水煎服。

【主治】麻风。

27720 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷八十四。

【组成】四物汤加黄芩

【用法】煎汤，调浮萍末服之。

【主治】血不荣于腠理，身上虚痒。

27721 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷八十九。

【组成】当归 川芎 芍药 生地（姜、酒炒） 山梔子 连翘 甘草

【用法】上锉。水煎服。

【功用】养阴血以消毒。

【主治】汤火伤，发热作渴，小便赤涩。

27722 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷九十五。

【组成】当归 芍药 川芎 生地（酒洗）黄芩（酒洗） 黄柏（酒洗） 槐花（炒）各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】内热痔漏下血。

27723 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷九十六。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地黄 升麻各等分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】血虚脱肛。

【加减】血热者，加黄柏；兼痢，加槐花、黄连。

27724 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷一〇一。

【组成】当归 川芎 赤芍药 熟地（砂仁炒） 木贼 防风各等分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】眼出冷泪属虚者。

27725 加味四物汤

【方源】《济阳纲目》卷一〇七。

【组成】当归 川芎 芍药 生地黄（酒洗） 牛膝 香附 生甘草 侧柏叶

【用法】上锉。水煎嗽口；或服亦可。

【主治】阴虚气郁，牙出鲜血。

27726 加味四物汤

【方源】《医学正印》卷下。

【组成】当归（酒洗） 川芎 芍药 熟地香附（醋炒） 黄芩（酒炒） 柴胡各等分

【用法】水煎服。

【功用】养血顺气，清肺和肝。

【主治】妇人瘦弱，不能孕育。

27727 加味四物汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】大熟地一两（九蒸） 白芍五钱（酒炒） 当归五钱（酒洗） 川芎三钱（酒洗） 白术五钱（土炒） 粉丹皮三钱 元胡一钱（酒炒） 甘草一钱 柴胡一钱

【用法】水煎服。

【功用】补肝之血，通郁散风。

【主治】妇人经水忽来忽断，时疼时止，寒热往来者。

【方论选录】此方用四物以滋脾胃之阴血；用柴胡、白芍、丹皮以宣肝经之风郁；用甘

草、白术、元胡以利腰脐而和腹疼。入于表里之间，通乎经络之内，用之得宜，自然奏功如响也。

27728 加味四物汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】川芎 白芍 知母 瓜蒌仁各一钱 生地 当归各二钱 诃子二钱 冬花六分 桔梗四分 甘草四分 兜铃四分 生姜一大片

【主治】生产半月后，干嗽有声，痰少者。

27729 加味四物汤

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】四物汤加甘菊 蔓荆

【主治】血虚头痛。

27730 加味四物汤

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】四物汤和陈皮 红花 酒芩 苍耳

【用法】加好酒数滴，调入五灵脂末服之。

【主治】鼻渣。

27731 加味四物汤

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】熟地五钱 川芎二钱 当归五钱 白芍一钱 白茯苓二钱 生甘草二钱 金银花一两 天花粉二钱 土茯苓一两

【用法】水煎服。

【主治】阴杨梅疮，色红，不起不破，作痒者。

27732 加味四物汤

【方源】《洞天奥旨》卷十三。

【组成】熟地五钱 川芎二钱 当归五钱 白芍三钱 荆芥（炒）二钱 白术末二钱

【用法】水煎，调服四剂。

【主治】手足麻裂疮。

27733 加味四物汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】四物汤加桃仁 红花 丹皮 枳壳 玄胡

【主治】胃脘痛自上而下，自闻唧唧有声，属血者。

【加减】重者，加桃仁、厚朴，大黄，甘草。

27734 加味四物汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎 蒺藜 知母 诃皮各一钱 当归 熟地各二钱 桔梗 兜铃各四分 款冬六分

【用法】水煎服。

【主治】产后半月，干嗽有声而痰少者。

27735 加味四物汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】当归 川芎少许 熟地 白芍（炒） 丹皮

【用法】水煎服。

【主治】小儿痢疾，暑伤血分，坠胀作渴，体虚。

27736 加味四物汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】当归 川芎少许 白芍（炒） 熟地黄 苡仁 葳蕤 白茯苓 山药 扁豆（炒）

【用法】水煎服。兼服肥儿丸。

【功用】保肺健脾。

【主治】小儿单龟胸，气壅已平。

27737 加味四物汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】熟地黄 川芎（少许） 白芍（炒） 当归 白茯苓 白扁豆（炒）

【用法】水煎服。

【主治】小儿病后元气有亏而作晕者。

27738 加味四物汤

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】川芎 白芍 归身 熟地 人参 肉桂 炒白芷 五味子 云苓 生甘草

【用法】水煎服。与保元汤同服更妙。

【主治】毒根。

27739 加味四物汤

【方源】《种痘新书》卷十一。

【组成】当归 川芎 生地 赤芍 丹皮 前胡 干葛 连翘 牛子 红花 甘草

【功用】凉血解毒，滋阴抑阳。

【主治】麻疹毒盛火炽，疹色大红者。

27740 加味四物汤

【方源】《种痘新书》卷十一。

【组成】当归 生地 赤芍 川芎 茵陈 梔子 木通 车前 牛子 连翘 知母 滑石 甘草各等分

【用法】水煎服。

【功用】滋阴降火，利小便，泻热。

【主治】麻疹退后，余毒未尽，而热之甚者，致口鼻出血。

27741 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十五。

【组成】四物汤加川附子 炮姜 官桂

【主治】寒湿带下，胞中冷痛。

【加减】日久滑脱者，加升麻、柴胡举之，龙骨、牡蛎、赤石脂涩之。

27742 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】四物汤加血余 白茅根

【主治】妊娠膀胱血热，尿血。

27743 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十七。

【组成】四物汤加炮姜

【主治】产后阴血暴伤，阳无所附，而致发热。

【加减】若头疼恶寒而发热者，属外感，去炮姜，加柴胡、葱白。

27744 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】四物汤加花粉 麦冬

【主治】产后血虚而渴者。

27745 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】四物汤加阿胶 地榆 血余 乌贼鱼骨

【主治】产后败血渗入大肠成血痢者。

27746 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】四物汤加蒲黄 瞿麦 桃仁 牛膝 滑石 甘草梢 木香 木通

【主治】产后热邪挟瘀血流渗胞中，小便淋闭，腹胀痛。

27747 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】四物汤加柴胡 梔子 龙胆草

【主治】妇人阴疮肿痛者。

27748 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】当归 芍药 川芎 生地黄 茅根 蒲黄 牡丹皮 梔子（炒黑） 甘草（生）

【用法】藕节为引，酒、水煎服。

【主治】小儿因努劳吐血，兼咳嗽。

【备考】先用桃仁承气汤以破逐之，次用加味四物汤和之。

27749 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷五十七。

【组成】生地（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 当归（酒洗） 连翘（去心） 紫草茸（酒洗）

【用法】水煎服。

【主治】痘疮因气行血滞，毒热伏于血分，不能成浆，至行浆时，空壳无浆，根紧而紫者。

27750 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】川芎 当归 生地 黄芩（酒炒） 川连（酒炒） 木香 白芍（炒）

【用法】水煎服。

【功用】清热除湿，调理气血。

【主治】湿热郁于肠胃，致伤气血，痘疮未愈而患赤痢，痘滞黯无色。

27751 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】当归 赤芍 荆芥穗 防风 红花 丹皮 牛蒡子（炒） 连翘（去心） 川芎 生地黄

【用法】水煎服。

【主治】痘症毒盛血热，痘出稠密而作痛者。

27752 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】当归 白芍(酒炒) 生地 牡丹皮 荆芥(炒黑) 川芎 黄芩 黄连 地榆

【用法】水煎服。

【主治】痘症毒火炽甚，流注大肠，大便下血。

27753 加味四物汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】生地 连翘(去心) 川芎 当归 赤芍 石膏(煨) 麦门冬(去心) 川黄连(姜炒) 木通

【用法】水煎服。

【主治】痘症肺胃热盛，见点后寒战咬牙，痘色紫赤，大便秘，小便涩，烦躁口渴。

27754 加味四物汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】熟地黄 当归 白芍 川芎 黄芩 黄连 黄柏(酒炒)各一钱 甘草五分

【用法】水煎，空心服。

【主治】水亏血少，形瘦多热，月经不调。

27755 加味四物汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】熟地黄 当归 川芎 白芍 人参 香附(童便制) 甘草(炙)

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】妇人气血衰弱，形瘦经少。

27756 加味四物汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】川芎 当归 玄胡索 乌药各一钱(炒) 白芍(酒炒) 小茴各八分 熟地黄二钱 生姜二片

【用法】水煎，空心服。

【功用】暖经和血。

【主治】妇人大虚，月经来如黄泥水。

27757 加味四物汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】熟地黄 当归各一钱五分 川芎 白芍 香附(制)各一钱 砂仁五分(炒)

【用法】生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】妊娠五月，禀赋虚弱，血虚胎萎不长。

27758 加味四物汤

【方源】方出《金匱翼》卷五。名见《杂病证治新义》。

【组成】生地二钱 当归一钱 蔓荆五分 黄芩一钱(酒炒) 白芍一钱(酒炒) 炙甘草三分 甘菊七分 川芎五分

【功用】《杂病证治新义》：养血熄风。

【主治】血虚脉空，自鱼尾上攻头痛者。

【方论选录】《杂病证治新义》：本方以四物汤补血为主，而其中当归、川芎并有活血舒痛之功，益以白芍之敛和黄芩之清、菊花之轻以平其肝，蔓荆以祛风，甘草合白芍并可缓痛，实为血虚头风痛之良方。如结合现代药理体会，实即具有补血、弛缓神经、缓解头痛之效，为用于贫血性头痛之良剂。

【备考】《杂病证治新义》本方用法：水煎服。

27759 加味四物汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】当归身 正川芎 杭白芍 怀生地 白云苓 正雅连 南木香各等分

【用法】水煎，空心热服。

【主治】小儿先水泻而变痢者。

27760 加味四物汤

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】当归 川芎 芍药 生地 山梔(炒)各一钱

【用法】水煎，临服入童便一盞，姜汁少许同服。

【主治】因怒气逆甚，先恶心，继而呕血成升成碗者。

27761 加味四物汤

【方源】《霉疔新书》。

【组成】当归 川芎 芍药 地黄 甘草 威灵仙 草薢 椒目

【用法】加生姜二片，水煎，温服。服白蛇

汤七日后服。

【主治】杨梅结毒瘡疾痼病。

27762 加味四物汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】当归二钱（血虚有寒者可多用，血虚有热者宜少用）川芎一钱三分 熟地二钱 白芍一钱半 白芷一钱 羌活八分 川独活一钱 蔓荆子一钱 川乌（制）八分 荆芥穗 菊花各七分 北细辛三分 甘草八分

【用法】速进一二三服。外用生萝卜捣汁，仰卧注鼻，不用枕头睡一刻，三次即愈。又用蓖麻子仁、乳香各二三钱，捣为饼，左右贴太阳穴。妇人解发出气，否则害目。无萝卜之时，用早莲草汁代之亦可。

【主治】偏头风，血虚暴痛，将来害目。

【加减】有热症者，加生地三钱。

27763 加味四物汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归二钱 白芍（酒炒）一钱三分 川芎一钱 熟地二三钱 陈皮八分 香附（童便炒）七八分 丹参二钱 丹皮八分

【用法】水煎服。

【主治】肝脾血虚，微滞微痛，一切经乱之证。

【加减】如食少有痰，加白术一钱半，茯苓一钱；如血寒，加肉桂一钱半；如血热，加生地、黄芩、青蒿之类；如肝不藏血，加阿胶珠一钱半。

27764 加味四物汤

《会约》卷十四引《良方》。为《保命集》卷下“增损四物汤”之异名。见该条。

27765 加味四物汤

【方源】《女科旨要》卷一。

【组成】当归 鹿茸 白芍 香附各三钱 川芎 熟地各二钱五分 黄耆 白术 茯苓 黄芩 陈皮（去白） 砂仁 人参 阿胶 小茴 山萸各二钱 沉香 粉草各一钱 延胡二钱

【用法】分四帖。加生姜三片煎，空心服。

【主治】妇人二十五六，气血两虚，血海虚冷，经脉不调，或时腹下疼痛，或白带，或如鱼脑髓，或如米汁，信期不定，每日淋漓不止，面色青黄，四肢无力，头晕眼花。

【加减】如咳嗽潮热，加五味子、杏仁各五分，竹沥少许。

27766 加味四物汤

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】当归 白芍各一钱 生地三钱 川芎七分 丹皮八分 柴胡五分

【用法】水二钟，加大枣二枚，水煎服。

【主治】血虚咽喉燥痛，微烦热恶寒，午后尤甚；劳伤火动，口破咽疼，暗热内热，脉数无力；血热口疮，或牙根肿溃，烦躁不宁。

【加减】三阴虚火咽痛者，加黄柏、知母各一钱，桔梗、元参各一钱五分；渴者，加麦冬、花粉各一钱五分。

27767 加味四物汤

【方源】《伤科汇纂》卷八。

【组成】四物汤加黄柏 知母 黄芩 黄连 蔓荆子 北五味

【主治】血虚，阴火上冲头痛。

27768 加味四物汤

【方源】《医钞类编》卷八。

【组成】四物汤加黄连 黄柏 黄芩

【主治】湿热伤血，致赤痢或下血者。

27769 加味四物汤

【方源】《验方新编》卷三。

【组成】当归 熟地各三钱 川芎 芍药各二钱 柳树根一两（酒炒）

【用法】水煎服。

【主治】癆热咳嗽如神。

27770 加味四物汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】熟地 川芎 白芍 当归 柴胡 黄芩 梔子 甘草 茯苓 木通

【主治】疹后痘证，腹胀，午后发热头痛。

27771 加味四物汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】当归 白芍 生地 柴胡 酒芩 干葛 力子 连翘

【主治】麻症后一切血虚。

27772 加味四物汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】人参一钱 黄耆三钱 熟地 当归各一两 白芍五钱 川芎 半夏各二钱

【主治】中风左瘫右痪。

27773 加味四物汤

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】蒸熟地 杭白芍 西归身 真川芎 生甘草 黑元参 剖麦冬 白桔梗 制香附

【用法】水煎服。

【主治】阴虚液少，午后咽痛喉燥，舌干无苔，一切贫血症经久不愈。

27774 加味四物汤

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】桃仁 红花 大黄 川芎各一钱五分 山楂肉二钱 当归 白芍各三钱 生地四钱

【用法】水煎服。

【主治】跌扑伤损，气厥血瘀疼痛者。

27775 加味四物汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】生地 当归 白芍 鲜菊叶 丹皮 生石决明 天麻

【主治】产后血虚，肝阳上升，头痛耳鸣，昼轻夜重，确非外感者。

27776 加味四物汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】羌活 防风 熟地 当归 芍药 川芎 桃仁 牛膝 黄芩 黄柏

【用法】水煎服。

【功用】除风胜湿，活血消肿。

【主治】瘦人历节，红肿疼痛。

【方论选录】本方以羌、防除风胜湿，四物汤补血，合桃仁、牛膝以活血消肿止痛，芩、柏以清湿热，此宗丹溪所说瘦人责之于血虚，标本兼治之法也。若用于急性风湿性关节炎，汗

多关节红肿颇甚者，有活血消炎镇痛之作用。

27777 加味四物汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】秦归 川芎各二钱 酒芍 熟地 丹参各四钱 香附三钱 泽兰四钱

【用法】水煎，温服。

【功用】养血调气。

【主治】血虚气郁，月经量少而色紫黑，面色青黄，舌质淡红，苔薄黄，脉沉细而弱。

【加减】心悸少寐，加枣仁（炒）三钱，柏子仁三钱；潮热或手心发热，加鳖甲三钱，丹皮二钱。

27778 加味四物汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】川芎 31 克 当归 31 克 白芍 12 克 熟地 12 克 黄芩 15 克 浮萍 12 克 淮山药 15 克 白术 15 克 首乌 15 克 红枣 6 克

【用法】水煎服。

【功用】清营凉血。

【主治】虚热型荨麻疹，疹色淡红，稀疏分布，日晒潮热，多在夜间发生，舌质红，苔薄，脉弦。

【加减】养血、祛风、清热，加丹皮、山梔、银花、连翘、蝉蜕、僵蚕、苦参、寄生、灵仙；灼热、口渴、舌红，重用生地，佐以丹皮、银花、连翘、麦冬；热甚，加石膏；痒者，加苦参、僵蚕；腹痛、便秘，加大黄、牛膝；体强，可加麻黄；体弱，加地肤子。

27779 加味四柱散

《易简方》。为《简易方》引叶氏方（见《医方类聚》卷八十八）“附子养气汤”之异名。见该条。

27780 加味四柱散

【方源】《得效》卷五。

【组成】人参（去芦） 白茯苓（去皮） 附子（炮，去皮脐）各一两 木香（湿纸包，煨过） 诃子（湿纸包，炮，取皮用）各半两

【用法】上锉散。每服二钱，加生姜二片，

大枣一枚，煎至六分服。

【主治】脏腑虚怯，本气衰弱，脾胃不快，不进饮食，时加泄利，昼夜不息。

27781 加味四逆汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】附子 干姜 人参 甘草 吴茱萸

【主治】伤寒阴毒证。

【加减】烦躁呕逆，加姜汁、半夏；渴者，去半夏，用水浸冷服之；面赤，加葱白。

27782 加味四逆汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】附子二三钱 甘草（炙）一钱半 干姜（炒）一钱半 木香三四分（煨用） 白术二三钱 乌梅二个 肉豆蔻（面煨）一钱半

【用法】水煎服。如上焦热格者，冰冷服之。

【主治】伤寒阴寒自利，外热而不恶热，口渴而不喜冷，四肢厥冷，脉虽数而无力，此阳脱凶候。

27783 加味四逆汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】附子 炮姜 吴茱萸 柿蒂 丁香 炙草

【主治】胃寒呃逆。

27784 加味四逆汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】附子四钱 杭白芍二钱 焦白术四钱 炮姜三钱 官桂三钱 人参五钱 甘草四钱

【用法】水煎，温服。

【主治】年老伤寒，恶寒无热，身重倦卧，手足厥逆者。

【方论选录】此方以附子、官桂、炮姜温中，焦术扶脾，白芍敛阴，人参通行元气，甘草和药调中，正气复则手足自温矣。

27785 加味四逆散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】川柴胡八分 炒枳实一钱 生白芍一钱 清炙草八分 干姜五分（拌捣北五

味三分） 桂枝尖五分 浙茯苓四钱 干薤白五枚（烧酒洗，捣） 淡附片五分

【用法】用水两碗，煎成一碗，去滓温服。

【功用】达郁通阳。

【主治】伤寒邪传少阴，火为水遏，阳气内郁，不得外达，水气上冲而下注，致四肢厥逆，干咳心悸，便泄溺涩，腹痛下重，舌苔白而底绛，脉左沉弦而滑，右弦急。

27786 加味四神丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】补骨脂（酒炒）六两 吴茱萸（盐炒）三两 五味子（炒）四两 肉豆蔻（面裹，煨）四两 花椒（微焙）一两 生硫黄六钱 大枣八十一枚 生姜（切片）六两

【用法】先煮生姜十余沸，入大枣同煮至烂熟，去姜，余药为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。

【主治】黎明腹痛泄泻。

【方论选录】方中用补骨脂以补命门，吴茱萸以补肝胆，此培火之基也。然泻者关乎下焦，实又关乎中焦，故又用肉豆蔻之辛温者，以暖补脾胃，且其味辛而涩，协同五味之酸收者，又能固涩大肠，摄下焦气化。且姜、枣同煎，而丸以枣肉，使辛甘化合，自能引下焦之阳，以达于中焦也。然此药病轻者可愈，病重者服之，间或不愈，以其补火之力犹微也，故又加花椒、硫黄之大补元阳者以助之，而后药力始能胜病也。

27787 加味失笑散

【方源】《保命歌括》卷十六。

【组成】五灵脂 蒲黄（隔纸炒） 玄胡索 各等分

【用法】上为细末。每服二钱，酒、水各半盏，煎七分，食前服。

【主治】小肠气痛，上冲心者。

27788 加味失笑散

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】蒲黄二钱五分 灵脂（酒炒）一钱四分 木通 赤芍 没药各一钱 玄胡 姜

黄各一钱五分 盐卤一滴

【主治】胃脘痛。

27789 加味失笑散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】蒲黄 五灵脂各二钱 延胡 丹皮各三钱 桃仁二钱 香附三钱 台乌二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】活血逐瘀。

【主治】瘀血阻滞，经来腹痛如刺，量少色紫有血块，排出则痛减，舌质红，脉沉弦有力。

【加减】疼痛引及少腹两侧痛剧者，加姜黄二钱，乳香二钱；大便燥结，加大黄二钱。

27790 加味生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎一钱 当归三钱 肉姜四分 桃仁十五粒 三棱（醋炒）六分 元胡六分 肉桂六分 炙草四分

【主治】生产半月后，腹中血块日久不消，或疼痛，或外加肿毒，高寸许，或身热，饮食减少，倦甚。

27791 加味生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎三钱 当归六钱 黑姜四分 桃仁十粒 炙草五分 荆芥四分（炒黑）

【用法】加大枣，水煎，速灌两服。

【主治】产后劳倦甚而晕，及血崩气脱而晕。

【加减】如形色脱，或汗出而脱，皆急服一帖，即加人参三四钱（一加肉桂四分），决不可疑参为补而缓服；痰火乘虚泛上而晕，加橘红四分；虚甚加人参二钱；肥人多痰，再加竹沥七分，姜汁少许，其血块痛甚，兼送益母丸，或鹿角灰、或玄胡散、或独胜散、上消血块方，服一服即效，不必易方，从权救急。

27792 加味生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎二钱 当归五钱 黑姜四分 炙草五分 桃仁十粒

【用法】问伤何物，加以消导诸药，煎服。

【主治】产后血块未消，又患伤食。

【加减】消面食，加神曲，麦芽；消肉食，加山楂、砂仁；伤寒冷之物，加吴萸、肉桂。如产母虚甚，加人参、白术。

27793 加味生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】川芎 防风各一钱 当归三钱 炙草四分 桃仁十粒 羌活四分（一本无桃仁，有黑姜四分）

【主治】产后气血两虚，阴阳不和，三日内发热恶寒，头痛胁痛，而类外感者。

【加减】服二帖后，头仍痛，身仍热，加白芷八分，细辛四分；如发热不退，头痛如故，加连须葱五个，人参三钱。

27794 加味生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】川芎一钱 益智一钱 当归四钱 黑姜四分 炙草四分 桃仁十粒 茯苓一钱半（一本当归作三钱，有枣一枚）

【主治】产后三日内，因劳倦伤脾或饮食太过，脾胃受伤，完谷不化，腹中块未消者。

【备考】《胎产心法》有砂仁。

27795 加味生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】川芎一钱 当归二钱 杏仁十粒 桔梗四分 知母八分（一本作四分）

【主治】产后外感风寒，咳嗽，鼻塞声重。

【加减】有痰，加半夏曲；虚弱有汗，咳嗽，加人参。

【备考】《胎产心法》有炮姜、炙草、生姜。

27796 加味生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】川芎一钱 当归三钱 黑姜五分 肉桂八分 吴萸八分 砂仁八分 炙草五分

【功用】温胃散寒，消寒食。

【主治】产后劳伤风寒及食冷物，胃脘痛，腹痛者。

【加减】伤面食，加神曲、麦芽；伤肉食，

加山楂；大便不通，加肉苁蓉。

【备考】《胎产秘书》有桃仁、生姜，无砂仁。

27797 加味生化汤

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷二十。

【组成】当归（去芦）三钱 川芎一钱 桃仁十三粒（不去皮尖，捣） 干姜一钱（炒） 牛膝二钱 炙甘草六分 红花三分（酒洗） 肉桂（去皮）六分

【用法】加枣一枚，水煎服。

【功用】催生，去恶露。

【主治】产后腹痛甚而恶露不行者。

【加减】产前催生，虚人加人参三钱；产后去恶露，减人参。

27798 加味生化汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎二钱 当归二钱 姜炭五分 炙草五分 桃仁十粒 陈皮三分 大枣二枚

【用法】水煎，温服。连进二帖。

【主治】产后七日内，气血两虚，阴阳不和，致发热头疼、恶寒、胁疼而类外感者。

【加减】如明知感冒风邪，二帖不退，加羌活四分，葱白四寸；呕，加藿香三分，生姜一片；如汗多、气促如微喘，俱加人参二三钱；渴，加用生脉散；如乍寒乍热，发有常期，加柴胡四分；有痰，加橘红、花粉。

27799 加味生化汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎三钱 当归六钱 人参三钱（如虚倍用） 天麻八分 黄耆一钱半 炙甘草五分 荆芥八分 大枣三枚

【用法】水煎服。

【主治】产后汗多不止，阴竭阳微，以致筋脉拘急，项强口噤，牙噤发搐，类伤寒症症者。

【宜忌】忌葱、韭、辛热食物。

【加减】口渴，加麦冬、五味；脉脱，加人参至六钱，附子四分；便秘，加麻仁三钱；有痰，加竹沥、姜汁。

27800 加味生化汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎一钱 当归三钱 姜炭五分 桃仁十粒 人参三钱 茯苓一钱（汗多勿用） 炙甘草五分

【主治】产后血脱，劳伤过甚，气无倚仗，呼吸止息，各违其常，气出短促而喘，言语不相接续。

【加减】汗多，加黄耆；口渴，加麦冬、五味。

27801 加味生化汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎一钱 当归二钱 山药一钱 炮姜 炙甘草各五分

【功用】温补气血，健脾助胃，养正兼消。

【主治】产后形体劳倦，脾气受伤，多食厚味，脾转运滞，痞塞噎酸，恶食。

【加减】完谷不化，加煨肉果一个；腹中块痛，加桃仁；痛止，加白术；体虚，加人参。并审所伤何物，佐以消导药，如伤肉食，加砂仁、山楂；伤米食，加神曲、麦芽；伤冷物，加肉桂、吴萸。

27802 加味生化汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎一钱 当归三钱 桃仁十粒 炮姜 炙草各四分 肉桂五分 元胡五分

【主治】产后小腹作痛，可按揉而稍止者。

【加减】若脐下无血块，而仍痛不止者，加熟地三钱；痛止，去肉桂、元胡。

27803 加味生化汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎一钱五分 当归（炒）二钱 干姜（炙黑）四分 人参二钱 於术（生）二钱 茯苓一钱五分 陈皮五分 泽泻八分 肉果霜五分 甘草（炙）五分 莲子九粒

【主治】产后泄泻，块痛已除者。

【加减】因寒作泻，倍用黑姜，腹痛泄水，饮食不化，加砂仁八分，炒山楂二钱，炒麦芽二钱；久泻不止，加升麻一钱。

27804 加味生化汤

【方源】《胎产要诀》卷下。

【组成】当归 人参各二钱 川芎 茯苓各一钱半 桃仁 莲子各十粒 炙干姜五分 制肉果一个 诃子皮一钱 糯米一撮

【主治】产毕即泻。

【加减】腹中血块不痛，加白术二钱，陈皮三分。

27805 加味生化汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】川芎二钱 当归四钱 炮姜四分 桃仁十粒（去皮尖） 炙草五分 桂枝四五分

【用法】水煎服。

【主治】产后风冷乘虚入腹，或伤寒物腹痛。

【加减】伤肉食，加山楂、砂仁；伤面食，加炒神曲、炒麦芽。

27806 加味生化汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】生化汤加柴胡 鳖甲

【主治】产后疟疾，因瘀血停留，荣卫不和，致寒热往来。

27807 加味生化汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】生化汤加连翘 金银花 甘草节 乳香 没药

【主治】产后气血两虚，荣气不从，逆于肉理，或败血留内结成痼疽者。

27808 加味生化汤

【方源】《盘珠集》卷中。

【组成】人参 黄耆（炙） 当归 川芎 麻黄根 天麻 荆芥 炙甘草 防风 枣仁（炒）

【功用】调和营卫。

【主治】产后气血两虚，阴阳不和，致潮热有汗，大便不通，头痛恶寒，胁痛等类外感者。

【加减】有痰，加姜汁、竹沥；大便闭，加麻仁。

27809 加味生化汤

【方源】《宁坤秘籍》卷中。

【组成】川芎一钱 当归二钱五分 炙甘草五分 干姜四分 桃仁十粒 人参二钱 枣仁一钱

【主治】产后气短，似喘非喘，气不相接续，或兼热，或兼痰，而气短促危急者。

27810 加味生化汤

【方源】《宁坤秘籍》卷中。

【组成】川芎一钱 当归三钱 炙甘草四分 杏仁十粒（去皮尖） 枣仁一钱（炒） 桔梗四分 人参二钱 半夏八分

【主治】产后气短痰嗽，声重汗出。

【加减】痰多，加黄耆一钱；前症汗多，加黄耆并参；如腹中块痛不除，暂停参、耆以定块。

27811 加味生化汤

【方源】《宁坤秘籍》卷中。

【异名】加参生化万安汤（《女科秘要》卷六）。

【组成】川芎二钱 当归三钱 人参三四钱 炙甘草五分 陈皮三分 杏仁七粒（去皮尖）

【主治】产后头痛发热，气急喘汗。

【加减】如在产后七日内，加用黄耆三钱，枣仁一钱，麦冬一钱。

27812 加味生脉散

《医学入门》卷四。为《活人书》卷十七“五味子汤”之异名。见该条。

27813 加味生脉散

【方源】《济阳纲目》卷三十一。

【组成】人参 麦门冬 五味子 杏仁 陈皮 白术

【用法】上锉。水煎服。

【主治】胃虚极，气上逆而喘急，抬肩撷肚。

27814 加味生脉散

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】麦冬五钱 人参二钱 五味子一钱 姜炭三分

【用法】水二钟，煎八分，食远服。亦可代

茶。

【主治】鼻蛆。

27815 加味生脉散

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】人参 麦冬(去心) 归身 生地 炙草 石菖蒲各一钱 五味子十三粒(捶碎)

【用法】猪心一个，劈开，水二盏，煎至一盏半，去心，入药煎七分，食后服。

【主治】产后去血太多，心血虚弱，不能上荣于舌，语言不清，含糊嗜涩；或怔忡。

27816 加味生脉散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】人参 麦冬 五味子 阿胶 白术 陈皮

【主治】元气虚乏而短气。

27817 加味白丸子

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】南星半两(细切，以白矾汤泡，晒干，或生姜汁制) 白附子二两(姜制) 半夏(汤泡)半两(生姜汁制)

【用法】上为细末，面糊为丸，如芡实大。每服一丸，姜、蜜、薄荷汤任化服。

【主治】小儿风痰壅盛。

27818 加味白术散

【方源】《得效》卷五。

【组成】陈皮 半夏 人参 白茯苓 白术 甘草(炙) 山药(炮)各二两 白扁豆(制)一两半 缩砂 桔梗(炒) 石莲肉 薏苡仁各一两

【用法】上锉散。加生姜、桑白皮，水煎服。

【主治】喘嗽，每遇饮酒必发。

27819 加味白术散

【方源】《医统》卷五十二。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草(炙) 藿香各八分 干葛一钱 木香 枳壳(麸炒) 五味子 柴胡各四分

【用法】水煎，食远温服。

【主治】中消，消谷善饥。

27820 加味白虎汤

【方源】《广嗣纪要》卷十一。

【组成】生地一钱半 黄芩 麦冬 人参 知母 葛根各一钱 石膏三钱 甘草五分 乌梅半个

【用法】水煎服。

【主治】妊娠痲症，热多寒少者。

27821 加味白虎汤

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】白虎汤加瓜蒌仁 枳壳 黄芩

【主治】热痰喘嗽，火迫肺金。

27822 加味白虎汤

【方源】《简明医便》卷四。

【组成】石膏三钱 知母一钱半 人参一钱 甘草五分 黄芩 杏仁 梔子各一钱 麦冬二钱 五味十五粒(打)

【用法】加梗米一撮，水煎服。

【主治】上焦消渴热甚。

27823 加味白虎汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参二两 石膏三两 知母五钱 茯苓五钱 麦冬三两 甘草一钱 半夏三钱 竹叶二百片 糯米一撮

【用法】水煎服。

【主治】阳明胃经火旺，热极发狂，登高而呼，弃衣而走，气喘，发汗如雨。

27824 加味白虎汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】石膏五钱 知母一钱 人参一钱 茯苓二钱 山药三钱 麦冬二钱 石斛三钱 甘草四分 梗米一合(煎汤代水)

【主治】伤暑，汗多体倦，渴而引饮，心烦脉虚。

27825 加味白虎汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生石膏 12 克 连翘 9 克 知母 6 克 黄连 3 克 黄柏 6 克 元参 9 克 蝉蜕 6 克

【用法】水煎服。

【主治】漆性皮炎。

【加减】便秘者，加大黄、枳实；有表证者，

加荆芥、防风、藿香。

27826 加味白金丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】郁金五钱 枯矾二钱 巴豆二粒
(去油)

【用法】上为末。每服二钱。

【主治】癫证痰盛者。

27827 加味白蔻散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】苍术 白术 羌活 白蔻 陈皮
枳壳各一钱 秦艽 厚朴 槟榔 吴萸各一
钱五分 粉葛二钱 甘草六分

【用法】生姜、灯心为引。

【主治】酒伤中焦，寒邪传肝，周身麻胀，
经络抖跳，乍痛乍止，胸膈不利。如血变为
痰，则常痛不禁，左胁尤甚。

27828 加味白蔻散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】白蔻散加大黄二钱 朴消二钱

【用法】用猪胆汁半杯，童便半杯，匀入药
内，合炒几回，不用引，取起煎服。须用灸
脐法以助药力，庶几得快。

【主治】酒毒伤耗血海，肝火上炎，心肺受
病，酒毒湿热流渗二腑，寒痰闭塞不行，大
小肠气泛不清，三焦被寒，伤及脾胃，致肚
腹作痛，上下不定，二便不通，呕吐不止。

27829 加味白薇丸

【方源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】白薇 赤芍 沙参各三两 归身
四两 川芎 甘草(炙)各一两 黄耆(蜜
炙) 丹皮各二两

【用法】上为末，水为丸，如绿豆大。每服
二三钱，早、晚沸汤送下。

【主治】妇人崩漏之疾，忽尔厥逆，移时方
醒，名曰血厥。

【宜忌】忌食莱菔、葱、蒜、猪、羊、糟酒。

27830 加味白薇汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】白薇二钱 萎仁三钱 橘红一钱
杏仁二钱 象贝二钱 丹皮五钱 桑白皮二

钱 青蒿一钱 竹茹一钱 浮石三钱 雪梨
三片

【主治】肺胃痰热，壅于膈上，身热咳嗽，
气粗痰鸣，口干作渴。

27831 加味瓜蒂散

【方源】《疡医大全》卷三十九。

【组成】白茅根 芦根各一两 瓜蒂一个

【用法】水煎服。必大吐，吐后必愈。

【主治】食河豚中毒。

27832 加味宁志丸

【方源】《扶寿精方》。

【异名】加味安志丸(《济阳纲目》卷五十
五)。

【组成】白茯苓(去皮) 人参 远志(甘
草煎汤，浸软去木) 菖蒲(寸九节者，米
泔浸) 黄连(去毛) 酸枣仁(水浸，去
红皮) 柏子仁(如法去壳)一两 当归
(酒洗) 生地黄(酒洗)各八钱 木香四钱
(不用火) 朱砂(研，水飞)一两二钱(半
入药，半为衣)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每
服五六十丸，饥时用麦门冬(去心)煎汤送
下。

【主治】虚惫精神恍惚，心思昏愤，气不足，
健忘怔忡。

27833 加味宁神丸

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷一引《医
方集略》。

【组成】生干地黄一两半 当归 白芍药
白茯神 麦门冬 陈皮 贝母(炒)各一两
远志(姜制) 川芎各七钱 酸枣仁(炒) 黄
连 甘草各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大，朱
砂为衣。每服五七十丸，枣汤送下。

【主治】心血不足，惊悸怔忡，健忘恍惚，
一切痰火之证。

27834 加味宁神丸

【方源】《医部全录》卷三三一。

【组成】怀生地(酒洗) 枸杞子各一两半

石菖蒲 人参 元参各五钱 珠母四钱(如无,以细珍珠代之) 怀山药 当归身(酒洗) 柏子仁 远志(甘草水煮) 麦冬 茯神(人乳拌蒸) 酸枣仁(微炒)各一两

【用法】上为细末,煮桂圆肉捣膏为丸,如梧桐子大,朱砂飞过为衣。每服七十丸,清晨、临卧白汤送下。

【功用】养心固肾,益元气。

27835 加味半硫丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】硫黄一两(入猪脏内缚定,以米泔、童便、水酒各一碗,煮干一半,取出洗净晒干) 半夏 人参 白茯苓各一两 石膏一分

【用法】上为末,姜汁浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服五十丸至一百丸,空心米汤送下。

【主治】忧思过度,脾肺气闭,结聚痰饮,留滞肠胃,吐利交作,四肢厥冷,头目眩晕,或复发热。

27836 加味圣愈汤

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】熟地五钱 生地五钱 川芎五钱 人参五钱 金银花一两 当归三钱 黄耆三钱

【用法】水煎,食远服。

【主治】疮疡脓水出多,或金刀疮,血出多,不安,不得眠,五心烦热。

27837 加味圣愈汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】圣愈汤加杜仲 续断 砂仁

【主治】妊娠胎伤,腹痛不下血者。

27838 加味发表汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】苍术 秦艽 知母 黄芩 羌活 各一钱半 干葛二钱 防风 防己 桂枝 苏叶 细辛各一钱 甘草三分

【用法】葱、姜为引。

【主治】酒伤筋软,手足发战不遂,六脉浮洪有力,乍寒乍热。

27839 加味地黄丸

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】抑阴地黄丸(《四明心法》卷中)。

【组成】干山药 山茱萸(肉) 牡丹皮 泽泻 白茯苓 熟地黄 生地黄 柴胡 五味子(各另为末)各等分

【用法】上将二地黄酒拌杵膏,入前末和匀,加炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心白汤送下。如不应,用加減八味丸。

【主治】肝肾阴虚诸症,或耳内痒痛出水,或眼昏痰喘,或热渴便涩。

27840 加味地黄丸

【方源】方出《万氏女科》卷三,名见《金鉴》卷六十二。

【组成】地黄丸加五味子一两 肉桂一两

【功用】固下元。

【主治】①《万氏女科》:盘肠产后下元虚者。②《金鉴》:痢疽已溃,虚火上炎,口干作渴者。

【备考】原书云,患盘肠产,欲免其苦者,应于此后无孕时多服地黄丸加五味子一两,肉桂一两。《金鉴》本方用熟地(酒蒸,捣膏)八两,山药(炒)四两,山萸肉(去核)五两,白茯苓四两,牡丹皮(酒洗)四两,泽泻(蒸)三两,肉桂六钱,五味子(炒)三两。为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,空心盐汤送下。

27841 加味地黄丸

【方源】《医统》卷九十。

【组成】熟地黄(煮烂,捣)四两 山茱萸肉 山药各二两 泽泻一两 牡丹皮 白茯苓各半两 鹿茸(酥炙) 牛膝各二钱

【用法】上为末,面糊为丸,如黍米大。三岁以上儿服十五丸。

【主治】小儿禀受不足,肾虚精髓内耗,气血不充,致肌肉瘦薄,骨节呈露,状如鹤膝,成鹤膝节者。

27842 加味地黄丸

【方源】《医便》卷四。

【组成】怀熟地黄(酒蒸)四两 山茱萸(去核,净)二两 山药(姜汁炒)一两 牡丹皮(去木)一两半 五味子(去梗)一两 麦门冬(去心)一两 益智仁(去壳,盐水炒)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,空心盐汤送下;夏月不用盐。

【主治】老人阴虚及肾气久虚,致筋骨痿弱无力,面无光泽,或黧惨,食少痰多,或嗽或喘,或便溺数涩,阳痿,足膝无力,形体瘦弱憔悴,寝汗,发热作渴。

【加减】腰痛,加鹿茸、当归、木瓜、续断各一两;消渴,去茯神,倍用麦门冬、五味子;老人下元冷,胞转不得小便,膨急切痛四五日,困笃垂死者,加泽泻二两,去益智仁;诸淋数起不通,倍用茯苓、泽泻,益智减半;脚气痛连腰胯,加牛膝、木瓜各一两;夜多小便,茯苓减半;牙齿疼痛,浮而不能嚼物,并耳溃及鸣,去麦门冬,加附子(炮)、桂心(净)各一两;耳聋或作波涛钟鼓之声,用全蝎四十九枚(炒微黄色,为末,每服三钱)。每服一百丸,空心温酒送下。

27843 加味地黄丸

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】熟地黄八两(酒煮) 山茱萸 山药各四两 茯苓 牡丹皮各二两五钱 泽泻二两 当归身 枸杞子各三两

【用法】上药各为末,捣熟地极烂和药,如干,加炼蜜再捣千杵,为丸如梧桐子大。每服二钱,早、晚用淡盐汤送下。

【主治】梅疮病愈后,精血未复者。

27844 加味地黄丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】熟地 黄耆各一两五钱 槐花 黄柏 杜仲 白芷各一两 山茱萸 独活 山药各八钱 牡丹皮 茯苓 泽泻各六钱 白附子二钱

【用法】炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心米饮送下。

【主治】①《医学入门》:五痔。②《杏苑》:阴血不足,痔疾疼痛。

【备考】《杏苑》有知母,槐花作“槐角”。
27845 加味地黄丸

【方源】《保命歌括》卷九。

【组成】地黄(酒蒸,焙,末)二两 山茱萸肉 白茯苓 山药 杜仲(盐、酒炒,另取末) 巴戟(去心,净肉) 远志(去心) 小茴香(炒)各一两 泽泻 肉苁蓉(酒洗,焙) 牡丹皮 破故纸(炒)各七钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心、食前酒送下。

【主治】肾虚不能纳水,水不归经,致成痰饮者。

27846 加味地黄丸

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】虎胫骨(酒炙) 生地黄 酸枣仁(炒) 辣桂 防风 白茯苓 当归

【用法】炼蜜为丸。白汤送下。

【主治】小儿肝肾两虚,血气不充,髓不满骨,而致筋骨软弱,行迟者;和禀受不足,气血不充,致脚细,肌肉瘦薄,骨节俱露,如鹤之膝,而成鹤膝节者;以及大病后,手足痿弱,惊风后手足痿缓。

【加减】如惊后得前症者,加羌活。

27847 加味地黄丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】地黄丸加牛膝 虎胫骨(酥炙) 白茯苓

【用法】上为末,炼蜜为丸服。

【主治】小儿痢后鹤膝风。

27848 加味地黄丸

《痘疹传心录》卷十五。为《医部全录》卷三三一引《体仁汇编》“八味地黄丸”之异名。见该条。

27849 加味地黄丸

【方源】《准绳·幼科》卷二。

【组成】地黄八两 山药 山茱萸各四两 泽泻 牡丹皮 茯苓各三两 羌活 防风各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。量儿大小，加減服之。

【主治】小儿急惊风。

27850 加味地黄丸

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】熟地黄(酒浸，蒸透，晒干)八两(酒拌杵膏) 山茱萸肉 干山药 五味子(炒)各四两 泽泻 白茯苓 牡丹皮 鹿茸(炙)各三两 肉桂(厚者，去皮取肉)一两

【用法】上药各为末，入地黄和匀，量入米糊为丸服。煎服更好。

【主治】小儿痘疮，腰痛发热。

【备考】发热者，加肉桂，引虚火归肾经而热自止也。

27851 加味地黄丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】熟地四两 山药二两 白茯苓一两五钱 丹皮一两五钱 泽泻(去毛)一两 当归一两(酒拌) 香附(童便制)一两 桃仁(去皮尖)一两 山萸肉(去核净肉)四两 土红花一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心温酒或盐汤送下。

【主治】妇人经闭发热或咳嗽。

27852 加味地黄丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】怀生地黄(酒蒸)四两 怀山药二两 牡丹皮一两五钱 白茯苓一两 山茱萸(酒蒸，去核) 破故纸(炒)二两 益智仁一两 人参一两 肉桂五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心盐汤送下。

【主治】肾与膀胱俱虚，冷气乘之，不能约制，致遗尿不禁，或睡中尿自出。

27853 加味地黄丸

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】怀熟地黄八钱 山药四钱 山茱萸(酒蒸，去核)四钱 白茯苓(去皮) 牡丹皮 泽泻各三钱 嫩鹿茸(酥炙)二钱 怀

牛膝(去芦，酒浸)二钱 五加皮三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如黍米大。每服一钱，空心盐汤送下。

【主治】小儿肝肾虚弱，骨髓不充，而行迟者。

27854 加味地黄丸

【济阴纲目】卷六。为《准绳·女科》卷四“六味地黄丸”之异名。见该条。

27855 加味地黄丸

【方源】《济阴纲目》卷九十三。

【组成】熟地黄八两(杵膏) 山茱萸(酒蒸，去核) 干山药各四两 牡丹皮 白茯苓 泽泻 牡蛎 五味子各三两(一方，六味丸去泽泻，加益智仁)

【用法】上为末，地黄膏和炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心滚汤送下。

【主治】内虚热者，小便频数不禁。

27856 加味地黄丸

【方源】《简明医彙》卷四。

【组成】六味地黄丸加黄柏(制)四两 当归 白芍 知母(生) 麦冬各三两 五味子二两

【主治】阴虚火动，手足心热，口干唇燥，夜卧不安，遗精白浊，咳嗽失血，痰涎壅盛，面黄肌瘦，骨蒸劳热；肾消，小便淋浊。

27857 加味地黄丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】山药(炒) 山茱萸 北五味 泽泻(去毛) 黄柏(盐水炒) 知母各四两(青盐水炒) 怀生地八两 牡丹皮(炒) 白茯苓(去皮)各二两五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心滚汤送下。

【主治】下消。

27858 加味地黄丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】怀生地(竹刀切片，酒洗，焙干)四两 山萸肉(酒洗，焙) 山药 白茯苓各二两 泽泻 牡丹皮各半两 菊花(去梗叶) 麦冬肉(焙干) 当归(焙)各一两

五味子五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。空心淡盐汤化下。

【主治】小儿痘后近视。

【加减】如少年火旺，加黄柏、知母各五钱，俱用盐水制。

27859 加味地黄丸

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】熟地五钱 山药三钱 山茱萸二钱 茯苓二钱 骨碎补二钱 补骨脂二钱 丹皮二钱 当归五钱 麦冬三钱 泽泻一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】齿窟疮，因伤损于齿牙，其齿堕落而成窟。

【加减】气虚甚者，加人参五钱。

27860 加味地黄丸

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】熟地 山药 白茯苓 山萸 丹皮 泽泻 麦冬 五味 乌梅

【主治】真阴素虚，致伤风久嗽不止，咳久伤气，肺叶不收，不治多成癆怯。

27861 加味地黄丸

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】熟地九钱 茯苓 牡丹皮 山萸肉 泽泻 当归 川芎 川楝子 使君子各四钱

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七十丸。

【主治】小儿肾疳，一名骨疳。肢体瘦削，遍身疮疥，喜卧冷地，口疮出血，口臭，次第齿黑，名曰崩砂，盛则龈烂牙落。

27862 加味地黄丸

【方源】《疡医大全》卷十三。

【组成】六味地黄汤加枸杞子 当归身 麦冬各三两 甘菊花 白芍药各二两 柴胡五钱 北五味三钱

【用法】炼蜜为丸，每早服三钱，淡盐汤送下。

【主治】耳聋。

27863 加味地黄丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】熟地 山萸 山药 丹皮 茯苓 当归 黄连 泽泻 人参

【功用】壮水滋阴。

【主治】眼目久病属虚者。

27864 加味地黄丸

【方源】《会约》卷七。

【组成】熟地八两 山药四两 枣皮（酒蒸） 茯苓各四两 泽泻一两 丹皮一两半 枸杞三两（酒蒸） 菟丝子（淘去泥沙，酒蒸）四两 补骨脂（盐炒）二两 骨碎补三两

【用法】炼蜜为丸。每服七八钱，空心盐汤送下。

【主治】真阴不足，以致齿疏动摇，壮年脱落者。

【加减】如命门火衰，真阳不足者，加肉桂三两，附子四两，或安肾丸亦妙。

27865 加味地黄丸

【方源】《会约》卷九。

【组成】怀庆元支地黄八两（加元砂仁微炒，三钱，研末，与米酒同蒸同晒九次，勿少） 淮山药四两 枣皮三两（去核，酒蒸） 白茯苓（去皮）四两 粉丹皮一两七钱 建泽泻（淡盐水浸，晒）一两三四钱 甘枸杞（去梗）三两（酒蒸） 菟丝子（淘尽泥砂）三两（酒浸，蒸，晒干） 真阿胶（蛤粉炒成珠）三两 麦冬（去心，酒蒸）二两 杜仲（淡盐水炒断丝）三两 北五味（微炒）七八钱

【用法】先将地黄、枣皮、枸杞、麦冬于石臼内捣成膏，然后将余药磨成细末，合前膏加炼蜜捣匀为丸。每晨服七八钱，用淡盐汤送下。凡一切虚弱之人，每年夏季制服一料，可以扶体，免阴虚火炎之病，但须间服温脾汤，更妙。

【功用】平补肝肾，养肺清热。

【主治】阴虚失血，胸背痛，小便赤，遗精潮热，咳嗽气喘。

【宜忌】忌铁与三白。

【加减】若精滑者，枣皮可加至四五两；若血虚有热者，粉丹皮可加至二两四五钱；小便短者，建泽泻用一两八钱。

27866 加味地黄丸

【方源】《会约》卷十二。

【组成】熟地三钱 枣皮一钱半 茯苓一钱半 山药二钱 丹皮一钱 泽泻七分 五味三分（炒） 麦冬一钱半 阿胶（蛤粉炒）二钱

【用法】空心服。

【主治】水亏干燥，咽痛便结，皮枯筋急。

27867 加味地黄丸

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】熟地一两 淮山七钱 茯苓六钱 萸肉四钱 丹皮二钱 北五味四钱 麦冬（去心）三钱 蛤蚧（去头足，炙）五钱 泽泻（盐水炒）三钱

【用法】炼蜜为丸，如绿豆大。每服四钱，白汤送下。

【主治】虚劳咳嗽。

27868 加味地黄汤

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】熟地二钱（切片） 山萸一钱 丹皮八分 川芎八分 山药一钱 泽泻八分 归身一钱 枸杞一钱 菟丝子一钱 菊花一钱 茯苓八分

【用法】水煎服。为丸亦可。若为丸，则用熟地八两，山药、山萸、归身、枸杞各四两，丹皮、云苓、泽泻、川芎各三两，菟丝子三两（酒蒸），菊花二两，共研细末，炼蜜为丸。空心每服四钱。

【主治】肝肾亏虚，眼睛不红，不肿痛，眼胞不下坠，但视物不明，及病后眼睛看物不清楚，云雾退后不明，夜见灯有丝球者。

27869 加味地黄汤

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】熟地 山药 萸肉 丹皮 泽泻 茯苓 黄芩 藕节 黑山栀 归身

【用法】加灯心十根，水煎服。

【主治】小儿血热妄行，鼻衄者。

27870 加味地黄汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】熟地 山药 山茱萸 白茯苓 丹皮 人参各等分 黄耆倍之

【用法】加煨姜三片，大胶枣二个，水二钟，煎一钟，空心服。

【主治】肠痈溃后，淋漓不已，或精神减少，饮食无味，自汗盗汗。

27871 加味地黄汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】熟地 茯苓各五钱 山茱萸 泽泻 丹皮各三钱 山药 麦冬各五钱 北五味一钱 肉桂五分

【用法】水煎服。一剂咽痛除，二剂下利止，三剂胸不满，心亦不烦。

【功用】补水济心，补金生肾。

【主治】春月伤风后阴虚，肾水不能上济于心，虚火上越，致下利，咽痛，胸满心烦。

【方论选录】夫既是肾阴之虚，用地黄汤以滋水，加麦冬、五味以益肾之化源是矣，何加入肉桂以补命门之火，非仍是治少阴之寒邪乎？不知水非火不生，用肉桂数分，不过助火之衰，而非祛寒之盛。且大肠自利，得壮火而泻，得少火而止，虽地黄汤内减熟地之多，增茯苓、泽泻之少，亦足以利水而固肠，然无命门之火以相通，则奏功不速，故特加肉桂于水中而补火也。

27872 加味地黄汤

【方源】方出《石室秘录》卷四，名见《疡医大全》卷十六。

【组成】大熟地四钱 山萸肉 山药各二钱 骨碎补三钱 泽泻 牡丹皮 白茯苓各一钱六分

【用法】水煎服。

【主治】牙宣，齿龈出血。

27873 加味地黄汤

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】熟地八两 山茱萸四两 山药四两 丹皮三两 泽泻三两 柴胡一两 麦冬三两 当归三两 白芍三两 肉桂一两 菖蒲五钱 茯苓三两

【用法】上各为末，炼蜜为丸。每服五钱，早、晚空腹滚水送下。一料即愈。

【主治】鹅掌风，足癣。

27874 加味地黄汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】熟地 山药 白茯苓 丹皮 山萸肉 泽泻 天冬 麦冬 桔梗 甘草 牛膝(倍用)

【功用】滋水制火。

【主治】痰火为病，痰色清白，稀而不稠，属肾虚水沸为痰者。

27875 加味地黄汤

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】大熟地(姜汁、砂仁拌炒)八钱 净萸肉四钱 怀山药四钱 茯苓三钱 丹皮三钱 泽泻二钱 陈胆星二钱 吴茱萸五分(川连五分煮汁，泡七次，炒)

【用法】水煎，加荆沥一钱冲服。

【主治】子痫，口噤项强，手足挛搐，言语齄涩，痰涎壅盛，不省人事。

27876 加味地黄汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】熟地 山药 白茯苓 山萸肉 泽泻 丹皮 白芍(炒) 五味子(少许)

【用法】水煎服。

【主治】小儿痢症日久，腰痛，因作坠努，有伤肝肾。

27877 加味地黄汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】熟地黄三钱 薄荷六分 泽泻一钱 山萸肉一钱五分 白茯苓一钱 柴胡六分 牡丹皮一钱 山药一钱五分

【用法】水三钟煎，空心服。其乳母亦当如方服药，亦有功益。

【主治】小儿黄疸，而人虚体瘦，兼骨蒸劳热者。

【宜忌】乳孩此症，多因吃乳母热乳而成，然必须戒乳，吃药方效，以米汤薄粥代之。同时须戒鱼腥、酒、面、猪肉、鲤鱼、羊肉、野鸡等物。

27878 加味地黄汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】熟地 山萸 山药 丹皮 泽泻 白茯苓 麦冬 沙苑蒺藜

【用法】水煎，饿时服。

【主治】小儿虚癆咳嗽，夜热咽痛，大便干结；或有女子经闭。小儿病中服药不当，以闭肾气耳聾者。

27879 加味地黄汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】熟地黄 山萸肉 白茯苓 泽泻 山药 牡丹皮 蒺藜

【用法】水煎，空心服。

【主治】小儿因先天肾气不全，而致生单龟背，痰胸已定者；小儿淋疾，肝肾亏虚，淋而不痛，久而不愈，或为药饵所伤者。

27880 加味地黄汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】熟地黄 山萸肉 山药 丹皮 泽泻 白茯苓 麦冬 蒺藜 黄柏(炒) 车前子

【用法】水煎服。

【主治】小儿肺肾不交，鼻常流血，身体干瘦，毛发不润，心慌气弱。

27881 加味地黄汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】熟地黄 山药 山萸 丹皮 白茯苓 泽泻 黄柏 车前子

【用法】水煎，空心服。

【主治】小儿齿缝出血日久，服连翘解毒汤而不愈者。

27882 加味地黄汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】熟地 山萸 山药 白茯苓 泽

泻 丹皮 黄柏(盐水炒) 木瓜

【用法】水煎，饿时服。

【主治】小儿顽癣、疥疮，年久不愈，谓之肾疳者。

27883 加味地黄汤

《金鉴》卷四十八。即《金匱》卷下“肾气丸”改为汤剂。见该条。

27884 加味地黄汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】大怀地二钱 正怀山一钱五分 山茱肉一钱二分 宣泽泻六分 粉丹皮一钱 白云苓一钱二分 建莲肉七分 净知母五分 芡实米一钱 大麦冬一钱 北五味十四粒

【用法】净水浓煎，清晨空心服。

【主治】小儿下消，小便浑浊，色如膏脂。

27885 加味地黄汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】六味地黄汤加柴胡 白芍 肉桂

【主治】阴虚疟疾，疟发时，其寒如冰，转热如烙，而面赤口渴，热退即不渴者。

27886 加味地黄汤

【方源】《会约》卷二十。

【组成】熟地三五钱 枣皮 山药各一钱半 茯苓 丹皮各一钱 泽泻七分 肉桂一钱半 北五味三分

【用法】水煎，温服。

【主治】热盛阴亏，麻疹隐伏，其脉寸强尺弱，不宜表者。

27887 加味地黄汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】熟地 白芍各一两 当归 枣皮各五钱 山药四钱 茯苓 丹皮 泽泻 白芥各三钱 柴胡一钱

【主治】中风左手不仁。

27888 加味补黄丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】厚朴(炙)六十四两 大黄六十四两 槟榔三十二两 黑丑(炒)三十二两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸。每服二钱，温开水送下，一日二次。

【功用】消食消水，顺气宽胸。

【主治】食水停滞，胸中结满，郁闷腹痛，两肋膨胀。

【宜忌】孕妇忌服。

27889 加味芍药汤

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】白芍五钱(生) 当归身五钱(生) 槟榔二钱 川朴二钱(捣碎) 大黄三钱 甘草一钱 枳壳二钱 山楂二钱(生) 神曲三钱

【用法】生姜为引。服药之后，努圈变而为滑利，红白变而为黄粪，即为药已中病。如一药尚未全愈，更进一剂，须体察积滞之轻重，以酌大黄之去留。

【主治】痢疾初起，舌有厚苔，胸中满闷，坚硬拒按者。

27890 加味芎归汤

【方源】《得效》卷十四。

【异名】龟壳散(《医学入门》卷八)、活命芎归汤(《寿世保元》卷七)、开骨丹(《医学正印》卷下)、开骨千金不易汤(《胎产秘书》卷中)、开骨散(《金鉴》卷四十)、开骨芎归汤(《仙拈集》卷三)、加味芎归汤(《笔花医镜》卷四)、加味当归汤(《医原》卷下)、佛手开骨散(《北京市中药成方选集》)。

【组成】川芎 当归各一两 自死干龟壳一个(如无，用钻龟废壳亦可，酥炙) 生男女者妇人头发一握(烧存性)

【用法】上为散。每服三钱，水一盞半，煎服。屡效。约人行五里，生胎、死胎俱下。

【功用】①《女科证治约旨》：催生兼能下死胎。②《北京市中药成方选集》：补气养血，扩张交骨。

【主治】①《得效》：妇人难产五七日不下，垂死者；及矮石女子交骨不开者。②《胎产心法》：死胎不下。

【方论选录】①《沈氏经验方》：用龟版滋阴以益肾，发灰补血而消瘀，更加芎、归以

调和营卫，行而不窜，补而不壅，能令气血充足而无阻滞之患。保产第一方也。②《成方便读》：当归、川芎二味，古方谓之佛手散，统治胎前产后一切诸证，以及安生胎，落死胎，其功甚大。盖以二物于养血之中，寓理气之力，其辛香之气，可散可宣，温润之功，能和能补，胎产一证，皆赖此气血，气血一理，故即能逆者顺而病者愈矣。败龟板取其得至阴之气，而有解脱之功。血余则行水消瘀，且能补益阴血，还原神化耳。

【临证举例】产门不开 《校注妇人良方》：地官李孟卿，取三十五岁女为继室，妊娠虑其难产，索加味芎归汤四剂备用，果产门不开，只服一剂，顿然分娩。上舍怀德之室，产门不开，两日未生，服前药一剂，即时而产。怀德传服此方，用者无有不验。一妇人分娩最易，至四十妊娠，下血甚多，产门不开，与前汤一剂，又以无忧散斤许，煎熟，时时饮之，以助其血而产。

【备考】《胎产心法》：交骨不开者，古法用加味芎归汤，每见服此药者，恶血凝滞，反成不救。

27891 加味芎归汤

《正体类要》卷下。为《三因》卷九“加味芎归汤”之异名。见该条。

27892 加味芎归汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】川芎 当归各一钱半 黄芩（酒炒） 白术各一钱

【用法】细茶二钱为引，食后服。

【主治】妊娠外感头痛者。

27893 加味芎归汤

【方源】《济阴纲目》卷十二。

【组成】当归 川芎各二钱 人参 紫苏 干葛各一钱

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】产后血气虚，外感风寒，头痛，憎寒壮热。

27894 加味芎归汤

【方源】《济阳纲目》卷七十三。

【组成】当归 川芎 芍药 桃仁 红花 各等分

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】死血所致腹痛，每痛不移动。

【加减】痛甚者，加酒制大黄。

27895 加味芎归汤

【方源】《幼幼集成》卷一。

【组成】当归身一两 大川芎五钱 上青桂二钱

【用法】水煎，酒对服。立下。

【功用】催生。

【加减】预防血晕，以本方加酒炒荆芥二钱，先将此药煎好，候胞衣已下，随即服之。断无血晕之患。

27896 加味芎归汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】人参二钱 黄耆一钱 当归二钱 升麻八分 川芎一钱 炙草四分 五味子十五粒

【主治】产后子宫不收，产门不闭。

【加减】再不收，加半夏八分，白芍八分（酒炒）。

27897 加味芎归汤

【方源】《女科指掌》卷四。

【组成】当归 川芎 炮姜炭 炒黑荆芥 地榆（醋炒黑）

【用法】水煎，顿服。

【主治】产后气血耗伤，经脉未得平复，或惊忧悲怒，劳役损动，或咸酸不节，伤于荣卫，气衰血弱致血崩不止。

27898 加味芎归汤

【方源】《续名家方选》。

【组成】当归 川芎各一钱 牡丹皮 肉桂 桃仁 红花 玄胡索 青皮 莪术 三棱各五分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】恶露未尽，大腹痛者。

27899 加味芎归汤

《伤科补要》卷三。为《金鉴》卷九十“加

味芎蒭汤”之异名。见该条。

27900 加味芎归汤

【方源】《妇科胎前产后良方》。

【组成】丹皮四分 元胡五分 莪术五分 赤芍四分 红花七分 当归七分 川芎七分 香附五分 乌药三分 枳实四分 山楂肉五分 木香六分 陈皮三分 姜厚朴五分 苍术四分 砂仁六分 官桂四分 干姜(炒)六分 益母草六分 花粉三分 半夏五分 甘草四分

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】产后瘀血未尽，小腹疼痛。

27901 加味芎归汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】当归 川芎 人参 泽兰 童便

【主治】妇人新产去血过多，致神昏烦乱，眼花头晕者。

27902 加味芎归饮

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】川芎二钱 当归五钱 人参一钱 吴茱萸五分 阿胶二钱 蕲艾八分 甘草(炙)五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】胞阻。孕妇胞中之血受寒致少腹作痛者。

27903 加味芎归饮

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】当归 川芎 桃仁 红花 郁金 大黄(醋炒) 甜酒 童便

【主治】努力跌打吐血。

27904 加味芎苏饮

【方源】《便览》卷一。

【组成】川芎 陈皮 白芷 款冬花各八分 紫苏梗叶 茯苓各七分 苍术 半夏 麻黄 杏仁各一钱 甘草 桑白皮(炒)各五分 细辛三分

【用法】水二盏，加生姜五片，煎服。

【主治】冬月时病咳嗽，头痛拘急，痰多，恶逆痞闷。

【加减】有汗，去麻黄；无汗，加葱白；热，

加黄芩；渴，加乌梅。

27905 加味芎苏散

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】紫苏 羌活 陈皮 麦冬各一钱 川芎 白芍各八分 干姜 生甘草各五分

【用法】加生姜二片，水煎服。

【主治】妊娠外感风寒，格子肌表，侵入脾胃，伤损荣卫，致憎寒发热，头疼眼痛，甚至心腹烦闷。

27906 加味芎蒭汤

【方源】《三因》卷九。

【异名】加味芎归汤(《正体类要》卷下)、芎归汤(《慎斋遗书》卷五)。

【组成】川芎 当归 白芍药 百合(水浸半日) 荆芥穗各等分

【用法】上为散。每服四钱，水一盞，酒半盞，同煎七分，去滓，不拘时候服。

【主治】打扑伤损，败血流入胃脘，呕吐黑血，或如豆羹汁。

27907 加味芎蒭汤

【方源】《普济方》卷三五二引《医学类证》。

【组成】芎蒭 当归 芍药各等分

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，煮取七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】产后崩中漏下。

27908 加味芎蒭汤

【方源】《金鉴》卷九十。

【异名】加味芎归汤(《伤科补要》卷三)。

【组成】芎蒭 当归 白术 百合(水浸一日) 荆芥各一钱

【用法】水一钟半，酒半钟，煎八分，不拘时候服。

【主治】因打扑伤损，败血流入胃脘，呕吐黑血如豆汁，而形气虚者。

27909 加味达原饮

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】槟榔二钱 川朴二钱(捣) 草果一钱(炒，研) 知母一钱 黄芩一钱(生) 白芍一钱(生) 甘草一钱 柴胡二

钱 羌活二钱 葛根二钱

【主治】瘟疫盛行之年，偶感风寒，触动瘟疫者，以及并无疫病之年，重感风寒，全似瘟疫者，初感风寒、瘟疫，致表症头痛，兼憎寒发热等表证。

【备考】原书本方治表症头痛加生姜三片，大枣二个为引。

27910 加味百合汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】乌药一钱五分 百合四钱 贝母(杵) 瓜蒌皮各二钱 薤白三钱 白蔻(去壳，杵)七分

【主治】胸膈痛。

27911 加味百花丸

【方源】《医方集解》。

【组成】百合 款冬花 紫菀 百部 乌梅

【用法】炼蜜为丸，如龙眼大，食后、临卧姜汤下或嚼化；煎服亦可。

【主治】①《医方集解》：喘嗽不已，或痰中有血，虚人尤宜。②《全国中药成药处方集》：七情内伤，酒色无节，虚热上炎，咳嗽喘急，口干声哑，痰中带血，阴虚肺伤，午后潮热。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：禁房事；忌食发物、热物。

【方论选录】《医林纂要》：百合甘苦涩，为敛肺主药；款冬花味辛以舒其敛闭之余邪，且能散肺热而除痰定喘；乌梅酸咸，酸以补肺而敛阴，咸以补心而散血，曾经火气熏蒸而色变黑，则肺居心上，不畏火之烁，此亦补肺主药；百部苦甘，功专入肺，甘补苦泄，主治哮喘；紫菀辛苦，舒郁热而行痰止血；蜜能润肺，止咳生津，甘则能补。此取百合、款冬花而名百花，又蜜亦百花之英。临卧服者，卧则气归于肺，使药亦随之入。此为肺虚而虚，兼有外邪客之，久而不散，正不能胜邪者设，又补正之一法。

【备考】本方原名“加味百花膏”，与剂型

不符，据《全国中药成药处方集》改。

27912 加味百花膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】紫菀 款冬花各一两 百部五钱

【用法】上为末。每服三钱，加生姜三片，乌梅一个，煎汤调，食后、临卧各一服；或炼蜜为丸服亦好。

【主治】久嗽不愈。

27913 加味百顺丸

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】大黄二两 桃仁一两 红花五钱 牙皂二钱

【用法】研末为丸。每服二三钱。

【主治】有形之积聚。

27914 加味托里散

【方源】《外科经验方》。

【组成】人参 黄耆(盐水拌，炒) 当归(酒拌) 川芎 麦门冬(去心) 知母(酒拌，炒) 黄柏(酒拌，炒) 芍药(炒) 金银花 柴胡 甘草(水一钟，浸透，以慢火炙) 各一钱

【用法】上作一剂，用水二钟，煎八分，食前服。

【主治】悬痈不消不溃。

27915 加味托里散

【方源】《疮疡经验全书》卷五。

【组成】桔梗 厚朴 白芷 人参 黄耆 当归 官桂 川芎 荆芥 黄芩 乌药 防风 连翘 香附 枳壳 天花粉

【用法】水煎服。

【主治】因怒气上攻于心，酒后房事下伤于肾，致生上肩疽、下鼠疽。

【加减】胸膈满闷，加陈皮、砂仁；热盛，加小柴胡、黄芩、玄参；咳嗽，加麦冬、兜铃、五味、杏仁、桑皮；口干烦躁，加麦冬、前胡、干葛、乌梅；寒多，加厚朴、防风、藿香，再服黄芩丸、通气散，仍贴玄武膏、金丝膏。

27916 加味至宝丹

【方源】《普济方》卷三七五。

【组成】鸡膝一个(乌骨者尤妙,去净) 牛胆膏半两 天南星(取心)三钱 血竭三钱(如无以猪心血代之) 马牙消二钱半 硼砂一钱 蝎梢九个 枯矾二钱半 脑子 麝香少许(以上为细末,入鸡膝内扎了,用碗蒸一饭久,取出悬挂,却入后药) 至宝丹二两 沉香 木香各一钱 白芷梢一钱半 猪牙皂角三条(去皮弦)

【用法】上为末,夏加花蜘蛛十个,和前药糊为丸,如苏合香丸大,朱砂、金箔为衣。每服一丸,薄荷汤磨服。

【主治】小儿急慢惊风。

27917 加味贞元饮

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】当归身五钱(炒) 熟地五钱 炙草一钱 党参五钱 乌梅五个(去核)

【功用】敛肝而兼敛肺。

【主治】产后荣血暴竭,卫气无依,孤阳上越,而致气喘。

27918 加味当归汤

《医原》卷下。为《得效》卷十四“加味当归汤”之异名。见该条。

27919 加味当归饮

《疡科选粹》卷二。为《普济方》卷二七二“加味当归饮子”之异名。见该条。

27920 加味当归散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】当归(酒洗) 赤芍各二两 川芎五钱 甘草(半生半熟) 大黄(半生半炮)各一两 麻黄(制)五钱 黄连 升麻 葛根

【用法】每用三钱,加生姜、葱、灯心,水煎服。

【功用】顺调气血,和解表里,爽利心腹,疏理百病。

【主治】小儿因膏粱厚味,或乳母七情郁火所致热毒疮疡,及温热停积自利,烦躁不宁。

【加减】丹毒,加连翘、荆芥,不用葱。

【备考】方中黄连、升麻、葛根用量原缺。

27921 加味当归散

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】当归一钱五分 吴茱萸三分 青化桂 正川芎各五分 黑姜炭五钱 南木香五分 小茴香一钱 炙甘草五分

【用法】水煎,临服加盐七分,空心服。

【主治】小儿受寒湿之气,小腹绞痛,外肾红肿,并腹痛啼哭。

27922 加味当归散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】当归 炒芥穗各三钱 全蝎二钱 桑寄生五钱 钩藤 僵蚕各三钱

【用法】水煎,温服,不拘时候。

【功用】疏风解表,养血。

【主治】产后发痉之中风证。因产后感冒风邪,致头项强痛,恶寒发热,身疼腰痛,继而四肢强直,或手足痲痹,牙关紧闭,舌淡苔薄色白,脉弦紧。

27923 加味当归膏

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】当归 生地各一两 紫草 木鳖子肉(去壳) 麻黄 大风子肉(去壳,研) 防风 黄柏 元参各五钱 麻油八两 黄蜡二两

【用法】先将前九味入油熬枯,滤去滓,再将油复入锅内,熬至滴水成珠,再下黄蜡,试水中不散为度,倾盖碗内,坐水中出火三日,听搽。

【主治】一切疮疹,并痈肿及疔风。

27924 加味回阳散

【方源】《医部全录》卷四三二引《幼幼近编》。

【组成】人参 白术 山药 茯苓 甘草 附子 赤石脂(煨) 僵蚕 全蝎

【用法】每服二钱,姜汤调下。

【主治】小儿慢惊面青,四肢逆冷,泄泻不止。

27925 加味竹叶汤

【方源】《广嗣纪要》卷十。

【组成】人参 麦冬 炙甘草 阿胶 生

地黄各一钱 水竹叶十二片

【用法】粳米一合为引，水煎服。

【主治】①《广嗣纪要》：妊妇伤寒汗下后，热不除，属虚者。②《医略六书》：孕妇伤寒汗下后，虚烦，脉濡数者。

【方论选录】《医略六书》：妊妇伤寒汗下解后，津液暴亡，故虚烦不眠，胎孕因之不安焉。竹叶疗膈热以除烦，人参扶元气以生血，生地滋阴壮水，麦冬润燥清心，阿胶补阴益血，炙草缓中和胃也。水煎温服，使气阴内充，则虚热自化，而虚烦无不退，胎孕无不安，何不眠之足患哉！

27926 加味竹叶汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】白茯苓一钱半 麦门冬（去心）二钱半 黄芩一钱 人参一钱 竹叶五片 粳米一撮

【用法】水煎，空腹热服。

【主治】妊娠心烦不解。

【加减】肥人，加半夏、生姜。

27927 加味竹叶汤

【方源】《盘珠集》卷上。

【组成】生地 白芍 地骨皮 竹叶 茯苓 人参 浮小麦

【主治】妊娠伤寒汗下后，热不止。

27928 加味竹叶汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】淡竹叶三钱 北沙参三钱 鲜生地五钱 麦冬 炒阿胶各三钱 炙甘草五分

【主治】妊娠伤寒汗下后，津液暴亡，虚烦不眠，胎孕不安，脉濡数者。

27929 加味竹沥汤

【方源】《广嗣纪要》卷九。

【组成】淡竹沥一合 黄芩 麦冬 知母各一钱 白茯苓一钱半

【用法】上哎咀。水二盏，加炒黄柏三分，煎一盞，入竹沥再煎一二沸服。

【主治】子烦。妊娠三四月，因心包、三焦二经气逆，致烦闷不安，口干舌燥者。

27930 加味竹沥汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】麦冬二钱 石斛三钱 羚羊角一钱五分 橘红一钱 胆星五分 僵蚕一钱五分（炒） 天麻八分 淡竹沥半杯 姜汁一滴（同冲服）

【主治】中风，风火炽盛，胃津不能上行，痰塞灵窍，昏不知人，证属中腑者。

27931 加味竹茹汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】橘皮 半夏 茯苓 甘草 竹茹 黄连 干葛

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】伤寒嘔而有郁热在胃中者，及胃病痰热呕者。

【加减】心下满，加枳实；胸腹满，加枳壳、桔梗；胁满，加青皮；外有热，加柴胡；有痰嗽，加杏仁、五味。

【备考】《伤寒广要》本方用桔红二钱，半夏二钱，茯苓二钱，甘草五钱，竹茹一团，黄连（姜炒）一钱，葛根一钱半。

27932 加味华盖散

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】苏子 陈皮 赤茯苓 桑皮 麻黄 杏仁各二钱 甘草一钱

【用法】加生姜三片，大枣二个，水煎服。

【主治】肺受风寒，喘而胸满声重。

27933 加味华盖散

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】麻黄 杏仁（去皮尖，炒） 苏子（炒） 前胡 橘红 甘草（生） 桑皮（炒） 桔梗 赤茯苓

【用法】水煎，食后温服。

【主治】小儿感受风寒，寒邪壅蔽，致气促胸满咳嗽者。

27934 加味交加散

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】当归 川芎 白芍药 生地 黄芩 厚朴 陈皮 白茯苓 半夏 羌活 独活 桔梗 枳壳 前胡 柴胡 干姜 肉

桂 甘草

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】①《准绳·疡医》：打扑伤损，折骨出臼，发热恶寒，体弱之人。②《金鉴》：伤损之证，外挟表邪，脉浮紧，发热体痛，形气虚者。

【加减】有热，除干姜、肉桂。

27935 加味交加散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地二斤（取汁） 生姜二斤（取汁） 白芍一斤（炒） 蒲黄一斤（隔纸炒） 当归一斤 桂心六两 延胡一斤（醋炒） 红花六两 没药八两

【用法】地黄汁收炒姜渣肉，生姜汁收炒地黄渣肉，同诸药焙脆为散。每服三钱，温酒调下。

【主治】营卫不调，经衍腹痛，脉弦涩滞者。

【方论选录】血亏挟瘀，不与营卫和谐，邪得侵入而冲任闭塞，故腹痛寒热，经候衍期也。生地滋血脉，生姜散表邪，二汁互收，各炒为散，酒调，使交通表里，调和营卫，更加当归养血脉，白芍敛营阴，蒲黄破瘀通经，桂心温经暖血，延胡化血滞以调经，红花活血脉以荣经，没药散瘀血以通调经脉也。为散以散之，酒调以行之，俾邪从外解，则营卫自和，而冲任无不调，腹痛无不退，寒热无不除，何月经衍期之不愈哉！

27936 加味冲和汤

【方源】《济阳纲目》卷十一。

【组成】紫苏叶一钱半 干葛 前胡 桔梗 枳壳 橘红 半夏 茯苓 黄连各一钱 人参 木香 甘草各五分 蓬术七分

【用法】加生姜三片，水煎，食远服。

【主治】多饮结成酒癖，腹中有块，随气上下。

【加减】如热盛，去木香，加黄芩、柴胡。

27937 加味冰硼散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】冰片一分 硼砂一钱 风化消

山豆根 青黛 胆矾 牛黄各二分

【用法】上为细末。吹喉。

【主治】风温伤寒，风寒搏束内热，喉痛者。

27938 加味冰硼散

【方源】《外科十三方考》。

【组成】熊胆三分 儿茶五分 血竭 乳香 没药 硼砂 寒水石各五钱 青黛六钱 冰片一钱

【用法】上为末。吹入喉中，使其尽量流出涎水，约七日后出脓，即愈。

【主治】喉风，外面红肿者。

【备考】喉风治法，内服中九丸，兼服加减甘桔汤及败毒散。若外面红肿者，以麻凉膏敷之，再吹加味冰硼散。

27939 加味汤泡散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】归尾 赤芍药 黄连 杏仁 防风各一两 铜青二钱 薄荷叶三钱

【用法】洗眼。

【主治】眼壅肿。

27940 加味守效丸

【方源】《保命歌括》卷十六。

【组成】南星 山楂 苍术各二两 白芷 半夏（制） 枳实（炒） 神曲（炒）各一两 海藻半两 昆布半两 玄明粉 吴茱萸 青皮 荔枝核各一两

【用法】上为末，别取神曲糊为丸。空心酒送下。

【主治】癰疽，不痛者。

27941 加味守效丸

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】南星 山楂肉（酒炒） 苍术（炒）各二两 白芷 半夏（姜制） 橘核仁 神曲（炒）各一两 海藻 昆布各五钱 吴茱萸 青皮（醋炒） 元胡索（醋炒） 荔枝核（炒）各一两

【用法】上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下。

【主治】阴肿。因食积不消，湿气下行，致

生偏坠，或左或右，睾丸作肿者。

27942 加味安志丸

《济阳纲目》卷五十五。为《扶寿精方》“加味宁志丸”之异名。见该条。

27943 加味安胎饮

【方源】方出《嵩崖尊生》卷十四。名见《胎产心法》卷上。

【组成】安胎饮加麦冬 干葛 知母 炒梔 花粉 犀角 竹沥各八分

【主治】妊娠口干。

【备考】《胎产心法》：如嫌药味过多，临证酌而减之可耳。

27944 加味安胎饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】砂仁 炒麦冬 条芩各一钱 人参 当归 熟地各二钱 陈皮 紫苏各四分 生白术一钱五分 甘草三分 大枣二个 生姜三片

【用法】水煎服。必一日两服，方可平安。

【主治】妊娠元气不足，精神倦怠，胎动不安，腹痛，或身上微热者。

【加减】如腹痛者，去麦冬，加藜艾（醋炒黑）七分，或再加四制香附一钱；如咽燥多痰兼失血者，加川贝一钱五分，黑荆芥一钱。

27945 加味安胎饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】白术 熟地 当归各二钱 陈皮 苏梗 川芎 甘草各四分 砂仁五分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠气虚下陷，间有兼寒，致腹痛时作，小腹重坠者。

【加减】兼寒者，加吴萸五分，干姜五分。或去干姜，加醋炒良姜七分，生绵耆一钱五分，母丁香四分。

27946 加味安胎饮

【方源】《胎产要诀》卷上。

【组成】人参 白术 陈皮 甘草 川芎 当归 柴胡 升麻 半夏 生地

【主治】孕妇脾胃气虚，而胎压水泡，或脐腹作痛，小便淋沥。

27947 加味安胎饮

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 当归身（酒洗） 熟地各二钱 麦冬一钱（去心，如烦渴加用） 条芩八分 白术一钱五分（土炒） 陈皮 紫苏炙草各四分

【用法】水煎服。

【主治】孕妇元气不足，或胎动不安，或身热食减。

27948 加味安胎饮

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】白术（蜜炙）二钱 人参 当归 熟地黄 川芎 白芍 陈皮 苏叶 黄芩（蜜炙） 炙甘草各一钱 升麻五分（一方有砂仁）

【用法】加生姜三片，大枣二个，水一钟半，煎七分服。

【主治】妊娠六月，脾胃气虚不能承载，致胎作胀，或胀作痛。

27949 加味安胎饮

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参一钱 川芎 条芩各八分 白术（蜜炙） 当归 熟地黄 紫苏 陈皮 甘草各四分 砂仁三分 麦冬（去心） 甘葛各七分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】妊娠燥渴，口干不得卧。

27950 加味安胎饮

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】人参 白术 当归 香附 条芩 紫苏各一钱 陈皮 砂仁 川芎 白芍各七分 甘草五分

【用法】水煎，空心服。

【主治】妊娠五六个月，胎气不安，腰腹疼痛。

27951 加味羊肝丸

【方源】《医便》卷三。

【组成】白乳羊肝一具（以竹刀割开，去膜，蒸熟，捣如泥） 甘菊花五钱 黄连一两 防风（去芦） 薄荷（去梗） 荆芥穗（去梗），

净) 羌活 当归 生地黄各五钱 川芎三钱

【用法】上为末,羊肝泥和为丸,如丸不就,加少酒糊丸,如梧桐子大。每服六七十丸,食后浆水送下;临卧减半,茶清送下。

【主治】一切目疾,翳膜,内、外障。

27952 加味羊肝丸

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】羌活 川芎 蒙花 木贼 谷精草 菟丝子 草决明各一两 或加青盐 人參各三钱

【用法】各切成片,用黑羊肝胆,入砂锅内,加好酒三壶,煮干,再加三壶,煮三炷香,去药不用,只留肝胆,铜刀切片,新瓦焙干研末,炼蜜为丸,如梧桐子大。空心服四钱。

【主治】因怒障翳遮睛。

27953 加味羊肝丸

【方源】《异授眼科》。

【组成】羊肝一具(去筋膜,瓦焙干) 细辛一两 熟地一两五钱 羌活一两 五倍子一两 白菊一两 防风一两 杏仁(去皮)一两 菟丝子一两 茯苓一两 草决明(炒)一两 枸杞一两 青箱子一两 地肤子一两 茺蔚子一两 石决明(煨)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服五十丸,盐汤或酒送下,一日三次。

【主治】心肾虚耗,水火不交,目有如转辘轳,渐生内障者。

27954 加味异功汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】人參三钱 当归一钱五分 肉桂一钱五分 炙甘草二钱 茯苓三钱 于术(炒焦)三钱 生姜三钱 大枣(去核)二个 广皮二钱

【用法】水五杯,煮成两杯,滓再煮一杯。分三次服。

【功用】辛甘温阳。

【主治】疟邪久羁,因疟成劳,而成劳疟;络虚而痛,阳虚而胀,胁有疟母,邪留正伤。

【方论选录】此证气血两伤,《经》云:劳者温之。故以异功温补中焦之气,归、桂合异功,温养下焦之血,以姜、枣调和营卫,使气血相生,而劳疟自愈。此方补气,人所易见,补血人所不知,《经》谓:中焦受气取汁,变化而赤,是谓血。凡阴阳两伤者,必于气中补血,定例也。

27955 加味异功散

【方源】《保命歌括》卷二十。

【组成】人參 白术 茯苓各一钱 甘草三分 陈皮 砂仁(研) 藿香各五分 神曲(炒)一钱 陈米(年久者佳)一合

【用法】上咬咀,取顺流水二大盏,煎沸,泡伏龙肝,搗细搅浑,放冷澄清,取一盏,加生姜三片,大枣一个,入药煎服。

【主治】胃虚而呕,不喜食。

27956 加味异功散

【方源】《医家心法》。

【组成】人參 黄耆 白芍 茯苓 陈皮 甘草 煨姜 大枣

【主治】小儿痘疮至七八日

【备考】小儿痘疮至七八日,竟用加味异功散加白术。

27957 加味异功散

【方源】《金鉴》卷四十七。

【组成】异功散加山楂 神曲 厚朴 生姜

【主治】产后发热,呕吐胀闷属伤食,或倦怠气乏,属伤气者。

27958 加味异功散

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人參 白术(蜜炙) 当归 川芎 陈皮(去白) 茯苓 阿胶(蛤粉炒珠) 麦冬(去心) 炙甘草各等分

【用法】加生姜三片,大枣二个,水煎服。

【功用】预防妊娠五月以前堕胎。

27959 加味异功散

【方源】《会约》卷十九。

【组成】人參 白术二钱 茯苓一钱半 甘草(炙)一钱 当归二钱 陈皮(去白)一

钱 钩藤钩钱半(此味后入,过煎无力)

【功用】补脾胃。

【主治】小儿慢惊风证。脾胃虚弱,肝木所胜,外虚热而内真寒。

【加减】如不应,加半夏一钱半,炮姜一钱,白蔻八分,木香四分,或再加附子一钱半。

27960 加味异功散

【方源】《疫疹一得》卷下。

【组成】人参一钱 白术一钱 茯苓一钱 陈皮一钱 山楂二钱 谷芽三钱 甘草五分 砂仁八分 生姜一片 黑枣三个

【功用】健脾养胃。

【主治】疫疹愈后,脾胃虚弱,食少不化。

27961 加味异功散

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】党参(去芦,米炒)二钱 白术(净)一钱五分 陈皮 麦芽(炒) 茯苓 神曲(炒) 炙草各一钱

【用法】加生姜二片,水煎服。

【功用】补脾消食。

【主治】产后伤食,吞酸噎腐,满闷者。

【加减】如腹痛,加木香末六分,冲药服。

27962 加味异功散

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】党参(去芦,米炒)一钱五分 陈皮一钱 扁豆(炒,杵)一钱五分 生薏米三钱 白术(净) 山药(炒)各二钱 泽泻(盐水炒)一钱 白茯苓一钱五分 炙草一钱

【主治】脾虚有湿所致带下病。

【加减】如有热,加莲子心五分,黄柏一钱;色白清冷,腹痛多寒者,加干姜一钱,或再加制附子一钱。

27963 加味异功散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】党参三钱 白术四钱 茯苓二钱 甘草一钱 广皮二钱 蕲艾三钱 乌贼骨八钱 续断三钱

【用法】水煎,温服。

【功用】补气健脾。

【主治】因脾虚气弱,妊娠四五月,胎动不安,腰痠腹痛,有时下血,气短神倦,面色浮黄,大便下利,舌淡苔白滑,脉沉滑。

27964 加味异香散

【方源】《保命歌括》卷三十二。

【组成】莪术(炮) 益智仁 三棱(炮) 甘草各一钱 青皮(去瓢) 陈皮各五分 石莲肉 厚朴(姜汁炒)各二分

【用法】上咬咀。加生姜三片,大枣一个,白盐少许,水一盞半,煎一盞,去滓温服。

【主治】右胁下痛,属痰与食积者。

【加减】食积,脉弦,按之痛益甚,加神曲、麦蘖(各炒)、山楂肉、苍术、香附各五分;痰积,脉滑,按之痛不甚,加半夏曲、南星、茯苓、苍术、香附各五分。

27965 加味导气汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】木香三钱 川楝三钱 小茴香四钱 吴茱萸四钱 升麻二钱 巴戟天三钱 葫芦巴三钱 川椒一钱 炮姜二钱

【用法】水煎,温服。

【主治】因下部受寒凉而得之疝气,初起少腹微痛,日久生一气管,直通肾囊,不痛其管即空,偶触寒凉,少腹作痛,其管即胀起,复通肾囊。

【方论选录】此方以川楝为君,乃治疝之要药;以川椒、炮姜、小茴为臣,清其少腹之寒;以升麻、巴戟、吴萸、芦巴为佐,止其少腹之痛;以木香为使,通行其三焦之气。寒散痛止,而疝愈矣。

27966 加味导赤汤

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 生地 条芩 木通 甘草梢 麦冬(去心) 赤芍各一钱 淡竹叶十五片

【用法】加灯心四十九寸,水煎,空心服。

【主治】子淋。孕妇小便少;溺血。

27967 加味导赤饮

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归尾四钱 赤芍三钱 葛根四钱 寸冬三钱 连翘三钱 生地四钱 龙胆草三钱 石膏六钱 神曲三钱(炒) 麦芽三钱(炒) 大白三钱 木通二钱 大黄三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】心肺二经风热壅盛，经络淤滞，或风尘刺激，烈日曝晒，致胥肉攀睛症，从大眦生一道胥肉，侵蚀瞳孔，不时痛痒，热泪常流，视物昏蒙。

27968 加味导赤散

《普济方》卷三八八。为《直指》卷十六“增味导赤散”之异名。见该条。

27969 加味导赤散

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】生地一钱五分(切片) 木通八分 甘草四分 归尾八分 柴胡八分 防风八分 荆芥八分 车前子八分 黄芩八分(酒炒) 赤芍八分

【用法】加生姜一薄片为引。

【主治】心火乘肾，眼睛赤脉一条贯瞳仁者。

【加减】痛甚口渴，眼睛生眵，加黄连六分(酒炒)，连翘一钱。

27970 加味导赤散

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】生地一钱五分(切片) 木通八分 红花四分 赤芍八分 防风六分 荆芥六分 蝉蜕八分 甘草四分 归尾八分

【用法】生姜一薄片为引。外点消炉散。

【主治】胥肉攀睛，眼大角长肉一块及黑珠。

【加减】痛者，加黄芩八分(酒炒)；痒者，加蕤仁八分，刺蒺藜八分。

27971 加味导赤散

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】生地 赤芍 木通(去皮) 甘草梢 麦冬 黄柏 知母 桂心各一钱 灯心

四十七寸

【用法】水煎，调益元散一钱服。

【主治】产后血虚内热，小便涩痛成淋。

27972 加味导赤散

【方源】《育婴秘决》卷四。

【组成】木通 生地黄 甘草梢 条芩 梔子仁 泽泻 车前子 柴胡梢各等分

【用法】上为末，每服一二钱，加淡竹叶七片，灯心二十一寸，水煎，食前服。

【功用】泻心火，滋肾水。

【主治】小儿心热肝热，小便赤涩者。

27973 加味导赤散

【方源】《医方考》卷六。

【组成】生地黄 人参 麦门冬 木通 甘草各等分 竹叶十片 灯心七根

【主治】痘疹小便黄赤，口干烦渴者。

【方论选录】内热，故用生地黄；小便黄赤，故导以木通、竹叶、灯心；口干烦渴，故润以人参、麦冬、甘草，乃气化而津液自生也。

27974 加味导赤散

【方源】《准绳·幼科》卷二。

【组成】生地黄 木通 防风 甘草 山梔子 薄荷叶 麦门冬

【用法】加灯心、竹叶，水煎服。

【主治】小儿急惊风。

27975 加味导赤散

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】生地 木通 生甘草 连翘 黄连 滑石 赤苓 麦冬(去心)

【用法】灯心为引，水煎服。

【功用】除湿热。

【主治】水痘，其形尖圆而大，内含清水，易胀易靥，不作脓浆。

27976 加味导赤散

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】薄荷叶四钱 生地黄(酒洗) 木通 元参 车前子 连翘 淡竹叶各七钱 黄连三钱

【用法】灯心、石膏为引。

【功用】利小便，止惊泄，清胃泻火。

【主治】麻证发热，五六日，欲出不出，或作惊候，吐泻交攻；麻证内热不除，不能尽收。

【加减】兼惊者，加辰砂、滑石粉，调服。
27977 加味导赤散

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】生地黄(酒洗)一钱五分 川木通 川元参各五分 连翘六分 川黄连六分 薄荷叶四分 淡竹叶七分

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】麻疹将收已收之后，脱肛者。

【加减】若因毒火内迫，大肠枯涩，肺金受伤，不能传送，致成里急后重之症，而病者难忍不耐，用力送气催便，以冀稍松，适肛脱出，去薄荷、淡竹叶，加当归尾、牛蒡子、枯黄芩、枳壳、滑石各八分，丑牛四五分，丹皮四五分，升麻五六分；如兼有潮热者，加鲜地骨皮二三钱；若因久泻而脱肛者，去薄荷、竹叶，加当归身一钱许、川芎一钱许、升麻六七分。

27978 加味导痰汤

【方源】《医方类聚》卷一〇四引《经验秘方》。

【组成】大天南星(姜汁浸三日，锉，晒干) 大半夏(生用)各一两 枳实(麸炒，去瓤) 桔梗 赤茯苓 沉香 木香 陈皮各半两

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盞半，生姜自然汁一呷，同煎至六分，去滓，澄清汁服。此药煎时不要搅动，须文武火煎。服此药后，却服生料治中汤加沉香，更入生姜煎，滤取澄清，水中浸冷服。

【主治】反胃呕吐。

27979 加味导痰汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】茯苓 半夏 南星 枳实 黄芩 白术 陈皮 甘草 桔梗 黄连 瓜蒌仁 人参

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二个，

水煎服。临服捶法入竹沥、姜汁温服。年力壮盛，先用吐痰法，次服此汤。

【主治】内伤七情，痰迷心窍。湿热痰饮，头痛眩晕，心惕怔忡，昏沉多卧。

①《伤寒六书》：因内伤七情，致痰迷心窍，神不守舍，而憎寒壮热，头痛，昏沉迷闷，上气喘急，口出涎沫。名曰挟痰。②《证治宝鉴》：痰饮而致怔忡，心中惕惕然摇动，不得安静，无时而作，头时眩，或时头痛，或吐痰，或气口大滑于人迎，其人喜暗恶明。痰证而致多卧，恶亮羞明，喜朝里睡。③《张氏医通》：湿热痰饮，眩晕痰室。

27980 加味导痰汤

【方源】《济阴纲目》卷二。

【组成】半夏 陈皮 白茯苓 甘草 枳实 黄连 川芎

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】躯脂经闭。

【方论选录】《医略六书》：躯脂壅遏，阻塞胞门，气上迫肺，故心气不得下通，而月事不来焉。枳、连、芎、半导痰清火，力能入血海以化滞通经；陈、草、姜、苓和中化气，功专入气海以决壅通闭也。水煎温服，使躯脂默运，则气不上迫而心气无不下通，经血自当顺流而下，何月事之不来足患哉。

27981 加味导痰汤

【方源】《济阳纲目》卷四十五。

【组成】南星(姜汤泡) 半夏(姜汤泡) 各二钱 枳实(麸炒) 黄芩 橘红 茯苓 各一钱 天麻 全蝎 黄连各七分 甘草四分

【用法】上锉，水煎，加竹沥二匙，姜汁半酒盞，食远服。

【主治】痰迷心窍，发病。

27982 加味导痰汤

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】陈皮 枳实 半夏 茯苓 南星 甘草 竹沥一大蛤壳 白芥子

【用法】水煎，入竹沥更温服。

【主治】产后咽喉生疮，舌上有白苔，久不愈，属痰饮者。

27983 加味导痰汤

【方源】《喉科心法》。

【组成】陈皮（去白） 茯苓 枳壳（炒） 真胆星 杏仁（去皮尖，炒，研） 桔梗各二钱 桑白皮一钱半 法夏四钱 甘草一钱半（或加石膏 知母 瓜蒌霜 老姜汁）

【主治】咽喉痛失音，起于四五日，肥人痰多体实者。

27984 加味导痰饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】制半夏 茯苓各三钱 陈皮二钱 甘草一钱 枳实 川芎各一钱半 生姜二片 青皮五钱 鳖甲二两

【用法】水煎，温服。

【功用】导痰消积，化瘀。

【主治】妇人癥瘕痰积证。身体肥胖，平素多痰，肤色晄白，头眩耳鸣，恍惚不寐，肉瞢筋惕，时作时止，白带甚多，月经停闭，积久则腹大如怀孕状，若结为癥则坚硬不移，形成瘕则动无定处，噁心呕吐，舌淡苔白腻，或灰腻，脉弦细而滑。

27985 加味阴阳散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】黄连 干姜 青黛 孩儿茶各等分

【用法】上为末。每用少许搽患处。

【主治】口舌生疮。

27986 加味阴阳散

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【异名】赴筵散。

【组成】川连 干姜 生蒲黄各3克 儿茶 青黛

【用法】上为末。敷之。

【主治】口舌生疮。

27987 加味防风汤

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】防风一钱 片芩（酒炒）一钱五分 人参 白及各一钱 麦门冬（去心）二钱 生

甘草五分 知母一钱 炒白芍一钱 怀生地（酒洗）一钱 黄柏（酒炒）一钱 黄耆一钱 黄连（酒炒）一钱 当归头 百合各一钱

【用法】上锉。水煎，食远温服。

【主治】因元阳亏损，外寒内热，致鼻流涕，久而不愈，甚则有滴下腥臭之恶，而成脑漏者。

27988 加味防风汤

【方源】《证治汇补》卷八。

【组成】麻黄 防风 苍术 川芎 藁本 羌活 白芷 桔梗 芍药 甘草

【功用】《医略六书》：升阳散湿。

【主治】风邪时疫致下痢，兼有表证者。

【方论选录】《医略六书》：肠胃受风，不能化气，而糟粕不传，故下痢不止，头疼身热焉。防风散风邪以胜湿，麻黄开腠理以逐邪，羌活散太阳之邪，白芷散阳明之邪，川芎行营卫之气，白芍敛肠胃之阴，苍术燥湿强脾气，藁本升阳散外邪，桔梗开提肺气，甘草甘缓和中。煎汤热服，使风散湿除，则肠胃清和，而振传送化之职，头疼身热无不解，下痢清稀无不止矣。

【备考】《医略六书》本方用麻黄一钱半，苍术一钱半，羌活一钱半，川芎一钱半，防风一钱半，白芍一钱半（酒炒），藁本一钱半，桔梗八分，白芷钱半，甘草八分。水煎，去滓温服。

27989 加味如圣汤

【方源】《济阳纲目》卷一〇六。

【组成】桔梗三钱 甘草一钱半 黄芩 黄连 薄荷 天花粉 元参各一钱

【用法】水煎，频频咽之。滓再煎服。

【主治】咽喉一切病证。

【加减】如风热壅盛，欲结毒溃脓，加射干、连翘各一钱，牛蒡子八分，羌活、防风各七分；大便秘，加大黄二钱；口燥咽干，加生地黄、知母各一钱；阴虚火动声哑，加黄柏、蜜炙知母、麦冬各一钱，五味子二十粒。

27990 加味如圣散

【方源】《医方考》卷六。

【组成】桔梗二钱 牛蒡子 麦门冬各一钱五分 甘草 玄参 荆芥各一钱 防风七分 生犀角 黄芩各五分

【主治】①《医方考》：痘症咳嗽风热，声哑喉痛者。②《痘学真传》：痘家风痰热壅，烦渴不宁，痘色干红，在五六朝前不润泽起胀者。

【方论选录】①《医方考》：牛蒡子、麦门冬疗风痰而清肺热；荆芥、防风散风邪而升郁热；甘草、桔梗、黄芩利咽喉而清气热；犀角、玄参凉心膈而疗积热。热去则金清，金清则声哑愈矣。②《痘学真传》：牛蒡、麦冬、黄芩清肺家痰热，荆芥、防风散肌表风邪，犀角、玄参凉心胸之郁热，甘草缓诸药寒凉之性，桔梗领诸药归于肺家，不使下行，独用二钱，然此味材堪舟楫，不能独建奇功，方中似宜减半。

27991 加味如神散

【方源】《寿世新编》。

【组成】元明粉六钱 大梅片一分 硼砂三钱五分 飞朱砂一钱 飞青黛八分 上儿茶五分 苏薄荷一钱 荆芥穗一钱 北细辛五分 麝香三厘 官白芷一钱 生石膏八分

【用法】上为极细末，瓷瓶收贮，塞紧，勿泄气。用时蘸少许擦之，流去热涎自愈。

【主治】风火牙痛，红肿而热，或口气臭秽者。

【宜忌】孕妇忌之。

27992 加味妇沉汤

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】乌药一钱五分 缩砂 木香各八分 延胡索 香附各三钱 甘草一钱

【用法】大枣为引，水煎服。

【主治】经水欲来，小腹疼痛者。

27993 加味观音散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】白扁豆(微炒) 石莲肉(炒，去心) 人参(焙，去芦)各一分 白茯苓一

钱半(去皮) 神曲二钱(炒) 甘草(炙) 香白芷 绵黄耆(捶碎，用蜜水拌炙) 木香(炒)各一钱 白术(炒)一钱半

【用法】上为末。每服婴儿用一字，二三岁半钱，四五岁一钱，用水一小盏，或半银盏，枣子半个，煎十数沸，温服。

【功用】补虚，调胃气，进乳食，止吐泻。

27994 加味红花散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】生地五钱 秦归二钱 赤芍三钱 干荷叶 牡丹皮各二钱 红花一钱 蒲黄(生炒各半)三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】清热活血。

【主治】产后血晕之血瘀证，偏于热邪者，面带红色，神昏口噤，甚至不省人事，胸满心烦，少腹硬痛拒按，恶露不下，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉数。

27995 加味红绵散

【方源】《医方考》卷六。

【组成】天麻 麻黄 荆芥穗 全蝎 薄荷 紫草 蝉蜕各等分

【用法】以此药调抱龙丸服之。

【主治】痘疹风热惊搐。

【方论选录】痘之出也，自内达外。心热则惊，肝热则搐，所以搐者风也，所以惊者热也。是方也，麻黄、荆芥、薄荷、天麻、全蝎、蝉蜕消风解热；乃紫草者，所以解毒发痘而活血也。

【备考】《治痘全书》本方用法：上为末，调抱龙丸服之。

27996 加味麦冬汤

【方源】《医钞类编》卷十七。

【组成】人参 麦冬(去心) 归身 生地 石菖蒲 炙草各一钱 五味子十二粒

【用法】猪心一个，劈开，水二盏，煎至盏半，去猪心，入药煎服。

【主治】产后语言不清，含糊蹇涩，并治怔

仲。

27997 加味寿星丸

【方源】《得效》卷十三。

【组成】天南星三两 母真珠一钱 真琥珀五钱 圆白半夏五两 枯矾五钱 大朱砂一两(细研,为衣)

【用法】上为末,生姜自然汁煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十五丸,淡姜汤送下;气不顺,人参汤送下;惊悸,金银器、灶心土汤送下;上热烦躁,淡竹叶、麦门冬汤送下;宁心定志,石菖蒲汤送下;痰盛喘急,桑白皮汤送下;小儿急惊,麦门冬、青竹叶汤送下;慢惊,冬瓜仁、木香汤送下。

【主治】因事惊忧,涎留心包,精神不守,事多健忘,谵言妄语,如有所见,不得安卧;或风痰潮作,手足抽掣;或心虚烦躁。

【加减】心气狂甚,加铁膩粉一两。

27998 加味寿胎丸

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】菟丝子 桑寄生 续断 黄耆 白术 阿胶 莲房炭

【功用】补肾安胎。

【主治】肾虚胎漏。先天不足,肾气虚怯,或房事不节,损伤肾气,冲任不固,胎漏下血,腰脊痠痛腿软,头晕耳鸣,尺脉细弱。

27999 加味坎离丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】人参二两 五味子(去梗)一两 麦门冬二两 牛膝(酒浸)二两 黄耆(蜜炙)一两 菟丝子(酒浸,成饼用)二两 小茴香(盐炒)二两 当归(酒浸)二两 白茯苓(去皮)二两 木香一两 川椒(去目合口,微炒) 黄柏(酒浸,炒)四两 天门冬(去心)五两 肉苁蓉(酒浸)二两 山茱萸(去核)二两 杜仲(炒断去丝)二两 巴戟(去皮,酒浸)二两

【用法】上为细末,秋、冬酒糊为丸,春、夏蜜为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心盐汤或好酒任下。

【功用】下滋肾水,上降心火,中补脾土,除风,添精补髓,强阴壮阳,杀九虫,通九窍,补五脏,益精气,止梦遗,身轻体健,延年增寿。

【主治】酒色过度,劳心费力,精耗神衰,心血少而火不能下降,肾气衰而水不能上升,脾土无所滋养,渐至饮食少进,头目昏花,耳作蝉声,脚力痿软,肌肤黄瘦,遍身疼痛,吐痰咳嗽,胃脘停积,梦遗盗汗,泄泻,手足厥冷。

28000 加味坎离丸

【方源】《医统》卷四十八。

【组成】川黄柏八两(二两酒浸,二两盐水浸,二两人乳浸,二两蜜水浸,晒干,炒褐色) 知母八两(盐酒浸,炒) 当归 川芎 白芍药各四两(酒浸一日,晒干) 熟地黄八两(用白茯苓四两打碎,砂仁二两,三味同入绢袋中,好酒二瓶煮干,去茯苓、砂仁,止用地黄)

【用法】上锉,匀铺筐中,日晒夜露三日为度,白蜜一斤半,重汤炼成珠,和药末捣丸,如梧桐子大。每服八十丸,空心盐汤送下,冬月酒送下。

【功用】生精养血,升水降火。

【主治】虚损。

28001 加味芩茎汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生苡仁五钱 栝楼仁四钱 光桃仁 川贝母 甘草节各一钱半 银花 连翘各二钱 制月石八分 陈芥菜卤两瓢(冲)

【用法】先用活水芦根、鲜菩提根、鲜冬瓜皮子各二两煎汤代水。

【功用】降气行血以宣肺痹,排脓去腐以清肺毒。

【主治】赤膈伤寒,毒陷伤肺成痈,咳出浊痰腥臭,甚或吐脓,胸中犹隐隐痛,舌苔白腐满布,脉右寸滑数而实。

28002 加味芷贝散

【方源】方出《回春》卷六,名见《东医宝

鉴·外形篇》卷三。

【组成】天花粉 金银花 皂角刺 穿山甲(土炒) 当归尾 白芷梢 瓜蒌仁 贝母 甘草节

【用法】上锉。酒煎服。

【主治】吹乳，乳痈肿痛不可忍者。

【备考】《东医宝鉴·外形篇》本方诸药用各一钱，锉作一帖，酒、水各半煎服。

28003 加味苍术膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术十斤(捣如泥，入大锅内，用水二桶，以文武火煮至十余碗，取出绢滤，入瓷罐内) 人参 生地 熟地 黄柏 远志 杜仲 川芎 胡桃肉 川椒 故纸 当归 姜汁各四两 青盐二两 朱砂一两 旱莲草汁二碗 白蜜二斤

【用法】上为末，共入膏内封固，大锅水煮，官香二柱为度，取出埋土中七日。每空心酒、汤任下。

【功用】通达诸身关节，流注遍体毛窍，养精养气养神，久服精满气盈，暖丹田，减相火，发白转黑，齿落更生。

【主治】男子精冷绝阳，妇人胞冷不孕。

28004 加味苍柏汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】苍术皮9克 黄柏9克 银花9克 连翘9克 萆薢12克 山栀9克 牛膝9克 防己9克 米仁12克 甘草3克

【用法】水煎服。

【主治】足癣。

28005 加味苍柏散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术一钱 白术八分 知母 黄柏 黄芩各五分 当归 芍药 生地各四分 木瓜 槟榔 羌活 独活 木通 防己 牛膝各三分 甘草一分

【用法】加生姜水煎，温服。

【主治】湿热脚气。

【加减】有痰，加竹沥、姜汁；大便实，加

桃仁，小便涩，倍牛膝。

【方论选录】苍术、白术去湿；知母、黄柏、黄芩去热；当归、芍药、生地调血；木瓜、槟榔行气；羌活、独活利关节，散风湿；木通、防己、牛膝引药下行及消肿湿；甘草和药。

28006 加味芦荟丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】银柴胡十六两 君子肉十六两 黄连八两 胡连八两 芦荟二两 胆草十六两 麦芽(炒)十六两 三棱(炒)十六两 阿魏四两 莪术(炙)十六两 全蝎八两 芫荽十六两 鸡内金(炒)三十二两 橘皮三十二两 枳壳(炒)六十四两 山楂三十二两 莱菔子(炒)三十二两 神曲(炒)十六两 白术(炒)三十二两 干蟾(烧)三十二两 槟榔十六两，黄芩三十二两 青皮(炒)十六两 茯苓十六两 厚朴(炙)十六两 甘草十六两 大青叶十六两

【用法】上为细末，过罗。用冷开水泛为小丸。每服五分，日服二次，温开水送下。周岁内酌减。

【功用】消痞磨积，化痞杀虫。

【主治】小儿疳积体瘦，痞块坚硬，肚大青筋，面黄肌瘦。

28007 加味两仪膏

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】党参八两 熟地三两 归身三两(炒) 黄耆三两炙(或加制附子一钱)

【用法】大乌梅四十个，煎一沸，去核，合前药同煎成膏。冲服。随证用引：有痰则以陈皮为引，有热则以麦冬为引，有寒则以生姜为引。

【功用】阴阳双补。

【主治】虚证厥逆；吐血；以及大汗淋漓虚脱证。

【加减】寒甚，酌加桂，附。

28008 加味扶桑饮

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】熟地五钱 当归二钱 白芍一钱

五分 川芎八分 木瓜一钱(酒炒) 枣仁二钱(炒,研) 牡蛎四钱(煅,研) 茯苓二钱 广皮一钱 甘草五分 金毛脊二钱(去毛,切片) 续断二钱

【用法】上药以嫩桑枝二两,煎汤代水煎药。

【主治】肝劳,阳气拂逆,阴气亏损,身热胁痛,头眩耳鸣,筋节弛纵。

28009 加味连壳丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】黄连一两 枳壳 厚朴各五钱 当归四钱 木香 黄柏各三钱 荆芥二钱 猬皮一个

【用法】上为末,糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温水送下。

【主治】湿热内甚,饱食肠滞,发为诸痔,久而成瘻。

28010 加味连草汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】黄连三钱 生甘草一两 菖蒲一钱 贝母三钱 生姜汁半茶钟

【用法】水煎一碗,服之即解,不必二服,得吐犹愈之速也。

【主治】饮吞鸩酒,白眼朝天,身发寒颤,忽忽不知如大醉之状,心中明白但不能语言。

28011 加味连理汤

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】白术(土炒)二钱 人参 白茯苓 黄连 干姜各一钱 甘草(炙)五分

【用法】水煎,热服。

【主治】口糜,口臭,泄泻。

28012 加味佛手散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】川芎 当归 赤芍 生地 红花 白芷 陈皮 益母草 干姜 官桂 甘草 麝香 蒲黄 童便 鹿角屑

【主治】胎死腹中,孕妇神气清爽,能食,腹不胀满,上焦气不喘急。

【方论选录】方中鹿角、姜、桂加以红花使

引辛热以下胎,加麝香以开窍,佐以白芷、蒲黄、赤芍、陈皮排胀行血,而芎、归、母、地更入童便,所以救母命于无危也。

28013 加味佛手散

【方源】《朱氏集验方》卷十引梁国佐方。

【组成】佛手散加枳壳

【主治】妇人妊孕三月,忽然心腹胀痛,下血两小块。

28014 加味佛手散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】佛手散加蒲黄

【主治】血崩。

28015 加味佛手散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归 川芎 荆芥各等分

【用法】上锉一剂。水煎,入童便,温服。

【主治】产后晕倒,不省人事,眼黑耳鸣等;并治中风不省人事,口吐涎沫,手足瘈瘲。

28016 加味佛手散

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】当归 川芎 黄耆(蜜炙)各一两 柴胡 前胡各一钱半

【用法】上咬咀。每服五钱,水一大盏,桃、柳枝各三寸,枣子、乌梅各一枚,生姜一片,水煎服。

【主治】产后血虚,劳倦盗汗,多困少力,咳嗽有痰。

【加减】如有痰,不用乌梅。

【方论选录】《济阴纲目》汪淇:以盗汗而用柴、前、川芎,似非宜矣;以咳嗽有痰而用黄耆,又似难用,然以之为君,而柴、前仅用钱许,何多寡之相悬也?要之,产后当以气血为主,故用之耳。惟无邪者宜之。

28017 加味佛手散

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】当归二两 川芎一两 益母草五钱 乳香末一钱 败龟版一具

【用法】水煎服。

【主治】胞衣不下。

28018 加味佛手散

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】当归三钱 川芎一钱 人参三五钱(去血过多加至一两)

【用法】临服入童便半盏,续续进之。

【主治】产妇交骨不开。

【加减】质壮气实者,但加重便,人参不用可也。

28019 加味佛手散

【方源】《胎产辑萃》卷三。

【组成】川芎 当归 益母草 陈皮 葵子 香附

【用法】水煎服。

【功用】催生。

28020 加味佛手散

【方源】《羊毛温证论》。

【组成】川芎二钱 全当归五钱 生黄耆三钱 荆芥穗一钱 泽兰叶三钱 五灵脂一钱 醋炒延胡索五分 酒炒植炭二钱 桂枝木五分 蝉蜕壳十枚 白僵蚕一钱

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】羊毛温邪,新生产后毒火伏郁,神昏口渴,胸胀气阻,头痛身麻,烧热谵语,忽寒忽热,眩晕不寐,或腹中停瘀作痛。

【加减】毒重,加秋石一钱,雄黄二分,黄蜜三钱和服;如寒困毒火,加上肉桂三分,减去桂枝。

28021 加味佛手散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】当归三钱 川芎二钱 泡参 香附各四钱 台乌 吴萸各二钱 桑寄生四钱 延胡二钱

【用法】水煎,温服。

【功用】散寒,调气,活血。

【主治】月经后期,气郁偏寒,量正常色黑,间有血块,腰腹微有胀痛,苔薄白而润,脉沉迟或沉弦。

28022 加味辛夷散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】辛夷 黄耆 人参 当归 白芍

川芎 白芷 细辛 黄芩各一钱 甘草六分

【用法】灯心三十根,水煎,食远服。

【主治】鼻中流出臭脓,名曰脑漏。

28023 加味羌活汤

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】羌活 防风 升麻 柴胡 当归 川芎 藁本 细辛 黄芩 白菊花 蔓荆子 各等分

【主治】痘后面目浮肿。

28024 加味羌活饮

【方源】《三因》卷十六。

【异名】加味羌活散(《玉机微义》卷四十四)。

【组成】羌活 前胡各一两 人参 桔梗 甘草(炙) 枳壳(麸炒) 川芎 天麻 茯苓各半两 蝉蜕(去头足) 薄荷各三钱

【用法】上为末。每服二大钱,水一盂,加生姜三片,煎七分,不拘时服。

【主治】风寒暑湿,外搏肌肤,发为瘾疹,憎寒发热,遍身搔痒,随脏气虚实,或赤或白,心迷闷乱,口苦咽干。

28025 加味羌活散

《玉机微义》卷四十四。为《三因》卷十六“加味羌活饮”之异名。见该条。

28026 加味羌活散

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】羌活(上) 独活(中) 柴胡(上) 前胡(中) 枳壳(中) 桔梗(中) 人参(中) 茯苓(中) 川芎(中) 升麻(中) 芍药(中) 甘草(下)

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】斑疹初出,憎寒壮热,头疼体痛,胸满不利。

【加减】斑盛,加黄连。

28027 加味羌活散

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】羌活 前胡 薄荷叶 防风 川芎 枳壳(麸炒) 桔梗 蝉蜕 连翘(去心) 生甘草 赤苓

【用法】引用生姜，水煎服。

【功用】疏风散湿。

【主治】瘾疹。心火灼于肺金，又兼外受风湿，发必多痒，色则红赤，隐隐于皮肤之中。

28028 加味补中汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】人参 白术（炒） 黄耆 当归 肉桂 白芍（炒） 木香 升麻 柴胡 陈皮 甘草

【用法】加煨姜一片，大枣一枚，水煎服。

【主治】小儿虚极，或泻成慢惊，手足厥逆。

28029 加味补血汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】黄耆 当归各五钱 升麻一钱 北五味子十粒

【用法】水煎服。

【主治】脱肛。

28030 加味补血汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】当归 黄耆各一两 荆芥三钱 白术五钱

【用法】水煎服。

【主治】妇女经水过多，行后复行，面色萎黄，人倦无力。

28031 加味补血汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】黄耆二两 当归 人参各一两 丹皮三钱 荆芥三钱 益母草三钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人因跌扑闪损，遂至小产，血流紫块，昏晕欲绝。

28032 加味补血汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】黄耆二两 当归一两 升麻五分 益母草三钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人气虚，产后五六日，胞衣留于腹中，经治仍胞衣不下，又无烦躁昏晕之状者。

28033 加味补血汤

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】生黄耆一两至二三两 当归五钱至一二两 三七末五钱 没药末二钱 白及三钱至一两 白芍五钱

【用法】水煎服。伤轻者减半用。

【主治】金刃自伤将死者。

28034 加味补血汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】黄耆一两 当归五钱 香附灰 莲蓬灰 粟壳灰 贯仲灰 藕节灰 陈棕灰 地榆灰各三钱

【主治】久崩不止。

28035 加味补血汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】黄耆一两 当归 山药各五钱 木通三钱

【用法】炖猪蹄服。

【主治】乳汁过少。

28036 加味补血汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆一两 当归五钱 龙眼肉五钱 真鹿角胶三钱（另炖同服） 丹参三钱 明乳香三钱 明没药三钱 甘松二钱

【主治】身形软弱，肢体渐觉不遂，或头重目眩，或神昏健忘，或觉脑际紧缩作疼，甚或昏仆移时苏醒致成偏枯，或全身痿废，脉象迟弱，内中风证之偏虚寒者。

【加减】服之觉热者，酌加天花粉、天冬各数钱；觉发闷者，加生鸡内金一钱半或二钱。服数剂后，若不甚见效，可用所煎药汤送服麝香二厘（取其香能通窍），或真冰片半分亦可；若服后仍无甚效，可用药汤送制好马钱子二分。

【方论选录】古方有补血汤，其方黄耆、当归同用，而黄耆之分量，竟四倍于当归，诚以阴阳互为之根，人之气壮旺者，其血分自易充长，是以此方不以当归为主药，而以黄耆为主药也。用龙眼肉者，因其味甘色赤，多含津液，最能助当归以生血也。用鹿角胶者，

因鹿之角原生于头顶督脉之上，督脉为脑髓之来源，故鹿角胶之性善补脑髓。凡脑中血虚者，其脑髓亦必虚，用之以补脑髓，实可与补血之药相助为理也。用丹参、乳香、没药者，因气血虚者，其经络多瘀滞，此于偏枯痿废亦颇有关系，加此通气活血之品，以化其经络之瘀滞，则偏枯痿废者自易愈也。用甘松者，为其能助心房运动有力，以多输血于脑，且又为调养神经之要品，能引诸药至脑以调养其神经也。

【临证举例】内风 高某，年过六旬，渐觉两腿乏力，寝至时欲眩仆，神昏健忘，恐成痿废，求为诊治。其脉微弱无力。为制此方服之，连进十剂，两腿较前有力，健忘亦见愈，而仍有眩晕之时。再诊其脉，虽有起色，而仍不任重按，遂于方中加野台参、天门冬各五钱，威灵仙一钱，连服二十余剂始愈。

28037 加味补阴丸

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】熟地 生地 麦冬 五味 当归 川芎 白术 黄耆 黄柏 知母 白芍 山药 砂仁 茯神

【用法】炼蜜为丸。盐汤送下。

【主治】伤寒愈后，心血不足，阴虚发热，四肢无力，倦怠，眼昏耳聋，神气不宁，或夜梦遗精，或作寒热盗汗，饮食无味，不生肌肉，身体羸瘦，面色青黄。

【加减】冬月，加干姜；梦遗，加牡蛎、蛤粉、琐阳；腰腿骨酸无力，加虎胥骨、败龟版、杜仲。

28038 加味补阴丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】甘州枸杞（盐酒炒）二两 知母（盐酒炒）二两 黄柏（盐酒炒褐色）三两 生地黄（酒洗）一两 熟地黄（酒洗过，姜汁炒）二两 天门冬（去心）一两五钱 麦门冬（去心）七钱 干山药（微炒）一两 杜仲（姜汁炒去丝）二两 牛膝（去芦，酒洗）一两 当归（去芦，酒浸）一两 山茱

萸（去核）一两 琐阳（酥炙）一两五钱（大便软者去五钱） 菟丝子（酒浸一宿，炒，取末）一两 人参（去芦）七钱

【用法】上为细末。用好白术与前药末相等为咀，用铜锅熬，先以水六大碗，熬至一碗取出听用；再以水五碗，熬至一碗取出听用；再以水四碗，熬至一碗，通前共水连渣以净袋滤过，文武火熬成膏，和前药末为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心淡盐汤送下。

【功用】补养。

【宜忌】忌食白萝卜、诸血。

28039 加味补阴丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】黄柏 知母各四两 牛膝 杜仲 巴戟 熟地 山茱萸各三两 苁蓉 白茯苓 枸杞 远志 山药 鹿茸 龟版各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心盐汤送下。

【功用】①《医学入门》：扶下弱。②《东医宝鉴》：补阴虚，泻阴火。

28040 加味补阴丸

【方源】《便览》卷三。

【组成】黄柏（盐酒炒）三两 北五味子一两 知母（去毛，盐水炒）三两 人参（去芦）一两半 龟版（酥炙）三两 枸杞（去萼）三两 天冬（去心）二两 琐阳（酥炙）二两 白芍（酒炒）一两半 当归（酒洗）一两半 牛膝（饭上蒸）二两 杜仲（姜炒丝尽）二两 故纸（酒炒）一两 沉香五钱 熟地五两（热酒浸透，另捣） 干姜（炒紫）二钱 山茱萸肉一两半

【用法】上为末，炼蜜和猪脊髓三条，小枣三十枚（去皮核），共捣为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心淡盐汤送下；冬月酒送亦可。

【主治】虚损。

【宜忌】忌白萝卜、牛肉、鱼腥。

28041 加味补阴丸

【方源】《准绳·伤寒》卷七。

【组成】黄柏（盐酒拌炒）四两 熟地黄

知母(盐酒拌炒) 败龟版(醋炙)各二两
虎胥骨 锁阳(醋炙) 白芍药(酒炒) 当
归(酒浸) 川牛膝(酒洗) 杜仲(醋炙
去丝) 砂仁各一两

【用法】上为末,炼蜜入猪脊髓五条,共捣和成,石臼内杵千余下为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心淡盐酒或盐汤送下。

【主治】病后阴虚,精血不足,四肢少力,心神不宁,夜梦遗精,或虚热盗汗,饮食进少,不为肌肉,身体羸弱,面色青黄而无血色。

【加减】若冬月天寒,加干姜(炮)五钱。

28042 加味补阴丸

【方源】《医钞类编》卷五。

【组成】黄柏 知母(俱酒炒) 败龟版(酥炙) 侧柏叶 枸杞 五味子 杜仲(姜汁炒断丝) 砂仁各等分 炙草减半

【用法】猪脊髓和地黄膏为丸服。

【主治】肾阴虚,腰背痛。

28043 加味补肝散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归 生地 白芍 川芎 广皮 甘草 柴胡 山梔 黄芩

【主治】肝血虚,火旺,内伤嗽血。

28044 加味纯阴汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】熟地 玄参 麦冬各五钱 山茱萸二钱 北五味子一钱 丹皮五钱

【用法】水煎服。可服十剂,经水自多。

【主治】妇人先期经来,其经水止有一、二点。

28045 加味青龙汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】白茯苓 干姜 白芍各三钱五分 杏仁 半夏 甘草各三钱 当归 桔梗 川芎 桂枝 五味各一钱半 麻黄 陈皮各一钱

【用法】上咬咀,分五贴。加生姜三片,水一钟半,煎七分,空心热服。

【功用】发散风邪,顺气化痰。

【主治】产后失于调理,肺经空虚,风寒乘入,以致气紧咳嗽痰多。

【加减】如气急,加苏叶、枳实各二钱。

28046 加味青金丹

【方源】《普济方》卷三十六引《指南方》。

【组成】硫黄 水银各等分

【用法】上各研细,不见星子为度,入木香末、丁香末各等分,用生姜自然汁煮糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前米汤送下。

【主治】反胃。清浊不分,中焦气痞闷,心下大如杯,或时寒,或时热,朝食暮吐,暮食朝吐,其关脉弦而紧,弦则为虚,紧则为寒,虚寒相搏,此名为格,与关格同。

28047 加味青娥丸

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】杜仲 破故纸 胡桃肉 川断 当归 白芍 山药 远志肉 益智仁 莲子

【主治】妊娠腰痛,肝肾亏虚者。

【方论选录】是方补骨、桃肉木火相生,此郑相国所进青娥丸方也,引以杜、远则入肾,而当归之苦温以补血,白芍之酸收以敛阴,续断可以联经络,益智可以缩水,再加莲子、山药之平涩以入心交肾,则痛止而胎安。

28048 加味青娥丸

【方源】《普济方》卷二一九。

【组成】杜仲三两(炒去丝,姜汁制)一两 破故纸(盐炒)四两 胡芦巴四两 小茴香四两(盐炒) 莲花蕊半两 川山甲六钱(酥炙) 胡桃三十个(去皮) 青盐少许

【用法】上为末,煮和为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒吞下,干物压之。

【功用】《景岳全书》:滋益阴阳,美容颜,健腰膝,止腰痛。

【主治】诸虚不足。

28049 加味青娥丸

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】杜仲(姜汁浸炒)十二两 破故纸十二两(水淘,芝麻同炒变色,去芝麻,瓦

上焙干,为末) 沉香六两 胡桃(去皮隔,另研)六两 没药(另研) 乳香(另研)各六两

【用法】上为末,用肉苁蓉十二两,酒浸成膏,和剂捣千余杵为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒或盐汤任下。

【主治】肾虚腰痛,或风寒乘之,血气相搏为痛。

28050 加味青娥丸

【方源】《济阳纲目》卷七十五。

【组成】破故纸(酒洗净,炒香) 川萆薢(童便浸一宿) 杜仲(姜汁炒断丝) 牛膝(去芦) 黄柏(盐水炒) 知母(酒炒)各四两 胡桃肉(汤泡,去皮)八两(另研膏)

【用法】上为细末,春、夏用糯米粥,秋、冬用炼蜜和匀,石臼内杵千余下为丸,如梧桐子大。每服五十丸至八十丸,空心盐汤、盐酒任下,以干物压之。

【功用】滋肾水,壮阳,益筋骨。

【主治】腰膝足痛。

28051 加味枇杷膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】枇杷叶五六六十斤(干鲜俱可,如不咳嗽不用) 大梨二个(要深脐的,去皮心,切碎) 蜜半杯(先熬滴水成珠,如大便溏泻不用) 大枣八两(或黑圆枣,或徽枣均可。煮熟,乘热去皮) 建莲肉四两(不去皮)

【用法】先将枇杷叶放锅内,用河水多煎几滚,取汤用绢淋清汁,其煎过之枇杷叶弃之不用。后将梨、枣、莲肉、蜜同放锅内,铺平,然后将枇杷叶煎的清汁淹满略高些,盖好,煮半枝线香翻转,再煮半枝线香,用瓷罐收好。随意温食。

【功用】润肺健脾。

【主治】气血两虚,身体羸瘦,四肢痿软,精神倦怠,腰疼脊痛,饮食减少,一切不足弱症。

28052 加味苦参丸

【方源】《普济方》卷一一五。

【异名】苦参丸(原书卷一〇八)。

【组成】苦参一斤 荆芥半斤 何首乌白僵蚕二两 香白芷 川芎二两 赤芍药二两 大黄一两 白花蛇一条。

【用法】上为细末。面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸。温茶清送下,不拘时候。

【主治】一切风证。

28053 加味苦参丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】苦参一斤 防风 荆芥 苍耳子 胡麻子 皂刺各十两 蔓荆子 牛蒡子 黄荆子 枸杞子 何首乌 禹余粮 蛇床子各三两 白芷一两半

【用法】上为末,用皂角煎膏和丸,如梧桐子大。每服五十丸,茶、酒任下。

【主治】大风疮及诸风、赤白癫风。

28054 加味抵当丸

【方源】《保命歌括》卷二十五。

【组成】三棱(煨) 莪术(煨) 干漆(炒烟尽) 牛膝(酒洗) 琥珀 虻虫(糯米炒) 肉桂 水蛭(石灰炒) 桃仁泥 大黄(煨)各等分

【用法】上为细末,用生地黄自然汁和米醋调匀为丸,如梧桐子大。每服十丸,空心童便送下,五日进一服。以血下为度。间服四物汤。

【主治】血胀。

28055 加味转舌膏

【方源】《古今医鉴》卷二引贾兰峰方。

【组成】连翘一两 梔子(炒)五钱 黄芩(酒炒)五钱 薄荷一两 桔梗五钱 玄明粉五钱 大黄(酒炒)五钱 防风五钱 川芎三钱 石菖蒲六钱 甘草五钱 犀角三钱 柿霜一两 远志(甘草水泡)一两

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,如弹子大,朱砂五钱为衣。每用一丸,临卧薄荷汤调下。

【主治】中风痲疯,舌塞不语。

【备考】本方方名，据剂型当作“加味转舌丸”。

28056 加味虎潜丸

【方源】《医学正传》卷三引丹溪方。

【组成】人参 黄耆 芍药(煨) 黄柏(盐酒炒) 当归(酒洗) 山药各一两 锁阳(酥炙) 枸杞子 虎胥骨(酥炙) 菟丝子(盐酒浸三宿，细研，焙干，入诸药再研) 龟版(酥炙) 破故纸(炒) 杜仲(姜汁拌炒丝断) 五味子各七钱五分 牛膝(去芦，酒洗) 二两 熟地黄四两

【用法】上为细末，炼蜜和猪脊骨髓为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，温酒或姜盐汤送下。

【功用】《医统》：壮元阳，滋肾水。

【主治】①《医学正传》引丹溪方：虚损。②《医统》：诸虚不足，腰腿疼痛，行步无力。

【备考】《医统》有知母、茯苓，无芍药、五味子。

28057 加味虎潜丸

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】人参 黄耆(蜜炙) 白芍药(煨) 当归(酒洗) 山药各一两 锁阳(酥炙) 虎骨(酥炙) 龟版(酥炙) 菟丝子(制如法) 破故纸(炒) 杜仲(姜汁炒断丝) 五味子各七钱半 牛膝(酒浸) 二两

【用法】上为细末，炼蜜和猪脊髓为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐点汤送下。

【功用】健筋骨，补肾壮精。

【主治】肾脉虚数，精神短少，腰膝无力。

28058 加味虎潜丸

【方源】《医学六要》卷二。

【组成】人参 黄耆 芍药 黄柏(坚厚者，酒浸) 当归(酒浸) 山药各一两 锁阳(酥炙黄) 枸杞 虎胥骨(酒浸一宿，酥炙黄) 五味子各七钱五分 牛膝(酒洗) 一两 熟地四两

【用法】以炼蜜加猪脊髓为丸，如梧桐子

大。每服一百丸，空心温酒送下。

【功用】强骨补精。

【主治】虚损。

28059 加味虎潜丸

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】虎潜丸去知母，加人参、黄耆、山药、枸杞各二两，五味子一两

【主治】痿痹而厥。

28060 加味肾气丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】金匱加減肾气丸(《保嬰撮要》卷五)、加味八味丸(《医学入门》卷七)、金匱肾气丸(《冯氏锦囊》卷十一)、济生肾气丸(《张氏医通》卷十六)、资生肾气丸(《金鉴》卷二十七)。

【组成】附子(炮)二个 白茯苓 泽泻 山茱萸(取肉) 山药(炒) 车前子(酒蒸) 牡丹皮各一两(去木) 官桂(不见火) 川牛膝(去芦，酒浸) 熟地黄各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮送下。

【功用】《中国药典》一部：温肾化气，利水消肿。

【主治】①《济生》：肾虚腰重，脚肿，小便不利。②《医学集解》：虚证，脾肾大虚，肚腹胀大，四肢浮肿，喘急痰盛，小便不利，大便溏黄；亦治消渴，饮一溲一。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴、少阴药也。桂附八味丸滋真阴而能行水，补命火因以强脾，加车前利小便而不走气，加牛膝益肝肾借以下行，故使水道通而肿胀已，又无损于真元也。

【临证举例】慢性肾炎 《新中医药》(1957; 9: 30)：用本方(熟地四钱，山药、山萸、泽泻、丹皮、肉桂、车前子、淮牛膝各一钱，茯苓三钱，附子五分)治疗慢性肾炎6例。临床观察结果：本方能使浮肿逐渐减退或减轻，尿量逐渐增多，尿蛋白消失或

减少,肾功能改善,患者食欲增加,体力增强,血压降低。治疗过程中未发现副作用。

【备考】本方改为汤剂,名“金匱肾气汤”(见《证因方论集要》卷二)、“肾气汤”(见《医林纂要》)、“加减金匱肾气汤”(见《医门八法》)。

28061 加味肾热汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】磁石四钱 牡蛎四钱 生地四钱 白术一钱 白芍一钱 人参一钱 元参二钱 甘草五分

【用法】猪肾二枚,煎汤代水。

【主治】肾火飞腾于上,口燥咽干,面红目赤,耳流脓血,不闻人声。

28062 加味肾着汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】炮姜一两二钱 茯苓一两二钱 炙甘草七钱 炒白术七钱 炮附子二钱 肉桂二钱五分 泽泻二钱 杜仲二钱 牛膝二钱

【主治】腰疽,感于寒湿,平漫而不焮赤。

【加减】兼有风痒,加防风;瘀痛不消,加当归、金银花。

28063 加味败毒散

【方源】《普济方》卷二五三引《海上方》。

【组成】人参败毒散一贴 斑蝥一个 枇杷叶十片

【用法】上后二味同炒黄色,去斑蝥,将枇杷叶入败毒散,水一碗,煎至七分,临睡通口服。

【主治】饮酒过度,面黑肚饱。

28064 加味败毒散

【方源】《三因》卷三。

【组成】羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳(麸炒,去瓢) 桔梗 甘草(炙) 人参 茯苓 川芎 大黄(蒸) 苍术(米泔浸)各等分

【用法】上锉散。每服四大钱,水一盞半,加生姜三片,薄荷一头,煎七分,去滓热服。

【主治】三阳经脚气流注,脚踝上焮热赤肿,寒热如疟,自汗恶风,或无汗恶寒。

【加减】皮肤瘙痒赤疹,加蝉蜕。

【备考】《外科理例》本方用法:分二剂,水一钟,加生姜三片,煎八分,不拘时服。

28065 加味败毒散

【方源】《普济方》卷一〇五引《余居士选奇方》。

【组成】前胡(去芦) 柴胡(银州者,去苗) 人参 甘草(冬服用炙,夏月不用) 羌活 独活 桔梗 茯苓(去皮) 枳壳(汤浸,去瓢,麸炒令香) 川芎各一两 半夏(汤洗七次) 苍术(米泔浸炒)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,入生姜、薄荷,同煎至八分,去滓温服。如觉着风,即并热进三两服。微汗出立愈。

【主治】风气上攻头目,咽燥舌涩,心胸烦满,痰涎不利,头旋目眩;兼解伤寒阳证,脚气,踝上赤肿疼痛,寒热如疟,自汗恶风,或无汗恶风。

【加减】热甚者,加大黄。

28066 加味败毒散

【方源】《医学正传》卷二。

【组成】羌活 独活 前胡 柴胡 川芎 枳壳 桔梗 茯苓 人参各五分 甘草 薄荷各二分半 白术 防风 荆芥 苍术 芍药 生地黄各五分

【用法】上切细,作一服。加生姜三片,大枣二枚,水煎服。

【主治】瘟疫及瘾疹等证或因虚而感冒风湿以致发斑者。

28067 加味败毒散

【方源】《回春》卷七。

【组成】柴胡 前胡 羌活 独活 防风 荆芥 薄荷 枳壳 桔梗 川芎 天麻 地骨皮

【用法】水煎,热服。出汗为佳。

【主治】小儿痘疮,初起发热。

【加减】上古方,除参、苓,恐补早助火也;

宜加紫草、蝉退、苏叶、麻黄、僵蚕、葱白(带根)解热;泄泻,加猪苓、泽泻、去紫草。

28068 加味败毒散

【方源】《准绳·疡科》卷三。

【组成】荆防败毒散加牛蒡子 玄参

【主治】风热上壅,颈痛,或因怒气,憎寒壮热。

【备考】如服四五剂不退,宜服益气养荣汤。

28069 加味败毒散

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】羌活 独活 前胡 柴胡 白茯苓(去皮) 人参 枳壳(去瓢,麸炒) 桔梗 天麻 全蝎 僵蚕 白附子 地骨皮 川芎 甘草

【用法】上作一剂。加生姜三片,水煎,热服。

【主治】小儿急惊风,初起发热,手足搐搦,眼上视;并一切感冒风寒,咳嗽鼻塞声重,头疼发热,及痘疹欲搐发搐,并时行瘟疫。

28070 加味败毒散

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】人参 羌活 独活 前胡 柴胡 川芎 桔梗 茯苓 枳壳 甘草 木瓜 苍术各八分

【用法】水二钟,加生姜三片,煎八分,食前服。

【主治】足三阳经湿热毒气流注,脚膝焮赤肿痛,寒热如疟,自汗恶风,或无汗恶寒,或恶闻饮食。

【加减】便秘,加炒大黄。

28071 加味败毒散

【方源】《穷乡便方》。

【组成】羌活 独活 柴胡 前胡 枳实 桔梗各一钱 草果仁 槟榔 半夏各六分 乌梅一个 甘草 薄荷各四分 川芎八分

【主治】阳症,发自上脘。

【备考】初用芎苏五苓饮,二用清脾汤,三用本方。

28072 加味败毒散

【方源】《外科百效》卷三。

【组成】薄荷 瓜蒌 白芷 乌梅 生黄芩 归尾 半夏 桑白皮 茅根 灯心

【主治】肺痈初起,口燥咽干,胸肋隐痛,咳唾脓血,气息腥臭。

28073 加味败毒散

【方源】《医林绳墨大全》卷八。

【组成】黄芩 半夏 桔梗 薄荷 人参 独活 柴胡 羌活 枳壳 茯苓 甘草 川芎 前胡各一钱

【用法】加生姜三片,水煎服。

【主治】咽喉风燥,干枯如毛刺,吞咽有碍。

【加减】痰甚,加石膏。

28074 加味固本丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】天麦二门冬 诃子 阿胶 知母 各五钱 生地 熟地 当归 茯苓 黄柏各一两 人参三钱 乌梅十五个 人乳 牛乳 梨汁各一碗

【用法】上为末,炼蜜为丸,如黄豆大。每服八九丸,诃子煎汤或萝卜煎汤送下。

【主治】男妇声音不清。

28075 加味固本散

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】生地 熟地 桔梗 茯苓 天冬 肉 玄参 川贝 百合 阿胶 紫菀 麦冬 肉 甘草

【用法】白蜜二斤收胶。

【主治】虚劳。

28076 加味固阴煎

【方源】《女科证治约旨》卷二。

【组成】生地炭 白芍 阿胶 生龙骨 生牡蛎 茯神 淮山药 秋石 知母 黄柏

【主治】黑带。因命火太旺,肾水受煎,下焦所郁之湿热,欲济肾水而不得,反得肾气而化黑,形如豆汁,气则腥臭,直流阴部。

28077 加味和中饮

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】陈皮 枳壳 砂仁(炒,研) 山

楂 麦芽(炒) 川朴(捣) 泽泻各二钱
神曲三钱(炒) 川大黄三钱

【主治】头痛，饮食内伤，其病在里，胀满烦躁。

28078 加味和中散

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】人参 白术(去芦)各一钱 白茯苓(去皮用) 陈皮各五分 半夏七分 全蝎(炒)五分 天麻七分 细辛三分 薄荷三分 甘草二分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。乳母亦宜服之。

【主治】小儿慢惊风。

28079 加味知母散

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】黄耆 赤茯苓各一钱 子芩 麦冬(去心) 知母(炒) 甘草 山梔仁(炒)各五分

【用法】加竹沥为引，水煎服。

【主治】妊娠燥渴，咽间作痛。

28080 加味金龙丸

【方源】《中国麻风病学》。

【组成】大枫子(去壳)十两 伏龙肝三两 芎藭 连翘 皂角刺 大黄各二两

【用法】炼蜜为丸。用后当下脓血、赤水。其虫若系紫黑色者，为多年之病；若系红色者，为近日之病。连服数日，虫积尽下，即停止服药。

【主治】大麻风。

28081 加味金刚丸

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】丝饼七钱 牛膝(盐水炒) 木瓜各五钱 肉苁蓉(酒洗淡)七钱 杜仲(盐水炒)六钱 草薢五钱

【用法】炼蜜为丸，如绿豆大。每服二钱，淡盐汤送下。

【主治】痿病，筋骨软弱。

28082 加味金莲花

【方源】《直指》卷十五。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 山梔(炒)各

二两 桔梗 半夏(泡) 陈皮 人参(去芦)各一两

【用法】上为细末，滴水为丸，如小豆大。每服五十丸，淡姜汤送下。

【主治】内外诸热，气壅痰涎，溺血淋闭。

28083 加味金莲花

【方源】《东医宝鉴》卷三引《必用》。

【组成】黄连 黄柏 黄芩(并酒炒) 梔子各一两 大黄(煨) 人参 半夏 桔梗各五钱

【用法】上为末，滴水为丸，如梧桐子大。每服三十丸，茶清送下。

【功用】泻三焦火，止嗽化痰，清头目。

【主治】三焦火。

28084 加味金锁匙

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】火消三钱 硼砂二钱 冰片八厘 雄黄六分 姜蚕四分 寒水石一钱 人中白 灯草灰各三分

【用法】上为细末。吹喉。

【主治】阳证喉痹，六脉洪数。

28085 加味肥儿丸

【方源】《袖珍小儿》卷五。

【组成】胡黄连一两 史君子(去壳，浸，去皮) 三棱(煨) 木香 莪术(煨) 香附子 青皮(炒) 陈皮 麦芽(炒) 神曲各一两(炒) 槟榔 川黄连 芦荟各五钱

【用法】上为末，以神曲、麦芽糊为丸，如绿豆大。每服三四十丸，空心米饮送下。

【主治】诸疳身黄，肚急痞块，泄泻，瘦弱。

【加减】无热，去胡黄连；泄泻，加人参、肉豆蔻、茯苓。

28086 加味肥儿丸

《全国中药成药处方集》(承德方)。为原书同卷“肥儿丸”之异名。见该条。

28087 加味泻心汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】黄连五分 犀角五分 蒲黄一钱 天冬二钱 丹参二钱 元参一钱五分 连翘

二钱 茯苓二钱 甘草五分 淡竹叶二十张
灯心三尺

【主治】心火炽盛，五中烦躁，面红目赤，口燥唇裂，甚则衄血吐血。

28088 加味泻白散

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】桑白皮 地骨皮 桔梗 知母 陈皮各一钱二分 黄芩 青皮各一钱 甘草四分

【用法】用水二钟，煎八分，食后温服。

【主治】感热喘嗽，口干烦热，胸满有痰。

28089 加味泻白散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】桑白皮 地骨皮 桔梗 杏仁 防风 黄芩 瓜蒌仁 知母 薄荷 枳壳 橘红 甘草

【主治】外感风邪，伤肺腋痛。

【加减】口渴加石膏、花粉、竹叶。

28090 加味泻白散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】桑白皮 地骨皮 甘草 黄芩 柴胡 钩藤 苏梗 桔梗 山梔

【主治】恼怒伤肝，木火刑金，内伤腋痛。

28091 加味泻白散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】桑白皮 地骨皮 甘草 防风 荆芥 桔梗

【主治】伤风咳嗽，脉浮数，自汗身热。

28092 加味泻白散

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】桑根皮（姜汁和蜜炙） 地骨皮各一两 甘草（炙）五钱 橘红 桔梗

【用法】上为散。每服四五钱，入梗米一百粒，竹叶一把，水煎服。

【主治】肺热咳，手足心热。

【宜忌】如有邪邪禁用。

【加减】有热，更加知母、黄芩。

【备考】方中橘红、桔梗用量原缺。

28093 加味泻白散

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】桑皮（蜜炙） 地骨皮 甘草（生） 川贝母（去心，研） 麦冬（去心） 知母（生） 桔梗 黄芩 薄荷

【用法】水煎服。

【主治】火嗽，面赤咽干燥，痰黄气秽带粘稠，便软。

28094 加味泻白散

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】桑白皮 地骨皮 白茯苓 知母 黄芩 人参 甘草

【用法】糯米一百粒为引，水煎，食后服。

【主治】小儿麻症，肺炎喘嗽。

【备考】原书治上症，以本方去人参、甘草。

28095 加味泻白散

【方源】《外科证治全书》卷二。

【组成】桑白皮（生） 地骨皮各三钱 生甘草八分 桔梗 辛夷各二钱 黄芩 陈皮 木通各一钱五分（一方加山梔仁（生研）一钱）

【用法】水煎，食远服。

【主治】鼻痔。生鼻孔内，如肉赘下垂，色紫微硬，撑塞鼻孔，气息不通，香臭莫辨，或臭不可近，痛不可摇。

28096 加味泻白散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】炙桑皮 骨皮 竹叶 荆芥 力子 甘草 元参 薄荷 木通 赤芍 连翘

【主治】麻疹，眼现红赤不开。

28097 加味泻白散

【方源】《马培之医案》。

【组成】桑白皮二钱 苏梗一钱 川贝母一钱 橘红一钱 甘草三分 瓜蒌皮三钱 杏仁二钱 地骨皮一钱半 茯苓二钱 雪梨三片

【主治】鸡胸，气粗身热。

28098 加味泻肝汤

【方源】《外科经验方》。

【组成】龙胆草（酒拌炒） 当归梢 车前子（炒） 泽泻 生地黄 芍药（炒） 黄连（炒） 黄柏（酒拌炒） 知母（酒拌

炒) 防风各一钱 甘草梢五分

【用法】上作一剂。水二钟,煎八分,食前服。外敷乌金散。

【主治】肝经湿热不利,阴囊肿痛,或溃烂皮脱,睾丸悬挂,或便毒及下疳肿痛,或溃烂者。

28099 加味泻黄散

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】防风一钱 葛根二钱 石膏四钱 石斛三钱 山梔一钱五分 茯苓三钱 甘草四分

【用法】用荷叶一角,梗米一撮,煎汤代水。

【主治】脾有伏火,口燥唇干,烦渴易饥,热在肌肉。

28100 加味泽兰汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】泽兰 丹参各三钱 当归 酒芍各二钱 甘草五分 五灵脂 蒲黄 通草各二钱

【用法】水煎,温服。

【功用】活血逐瘀。

【主治】单纯血瘀之月经过少,经来色紫,少腹时痛,硬而有块,按之痛甚,苔薄黄,脉两尺沉涩。

28101 加味泽泻汤

【方源】《医略六书》卷二十四。

【组成】泽泻一钱半 枳壳一钱半(炒) 黑丑二钱 槟榔一钱半 赤芍一钱半 木通一钱半 赤苓三钱 猪苓一钱半 陈皮一钱半

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】脚气上攻,脉沉者。

【方论选录】湿热内滞,气化不得流通,而脚气上攻,故两胫红肿疼痛不止焉。泽泻泻膀胱之湿,猪苓利三焦之湿,黑丑荡涤积水之湿,槟榔疏导结滞之气,赤苓渗脾胃之湿兼利营气,枳壳破肠胃之气能宽胸膈,木通降火利水,赤芍破血退肿,陈皮理气和中也。使湿热并化则水府肃清,而血气通利,两胫

红肿无不退,脚气疼痛无不痊矣。此导气泻湿之剂,为脚气肿痛上攻之专方。

28102 加味治中汤

【方源】《济生》卷五。

【组成】干姜(炮) 白术 青皮(去白) 陈皮(去白) 缩砂仁各一两 人参(去芦) 甘草(炙)各半两

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盏半,加生姜五片,枣子一枚,煎至七分,去滓温服,不拘时候。或兼进感应丸。

【主治】脾胃不足,饮食不节,过食生冷,肠鸣腹痛,泄泻注下。

28103 加味治中汤

【方源】《得效》卷四。

【组成】人参 白术 干姜 青皮 陈皮各一两 藿香 半夏各五钱 甘草三钱

【用法】上锉散。加生姜三片,红枣一枚,水煎服。

【主治】体虚感冒雨湿,呕吐。

28104 加味治中汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】人参一钱半 白术(陈土炒)二钱半 白芍药(醋炒)一钱五分 甘草(炙)一钱 青皮(去瓤,麸炒)七分 陈皮(去白)一钱 干姜(炒黑)一钱 苍术(麸炒)一钱半 升麻五分 柴胡五分 防风五分 白茯苓一钱

【用法】加生姜三片,加大枣二枚,水二钟,煎一钟,食前服。

【主治】春月肝木乘脾,腹痛久泻不止。

【加减】久泻虚寒,加熟附一钱。

28105 加味治中汤

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】青皮(炒)三钱 诃子五钱 干姜(炒) 白术(土炒) 茯苓各五钱 人参 砂仁各三钱 半夏二钱 甘草一钱

【用法】上作六服。加生姜五片,水煎服。

【主治】疮疡溃后,泄泻不止。

28106 加味治中汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】陈皮 枳实 青皮 厚朴各一钱 白术八分 甘草五分 苍术一钱五分 干姜五分 草果 砂仁各一钱二分

【主治】挟食伤寒，头痛身亦痛。

【加减】热甚，去白术，加柴胡；呕吐，加姜汁炒半夏；胸中饱闷，去甘草、白术，加枳实；腹痛甚者，加芍药、大黄，去干姜、白术。

28107 加味宝华散

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【异名】雷击散。

【组成】广藿香六钱 苏荷叶四钱 香白芷三钱 黄郁金六钱 荆芥穗四钱 降香屑四钱 鲜贯众(去泥)六钱 青防风六钱 牙皂荚三钱 姜醋煮半夏六钱 明雄黄三钱 北细辛三钱 枯明矾四钱 紫苏叶四钱 广陈皮六钱

【用法】上药生晒，共研细末。每服一钱，生姜汤送下。小儿减半。

【主治】清浊相干，阴阳逆乱，上吐下泻，肚腹绞痛，转筋。

【宜忌】孕妇忌服。

28108 加味定风珠

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】生石膏一两 生白芍六钱 生牡蛎四钱 生地六钱 贡胶三钱 麻仁三钱 生龟版四钱 生龙骨四钱 西滑石五钱 甘草三钱 生鸡子黄三个

【用法】水煎，冲鸡子黄服。

【主治】辘轳转关症。二目不赤不疼，不肿不痒，眼球流转不定，亦不自觉。

28109 加味定志丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十。

【组成】远志二两 人参一两 菖蒲二两 白茯苓三两 琥珀 郁金

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，米汤送下。

【主治】痰迷心膈，惊悸怔忡。

【备考】方中琥珀、郁金，用量原缺。

28110 加味定志丸

【方源】《医学六要》卷七。

【组成】远志一两 人参一两 白茯苓三两 菖蒲二两 琥珀 天花粉 郁金各一两 贝母 瓜蒌

【用法】上为末，姜汁、竹沥为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服二钱。

【主治】肥人痰迷心膈，寻常怔忡。

【加减】火盛者，加炒黄连一两。

28111 加味定志丸

【方源】《古今医鉴》卷八引陈白野方。

【组成】当归身(酒洗) 川芎 白芍药 生地黄(酒洗，切)各二两 人参六钱 石菖蒲二两 远志(甘草水泡，去骨，姜汁炒)三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，临卧白汤送下。

【主治】健忘。

28112 加味定志丸

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】人参二两 白术一两 白茯苓一两五钱 菖蒲七钱 远志五钱 茯神一两 牛黄一钱 麦冬一两

【用法】上咬咀，共为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三五十丸，食后白汤送下。

【主治】心气不足，恍惚多忘。

28113 加味定志丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】人参三两 白茯苓(去皮木)二两 远志(甘草水泡，去心) 石菖蒲各二两 酸枣仁(炒)二两 柏子仁(炒，去壳)二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂、乳香为衣。每服五十丸，临卧枣汤送下。

【功用】安神定志。

【主治】心气不足，恍惚多忘，或劳心胆冷，夜卧不睡。

28114 加味定志丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】大远志(甘草汤泡,去骨) 石菖蒲各二两 人参四两 茯苓三两 黄耆(蜜炙)四两 肉桂一两

【用法】炼蜜为丸,如梧桐子大。每服百丸,空心米汤、温酒任下。

【主治】目能近视,不能远视。

28115 加味建中汤

【方源】《直指》卷九。

【组成】白术 黄耆各一钱(蜜炙) 白芍药二钱 肉桂(去粗皮)一钱 甘草七分 当归(酒洗)一钱

【用法】上咬咀。用水一盏半,加炒浮小麦一撮,煎八分,去滓,入饴少许,再煎温服。

【主治】诸虚自汗。

28116 加味建中汤

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】小黄耆建中汤加当归 琥珀 木香

【用法】水煎服。

【主治】女人虚败腹痛。

28117 加味建中汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十。

【组成】桂心半两 白芍一两 炙甘草二钱半 吴茱萸 当归 延胡 丹皮各五钱

【用法】每服五钱,加生姜、大枣,水煎,食前服。

【主治】血海受寒,小腹作痛。

28118 加味建中汤

【方源】《证治汇补》卷六。

【组成】桂枝 白芍 甘草 柴胡 木瓜 饴糖 生姜 大枣

【用法】水煎去滓,入饴二匙服。

【主治】寒湿霍乱转筋。

28119 加味建中汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】白术(炒) 白芍(炒) 扁豆(炒) 黄耆 陈皮 甘草 白茯苓 丹皮 枣仁 沙参

【用法】大枣一枚为引。

【主治】小儿病后,面黄肌瘦,夜出盗汗。

28120 加味建中汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】桂枝 白芍 党参 黄耆 当归 炙甘草 生姜 大枣

【用法】水煎服。

【主治】虚黄,面色萎黄,精神怠倦,小便清白。

【方论选录】本方为建中补血之剂。以仲景桂枝汤调中和营,参、耆、当归补血,而用于血虚发黄之良方。以药理论,本方所用党参,经现代研究有优良之补血作用,故可用于溶血性贫血性黄疸。

28121 加味降气汤

【方源】《医林绳墨大全》卷八。

【组成】当归 川芎 木香 三棱 莪术 桔梗 黄芩 甘草

【用法】水煎服。

【主治】喉痹失音。

28122 加味参术汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参 天花粉 生地各五钱 白术 麦冬各一两

【用法】水煎服。

【主治】脏躁,无故自悲,涕泣不止。

28123 加味参术汤

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】人参一两 白术五钱 甘草一钱 肉桂一钱 白扁豆三钱

【用法】水煎服。

【主治】娠妇气虚而又犯寒,畏寒腹痛,将欲堕胎者。

28124 加味参麦饮

【方源】《疫疹一得》卷下。

【组成】人参五分 麦冬三钱 五味子八分 通草八分 石菖蒲一钱 川连五分 甘草三分 白芍一钱 灯心三尺

【主治】疫疹愈后,多言。

28125 加味参麦散

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】人参 麦冬 归身 生地 炙草

石菖蒲各一钱 五味子十二粒

【用法】猪心一个，劈开，水二盏，煮至一盞半，去心，入药煎七分，食后服。

【主治】产后去血太多，心血虚弱，舌萎缩卷短，语言不清，含糊塞滞，及怔忡。

28126 加味参苏饮

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】人参 紫苏 柴胡 陈皮 甘草 枳壳 前胡 白芷 半夏 桔梗 干葛 茯苓 青皮

【用法】加生姜、葱，水煎服。

【主治】寻常外感并痧疹前后。

【加减】本方用参，亦当量情，病者体虚冒寒则用，余症去之；肺热咽不利者，加黄芩；起发痘疹者，加升麻；痰盛者，加南星、竹沥；壮热者，加黄芩；风盛似欲发搐者，加防风、天麻；项背拘急，加羌活；头痛加川芎、细辛；鼻塞加细辛、白芷；初嗽加麻黄、杏仁；痰壅热盛加桑皮、葶苈；久嗽加杏仁、五味、贝母；肺虚唇白而嗽，不能接气者，加人参、阿胶、糯米；初时感冒，欲令取汗发散者，加麻黄、苍术；春冬感冒风寒而甚者，倍加羌活；风寒已经发散，惟热不愈者，另用小柴胡汤，除去本方。

28127 加味参苏饮

【方源】《赤水玄珠》卷二十一。

【组成】参苏饮加五味子 杏仁

【主治】妊娠咳嗽，项背强急，鼻塞头眩，时发寒热。

28128 加味参苏饮

【方源】《痘疹传心录》卷十九。

【组成】人参二分 苏叶七分 前胡一钱 小川芎七分 山楂肉八分 桔梗五分 白茯苓八分(去皮) 白粉葛八分 陈皮七分 半夏三分 牛蒡子五分(揀净，炒香，研碎) 甘草二分(生，去皮)

【用法】生姜三片同煎，热服。取微汗。

【主治】痘疹初起发热，体气虚羸者；亦治伤感。

【备考】人参或无亦可，倘元气虚必要。

28129 加味参苏饮

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】人参二钱 苏子二钱 沉香五分 桑皮三钱 萎皮三钱 橘红一钱 半夏一钱 丹参二钱 柏子仁二钱 苡仁五钱 生姜二片

【主治】悲伤。悲则气逆，腋都不舒，积久伤肺，清肃之令不能下行。

28130 加味参苏散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】附子一两半(炮) 人参一两半 苏木一两半

【用法】上为散。水煎，去滓温服。

【主治】产后虚寒夹瘀，吐血，脉细涩者。

【方论选录】产后气阳两虚，瘀血滞逆膈间，上出于口，谓之虚寒夹瘀吐血焉。附子补火扶阳，炮黑可以吸血归原；苏木破瘀通经，生用力更峻于利血；人参扶元补气以统血归经也。为散水煎，使气阳内充则瘀血自化，而好血无不归经，何虚寒瘀逆吐血之不痊哉？

28131 加味参附汤

【方源】《妇人良方》卷八。

【异名】加减参附汤(《校法妇人良方》卷八)。

【组成】大附子二两半(炮) 大人参一两

【用法】上咬咀。每服四钱，水二盞，加生姜十片，丁香十五粒，米一撮，煎至七分，空心温服。

【主治】①《妇人良方》：妇人滞下，脏腑虚冷，四肢逆冷，六脉沉绝。②《校注妇人良方》：寒痢阳气脱陷，呕吐不食，手足俱冷。

28132 加味参苏饮

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参 茯苓各五钱 半夏三钱 天花粉三钱 甘草一钱 竹沥二合 附子一片

【用法】水煎服。

【主治】痰积上焦，哭笑无常。

28133 加味参耆汤

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】黄耆一两 人参五钱 荆芥三钱 当归五钱 天花粉三钱 附子三分 生甘草一钱 牛膝三钱 金银花一两

【用法】水煎服。

【主治】脚腿生疽，或忽然肿起一块不痛者；并治各疮。

28134 加味参耆汤

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】黄耆一两 人参五钱 荆芥三钱 当归五钱 天花粉三钱 附子三分 牛膝三钱 金银花一两 白芍药五钱 白术五钱

【用法】水煎服。

【主治】陈肝疮（即蚤疽），生于左右臂上，三五处如疔毒肿痛，痛不可忍，擦挨难忍。

28135 加味参夏汤

【方源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】人参 半夏各一两半 肉桂一两 甘草（炙）五钱 乳香三钱

【用法】每服五钱，加生姜五片，水煎服。

【主治】七情相干，眩晕欲倒；又治七情之气郁于心腹，不可忍，脉沉迟者。

28136 加味参橘饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】人参一钱 白术二钱 砂仁三分 厚朴一钱 橘红四分 当归一钱 香附五分 甘草三分 生姜三片 竹茹一丸（一方加夏曲八分）

【功用】顺气理血，豁痰导水。

【主治】妊妇一二月，恶阻呕逆，烦闷嗜卧。

【备考】若无力服参，去之亦可。

28137 加味参橘饮

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参一钱 归身（酒洗） 白术（土炒）各二钱 半夏八分（制） 橘红 藿香 炙草各四分 砂仁三分（碎） 竹茹一团

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】孕成两三月后，恶阻呕逆恶食，或头眩晕倦怠者。

【加减】肥人，加竹沥一盞，姜汁一匙。

28138 加味承气汤

【方源】《正体类要》卷下。

【组成】大黄 朴消各二钱 枳实一钱 厚朴一钱 甘草五分 当归 红花各一钱

【用法】酒、水各一钟，煎至一钟服。

【主治】瘀血内停，胸腹胀痛，或大便不通。

【加减】量虚实加减，病急不用甘草。

28139 加味承气汤

【方源】《济阳纲目》卷七十三。

【组成】大黄 朴消各二钱 枳实 厚朴 当归 官桂各一钱 甘草五分

【用法】上锉一剂，水、酒各一钟煎服。

【主治】因事伤损，或酒后涉水，血凝腹痛。

【加减】量虚实加减，病急者甘草不用。

28140 加味承气汤

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】大黄 厚朴 枳实 羌活 防风 当归 生地 朴消各一钱

【用法】水煎，空心服。

【主治】跌打损伤，瘀血在内者。

28141 加味春雪膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】黄连四两（洗净，用童便二升，浸一宿，去渣用汁，淬芦甘石汁尽，留石为用） 方芦甘石十二两 好黄丹六两（水飞） 乌鱼骨（烧存性） 乳香 当归各三钱 白丁香半钱 麝香 轻粉各少许 硃砂一钱（研细，水调盞内，放汤瓶中，候干为度）

【用法】上各为末，另裹起，用白砂蜜二十两，炼去蜡，下芦甘石末，不住手搅，次下黄丹及诸药末，不住手搅，至紫色不粘手为度，搓作铤子。每用一粒，新汲水少许化开，时时点之。

【主治】风热上攻眼目，昏暗痒痛，癰湿难开，多泪疼痛，或生翳膜。

【宜忌】忌酒、湿面、猪肉、荞麦。

【备考】①本方方名，《玉机微义》引作“春雪膏”，《张氏医通》引作“绛雪膏”。②方中礞砂，《张氏医通》作“礞砂”。

28142 加味枳术丸

《医学正传》卷四。为《松崖医径》卷下“秘传加味枳术丸”之异名。见该条。

28143 加味枳术丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】白术四两 枳实(面炒)二两 人参 陈皮(去白)各二两 甘草一两五钱 当归(酒洗)三两 白芍药三两 香附米(童便浸) 黄连(姜汁炒)各二两 葛根一两五钱

【用法】上为细末，神曲糊丸，如梧桐子大。每服一百丸，半饥半饱时沸汤送下。

【主治】脾胃病。

28144 加味枳术丸

《医统》卷二十三。即《直指》卷六“家秘加味枳术丸”。见该条。

28145 加味枳术丸

【方源】《赤水玄珠》卷十三。

【组成】白术(米泔浸)四两 枳实(去白，麸炒)二两 陈皮 半夏(泡) 神曲(炒) 麦芽(炒) 山楂肉各一两半

【用法】上为末，荷叶饭为丸。每服五六十丸。

【主治】伤食。

【加减】如胃寒或冬月，加砂仁一两；气滞不行，加木香五钱；常有痰火，又兼胸膈痞闷，加黄连(姜汁炒)、茯苓各一两。

28146 加味枳术丸

【方源】《准绳·伤寒》卷七。

【组成】枳实(炒) 神曲(炒) 大麦蘖(炒) 棠球子 陈皮各一两 人参 白术各二两

【用法】上为末，荷叶烧饭和丸，如梧桐子大。每服七八十丸，白汤送下。

【功用】进饮食，强胃气。

【主治】病后胃弱，食少。

【加减】如夏有热，加姜炒黄连七钱；如冬月天寒，加砂仁一两；如气郁不舒畅，加香附一两；如痰多，加橘红一两，去陈皮，更加半夏曲一两。

28147 加味枳术丸

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】白术一两半(炒) 枳实一两半 半夏一两半(制) 神曲三两 苍术一两半(炒) 卜子三两(炒) 草薢一两半(炒) 黄连六钱 葛花一两半 泽泻一两半

【用法】上为末，用白螺蛳壳三两，煅研，另煎浓汁泛丸。每服三钱，空心焦楂汤调化温服。

【功用】健脾消积。

【主治】痰积、食积、酒积、茶积腹痛，脉沉数滑者。

【方论选录】痰积而食不化，酒停而茶不行，故肉食从之，遂成诸积而腹痛不已焉。苍术、半夏燥湿消痰，白术、枳实健脾化积，神曲消食化滞，卜子消痰消食，草薢温中散寒滞，黄连清热燥伏湿，葛花升清阳以解酒，泽泻泻浊阴以利窍也。丸以白螺之善消积块，汤以焦楂之善化肉癖，使诸积皆消，则脾胃调和，而经府廓清，安有腹痛不止之患乎？此健脾消积之剂，乃治诸积腹痛之专方。

28148 加味枳术丸

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】归尾三两 白术一两半(炒) 枳实一两半(炒) 蒲黄三两 灵脂三两 没药三两 肉桂一两半(去皮) 泽泻一两半 陈皮一两半

【用法】上为末，粥为丸。每服三钱，米饮送下。

【主治】产后血瘀腹胀，脉涩滞者。

【方论选录】产后脾气有伤，不能输化于中，而瘀血滞于肝脾，遂成腹胀焉。白术健脾气以运化，枳实破滞气以宽中，归尾破血活血，蒲黄破瘀散血，五灵脂破瘀降浊阴，明没药散瘀行血滞，紫肉桂温经通闭，建泽泻

泻湿利水，陈皮利气以和中也。粥丸饮下，使脾气健运，则瘀血自化，而经府清和，安有腹胀之患乎？

28149 加味枳实汤

【方源】《普济方》卷一九二引《直指》。

【组成】枳壳(制) 白术 紫苏茎叶 辣桂 陈皮(去白) 槟榔 桔梗 木香 五灵脂(炒)各一分 半夏(制) 茯苓 甘草

【用法】上锉。每服三钱，加生姜四片，水煎服。

【主治】气为痰饮所膈，心下坚胀，此属气分。

【备考】①半夏以后三味用量原缺。②《丹溪心法》本方五灵脂以上诸药用各二分，半夏、茯苓、甘草各一分半。

28150 加味枳实汤

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】白术二钱 枳实 陈皮 麦芽 山楂 茯苓 神曲 连翘各一钱 茵陈 荷叶各一钱五分 泽泻五分

【用法】水煎服。

【主治】谷疸，胸膈满闷，噎腐吞酸。

【加减】如兼伤酒，加葛根一钱；若便闭，去白术，加卜子、黄芩。

【方论选录】《证因方论集要》：白术除胃中湿热；枳实消胃中停滞；荷叶取之以升发胃中生气，此东垣原法也。佐以麦芽、山楂、神曲，大和中焦；茯苓、陈皮以和脾土；连翘、茵陈以散湿热；泽泻功专利湿行水。此治谷疸者。

28151 加味枳壳汤

【方源】《广嗣纪要》。

【组成】枳壳半两 黄芩一两 白术一两(一加黄连、黄柏各二钱(炒)，生甘草，青竹茹)

【用法】水煎服，三钱一剂。

【主治】胎动不安。因恣食酒面、炙博厚味、及误服辛燥毒药，以致邪火熏蒸者。

28152 加味枳壳汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】白术(蜜炙) 熟地黄各一钱 生地 黄 枳壳(麸炒) 黄芩(炒)各五分

【用法】水煎服。

【主治】胎漏，劳役下虚者。

【加减】未效，加当归一钱。

28153 加味胡麻散

【方源】《济阳纲目》卷八十四。

【组成】胡麻一两二钱 苦参 荆芥穗 何首乌(不见铁)各八钱 威灵仙 防风 石菖蒲 牛蒡子(炒) 甘菊花 蔓荆子 白蒺藜 甘草(炒)各六钱

【用法】上为末。每服三钱，酒调服。

【主治】风热瘾疹，瘙痒，或兼赤晕，寒热，形病俱实者。

28154 加味荆芥散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】炒荆芥 桃仁 五灵脂 荠菜各三钱

【用法】水煎，温服，不拘时候。

【功用】化瘀祛风。

【主治】产后血晕，血瘀又感风邪，头晕且痛，时或昏闷，微有寒热，无汗，腹痛拒按，少腹硬痛，心下满急，神昏口噤，舌略带青，苔薄白，脉浮缓而涩。

28155 加味荆黄汤

《医学入门》卷七。为《得效》卷十六“消毒饮”之异名。见该条。

28156 加味草金丹

【方源】《便览》卷三。

【组成】天门冬(酒浸，去心)二两 巴戟(去心)二两 远志(甘草水煮，去心)二两 当归(酒浸) 白茯苓(去皮，水澄去浮，晒) 泽泻(去毛) 生地黄(沉水者，酒浸) 熟地(肥者，酒浸，姜制) 人参(去芦) 车前子(炒) 覆盆子(去核，酒浸，晒) 牛膝(去苗，酒浸) 山药(肥大，焙) 赤石脂(火煅) 肉苁蓉(酒浸，去甲) 真川椒(去目，炒) 甘州枸杞子

柏子仁(焙) 白术(去梗,炒) 石菖蒲(去毛) 地骨皮(去心) 五味子(去梗) 菟丝子(酒煮) 杜仲(姜炒) 各一两

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三四十九丸,淡盐汤送下。

【功用】补益。

【主治】诸虚百损。

【宜忌】忌三白、烧酒。

28157 加味茵陈汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】茵陈二钱 木通一钱五分 赤苓三钱 泽泻一钱五分 苡仁一两 茅术一钱 厚朴一钱 青皮一钱 薄荷一钱 车前二钱 青荷梗一尺

【主治】脾经受湿,胃经受热,郁蒸发黄。

28158 加味茯苓汤

【方源】《得效》卷九。

【组成】人参(去芦) 半夏(汤洗) 陈皮(去白) 各一两半 白茯苓(去皮) 一两 粉草五钱 益智仁(去壳) 香附子(炒去毛) 各一两

【用法】上锉散。每服四钱,水一盞半,加生姜三片,乌梅半个,同煎,温服,不拘时候。

【主治】痰迷心胞,健忘失事,言语如痴。

28159 加味茯苓汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】苍术二钱 白术三钱 茯苓一钱 甘草(炙)五分 猪苓八分 泽泻一钱 升麻五分 肉桂七分 柴胡六分 黄芩一钱 生草五分 川归一钱 白芍七分

【用法】上咬咀。水二钟,煎一钟,温服。

【功用】补中健脾,疏利湿热。

【主治】水泄注下,日夜无度,小便短少,口渴咽干,腹中疼痛或变成赤白痢疾。

【方论选录】此证中气不充,脾湿壅遏。法当补中健脾,疏壅湿热。故用苍术、白术、茯苓、甘草等补中健脾;猪苓、泽泻利小便,分消水湿;升麻升阳气上行,兼助柴胡、黄芩清热;生草泄火;下多则亡阴,故佐归、芍

以助阴血。

28160 加味茯苓饮

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】茯苓 人参 苍术 橘皮 生姜 枳实

【用法】水煎,兼服滚痰丸。

【主治】胃中有留饮,而自吐宿水,小便不利;及由咳嗽而白膜发血斑,以及小儿百日咳。

28161 加味茯神散

【方源】《证治宝鉴》卷二。

【组成】沙参 黄连 人参 甘草 菖蒲 茯神 远志羚羊角 赤小豆

【主治】妄言妄见妄闻挟热者。

28162 加味茯苓汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】茯苓三钱 菟丝四钱 杜仲三钱 破故纸一钱半 当归二钱 贝母二钱 橘红一钱 半夏一钱 杏仁三钱 白术一钱

【用法】核桃肉二枚过口。

【主治】肾咳不已,则膀胱受之,膀胱咳状,咳而遗溺,膀胱为津液之腑,咳则气不能禁而遗溺。

28163 加味茶汤方

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】山药 莲肉(去心) 芡实 菱米 茯苓 酥油 白扁豆(炒) 薏苡仁各四两(炒) 江米二升(炒) 小黄米三升 人参(量人虚实加之) 白糖 白蜜各八两

【用法】上为细末,将酥油、糖、蜜熔化入药末同炒,待凉,盛于瓷罐内。每服五钱,滚水调匀,不拘时任意服之。

【主治】老年男妇劳病日久,胃气短少,不能进饮食者。

28164 加味茶调散

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】荆芥穗 薄荷 黄芩 青茶叶 石膏(生) 白芷 川芎

【用法】引用生姜,水煎服。

【主治】胃热头痛,鼻干目痛,齿颊疼痛。

【加减】便秘者，加川大黄。

28165 加味赴筵散

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】良姜 草乌（去黑皮） 荆芥穗 细辛 乳香（另研） 香白芷 真川椒（去目） 僵蚕 猪牙皂角（去弦）各等分

【用法】上为末。每用少许，擦于患处，上下牙咬定。有涎吐出，不得吞咽，良久其痛即减。

【主治】牙痛。

28166 加味威喜丸

【方源】《宋氏女科》。

【组成】白茯苓（去皮）四两（切碎，同猪苓二两煮半日，去猪苓） 牡蛎二两 黄蜡二两

【用法】上将黄蜡熔化，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心清汤送下。

【主治】带下，白浊。

28167 加味贯金汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】大黄 白芷 僵蚕 川山甲 贝母

【用法】用水二钟，煎一钟，食远服。

【主治】阳疮毒，腹痛如锥，手不可近，六脉洪数者。

28168 加味胃苓丸

【方源】《保命歌括》卷五。

【组成】苍术（制） 厚朴（姜制） 陈皮 白术 猪苓 泽泻 香附（酒浸，炒） 神曲（炒） 白茯苓各等分 炙甘草减半

【用法】上为末，荷叶煮梗米糊丸，米饮送下。

【功用】导饮消食。

28169 加味胃苓丸

【方源】《温热暑疫全书》卷三。

【组成】苍术五两 陈皮三两 厚朴二两 甘草二两（炙） 白术四两 茯苓二两 肉桂二两 猪苓二两 泽泻二两（去毛） 人参一两（去芦） 黄连一两（姜汁炒） 白芍二两（炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服五六十丸，清米汤送下。

【主治】暑病。

28170 加味胃苓汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】陈皮 茯苓 白术 白芍各一钱 藿香 人参 厚朴 山楂 泽泻 半夏各五分 甘草 猪苓各三分 香附（女人加）一钱

【用法】加生姜三片，灯心二十根，水二钟，煎八分，食前服。

【主治】脾胃受伤，胸膈不宽，两肋膨胀，小水不利，面目四肢浮肿者。

28171 加味复元丹

【方源】《保命歌括》卷二十六。

【组成】附子（炮） 桂心各五钱 白茯苓 巴戟（去心） 白术 萆薢 山药 破故纸（炒） 砂仁 泽泻 茴香（炒） 肉苁蓉（酒浸，去甲、心，焙）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，米饮送下。

【主治】脾肾俱虚，发为水肿。

28172 加味香归饮

【方源】《女科万金方》。

【组成】橘红 白芍 当归 川芎 白茯苓 熟地 柴胡 甘草 人参 黄耆 枳壳 香附 陈皮 砂仁

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】经事不通，寒热，小腹有块，胸饱。

28173 加味香苏饮

【方源】《玉案》卷二。

【组成】川芎 紫苏 羌活 防风 苍术 香附 甘草 荆芥 白芷各三钱 葛根 前胡各一钱

【用法】加葱头十枚，生姜三片，水煎服。以被覆取汗为度。

【主治】伤风，风邪客于腠理，洒淅恶寒，喷嚏呵欠，头疼发热，类于伤寒，但见风寒即怕，亦不太甚者。

28174 加味香苏饮

【方源】《内科摘录》卷一。

【组成】苏叶一钱半 陈皮 香附各一钱二分 防风 荆芥 蔓荆子各一钱 川芎甘草各七分 生姜三片

【用法】水一钟半煎服。覆似汗。

【主治】时邪感冒，伤风伤寒，发热，头痛项强，鼻塞声重。

28175 加味香苏散

【方源】《准绳·伤寒》卷二引《拔粹》。

【组成】香附三两 紫苏梗二两 陈皮一两 甘草半两

【用法】上锉散。每服四钱，水一盞半，煎一盞，加生姜三片，连根葱白二茎，同煎热服。

【功用】解表。

【加减】头痛，加川芎、白芷；头痛如斧劈，加石膏、连须葱头；偏正头风；加细辛、石膏、薄荷；太阳穴痛，加荆芥穗、石膏；伤风自汗，加桂枝；伤寒无汗，加麻黄（去节）、干姜；伤风恶寒，加苍术；伤风咳嗽不止，加半夏、杏仁（去皮尖）；伤风胸膈痞塞，加制枳壳；伤风发热不退，加柴胡、黄芩；伤风鼻塞声重，咽隔不和，加苦梗、旋覆花；伤风痰涎壅盛，加白附子、天南星；伤风鼻内出血，加茅花；伤风气促不安，加大腹皮、桑白皮；伤风鼻塞不通、头昏，加羌活、荆芥；伤风不散，吐血不时，加生地黄；伤风不解，耳内出脓疼痛，加羌活、荆芥；伤风不解，咽喉肿痛，加苦梗；伤风中脘寒，不思饮食，加去白青皮、枳壳；伤风呕吐，恶心不止，加丁香、半夏；伤风头晕眼花颠倒，支持不住，加熟附子；伤风时作寒慄，加桂枝；伤风痰壅，呕恶不止。加白附子、旋覆花、半夏；伤风后，时时作虚热不退，加人参；伤风饮食不能消化，加缩砂仁、青皮；伤风一向不解，作潮热，白日至日中不退，日日如是，加地骨皮、柴胡、人参、菴藟；初感风头痛作热，鼻塞声重，加羌活、川芎；感风腰疼，不能伸屈，加官桂、桃仁；感风浑身痛不止，加赤

芍药、紫金皮；感风颈项强急，不能转头，加羌活、官桂；腹肚疼痛，加木香；腹肚疼痛不可忍，加姜黄、茺萸七粒；小腹疼痛无时，不可忍，加木香、姜、枣；妇人忽然大便秘结，不能下地，加木香、木瓜、茺萸；妇人被气所苦，胸膈痞塞，胁肋刺痛，小便急疼，加木香、枳壳；妇女被气疼所苦，加木香、缩砂仁；脾胃不和，中脘不快，加谷芽、神曲；伤食吐呕，泄泻腹痛，加干姜、木香；心卒痛者，加延胡索酒一盞；饮酒太过，忽遍身发痘，或两目昏黄，加山茵陈、山梔子；中酒吐恶，加乌梅、丁香；妇人经水将行，先作寒热，加苏木、红花；妇人产后作虚热不退，烦渴，加人参、地黄；产后发热不退，加人参、黄耆，产后腰疼不已，加当归、官桂；冷嗽不已，加干姜、五味子、杏仁；脾寒，加良姜、青皮、草果；脚气，加木香、木瓜、牛膝、紫金皮、茺萸、川楝子；感风寒发热头疼，加不换金正气散；感寒头痛，壮热恶寒，身痛不能转动，加生料五积散；饮食不下，欲吐不吐，加丁香、萝卜子；感寒头痛，发热身疼，分阴阳，加败毒、石膏；妇人产后风，脚手疼痛，生料五积散、人参败毒散加木瓜、不换金正气散加生地黄、川芎。

28176 加味香苏散

【方源】《普济方》卷七十四引《德生堂方》。

【组成】紫苏 香附子 陈皮 甘草 桑白皮 生地黄 苏木 蝉蜕 黄芩各二两

【用法】上咬咀。每服五钱，水一钟半，灯草二十茎，同煎八分，去滓热服，不拘时候。

【主治】时行赤眼，暴发赤肿，怕日羞明，疼痛难忍。

28177 加味香苏散

【方源】《奇效良方》卷三十九。

【组成】香苏散加鸢尾藤 木香 芍药

【主治】腿脚疼，足面赤肿，步履艰辛。

28178 加味香苏散

【方源】《保命歌括》卷十六。

【组成】苍术 香附 陈皮 川楝肉各二钱 甘草五分 苏叶一钱半

【用法】上作一服。酒、水各一盞，加连须葱白五根，煎服。

【主治】小肠气，肾核胀痛。

28179 加味香苏散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】川芎 紫苏 防风 荆芥 香附 甘草 羌活 白芷各三钱 葛根 前胡各一钱 苍术 天麻 黄芩各八分

【用法】加葱头十个，生姜三片，水煎服。以被覆取汗为度。

【主治】伤风，头疼身热，鼻塞气粗，喷嚏呵欠，呻吟不绝，见风便怕，洒淅微寒。

28180 加味香苏散

《医部全录》卷二〇九。为《直指》卷二十三“橘皮汤”之异名。见该条。

28181 加味香苏散

【方源】《医学心悟》卷二。

【组成】紫苏叶一钱五分 陈皮 香附各一钱二分 甘草(炙)七分 荆芥 秦艽 防风 蔓荆子各一钱 川芎五分 生姜三片

【用法】上锉一剂。水煎，温服。微覆似汗。

【主治】四时感冒，寒热头痛，咳嗽。

【加减】若头脑痛甚者，加羌活八分，葱白二根；自汗恶风者，加桂枝、白芍各一钱；若在春、夏之交，唯恐夹杂温暑之邪，不使用桂，加白术一钱五分；若兼停食，胸膈痞闷，加山楂、麦芽、卜子各一钱五分；若太阳本症未罢，更兼口渴溺湿者，此为膀胱腑症，加茯苓、木通各一钱五分；喘嗽，加桔梗、前胡各一钱五分，杏仁七枚；鼻衄或吐血，去生姜，加生地、赤芍、丹参、丹皮各一钱五分；咽喉肿痛，加桔梗、莠子各一钱五分，薄荷五分；便秘，加卜子、枳壳；若兼四肢厥冷，口鼻气冷，是兼中寒也，加干姜、肉桂之类，虽有表症，其散药只用一二味，不必尽方；若挟暑气，加入知母、黄芩之类；干呕发热而咳，为表有水气，加半夏、茯苓各

一钱五分；时行疫痢，加苍术四分；梅核气症，咽中如有物，吞之不入、吐之不出者，加桔梗、苏梗各八分；妇人经水适来，加当归、丹参；产后受风寒，加黑姜、当归，其散剂减去大半；若体质极虚，不任发散者，更用补中兼散之法。

28182 加味香苏散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】香附一两半 苏叶一两半 藿香三两 陈皮半两 甘草六钱 砂仁一两(炒)

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】孕妇感冒，吐泻，脉浮者。

【加减】转筋，加木瓜；胎动，加白术；挟热，加黄连、白术；挟寒，加白术、炮姜。

【方论选录】妊娠先伤于暑，复感于风，风暑合邪，肝胃受病，故吐泻不已，胎因不安焉。香附调气解郁，苏叶理血疏风，藿香快胃祛暑，陈皮利气和中，砂仁醒脾安胎气，甘草缓中和胃气也。为散水煎，使风暑并解，则肝胃调和而吐泻无不止，胎孕无不安矣。

28183 加味香连丸

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】黄连二两(一半姜汁炒，一半芒消水炒) 木香 大黄(酒蒸九次) 青皮(炒) 枳壳(炒) 黄芩(炒)各一两 白芍二两(酒炒) 甘草五钱

【用法】姜汁、神曲糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心服。赤痢用苦茶，白痢用姜汤送下。

【主治】赤白痢。

28184 加味香连丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】黄连(炒)十两 大黄四两(酒蒸) 木香二两 槟榔一两

【用法】上为细末，陈面糊为丸，如绿豆大。每服七十丸，空心米汤送下。

【主治】痢疾。

28185 加味香连丸

【方源】《医统》卷三十六引《祁门》。

【组成】黄连四十两（去毛净，十两锉如豆大，用吴茱萸五两泡去苦水，煎汤二碗，泡黄连同茱萸，干去萸，用连炒赤色。又以十两用好酒炒赤色。又以十两醋炒赤色。又以十两童便炒赤色） 广木香十两（锉） 石莲肉五两 肉豆蔻二两五钱（面包煨）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，空心以饮汤送下。

【主治】冷热不调，下痢赤白，脓血相杂，里急后重。

28186 加味香连丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】黄连四两（用吴茱萸水炒过） 木香一两 阿芙蓉二钱

【用法】上为末，陈米糊为丸，如绿豆大。每服二三十丸。急将莲肉煎汤送下。被盖取睡。

【主治】便泄不收，诸方不效，临危者。

28187 加味香连丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】黄连二两（炒） 吴茱萸（滚水泡，炒）二两 木香一钱 白豆蔻（带壳，面裹火煨）一钱五分（秘方加乳香、没药各一钱）

【用法】上为细末，用乌梅二两，滚水泡，去核，捣和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白痢，干姜汤送下；血痢，甘草汤送下；赤白相兼，二味泡汤送下；白泻，米汤送下。

【主治】诸痢。

28188 加味香连丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】大川黄连四两（酒炒） 广木香五钱 真沉香五钱（同上忌火） 吴茱萸八钱（水泡，炒） 肉豆蔻五钱（面包煨）

【用法】上为末，荷叶汤法为丸。每服大人二钱，小儿一钱，空心米饮汤送下。

【主治】一切新久痢疾。

28189 加味香连丸

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】香连丸加莲肉粉一半

【用法】为丸服。

【主治】产后痢疾。

28190 加味香连丸

【方源】《胎产要诀》卷下。

【组成】黄连五两（切片，用吴茱萸七钱，水二钟，煎汁一钟，浸黄连，炒燥用） 厚朴（姜制）六钱 陈皮六钱 木香一两 甘草四钱

【用法】上药各为末，米醋糊为丸，米饮送下。如患腹痛后重，先服两次，复将合成之末分二两，加生大黄六钱，研末，醋糊为丸，服之痢减即止。

【主治】产后痢疾，赤白脓血，里急后重，腹痛。

28191 加味香连丸

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】黄连十两（吴茱萸、酒炒） 木香（不见火）二两 槟榔二两 枳壳一两 陈皮一两

【用法】上为末，醋糊为丸服。

【主治】痢疾。

28192 加味香连丸

【方源】《北京市中药成方选集》

【组成】黄连六两 木香四两 槟榔二两 枳壳（炒）四两 吴茱萸（炙）二两 黄芩四两 厚朴（炙）四两 黄柏二两 白芍四两 玄胡（炙）二两 当归二两 甘草一两

【用法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸。每服二钱，日服二次，温开水送下。

【功用】祛湿散寒，导滞化痢。

【主治】过食生冷，湿热凝结，腹痛下坠，红白痢疾。

28193 加味香连汤

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】白芍 黄芩各二钱 黄连 陈皮各一钱 茯苓六分 木香五分 黄柏八分 乳香 没药各一分半

【用法】酒煎服。

【主治】孕妇痢疾。

28194 加味香连散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】白术四两(米泔汤拌炒) 黄芩三两 黄连一两(土炒) 砂仁二两五钱 厚朴三两(炒) 薄荷二两 白茯苓三两 白芍三两(酒炒) 木香二两 陈皮二两 甘草二两 山楂肉四两 红花一两 扁豆三两(炒) 柴胡二两 车前子三两 当归三两(隔纸烘干另磨,或晒干)

【用法】上为极细末。男妇大人每服二钱或三钱,三五岁者,每服一钱或二钱,乳孩每服五六分。一切痢疾,俱用白滚汤化下;水泻用生姜汤化下。此方药味平和,须宜多服,以愈为度。

【主治】痢疾初起,毒气深重,米谷汤水不能进,而成噤口者;并治一切红白痢疾。

28195 加味香附丸

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】香附一斤(四两老酒浸两宿,炒,捣碎,再焙干,磨为末;四两米醋浸同上;四两童便浸同上;四两用山梔四两煎浓汁,去渣,入香附浸同上) 泽兰(净叶)六两(酒洗) 海螵蛸六两(捣稍碎,炒) 当归四两(酒洗) 川芎三两 白芍药四两(酒炒) 怀熟地八两(捣膏,焙干)

【用法】上药各为末,用浮小麦粉酒醋水打糊为丸,如绿豆大。每日早、晚服两次。

【功用】种子

【主治】《张氏医通》:倒经,自汗,胎漏下血。

【宜忌】忌食莱菔及牛肉、生冷。

28196 加味香薷丸

【方源】《年氏集验良方》卷三。

【组成】香薷草四两 白扁豆(炒)二两 广皮二两 粉甘草五钱 宣木瓜二两 白术二两 白茯苓二两 泽泻二两 猪苓二两 藿香二两 滑石一两 川连一两 朱砂一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,重三钱。每服一丸,临用以滚水调化,温服。

【主治】夏月感冒暑气,口渴心烦躁,吐泻发热,霍乱腹痛。

28197 加味香薷饮

【方源】《济生》卷一。

【组成】香薷半斤 扁豆四两 厚朴(姜制炒)六两 槟榔二两 川黄连(去须)三两

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盞,用酒半盞,煎至八分,去滓,沉冷服,不拘时候。

【主治】伏暑伤冷,霍乱转筋,烦渴,心腹撮痛,吐利交作,四肢厥冷;及伏暑成疟,烦闷多渴,微微振寒,寒罢大热,小便黄赤,背寒面垢。

28198 加味香薷饮

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】香薷二钱 厚朴(制) 扁豆(炒) 白术(炒) 白芍药(炒) 陈皮 白茯苓 黄芩各一钱 黄连(姜汁炒) 甘草(炙) 猪苓 泽泻各五分 木瓜七分

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】疟疾。

【加减】口渴实者,加天花粉、葛根、知母;虚者,加五味子、麦门冬、人参。

28199 加味香薷饮

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】香薷 厚朴(炒) 白扁豆 甘草 柴胡 陈皮 川贝母

【用法】水煎服。

【主治】疟疾在盛暑伏天,唇红烦躁作渴,有暑有食者。

28200 加味香薷饮

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】香薷 山楂肉 枳实 猪苓 陈皮 甘草 白扁豆(炒) 厚朴(炒)

【用法】水煎服。

【主治】中暑,兼腹痛,恶心,泄泻,有食者。

28201 加味香薷饮

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】香薷 厚朴 黄连 滑石 甘草

【主治】霍乱饮冷。

28202 加味修肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】羌活 防风 桑螵蛸 梔子 薄荷 当归 赤芍药 甘草 麻黄 连翘 菊花 木贼 白蒺藜 川芎 大黄 黄芩 荆芥各一两

【用法】上为末，等分，水煎，入酒温服。

【主治】肝经热毒入脑，眼生花翳白陷。目中忽然肿痛赤涩，泪出不明，眼中生翳如萝卜花，或鱼鳞子，入陷如碎米者。

28203 加味修肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】梔子 薄荷各三两 羌活一两 当归 大黄 连翘各五钱 黄芩 赤芍药 菊花 木贼 白蒺藜 川芎各一两 麻黄 甘草

【用法】上为末。每服三钱，用酒调下。痛用酒、不痛水煎服。

【主治】患眼生翳，如珠垂帘遮睛者。

28204 加味修肝散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】梔子 薄荷 连翘 麻黄 赤芍药 羌活 当归 大黄 黄芩 菊花 木贼 白蒺藜 川芎 甘草

【用法】上水煎，食后服。

【主治】小儿脾胃实热，或是胎中受毒，或因乳母好食热物，以致眼生翳者。

【宜忌】忌食油腻、煎炒、糖甜果子之类。

28205 加味保元汤

【方源】《回春》卷七。

【组成】黄耆二钱 人参一钱 麦门冬(去心)二钱半 知母一钱半 梔子(炒)一钱半 甘草五分

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】痘疮结痂后虚烦者。

【加减】结痂后有余热者，加牛蒡子一钱半，白附子一钱。

28206 加味保元汤

【方源】《痘科类编释意》卷三。

【组成】人参 黄耆 甘草 归尾 赤芍(酒炒) 红花 黄芩 黄连 连翘 升麻 防风 荆芥 牛蒡子

【用法】水煎，入烧人粪一钱，调服。

【功用】补气活血，解毒散火。

【主治】痘起发时渐渐变黑，已延一身，未至干枯塌陷者。

【方论选录】此方参、耆、甘草补元气，又能泻火；归、芍、红花能活血，又能凉血；芩、连、牛蒡、连翘、升麻以解毒；防风、荆芥以疏表；人粪清热解火。

28207 加味保元汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】人参 黄耆 白术(炒) 白芍(炒) 肉桂 甘草 糯米

【主治】痘疮色白浆清，虚寒甚者。

28208 加味保元汤

【方源】《金鉴》卷五十七。

【组成】人参 猪苓 泽泻 白术(土炒) 黄耆(蜜炙) 赤茯苓 甘草(炙)

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】痘疮水泡，形大皮薄，内含一包清水，手足独密，身面俱少。

28209 加味保元汤

【方源】《金鉴》卷五十七。

【组成】人参 黄耆(蜜炙) 甘草(炙) 全当归(酒洗) 白芍(酒炒) 木香(煨) 白术(土炒) 官桂

【用法】引用老米，水煎服。

【主治】小儿气血两虚，痘疮倒陷，紫色清稀不足，根脚淡白无晕，遍体形如豆壳，疮皮皱而似结非结，至收靥时终不成痂。

28210 加味保元汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】人参 黄耆(炙) 甘草(炙) 当归(酒洗) 白芍药(炒) 麦冬(去心) 枣仁(炒，研)

【用法】水煎服。

【主治】痘症气虚，养浆时，顶平清稀而烦躁。

28211 加味保元汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】人参 黄耆(蜜炙) 浮小麦 甘草(炙) 广桂枝 白芍(炒)

【用法】水煎服。

【主治】痘疮起胀后，阳虚汗出，大汗不止。

28212 加味保元汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】人参 黄耆 肉桂 杏仁 五味炙草

【主治】气虚作喘。

28213 加味保和丸

【方源】《保命歌括》卷五。

【组成】山楂 神曲(炒) 半夏(洗) 茯苓各三两 白术五两 香附(酒浸) 厚朴(姜汁炒) 萝卜子(炒) 陈皮 连翘各二两 苍术(制炒) 枳实(麸炒) 净黄连(酒炒) 黄芩(酒炒) 各二两

【用法】上为细末，姜汁煮蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后白汤送下。

【功用】消痰利气，扶脾胃，进饮食。

28214 加味保和丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】保和丸三钱，加姜汁浸炒黄连三钱，山楂肉三钱。

【用法】上为末，米糊为丸，如麻子大。每服六十丸，煎人参、竹沥汤送下。

【主治】实热翻胃。

28215 加味保和丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】白术(去芦，炒)五两 枳实(麸炒)一两 陈皮(去白)三两 半夏(泡，姜炒)二两 白茯苓(去皮)三两 苍术(米泔浸，炒)一两 川厚朴(姜炒)二两 香附(酒炒)一两 神曲(炒)三两 连翘二两 黄连(酒炒)一两 黄芩(酒炒)一两 山楂肉三两 麦芽(炒)一两 萝卜子二两 木香五钱 三棱(醋炒)一两 莪术(醋

炒)一两

【用法】上为细末，姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至七八十丸。食后白滚汤送下。

【功用】消痰利气，扶脾助胃，开胸快膈，消痞除胀，清热消食。

【主治】虚弱之人，腹内积聚癖块，胀满疼痛，面黄肌瘦，肚大青筋，不思饮食。

28216 加味保和丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】白术一两五钱(土炒) 神曲一两五钱 萝卜子一两五钱(炒) 广皮一两五钱 连翘一两五钱 半夏一两五钱(炙) 香附一两五钱(炙) 茯苓一两五钱 黄芩一两五钱 黄连五钱 山楂一两(炒) 厚朴一两(炙) 枳实一两(炒) 麦芽一两(炒)

【用法】上为细末，水法为丸，如绿豆大。每服三钱，白开水送下。

【功用】和血补血，消补兼施，消多于补。

【主治】食积、酒积、痰饮、除胸膈痞满，嗳气吞酸，腹痛便溏。

【方论选录】本方为朱丹溪保和丸加枳实、香附、厚朴、黄芩而成。或谓保和丸原方麦芽伤肾，萝卜子伤脾胃之气，故主张以枳实、香附易之，不伤先后天之真气。

28217 加味信枣丹

《全国中药成药处方集》(武汉方)。为原书同卷“枣信丹”之异名。见该条。

28218 加味顺气散

【方源】《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》。

【组成】天台乌药五两 桔梗(去芦，炒) 川白芷 川芎 甘草(炙) 陈皮(去白) 白术(无油者)各二两半 麻黄(去根节)一两半 枳壳(去瓢，锉，麸炒令黄)一两半 天南星(炮制) 大腹皮(洗净) 川乌头(生，去皮脐)各一两 干姜(炮)七钱半 人参(去芦) 木香(不见火)各半两

【用法】上咬咀。每服四钱匕，加生姜五片、大枣一个，水一盞半，同煎至八分，去滓，吞下白丸子。

【主治】男子妇人，气脉不顺，虚风攻注，痰涎壅滞，头目昏眩，肌肤不遂，手足缓弱，心忡气短，行步不正。

28219 加味顺气散

【方源】《普济方》卷一〇五。

【组成】南星 枳壳 防风 川芎 僵蚕 全蝎 木香少许 白术 白茯苓(去皮) 当归 青皮(去白) 蓬术 陈皮(去白) 天台乌药 人参少许 甘草 白芍药各等分

【用法】上咬咀。加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】风气。

28220 加味独圣散

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】穿山甲一两(酒洗净，和砂仁、陈皮微炒黄色，去砂仁、陈皮 白芍药一两(酒浆煮，焙) 红曲八钱 升麻一两 蟾酥五钱 笋嫩尖一两

【用法】上为末。每用二分，酒浆调服。

【主治】毒盛而经络壅塞，痘不易出。

28221 加味胜金丸

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】常山四钱(酒煮，焙) 苍术二钱 槟榔二钱 草果二钱

【用法】酒煮糊丸，未发前晚服五十丸，至五更再服七十丸，均用酒送下。得吐或利即止。

【功用】截疟。

28222 加味胜湿汤

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】羌活 独活 藁本 防风 蔓荆子 川芎 苍术(泔浸，炒) 黄柏(酒炒) 荆芥 甘草(炙)

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】项颈强痛。

【加减】发热恶寒有外邪者，加麻黄、桂枝；

腰痛沉沉者，加熟附，防己；虚极者，去黄柏，加人参。

28223 加味洞下丸

【方源】《医统》卷四十三引《集成》

【组成】橘红半斤(食盐一两，微以水拌炒) 南星(制) 半夏(制) 黄芩 黄连 甘草各一两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】上焦有热，咳嗽生痰。

28224 加味活命饮

【方源】《痧书》卷下。

【异名】加味活命散(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】穿山甲(土炒) 银花 大黄各三钱 归尾 陈皮各一钱半 花粉 赤芍 生地 薄荷 防风 白芷 贝母 甘草节 乳香各一钱 没药(净) 角刺各五分(以上三味后下) (一方无大黄、生地、薄荷)

【用法】加水入大瓦瓶封口煎，温服，侧睡。一方好酒煎。

【主治】痧后留滞热毒，发为痈肿、发背、疔疽。

【宜忌】忌铁器、酸味、诸毒物。

【加减】毒在背，加角刺一钱半；在腹，加白芷；在胸，加薤仁二钱；在头面手足，加银花五钱。

28225 加味活命散

《杂病源流犀烛》卷二十一。为《痧书》卷下“加味活命饮”之异名。见该条。

28226 加味济川煎

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】熟地 油归各五钱 川芎 苁蓉各三钱 牛膝二钱 泽泻一钱半 枳壳一钱 升麻七分

【主治】产后便秘。

28227 加味济生汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】当归 川芎 枳壳 香附 大腹皮 乌药 车前 牛膝 冬葵子

【主治】难产，因胎前安逸，喜坐贪睡，致临产而气滞血涩者。

28228 加味将军汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】犀牛角二钱 羚羊角二钱 真锦纹川军四两

【用法】水煎，温服。早晨空心服药，俟其大泻后，至晚不可与食。其人不能饮烧酒者，用烧酒四两，香油二两，能饮二两者，用烧酒六两，香油三两，折杨枝百根，皆六寸许，将油、酒对一处，用杨枝搅之，每根搅五六下，搅完将油、酒火上微温，令病人以羹匙饮之，饮尽为度。病者既一日不食，饮完此酒，必大醉思睡，任其睡去，不可惊动。饮此酒有呕者，有不呕者，其形不一，及其睡醒，再与粥或淡汤食之，其病若失。如觉有不爽之处，可取鸠尾、中脘针之，留五小时乃出针，针后服清镇丹一剂。

【主治】狂病或登高而歌，或弃衣而走，或妄言妄言，或打人骂人者。

28229 加味养元粉

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】条参 茯苓 莲米 山药 芡实 各一两 山楂五钱 花椒一钱

【用法】加糯米一升，炒黄研末，白糖调服。

【主治】脾胃虚弱。

28230 加味养心汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】茯苓 茯神 黄耆 半夏 归身 川芎各二钱半 炙甘草二钱 柏子仁 远志 肉桂 人参 五味子 枣仁各一钱二分 生姜 大枣

【用法】水煎，加羚羊角、犀角，俱磨冲服。

【主治】不寐，心肺有火，方卧即大声鼾睡，少顷即醒者。

28231 加味养心汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】天冬一钱五分 麦冬一钱五分 生地五钱 人参一钱 丹参二钱 龟版五钱

当归一钱五分 茯神二钱 柏子仁二钱 枣仁一钱半 远志五分 甘草四分 淡竹叶二十张

【主治】心血大亏，心阳鼓动，舌绛无津，烦躁不寐。

28232 加味养生方

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】牛膝 枸杞 生地 杜仲 菊花 萸肉 白芍各二两 五加皮 桑寄生各四两 龙眼肉八两 木瓜 归身各一两 桂枝三钱

【用法】火酒三十斤，浸七日服。

【主治】手足麻木疼痛。

28233 加味养血汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】黄耆 当归 丹皮 扁豆(炒) 木瓜 苡仁 白芍(炒) 白茯苓 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【功用】补脾生血。

【主治】痘后人虚。

28234 加味养血汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】黄耆 当归 白芍(炒) 白茯苓 沙参 苡仁 百合 甘草 白术(炒) 麦冬

【用法】莲米五枚(去皮心)为引，水煎服。

【主治】童子癆。咳嗽吐痰，面青唇白，骨蒸发热。

28235 加味养血汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】黄耆 白术(炒) 白芍(炒) 丹皮(炒) 柴胡 陈皮 甘草 当归

【用法】水煎服。兼服健脾丸。

【主治】潮热而唇白，神倦怠者，乃体虚也。

28236 加味养荣丸

【方源】《摄生众妙方》卷十一。

【组成】当归(酒浸)二两 芍药(煨)一两五钱 熟地黄(酒浸)二两 白术二两 川芎一两五钱 茯苓一两 人参一两 甘草(炙)五钱 黄芩(炒)一两五钱 香附

(炒)一两五钱 麦门冬(去心)一两 阿胶(炒)七钱 贝母一两 陈皮(去白)一两 黑豆(大者,炒,去皮)四十九粒

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,食前空心盐汤、温酒任下。

【主治】①《摄生众妙方》:女人不孕。②《医学入门》:经脉参前,外潮内烦,咳嗽,饮食减少,头晕目眩,带下,血风血气,久无嗣息,一切痰火不受峻补,又治胎前胎动胎漏。

【宜忌】忌食诸血。

28237 加味养荣丸

【方源】《疮疡经验全书》卷十三。

【组成】当归三两 熟地一两半 白芍丹皮各一两半 香附四两 人参 贝母 阿胶 山药 茯苓 黄芩 川芎各一两 白术一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每日早、晚服八九十丸,淡盐汤送下。

【主治】妇人病愈后,气血衰少,发热咳嗽。

28238 加味养荣丸

【方源】《疡医大全》卷二十六。

【组成】当归身(酒洗,焙)三两 白茯神(人乳蒸)二两 肥玉竹(焙)二两 杭白芍(酒炒)二两 酸枣仁(炒熟)二两 丹参(酒炒)二两 远志肉(甘草汤焙)二两 柏子仁二两 川续断(酒炒)二两 橘红(饭上蒸)一两 杜仲(盐水炒)二两 秦艽(酒炒)一两五钱 女贞实(蜜拌蒸)二两 钩藤钩四两(同石斛蒸) 郁金二两

【用法】上为细末,用金钗石斛一斤,同钩藤四两,熬膏,煮和丸,如豌豆大。每早服三钱,白汤送下。

【功用】调经养血。

【主治】妇人脚气,心虚血少,肝脾不足,怔忡心悸。

28239 加味养脏汤

【方源】《得效》卷六。

【组成】养脏汤加炮附子 青皮 乌药 茯苓各五钱

【用法】加生姜三片,红枣二枚,水煎服。

【主治】休息痢。因伤酒肉炙博,发为痢疾,休作无时。

28240 加味宣风散

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】鸡心槟榔三个 橘皮 桃仁(浸,去皮,焙) 白芷 枳壳(制)各半两 牵牛二两(半炒半生)

【用法】上为末。每服二钱,食前蜜汤调下。

【功用】通利肾脏风气。

【主治】耳病。

28241 加味宣风散

【方源】《直指小儿》卷五。

【组成】宣风散加青皮一分

【用法】每服一钱,蜜汤调下。先下黑粪,次下褐粪,然后以和胃药加陈米与之,良久粪黄,疮自微出;又以竹园胡荽煎酒,敷其身,即得发起。

【主治】肾证疮痘变黑。

【加减】气怯者,外加南木香一钱。

28242 加味姜附汤

【方源】《得效》卷四。

【组成】附子(炮) 干姜 人参各一两 甘草五钱

【用法】上锉散。每服四钱,水二盏,煎至一盏,空心服。

【主治】吐泻过多,手足逆冷,气少不语,六脉沉伏。

【加减】腹痛,加官桂;小便不利,加茯苓,每料各五钱。

28243 加味姜附汤

【方源】《普济方》卷三十六。

【组成】大附子一个(一两以上者,匀炮分四破;生姜一斤,取自然汁于铉内慢煮附子至干,去脐,焙) 丁香 胡椒各五钱 木香 毕澄茄各二钱 沉香三钱 甘草(炙)三钱 干饴糟半斤(生姜五两同捣烂,做饼子,焙干)

【用法】上为末。每服二钱,空心用烧盐少

许，米汤点服。

【主治】远年近日反胃呕吐，全不进饮食。

28244 加味姜附汤

《寿世保元》卷三。为《伤寒微旨论》卷下“茵陈四逆汤”之异名。见该条。

28245 加味祛风散

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】黄柏 细辛 黄连 大黄 山梔 薄荷 甘草 麻黄 连翘 荆芥 白术 滑石 川芎 羌活 独活 天麻 熟地 桔梗 黄芩 石膏 芍药 防风各等分

【用法】加生姜，水煎，临服加好酒二小杯。十贴后服天仙换骨丹。

【主治】珍珠风。初起时形如小鳖棋子，遍身疙瘩，久而不治，遍身作痒。

28246 加味神功丸

【方源】《普济方》卷四十三引《余居士选奇方》。

【异名】神功丸（原书卷三十七）。

【组成】木香一两 人参二两（去芦头）大麻仁二两（别研如膏） 枳实 桃仁各二两 诃黎勒皮四两 大黄（锦文者）四两（面裹煨，去面）

【用法】上为细末。入麻仁捣研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧以温水送下，或温米饮下皆可。如大便不通，可加丸数，以利为度。

【主治】三焦气壅，心腹痞闷，六府风热，大便不通，腰腿疼痛，肩背沉重，头昏面热，口苦咽干，心胸烦躁，睡卧不安；及治脚气，并素有风人，大便秘结。

28247 加味神术汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】白术一钱 茅术一钱 当归一钱五分 茯苓二钱 苡仁四钱 厚朴一钱 砂仁一钱 半夏曲三钱（炒） 佩兰叶一钱 川牛膝一钱五分 荷叶一角 生姜二片

【主治】伤湿，四肢倦怠，食少胸痞。

28248 加味神应丸

《陈紫庵妇科补解》卷三。为原书同卷

“安胎神应丸”之异名。见该条。

28249 加味神柞散

《梅氏验方新编》卷四。即《石室秘录》卷四“夺门丹”。见该条。

28250 加味神香散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】砂仁 白蔻 枳实 丁香

【用法】上为末。每服一二钱，生姜汤送下。

【功用】散无形积聚。

28251 加味除湿丸

【方源】《医方类聚》卷九十八引《经验秘方》。

【组成】石斛 牛膝（酒浸，焙干） 当归（酒浸，焙干） 肉苁蓉（酒浸，焙干） 威灵仙 苦苣莠（炒香，另研） 黄耆 川续断 苍术（米泔水浸） 陈皮（去白） 乌药（嫩者） 茯神（去木）各二两（同木瓜两个，用竹刀切片，去瓤，晒干，酒浸三日） 石楠叶 南星（炮） 防风（去芦须） 薏苡仁 川草薢 槟榔 杏仁（去皮尖，麸炒）各一两半 牵牛（头末）一两（炒） 乳香二两（另研） 木香二两 沉香一两（同木香另研）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒、盐汤任下。

【主治】脚气。

28252 加味除湿汤

【方源】《得效》卷六。

【组成】半夏曲 厚朴（去粗皮，姜汁制） 苍术（炒）各一两 藿香叶 陈皮（炒） 茯苓各五钱 粉草一钱 官桂 木香各三钱

【用法】上锉散。每服四钱，水一盞半，加生姜三片，红枣二枚，水煎，空心时服。仍以五苓散兼服，利其小便。

【主治】下痢湿证。一身尽痛，重着浮黄，下痢如豆羹汁。

28253 加味珠黄散

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】珠粉七分 西黄五分 琥珀七分 西瓜霜一钱

【用法】上为细末。吹喉部。

【功用】消肿止痛，化毒生肌。

【主治】喉症。

28254 加味桂附汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】白术一两 肉桂 干姜各一钱 附子 甘草各五分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，身热四日，畏寒不已。

28255 加味桂枝汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】桂枝八分 白芍一钱五分 甘草五分 怀牛膝二钱 川牛膝一钱五分 当归二钱 蚕砂四钱 秦艽一钱 防风一钱 红枣五枚 生姜三片

【主治】中络。风入肌表，肌肉不仁，或手指、足趾麻木。

28256 加味桂枝汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】桂枝四钱 白芍二钱 荆芥二钱 防风一钱五分 生甘草一钱 生姜三片 大枣二枚

【主治】春温初起，恶寒发热，右脉浮缓于左，口渴苔滑。

【备考】服药后，微汗至足而解。

28257 加味桔梗汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】桔梗(去芦) 白及 橘红 甜葶苈(微炒)各八分 甘草节 贝母各一钱五分 苡仁 金银花各五钱

【用法】水煎服。

【主治】肺癰。

【加减】初起，加荆芥、防风各一钱；溃后，加人参、黄耆各一钱。

28258 加味真武汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】焦术 茯苓 白芍 小茴 附子 肉桂 炮姜 甘草 生姜 大枣

【主治】当脐腹痛。

28259 加味莲湖丸

【方源】《竹林女科》卷三。

【组成】条芩四两 砂仁(微炒) 炙甘草各一两 白术(蜜炙) 莲子(去皮心)各二两 人参一两

【用法】上为末，山药四两煮糊为丸。白汤送下。有孕时多服。

【主治】盘肠产。

【备考】凡患盘肠产者，恐防再犯，宜于此后未孕之时，多服加味地黄丸，以固下元关键。及有孕时，多服加味莲湖丸以补气，更服三补丸以凉血，直待临月再服加味八珍汤十余剂，庶可免矣。

28260 加味薯桂汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】黄耆三两 肉桂三钱 破故纸二钱 牛膝三钱

【用法】水煎服。服后必有大汗如雨。

【主治】鹤膝风，足胫渐细，足膝渐大，骨中痠痛，身渐瘦弱。

28261 加味柴平汤

《东医宝鉴·杂病篇》卷六。即《回春》卷三“柴胡汤”。见该条。

28262 加味柴陈汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 陈皮 白茯苓 枳壳 桔梗 杏仁 金沸草

【主治】伤风，邪传少阳胆经，耳中气闭，咳嗽口苦。

28263 加味柴苓汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】柴胡 白茯苓 甘草 陈皮 防风 白芍(炒) 当归身 白术(炒)

【用法】生姜一片，红枣一枚为引，水煎服。

【主治】小儿伤风咳嗽，面青唇白，体弱，或兼大便不实者。

28264 加味柴胡汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 当归 川芎 白芍 熟地 香附 玄胡

【主治】肾积居于脐下，按之不移，因于血

者。

28265 加味柴物汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 当归 川芎 白芍 熟地 何首乌 知母 麦冬 乌梅

【功用】截疟。

【主治】三阴疟症。

28266 加味柴胡汤

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 人参 枳壳 大黄 甘草

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎，空心服；哑瘴，食后服。

【主治】温疫挟岚瘴溪源蒸毒之气，血乘上焦，瘀血攻心，毒涎聚胃，病欲来时，令人迷困，甚则发燥狂妄，或哑而不能言者。

28267 加味柴胡汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】人参 半夏 柴胡 黄芩 百合 知母 甘草

【用法】上锉一剂。加青竹茹一团，粳米炒食盐一撮，入姜汁少许，水煎服。

【主治】百合病，百无是处，又非寒又非热，欲食不食，欲行不行，欲坐不坐，服药即吐，小便赤。

28268 加味柴胡汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】柴胡 黄芩 陈皮 甘草 山梔 丹皮

【主治】肝胆之火上冲，呃逆。

28269 加味柴胡汤

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】柴胡 酒芩 荆芥穗 制半夏 甘草 川芎 香白芷 苏薄荷五片 防风 前胡各等分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水二钟，煎至八分，食后服。

【主治】外症兼火，额角板骨及眉棱骨痛。

28270 加味柴胡汤

【方源】《证治汇补》卷六引《良方》。

【组成】柴胡 黄芩各二钱 牡蛎 半夏 枳实 甘草各一钱

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】伤寒少阳证，胁痛。

28271 加味柴胡汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】柴胡 半夏 黄芩 茵陈 豆豉 大黄 黄连 干葛

【主治】酒疸。身目黄，腹如水状，心懊热不食，时欲吐，足胫满，小便黄赤，面赤斑。

28272 加味柴胡汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 甘草 花粉 白芍 麦冬 山梔 大黄

【主治】伤于湿，湿热上壅，阳气不能下通于阴，身热足寒，时头热面赤。

28273 加味柴胡汤

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】小柴胡汤加红花 牡丹皮

【主治】经水将行着寒，适来适断，触经感冒。

28274 加味柴胡汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】柴胡 半夏(制) 黄芩 人参各一钱 牡丹皮 当归各七分 红花 甘草各四分

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】热入血室，血热多滞者。

28275 加味柴胡汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】柴胡 人参各二钱 黄芩 山梔 仁(炒) 生地黄 半夏(姜制)各一钱 甘草五分

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】妊娠肝经怒火而致吐血衄血者。

28276 加味柴胡汤

【方源】《外科真铨》卷下。

【组成】柴胡一钱 半夏五分 黄芩一钱 陈皮三分 白芍二钱 防风五分 荆芥一钱

甘草五分

【用法】水煎服。外用鸡子清和香油调青黛末涂之。

【主治】水激丹，乃足少阳胆经风火所致，初生两胁，虚肿红热，证轻者。

28277 加味柴胡饮

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】柴胡二钱 羌活二钱 葛根二钱 薄荷一钱 浮萍二钱 紫苏二钱 甘草一钱 当归身五钱（炒） 生姜三片

【功用】解表。

【主治】风寒表证头痛，憎寒发热。

28278 加味逍遥丸

《北京市中药成方选集》。即《内科摘要》卷下“加味逍遥散”改为丸剂。见该条。

28279 加味逍遥饮

《审视瑶函》卷五。为《内科摘要》卷下“加味逍遥散”之异名。见该条。

28280 加味逍遥散

【方源】《得效》卷十五。

【组成】逍遥散加远志（去心） 桃仁（去皮尖） 苏木 红花各一钱

【用法】水一盞半煎服。

【主治】癩疾。荣血迷于心包，歌唱无时，逾墙上屋。

28281 加味逍遥散

【方源】《内科摘要》卷下。

【异名】八味逍遥散（《医学入门》卷八）、加味逍遥饮（《审视瑶函》卷五）、丹栀逍遥散（《方剂学》）。

【组成】当归 芍药 茯苓 白术（炒） 柴胡各一钱 牡丹皮 山栀（炒） 甘草（炙）各五分

【用法】水煎服。

【功用】《赵炳南临床经验集》：疏肝清热，解郁和营。

【主治】肝脾血虚，内有郁热，潮热晡热，自汗盗汗，腹胁作痛，头昏目暗，怔忡不宁，颊赤口干；妇人月经不调，发热咳嗽；或阴中作痛，或阴门肿胀；小儿口舌生疮，胸乳

膨胀；外证遍身搔痒，或虚热生疮。

①《内科摘要》：肝脾血虚发热，或潮热晡热，或自汗盗汗，或头痛目涩，或怔忡不宁，或颊赤口干，或月经不调，或肚腹作痛，或小腹重坠，水道涩痛，或肿痛出脓，内热作渴。②《校注妇人良方》：遍身搔痒，或口燥咽干，食少嗜卧，小便涩滞，及瘰癧流注，虚热等疮。③《女科撮要》：妇人初产，阴门肿胀，或焮痛而不闭；血虚火燥，产后大便不通。④《保婴撮要》：小儿肝脾血虚内热，胁腹作痛，头目昏黑，或食少不寐，或口舌生疮，或胸乳膨胀；或女子患前症，经候不调，发热咳嗽，寒热往往来。伤损血虚，内热发热；或肢体作痛，或耳内作痛。乳母肝脾血虚发热；致儿患疮，或儿肝脾有热，致疮不愈。⑤《医学入门》：脾胃血虚有热生痛；或胁乳肿痛，耳下结核。⑥《济阴纲目》妇人温热流注下部，阴内溃烂痒痛。⑦《济阴纲目》：大怒逆气伤肝，肝伤血少目暗。⑧《金鉴》：妇人郁热伤损肝脾，湿热下注而致阴中作痛，痛极往往手足不能伸舒；及风湿血燥而致血风疮证，遍身起痞瘰，如丹毒状，或痒或痛，搔之则成疮。⑨《杂病源流犀烛》：郁证；或血燥肝气虚弱，风寒客于经络，肩臂痛而筋挛，遇寒则剧，脉紧细。⑩《伤科汇纂》：血虚肝燥，骨蒸劳热。⑪《全国中药成药处方集》：肝经郁热过甚，烦热口苦，耳鸣头眩。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：忌气恼、劳碌。

【方论选录】①《医方考》：方中柴胡能升，所以达其逆也；芍药能收，所以损其过也；丹、栀能泻，所以伐其实也；木盛则土衰，白术、甘草，扶其所不胜也；肝伤则血病，当归所以养其血也；木实则火燥，茯苓所以宁其心也。②《成方便读》：本方以丹皮之能入肝胆血分者，以清泄其火邪；黑山栀亦入营分，能引上焦心肺之热，屈曲下行；合于逍遥散中，自能解郁散火，火退则诸病皆愈耳。

【临证举例】①产后阴门不闭 《女科撮要》：一产妇阴门不闭，小便淋漓，腹内一物，攻动胁下，或胀或痛，用加味道遥散加车前子而愈。②咳嗽 《内科摘要》：一妇人因怒吐痰甚多，狂言热炽，胸胁胀痛，手按稍止，脉洪大无伦，按之微细，此属脾肝二经血虚，以加味道遥散加熟地、川芎二剂，脉症顿退，再用十全大补而安。③恶寒发热 《柳选四家医案》：寒热无期，中脘少腹剧痛，此肝脏之郁也，郁极则发为寒热，头不痛，非外感也。以加味道遥散主之。

【备考】①本方改为丸剂，名“加味道遥丸”（见《北京市中药成方选集》）、“丹桅逍遥丸”（见《全国中药成药处方集》南京方）。②《医学心悟》有薄荷。

28282 加味道遥散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】白芍 白术各一钱 白茯苓 麦门冬 生地各六分 甘草 桔梗各二分 地骨皮 当归各八分 山桅仁 黄柏各三分

【用法】水煎，温服。

【主治】①《医学入门》：潮热咳嗽。②《杂病源流犀烛》：外感风寒湿邪，颈项强痛，湿气胜者；瘰癧，肝经火燥而血病，寒热止而核不消。

【加减】虚甚者，加山药、破故纸、枸杞子。

28283 加味道遥散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】当归一钱 白术一钱 茯苓 白芍各八分 柴胡 薄荷 陈皮 知母 贝母 骨皮 麦冬 香附 甘草各三分

【用法】煨生姜为引。

【主治】酒病后发咳，间有骨蒸邪热者。

28284 加味道遥散

【方源】《慈幼心传》卷下。

【组成】当归 甘草 芍药 茯苓 白术 柴胡 丹皮 梔子 漏芦

【用法】水煎，子、母并服。

【主治】乳母情欲郁火或厚味积热传儿，小

儿大便不通。

28285 加味道遥散

【方源】《准绳·女科》卷五。

【组成】当归 白芍药 干葛各二钱 生地 黄 川芎 黄芩各一钱半 人参九分 麦门冬九分 柴胡一钱 乌梅二个 甘草六分

【用法】上锉散，分作二服。用水一钟，煎至七分，空心服。

【主治】产后发热，口干作渴，唇裂生疮。

28286 加味道遥散

【方源】《活幼心法》卷八。

【组成】白术（米泔水浸，炒） 白芍（酒炒） 薄荷叶 白茯苓 当归身 牡丹皮 陈皮 柴胡 麦门冬 甘草 干葛

【用法】水煎服。

【主治】病后瘦弱，唇白气虚，感时气出痧疹者；或体虚瘦弱，痧出白色，少红活者。

28287 加味道遥散

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】白术 茯苓 牡丹皮 白芍 柴胡 陈皮 当归 山桅 贝母 天花粉各八分 甘草 红花 羚羊角各五分

【用法】水二钟，加淡竹叶二十片，煎八分，食后服。

【主治】鬓疽七日以上，根盘深硬，色紫焮痛。

28288 加味道遥散

【方源】《治痘全书》卷十三。

【组成】当归 白芍 茯苓 白术 大枣 柴胡 甘草 丹皮 梔子仁

【用法】上为散服。

【主治】痘疮气血虚，稍稍有火，气血不匀调者。

【方论选录】气虚不和，故用茯苓、白术、甘草；血虚不和，故用当归、芍药；至柴胡，正所以调和半表半里之气血也；血有热，非丹皮不可；气有热，非山桅不可。玩此乃八物汤之变者，非逍遥而何？

28289 加味道遥散

【方源】《济阳纲目》卷四十五。

【组成】当归 芍药(酒炒) 白术 茯苓 甘草(炙) 柴胡各一钱 牡丹皮 山梔子(炒) 钩藤钩各五分

【用法】上咬咀，作一服。加生姜三片，薄荷少许，水煎，食远或临卧服。

【主治】肝火亡血，手足痠痲，及血虚有热，遍身瘙痒。

28290 加味逍遥散

【方源】《一草亭》。

【组成】大当归(酒洗)一钱 白芍药(酒炒)一钱 白茯苓(去皮)一钱 白术(土炒)一钱 北柴胡(炒)一钱 牡丹皮一钱 苏薄荷三分 甘草三分 川黄连三分(用吴茱萸煎汤拌炒)

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】妇人郁怒伤肝，眼目赤涩昏暗，及血虚发热，口干自汗，月经不调，腹痛。

28291 加味逍遥散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】当归 白芍 白术 茯苓 柴胡各一钱 薄荷五分 甘草六分 丹皮七分 香附八分

【用法】水二钟，煎八分，食远温服。

【主治】妇人血虚，五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忡颊赤，口燥咽干，发热盗汗，食少嗜卧；并室女血弱，荣卫不调，痰嗽潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸；及血热相搏，月水不调，寒热如疟，脐腹作痛。

【加减】有热，加黄芩五分，生姜三片，红枣二枚。

28292 加味逍遥散

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】白芍一两 柴胡二钱 当归一两 甘草一钱 陈皮一钱 茯苓三钱 白术五钱 炒梔子一钱 天花粉二钱 枳壳五分 丹皮二钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人因怒发热，肝气横逆，火盛血亏，经来之时，两耳出脓，两太阳作痛，乳

房胀闷，寒热往来，小便不利，脐下满筑。

【方论选录】此方乃平肝之圣药，亦解怒之神剂也。补血而无阻滞之忧，退火而更鲜寒凉之惧。不必治肾，而治肾已包于其中；不必通膀胱，而通膀胱已统乎其内。

28293 加味逍遥散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡二钱 当归二钱 白术一钱 甘草一钱 茯苓三钱 陈皮一钱 白芍三钱 炒梔子一钱 羌活五分

【用法】水煎服。

【主治】春温。春月伤风四五日，身热恶风，头项强，胁下满，手足温，口渴。

28294 加味逍遥散

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡二钱 白芍五钱 当归三钱 白术五分 甘草一钱 茯苓三钱 陈皮五分 肉桂一钱

【用法】水煎服。

【主治】春月伤风，手足逆冷，心下满而烦，饥不能食，脉紧。

【方论选录】逍遥散原是和解肝经之神药，得肉桂则直入肝中，以扫荡其寒风。阳和既回，而大地皆阳春矣，何郁滞之气上阻心而下克脾胃哉！脾胃有升腾之气，草木更为敷荣，断不致有遏抑摧残之势矣。

28295 加味逍遥散

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】柴胡二钱 白术五钱 茯苓三钱 甘草一钱 白芍五钱 陈皮一钱 当归二钱 炒梔子三钱 荆芥一钱 防风五分 龙胆草二钱 天花粉二钱 玄参五钱

【用法】水煎服。

【主治】阴疳。疮生于阴户之内，时痛时痒，往往有不可忍之状，其气腥臊作臭，无物可以解痒，倘愈交接则愈痛。

【备考】内治之后，仍以外治同施。

28296 加味逍遥散

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】当归 白术各二钱 柴胡 白芍各一钱 丹皮 茯苓 梔子各七分 生甘草八分 灯心七茎

【主治】妊娠小便中带血。

28297 加味逍遥散

【方源】《女科指掌》卷一。

【组成】当归 白芍 茯苓 白术 柴胡 香附 甘草 丹皮 山梔 薄荷

【主治】因郁怒伤肝所致白浊白淫，往来寒热，胁痛心烦，面带青，口苦，脉弦，小便数。

28298 加味逍遥散

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】白术(炒) 白芍(炒) 白茯苓 丹皮 石斛 当归 柴胡 薄荷 陈皮 甘草

【用法】水煎服。

【功用】舒和气血，调畅营卫。

【主治】痘之前后，不可补、不可凉、似虚非虚之症。

28299 加味逍遥散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】白术(炒) 白芍(炒) 白茯苓 陈皮 甘草 当归 薄荷 全蝎(洗净) 僵蚕(炒)

【用法】生姜为引。

【主治】小儿一种似慢惊非慢惊之症。

28300 加味逍遥散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】白术八分(炒) 白芍八分(炒) 当归八分 白茯苓八分 柴胡五分 薄荷五分 陈皮六分 白扁豆一钱(炒) 甘草六分 神曲一钱(炒) 麦芽八分(炒)

【用法】水煎服。

【主治】小儿脾疳。因乳食不调，饥饱不一，或一切病后，亏损气血，以致时热时冷，或大便非结即泻，面黄肌瘦，肚大夜热。

【备考】兼服健脾肥儿丸。

28301 加味逍遥散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】白术(炒) 白芍(炒) 薄荷 陈皮 甘草 柴胡 白茯苓 当归 白扁豆(炒) 砂仁 木香 黄芩

【用法】水煎服。

【主治】小儿痢疾体虚，不便行利导滞者。

28302 加味逍遥散

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】白术(炒) 白芍(炒) 白茯苓 陈皮 当归 甘草 薄荷 柴胡

【用法】或加生姜一片，水煎服。

【主治】小儿疳在五七次后，人虽虚而多热，其体势在不可截，不可消，不可补者。

28303 加味逍遥散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】白术(炒) 白芍(炒) 白茯苓 当归 薄荷 柴胡 陈皮 甘草 家芡实 丹皮 白莲须

【用法】水煎服。

【主治】小儿淋症不痛者；或久淋不愈者。

28304 加味逍遥散

【方源】《幼科直言》卷六。

【组成】白芍八分(炒) 白术八分(炒) 陈皮六分 甘草六分 当归八分 白茯苓八分 薄荷六分 黄芩一钱(炒) 僵蚕一钱(炒) 柴胡六分

【用法】水煎服。

【主治】白虎历节风。

28305 加味逍遥散

【方源】《一盘珠》卷五。

【组成】当归 白术 白芍 白芩 柴胡 香附 丹皮 甘草 薄荷 黄芩 夏枯 天葵

【用法】酒、水各半，煎服。

【主治】女子月经不调，而成瘰癧者。

【加减】经闭，加红花、三棱。

28306 加味逍遥散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归 白术各五钱 白芍 茯苓各一钱 麦冬八分 柴胡 砂仁 甘草各五分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】妇女月水不调，发热体倦，头疼口干，脐疼痛。

28307 加味逍遥散

【方源】《医略六书》卷十八。

【组成】软柴胡五分 白芍药一钱半（酒炒） 冬白术一钱半（炒） 当归身二钱 白茯苓二钱（去木） 粉甘草五分 钩藤钩五钱 忍冬藤三钱 山梔 丹皮

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】女子血虚火旺，经闭潮热；男子阴虚木旺，脉弦虚数者。

28308 加味逍遥散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】柴胡六钱（盐水炒） 白芍二两（炒） 白术一两半（制） 当归三两 茯苓一两 炙草四钱 山梔二两（炒） 丹皮一两半 蛤壳三两（生研）

【用法】上为散。白雷丸三钱，煎汤调下三钱。

【主治】阴痒，脉弦虚数。

【方论选录】蛤壳生研，利少阴之湿热；柴胡盐制，解肝胆之虚阳；当归养血荣经；白芍敛阴和血；白术培土制湿；茯苓渗湿和脾；丹皮凉血以清相火；山梔降热以清湿火；炙甘草以缓中和胃也。白雷丸汤调下，取其清热杀虫，使热化虫消则湿亦得泄而津血四布，肝脾无不皆受其荫，岂有湿热下注以成阴痒之病哉！

28309 加味逍遥散

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】白芍 白术各一钱二分 地骨皮 知母 当归各一钱 茯苓 麦冬 生地各八分 山梔 黄柏各五分 桔梗 甘草各三分

【用法】水煎服。

【主治】血病，女子不月；妇人痢证；胁连胸腹胀痛；妇人阴缩，阴户急，痛引入小腹；阴冷而内热寒热，经候不调；妇人便毒，于两拗肿痛，腹内有块，不时上攻，小便不利。

28310 加味逍遥散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】丹皮 白术各一钱半 当归 赤芍 桃仁 贝母各一钱 山梔 黄芩各八分 桔梗七分 青皮五分 甘草三分

【主治】脾家蓄热，痰涎夹血。

28311 加味逍遥散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】甘草 当归 白芍 白术 茯苓 柴胡各一钱 桂皮 山梔各七分

【主治】乳岩初起。

28312 加味逍遥散

【方源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】当归 柴胡 白术 白芍 茯苓 各一钱 炙草五分 薄荷七叶 山梔 生地 白茅根

【主治】初次产育，产门肿胀，或瘀痛不闭。

28313 加味逍遥散

【方源】《妇科玉尺》卷六。

【组成】柴胡 白芍 当归 白术 茯苓 甘草 知母 地骨皮 山梔 黄柏 桔梗 麦冬 生地

【主治】妇女虚劳。

28314 加味逍遥散

【方源】《疡科心得集·方汇》卷上引《大全》。

【组成】柴胡 白芍 当归 茯苓 白术 甘草 黄芩 半夏 白芷 陈皮 桔梗

【主治】肝郁气滞；或口舌生疮；或耳内作痛；或乳痈、乳痰等。

28315 加味逍遥散

【方源】《外科证治全书》卷三。

【组成】柴胡二钱 白芍五钱 当归三钱 陈皮五钱 甘草一钱 白术三钱 茯神三钱 人参一钱 川芎一钱 瓜蒌三钱 半夏三钱

【用法】水煎服。

【主治】乳悬。肝气不舒，痰气郁结，乳内忽大如桃，不觉痛痒，色亦不赤，身体发热，形渐瘦损。

28316 加味逍遥散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 薄荷 连翘 白芍
当归 茯苓 甘草 丹皮 生地

【用法】上为散服。

【功用】清热养血。

【主治】先经后疹。妇人月事后五六日，发热见疹，血室空虚，热邪乘虚入内，重则妄见妄闻，如见鬼祟，昼时了了，夜时谵语，轻则常发夜热，变成疹法。

28317 加味逍遥散

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】银州柴胡一钱 当归二钱 生白芍二钱 白术一钱 茯苓一钱 炙甘草五分 煨姜三片 薄荷一分 霜桑叶二钱

【用法】上为末，分为十服。每服二钱，鲜荷叶半张煎汤冲服。

【功用】疏散风热，升发脾胃清阳，清肝明目。

28318 加味铁落饮

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】生石膏三两 青龙齿 辰茯神 青防风各一两五钱 元参 秦艽各一两 鲜生地四两

【用法】先用铁落八两，长流水一斗，煮取五升，并以上七味加竹沥半升，羚羊五钱，入铁汁中，煮取二升，去滓，和入竹沥。温分五服，一日服尽。

【功效】泄肝阳。

【主治】狂病。忿郁暴怒上逆，狂躁笑哭，面色清皎，大便通调者。

28319 加味铁落饮

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】石膏一两 生地八钱 龙齿五钱 银花五钱 葛花五钱 牡蛎八钱 川连三钱 防风三钱 白云苓四钱 玄参五钱 秦艽三钱 铁落七钱 甘草一钱

【用法】水煎，加竹沥半瓶为引，药水冲服。

【主治】痰火结胸，不能升降清浊，阴阳混乱，关格不通，视力突然消失，脉象寸关滑

数，两尺沉细。

28320 加味秘元煎

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】西党参 白术 茯苓 炙甘草 山药 枣仁 远志 五味子 芡实 金樱子 莲须 阿胶 丹皮

【主治】房事过度，津液亏耗，水不济火，关窍不固，赤白带下。

28321 加味透肌汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】防风 干葛 当归 薄荷 山楂肉 枳壳 柴胡 陈皮 甘草 川贝母 煨石膏

【用法】生姜一片为引。

【主治】小儿疟疾，因暑热盛，作渴作烦，汗不透者。

28322 加味透肌散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】人参 黄耆 白术 芍药 川芎 甘草 茯苓 木通 陈皮 糯米 厚朴 大腹皮各等分

【用法】上为粗散。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿痘疮既出而腹胀者。

28323 加味健脾丸

【方源】《济阳纲目》卷十二。

【组成】人参 白术（焙） 半夏（汤泡） 砂仁各一两 茯苓 青皮（去瓤） 枳实（麸炒） 山楂（去核）各一两半 陈皮（炒） 神曲（炒黄色） 香附子（炒） 麦芽（炒，净末） 厚朴（姜汁炒） 苍术（米泔浸，晒干）各二两 甘草（炙）七钱

【用法】上为末，用荷叶煮陈仓米饭或仓米磨粉煮粥为丸，如绿豆大。每服六七十丸，白米饮送下。

【功用】清热和中。

【主治】痰涎多食，肚腹饱胀。

28324 加味健脾丸

【方源】《济阳纲目》卷十二。

【组成】白术（微炒）五两 陈皮（洗净存白） 半夏（姜汁泡七次）各三两 神曲

(炒) 山楂(蒸去核) 归身(酒洗) 白芍药(炒) 白茯苓各二两 川芎(小者佳) 黄连(姜汁炒) 各一两半 香附(童便浸) 枳实(麸炒) 甘草(炙) 各一两

【用法】上为末，荷叶包老米，慢火上蒸熟捣丸，如赤小豆大。每服八九十丸，食后服。

【功用】健脾。

28325 加味射干汤

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】射干 生地各一钱 桔梗 连翘 黄芩 贝母 元参 甘草各七分 荆芥五分 牛蒡七分

【用法】水煎服。

【主治】喉痹肿痛。

28326 加味脏连丸

【方源】《医便》卷三。

【组成】雄猪脏一副(去两头各七寸) 黄连(去毛，净末)一斤 槐花(净末)四两

【用法】将后二味装入脏内令满，用绳扎两头口上，用小麦数十粒，放甑上蒸三时，以脏黑取看小麦极烂为度，入石臼捣如泥为丸，如绿豆大。每服一百丸，空心薄酒送下。

【主治】饮酒食炙，热毒下坠，为肠风脏毒，痔漏下血。

28327 加味脏连丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】黄连八两 枳壳六两 大麦馅子一升 甘草四两

【用法】上为粗末，装入健猪大肠内，不拘几段，用线扎紧，酒、水同煮极烂，捣成饼，晒干为细末，水叠为丸。每服二钱，白汤送下。

【主治】脏毒。

28328 加味脏连丸

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】川连五两 苦参三两 生川军二两 圆皂角仁 白芷各一两五钱 光桃仁一两

【用法】各为细末，取猪大肠洗净，纳入肠中，酒、水各半，煮烂捣研，和入百草霜一两，红曲三两，共捣为丸。每服三钱，朝、晚空腹用木耳豆腐食盐煎汤送下。

【功效】清涤肠浊。

【主治】脏毒下血，血色如烟尘，沉晦瘀浊，便溏不畅，胃气不健，肢体倦怠者。

【备考】原书用本方治上症，是继芩连二陈汤或清肠解毒汤后用以除根。

28329 加味凉膈散

《点点经》卷三。为原书同卷“救阴泻阳汤”之异名。见该条。

28330 加味凉膈散

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】大黄 朴消 甘草各二两 连翘四两 栀子仁 黄芩 薄荷 柴胡 槟榔各一两

【用法】上锉。每服五钱，水煎服。

【主治】瘴症，迷罔狂妄，哑不能言。

28331 加味凉膈散

【方源】《济阳纲目》卷九十一。

【组成】大黄 朴消 甘草各三钱 连翘滑石各四两 栀子仁 黄芩 薄荷 茯苓各一两

【用法】上为末。每服一两，加竹叶、蜜少许，水煎服。

【主治】淋闭。

28332 加味凉膈散

【方源】《济阳纲目》卷一〇三。

【组成】大黄(酒炒) 黄芩(酒浸) 防风 荆芥 羌活 朴消 甘草各二钱 连翘四钱 栀子仁 薄荷各一钱

【用法】上为末。加竹叶，水煎服。

【主治】风热壅盛，耳肿痛。

28333 加味凉膈散

【方源】《痘科类编释意》卷四。

【组成】连翘 片芩 山栀仁(炒) 枳实(炒) 前胡各五分 大黄(酒炒)一钱 薄荷 甘草各二分

【用法】水一钟，煎五分，三岁以下者，分

二三次服。服之微利一二次，痰热自退，若已通利，不必尽剂。

【主治】小儿急惊风。

28334 加味凉膈散

【方源】《医林绳墨大全》卷八。

【组成】黄连 荆芥 石膏 山栀 连翘 黄芩 防风 枳壳 当归 生地 甘草 桔梗各等分 薄荷 白芷

【用法】细茶为引，水煎服；或为细末，调服亦可。

【主治】实火蕴热积毒，二便闭塞，风痰上壅，将发喉痹，胸膈不利，脉弦而数。

28335 加味凉膈散

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】黄芩一钱 连翘（去心）一钱五分 山栀仁（炒） 薄荷 桔梗各八分 竹叶十片 牛蒡子一钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠口痛，口舌无疮，及咽喉肿痛。

28336 加味凉膈散

【方源】《寒温条辨》卷四。

【组成】白僵蚕（酒炒）三钱 蝉退（全）十二枚 广姜黄七分 黄连二钱 黄芩二钱 栀子二钱 连翘（去心） 薄荷 大黄 芒消各三钱 甘草一钱 竹叶三十片

【用法】水煎去滓，冲芒消，入蜜、酒冷服。

【主治】①《寒温条辨》：大头、瓜瓢等温病危在旦夕。②《羊毛温症论》：温证羊毛，火郁于上，壮热面赤，唇燥舌干，烦躁谵言，胸闷气滞，脉象数实。

【加减】若欲下之，量加消、黄；胸中热，加麦冬；心下痞，加枳实；呕、渴，加石膏；小便赤数，加滑石；满，加枳实、厚朴。

【方论选录】连翘、荷、竹，味薄而升浮，泻火于上；芩、连、栀、姜，味苦而无气，泻火于中；大黄、芒消味厚而咸寒，泻火于下；僵蚕、蝉退以清化之品，除疵疾之气，以解温毒；用甘草者，取其性缓而和中也；加蜜、酒者，取其引上而导下也。

28337 加味凉膈煎

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】风化消一钱 煨甘遂八分 葶苈子一钱半 苏薄荷一钱半 生锦纹一钱（酒洗） 白芥子八分 片黄芩一钱半 焦山栀三钱 青连翘一钱半 小枳实一钱半 鲜竹沥两瓢 生姜汁两滴（同冲）

【功用】下痰通便。

【主治】温热挟痰火壅肺，痰多咳嗽，喉有水鸡声，鼻孔煽张，气出入多热，胸膈痞胀，腹满便秘，甚则喘胀闷乱，胸腹坚如铁石，胀闷欲死。

【方论选录】本方凉膈散为君，以去其火；臣以枳、葶、芥、遂，逐其痰而降其气；佐以竹沥、姜汁辛润通络，庶可转危为安。若畏其峻险而不用，仍以疲药塞责，则百不救一矣。

28338 加味消风散

【方源】《医林绳墨大全》卷八。

【组成】薄荷 玄参 全蝎 升麻 荆芥 紫苏 干葛 赤芍 桔梗 甘草

【用法】水煎服。

【主治】咽喉肿痛，因于呕吐咯伤，或因食恶物及谷芒刺涩，风热与气血相搏者。

28339 加味消毒饮

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医林》。

【异名】加味消毒饮子（《普济方》卷二七八）、驱风解毒散（《古今医鉴》卷九）。

【组成】荆芥 防风 恶实 甘草 连翘 羌活各一钱

【用法】上锉作一贴。水煎服。

【主治】①《东医宝鉴》引《医林》：搭腮肿。②《古今医鉴》：疔腮肿痛。

28340 加味消毒饮

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】鼠粘子一钱半 甘草五分 荆芥七分 紫草一钱 防风六分 糯米一撮

【用法】水煎，不拘时服。

【主治】痘疹血热，咽喉不利。

28341 加味消毒饮

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】荆芥穗 防风 牛蒡子(炒) 升麻 生甘草 赤芍 南山楂 连翘(去心)

【用法】加生姜，水煎服。

【功用】疏风清热。

【主治】痘后余毒未尽，更兼恣意饮食，外感风寒，偏身出疹，色赤作痒，始如粟米，渐成云片。

28342 加味消黄散

【方源】《囊秘喉书》卷上。

【异名】禁药。

【组成】牙消二钱 蒲黄五分 冰片一分五厘 僵蚕一分(制) 牙皂一分二厘(制) 白芷一分

【主治】一切喉症。

【加减】痰甚，加蜒蚰梅。

28343 加味流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】川芎 麻黄 甘草 肉桂 干姜 半夏 茯苓 枳壳 白芷 厚朴 芍药 陈皮 苍术

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】足发背。

28344 加味润下丸

《摄生众妙方》卷六。为《丹溪心法》卷二“润下丸”之异名。见该条。

28345 加味益元散

【方源】《济阳纲目》卷九十一。

【组成】滑石二钱 甘草五分 车前子一钱

【用法】上为末。水调服。

【主治】诸淋。

28346 加味益元散

【方源】《济阳纲目》卷九十一。

【组成】益元散二钱加茴香一钱(微炒黄) 木香 槟榔各二分半

【用法】上为末。水调服。

【主治】气滞，卒淋急痛。

28347 加味益气汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】黄耆 人参各一钱 白术 陈皮 当归各七分 柴胡一钱 升麻三分 黄柏(酒炒)七分 羌活一钱半 防风 甘草各五分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，热服。

【主治】素体怯弱，兼之疲劳，感冒伤寒，头痛发热者。

【加减】冬月，加细辛三分；如热甚，脉滞有力，加黄芩(酒炒)三分。

28348 加味益气汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】黄耆(蜜炒) 人参 白术(去芦) 陈皮 当归各一钱 升麻 柴胡 木香各五分 香附 青皮(去瓢) 川芎各八分 桂枝少许 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】气虚，浑身发麻。

28349 加味益气汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】黄耆(蜜炒)一钱五分 人参一钱 白术(去芦，炒)二钱 陈皮八分 当归一钱 柴胡五分 升麻五分 茵陈四分 苍术(米泔浸，炒)四分 梔子(炒)四分 猪苓四分 赤茯苓一钱 泽泻四分 黄连四分 滑石四分 甘草(炙)四分

【用法】上锉。加生姜，水煎服。以六味地黄丸加苍术、白术、茵陈、黄柏各二两，蜜为丸，相兼而进之。

【主治】五疸，遍身发黄如梔子水染，病延日久，身体黑瘦，四肢沉困，憎寒发热，不思饮食。

28350 加味益气汤

【方源】《济阳纲目》卷八十二。

【组成】黄耆 人参 白术 甘草(炙) 当归 陈皮各一钱 升麻 柴胡 麦门冬(去心) 香附 羌活 防风各五分 木香 乌药(炮)各三分

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】气虚，十指尽麻，并面目皆麻。

28351 加味益气汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参二钱 白术五钱 甘草一钱 茯苓三钱 陈皮五分 半夏一钱 柴胡一钱

【用法】水煎服。

【主治】贪眠乐卧，终日徜徉枕席之上，脾气内伤，遂至风邪袭之，身痛背疼，发热恶风。

28352 加味益气汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】熟地八钱 炙耆五钱 淡附子四钱 归身四钱 白术三钱 菟丝饼三钱 人参不拘 茯苓三钱 升麻七分 川芎一钱五分 净萸肉四钱 肉桂心一钱 煨姜一钱 龙眼肉五个 黑大豆四十九粒

【用法】水煎服。

【主治】产后宗气下陷，脱肛。

28353 加味益气汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 黄耆（蜜炙） 白术（蜜炙） 甘草（炙）各一钱五分 当归二钱 川芎 砂仁 陈皮 酸枣仁（炒）各八分 升麻（炒） 柴胡各三分

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水煎，空心服。

【功用】养气血，固胎元，预防堕胎。

【主治】妇人先经半产，后次有胎，妊娠七月以前。

28354 加味益气汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】人参（无参者，以淮山药三钱代之，或以时下生条参三钱代之） 当归 甘草（炙）各一钱 白术一钱半 陈皮八分 川芎六分 黄耆（蜜炙）二钱 升麻（蜜炒） 柴胡（酒炒）各三分 石菖蒲六分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】劳苦太过，气虚耳聋，或耳鸣眩运，

倦怠。

28355 加味益心汤

【方源】方出《蒲辅周医疗经验》，名见《千家妙方》上册。

【组成】法半夏二钱 茯苓二钱 化橘红一钱半 炙甘草五分 炒枣仁三钱 远志一钱 石菖蒲八分 党参一钱半 枳实八分 松节三钱

【用法】每日一剂，水煎服。

【功用】补益心气，温脾理痰。

【主治】心气不足，兼有脾湿而致心悸（房颤），头晕，冷汗多，便溏，脉右关沉滑，左沉弱，均有结代，舌苔薄白。

28356 加味益母丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】益母草半斤 当归 赤芍 木香各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下；催生，用童便送下；胎前脐腹刺痛，胎动不安，下血不止，米饮或秦艽、当归煎汤送下；胎前产后，脐腹作痛作声，或寒热往来，状如疟疾者，米汤送下；临产并产后，先各用一丸，童便入酒送下；产后胎衣不下，落在胞中及临产一切产难，横生不顺，死胎经日不下，腹中胀满，心闷心痛，炒盐汤送下；产后中风，牙关紧急，半身不遂，失音不语，童便入酒送下；产后气喘咳嗽，胸膈不利，恶心口吐酸水，面目浮肿，两胁疼痛，举动失力者，温酒送下；产后太阳穴痛，呵欠心怔气短，肌体羸瘦，不思饮食，血风身热，手足顽麻，百节疼痛，温米饮送下；产后眼前黑暗，血晕血热，口渴烦闷，如见鬼神，不省人事，薄荷自然汁或薄荷煎汤下，或童便、酒各半送下；产后面垢颜赤，五心烦热，或结血块，脐腹奔痛，时发寒热，有冷汗者，童便入酒或薄荷汤送下；产后恶露结滞，脐腹刺痛，恶物上冲，心胸满闷及产后未经满月，血气不通，咳嗽四肢无力，临睡自汗不止，月水不调，久不治而

为骨蒸，或鼻衄口干舌黑，俱童便入酒送下；产后二便不通，烦躁口苦，薄荷汤送下；产后痢疾，米汤送下；产后漏血，枣汤送下；产后赤白带，胶艾汤送下；血崩漏下，糯米汤送下；勒乳痛，或成痈，为末，水调涂乳上，或生捣敷亦好；妇人久无子，温酒送下。

【功用】定魂魄，调血气，破血痛，养脉息，调经络。

【主治】妇人月水不调，不孕，胎前、难产、产后诸疾。

28357 加味益母丸

【方源】《医学正印》卷下。

【组成】益母草八两 川芎二两 白芍二两 当归二两 熟地二两 广木香二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，好酒或童便送下。

【功用】调经种子。

28358 加味益母散

【方源】《一盘珠》卷七。

【组成】益母草 荆芥（炒黑）各三钱 归尾 红花 丹皮各一钱半 桃仁七粒 山楂（炒黑）三钱 蒲黄 菖蒲 甘草各三分

【主治】产后血晕，恶露不行。

28359 加味益营煎

【方源】《顾氏医经》卷四。

【组成】当归 芍药 山药 枸杞 炙甘草 丹皮 生地 知母 麦冬 西洋参 五味子

【主治】月经不调，形瘦多火，消烁津液，经水衰少。

28360 加味调中汤

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】补中益气汤加神曲 麦芽 木香

【主治】服药过多，胃气薄弱，稍为饮食所压，其头即痛。

28361 加味调中饮

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】陈皮 枳实 青皮 厚朴 干姜 白术 砂仁 苍术 草果 甘草 生姜炒萝卜子一撮

【用法】水煎，温服。

【主治】伤寒夹食停滞，头痛身热，不恶寒，气口脉紧盛。

28362 加味调中饮

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】苍术一钱五分（米泔浸，炒） 厚朴八分（姜汁炒） 陈皮一钱五分 白术一钱五分 山楂二钱 干姜八分（泡） 神曲二钱（炒） 草果一钱 黄连八分（姜汁炒） 甘草八分 枳实一钱

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【主治】①《寿世保元》：食积类伤寒，头疼身热，恶寒，身不痛，气口脉紧盛。②《医学集成》：宿食口渴，胀满，噎气如败卵，脉浮滑。

28363 加味调经丸

【方源】《女科秘要》卷八。

【组成】香附五斤（分五分，一斤用盐水浸，一斤用醋浸，一斤用童便浸，一斤用无灰酒浸，一斤用米泔水浸，每样春三日、夏二日、秋五日、冬十日，仍用原水煎，不犯铁器，晒干，用葱五斤，取白切细，拌香附焙干，以葱白黄香为度） 当归 白芍 生地各四两 青皮一两五钱 黄连 黄芩各三两 川芎 杏仁 柴胡各二两 白芷二两五钱 滑石（水飞净）五两 荆芥五两

【用法】上为末，醋面糊为丸。每服八十丸，空心白汤送下。

【主治】妇人血热，经水先期，气旺痰火者，服本方易孕。

28364 加味调经散

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】肉桂 白芷 川芎 川归 芍药 玄胡索 牡丹皮 蒲黄五钱 细辛 麝香各一两

【用法】上为末。每服二钱，食前白汤调下。

【主治】妇人经候不调；带下。

28365 加味陷胸丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】黄连(姜汁炒) 半夏(姜制) 枳壳 煨消各三钱 轻粉二钱半 滑石(飞净)一两

【用法】炼蜜为丸,如芡实大。大儿五六丸,周岁儿一丸,沸汤调化服。

【主治】痰积痞满,疳热喘嗽。

28366 加味陷胸汤

【方源】《医统》卷二十九引《医林集要》。

【组成】枳壳(麸炒) 桔梗各四钱 半夏(泡) 黄芩 瓜蒌子 黄连各二钱 麦门冬(去心)二钱

【用法】上㕮咀,作二服。每服加生姜五片,水二盏,煎八分,食远服。利下即安。

【主治】热壅痞满,胸膈痛或两胁痛,及疳、利后发热留滞胸膈,或饮酒过度,胸满结痛。

28367 加味桑菊饮

【方源】方出《蒲辅周医疗经验》,名见《千家妙方》下册。

【组成】桑叶一钱 菊花一钱 杏仁一钱 薄荷(后下)七分 桔梗七分 芦根三钱 甘草八分 连翘一钱 僵蚕一钱半 蝉衣(全)七个 葛根一钱 黄芩七分 葱白二寸(后下)

【用法】上作一剂。一剂二煎,共取120毫升,分多次温服。

【功用】宣肺祛风,辛凉透表。

【主治】风热闭肺(腺病毒肺炎)高热,咳嗽,皮疹,惊惕,口腔溃烂,唇干裂,腹微胀满,大便稀,脉浮数有力,舌红少津无苔。

28368 加味通气汤

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】茴香 乌药 当归 芍药 香附 山楂子 陈皮 茯苓 白术 延胡索 吴茱萸 槟榔 泽泻 木香 甘草

【用法】水煎,温服。

【主治】产后小腹及腰疼,甚则肛门窘迫不可忍。

28369 加味通心饮

【方源】《得效》卷三。

【组成】瞿麦穗 木通(去皮节) 梔子(去壳) 黄芩 连翘 甘草 枳壳(去瓢) 川楝子(去核)各等分

【用法】上锉散。每服五钱,水一盏半,灯心二十茎,车前草五茎同煎,空心温服。

【主治】①《得效》:肾与膀胱实热,小肠气痛,小腑不通。②《奇效良方》:诸疝胀痛及小便不利。

【备考】本方方名,《准绳·类方》引作“加味通心散”。

28370 加味通心散

《准绳·类方》卷六。即《得效》卷三“加味通心饮”。见该条。

28371 加味通心散

【方源】《医宗必读》卷八。

【组成】瞿麦穗 木通(去皮) 梔子(去壳) 黄芩 连翘 甘草 枳壳(去瓢) 川楝子(去核) 归尾 桃仁(去皮尖,炒) 山楂各等分

【用法】上为末。每服三钱,灯心、车前草煎汤,空心调下。

【主治】痃瘕疝,内有脓血,小便不通。

28372 加味通心散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】瞿麦穗一两 木通 梔子仁(酒炒黑) 黄芩 连翘 甘草梢 川楝肉 车前各五钱 肉桂三钱

【用法】上为散。每服五钱,加灯心二十茎,竹叶十片,水煎服。

【主治】小肠疝痛,水道不通。

28373 加味通圣散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】防风 川芎 当归 白芍 白术 甘草 连翘 薄荷 梔子 桔梗 麻黄 石膏 滑石 荆芥 黄芩 朴消 大黄 蝉退 枳壳

【用法】水二钟,煎八分,热服。

【主治】风饼风丹作痒。

28374 加味理中丸

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】人参 白术(土炒) 干姜(汤泡,炒黑) 神曲(炒) 各一两 麦芽 砂仁(炒) 各八钱 陈皮(去白) 一两 香附(醋炒) 一两 甘草(炙) 六钱

【用法】上为末,神曲打糊为丸,如梧桐子大。每服八十丸,空心米汤送下。

【主治】胎前产后,脾胃虚惫,饮食不进,呕吐泄泻,心腹疼痛,体虚有汗。

28375 加味理中丸

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】白术四钱 人参 白茯苓 神曲 各一钱 砂仁 干姜(煨) 麦芽(炒) 各二钱 炙草一钱半

【用法】炼蜜为丸。生姜汤嚼下。

【主治】脾胃虚寒,不进饮食,呕吐泻泄,或服寒药太过。

28376 加味理中汤

【方源】《三因》卷九。

【组成】人参 白术 甘草(炙) 干姜(炮) 干葛 川芎各等分

【用法】上锉散。每服四钱,水一盞,煎七分,去滓温服。

【主治】饮酒过多,及啖炙煖热食动血,发为鼻衄。

28377 加味理中汤

【方源】《济生》卷二。

【组成】人参 干姜(炮) 白术各一两 干葛 甘草(炙) 各半两

【用法】上为细末。每服三钱,水一大盞,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤胃呕血。饮食伤胃,遂成呕吐,物与气冲,与血吐出,或心腹疼痛,自汗。

28378 加味理中汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】人参 白术 干姜(不炒) 甘草(炙) 半夏(制) 茯苓 橘红 细辛 北五味子各等分

【用法】上锉细。每服二钱半,加生姜、大枣,水煎,食前服。

【功用】《金匱翼》:温养脾肺。

【主治】脾肺虚寒,咳嗽不已;中寒口噤,身体强直。

①《直指》:肺胃俱寒,咳嗽。②《外科发挥》:肺胃俱寒,发热不已。③《景岳全书》:脾肺俱虚,咳嗽不已。④《文堂集验方》:中寒,身体僵直,口噤不语,四肢战掉,洒洒恶寒,脉浮紧,无汗。⑤《杂病证治新义》:虚寒咳嗽。

【临证举例】肺病咳嗽 《外科发挥》:一男子年前病肺病,后又患咳嗽,头眩唾沫,饮食少思,小便频数。服解散化痰药,不应。诊之,脾肺二脉虚甚。余谓:眩晕唾涎,属脾气不能上升,小便无度,乃肺气不得下制,尚未成痼耳。投以加味理中汤四剂,诸证已退大半,更用钟乳粉汤而安。

28379 加味理中汤

【方源】《伤寒六书》卷四。

【异名】加味理中饮(《赤水玄珠》卷十八)。

【组成】干姜 肉桂各四分 白术一钱 人参 陈皮 茯苓各八分 甘草三分

【用法】水二钟,加生姜一片,大枣二枚,水煎,临服挂法入炒陈壁土一匙调服。

【主治】足太阴脾经受症,脏寒,自利不渴,手足温,身无热,脉来沉而无力。

【加减】厥阴消渴,气上冲心,饥不欲食,食即吐蛔,腹痛大便实者,加大黄、蜜少许利之;腹濡满时减者,去甘草;呕吐,入半夏、姜汁;踡卧沉重,利不止,少加附子;利后身体痛者,急温之,加附子;自利腹痛,入木香(磨)、姜汁,调和服之。

28380 加味理中汤

【方源】《伤寒广要》卷九引《董要》。

【组成】理中汤加丁香一钱 橘红二钱 半夏二钱 柿蒂(炒)五分

【主治】胃冷呃逆。

28381 加味理中汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】人参 白术 炙草 干姜(炮) 陈皮各一钱 丁香五分 干柿蒂二钱

【用法】水煎服。

【主治】产后胃气虚寒，呃逆。

【加减】有热，去丁香，加竹茹二钱。

28382 加味理中汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】人参 白术 炙草 干姜(煨) 陈皮 藿香 厚朴(姜制) 生姜五片

【用法】水煎，温服，不拘时候。

【主治】产后脾胃虚弱，失于调理，伤于风冷饮食，而为霍乱，心腹绞痛，手足逆冷，吐泻并作。

28383 加味理中汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】甘草 干姜 白术 条参 肉桂 附子各等分 秦艽 腹皮 钩藤 川羌各一钱半 怀膝一钱 虎骨三钱

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】酒伤，四肢厥冷，痿痹不仁，口不作渴，冷汗如雨等。

28384 加味理中汤

【方源】《医学六要》卷三。

【组成】人参 白术 干姜(炮) 各一钱 甘草(炙) 五分 丁香十粒 生姜十片

【用法】水煎，凉服。

【主治】胃虚受寒，呕吐不止。

【方论选录】《医学入门万病衡要》：本方用人参、白术、炙草诸甘温以补中；干姜、丁香诸辛热以散寒；生姜散逆气，以止呕吐。

28385 加味理中汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】理中汤加炒川椒五粒 槟榔五分

【主治】胃寒所生蛔厥。

28386 加味理中汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】大附子(面包煨，去皮脐) 人参(去芦) 白术(去芦) 干姜(炒) 肉桂 陈皮 茯苓(去皮) 各等分 甘草(炙) 减半

【用法】上锉一剂。加生姜一片，大枣二枚，水煎，热服。

【主治】寒甚痢冷。

28387 加味理中汤

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】人参 白术 白芍药 白茯苓 干姜 黄连 藿香叶 木香 诃子肉 肉果 甘草各一钱

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣二枚，煎一钟，饥时服。

【主治】妊娠泄泻。

28388 加味理中汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】人参三钱 白术一钱五分 干姜一钱(炮) 甘草八分 肉桂八分 陈皮一钱五分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，临服加木香(磨)一匙，姜汁少许同服。

【主治】伤寒，直中阴经，腹痛，怕寒厥冷，或下利呕吐不渴，脉沉迟无力。

28389 加味理中汤

【方源】《济阳纲目》卷十三。

【组成】人参 白术 干姜(炮) 甘草 附子 丁香 柿蒂

【用法】上锉。水煎服。

【主治】吐利后，胃中虚寒，呃逆。

28390 加味理中汤

【方源】《济阳纲目》卷十八。

【组成】理中汤加陈皮 丁香各等分

【主治】胃感寒，呕吐不止。

28391 加味理中汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】干姜 人参 白术 肉桂 甘草 半夏 陈皮 细辛 茯苓

【用法】加煨生姜五片，水煎熟，再入姜汁半盏服。其腹内外，仍用生姜炒热，时时熨之。

【主治】中寒。冬时直中真寒，一身受邪，难分经络，手足厥冷，或腹痛呕吐，甚则卒倒昏迷，不省人事，脉迟无力。

【加减】病重，加熟附子；身甚寒，加麻黄；挟气，加木香；呕吐涎沫，加丁香；腹痛，加木香、砂仁；挟食，加草果、枳壳；泻不止，加升麻、苍术。

28392 加味理中汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】大附子（童便制）一钱 干姜（炒黑） 甘草 槟榔 白术（生炒） 人参各八分 肉桂 川椒各六分

【用法】水一钟，加乌梅三个，水煎服。

【主治】蛔厥。

28393 加味理中汤

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】人参 白术 茯苓 炮姜 炙草 川芎 扁豆

【主治】因强呕吐，致伤胃吐血，腹痛自汗者。

28394 加味理中汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】淡附子二钱 干姜一钱 茯苓二钱 人参不拘 炙甘草七分 焦术二钱 白蔻五分 肉桂心一钱 延胡索（醋炒）一钱五分 乳香（去净油）一钱五分

【主治】产后心腹痛。

【加减】气痛，加广木香一钱，郁金（酒炒）一钱，良姜（醋炒）一钱，紫丁香十只；血痛，加五灵脂（醋炒）一钱五分，炮姜炭七分（代去干姜），蒲黄（炒）七分，归身（酒炒）二钱；寒痛，加吴萸一钱，小茴（盐水炒）一钱五分，芦盐（水炒）二钱，重用桂、附；食痛，加焦神曲一钱五分，山楂（砂糖炒）二钱，鸡肫皮（焙干）二钱，广皮一钱，母丁香七分；虫痛，加川椒四十粒，乌梅二个，吴茱萸（川连一钱，煮汁拌炒）八分，榧子肉三钱；痰痛，加法夏二钱，肉果（煨）一钱，沉香一钱，牡蛎粉二钱，化橘红一钱；积痛，加木丁香八分，陈香圆二钱，佛手柑一钱，巴豆（去油净，取霜，焙干）三分，再用湿腐皮包好，药汁送；虚痛，阴

虚加熟地（姜汁、益智、砂仁共五粒炒焦）五钱，枸杞子（酒炒）二钱，阿胶（蒲黄炒）二钱，净萸肉（酒炒）二钱，干姜（代炮姜）五分，阳虚，增附子；实痛，去人参、焦术，加枳壳一钱，草蔻一钱，肉桂（代桂枝）八分（醋炒），甚者，加韭汁制大黄三钱（用韭汁拌大黄，九蒸九晒）。

28395 加味理中汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】理中汤加附子 茯苓 苍术

【主治】寒中腹胀，多涎涕，足软，脾胃、腰背、睾丸痛，并兼气虚者。

28396 加味理中汤

【方源】《方症会要》卷三。

【组成】人参 白术 甘草 干姜 玄胡

【主治】虚寒腹痛。

【加减】寒甚者，加桂、附。

28397 加味理中汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】人参（少者，用山药三钱炒黄代之） 白术一钱半 干姜（炒）一钱 甘草（炙）一钱 附子五分 丁香三分 木香三分 半夏一钱 草豆蔻（煨）八分 生姜一钱

【用法】水煎服。

【主治】胃寒呃逆。

28398 加味理中汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】白术二钱 干姜（炒）一钱半 甘草（炙）一钱 丁香五分 白豆蔻（去壳炒，研）一钱

【用法】水煎服。如假热在上不纳者，冰冷与服。

【主治】阴寒腹痛，脉紧而微，或表热里寒者。

【加减】寒甚而手足厥逆，上吐冷涎，下泄清水，加附子二三钱。

28399 加味理中汤

【方源】《会约》卷九。

【组成】人参 白术二钱或五六钱 扁豆（炒，研）二钱 陈皮一钱 干姜（炒）一二

钱 甘草(炙)一钱 当归一二钱(滑泄者,土炒) 木香四分 白豆蔻(去壳炒)一钱 茯苓一二钱 白芥子(炒,研)八分

【用法】水煎,温服。

【主治】脾胃虚寒,气胀便秘,恶食恶寒等。

28400 加味理中汤

【方源】《华氏医方汇编》卷五。

【组成】西党参三钱 野于术二钱 炙草二分 干姜(炒黑)六分 归身一钱半 大枣三枚

【用法】水煎,温服。

【主治】小产下血不止。

28401 加味理中汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参五钱 白术三钱(土炒) 炮姜一钱 附子二钱 扁豆三钱(炒) 小半夏二钱 归身三钱(土炒) 砂仁一钱半(炒) 焦楂一钱半 木香五分(研) 粟壳一钱半(蜜炙焦) 生草八分 乌梅炭一钱 川朴五分(炒)

【用法】水煎服。

【主治】脏腑虚寒,偶得暑热痢病,误服凉下太过之药,脾胃受伤,日久不能除根,仍然腹痛痢泻者。

28402 加味理中饮

《赤水玄珠》卷十八。为《伤寒六书》卷四“加味理中汤”之异名。见该条。

28403 加味理建汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】干姜 吴术 人参 黄耆 白芍 肉桂 甘草 牡蛎 浮麦 当归

【用法】上件咬咀。每服水二盏,加生姜五片,大枣一枚,煎八分,食前热服,滓再煎。

【主治】男子、妇人夜多盗汗,并便浊者。

28404 加味黄玉膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】川黄连一钱 黄柏三钱 白僵蚕三钱 乳香二钱 香白芷三钱 槐枝三钱 白鲜皮三钱 生草一钱五分

【用法】共以香油三两、脂油四两,将药炸

枯,滤去药渣,兑猪胆汁三钱、白□五钱熬化,再入梅花冰片八分,共合为膏。

【功用】清热解毒,燥湿止痒。

【主治】痘疮;皮肤疮疡。

28405 加味黄芩汤

【方源】《广嗣纪要》卷十。

【组成】黄芩二钱 白芍 白术 白茯苓 炙甘草 阿胶各一钱

【用法】用水一盏半,煎至一盏,后入阿胶,再煎至八分服。

【主治】①《广嗣纪要》:妊娠伤寒下后,协热而利不止,胎气损者。②《重订通俗伤寒论》:妊娠伤寒表解后,腹中不和,协热下利,胎不安,脉数者。

【方论选录】《医略六书》:方中黄芩清热安胎,白术健脾止利,白芍敛阴以固冲任,阿胶补阴以资血室,茯苓渗湿和脾,炙草缓中和胃。水煎温服,俾协热既化则脾气顿和而清阳无不敷布,脾运无不有权,何患下利不瘳,胎孕不安乎?

28406 加味黄芩汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】黄连 黄芩各一钱半 白芍药三钱 甘草七分 滑石末三钱

【用法】水煎服。若滑石不煎调服,止于一钱。

【主治】疹子自利,甚则里急后重而为滞下。

【加减】血痢,加地榆二钱。

28407 加味黄芩汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】黄芩二钱 白芍一钱 甘草五分 白术(蜜炙)三钱 茯苓一钱二分 通草八分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠泄泻,内热烦渴,小便赤涩者。

【加减】如腹痛,加砂仁、黄连(姜汁炒)各一钱。

28408 加味黄芩汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】黄芩二钱半 白芍一钱半 甘草一钱 半夏一钱半 生姜二钱

【用法】水煎服。

【主治】胃热作呕，烦躁不宁，脉洪实者。

【加减】热甚，加石膏，或加黄连；大便燥结，加酒炒大黄。

28409 加味黄芩汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】黄芩四钱 厚朴三钱 吴茱萸四钱 毛苍术四钱 杭白芍三钱 升麻三钱 车前子四钱(炒) 木通三钱 大枣六枚 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】漏底伤寒。伤寒日久，不能忌口，饮冷食凉，触动脾胃，致令脾气虚衰，脾湿下陷，腹痛泄泻。亦治痢疾。

【加减】赤痢，去车前子，加大黄四钱，服一剂，再加地榆炭三钱，粟壳四钱，服二剂；白痢，去大枣、车前子，加槟榔三钱，炮姜二钱，地榆炭三钱，粟壳四钱。

【方论选录】此方用黄芩清热；白芍敛阴；厚朴温中；甘草、大枣和胃；苍术燥湿；吴茱萸止其腹痛；升麻提升清气；车前分其清浊；木通引热下行。

28410 加味黄耆汤

【方源】《医学入门》卷四。

【异名】保元汤。

【组成】黄耆一钱 人参 甘草各一钱 白术五分 肉桂五分

【主治】阳虚背恶寒。

【加减】病甚者，加附子。

【备考】方中肉桂用量原缺，据《济阴纲目》补。

28411 加味推气散

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】片姜黄 甘 桂 桔 陈皮 半夏 姜

【主治】右胁痛。

28412 加味控涎丸

【方源】《得效》卷五。

【组成】大戟 芫花 甘遂 甜葶苈 巴豆(去壳)各一两 黑牵牛三两(炒，取头末) 白芥子(炒)二两

【用法】上为末，米糊为丸，如粟米大。每服三七粒，茶清吞下；或温水亦可。得利则效。

【功用】消浮退肿，下水。

【主治】风热上壅，或中脘停留水饮，喘急，四肢浮肿，脚气入腹，平常腹中痰热，诸气结聚。

【宜忌】服后未可服甘草药及热水。

28413 加味控涎丹

【方源】《济阳纲目》卷七十八。

【组成】甘遂(去心) 紫大戟(去皮) 白芥子 木鳖子各一两 桂五钱

【用法】上为末，糊为丸，如梧桐子大。每服五七丸至十丸，临卧淡姜汤或热水送下。

【主治】肩、背、臂痛。

28414 加味救肺饮

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】当归 白芍 麦冬 五味子 人参 黄耆 炙草 百合 款冬花 紫菀 马兜铃

【主治】金被火刑，肺损嗽血。

28415 加味救肺散

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】麦冬(去心) 人参 黄耆(炙) 郁金 五味子 当归(酒洗) 白芍药(酒炒) 川贝母(去心，研) 甘草(炙) 马兜铃

【用法】水煎服。

【主治】小儿劳伤，无热咳嗽，痰中带血。

28416 加味铜绿散

《囊秘喉书》卷上。为原书同卷“绿袍”之异名。见该条。

28417 加味猪苓汤

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】猪苓(去皮) 赤茯苓(去皮) 泽

泻 白术 麦门冬(去心) 百药煎 黄连(去须) 大黄(煨) 甘草(炙) 各等分

【用法】上咬咀。水煎，温服。

【主治】热痢，血痢。

【加减】血痢，加阿胶、蒲黄。

28418 加味脱花煎

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】当归七钱 牛膝(盐水炒) 川芎各二钱 肉桂(去皮，另炖) 红花各一钱 车前一钱五分 朴消三钱

【用法】水煎好，加入朴消，再煎三四沸服。

【功用】下死胎。

【主治】胎死腹中，非产期而觉腹中阴冷重坠，或为呕恶，或秽气上冲，舌见青黑者。

28419 加味麻仁丸

【方源】《准绳·类方》卷三引《体仁汇编》。

【组成】大黄一两 白芍药 厚朴(姜汁炒) 当归 杏仁(去皮尖) 麻仁 槟榔 南木香 枳壳各五钱 麝香少许

【用法】上为末，炼蜜为丸。熟水送下。

【主治】关格，大小便不通。

28420 加味麻仁丸

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】火麻仁八两 枳实四两 白芍三两 当归八两 熟军一斤 川朴 郁李仁 杏仁各四两

【用法】上为细末，炼蜜为小丸。每服三钱，开水送下。

【功用】滋润大肠，健胃通便。

【主治】肠胃燥结，大便不通，胸腹胀满。

【宜忌】产妇、孕妇、老年人忌用。

28421 加味麻风丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大胡麻一斤四两 小胡麻一斤四两 川牛膝四两 白蒺藜一斤四两 苦参一斤 防风八两 荆芥八两 当归六两 茅苍术六两 川断四两 苡仁四两 黄柏六两 浮萍二十两 马齿苋二十四两

【用法】上为细末，水泛为丸。每日早、午、晚三次，每服三钱或二钱。每丸一钱，照数加风子膏，春、秋用八厘，夏用五厘，冬用一分，拈圆，以茅尖茶叶一分煎汤过口。

【主治】痲风初起。

【备考】制风子膏法：风子肉铜锅内炒至三分红色，七分黑色为好，太过无力，不及伤眼。炒后研成膏，如红沙糖一样，用铜勺盛，置火上熬四五滚，倒在纸上，放土面上，以物盖之待用。如上面霉，拭去后，仍可使用。

28422 加味麻黄汤

【得效】卷四。为《三因》卷九“麻黄桂枝汤”之异名。见该条。

28423 加味麻黄汤

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】麻黄 苏叶 桑白皮(蜜炙) 各等分 甘草减半

【用法】上咬咀。以水煎服。得汗咳止。

【主治】肺感风寒，痰涎咳嗽。

【加减】身热而渴者，加知母、石膏。

28424 加味麻黄汤

《种痘新书》卷十一。为《赤水玄珠》卷二十八“加味麻黄散”之异名。见该条。

28425 加味麻黄汤

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】麻黄 桂枝 杏仁 甘草 半夏 橘红 苏叶 生姜 大枣

【主治】伤寒嗽，恶寒无汗，脉紧。

28426 加味麻黄汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】麻黄三钱 桂枝二钱 苏叶三钱 黄芩三钱(酒洗) 芥穗三钱 滑石四钱 豆豉四钱 木通三钱 甘草一钱 葱头一个 杏仁二钱 川贝母二钱 皂刺三钱

【用法】酒、水各半煎服。

【主治】伤寒咳嗽，有声无痰者。

28427 加味麻黄散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【异名】加味麻黄汤(《种痘新书》卷十一)。

【组成】升麻(酒洗) 麻黄(酒炒) 人中黄 牛蒡子 蝉退各等分

【主治】①《赤水玄珠》：麻痘发不出。②《麻症集成》：麻痘形色紫黑，标闭不明，一出即没。

28428 加味清中散

【方源】《何氏济生论》卷四。

【组成】山栀 川连 黄芩 石膏 升麻 白芷 甘草 橘红 桔梗 枳壳

【用法】水煎，不拘时服。

【主治】胃火作痛。

28429 加味清六丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】滑石六钱 乳香 没药 桃仁 木香 槟榔 大黄各一钱

【用法】上为末，神曲糊为丸，如绿豆大。每服一百丸，米饮送下。以利尽秽物为度。

【主治】血瘀肠中，痢久不愈，下如清涕，有紫黑血丝。

28430 加味清心饮

【方源】《得效》卷七。

【组成】石莲肉 白茯苓各一两 益智仁 麦门冬 远志(水浸取肉，姜制炒) 人参各半两 石菖蒲 车前子 白术 泽泻 甘草(微炙)各二分

【用法】上锉散。每服三钱，加灯心二十茎，水煎服。

【主治】心中客热烦躁，便下赤浊肥脂。

【加减】有热，加薄荷少许。

28431 加味清宁膏

【方源】《何氏虚劳心传》。

【组成】生地四两(酒拌略蒸) 麦冬四两 白花百合八两(晒干四两) 桑白皮(蜜炙)三两 款冬花二两 百部三两 玉竹四两 薄荷三两 贝母三两 山药(蒸熟)六两(以上三味，研细入膏) 桔梗一两 枇杷叶(蜜炙)八两 橘红一两 米仁(炒)八两 茯苓二两 白芍(酒炒)三两 炙甘草一两 龙眼肉四两 大枣六两

【用法】上药煎成膏，加饴糖、白蜜各一斤，俱煎极熟收之，俟冷入薄荷、贝母、山药末拌匀。时时挑置口中噙化，或白汤调服亦可，临卧及睡觉噙之更佳；亦可小剂作煎饮。空心兼服保阴、回生之属。

【功用】补阴，清肺，益脾，降气，消痰。

【主治】阴虚咳嗽，或多痰，或干咳，或痰血红，或纯血。

【加减】泄泻，再加炒米仁四两。

28432 加味清肺饮

【方源】《痘科类编释意》卷三。

【组成】人参 柴胡 杏仁(去皮) 桔梗(去头) 芍药 麻黄 半夏 粟壳(盐水泡，去筋膜，蜜炙) 甘草 五味子 旋覆花 阿胶(麸炒成珠) 桑白皮 知母 乌梅(水泡，去黑衣，去核)

【用法】加生姜三片，葱一根，水一钟半，煎至八分，温服。

【主治】热毒在肺，传于皮肤之间，而致痘疮发紫泡血泡者。

【加减】治紫泡、血泡，加当归、生地，去五味子、粟壳；白泡，加生地、酒炒黄芩。

28433 加味清胃汤

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】黄连 当归 升麻 生地黄 牡丹皮 白芷梢各等分 细辛减半

【用法】噙漱咽之。

【主治】小儿走马牙疳，初作口气，次第齿黑，盛则断烂，热血进出，甚者齿皆脱落，外证脑热肌削，手足如冰，寒热时来，滑泻肚痛，口臭干渴，齿齦生疮，爪黑面黧，身多疮疥。

28434 加味清胃汤

《痘疹传心录》卷十八。为《保婴撮要》卷一“加味清胃散”之异名。见该条。

28435 加味清胃汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】升麻 川连 甘草 葛根 石膏 桑白皮 枳壳 地骨皮

【主治】膏粱积热，土中之火刑金，致内伤腋痛。

28436 加味清胃汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】川连 升麻 丹皮 山梔 甘草 干葛

【主治】中消。

28437 加味清胃汤

《一盘珠》卷六。为《校注妇人良方》卷二十四“加味清胃散”之异名。见该条。

28438 加味清胃汤

【方源】《幼科释谜》卷六。

【组成】升麻 当归 黄连 丹皮 生地 黄 茯苓 陈皮

【主治】小儿胃热生痰，咳逆羸瘦。

28439 加味清胃汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】升麻 黄连 丹皮 生地 当归 甘草 桔梗 牛蒡 荆芥 元参

【主治】疹后牙疳红肿者。

28440 加味清胃散

【方源】《口齿类要》。

【组成】黄连(炒) 生地黄 升麻各一钱 牡丹皮八分 当归三钱二分 芍药 柴胡

【用法】水煎服。

【主治】脾胃肝胆经热。

28441 加味清胃散

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】秘本加味清胃散(《麻科活人》卷四)、加味清胃汤(《一盘珠》卷六)。

【组成】黄连(炒)一钱五分 生地黄 牡丹皮 当归各一钱 升麻二钱 犀角 连翘 甘草

【用法】水煎服。

【主治】脾胃有热，口舌生疮，齿龈腐烂疼痛，或吐血。

①《校注妇人良方》：醇酒厚味，唇齿作痛，或齿龈溃烂，或连头面颈项作痛。②《女科撮要》：脾胃有热，口内生疮。③《赤水玄珠》：妊娠吐衄。④《嵩崖尊生》：牙疼出血

口臭。⑤《一盘珠》：胃火吐血。

【临证举例】唇内热 一妇人唇裂内热二年，每作服寒凉之剂，时出血水，益增他症。此胃火伤血，而药伤元气也。余用加味清胃散而愈。

28442 加味清胃散

【方源】《保婴撮要》卷一。

【异名】加味清胃汤(《痘疹传心录》卷十八)。

【组成】《脾胃论》清胃散加柴胡 山梔

【用法】水煎，子母均宜服。

【主治】①《保婴撮要》：小儿脾胃实火作渴，口舌生疮，或唇口肿痛，齿龈溃烂，焮连头面，或恶寒发热，或重舌马牙，吐舌流涎。②《痘疹传心录》：因乳母情欲厚味，积热传儿，致小儿膏淋，小便不通。

28443 加味清胃散

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】升麻 白芷 防风 白芍药 干葛 甘草 当归 川芎 羌活 麻黄 紫背浮萍 木贼草各等分

【用法】每次五七钱，水煎服。

【功用】发散。

【主治】痲风热毒在表。

28444 加味清胃散

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】当归尾二钱 生地黄三钱 牡丹皮三钱 升麻四分 黄连六分 防风一钱五分 荆芥一钱 软石膏三钱

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】①《寿世保元》：胃经火盛，致牙齿肿痛，上下牙痛，牵引头脑而热，其齿喜冷恶热者。②《麻科活人》：胃中蕴热，中脘作痛，痛后火气发泄，必作寒热乃止；及齿龈肿痛出血。

【加减】若牙龈额半边痛者，加防风、羌活、白芷、细辛；若牙龈脱出而出血者，加扁柏叶、黄芩、荆芥、梔子；若虚损人牙痛者，加黄柏、知母、人参、甘草；若满口浮而痛，不

能力嚼者，加连翘、元参、芍药；小儿牙疳者，乳母服，加天花粉、元参、白芷；醇酒厚味，唇齿作痛，或牙龈溃烂，连头面颈项作痛者，并加犀角、连翘、甘草；胃气齿痛，加草豆蔻、细辛、防风、羊胛骨灰，去牡丹皮。

28445 加味清胃散

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】当归身(酒浸)一钱 黄连 生地 黄(酒洗) 升麻各二钱 牡丹皮一钱半 石膏三钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】膏粱积热，产后便血。

28446 加味清胃散

【方源】《证治汇补》卷四。

【组成】《脾胃论》清胃散加芍药 山梔

【主治】脾热口臭。

28447 加味清胃散

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】生地 当归 犀角 连翘 灵脂 升麻 丹皮 川连 甘草 力子 制军 使君子

【主治】麻症热留胃中，余毒上冲，致患牙疳。

28448 加味清室汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡 黄芩 甘草 半夏各一钱 白芍五分 丹皮三钱 陈皮五分

【用法】水煎服。

【主治】热入血室，妇人经水适来，正当伤风，发热恶寒，胸胁胀满，谵语者。

28449 加味清官汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】清官汤加知母三钱 银花二钱

【用法】竹沥五茶匙冲入服。

【主治】暑温漫延三焦，邪气久留，舌绛苔少，热搏血分者。

【方论选录】此苦辛寒法也。知母泻阳明独胜之热，而保肺清金；银花败毒而清络；竹沥除胸中大热，止烦闷消渴；合清官汤为暑

延三焦血分之治也。

28450 加味清凉饮

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】《直指》四顺清凉饮加川芎 柴胡

【用法】水煎服。

【主治】小儿头热身热，口中热气，大便黄赤。

28451 加味清凉饮

【方源】《保婴撮要》卷十二。

【组成】当归 赤芍药 甘草(炙) 大黄(炒) 山梔(炒)各三分 牛蒡子(炒，杵)四分

【用法】水煎服。

【主治】热毒积毒在内，患疮疡，大便不通，欲痛作渴者。

28452 加味清凉饮

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】大黄 连翘 赤药 羌活 当归 防风 梔子 荆芥 白芷 黄芩 甘草

【主治】面生疮。

28453 加味清凉饮

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】大熟地四钱 黄芩四钱 梔子三钱 滑石三钱 广陈皮二钱 黄柏三钱 木通三钱 茯苓三钱 甘草一钱 大海三个 山豆根三钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒咽痛，已得出大汗，脉静自安者。

28454 加味清营汤

【方源】《锦京直指》卷二。

【组成】鲜生地六钱 鲜石斛五钱 元参心五钱 原麦冬四钱 连翘三钱 银花三钱 天花粉三钱 鲜竹叶一钱 生石膏五钱 川黄连一钱 丹参三钱

【主治】温邪乘胃，热蒸心包，舌红而燥，口渴唇焦，脉数，或神昏谵语。

28455 加味清喉煎

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】润元参 大生地 粉丹皮 荆芥

穗 玉桔梗 焦山栀 天花粉 牛蒡子 生甘草 南薄荷 青防风

【用法】水煎服。

【主治】虚烂喉风。本原不足，虚火上炎，喉间白斑，痛烂连扁桃腺及内外粘膜，视之不肿，六脉细数。

【加减】尺脉旺，去荆、防，加知母、黄柏。

28456 加味清脾饮

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】青皮二钱 柴胡二钱 川朴二钱（捣） 黄芩二钱（生） 法夏二钱（研） 甘草一钱 茯苓二钱 白术二钱（炒） 草果二钱（炒，研） 槟榔三钱 枳壳三钱（炒） 川大黄五钱（生）

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】疟疾初发，作寒作热，舌有苔，中满不欲饮食，甚且发呕。

28457 加味清震汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】升麻一钱 苍术一钱 青荷叶一个（全用） 甘草（炙） 陈皮各八分 蔓荆子 荆芥各一钱五分 薄荷五分

【用法】水煎服。

【主治】雷头风。痰火所致头痛，起核块，或头中雷鸣。

28458 加味续命汤

【方源】《济阳纲目》卷四十五。

【组成】麻黄 防风 龙齿各一钱 防己 附子（炮） 石膏 桂枝各一钱 陈皮（去白） 紫苏各五分 竹沥一合 生姜汁十匙 生地汁半合

【用法】水煎服。

【主治】风痼，发则仆地，闷动无知，嚼舌吐沫，背反张，目上视，手足搐搦，或作六畜声者。

28459 加味续命汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】人参二钱 焦术二钱 茯苓二钱 炮姜八分 熟附子三钱 北细辛五分 生黄

耆三钱 防风二钱 酒拌炒归身三钱 法夏一钱 炙甘草八分 杞子三钱 鹿胶三钱 石菖蒲（米汁浸，炒）一钱五分（一方加天竺黄一钱五分）

【用法】水煎服。

【功用】补气壮阳。

【主治】产后类中风痉症。风寒入于腠理，经络不和，手足搐搦，眼目上视，角弓反张，口眼歪斜，舌痞不语，痰涎上涌，不省人事。

28460 加味绿矾丸

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】皂矾八两（用面一斤和作饼，入皂矾在内，火煨焦为度） 苍术（米泔水浸，炒） 厚朴（姜汁炒） 陈皮 甘草各八分 川椒十两（去目，炒去汗）

【用法】上为末，用红大枣三斤（煮熟去皮核），胡桃三斤（去壳），同捣成膏，和药为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，酒服。初服时觉此药甘美，服至病将愈，便觉药臭矣。

【主治】黄病。

28461 加味琼玉膏

【方源】《医便》卷一。

【组成】怀生地黄四斤 白术四两 白茯苓十五两 人参六两 天门冬（去心净）半斤 麦门冬（去心净）半斤 甘州枸杞子半斤（净去梗）

【用法】上先以地黄酒洗净，用水四碗浸一昼夜，捣取自然汁，和蜜三之一，以参、苓等药先为末，拌入蜜与地黄汁内，用瓶贮，与纸三十重，并箬包其口，用桑柴火蒸煮三昼夜取出，再换蜡纸包封十数重，沉井底一昼夜取起，再如前煮半日。每日清晨食远白汤点服。

【功用】补血益损，清金水以滋化源。

【主治】虚损。

【宜忌】其蜜用生绢滤净；地黄勿犯铁。

28462 加味椒红丸

【方源】《普济方》卷二二八。

【组成】真川椒一斤（净，分作四处，浸一

伏时，四两酒浸，四两醋浸，四两童子小便浸，四两米泔水浸）自然铜二两（用火煨，以童子小便浸七次，醋淬七次）

【用法】上将川椒一斤，置地上烧红，却将好酢洒于烧红地上了，地干，将花椒铺在地上，用瓦盆盖之，候地冷，取出花椒为末，却将自然铜、乳香、没药、血竭一处，用原浸花椒酒、醋、童子小便、米泔水打糊为丸，如梧桐子大。每服三十五丸至四十丸，温酒送下，日进三服。

【功用】轻身健体，顺气。

【主治】男子五劳七伤，身体骨节痠疼，行履艰难，胸膈闷满，不思饮食。

28463 加味款冬散

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】杏仁 桑白皮各七分 款冬花一钱 阿胶二钱 半夏七分 贝母 知母各一钱 甘草五分

【用法】上咬咀。加生姜三片，水煎，温服。

【功用】泻肺火，豁痰结。

【主治】肺受火邪，咳嗽发热。

【方论选录】杏仁、桑皮泄肺火；款冬、阿胶润肺止咳；半夏、贝母豁痰；知母清热；生草泄火和药。

28464 加味葛根汤

【方源】《片玉痘疹》卷六。

【组成】升麻 干葛 赤芍 甘草 荆芥穗 柴胡 牛蒡子（炒） 桔梗（洗） 连翘 木通 防风

【用法】淡竹叶为引，水一盞煎服。

【功用】发表解毒托里。

【主治】①《片玉痘疹》：痘疹蒸蒸作热，烦躁昏眩，毒深痘密而重者。②《准绳·幼科》：痘失表，发热谵语。

【加减】大便结，加紫草、红花；作渴，加麦冬、天花粉；腹痛闭结，加酒大黄。

28465 加味葛根汤

【方源】《医宗已任编》卷三。

【组成】升麻 葛根 前胡 桔梗 山楂

青皮 木通 荆芥 抚芎 甘草 灯心

【主治】小儿发热，看有痘情，耳冷、尻冷、脚冷，眼如含水，懒于言笑。

【加减】若热甚、气闷、谵语、腰无力，冬月加麻黄一钱；夏月加石膏一钱，甚者加至二钱；如冬月热甚，过四五日，重症已见，而舌灰白色者，亦须以石膏合麻黄用之；夏月苏叶、薄荷俱可进退用之。

【备考】用此方服至见点。如服后而不见点，是毒盛也，其症必重。如见点如糠粃齐布，热甚口臭，此脾经痘也，死不治矣。

28466 加味葛根汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】升麻 干葛 赤芍 甘草 桔梗 柴胡 防风 荆芥 连翘 地丁 木通 麦冬

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】痘失表，发热谵语。

28467 加味葱豉汤

【方源】《幼科七种大全·治验》。

【组成】淡豆豉三钱 葱白三寸 桂枝六分 橘红 半夏各五分 赤苓一钱半 甘草三分

【用法】长流水煎服。

【主治】水肿已一月，小便不利，脉沉细。

【方论选录】淡豉，肾之谷也；葱白，肺之菜也；桂枝和卫去风；二陈宣布痰水；不专于利而水自利，所谓治病必求其本也。

【临证举例】水肿 族孙患水肿已经一月，头面、四肢、腹、背、阴囊无处不肿，腹现青紫筋，肤如熟李子，脉沉细。服利水健脾药，小便不利。予曰：利之不应，此风水也。经曰：肾汗出，逢于风，内不得入于脏腑，外不得越于皮肤，客于玄府，传为胕肿，名曰风水。水无有不下，水之不利，实由于风，风去则水自行矣。为制加味葱豉汤。二剂松，又二剂汗出，水行病遂愈。

28468 加味葱豉汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】淡豆豉 葱白 荆芥 薄荷 牛蒡子 象贝母 橘红 连翘

【主治】产后风温。新产风邪犯肺，鼻塞声重，气逆，咳痰。

28469 加味葱豉汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】炒荆芥 香豉各二钱 艾叶三钱 桑枝五钱 广皮二钱 葱白一根

【用法】水煎，温服。

【功用】疏解表邪。

【主治】感受风寒，妊娠腹痛，头身俱痛，恶寒无汗，胸闷不舒，舌淡苔白，脉浮。

28470 加味葵子散

《类证治裁》卷七。为《张氏医通》卷十四“加味葵子茯苓散”之异名。见该条。

28471 加味越鞠丸

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】苍术（米泔浸，姜汁炒）四两 抚芎四两 香附（童便浸，炒）四两 神曲（炒）四两 梔子（炒黑）四两 橘红一两五钱 白术（炒）一两半 黄芩（炒）一两半 山楂（去核，蒸熟）一两半

【用法】上为末，稀糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，白汤送下。

【功用】解诸郁火痰气，开胸膈，进饮食。

【主治】郁证。

28472 加味越鞠丸

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】苍术（米泔浸，姜汁炒）一两 抚芎一两 香附（童便浸三日，炒）一两 神曲（炒）一两 梔子（炒）五钱 陈皮（去白）一两 白芍（去芦，炒）三两 黄连（酒炒）一两 山楂（去子）二两 白茯苓（去皮）一两 萝卜子（炒）五钱 连翘五钱 枳实（麸炒）一两 当归（酒洗）一两 广木香五钱

【用法】上为末，姜汁打稀糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，食后白汤送下。

【功用】解诸郁火痰气，开胸膈，思饮食，

行气消积散热。

【主治】郁证。

28473 加味越鞠丸

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】炒梔 香附 抚芎 苍术 神曲 山楂 陈皮 半夏 草薢

【用法】为丸服。

【主治】胃脘常懊痛。

28474 加味越鞠丸

【方源】《金匱翼》卷三。

【组成】苍术 神曲 香附 黑山梔 抚芎 针砂 山楂

【用法】上为末，糊为丸，如梧桐子大。温服，不拘时候。

【主治】食积、酒毒发热。

28475 加味紫金丹

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】信砒五分（研细，水飞如粉） 淡豆豉（晒干研末）一两五钱 麻黄（去节）四钱 当门子四分

【用法】上为极细末，和匀，真绿豆粉捣和为丸，如芥菜子大。每服十丸，少则五丸，麻黄二陈汤送下。

【功用】速通内闭。

【主治】哮喘，外内皆寒者。

28476 加味紫草饮

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】紫草 白芍 魔黄 甘草各五分

【用法】水煎，温服。

【主治】痘出未透。

【加减】年壮及北方皮厚之人，加蟾酥、辰砂；血虚出不匀，色不润者，加当归。

28477 加味紫菀汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】紫菀（炒）一钱 阿胶（蛤粉炒成珠）一钱 知母一钱 贝母一钱 桔梗五分 生甘草五分 人参五分 茯苓五分 五味子十二粒 牛蒡子五分 金银花五分

【主治】肺痿，久而气极，劳热自汗，皮毛枯悴，气息奄奄，咳嗽稠痰，喉间腥臭，且

或吐血，痿而变痢，肺气虚极而邪火愈盛。

【方论选录】方中紫菀辛苦温，升达阳气，以解胸膈之郁热，理上焦血，散逐痰涎，去肺间郁积；阿胶补润肺金，固气理血，散热滋阴；知母清肺金而滋肾水，以济妄火；贝母去热痰，开郁结，清热解毒；二母皆能金以生水，水济火则还以保肺；桔梗散肺邪，降肺逆；生甘草补土生金，且能解毒；气虚者，必人参以补之；茯苓亦补土生金，而能渗隔间邪湿；五味子补肺敛气，久嗽肺伤，肺叶焦痿，此当必用；牛蒡子功专治肺，利咽喉，止嗽除痰；金银花解百毒。肺病邪实宜急治，肺痿正虚宜缓养，且已虚则不容更破，而外邪未尽祛，则未可峻补，此方最为适宜也。

28478 加味遗粮汤

【方源】《摄生众妙方》卷八。

【组成】仙遗粮（白者佳，红者伤人。俗名冷饭团，《本草》名草薺）湿者二两，干者一两五钱 防风 木瓜 木通 薏苡仁 白鲜皮 金银花各五分 皂荚子四分

【用法】水一钟半，煎至一钟，空心一服，午前一服，午后连前二渣煎一服，一日三服。病浅者十余日可愈，病深者服四十日全愈。

【主治】杨梅疮风毒，及误服轻粉瘫痪，筋骨疼痛，不能动履者。

【宜忌】忌食牛、羊肉，鸡，鹅，鱼腥，茶，烧白酒；最忌房事。

【加减】虚弱，加人参、当归各七分。

28479 加味遗粮汤

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】川芎 当归 防风 薏苡仁 木瓜 金银花 木通 白鲜皮 苍术 威灵仙 各一钱 甘草五分 皂荚子五个（切片，微炒） 仙遗粮二两

【用法】水二碗，煎八分，量病上下，食前后服。病浅者，一月可退，病深者，百日可痊。

【主治】杨梅疮初起，筋骨疼痛，及已成数月，延绵不已；并杨梅风毒，误服轻粉，瘫

痿骨疼不能动履者。

【宜忌】忌牛肉、烧酒、海腥、煎炒。

【加减】疮久气虚者，加人参；腿脚之下，加牛膝一钱。

【备考】预服不发梅毒。

28480 加味滞下丸

【方源】《广笔记》。

【组成】川黄连（切片，拌好酒，用吴茱萸浸二宿，瓦上炒干，分连、萸各贮，净黄连三两，白痢加茱萸一两；赤痢用湿槐花炒，去槐花）八两 白芍药（酒浸，切片炒）五两 乌梅肉二两 滑石（水飞）六两 炙甘草二两 升麻（绿色者，醋炒）三两 莲肉（去心，炒）六两 白扁豆（炒，去壳）三两 红曲（簸净，炒）五两 干葛二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服五钱，白汤吞下，饥时服；证重者，日服三次。

【主治】痢疾。

28481 加味温风汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】当归 川芎 羌活各一钱五分 蜂房（炙）一钱 细辛四分 毕菱七分 麻黄（去净节）六分 附子（制）一钱

【用法】水煎服一半，口含一半。久之涎涎吐出。

【主治】寒邪犯脑，牙连头痛者。

28482 加味温经汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】当归尾 赤芍 川牛膝 肉桂 莪术（醋炙） 破故纸（盐水炒） 小茴香 香附（四制者） 乌药（炒） 川芎各一钱 甘草五分 生姜三片

【用法】水煎服。

【主治】石瘕。经来之后，寒入阴户，客于胞宫，血凝不行而腹渐大，如有胎孕，在壮盛之妇，半年之后气力强健，不治自消，若虚弱者，必成肿胀。

28483 加味温胆汤

【方源】《袖珍》卷一。

【异名】参胡温胆汤(《杂病源流犀烛》卷六)。

【组成】枳实(麸炒) 半夏(汤泡七次) 竹茹各八两四钱 橘红一两三钱 白茯苓六两三钱 甘草(炙)四两一钱 香附一斤半 人参 柴胡 麦门冬 桔梗各六两三钱

【用法】上咬咀。每服一两,加生姜五片,大枣一个,水二盏,煎一盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】心胆虚怯,触事易惊,梦寐不祥,异象惑惑,遂致心惊胆惧,气郁生涎,涎与气搏,变生诸证,或短气悸乏,或复自汗,四肢浮肿,饮食无味,心虚烦闷,坐卧不安。

28484 加味温胆汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】半夏 竹茹 陈皮 枳实 甘草 枣仁 人参 茯神

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【主治】①《伤寒全生集》:伤寒阴挟阳,惊悸昏沉。②《准绳·伤寒》:太阳病后,胆寒,虚烦不得眠。

【加减】口中烦渴,去半夏,加麦冬、五味、天花粉、知母;表热未除,加软柴胡;内重,大便自利者,加茯苓、白术、煨干姜,去枳实;表里俱大热者,加石膏、知母,去半夏;烦躁虚惊,加当归、生地、梔子、远志,调辰砂末;心中颠倒懊恼者,加梔子、乌梅;胃气虚弱不得眠者,加炒粳米。

28485 加味温胆汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】橘红 半夏 茯苓 甘草 竹茹 人参 黄连 川芎 生地 山梔 软柴胡 当归身 白芍药 酸枣仁 远志

【用法】加生姜、大枣、乌梅,水煎,调辰砂末服。

【主治】汗、吐、下后,虚烦不得眠者。

【加减】有痰,加姜汁炒半夏倍多。

28486 加味温胆汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】半夏(泡七次)三钱半 竹茹 枳实(麸炒)各一钱半 陈皮二钱二分 茯苓 甘草各一钱一分 酸枣仁(炒) 远志(去心) 五味子 人参 熟地黄各一钱

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣,水煎服。

【主治】病后虚烦不得卧,及心胆虚怯,触事易惊,短气悸乏。

28487 加味温胆汤

【方源】《准绳·伤寒》卷五。

【组成】人参二钱半 橘红 茯苓 黄连(酒炒) 软苗柴胡 当归身 川芎 白芍药 生地 酸枣仁各一钱 半夏七分 甘草五分 竹茹一团 生姜三片

【用法】水二钟,煎至一钟,去滓温服。

【主治】虚烦身振不得眠。

28488 加味温胆汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】陈皮 半夏(制) 茯苓各一钱 甘草(炙)五分 枳实 竹茹 黄芩各一钱 黄连八分 麦冬二钱 芦根一钱

【用法】上锉。加生姜、大枣,水煎服。

【主治】①《金鉴》:妊娠恶阻因于胃热者,呕吐,心中热烦懊恼,喜饮凉浆。②《叶氏女科》:体瘦恶阻多火者。

28489 加味温胆汤

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】陈皮 半夏(姜制) 茯苓 麦冬(去心) 枳实(麸炒) 生甘草 竹茹 黄连(姜炒)

【用法】加灯心,水煎服。

【主治】小儿热积胃中,食入即吐,口渴饮冷,呕吐酸涎,身热唇红,小便赤色。

28490 加味温胆汤

【方源】《寒温条辨》卷五。

【组成】人参 甘草(炙) 茯苓 远志(去心) 酸枣仁(炒,研) 熟地 枳实(麸炒) 陈皮 半夏(姜汁炒)各一钱 五味子五分 生姜一钱

【用法】水煎,温服。

【主治】汗下后不解，呕而痞闷，或虚烦不眠，肉瞤筋惕者。

28491 加味温养汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 白术二两 麦冬一两 半夏三钱 肉桂一钱

【用法】水煎服。

【主治】思虑过度，耗损心血，致患癫疾，或哭或笑，或裸体而走，或闭口自言，喃喃不已。

28492 加味滋阴丸

【方源】《医学正印》。

【组成】熟地黄八两（如法制） 山茱萸肉四两 干山药四两 白茯苓三两 牡丹皮三两 泽泻三两 黄柏三两（盐、酒、蜜炒三次，黑色） 知母三两（盐、酒炒三次，茶合色） 麦门冬三两（去心） 辽五味子一两五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心淡盐汤送下。

【主治】阴虚痰火无子。

28493 加味滋阴散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归二钱 川芎一钱五分 白芍二钱 熟地黄三钱 陈皮二钱 半夏二钱 白茯苓三钱 甘草八分 升麻三分 柴胡五分 牛膝二钱 黄柏一钱五分 知母一钱五分 白术一钱五分 苍术一钱五分

【用法】上锉。水煎，露一宿，空心服。

【主治】诸淋久不止者。

28494 加味滋肾丸

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】肉桂三分 黄连一钱 姜黄一钱五分 苦参三钱 苦苈（酒洗，炒） 石膏 黄柏（酒炒） 知母（酒炒）各五钱

【用法】上为极细末，打薄面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心白汤送下，以食压之。

【主治】眼内障。

【宜忌】觉肚冷者，勿用石膏。

28495 加味滋肾丸

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】黄柏八两（酒拌，晒，炒） 知母（法同上） 五味四两 青盐五钱

【用法】上为细末，粥糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心米饮、汤任下。

【主治】热淋管痛，并两足热。

28496 加味滋肾汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】黄柏 知母 肉桂 车前 木通 滑石

【用法】水煎服。

【主治】淋病。湿热结于下焦，尿意频数，淋漓不畅。

【方论选录】本方乃古方滋肾丸加味，为清热温肾利水之剂。以黄柏、知母清膀胱之热为主，少量肉桂温化肾气为佐，益以利水之车前、木通、滑石以通其淋，故为用于湿热结于下焦不化为淋之良方。

28497 加味犀角汤

《种痘新书》卷十二。为《得效》卷十一“加味犀角饮”之异名。见该条。

28498 加味犀角汤

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】荆芥 防风 牛蒡子（炒） 生甘草 桔梗 升麻 犀角 麦冬（去心） 梔子 黄连 石膏（煨）

【用法】水煎服。

【主治】痘疮热留于心，舌或赤或紫或黑或肿，舒舌、弄舌。

28499 加味犀角饮

【方源】《得效》卷十一。

【异名】加味犀角消毒饮（《东医宝鉴·杂病篇》卷十一）、加味犀角汤（《种痘新书》卷十二。）

【组成】牛蒡子三两（炒） 荆芥穗五钱 甘草（炙）一两 防风 川升麻各七钱半 犀角三钱 麦门冬（去心） 桔梗（去芦）各五钱

【用法】上锉散。每服二钱，水一盏煎，去滓令温，时时令呷，或频灌之。

【主治】小儿毒气壅遏，壮热心烦，疮疹虽出，未能匀透，口舌生疮，不能吮乳。

【宜忌】大便利，不宜服。

28500 加味犀角饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】犀角 木通 当归 甘菊 赤芍 元参各二钱 川芎 薄荷 甘草 蔓荆子各五分

【主治】风热耳病。

28501 加味槐花散

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】槐花 熟地黄 白术 青皮 荆芥穗 川芎各二钱 当归身 升麻各四分 枳壳(麸炒)五分

【用法】水煎服。

【主治】肠风下血，痔疮肿痛，发热便秘。

28502 加味槐角丸

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】槐角(炒) 枳壳(麸炒) 当归 黄芩 皂角仁(炒) 猬皮(炙) 秦艽 白芷各等分

【用法】上为末。每服一二钱，水煎服；或蜜为丸服。

【主治】痔疮肿痛或下血。

28503 加味槐角丸

【方源】《丹溪心法附余》卷十一。

【组成】槐角二两 生地二两 当归身 黄芩各二两 川芎 阿胶各半两 黄连 条芩 枳壳 秦艽 防风 连翘 地榆 升麻 各一两 白芷半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，或酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至七八十丸、百丸，空心温酒或米汤送下。

【主治】痔漏，及肠风下血。

【方论选录】本方以槐角、生地生血凉血为主；当归、川芎、黄芩、阿胶补虚为臣；以诸药为佐使。盖黄连泻心火，条芩凉大肠，枳

壳宽大肠，秦艽去大肠风，防风为血证上使，连翘为血证中使，地榆为血证下使，而连翘又能散经络中火邪，地榆又能凉血，升麻升散火邪，又与白芷引诸药入大肠经络，夫痔漏，经络之病也。

28504 加味蜈蚣散

【方源】《证治宝鉴》卷一。

【组成】川芎 羌活 蜈蚣 全蝎 鱼鳔 黄芩 马前 雄黄 蚯蚓(焙干) 川乌头

【用法】上为末。酒调下。

【主治】破伤风，角弓反张，口噤咬牙甚者。

28505 加味解毒丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】解毒丹一两 儿茶四钱(炙) 人中白五钱

【用法】上为末。小膏药内贴之。

【主治】下疳。

28506 加味解毒汤

【方源】《痢症验方》。

【组成】黄耆(盐水拌炒) 黄连(炒) 黄芩(炒) 黄柏(炒) 连翘 当归(酒拌) 各七分 甘草(炙) 白芍药 栀子仁(炒) 各一钱

【用法】水二钟，煎八分服。

【功用】止痛。

【主治】痢症大痛不止，脉洪大，按之有力者。

28507 加味解毒汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】黄芩二钱 黄连六分 黄柏一钱五分 栀子三钱 柴胡八分 茵陈二钱 龙胆草二钱 木通二钱 滑石三钱 升麻五分 甘草八分

【用法】上锉。加灯心，水煎服。

【主治】发黄症，身、口俱发如金色，小便如浓煮柏汁者。

【加减】大便秘，加大黄二钱；目睛黄，倍龙胆草。

28508 加味解毒汤

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】大黄 黄连 黄芩 黄柏 栀子 赤芍 连翘 枳壳(麸炒) 防风 甘草

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】下焦热毒盛，大便出血，大肠痛不可忍，肛门肿起。

28509 加味解毒汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】元参 苦桔梗 麦门冬(去心) 当归尾 赤芍 生地黄 连翘(去心) 牛蒡子(炒，研) 丹皮 红花 甘草(生) 木通

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】痘症火盛，毒壅会厌，咽喉肿痛，水不易入，气喷作呛。

28510 加味解毒饮

《准绳·幼科》卷三。为《保婴撮要》卷十二“加味解毒散”之异名。见该条。

28511 加味解毒散

【方源】《保婴撮要》卷十二。

【异名】加味解毒饮(《准绳·幼科》卷三)。

【组成】玄参 连翘 升麻 芍药 当归 羌活 生地黄 牛蒡子(炒)各三钱 茯苓 甘草各三钱 金银花 漏芦各五钱

【用法】每服一二钱，水煎服；或炼蜜为丸服。

【主治】天泡疮，发热作痛。

28512 加味解毒散

【方源】《保婴撮要》卷十八。

【组成】犀角(镑)五钱 连翘(炒)二钱 牛蒡子(炒)二钱 薄荷一钱 甘草五分

【用法】上为末。每服一二钱，滚汤调下。

【主治】麻疹痒痛，寒热甚者，烦躁谵语，并痘毒发热咽干。

28513 加味解毒散

【方源】《痘疹仁端录》卷十五。

【组成】金银花 黄连 连翘 漏芦 栀子 白芷 当归 防风 甘草

【主治】痈疽诸毒。

28514 加味解醒汤

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】葛根三钱 茯苓二钱 木香五分 砂仁一钱 人参一钱 白术(生) 陈皮 神曲(炒) 猪苓 泽泻各一钱五分(一方有枳椇子)

【用法】水煎，分二次服。

【功用】疏利湿热。

【主治】平素好饮，毒壅经络，而为痈发。其症多生于手足掌心，或腰腿臂下伸缩动处，疼如痛风，漫肿无头，其色淡红，憎寒发热，四肢沉重，烦渴，经治表症已解者。

【备考】原书用本方治上症，少加乳香、没药消之，溃后亦然。

28515 加味滚痰丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】大黄六两(蒸、晒九次) 黄芩五两(酒炒) 胆南星 青礞石(消煅) 沉香 橘红各二两

【用法】上为细末，竹沥为丸。每服三钱，空心白汤送下。

【主治】诸般痰症，失心丧志，癫狂痫病。

28516 加味磁朱丸

【方源】《得效》卷十六。

【组成】神曲四两 辰砂一两 磁石二两(煅，醋淬七次)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮服，一日三次。

【功用】益眼力。

【主治】脾胃有痰饮，渍侵于肝，久则昏眩。

【方论选录】丹砂之畏磁石，犹火之畏水，今合用之，砂法火入心，磁法水入肾，心肾各得其养，则目自然明；神曲倍于二味，用以健脾胃，消痰饮，极有方效。

28517 加味磁朱丸

《东医宝鉴·外形篇》卷一。即《直指》卷二十“千金神曲丸”。见该条。

28518 加味磁朱丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】磁石二两(能吸铁者，研极细水飞

出,切忌火煨) 赭石二两 清半夏二两 朱砂一两

【用法】上药各为细末,再加酒曲半斤,轧细过罗,可得细曲四两,炒熟二两,与生者二两,共和药为丸,如梧桐子大。每服二钱,铁锈水煎汤送下,一日二次。

【主治】痢风。

【方论选录】方中磁石中含铁质,且能吸铁,故能伏藏电气,即兼能伏藏与电气同类之相火也。又相火之发动,恒因君火之潜通,有朱砂之宁静心火,则相火愈不妄动矣。又电气入土则不能发声,故喻嘉言谓,伏制阴分之火,当以培养脾土为主。盖以土能制电,即能制水中之火,有神曲以温补脾胃,则相火愈深潜藏矣。加赭石、半夏者,诚以痢风之证,莫不气机上逆,痰涎上涌,二药并用,既善理痰,又善镇气降气也。送以铁锈汤者,以相火生于命门,寄于肝胆,相火之暴动实于肝胆有关。此肝胆为木脏,即为风脏,内风之煽动,亦莫不于肝胆发轫;铁锈乃金之余气,故取金能制木之理,镇肝胆以熄内风;又取铁能引电之理,借其重坠之性,以引相火下行也。

28519 加味蜡矾丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】象牙五钱 露蜂房 僵蚕 蛇退血竭 木香各三钱 乳香二钱 白矾二两

【用法】上为末,黄蜡四两为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下。

【主治】痔疮,新久诸漏。

28520 加味蜡矾丸

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】黄蜡一两 枯白矾一两 乳香一钱 没药一钱 雄黄二钱

【用法】上为细末,用蜡熔化为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服五十丸,视疮上下,蜜水送下。

【功用】卫护内膜,驱解诸毒。

【主治】诸疮恶毒,发背痈疽,痛不可忍者。

28521 加味蜡矾丸

【方源】《外科百效》卷三引如虚方。

【组成】黄蜡一两 白矾一两三钱(枯过)辰砂 雄黄 陀僧各一钱

【用法】上药各为末,先将黄蜡入铜铫内熔化,再入蜂蜜五钱同熔,随入四味末药搅匀,待冷为丸,如梧桐子大。每服二十丸,或酒或白汤送下。病在上饭后服,病在下空心服。

【主治】肠痢、痔漏、瘰癧等症,日夜疼痛,脓水不干。

28522 加味桦皮丸

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】芍药 良姜 黄柏炭 桦皮炭 归身 川芎 肉桂

【用法】面糊为丸服。

【主治】行经之时,风入胞中,寒凝浊瘀,赤白带下。

28523 加味震灵丹

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】煨禹余粮 煨赤石脂 煨紫石英 煨代赭石 明乳香 没药 朱砂 五灵脂 熟地炭 甘杞子 龟版胶 坎炁

【主治】操劳过度,血气耗损,冲任不固,白带频下。

28524 加味僵黄丸

《东医宝鉴·杂病篇》卷七。即《回春》卷二“内府仙方”。见该条。

28525 加味橘核丸

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】橘核二两(盐、酒炒) 小茴香 川楝子(煨,去核) 桃仁(光炒) 山楂(炒) 香附(醋炒)各一两 红花五钱 琥珀五钱 椒目 天仙藤各三钱 沉香二钱 神曲四两

【用法】上为末,以米饮为丸,如绿豆大。每服四五十丸,温酒送下;女子用红花一钱,泡汤送下。

【主治】七疝八瘕。

【宜忌】忌食生冷、油面等物。

28526 加味藜苓汤

【方源】《济阳纲目》卷二十。

【组成】天花粉二钱 赤茯苓一钱 猪苓
泽泻 香薷 干葛各七分 白术 黄连 甘
草各五分

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【主治】霍乱，身热口渴。

【加减】热极，加知母、石膏；泄极，加升
麻、黄芩、柴胡；腹痛，加芍药（炒）五分，
桂三分，寒痛亦如此。

28527 加味豁痰汤

【方源】《医学六要·治法汇》卷五。

【组成】半夏 赤茯 甘草 陈皮 南星
苍术 羌活 枳壳 独活 防风

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】痰流注腰痛。

28528 加味豁痰汤

【方源】《何氏济生论》卷四。

【组成】陈皮 半夏 南星 枳实 山梔
黄芩 川连 石膏 桔梗

【用法】加生姜三片，竹茹五分，水煎服。

【主治】痰积胃痛。

28529 加味藿香饮

《嵩崖尊生》卷六。为《外科正宗》卷二
“加味藿香散”之异名。见该条。

28530 加味藿香散

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】加味藿香饮（《嵩崖尊生》卷六）。

【组成】藿香 甘草 桔梗 青皮 陈皮
柴胡 紫苏 半夏 白术 茯苓 白芷 厚
朴 川芎 香附 夏枯草各等分

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水二钟，
煎八分，食远服。

【主治】气毒痲痹，外受风邪，内伤气郁，
以致颈项作肿，肩膊强痛，四肢不舒，寒热
如疟，及胸膈不利。

28531 加味露薷饮

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】人参一钱 半夏二钱 草果一钱
生姜二钱 广皮一钱 青皮（醋炒）一钱

【用法】水二杯半，煮成一杯，滴荷叶露三

匙，温服，滓再煮一杯服。

【主治】太阴脾疟，脉弦而缓，寒战，甚则
呕吐噫气，腹鸣漉泄。

28532 加剂四物汤

【方源】《赤水玄珠》卷八引《保命集》。

【组成】川芎 当归 白芍 生地 槐花
黄连 御米壳各等分

【用法】水煎服。

【主治】下痢。

28533 加剂除湿汤

【方源】《直指》卷三。

【组成】苍术（炒） 白术 甘草（炙）各
一两 干姜（炮） 茯苓各二两 橘红 辣
桂 厚朴（制）各半两

【用法】上锉。每服三钱，加生姜、大枣，
水煎服。

【主治】气虚伤湿，身重腰疼，四肢微冷，
或呕逆，或漉泄。

28534 加宝平安散

【方源】《济急丹方》卷上。

【组成】牛黄三两（研） 珍珠（腐肉煮，
研）四分 大冰片一钱 当门子一钱 枯矾
五分 萆薢三分 雄黄二钱 朱砂三钱 青
盐三分 明矾一钱 火消一钱 真佛面金五
十页

【用法】上药各为极细末，于五月五日午时
配合，用瓷瓶收贮，勿令出气。用时搐鼻取
嚏；至危者，以凉水送下少许。

【主治】急痧。凡中暑毒重，头眩气闭，眼
黑口噤，或饱胀呕吐者。

【宜忌】孕妇忌用。

28535 加参八味丸

【方源】《幼幼新书》卷三十引宋义叔方。

【组成】熟干地黄八两 山药 山茱萸各
四两 泽泻 赤茯苓 牡丹皮各三两 桂
（去皮） 附子 元参 赤芍药各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。
每服三十丸，赤茯苓汤送下，一日三次；小
儿用，丸如绿豆大，量服。

【主治】阴虚小便难，并寒淋。

28536 加参平胃散

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 白术(土炒)各一钱 苍术(米泔浸制) 厚朴(姜制)七分 陈皮 炙草各四分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】孕妇脾气虚弱，饮食停滞，以致腹胀呕吐。

28537 加参生化汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参三钱(有倍加至五钱者) 川芎二钱 当归五钱 炙草四分 桃仁十粒 炮姜四分

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】产后一二日，血块痛虽未止，产妇气血虚脱，或晕或厥，或汗多，或形脱，口气渐凉，烦渴不止，或气喘急者。

【宜忌】产后发厥，块痛不止，不可加耆、术。

【加减】血块痛甚，加肉桂七分；渴，加麦冬一钱，五味十粒；汗多，加麻黄根一钱；如血块不痛，加炙黄耆一钱；伤饭食、面食，加炒神曲一钱，麦芽五分(炒)；伤肉食，加山楂五个，砂仁四钱(炒)。

28538 加参生化汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎三钱 当归四钱 荆芥四分 桃仁十粒 人参三钱 肉桂五分(二帖后去之) 炙草五分 大枣二枚

【用法】水煎，热服。

【主治】产后血崩形脱，汗多气促。

【加减】汗多，加黄耆、人参各三钱；渴，加麦冬、五味；泻，加茯苓、莲子；痰，加竹沥、姜汁一酒杯；咳嗽，加杏仁、知母、桔梗各一钱；惊悸，加枣仁、柏仁各二钱；鲜血来多不止，加升麻、白芷各五分。

28539 加参生化汤

【方源】《宁坤秘籍》卷中。

【组成】人参三钱 桃仁十粒 麻黄根一钱 枣仁一钱(炒) 浮麦一撮

【主治】产后汗出气短。

【加减】渴，加麦冬一钱，五味子十粒；嗽，加杏仁十粒，桔梗五分；痰，加竹沥一酒盏，姜汁半匙；汗多，加黄耆一钱。

28540 加参瓜蒂散

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】瓜蒂七个 人参二钱

【用法】水三大碗，煎数沸，先令饱食，然后以药饮之。即大吐。

【主治】上焦痰气甚盛，而下焦又虚者。

28541 加参宁肺汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎一钱 当归三钱 人参二钱 杏仁十粒 桔梗 橘红各四分 款冬一钱 桑皮七分 半夏八分 知母一钱

【主治】产后旬日内外感冒风寒，咳嗽鼻塞，声重恶寒，或兼身热头痛。

【加减】虚人痰甚，加竹沥一小盏，姜汁三匙，甘草四分。

28542 加桂芎归汤

【方源】《济阴纲目》卷十一。

【组成】川芎 当归各二钱 官桂四钱

【用法】上锉一服。水煎服。

【主治】产母元气虚薄，胎衣不下。

【方论选录】《医略六书》：方中当归养血以润胞衣，川芎活血以行血气，官桂温经暖血、以通闭涩也。水煎入蜜，使经气润泽则沟满渠通，而胞衣无干涩之患，无不随药势而出矣。

【备考】《医略六书》本方用当归三钱，余各作一钱半。水煎去滓，入蜜三匙，煎沸温服。

28543 加料十全汤

【方源】《集验背疽方》。

【组成】黄耆(拣，不用叉附及蛀者，锉作二寸长截，拍扁，以冷盐汤湿润瓦器盛，盖甑上蒸三次，焙，锉用) 熟干地黄(拣肥

大滋润者，净洗焙干，用好饼酒湿润，瓦器盛，盖于饭甑上蒸、晒，如此七次，锉，焙）各一两（净） 当归（去芦净洗，取白头至中心一截，锉，焙干用；自中至尾，留合别药） 川芎（锉，微焙） 人参（去顶，锉，焙） 白茯苓（去黑皮，锉，焙） 甘草（炙） 白芍药（拣有皮者，无皮是伪者。削去皮，锉，焙用） 肉桂（削去粗皮，锉，不见火） 天台乌药（如无真者，可买隆兴府大块者用，锉，焙） 白术（用米泔浸半日，锉到小指头大方块，焙干，再用麦麸炒至黄色，不得伤火，去麸，锉用） 陈皮（不用沙柑子皮。水浸，削去白瓢，焙，锉） 真北五味子（核如猪肾形，肉微黑，苦味重者是真。拣去枝杖、炒过用。核如沙柑子核者，是土五味子，不堪用）各半两

【用法】上药各干净秤，锉作散，和匀。每服药一两，用水一碗，生姜五片，北枣二枚，同煎至八分碗，滤去滓，取清汁，分作两服；留滓晒干，碾罗为细末，后来常服，水一盞，生姜三片，大枣一枚，煎至八分服之。

【功用】补气血，进饮食，生肌肉。

【主治】痼疽后，疽疾将安及七八分时。

【备考】每日与排脓内补散相间服。

28544 加料平胃散

【方源】《便览》卷二。

【组成】厚朴（制） 橘皮各五两 苍术（泔浸，炒）八两 甘草 茯苓各二两 人参一两

【用法】上锉。水二钟，加生姜三片，大枣一枚，煎至一钟，去滓温服。一方枣肉为丸，如小豆大。每服五十丸，生姜汤送下，空心常服。

【功用】调气暖胃，化宿食，消痰饮；辟风寒冷湿，四时节非之气。

【主治】脾胃不和，不思饮食，心腹肋肋胀满刺痛，口苦无味，胸满气短，呕哕恶心，噎气吞酸，面色痿黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，体重节痛，常多自利，或发霍乱，及五噎八痞，

膈气反胃。

28545 加料四物汤

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】生干地黄 赤芍药 川芎 当归（洗，去芦） 防风各等分 黄芩减半

【用法】上哎咀。水煎，去滓服。

【主治】血热遍身生疮肿痒，及脾胃常弱，不禁大黄等冷药者。

【宜忌】忌酒、面、猪羊肉、豆腐。

28546 加料佛手散

【方源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】当归二两 川芎一两 蟹爪三钱 龟版（酥炙，研，新鲜者佳）一枚 肉桂一钱半 生芝麻三钱

【主治】妇人平日失于调养，或胎前多病，致气血两虚，临产交骨不开。

【方论选录】方中蟹爪取其峻厉；龟为至阴，版亦其类也，龟版分而开，以形相感之义；但以芎、归为主，大料顿服，血自充足，而交骨开矣。

28547 加料荷叶丸

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】荷叶炭三斤半 当归二两四钱 白芍一两六钱 川芎五钱 生地十二两 赤芍一两六钱 梅片四两五钱 犀角 羚羊各四钱五分 旱三七四两五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，二钱重，金箔十六开为衣，蜡皮封固。每服二丸，常服者一丸，白水送下。

【主治】吐血衄血，痰中带血。

28548 加料舒肝丸

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】香附四两 当归一两 枳实 醋柴胡各八钱 沉香五钱 毛橘一两 川芎八钱 郁金五钱 醋青皮一两 琥珀 木香各五钱 元胡八钱 油桂 老蔻 红花各五钱 油朴一两 乌药 白芍 枳壳各八钱 块苓一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重二钱

一分，朱砂为衣，棉纸包裹，蜡皮封。每服一丸，白水送下。

【功用】平肝顺气。

【主治】肝瘀气滞。

【宜忌】忌食腥冷。

28549 加减一阴煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地 芍药 麦冬各二钱 熟地三五钱 炙甘草五七分 知母 地骨皮各一钱

【用法】水二钟，煎服。

【功用】《中医妇科学治疗学》：养阴清热。

【主治】阴虚火旺，吐血、咯血、衄血，怔忡惊悸，上消；热病后伤阴水亏，烦渴不止，潮热不退；妇女阴虚血热，月经后期，色紫红，时作潮热，口中干燥，五心发热者。

①《景岳全书》：上消，水亏于下，火炎于上，有不得不清者；肾水真阴虚损，脉证多阳，虚火发热，及阴虚动血，或疟疾、伤寒屡散之后，取汗既多，伤阴水亏而脉虚气弱，烦渴不止，潮热不退，火之甚者。②《证治宝鉴》：虚劳，阴虚而兼微火者。③《竹林女科》：肝经怒火上冲，产后乳胀而溢；产后阴虚火盛而大热。④《类证治裁》：水亏火盛，烦躁热渴而为怔忡、惊悸者。⑤《医门八法》：阴虚血亏，虚火易动，头痛，遇热痛甚，烦热内热；耳聋。⑥《中医妇科学治疗学》：阴虚血热，月经后期，经量正常，色紫红，腹不胀痛，时作潮热，口干燥，手足心发热，脉虚数。

【加减】躁烦热甚便结者，加石膏二三钱；小水热涩者，加梔子一二钱；火浮于上者，加泽泻一二钱，或黄芩一钱；血燥血少者，加当归一二钱。

28550 加减一阴煎

【方源】《会约》卷六。

【组成】熟地三五钱 生地 白芍 麦冬各二钱 甘草七分 知母 地骨皮 黄芩各一钱 梔子（炒黑）八分

【用法】水煎服。

【主治】阴虚火盛，目赤涩痛。

28551 加减二陈汤

【方源】《医学发明》卷六。

【组成】丁香一两 半夏 橘红各五两 茯苓三两 炙甘草一两半

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，乌梅一个，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】①《医学发明》：痰饮为患，或呕吐恶心，或头眩心悸，或中脘不快，或发为寒热，或因食生冷，脾胃不和。②《景岳全书》：吞酸，胃脘痛，呃逆。

【加减】痞疾，加草豆蔻一两半（面裹烧熟用）。

28552 加减二陈汤

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《保命歌括》卷十五。

【组成】苍术一钱半 半夏 南星 白术 酒芩（炒） 香附各一钱 陈皮 茯苓各半钱 威灵仙三钱 甘草少许（一本加羌活一钱）

【用法】上咬咀，作一服。加生姜二三片，水煎服。

【主治】①《丹溪心法》臂痛。②《保命歌括》：上焦湿热痰横行经络，手臂痛。

28553 加减二陈汤

【方源】《保命歌括》卷十五引朱丹溪方。

【组成】二陈汤加苍术 南星 黄芩（酒洗） 羌活 姜汁 竹沥

【主治】白虎历节风，因痰因湿体肥者。

【加减】气虚，加人参、黄耆；血虚，加当归、川芎、白芷。

28554 加减二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷七十六引朱丹溪方。

【组成】陈皮（去白） 半夏（洗泡七次） 白茯苓 甘草（炙） 枳实（麸炒） 橘核 梔子（炒） 山楂各等分

【用法】上锉。水煎，入生姜汁，热辣饮之。

【主治】七疳。

【加减】瘀血作痛，加玄胡索、桃仁泥；气作痛，加木香、茴香、楝实等；六脉沉细，手足厥冷，加附子、干姜、肉桂；睾丸痛甚，加荔枝核、乳香、没药，均为细末，调入本方煎内，或另用顺流水调服；木肾肿大如升斗，去甘草，加海藻、昆布、荔枝核、茴香、川楝，均为末，顺流水调服，或作丸子。

28555 加减二陈汤

【方源】《医钞类编》卷五引朱丹溪方。

【组成】半夏 陈皮 茯苓 甘草 黄芩（酒洗） 羌活 红花

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】痰客太阳经，项强不能转侧。

28556 加减二陈汤

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷二引《必用》。

【组成】橘红（以盐水浸，焙）一钱二分 枳实 黄芩（炒）各一钱 白术 贝母（炒） 香附各九分 白茯苓 天花粉（盐水炒）各七分 防风 连翘各五分 甘草三分

【用法】上作一贴。水煎服。

【主治】老痰、燥痰、热痰。

28557 加减二陈汤

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】陈皮一钱 苍术八分 茯苓一钱 甘草二分 白术四分 枳壳七分 枳实三分 桔梗五钱 紫苏三分 薄荷二钱 香附七分 菖蒲一钱 荆芥六分 木通四分 川芎一钱 麦门冬五分

【用法】用水二盏，加生姜三片，煎至八分服。

【主治】痰、火、气。

28558 加减二陈汤

【方源】《育婴秘诀》。

【组成】陈皮（去白） 半夏（洗） 白茯苓 附子（童便浸） 木香 川芎 小茴（炒）各等分 甘草减半

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】小儿气疳，性急多哭，卵肿痛连小腹。

28559 加减二陈汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】橘红（去白）一钱 半夏（制）一钱半 白茯苓（去皮）一钱 贝母一钱半 枳实（炒）一钱 白术（去芦）一钱二分 连翘五分 黄芩（酒炒）一钱 防风（去芦）五分 天花粉七分 香附（童便炒）一钱 甘草三分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】痰火气逆。

28560 加减二陈汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮二钱 半夏（姜炒）二钱 白茯苓（去皮）三钱 甘草八分 人参二钱 白术一钱五分 竹茹二钱 砂仁八分 山梔三钱 麦冬（去心）一钱

【用法】上锉一剂，加生姜三片，大枣一枚，水煎，徐徐温服。

【主治】呕哕痰涎。

28561 加减二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷三十八。

【组成】陈皮（去白） 半夏 白茯苓 苍术（泔浸，炒） 白术 猪苓 泽泻 山梔子（炒） 麦门冬（去心） 黄芩（炒）各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】水肿。

【加减】腹胀，加厚朴；泻，加肉豆蔻、诃子；喘急，加桑白皮、杏仁；气壅，加香附；食积，加山楂、麦芽；阳水便秘，加甘遂少许；阴水气弱，加人参；风肿，加羌活、防风、白芷；夏月，加香薷；寒月，加姜、桂；气肿，加萝卜子、枳壳；血肿，加当归、芍药；痰，加贝母；上肿，加紫苏；下肿，加防己、木瓜；阴囊肿，加小茴香、木香；外肾如石，引胁痛，加巴戟；又太阳肿证，加藁本、赤小豆；少阳，加芫花、雄黄、木通。

阳明,加茯苓、椒目;太阴,加甘遂、葶苈;少阴,加泽泻、连翘、巴戟;厥阴,加大戟、吴茱萸。

28562 加减二陈汤

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】枯芩二钱 川连 橘红 川贝 茯苓 桑皮各一钱 前胡七分 枳壳八分 甘草五分 瓜蒌一钱

【主治】妊娠子嗽痰喘,因火乘肺金者。

28563 加减二陈汤

【方源】《医部全录》卷三二〇。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 枳实 麦门冬 竹茹 炒黄连 炒山栀 人参 白术 当归 辰砂 乌梅 竹沥

【用法】加生姜三片,大枣一枚,水煎,调辰砂末服。

【主治】痰因火动,心苦时跳时止。

28564 加减二陈汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】陈皮 半夏(制) 山楂肉 枳壳 柴胡 神曲(炒) 木香

【用法】加生姜一片为引。

【主治】小儿伤食吐,或伤乳吐,或腹痛手足心发热,或作暖气,或呕酸水,或作渴唇红。

28565 加减二陈汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】法半夏三钱 广陈皮三钱 紫菀三钱 诃子三钱 桔梗二钱 牛蒡子三钱 五味子一钱 炮姜二钱 甘草二钱

【用法】水煎,温服。

【主治】咳嗽,脉象沉紧者。

【方论选录】此方以半夏为君,半夏炙熟,乃温和之品,亦止嗽之圣药,惟有中寒者用之最宜;佐以诃子、牛子、紫菀、桔梗能温胃化痰,五味子益肾,炮姜温中,陈皮开胃,甘草和脾。此剂纯用温和之药,益胃强脾,脾健而痰自愈矣。

28566 加减十皮饮

【方源】《锦京直指》。

【组成】茯苓皮五钱 大腹皮三钱 川朴一钱 制茅术二钱 蒲种壳一两 天仙藤三钱 冬瓜皮四钱 陈皮一钱 丝瓜络一钱五分 炒苡仁六钱 地骷髅一两

【主治】久泻伤脾,脾虚不能运湿,湿滞气阻,一身浮肿。

28567 加减十全汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】川芎 川当归(去芦,酒浸) 白芍药 熟干地黄(酒浸) 半夏(汤泡七次,焙) 秦艽(去芦) 人参(去芦) 白术(炒) 金钗石斛(酒浸) 甘草(炙) 鹿角胶(锉,麸炒成珠) 白茯苓(去皮) 黄耆(蜜炙)各一两 肉桂(去粗皮,不见火) 银州柴胡(去芦)各二两

【用法】上咬咀。每服三大钱,水一盂半,加生姜五片,枣子一枚,入汤一块,煎七分,去滓热服,不拘时候。

【功用】调营卫,壮力,退热,收虚汗,美饮食,悦颜色。

【主治】诸虚百损。

28568 加减十全汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】人参 炙草 熟地 枸杞 炒杜仲 炮姜 江西术 白茯苓 归身 怀牛膝 生白芍

【主治】痢伤气血,形弱神衰,正虚邪少者。

28569 加减草宝汤

【方源】《普济方》卷三二二引《肘后方》。

【组成】黄耆四两 熟干地黄(汤泡十次) 白茯苓 人参 当归(酒浸) 白术 半夏(汤泡七次) 白芍药 五味子 桂各一两 甘草半两(炙)

【用法】上为粗末。每服二钱,水一盂半,加生姜三片,乌梅一个,煎至七分,去滓,空心、食前服。

【主治】妇人真气虚损,四肢劳倦,腰膝疼痛,颜色枯槁。

28570 加减七气汤

【方源】《直指》卷七。

【组成】半夏(制)二两半 人参 辣桂 厚朴(制)各一两 茯苓一两半 甘草(炙)半两

【用法】上锉散。每三钱半，加生姜七片，大枣一枚，水煎服。

【主治】气郁呕吐。

【加减】加本香亦得。

28571 加减七气汤

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】莪术(炮) 三棱(炮) 青皮 陈皮 香附 藿香 益智 甘草(炙) 桔梗 官桂 木香 槟榔 枳壳(炒) 白果 萝卜子(炒) 紫苏

【用法】加生姜三片，水煎服。

【功用】破滞气。

【主治】气刺痛。

28572 加减七气汤

【方源】《医方类聚》卷二一八引《仙传济阴方》。

【组成】人参三钱 桂三钱 半夏四钱 甘草二钱 沉香二钱 玄胡索二钱 乌药五钱 香附子二钱

【用法】加生姜，水煎服，不拘时候。

【主治】妇人气滞两胁痛，小腹疼至胸背。

28573 加减七气汤

【方源】《济阳纲目》卷七十二。

【组成】半夏(汤泡)三钱 桂心(去粗皮) 延胡索(炒)各一钱半 人参 乳香 甘草(炙)各一钱

【用法】上作一服。加生姜五片，大枣二枚，水煎，食远服。

【主治】喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七气为病，发则心腹刺痛不可忍，或外感风寒湿气作痛。

28574 加减七宝饮

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】恒山(醋制，炒) 槟榔 草果仁 甘草 厚朴(姜制) 乌梅 青蒿 知母各

等分

【用法】上吹咀。每服半两，水一碗，酒一盞，同煎至一大盞，露一宿，来日早晨烫温，去滓服。

【主治】一切疟疾，热多寒少者。

28575 加减七宝散

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】火消三钱 硼砂 磁石 明雄各一钱 全蝎一钱 枯矾 冰片各一分

【用法】上为细末。吹喉。

【主治】喉证，红肿痰盛，属阳证者。

28576 加减八风散

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】独活(去芦头) 防风(去叉) 黄耆(锉) 甘草(炙令赤色，锉)各一两一分 玄参 苦参 芎藭 秦艽(去苗土)各一两 白术(炒令紫色) 松脂各一两一分 蛇床子三分 黄连(去须) 芥子 天门冬(去心，焙)各一两半 丹参 人参 防己 芍药 白敛 细辛(去苗叶) 桂(去粗皮) 蒺藜各一两 葵藜子(炒，杵去尖) 枫香脂各一两一分 麻黄(去根节) 杏仁(去皮尖双仁，炒) 木通(锉) 甘菊花 白芷各一两 山茱萸一两一分 生干地黄(焙)二两 地骨皮 菖蒲各一两一分 磁石三两(以火烧通赤，入酒中淬十遍) 远志(去心)一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心用生姜蜜汤调下，晚再服。渐加至三服。

【主治】风毒疥癣。

28577 加减八正散

【方源】《医方类聚》卷二二四引《简易方》。

【组成】《和剂》八正散加茴香一撮

【用法】上每服三钱，水一中盞，煎至七分，热服。

【主治】妊娠心气壅，胎气八个月散坠，手足浮肿，急痛不安，难产。

28578 加减八正散

【方源】《保命歌括》卷二十六。

【组成】木通 滑石 瞿麦 车前子 白术 山梔子 防己 白茯苓各等分 甘草减半

【用法】上㕮咀。加灯心，水煎，食前服。

【主治】腰以下肿甚者。

【加减】大便不通，加大黄。

28579 加减八正散

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】瞿麦三钱 扁蓄三钱 木通四钱 滑石四钱 猪苓三钱 车前子四钱 泽泻三钱 通草二钱 淡竹叶三钱 桂心二钱 甘草梢二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】下焦瘀热，溺闭其传化之气，以致溺积膀胱，小便不通者。

28580 加减八味丸

【方源】《集验背疽方》。

【异名】加味八味丸（《直指》卷二十二）、加减八味地黄丸（《准绳·疡医》卷二）。

【组成】干熟地黄（焙，锉）二两 真山药（锉细，微妙） 山茱萸（去核取肉，焙干）各一两 肉桂（削去粗皮，锉，不见火）一两（别研，取半两净末，和入众药，余粗滓仍勿用） 泽泻（水洗，锉作块，无灰酒湿，瓦器盛盖，甑上蒸五次，锉，焙） 牡丹皮（去心枝杖，锉，炒） 白茯苓（去黑皮，锉，焙）各八钱 北真五味子（拣去枝杖，慢火炒至透，不得伤火）一两半（别研罗，和入众药。最要真者）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心无灰酒或盐汤任下。

【功用】补肾水，降心火，止燥渴。

①《集验背疽方》：降心火，生肾水，止渴；增益气血，生长肌肉，强健精神。②《医方类聚》引《澹寮》：免生痼疽。③《寿世保元》：久服必肥健而多子；晚年服此，不生痼疽诸毒，不患消渴。

【主治】肾水不足，心火上炎，津液亏损，

心烦燥渴，易生痼疽，寝汗发热，形体消瘦，口舌生疮，牙龈溃烂，咽喉作痛，或肾消小便频数，或肾虚火不归元，烘热咳嗽。

①《集验背疽方》：痼疽之后，转作渴疾，或未发疽人，先有渴症者。②《小儿痘疹方论》：小儿禀赋肾阴不足，或吐泻久病，津液亏损，或口舌生疮，两足发热，或痰气上涌，或手足厥冷。③《医方类聚》引《澹寮》：肾虚津乏，心烦燥渴。④《得效》：肾消，小便频数，白浊，阴痿弱，饮食不多，肌肤渐渐如削，或腿肿脚先瘦小。⑤《普济方》：或先患痼疽而才觉作渴，或有痼疽而无渴。⑥《外科理例》：疮痊后口干渴，甚则舌或黄，及口舌生疮不绝。⑦《准绳·类方》：肾水不足，虚火上炎，发热作渴，口舌生疮，或牙龈溃烂，咽喉作痛，或形体瘦悴，寝汗发热，五脏齐损。⑧《张氏医通》：肾虚火不归元，烘热咳嗽。

【方论选录】内真北五味子，最为得力，此一味独能生肾水、平补、降心火，大有功效。

【临证举例】①发热《内科摘要》：大尹沈用之不时发热，日饮冰水数碗。寒药二剂，热渴益甚，形体日瘦，尺脉洪大而数，时或无力。王太仆曰：热之不热，责其无火；寒之不寒，责其无水。又云：候热往来，是无火也；时作时止，是无水也。法当补肾，用加减八味丸，不月而愈。②发热《内科摘要》：州同韩用之年四十有六，时仲夏色欲过度，烦热作渴，饮水不绝，小便淋沥，大便秘结，唾痰如涌，面目俱赤，满舌生刺，两唇燥裂，遍身发热，或时如芒刺而无定处，两足心如烙，以冰折之作痛，脉洪而无论。此肾阴虚阳无所附，而发于外，非火也。盖大热而甚，寒之不寒，是无水也，当峻补其阴。遂以加减八味丸料一斤内肉桂一两，以水顿煎六碗，水冷与饮，半饷已用大半，睡觉而食温粥一碗，复睡至晚，乃以前药温饮一碗，乃睡至晓，食热粥二碗，诸症悉退。翌日畏寒，足冷至膝，诸症仍至，或以为伤寒。余曰：非也，大寒

而甚，热之不热，是无火也，阳气亦虚矣。急以八味丸一剂服之稍缓，四剂诸症复退。大便至十三日不通，以猪胆导之，诸症复作，急以十全大补汤数剂方应。③痢症作渴 《集验背疽方》：有一贵人病疽疾，未安而渴作，一日饮水数升，愚献此方，诸医失笑云：此药若能止渴，我辈当不复业医矣。诸医尽用木瓜、紫苏、乌梅、参、苓、百药煎等生津液、止渴之药，服多而渴愈甚。数日之后，茫无功效，不得已而用此药服之，三日渴止。今医多用醒脾、生津、止渴之药，误矣！而其疾本起于肾水枯竭，不能上润，是以心火上炎，不能既济，煎熬而生渴。今服八味丸，降其心火，生其肾水，则渴自止矣。④口舌生疮 《续名医类案》：薛立斋治一男子口舌糜烂，津液短少，眼目赤，小便数，痰涎壅盛，脚膝无力，或冷，或午后脚热，劳而愈盛，数年不愈。服加减八味丸而痊。

【备考】本方改为汤剂，名“加减八味汤”（见《医学心悟》）。

28581 加减八味丸

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】茯苓 山药各四两 山萸 丹皮 泽泻 五味 麦冬各三两 肉桂六钱 熟地八两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，空心淡盐汤送下。

【主治】痢症已溃未溃，口干作渴者。

28582 加减八味丸

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】熟地五两 附子三两（炮） 肉桂三两（去皮） 萸肉三两 泽泻一两半 当归三两 吴茱一两半（醋泡，炒） 阳起石三两（煨） 干姜一两半（炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，川椒汤送下。

【主治】阴内冰冷，不孕，脉细者。

【方论选录】熟地补先天之血，附子补真阳之火，萸肉涩精秘气，肉桂暖血温经，当归

养血脉以荣经脉，泽泻泻浊阴以清子宫，吴茱温肝逐冷，干姜暖胃祛寒，阳起石以壮阳暖子脏也。白蜜丸之，椒汤下之，使火壮阳回则寒冷消散而子宫温暖，何有阴冷之病，以致不孕之愆哉！

28583 加减八味丸

【方源】《会约》卷十一。

【组成】熟地八两 枣皮 淮山药各四两 茯苓三两（或不用） 附子四两 肉桂三两 补骨脂（盐炒）三两 杜仲（盐炒）三两 莲芯三两（少则用莲须） 牡蛎（煨，醋淬，如是者三次。净粉）三两 巴戟（去心，酒浸）四两 金樱子（去刺，半生者佳）三两

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】命门火衰，肾无关键，其淋如膏，不痛不涩，日夜频流，却不自知，两尺脉虚而涩。

【加减】或加菟丝子（酒蒸）四两。

28584 加减八味汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地一两 山茱萸五钱 丹皮五钱 泽泻二钱 茯苓三钱 山药五钱 麦冬五钱 北五味一钱 肉桂二钱

【用法】水煎服。

【主治】肾中水火两虚，耳中作痛，或痒发不已，或流臭水，作于交感之后，以凉物投入则快甚者。

28585 加减八味汤

《医学心悟》卷六。即《集验背疽方》“加减八味丸”改为汤剂。见该条。

28586 加减八味汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】熟地五钱 萸肉三钱 附子一两半（炮） 肉桂一钱半（去皮） 山药三钱（炒） 白芍一钱半（酒炒） 五味一钱半 益智三钱（盐水炒） 覆盆子三钱（炒）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】肾虚遗溺，脉弱者。

【方论选录】附子补火逐冷，肉桂暖血温

经，熟地补阴滋肾，萸肉秘气涩精，山药补脾阴以固下，白芍敛阴血以固经，益智补火通心，兼摄涎水，五味补肺滋肾，收敛津液，覆盆子益肾膀以缩小便也。水煎温服，使火壮阳回，则关门扃固而蓄泄有权，岂有遗溺之患乎！

28587 加减八物汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】人参 白术 茯苓 炙草 当归 川芎 白芍 陈皮 丹参 香附 丹皮各一钱

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】经行或前或后。

28588 加减八物汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】人参 白术 茯苓 归身 川芎 白芍 生地各一钱 炙甘草 木香各五分 青皮七分 香附（醋炒）一钱

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】妇人经水过后，虚中有滞，腹中痛者。

28589 加减八物汤

【方源】《保命歌括》卷二十四。

【组成】四物、四君加黄耆 升麻 柴胡 陈皮 枳壳 桔梗

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】下多亡阴而痞满者。

28590 加减八物汤

【方源】《便览》卷三。

【组成】人参 川芎 白术 白茯苓 白芍 陈皮 当归 甘草 香附 黄连 黄芩 山梔各等分

【用法】水煎服。

【主治】男子妇人肌体消瘦，气血俱虚，头眩目昏，脚腿软弱，四肢无力。

28591 加减八物汤

【方源】《回春》卷六。

【异名】加味八珍汤（《济阴纲目》卷三）、加味八物汤（《胎产要诀》卷上）。

【组成】当归 川芎 白芍（酒炒） 生地

黄 人参（去芦） 白术（去芦） 茯苓（去皮） 山药 杜仲（酒炒） 香附（炒） 各等分 甘草减半 乌梅一个

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎，食前温服。

【主治】妇人赤白带下。

【加减】肥人，加半夏；瘦人，加黄柏；饱闷，去人参，加砂仁；腹痛，加小茴、玄胡，去人参；冬，加煨干姜少许。

28592 加减八物汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 当归 白芍 熟地 石斛 苡仁 远志 秦艽 陈皮

【主治】虚阳上泛而致黄疸，但见身黄倦怠，肢体无力，既无血食酒汗之症，又无黄赤小便者。

28593 加减八物汤

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】人参三钱 白术 茯苓 甘草各五钱（炙） 白芍 当归身 陈皮 香附 牡丹皮各一钱

【用法】水煎，食前服。

【主治】脾胃虚弱，冲任损伤，气血不足，经来或前或后，愆期者。

28594 加减八物汤

【方源】《何氏济生论》卷八。

【组成】人参 白茯苓 熟地 小茴三钱 白术 川芎四钱 当归 白芍 香附五钱 甘草 黄芩 柴胡各二钱

【用法】每服七钱，加生姜三片，水煎服。

【主治】产后浮肿，气急潮热。

【加减】腹痛，加元胡索、干漆、枳壳各三钱；恶心，加良姜、砂仁各二钱；麻痹，加肉桂一钱；咳嗽，加五味、款冬、杏仁。

28595 加减八珍丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】八珍汤去川芎、白术，加黄连（炒）、阿胶（土炒）各三分，木香一分。

【用法】上为末，水为丸，如麻子大。炒米汤送下。多服佳。

【主治】小儿气血虚弱，久痢脱肛。

28596 加减八珍汤

【方源】《女科百问》卷下。

【组成】当归一钱半 川芎一钱 熟地(姜汁炒)五钱 白术一钱 白茯苓一钱 人参三分 益母草一钱 陈皮五分 砂仁五分

【用法】上㕮咀。水一钟半，煎七分，食前温服。二剂后，与益母丸间服，服益母丸用芎归汤送下。

【主治】产后乍寒乍热。

28597 加减八珍汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】人参 白术 白茯苓 炙草 归身 川芎 赤芍 熟地 玄胡索 香附

【用法】加生姜、大枣为引，水煎，食前服。

【主治】脾胃素弱，中气本虚，产后气乏血阻，败血虽少，但恶露不能尽下，腹痛乍痛乍止，痛亦不甚者。

28598 加减八珍汤

【方源】《广嗣纪要》卷十二。

【组成】人参 白术 白茯苓 炙草 当归 生地 白芍 阿胶各等分

【用法】水二钟，煎一钟，入阿胶，煎八分，食前服。

【主治】妊娠泻久不止。

【备考】如不止，兼服三物桃花丸。

28599 加减八珍汤

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】人参一钱 当归三钱 白芍二钱 生甘草一钱 茯苓三钱 白术五钱 黄耆三钱 熟地五钱 生地五钱 柴胡一钱 川芎八分 天花粉二钱

【用法】水煎服。先用六剂；去柴胡，加北五味子十粒，再服六剂。

【主治】疥疮脓窠。

【加减】有火者，加黄芩二钱。

28600 加减八珍汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】人参 白术三钱 茯苓一钱半 炙草一钱 当归三钱 白芍一钱半(酒炒) 熟地三钱 黄耆(蜜炒)五七钱 肉桂一钱 干姜(炒黄)八分 牛膝二钱 红花三分 益母草一两

【用法】加生姜、大枣为引，水煎服。次煎浓葱汤，令稳婆洗产户，使气上下通畅。更用菜油、滑石涂产户。

【主治】临产浆水来多，胎干不得下，肢体倦怠。

28601 加减人参丸

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 当归 阿胶 苏梗 桑寄生

【主治】受孕后，因色欲过甚，精血暗损，荫胎不足，胎系不固，胎不长成，而每致半产者。

28602 加减三气饮

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】当归身五钱(炒) 枸杞二钱(炒) 杜仲二钱(炒) 熟地三钱 木瓜三钱 茯苓一钱 白芍一钱(酒炒) 肉桂一钱 独活一钱 白芷一钱 炙草一钱 附片一钱

【用法】生姜三片为引。

【主治】风寒湿痹身痛，日久失治，气血消耗，虚实相兼者。

28603 加减三奇汤

【方源】《医学发明》卷四。

【组成】桔梗(去芦)半两 半夏(汤洗)七钱 陈皮(去白) 甘草 青皮(去白) 人参(去芦)各半两 杏仁三钱(研) 五味子四钱 紫苏叶 桑白皮各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水二大盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】咳嗽上气，痰涎喘促，胸膈不利。

28604 加减三奇汤

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】桔梗 陈皮(去白) 白茯苓 青

皮 苏子(炒) 人参 桑白皮(炒) 各五钱 半夏(面炒) 七钱 枳实(炒) 甘草(炙) 各三钱 杏仁十枚

【用法】上为末，姜汁煮神曲糊为丸，如黍米大。滚白水送下。

【主治】伤乳嗽，痰涌吐乳。

28605 加减三奇散

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】人参 知母 贝母 半夏 杏仁(生用) 马兜铃十个 麻黄(不去节) 各半两 天仙藤二两

【用法】上为粗末。每服三钱，用乌梅一枚，水二盏，蜜一匙，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】咳嗽上气，痰涎喘促，胸膈不利。

【宜忌】忌酒、醋、鸡、面、咸、酸、生冷等物。

28606 加减三拗汤

【方源】《朱氏集验方》卷五引梁国佐方。

【组成】麻黄半钱(不去节，沸汤洗，焙干，去毛) 杏仁(不去皮) 苦梗各二钱 甘草(生) 旋覆花(去蒂) 各半钱

【用法】上咬咀。每服一大钱，水一盏，加生姜一片，五味子数粒，竹叶一片，不可多，糯米数粒，煎至半盏，分作两次，食后温服。

【主治】伤风咳嗽。

28607 加减三拗汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】麻黄一钱 杏仁 桑白皮各七分 甘草五分 苏子 前胡各三分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】风寒喘。

【加减】痰盛，加南星、半夏；烦喘，加石膏；火喘，口干，加黄芩、瓜蒌仁、薄荷；寒喘，加细辛、肉桂；气喘，加兜铃、乌梅；气短而喘，去麻黄，加人参、茯苓。

28608 加减三拗汤

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【组成】麻黄(去根节) 三钱(水煮，去沫，

焙干) 桂枝二钱 杏仁七个(去皮尖，炒黄，另研如膏) 甘草(炙) 一钱

【用法】上为粗末，入杏膏拌匀。每服一钱，水六分，煎至四分，去滓温服，无时。以汗出为度。

【主治】感冒风邪，鼻塞声重，语音不出，或伤风头疼，目眩，四肢拘倦，咳嗽多痰，胸满气短。

【宜忌】自汗者不宜服之。

28609 加减三黄丸

《心印绀珠经》卷下。为《宣明论》卷四“神芎丸”之异名。见该条。

28610 加减三黄丸

《准绳·类方》卷五。为《千金》卷二十一引巴郡太守“三黄丸”之异名。见该条。

28611 加减三黄丸

《医部全录》卷四一五。为方出《千金》卷六，名见《卫生总微》卷十五“戎盐丸”之异名。见该条。

28612 加减三黄丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】大黄 黄芩 黄连 生地

【主治】消中。

28613 加减三黄汤

《圣济总录》卷十。为《千金》卷八引张仲景方“三黄汤”之异名。见该条。

28614 加减三黄汤

【方源】《洞天奥旨》卷十三。

【组成】石膏三钱 黄芩一钱 黄连一钱 黄柏一钱 炒栀子一钱五分 柴胡一钱 夏枯草五钱 天花粉二钱 赤芍三钱

【用法】水煎服。

【主治】眼丹胞。胃火沸腾，上炽于目，肉轮上生胞，红肿而作脓者。

28615 加减大安丸

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】陈皮(去白) 半夏 白茯苓 白术 枳实(炒) 桔梗各等分 苏子(炒) 甘草(炙) 莱菔子(炒) 各减半

【用法】上为末，姜汁煮神曲糊为丸，如麻

子大。淡姜汤送下。

【主治】伤乳喘嗽。

28616 加减天麻汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】半夏(姜汤泡七次)八分 白术(用腿白色不油者,微炒)七分 天麻(用坚实者,纸包,水湿煨熟)五分 神曲(炒)五分 南川芎七分(西芎不用) 泽泻五分 陈皮一钱 防风一分 茯苓五分 苍术(米泔制)三分 白芷二分 黄耆三分 人参(去芦)三分 甘草(炙)三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,黑枣二枚,煎至八分,食远服。

【主治】头目四肢麻木,饮食少用,不时眼黑。

28617 加减开邪散

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】甜白术五钱(土炒) 云苓五钱 制半夏三钱 青皮一钱五分 枳壳一钱(炒) 柴胡一钱 山楂三钱(炒) 草薢仁一钱(研)

【用法】煨姜三钱,大枣三枚为引。

【主治】疟疾,足太阳膀胱之疟与手太阳小肠合证,初病令人腰痛头重,寒从背起,先寒后热,熇熇喝喝,热止汗出,遍身骨节痠痛,小便短赤。

【加减】体虚脉弱者,加人参一钱,好肉桂心八分,另顿对服,贫人无力者,以上党参一两代之;恶心,加灶心土五钱;作泻,加炒白芍五钱;内热,小便短赤,加青蒿三钱;遍身骨节痠痛,加秦艽一钱五分;手足冷,青紫色,加桂枝二钱。

28618 加减木香丸

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】木香 白芍药 枳壳(去瓢,麸炒)各二分 槟榔四枚(细锉) 桂(去粗皮)半两 大黄(锉,炒)二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空腹酒送下,日午再服。渐加

至三十丸,以大便通利为度。

【主治】脚气,上气抬肩,喘冲心痛。

【备考】用乌豆汤濯脚后,服本方。

28619 加减木香散

【方源】《卫生宝鉴》卷十六。

【异名】木香散(《普济方》卷二〇八)。

【组成】木香 良姜 升麻(去腐) 人参(去芦) 槟榔各二钱半 神曲(炒)二钱 肉豆蔻 吴茱萸(泡) 缩砂仁 干姜(炮) 陈皮各半钱

【用法】上为粗末。每服四钱,水一盏半,煎至一盏,去滓,食前温服。

【主治】飧泄。

【备考】宜加白术。

28620 加减五皮饮

【方源】《锦京直指》卷二。

【组成】茯苓皮五钱 大腹皮三钱 丝瓜络一钱五 川朴一钱 炒车前三钱 冬瓜皮四钱 陈皮一钱五 炒桑皮二钱 广木香一钱 蒲种壳一两 地骷髅一两(先煎代水)

【功用】利水宽中。

【主治】肿从足起,自下升上,瘦短便泄,咳逆脘闷。

28621 加减五皮饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】茯苓皮三钱 腹皮 五加皮各二钱 桑枝五钱 防己二钱 苍术一钱半 建菖蒲五分 茵陈二钱

【用法】水煎,温服。

【功用】行水利湿。

【主治】妊娠水湿停积,胸满心悸,肢体浮肿,腰痠腿软,苔白腻,脉沉滑。

28622 加减五苓汤

《普济方》卷一九五。即《医方大成》卷六引《济生》“加减五苓散”。见该条。

28623 加减五苓汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】柴胡 陈皮 甘草 厚朴(炒) 山楂 白茯苓 白芍(炒) 麦芽(炒) 扁豆 猪苓

【用法】水煎服。

【主治】夏秋时霍乱吐泻，有伏暑在内，面赤唇红，作渴。

【备考】原书治上症，兼服六一散。

28624 加减五苓散

【方源】《普济方》卷二七五引《百一》。

【组成】沉香 檀香 生熟地黄 升麻 干葛 芍药 黄耆 黄芩 羚羊角 犀角 连翘 甘草 防风各等分

【用法】上咬咀。每服三钱，白水煎服；仍煎服何首乌散。

【主治】①《普济方》引《百一》：恶疮项上有痃，及漏疮。②《朱氏集验方》：一切脓疱、热疮及发背。

28625 加减五苓散

【方源】《医方大成》卷六引《济生》。

【异名】五苓散（《丹溪心法》卷三）。

【组成】赤茯苓（去皮） 猪苓（去皮） 泽泻 白术 茵陈各等分

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】饮酒、伏暑，郁发为疸，烦渴引饮，小便不利。

【备考】本方方名，《普济方》引作“加减五苓汤”。

28626 加减五苓散

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】木猪苓 白茯苓 白术 板桂各七钱 泽泻一两 南木香 丁香 沉香 槟榔各三钱 白豆蔻三钱半

【用法】上为细末。每服一钱半，煎白樟柳汤，空心温点服。

【主治】肿疾。

【加减】如要取水，加甘遂半钱在药内，利三五次，又当以匀气药止之。

28627 加减五苓散

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】猪苓 泽泻 白术 茯苓 肉桂 车前子 木通 枳壳 槟榔 甘草各一钱

滑石一钱 灯心十九茎

【用法】长流水顺取煎服，连进。以生为度。

【主治】初产，生二日艰难者。

28628 加减五苓散

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】猪苓 泽泻 白术 茯苓 肉桂 少许

【用法】加生姜、大枣，同煎服。

【功用】分理阴阳。

【主治】小儿吐泻。

【加减】吐泻并作，加藿香、木香、苍术；寒吐寒泻，则乳片不消，下利清白，腹痛，加煨干姜；腹痛，加煨芍药；热吐热泻，则吐利黄水，泻下如筒，加炒黄连、黄芩；久泻，加诃子、肉果；久吐，加丁香；宿食不消，吐泻馊酸腥臭，加山查、神曲、麦芽、枳壳；伤食甚者，加槟榔、草果；小便不利，加滑石；吐泻久而成虚渴，加人参、麦门冬、天花粉；脾胃受湿，倍加白术、半夏；饮食不进，加益智、大腹皮；虚胀，加卜子、大腹皮；胃口作痛，加草豆蔻、沉香、山查；胸膈饱闷，加枳壳；饮食不易消，加枳实；小便自利，去猪苓；生痰，去桂，加橘红；夏月暑泻甚者，加黄连、白扁豆；小腹痛，加盐炒茺萸；胃气不足，加人参、炒黄米、煨芍药。

28629 加减五苓散

【方源】《济阴纲目》卷九。

【组成】猪苓 泽泻 白术 茯苓 阿胶（炒）

【用法】上为粗末。每服四钱，用车前子、白茅根浓煎，温服。

【主治】妊娠尿血。

28630 加减五苓散

【方源】《济阳纲目》卷五十七。

【组成】人参 白术 赤茯苓 香薷 泽泻 猪苓 莲肉 麦冬（去心）各等分

【用法】上咬咀。每服四钱，水煎服。

【主治】心经伏暑，小便赤浊。

28631 加减五苓散

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白术二两 茯苓一两 泽泻三钱 薏仁三钱 猪苓草三钱 肉桂三钱

【用法】水煎服。

【主治】①《辨证录》：肾疽，身体面目俱黄，小便不利，不思饮食，不得卧。②《医学集成》：阴疽，手足皆冷，颜色晦暗者。

28632 加减五苓散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷五。

【组成】留白广皮三两（炒） 苍术四两（炒黄） 白术五两（炒黄） 白茯苓六两（焙） 甘草二两（炙） 白扁豆六两（炒黄） 泽泻二两（炒）

【用法】上为细末。每用黑砂糖调，煨姜汤下。

【主治】脾虚湿热作泻。

28633 加减五苓散

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】茯苓三钱 黄柏三钱 盐泽泻三钱 车前子四钱（炒） 瞿麦三钱 人中白五钱 甘草梢二钱 扁蓄三钱 木通三钱 猪苓四钱 桂心二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】淋证轻者。

【方论选录】此方用猪苓、茯苓甘淡利湿，瞿麦、扁蓄利水通淋；木通、车前引热下行，黄柏清下焦之热，泽泻能降浊泻湿，桂心使气化能出，草梢止茎中之痛，人中白为清热之圣药，用以清膀胱之热，从其类也，能引诸药直入膀胱，将湿热扫荡而去，此方用此一味，则画龙而点睛矣。

28634 加减五苓散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】桂木 白术 茅术各二钱 砂壳一钱半 云苓皮四钱 泽泻二钱 扁豆壳八钱 猪苓二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】温运脾阳，渗湿利水。

【主治】妊娠子肿，湿滞而兼脾虚，肢体面

目浮肿，胸闷不食，腰痠腿软，小便时少，苔白而腻，脉寸滑关濡。

28635 加减五拗汤

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】麻黄（连根节） 杏仁（留皮尖） 紫苏叶 苦梗 甘草各等分

【用法】上锉。加生姜，水煎服。得微汗止。

【功用】发散。

【主治】外感风寒，咳嗽，洒洒恶寒，鼻流清涕，或鼻塞。

28636 加减五味汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】橘红 桔梗 紫苏 五味 人参 麦冬 杏仁 桑皮

【用法】加生姜，水煎，磨沉香服。

【主治】喘而气促者。

28637 加减五积散

【方源】《医方类聚》卷九十八引《经验秘方》。

【组成】陈皮三两（去白） 桔梗六两（去芦） 枳壳三两（去瓢） 苍术（洗去皮，泔浸一宿）十二两 白芍药 白芷 川芎 当归（去芦，酒浸一宿） 肉桂（去粗皮） 半夏（汤泡七次） 白茯苓（去粗皮）各一两半 厚朴（去粗皮，姜制） 干姜（炮） 五加皮各二两 甘草一两半 木瓜三两 牛膝 茺莢各三两 真川乌一个（生用，带尖）

【用法】上㕮咀，除枳壳、肉桂外，炒黄，摊冷后和匀。每服四钱，加生姜三片，水盪半，无灰酒半杯，同煎至七分，空心服；如用酒浸七日后，早、午、晚各温饮一杯，尤妙。

【主治】脚气。

28638 加减五积散

【方源】《回春》卷六。

【组成】白芷 当归 川芎 陈皮 厚朴（姜汁炒） 苍术（米泔浸） 白芍（炒） 枳壳（麸炒） 桔梗（去芦） 半夏（姜制）各一钱 官桂五分 麻黄八分 甘草三分 羌活 独活 牛膝

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】妇人经行感冒，周身疼痛，手足痹麻，或生寒热，头痛目眩。

【备考】方中羌活、独活、牛膝用量原缺。

28639 加减小积散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十三。

【组成】茯苓 白芷 半夏 川芎 当归 陈皮 干姜 甘草 白芍 苍术 桔梗 桂枝 麻黄 厚朴

【主治】寒湿痛痹，身体烦疼，四肢挛痛，关节浮肿，痛有定处。

28640 加减小积散

【方源】《会约》卷六。

【组成】当归 白芍 苍术各一钱 麻黄 桔梗 羌活 荆芥 甘草各六分 陈皮 防风各七分 厚朴 枳壳 半夏 川芎 白芷各八分

【用法】加葱三茎，水煎服。

【主治】外感风寒湿热，目痛赤肿，太阳疼痛。

28641 加减小痹汤

【方源】《何氏济生论》卷一。

【组成】人参 茯苓 当归 白芍 川芎 各一钱（心、肝、肾三症加倍） 五味十五粒 白术一钱（脾症倍之） 细辛七分 甘草五分

【用法】加生姜三片，水煎，食远服。

【主治】痹证。

【加减】肝痹，加枣仁、柴胡；心痹，加远志、茯神、麦冬、犀角；脾痹，加厚朴、枳实、砂仁、神曲；肺痹，加半夏、紫菀、杏仁、麻黄；肾痹，加独活、官桂、杜仲、牛膝、黄耆、萆薢。

28642 加减小固丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】石斛 胡芦巴各二两 巴戟 苁蓉 山茱萸 菟丝子各三两 故纸二两半 小茴一两 附子五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

【主治】命门火衰，肾寒阴痿，元阳虚惫，阴沉于下，阳浮于上，水火不能既济。

【备考】《杂病源流犀烛》有山药三两。

28643 加减小消丸

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】人参 萝卜子 陈皮 厚朴 猪苓 泽泻各三钱 白术 茯苓 黄连 苍术 半夏 枳实各四钱 姜黄 炙甘草 砂仁 干姜各一钱 黄芩 山楂各五钱

【用法】水浸蒸饼为丸。每服二钱，淡姜汤送下。

【主治】中满气胀、鼓胀、水肿。

28644 加减小膝汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】桂心 瓜蒌 牛膝 瞿麦 川芎 归梢 枳壳 甘草 童便 麦藷

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】妊娠羸瘦或挟病，气血枯竭，既不能养胎，必不能安者，可用此下之。

28645 加减小麻汤

【方源】《永类铃方》卷十一。

【组成】升麻 粉葛 白芍 桔梗 羌活 甘草各等分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】大人、小儿伤风寒温疫，头痛寒热，斑疮未发，疑似之间。

28646 加减小麻汤

【方源】《种痘新书》卷四。

【组成】升麻一钱 防风六分 桔梗 川芎 陈皮各五钱 牛蒡 连翘各八分 山楂 柴胡各八分 蝉退四分 赤芍六分 甘草三分 木通五分

【主治】痘疮初热，外感风寒，憎寒壮热，咳嗽流涕，体性旺者。

28647 加减小麻汤

【方源】《痘疹会通》卷三。

【组成】升麻 赤芍 干葛 甘草 前胡 防风 桔梗 紫苏

【用法】水一钟半，加生姜一片，葱白二寸，

煎服。微汗为度。

【主治】无论痘与非痘，但见身热头痛，呵欠烦闷，睡中惊悸，嚏喷眼涩，鼻出清涕，耳凉骭凉，手足酸软者。

【加减】身热壮甚，腹胀喘满，加麻黄；惊搐时发，加木通、生地；烦渴，加花粉、黄芩，调辰砂郁金散三钱；衄血，加犀角、梔炭；便血，加桃仁、川连；溺涩，加木通、车前、大腹皮；闭结，加枳壳、川朴；秘结气喘，壮热烦躁，面目浮肿，舌苔甚粗，身热恶寒，四肢厥冷，加千里马；失血干呕，加芩、连、犀角；泄泻，加猪苓、泽泻；谵语狂妄，加石膏、知母，调辰砂郁金散；喉痛，加牛蒡子、元参、荆芥；咳嗽，加杏仁、枳壳；腹膨呕泻，鼻酸，加山楂、川朴、六曲；腹痛，加青皮、木香；腰痛，加羌活、独活。

28648 加减升葛汤

【方源】《治疗汇要》卷下。

【组成】升麻四分 葛根一钱 大贝母三钱 元参三钱 连翘二钱 天花粉一钱五分 金银花五钱 甘草一钱 黄芩一钱 归尾三钱 石膏三钱 薄荷一钱 芦根五钱

【主治】疮毒见阳明风热证候者。

28649 加减乌金散

【方源】《女科万金方》。

【组成】厚朴 柴胡 黄芩 麻黄各二钱 陈皮 当归 川芎 桔梗 茯苓 白芍 熟地各一钱五 羌活 草果 半夏各一钱 甘草九分

【用法】上分二剂。加生姜三片 葱三根，水煎，不拘时服。

【主治】产后败血虚弱，感冒风寒，发寒热，四肢痠痛，头昏目眩。

【加减】有汗，多川芎、当归、桂枝、白芍、熟地；有胀，多厚朴、陈皮；有热，多柴胡、黄芩；有寒，多苍术、草果、桂枝；有痰，多半夏、桔梗、茯苓；有头痛，多川芎、白芷、羌活。

28650 加减乌金散

【方源】《准绳·女科》卷五。

【组成】厚朴 柴胡 黄芩 麻黄各二钱 陈皮 当归 川芎 桔梗 茯苓各一钱五分 桂枝 苍术 白芷 枳壳各一钱 羌活 草果 半夏各二钱 甘草九分 白芍药 熟地黄各一钱五分

【用法】上锉为散，分作两服。每服用水一钟半，加生姜三片，葱三茎，煎至一钟，不拘时服。

【主治】①《准绳·女科》：产后寒热似疟。②《济阴纲目》汪淇注：三阴疟有错杂之邪者。

【加减】有汗，多当归、川芎、白芍药、熟地黄；有胀，多厚朴、陈皮；有热，多柴胡、黄芩；有寒，多苍术、草果 桂枝；有痰，多半夏、桔梗、茯苓；有头痛，多川芎、白芷、羌活；有泻，去枳壳、甘草；有余血块在腹，作潮热疼痛，加三棱、莪术，多用延胡索、八角、茴香；遍身痛，加羌活、独活；寒热往来，加黄芩、柴胡。

28651 加减乌金散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】柴胡八钱 桂枝两半 黄芩两半（酒炒） 厚朴两半 白芍两半（酒炒） 半夏两半（制） 甘草五钱 生姜十片 葱白十枚

【用法】上为散。每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】产后寒伤腠理，热遏胸中，寒热往来，胸满呕恶，脉数弦滞者。

【方论选录】桂枝温经散寒，黄芩清里泻热，柴胡疏腠理之邪，厚朴散胸中之满，半夏醒脾燥湿，白芍敛阴和营，生姜温胃散寒邪，葱白解表通阳气，甘草以缓中和胃也。为散水煎，使寒邪外解则退热自化，而胸中之阳气廓然，何胸满呕恶不退，往来寒热不定乎！

28652 加减乌药汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】乌药三钱 砂仁八分 延胡二钱 甘草一钱 木香一钱半 槟榔一钱 当归白芍各三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】理气和血。

【主治】气滞所致月经先期，在经行前后，腹胸胀甚，中有血块，舌淡，脉弦涩者。

【加减】不夹血块，去延胡；血行不畅，加川芎二钱。

28653 加减六合汤

【方源】《回春》卷六。

【异名】加味六合汤（《宋氏女科》）。

【组成】当归（酒洗）一钱 白芍（酒炒）八分 川芎（盐水浸）八分 熟地黄（酒洗，焙）一钱 橘红（盐水洗，去白）八分 白茯苓（去皮）七分 甘草（炙）四分 半夏（姜制）七分 贝母（去心，糯米拌炒）七分 白术（去芦）二钱 黄柏（酒浸）七分 知母（酒浸）七分 椿根皮（酒炒）一钱

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，空心热服。

【主治】妇人上有痰火，下有白带，腹痛。

【加减】若痰火盛，加桔芩七分，临卧服。

28654 加减六君汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】人参 茯苓 白芍各三钱 白术一两 香薷一钱 砂仁一粒 陈皮五分 半夏一钱

【用法】水煎服。

【主治】中暑，气不能升降，霍乱吐泻，角弓反张，寒热交作，心胸烦闷。

28655 加减六君汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】人参 白术（蜜炙）各八分 陈皮苍术（制） 藿香叶各一钱 茯苓 桔梗 炙甘草各五分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】子疟。妊娠患疟，寒热往来。

28656 加减六味丸

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】六味丸去山茱萸，加蒺藜四两。

【主治】阴虚咳嗽，吐血骨蒸，及童劳哺热消瘦。

【备考】亦可作膏。

28657 加减六味丸

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】大熟地（九蒸、晒） 大生地（酒洗）各三两 山药（乳蒸） 茯苓（乳蒸） 丹皮（酒蒸）各一两五钱 泽泻（盐水蒸）一两 当归（酒蒸） 白芍（酒炒） 柏子仁（去壳，隔纸炒） 丹参（酒蒸）各二两 自败龟版（浸去墙，童便炙酥，研为极细末） 远志（去心，甘草水泡，蒸）各四两

【用法】上为末，用金钗石斛四两、金银花十二两熬膏，和炼蜜为丸。每早服四钱，淡盐汤下。

【主治】痔疮，悬痈，脏毒。

28658 加减六味丸

【方源】《会约》卷十四。

【组成】熟地三五钱 山药二钱 茯苓一钱 枣皮一钱半 杜仲（盐水炒）二钱 枸杞二钱 五味三分

【用法】空心服。

【主治】妊妇肾虚腰痛，或入房不节，致伤胞系而痛，脉大而空，两尺更甚。

28659 加减六味丸

【方源】《外科证治全书》卷五。

【组成】六味地黄丸去泽泻、茯苓，加莲须、龙骨、线胶各一两。

【主治】肾虚梦遗，关元不闭。

28660 加减六味丸

【方源】《类证治裁》卷七。

【组成】熟地黄 茯苓 丹皮 山茱萸 山药 莲须 芡实 菟丝子各二两 龙骨 牡蛎 泽泻各一两 五味子五钱

【用法】蜜为丸服。

【功用】滋补下元。

【主治】劳倦伤中气，酒色伤肾阴，尿浊或

赤或白，尿短欠而无痛涩者。

28661 加减六味汤

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】熟地四钱 丹皮一钱五分 山萸（去核） 淮山药（炒）各二钱 白薇 白芍药 益智仁各一钱

【用法】水煎服。

【主治】虚人遗尿。

28662 加减六物丸

【方源】《外台》卷十一（注文）引《肘后方》。

【组成】栝楼根八分 麦门冬六分（去心） 知母五分 人参四分 苦参四分 土瓜根四分

【用法】上为末，以牛胆汁为丸，如小豆大。每服二十丸，麦粥汁送下，一日三次；未知，稍加至三十丸。

【主治】消渴热中。

【加减】咽干者，加麦门冬；舌干，加知母；胁下满，加人参；小便难，加苦参；小便数，加土瓜根，随患加之一分。

28663 加减六物汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎一钱 当归二钱 山药一钱五分 人参一钱 茯苓一钱 藿香五分 豆蔻 姜炭各四分 扁豆二钱 陈皮三分 炙甘草五分 姜二片

【主治】产后痛已除而呕不止，不纳谷者。

【加减】呕止，去豆蔻。

28664 加减六柱饮

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】人参 白茯苓 木香 肉豆蔻 诃子 益智仁 白芍药各等分

【用法】上咬咀。每服三钱，水煎服。

【主治】诸病坏证，久下脓血。

28665 加减火府丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】生干地黄（洗，切，焙）一两 木通一两半 黄连（去须）三分 黄芩（去黑心）一分 赤茯苓（去黑皮）半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸至十丸，食后温水送下。

【主治】心经蕴热，头目壅赤，小便秘涩。

28666 加减双解散

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】防风 荆芥 薄荷 桔梗 麻黄 黄芩 山梔 连翘 当归 芒消 大黄 赤芍 滑石 石膏各一钱 川芎 甘草各五分 白术八分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】时行赤眼，暴赤肿痛，白珠血片，甚至瘀血包珠。

【加减】大便滑，去大黄、芒消，加泽泻；有汗，去麻黄，加桂枝；咳嗽，加桑白皮、杏仁；痰多，加瓜蒌、贝母；两胁疼，加柴胡、青皮；食少，加陈皮、茯苓；身热，加羌活；脚腿疼，加防己、木香；脾虚，倍加白术，去石膏。

28667 加减双解散

《羊毛瘟证论》。为《寒温条辨》卷四“增损双解散”之异名。见该条。

28668 加减平阳汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】葛根三钱 云苓五钱 甜白术五钱 麦冬五钱 川贝母三钱（去心，研） 生石膏三钱 柴胡一钱 枳壳一钱五分 橘红一钱五分

【主治】疟疾。初病令人先寒洒淅，洒淅寒甚，发热头痛鼻干，渴欲饮水，目胸膈不得眠，甚则烦躁谵语，畏火，厌听人声喧哗，寒久乃热，热退汗出，喜见日月光火气，心乃快然，善饥而能食。

【加减】如体虚者，加人参一钱，贫人无力者，以上党参一两代之；如恶心，加广藿香三钱；如胃口饱闷作胀，加草蔻仁二钱，槟榔一钱五分；如寒多，加煨姜三钱，大枣三枚；如内热口渴，加知母二钱；如皮外热，加青蒿二钱；如作泻，加炒白芍五钱，车前子三钱。

28669 加减平胃散

【方源】《保命集》卷中。

【组成】白术 厚朴 陈皮各一两 甘草七钱 槟榔三钱 木香三钱 桃仁 黄连 人参 阿胶各半两 白茯苓(去皮)半两

【用法】上为细末。同平胃散煎服。

【主治】洩而便脓血,大肠泄也,四季通用。

【加减】血多,加桃仁;泄,加黄连;小便涩,加茯苓;气不下,后重,加槟榔、木香;腹痛,加芍药、甘草;脓,加阿胶;湿,加白术;脉洪,加大黄。

28670 加减平胃散

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】甘草(锉,炒)二两 厚朴(去粗皮,姜制炒香) 陈皮(去白)各三两二钱 苍术(去粗皮,米泔浸)五两

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,加生姜三片,干枣二枚,同煎至七分,去滓温服;或去姜、枣,带热服,空心食前;入盐一捻,沸汤点服亦得。

【功用】调气暖胃,化宿食,消痰饮,辟风寒冷湿四时不节之气。

【主治】脾胃不和,不思饮食,心腹胁肋胀满刺痛,口苦无味,胸满气短,呃逆恶心,噎气吞酸,面色萎黄,肌体瘦弱,怠惰嗜卧,体重节痛,常多自利,或发霍乱及五噎八痞,膈气反胃。

【加减】如小便赤涩,加白茯苓、泽泻,如米谷不化,饮食多伤,加枳实;如胸中气不快,心下痞气,加枳壳、木香;如脾胃因弱,不思饮食,加黄耆、人参;如心下痞闷腹胀者,加厚朴,甘草减半;如遇夏,则加炒黄芩;如遇雨水湿润时,加茯苓、泽泻;如遇有痰涎,加半夏、陈皮;凡加时,除苍术、厚朴外,依例加之。如服五钱,有痰,用半夏五分;如嗽,饮食减少,脉弦细,加当归、黄耆;如脉洪大缓,加黄芩、黄连;如大便硬,加大黄三钱,芒硝二钱,先嚼熟炒桃仁捣,以药送下。

28671 加减平胃散

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】苍术八两 厚朴 陈皮各五两 甘草三两 人参 茯苓各五两

【用法】上为细末。每服二钱,水一盞,加生姜二片,枣子二个,同煎至七分,去姜、枣,空心食前带热服;或入盐沸汤点服亦得。

【主治】脾胃不和。

28672 加减平胃散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】厚朴(炒) 陈皮 甘草 白芍(炒) 丹皮 黄芩(炒) 神曲(炒) 柴胡 使君子肉

【用法】生姜一片为引。

【主治】小儿脾胃郁热,作渴唇红,吐虫者。

28673 加减平胃散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】柴胡 厚朴 山楂肉 陈皮 甘草 神曲 青皮

【用法】水煎服。

【主治】小儿潮热,内有宿食,气壮唇红作渴。

28674 加减平胃散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】扁豆壳五钱 白术二钱 苍术一钱半 广皮一钱 云苓四钱 煨木香 建神曲各二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】调理脾胃以消食。

【主治】妊娠期内,饮食停滞,胃脘疼痛,延及腹部,口淡不思食,有时欲呕,噎气,脉弦滑,苔厚腻。

【加减】如腹痛下利作呕,加南藿香二钱,厚朴二钱、泽泻二钱;下利中央赤色粘液的,去苍术、扁豆壳,加黄连一钱,黄芩二钱,炒银花三钱,桔梗二钱;如夹黄色粘液的,去白术,加黄芩二钱,桔梗二钱;如夹白色粘液的,加广皮二钱,建菖蒲五分;胎动不安的,加炒艾叶三钱。

28675 加减正元丹

【方源】《广笔记》卷二。

【组成】香附一斤(同艾二两,醋浸二宿,分作四分,一分用盐水炒,一分酥炙,一分童便浸炒,一分和乳瓦上炒) 当归身(酒洗)五两 川芎二两 白芍药八两(酒浸,切片,半生半炒) 生地六两(酒洗) 阿胶四两(蛤粉炒成珠,无则鹿角胶代之) 枳壳三两(江西者良,半生半炒) 艾二两(用浸香附醋打糊饼,晒干) 青蒿子三两 山茱萸肉三两 银柴胡一两 五味子三两 鳖甲(醋炙如法)四两

【用法】上为末,米醋煮山药粉糊为丸,如梧桐子大。每服四钱,空腹淡醋汤吞下。

【主治】妇人月经不调,无子。

【宜忌】忌白莱菔。如经调后,觉经不行,恐有妊娠,即勿服。

【加减】如经后期,去青蒿子、银柴胡、鳖甲。

28676 加减正气散

【方源】《普济方》卷一四七引《卫生家宝》。

【组成】藿香叶 半夏(研细,用姜汁搜和,炙黄色) 厚朴(去皮,姜炙) 陈皮(去白) 甘草(炙) 白茯苓 草果子仁各等分

【用法】上为细末。每服二大钱,水一盞,加生姜三片,大枣一枚,煎七分,食前稍热服。

【主治】伤寒伤风,不论表里。

28677 加减正气散

【方源】《回春》卷三。

【组成】藿香 苍术(米泔浸炒) 厚朴(姜汁炒) 陈皮 砂仁 香附 半夏(姜汁炒) 甘草各等分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,大枣一枚,灯心一团,水煎,温服。

【主治】霍乱。

【加减】泻,加白术(炒)、山药、乌梅、炒米;呕吐同上;腹痛,加木香、茴香;饱闷,

加益智仁、大腹皮;发肿气喘,加苏子、桑白皮、木通、猪苓、大腹皮、木香,去甘草;小水短赤,加木通、猪苓、山梔、车前,去半夏、甘草;胸腹饱胀,或四肢浮肿,如不吐泻者,加萝卜子、枳壳、大腹皮、木通,去半夏、甘草;内热烦渴,加葛根、黄连、山梔、乌梅,去半夏、甘草;内寒手足冷,脉沉细,加干姜、官桂。

28678 加减玉女煎

《温病学释义》。为《温病条辨》卷一“玉女煎去牛膝熟地加细生地玄参方”之异名。见该条。

28679 加减玉容散

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】白芷一两五钱 白牵牛五钱 防风三钱 白丁香一两 甘松三钱 白细辛三钱 山柰一两 白莲蕊一两 檀香五钱 白僵蚕一两 白及三钱 麝香白一两 白薇三钱 鸽条白一两 团粉二两 白附子一两

【用法】上研极细末。每用少许,放手心内,以水调浓,搽搓面上,良久再用水洗净,一日二三次。

【主治】面风。

28680 加减术苓汤

【方源】《女科指南》。

【组成】人参 白术 茯苓 苍术 厚朴 泽泻 木通 陈皮 半夏 桑皮 白芍 紫苏

【用法】加生姜五片,水煎服。

【主治】身发浮肿,大便不实,及治肿胀、胃泄之症。

28681 加减甘桔汤

【方源】《瘡疹选要》。

【组成】桔梗 前胡 牛蒡子 杏仁 苏子 象贝母 橘红 羚羊角

【主治】瘡后感冒而呛者。

【加减】痰多者,加莱菔子、白芥子。

28682 加减甘桔汤

【方源】《外科十三方考》。

【组成】桔梗 元参 白芷 防风 赤芍

川芎 前胡 独活 连翘 荆芥 甘草各五分 丑牛 豆根 黄芩 射干 生地各五钱

【用法】竹叶七片为引，水煎，食后服。

【主治】喉风。喉咙肿痛，痛不可忍，一发如雷，水米不能下咽，生死危在顷刻，亦有延至六七日者。

【备考】内服中九丸，兼服加减甘桔汤及败毒散，若外面红肿者，以麻凉膏敷之，再吹加味冰硼散。

28683 加减甘露饮

【方源】方出《续本事》卷二，名见《医学纲目》卷二十五。

【组成】熟地黄 生地黄 天门冬（去心）黄芩 枇杷叶（去毛） 山茵陈 枳壳 金钗石斛 甘草各一两 犀角三钱

【用法】上为末。每服二钱，水一盞，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。小儿一服分作两服，更斟酌与之。

【主治】男子、妇人、小儿胃中客热，口臭，牙宣，赤眼，口疮，一切疮疹已散未散者。

【临证举例】牙宣《医学纲目》：予族中有一仆，牙宣口臭，牙齿渐至脱落，予与二服，立愈。

28684 加减甘露饮

【方源】《类证治裁》卷六。

【组成】人参 葛根 藿香 白术 茯苓 甘草 泽泻 木香 滑石 寒水石 石膏

【主治】胸胃郁热之口臭。

28685 加减小归饮

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】熟地六钱 萸肉 淮山药（炒）各二钱 肉苁蓉（酒洗淡）三钱 杞子二钱 肉桂（去皮，另炖）四分 附子（制）一钱 油当归三钱

【主治】阳虚阴结，而大便不通者。

28686 加减小归饮

【方源】《马培之医案》。

【组成】熟地黄四钱 杞子二钱 肉桂三分 杜仲三钱 当归二钱 菟丝子三钱 萸

肉一钱半 怀牛膝五钱

【主治】三阳不足，腰腿冷，足弱。

28687 加减小归饮

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】熟地六钱 萸肉二钱 淮山药二钱 肉苁蓉（酒洗淡） 当归各三钱 杞子二钱

【主治】阴虚阴结而大便不通者。

28688 加减小归饮

【方源】《马培之医案》。

【组成】大熟地四钱 龟板胶一钱半 山萸肉一钱半 云茯苓二钱 菟丝子三钱 鹿角胶一钱半 怀山药二钱

【主治】真阴不足，不能滋养营卫，腿腰痠痛。

28689 加减小归饮

【方源】《病科全书》。

【组成】熟地 萸肉 枸杞 茯苓 广陈皮各三钱 山药 半夏各二钱 三七 炙甘草各一钱 郁金钱半

【用法】水煎服。

【主治】瘰癧由内伤咳嗽日久而来者，名伤肺病。

28690 加减小归丸

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】当归一两（酒洗） 龙胆草一两（酒洗） 梔子仁一两（炒） 黄芩一两 大黄五钱（酒蒸） 芦荟五钱 青黛五钱 木香二钱半 柴胡五钱 青皮一两 胆星三钱 麝香五分

【用法】上为末，神曲糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，生姜汤送下，日进三服。一七后，用针砂酒以通其气。

【功用】聪耳泻火。

【宜忌】忌怒，戒色。

【备考】针砂酒：针砂一两，穿山甲末一钱，拌针砂养一昼夜，播出山甲，以酒一碗，将针砂浸三四日，噙酒口内，外用磁石一块，绵裹塞耳。

28691 加减龙荟丸

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】当归 川芎 陈皮 青皮各一钱 黄连(酒炒) 黄芩(酒炒)各一钱半 山梔仁 木香各五分 人参一钱 炙草一钱

【用法】上为细末,别用阿胶三钱,溶化作丸。陈米汤下。

【主治】小儿搐后变痢,表邪入里,风伤脾,便脓血。

【备考】先用小柴胡汤加大黄下之,后以加减龙荟丸主之。

28692 加减龙胆汤

【方源】《医部全录》卷四〇九。

【组成】龙胆草 柴胡 黄芩 麦门冬 防风 桔梗 赤芍 茯苓 甘草 大黄(煨,减半)一方用前胡

【用法】水煎服。得下即止。

【主治】小儿内热。

28693 加减归芍汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】生耆一钱半 潞参一钱半 白术一钱半(土炒) 云苓一钱半 归身一钱半(土炒) 白芍一钱半(炒) 秦艽一钱 地榆一钱(炒) 僵蚕一钱半(炒) 乌梅一钱半(去核) 胶珠一钱半 生草一钱

【用法】生姜三片,大枣三枚为引,水煎服。

【主治】一切痔漏肿痛,或大便下血,或因酒色过度,或用心太甚,皆属脾肺之虚。

28694 加减归脾汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参 当归 茯苓 白术 白芍各三钱 甘草 半夏各五分 川芎二钱 白豆蔻一粒 柴胡 远志 枣仁各一钱 麦冬五钱

【用法】水煎服。

【主治】劳倦伤脾,色白神怯,秋间发热头痛,吐泻食少,两目喜闭,喉哑昏昧,粥饮有碍,手常温住阴囊。

28695 加减归脾汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】人参 黄耆 枣仁(炒) 归身少许 白茯苓 木香少许 白芍(炒) 百合

【用法】大枣一枚为引,水煎服。

【主治】胎元不足,面白心慌,或泄泻盗汗。

28696 加减归脾汤

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】炙绵黄耆三钱 白术一钱五分 炙甘草五分 枣仁(炒)一钱 远志肉(炒) 广木香各八分 归身 茯神 党参各三钱 煨龙骨二钱 乌贼骨一钱

【用法】水煎服。

【主治】白淫、白淋、白带。

28697 加减归脾汤

【方源】《病科全书》。

【组成】党参 白术 炒枣仁 半夏 煨龙骨 煨牡蛎 龙眼肉各二钱 当归 白芍各三钱 远志 广陈皮各钱半 炙甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人忧郁内伤,初则或经水不调,久而或致闭不通,阴火上炎,皆生痼,此名伤肝痼。

28698 加减归脾汤

【方源】《性病》。

【组成】人参 龙眼肉 黄耆各二钱半 甘草五分 白术二钱半 茯苓二钱半 木香五分 当归 吴萸 姜艾 远志各一钱

【用法】水煎,温服。

【主治】经少色淡者。

28699 加减四七汤

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】苏梗八分 陈皮一钱五分 厚朴八分 南星二钱 半夏二钱 茯苓三钱 枳实一钱 青皮二钱 砂仁八分 益智仁一钱五分 白豆蔻八分 神曲(炒)二钱 槟榔一钱

【用法】上锉。加生姜,水煎服。

【主治】梅核气。

28700 加减四斤丸

【准绳·类方】卷四。为《三因》卷九“加味四斤丸”之异名。见该条。

28701 加减四物汤

【方源】《活人书》卷十九。

【异名】增损四物汤（《朱氏集验方》卷十）。

【组成】当归（切，焙） 川芎 熟干地黄 白芍药各一两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盞半，煎至八分，取六分清汁，带热服，每日二三次，以知为度；疾势甚大，散药不知，以四味各半两，细锉，以水四盞，煎至二盞半，去滓，分为四服，热吃，食前服，一日之中令尽，以和为度。平常产乳服至三腊止，如虚弱血脏不调，至一月止。

【主治】妊妇产前腹痛，及月事或多或少，或前或后，胎气不安，产后血块不散，或亡血过多，或恶露不下。

【加减】若妊妇下血，即入艾五七叶，阿胶末一钱匕；同煎，服如前法，如因虚致热，热与血搏，口舌干渴，欲饮水，加栝楼一两，麦门冬三分；腹中刺痛，恶物不下，加当归、芍药各一分；血崩，加地黄、蒲黄各一两；因热生风，加川芎一分，柴胡半两；身热脉躁，头昏项强，加柴胡、黄芩各半两；秘涩，加大黄半两，桃仁一分（炒）；滑泻，加桂、附各一分；发寒热，加干姜、牡丹皮、芍药各一分；呕，加白术、人参各半两；腹胀，加厚朴、枳实各一分；虚烦不得眠，加竹叶、人参各一分；躁，大渴，加知母、石膏各半两；水停心下，微吐逆，加猪苓、茯苓、防己各一分；虚寒状类伤寒，加人参、柴胡、防风各三分。

28702 加减四物汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷一。

【组成】木香 红花 丹皮 川芎 当归 秦艽 香附 益母草 熟地黄

【主治】妇人经行适来或断，断而复来，或五六日，或十余日，血滞而痛者。

【方论选录】此方四物去芍药之酸寒，加益母草之甘平，以补血虚；佐以木香、香附以

行气开郁，红花、丹皮以行血祛瘀，秦艽益肝胆，祛风，兼补厥阴血分不足也。

28703 加减四物汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】归尾 赤芍 川芎 生地 陈皮 半夏 人参 茯苓 干姜 香附 白芷 柴胡 丹皮 红花 益母草

【主治】产后气血虚损，阴阳不和，败血滞于经络所致之乍寒乍热，日夜无度，周身骨节疼痛。

【方论选录】是方四物补血，丹皮、柴胡、益母以退寒热；参、苓、陈、半，甘以补气；香附行气中之滞血；干姜、红花行经络之滞血，瘀血去，寒热自止。

28704 加减四物汤

【方源】《普济方》卷二四四引《海上方》。

【组成】川当归（洗，酒浸一宿，焙干称） 白芍药 熟干地黄（洗，焙干称） 附子（去皮，生用）各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一大盞，生姜三片，煎至七分，去滓温服。

【主治】脚气流注，四肢手指肿痛，不可屈伸。

28705 加减四物汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】加减羌活汤（《普济方》卷三五—）。

【组成】羌活 川芎 防风 香附子（炒） 白芷各一两 石膏二两半 细辛二钱 当归五钱 熟地黄一两 甘草五钱 苍术一两六钱（去皮）

【用法】上为粗末。每服一两，水煎服，不拘时候。

【主治】产后血虚、痰癖、寒厥之头痛。

【加减】如有汗者，是气弱头痛也，加芍药三两、桂一两半，加生姜煎；如痰癖头疼，加半夏三两、茯苓一两半，加生姜煎；如热厥头痛，又加白芷三两、石膏三两、知母一两半；寒厥头痛，加天麻三两、附子一两半，生

姜煎。

28706 加减四物汤

《医学纲目》卷二十五引东垣方。为《保命集》卷下“增损四物汤”之异名。见该条。

28707 加减四物汤

【方源】《景岳全书》卷五十七引东垣方。

【组成】当归 川芎 生地 侧柏叶各八分 枳壳(麸炒) 荆芥穗 槐花(炒) 甘草各四分 地榆 条芩 防风各六分 乌梅(肥者)三枚

【用法】水二钟,加生姜三片,煎八分,空心温服。

【主治】肠风下血。

【方论选录】《杏苑》:防风、荆芥,散肠脏之风毒;当归、川芎调血;地榆、生地、槐花、条芩凉下焦大肠之血热,枳壳以利大肠气;侧柏叶以止血;乌梅肉收大肠血热;甘草泻火和药性。

28708 加减四物汤

【方源】《济生》卷四。

【组成】侧柏叶 生地黄(洗) 当归(去芦,酒浸) 川芎各一两 枳壳(去瓢,炒) 荆芥穗 槐花(炒) 甘草(炙)各半两

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盞半,生姜三片,乌梅少许,煎至七分,空心、食前去滓温服。

【主治】肠风下血不止。

28709 加减四物汤

【方源】《济生》卷六。

【组成】川当归(去芦,酒浸,切,焙)一两 川芎一两 熟地黄(洗净)一两 白芍药一两 香附子(炒,去毛)一两半

【用法】上咬咀。每服四钱,水一盞半,加生姜五片,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】室女二七天癸至,有当时未至而后至者;有卒然暴下,淋漓不止;有若崩漏,失血过多,变生诸证者。

【加减】如血色鲜而不止者,去熟地黄,加

生地黄。

28710 加减四物汤

【方源】《直指》卷二十六。

【组成】当归 川芎 白芍药 干姜(炒)各半两 南木香 甘草(炒)各二钱半

【用法】上锉散。每服三钱,食前煎服。

【主治】血气不足,肢体乏力,或瘀血腹痛,或下血过多。

【加减】若腹不痛,则无瘀血,更加人参,又能益血。

28711 加减四物汤

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】四物汤半两 龙胆草六钱 汉防己三钱

【用法】上作一服。水一盞,煎至五七沸,去滓,热服。

【主治】赤眼。

28712 加减四物汤

【方源】《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》。

【组成】川当归 川芎 白芍药 黄芩 知母 香附子(微炒)各半两 生地黄一两 蒲黄三钱(微炒) 甘草二钱(炙) 侧柏叶(炙)半两

【用法】上为末。每服半两,水一盞半,柏叶一片,如掌大,茅根一寸长,十余根,煎至七分,去滓服,不拘时候。

【功用】凉心肺,顺气止血。

28713 加减四物汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】四物汤五钱 益元散二钱半

【用法】上和匀,用水酒各半盞,煎至八分,去滓,空心温服。

【主治】妇人冷热不调,阴阳不分,大小便相反。

28714 加减四物汤

【方源】《永类铃方》卷二十一。

【组成】生干地黄 赤芍 川芎 当归 防风各等分 黄芩减半

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】丹毒。

28715 加减四物汤

【得效】卷十一。为《朱氏集验方》卷九“加味四物汤”之异名。见该条。

28716 加减四物汤

【方源】《普济方》卷三四五引《便产须知》。

【组成】当归 川芎 生地黄 柴胡各等分

【用法】每服三钱，水一大盏，煎至六分，去滓服。

【主治】产后血虚发热，或日间明了，暮则发热憎寒。

28717 加减四物汤

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】当归 芍药 生地 茯神 酸枣仁(炒) 远志

【用法】水一钟半，煎至七分，通口服。

【主治】瘦人血少，怔忡无时，但觉心跳。

28718 加减四物汤

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】当归 川芎 白芍药 熟地黄各等分

【用法】水煎服。

【主治】妇人血病。

【加减】气虚头痛，加参、耆、白术、甘草；发热心烦，加芩、连、梔子；骨蒸劳热，加知母、黄柏、黄芩、银柴胡、地骨皮；虚劳气弱，咳嗽喘满，加人参、麦门冬、姜厚朴、枳壳；烦渴饮水，加石膏、知母；脐下虚冷，腰腹痛，加玄胡索、川楝子；血热烦躁，口苦舌干，加天花粉、麦门冬、黄芩；风虚眩晕，加秦艽、羌活；呕吐加白术、人参、藿香、姜连；中湿身重，加苍白术、白茯苓；筋骨肢节疼痛，加防风、羌活；血积块痛，加三棱、莪术、官桂、干漆、苏木、红花。

28719 加减四物汤

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 麦冬

紫草茸 防风 白芷 连翘 桔梗 甘草 牛蒡子 黄耆

【功用】补血泻火。

【主治】气实血虚，气至而血不至，痘疹起发，顶尖四围干枯无血色者。

28720 加减四物汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】当归 白芍 川芎 生地 黄柏 黄芩 熟地各等分

【用法】水一盞半，煎服。

【功用】补阴降火。

【主治】阴虚火动，此火起于九泉穴者。

【加减】甚者，加龟板；气虚者，加人参、白术、黄耆。

28721 加减四物汤

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】香附(炒)一钱 当归(酒洗) 川芎 枳壳(去瓢，炒) 柴胡 白芍(酒炒)各八分 黄芩 陈皮 三棱(醋炒) 莪术(醋炒)各六分 熟地黄一钱 白芷 玄胡索 小茴(酒炒) 白术(去芦，炒) 青皮(去瓢) 砂仁 肉桂 甘草各五分

【用法】上锉作一剂。水煎，空心热服。

【主治】室女十五六岁，误食生冷，经脉不通，日夜寒热，手足麻痹，饮食少进，头疼恶心呕吐，腹中忽然结一块痛者。

【加减】偏身痛，加羌活。

28722 加减四物汤

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】川芎 当归 芍药 地黄 防风 荆芥 甘草各等分 风尾草一握

【用法】水煎服。

【主治】一切无名疮肿。

28723 加减四物汤

【方源】《济阴纲目》卷九。

【组成】当归 白芍药 生地黄 黄芩各等分

【用法】上锉。每服八钱，水煎服。

【主治】妊妇伤寒，热极发斑，状如锦纹者。

28724 加减四物汤

【方源】《济阳纲目》卷七十五。

【组成】当归（酒洗）一钱半 芍药（酒炒） 杜仲（盐酒炒，去系）各一钱 川芎 香附 红花（酒洗）各八分 桃仁九个

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】瘀血腰痛，日轻夜重，脉涩者。

28725 加减四物汤

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】人参 甘草 茯苓 熟地黄 芍药 川芎 当归 天麻 黄芩 橘皮 梔子

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】血虚眩晕，因于吐衄崩漏，或产后失血，脾虚不能收摄荣气，诸血妄行，并夹风邪者。

28726 加减四物汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】大熟地一两（九蒸） 白芍三钱（酒炒） 当归五钱（酒洗） 川芎二钱（酒洗） 白术五钱（土炒） 黑芥穗三钱 山萸三钱（蒸） 续断一钱 甘草一钱

【用法】水煎服。四剂而血归经。十剂之后，加人参三钱，再服十剂，下月行经，适可而止矣。

【功用】补血归经。

【主治】妇女血虚，经水过多，行后复行，面色萎黄，身体倦怠，而困乏愈甚者。

【方论选录】方中四物汤乃补血之神品，加白术、荆芥，补中有利；加山萸、续断，止中有行；加甘草以调和诸品，使之各得其宜。所以血足而归经，归经而血自静矣。

28727 加减四物汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】熟地五钱（九蒸） 白芍三钱（生用） 当归一两（酒洗） 川芎一钱 山梔子一钱（炒） 山萸二钱（蒸，去核） 山药三钱（炒） 丹皮三钱（炒）

【用法】水煎服。

【功用】清胞中之火，补肾中之精。

【主治】妊妇口渴烦躁，舌上生疮，两唇肿裂，大便干结，数日不通，以致血热烁胎，腹疼小产者。

【宜忌】丹皮性极凉血，产后用之，最防阴凝之害，慎之。

28728 加减四物汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】川芎 当归 白芍 人参 黄耆 香附

【功用】补血益气。

【主治】经水不调，血色淡白。

【加减】如腹痛，加阿胶、艾叶、延胡索。

28729 加减四物汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】当归 白芍 川芎 熟地 桃仁 红花 元胡 香附 白术 木香 黄芩

【用法】水调服。

【主治】妇人经行腹痛。

28730 加减四物汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】生地 当归各一钱五分 川芎 白芍各一钱 谷精草 白蒺藜（炒） 海螵蛸各八分

【用法】水煎，热服。

【主治】血虚翳膜不退。

【加减】久病羞明，加天麻一钱。

28731 加减四物汤

【方源】《医部全录》卷二七四。

【组成】生地 当归 白芍 山梔 牡丹皮 贝母 知母 黄柏 陈皮 白术 甘草 元参 麦门冬各等分

【用法】水煎服。

【主治】一切失血。

【加减】如身热，加地骨皮、子芩；呕吐血，加知母、石膏，以泻胃火；衄咳血，加茅根、黄芩，以泻肺火；唾咯血，加梔、柏及肉桂少许，以泻肾火；吐衄不止，加炒黑干姜、柏叶、茜根、大小蓟；便血不止，加槐花、地榆、百草霜；溺血不止，倍山梔，加车前子、

小蓟、黄连，俱炒焦；诸失血久，加升麻、阿胶、人参，入童便、姜汁、韭汁。

28732 加减四物汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】人参 当归 麦门冬(去心) 生地 栀子(炒) 白芍药(炒)

【用法】水煎服。

【主治】痘疹收靥后，血虚烦躁者。

28733 加减四物汤

【方源】《金鉴》卷七十八。

【组成】生地黄 苦参 牛蒡子 薄荷 防风 当归 赤芍药 天花粉 连翘 荆芥 穗 川芎各一钱

【用法】上为粗末。以水二盏，煎至一盏，食后去滓温服。

【主治】风赤疮痍，起于两眦，其黑睛端然无恙，惟睑边烂而红赤，脾经风热上攻所致者。

28734 加减四物汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【异名】加味四物汤。

【组成】熟地黄 当归各三钱 川芎一钱 白芍二钱 山梔仁(炒) 柴胡 牡丹皮各一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后恶露不止，怒火伤肝而血不藏者；或产后血虚火燥之大便秘结。

28735 加减四物汤

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】川芎 当归 羌活 防风 香附(炒) 白芷 甘草各一钱 苍术(制) 细辛各七分

【用法】水煎，热服。

【主治】产后手足搐搦，咬牙头痛而昏晕者。

【加减】有汗气虚头痛，加白芍二钱，肉桂一钱五分，生姜三片；痰癖头痛，加制半夏三钱，茯苓一钱，生姜三片；热厥头痛，加白芷三钱，石膏二钱，知母一钱，寒厥头痛，

加天麻三钱，附子一钱五分，生姜三片。

【备考】先服加减四物汤，后服秦艽汤。

28736 加减四物汤

【方源】《医钞类编》卷八。

【组成】生地 白芍 当归 枸杞 牛膝 杜仲 黄柏 酸枣仁

【用法】水煎服。

【主治】阳旺阴衰，强中不收。

28737 加减四物汤

【方源】《治疹全书》卷下引《金镜录》。

【组成】生地 白芍 当归 桔梗 杏仁 桑皮 陈皮 姜仁

【主治】疹后痰嗽不止。

【加减】渴，加麦冬；喘，加苏子、葶苈。

28738 加减四物汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】生地 白芍 归尾 白术 苍术 黄芩 黄柏 陈皮 牛膝 甘草梢

【主治】妇人足后跟痛。

28739 加减四物汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】当归身一两(生) 熟地三钱 白芍三钱(生) 肉苁蓉一钱(洗净) 火麻仁三钱 怀牛膝三钱

【功用】滋阴养血。

【主治】年老、久病之人，阴血亏乏，津液不足，大便秘结。

28740 加减四顺饮

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】归尾 枳壳 木通 大黄(酒炒) 生地 紫草茸 麦冬 干葛 滑石 连翘 天花粉 薄荷叶

【用法】竹叶、灯心为引，水煎，热服。

【主治】天痘，火邪内甚，发热作渴，时时饮水，面赤唇焦，大便秘结，小便赤者。

28741 加减四逆汤

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】柴胡 芍药 甘草 枳实(麸炒黄) 各等分

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，粟米

一捻，煎至一盞，去滓溫服。

【主治】痢疾瀉痢并作者。

【加減】小便澀，加茯苓；痢后重，加薤白十寸。

28742 加減仙茅丸

【方源】《御藥院方》卷六。

【組成】仙茅二斤（米泔浸五日，去赤水，用銅刀子去皮，用銅刀銼碎，夏月只浸三日，陰干，不見日，干稱一斤） 蒼朮二斤（米泔浸五日，或二日亦得，去皮，焙干，秤一斤） 白茯苓（去皮）八兩 車前子十二兩 茴香（炒香）八兩 枸杞子一斤 生干地黄（焙干）四兩 熟地黄（焙干）四兩 柏子仁（微炒黃，搗）八兩

【用法】上為細末，酒煮面糊為丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心、食前溫酒下，日二服，漸加至七八十丸。

【功用】強筋骨，益精神，明目，黑鬚髮。

28743 加減生化湯

【方源】《傳習主女科·產后編》卷上。

【組成】川芎 麻黃根各一錢 當歸四錢 桂枝五分 人參一錢 炙草五分 羌活五分 天麻八分 附子一片 羚羊角八分

【主治】產后汗多變瘧，項強而身反，氣息如絕。

【備考】一方引用生薑一片，大棗一枚。

28744 加減生化湯

【方源】《傳習主女科·產后編》卷下。

【組成】川芎二錢 茯苓二錢 當歸四錢 黑姜五分 炙草五分 桃仁十粒 蓮子八枚

【用法】水煎，溫服。

【主治】產后塊未消，患瀉症。

28745 加減生化湯

【方源】《傳習主女科·產后編》卷下。

【組成】川芎二錢 當歸五錢 炙草五分 桃仁十二粒 茯苓一錢 陳皮四分 木香（磨）三分

【主治】產后七日內患痢。

【加減】紅痢腹痛，加砂仁八分。

28746 加減生化湯

【方源】《傳習主女科·產后編》卷下。

【組成】川芎一錢 當歸三錢 黑姜 砂仁 藿香各五分 淡竹葉七片

【用法】水煎，和姜汁二匙服。

【主治】產婦嘔逆不食。

28747 加減生化湯

【方源】《傳習主女科·產后編》卷下。

【組成】川芎一錢 當歸四錢 黑姜四分 炙草四分 防風七分 吳萸六分 白朮五分 桂枝七分

【主治】產后腹痛，無塊，遇風冷而作者。

28748 加減生化湯

【方源】《傳習主女科·產后編》卷下。

【組成】川芎一錢 當歸三錢 黑姜四分 炙草四分 桃仁十粒

【主治】產后虛中，感寒飲冷，其寒下攻，小腹作痛；又有血塊作痛；及產后血虛臍下痛者。

【備考】有塊痛者，本方送前胡散。亦治寒痛。

28749 加減生化湯

【方源】《胎產秘書》卷下。

【組成】川芎一錢 當歸二錢 人參 白朮各一錢 茯苓八分 青皮二分 炙草三分 藿香八分 烏梅二枚

【主治】產后類症。

【加減】渴，加麥冬一錢、五味三分；痰，加半夏八分、竹瀝、姜汁；汗，加黃耆、棗仁各一錢；傷米食，加神曲一錢、麥芽五分；傷肉食，加山楂、砂仁各五分。

28750 加減生化湯

【方源】《胎產秘書》卷下。

【組成】川芎一錢 當歸錢半 黑姜 炙甘草各五分 桃仁十粒 茯苓錢半 蓮肉 訶子各八分 生薑一片

【用法】水煎服。

【主治】產畢即瀉。

【加減】瀉不止，加人參三錢。

28751 加減生化湯

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】当归 川芎 炙甘草 桃仁 茯苓 陈皮 川连 木香

【主治】产后痢疾，因胎前暑湿未清，至产后尚腹痛滞下者。

【加减】白痢，加砂仁；赤痢，加山楂炭；赤白痢，加藿香、白芍；虚，加人参、焦术。

28752 加减生脉散

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】沙参三钱 麦冬三钱 五味子一钱 丹皮二钱 细生地三钱

【用法】水五杯，煮二杯，分温再服。

【主治】太阴伏暑，舌赤口渴汗多。

28753 加减白术散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】香薷 陈皮 厚朴 苍术 乌药 砂仁 藿香 干葛 竹茹 木瓜 人参 白术 茯苓 甘草 猪苓 泽泻

【主治】妊娠霍乱，阴阳清浊相干，甚则伤胎。

【加减】如心胸烦闷，加炒黄连、升麻。

28754 加减白术散

【方源】《蒿崖尊生》卷十一。

【组成】人参 茯苓 白术各二钱 枳壳 柴胡各一钱 藿香 干葛 五味 木香 炙甘草各一钱

【主治】消中，消谷善肌。

28755 加减白术散

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】葛根二钱 人参 白术 茯苓各一钱 木香 知母 黄柏 甘草各五分 五味子九粒

【主治】中消，饮食多，不甚渴，小便数，肌肉瘦；或消谷善饥者。

28756 加减白术膏

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】白术 当归 黄耆 柴胡 芍药 何首乌 陈皮 炙甘草

【用法】加大枣肉同煎取膏。

【主治】太阴经症。

【加减】恶寒，加羌活、升麻；热多，加山梔、黄芩、知母；寒多，加生姜；有痰，加半夏；口渴，加干葛；日晏一日，加升麻。

28757 加减白虎汤

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】石膏二钱半 知母一钱 甘草三分 人参七分 五味子十粒 黄柏七分 玄参五分

【用法】上锉一剂。加梗米一撮，水煎，食后服。

【主治】消渴，能食而消者。

28758 加减白虎汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】生地 石膏 麦冬 知母 贝母 黄芩 柴胡 甘草 竹叶心 车前

【用法】水煎服。

【主治】瘧疾，单热不寒。

28759 加减白通汤

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】附子一两（去皮脐） 干姜一两（炮） 官桂五钱 白术五钱 草豆蔻（煨） 甘草 人参 半夏（炮）各五钱

【用法】上咬咀。每服一两，水二盏半，加生姜五片、葱白五茎，煎至一盏二分，去滓，空心服。

【主治】形寒饮冷，大便自利，完谷不化，脐腹冷痛，足胫寒逆。

【方论选录】以附子大辛热，助阳退阴，温经散寒，故以为君；干姜、官桂辛甘大热，亦除寒湿，白术、半夏苦辛温胃燥脾湿，故为臣；草豆蔻、炙甘草、人参甘辛大温，温中益气；生姜辛大温，能除湿之邪；葱白辛温，以通上焦阳气，故以为佐。

28760 加减瓜蒌散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】大瓜蒌一个（子多者佳，少者用二个，杵烂） 当归三钱 没药二钱 乳香一钱 甘草三钱 金银花五钱 生姜五钱

【用法】用无灰酒二碗，煎一碗服。

【主治】内痢，脑疽，背腋诸毒，瘰癧，便毒，乳疽，乳岩。

【加减】将溃者，加皂角刺五钱；乳痈，脑疽，加蒲公英、土贝母各五钱。

【备考】未成者即消，已成者速溃。溃后用参，香补之。

28761 加减瓜蒂散

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】瓜蒂一两 藜芦一两 礞砂一两 郁金六钱

【用法】上为末。每服三钱，滚水冲服。

【主治】癫病。呆呆痴痴，喜怒哀乐，发之皆不中节，或忘前失后，或言语不伦，或无故喜怒，或忽泣忽止而体壮者。

28762 加减玄武汤

【方源】《履仙活人方》卷二。

【组成】白术 芍药各一两 白茯苓七钱 甘草三钱

【用法】上用生姜五片，煎至八分服。

【主治】伤寒数日未解，六脉浮沉，身疼头痛，恶寒潮热，咳嗽痰喘，遍身疼痛，手足冷痹，饮食少思，脏腑澹痢，四时伤寒。

【加减】头痛，加川芎、细辛；泄泻，加木香、藿香；咳嗽，加五味子、半夏；遍身疼痛，加官桂、川芎；有痰，加南星、陈皮；水泻，加军姜、木香；四肢疼痛，加附子（名真武汤）；心烦，加人参、麦门冬；热未除，加黄芩、干葛；三日无汗，如疟恶寒恶热，加麻黄、桂枝。

28763 加减圣功散

《痧症汇要》卷四。为《痧书》卷下“加减圣效散”之异名。见该条。

28764 加减圣神汤

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】人参一两 生黄耆一两 当归五钱 金银花二两 白芥子三钱 附子一钱

【主治】阴疽。

28765 加减圣效散

【方源】《痧书》卷下。

【异名】加减圣功散（《痧症汇要》卷四）。

【组成】卜子（炒） 砂仁（炒，研） 槟榔 陈皮 延胡各八钱 厚朴 防风 苍术 藁本 藿香叶 柴胡 独活 石菖蒲 泽泻 枳壳 细辛各五钱 草豆蔻（去壳）十个

【用法】上为粗末。每服五钱，水盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。取遍身微汗即愈。时气不和，空心饮之，可辟邪疫。

【主治】伤寒时疫风湿，阴阳两感，表里未辨，或外热内寒，或外寒内热，肢节拘急，头项腰脊疼痛，发热恶寒，呕逆喘咳，鼻塞声重，及饮食生冷，伤在胃脘，胸膈饱满，肠胁胀痛，心下痞结，手足逆冷，肠鸣泄泻，水谷不消，小溲不利。

28766 加减圣愈汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】党参（去芦，米炒）二钱 炙耆 归身 柴胡各一钱五分 熟地四钱 白芍（酒炒）一钱 炙草八分

【用法】加生姜一片，红枣一枚，水煎服。

【主治】寒热往来，非若疟疾之发，有定候者。

28767 加减发郁汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】升麻 葛根 羌活 柴胡 细辛 香附 葱白

【主治】郁火。重按烙手，轻按不觉，热在肌肉之内者；又有过食冷物，抑遏少阳之火于脾部者。

28768 加减地仙丹

【方源】《济生》卷三。

【组成】地龙（炒，去土） 五灵脂（去石） 乌药 白胶香（别研） 椒红（炒去汗） 威灵仙 木瓜（去瓢） 赤小豆（炒） 黑豆（炒，去皮） 天仙藤 川乌（炮，去皮） 五加皮 苍术（泔水浸，去黑皮，炒） 木鳖子（去壳油）各等分

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心用盐酒、盐汤送下。

【主治】风冷湿邪，留滞下焦，足膝拘挛，肿满疼痛，不能步履。

28769 加减地芝丸

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】生地黄四两 天门冬(烘热，去心，另焙) 枸杞子各三两 甘菊二两 熟地黄四两 麦门冬(去心) 山茱萸肉各三两 当归身二两 五味子一两

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，沸汤、温酒任下。

【主治】目能远视，不能近视。

28770 加减地黄丸

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】生地黄 熟地黄各半斤 牛膝当归各三两 枳壳二两 杏仁 羌活 防风各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒送下；淡盐汤亦可。

【主治】目为物伤。

【方论选录】以地黄补肾水真阴为君，夫肾水不足者，相火必盛，故生熟地黄退相火也；牛膝逐败血，当归益新血为臣；麸炒枳壳和胃气，谓胃为多血生血之所，是补其原；杏仁润燥，谓血少生燥为佐；羌活、防风，俱升发清利，大除风邪。为七情五贼饥饱劳役之病睛痛者，与当归养荣汤兼服，伤寒愈后之病，及血少血虚血亡之病，俱宜服也。

28771 加减地黄丸

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】生地(干者)一斤 熟地(干者)一斤 石斛(去苗) 防风(去芦) 枳壳(炒) 牛膝(酒洗) 杏仁(泡，去皮尖，麸炒黄，入瓦器研去油)各四两

【用法】上为细末，除杏霜另入，勿犯铁器，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心以豆淋酒送下；或饭饮及青盐汤亦可。

【功用】补肝益肾，驱风明目。

【主治】男妇肝藏积热，肝虚目暗，膜入水

轮，漏睛眵泪，眼见黑花，视物不明，混睛冷泪，翳膜遮障；及肾藏虚惫，肝受虚热；及远年近日，暴热赤眼，风毒气眼；兼治干湿脚气，消中消渴，及诸风气等疾。

【宜忌】忌一切动风毒等物。

28772 加减地黄丸

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】熟地四两 山药 山萸 茯苓 丹皮 五加皮 杜仲 牛膝 金银花 远志各二两 猪肾四个 紫河车一具

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心淡盐汤送下。

【功用】培元气。

【主治】大麻风将愈。

28773 加减地黄丸

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】熟地八两 山萸 山药各四两 茯苓三两 丹皮 百药煎 五味各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸服。

【主治】消渴症，夜间为甚。

28774 加减地黄丸

【方源】《活人方》卷一。

【组成】生地二两 熟地二两 茯苓二两 山药二两 天冬二两 麦冬二两 牛膝二两 枸杞(小茴、川椒、盐酒、芝麻四制) 人参四两 萸肉四两 当归一两 何首乌一两 丹皮五钱 泽泻五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。早空心吞服四五钱，白滚汤送下。

【功用】补阴壮水，培土生金，养血润燥。

【主治】虚劳，骨蒸内热。

28775 加减地黄丸

【方源】《验方新编》卷六。

【组成】熟地六两 山萸肉 真山药各四两 芡实 丹皮 云苓各二两 莲须一两 龙骨(生，研，水飞净)三钱 鱼鳔四两(蛤粉炒成珠)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四钱，早、晚熟汤送下。

【主治】遗精。

28776 加減地黄方

【方源】《医贯》卷六。

【组成】熟地四钱 山药二钱 山茱萸肉二钱 丹皮钱半 茯苓钱半 泽泻一钱 五味子一钱 柴胡一钱 芍药一钱 肉桂一钱

【用法】以水三钟，煎一钟服。

【主治】疟疾。见寒来如冰，热来如烙，惟面赤如脂，渴欲饮水者。

28777 加減地黄汤

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】生地 黄芩 栀子仁 赤芍 郁金

【用法】茅花为引，水煎，入车前草自然汁，细细服之。

【主治】小儿五脏积热所致鼻衄。

28778 加減地黄汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】熟地黄 牡丹皮 白茯苓 山茱萸 山药 泽泻 柴胡 白芍药

【主治】少阴经症。

【加减】热多，加山栀、知母、黄柏；寒多，加羌活、独活。

28779 加減地黄汤

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】人参 白术 肉桂 熟地 白芍 鳖甲 杜仲 牛膝 丹皮 黄肉

【用法】加桂圆肉，水煎服。

【主治】病后虚热。大病之后，日晡作热，一交子分即凉者。

28780 加減地黄汤

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】生地汁 丹皮 赤芍 柏叶（炒）桃仁（去皮尖） 茜草（炒） 白苓 化橘红 甘草 木香（另研）

【用法】茅根为引。

【主治】吐血初起，兼有外感，经用加減参苏饮后，次用本方。

28781 加減地黄汤

【方源】《类证治裁》卷八。

【组成】生地 山药 丹皮 黄肉 茯苓 杜仲 续断 五味 阿胶

【用法】水煎服。

【主治】妊娠肾亏火燥而为子烦者。

28782 加減芍药汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】芍药 地黄 当归 川芎 木香 黄连 黄芩 阿胶 地榆 甘草

【用法】水煎服。

【功用】调气和血。

【主治】便脓血。

【加减】里急后重，加枳壳、槟榔；发热，加软柴胡、升麻；腹中痛热甚者，加酒浸大黄；渴，加乌梅。

28783 加減芎辛汤

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】川芎 白芷 石膏 藁本 细辛 皂角 羌活 防风 荆芥 桔梗 薄荷 甘草 菊花 蔓荆子

【用法】上锉。水煎，食后服。

【主治】头风攻目。

28784 加減芎活汤

《育婴秘决》（汉阳忠信堂本）卷二。即原书湖北科技本同卷“加減芎活汤”。见该条。

28785 加減托里汤

【方源】《慈幼新书》卷五。

【组成】黄耆 人参 甘草 当归 白芍 白芷 山药 陈皮 木香 肉桂 糯米

【用法】临服加入乳半杯，酒酿数匙，同饮。

【主治】痘疮实热之症，服寒凉而冰伏，呕吐泻利，或皮薄浆清，或塌陷无神，血色不活，躁痒烦渴，唇舌淡白洁清，大便不固者。

【加减】泄泻，去当归，加升麻、诃子、肉蔻、炮姜、丁香；腹痛，加煨干姜、神曲；咳嗽，或烦渴，加麦冬、五味子；水泡作痒，加防风，倍白芷；抓烂，以松花粉或荞麦粉掩之；寒颤咬牙，四肢逆冷，唇舌淡白，加附子。

28786 加減至宝丹

【方源】《医方大成》卷五。

【组成】石膏（水煮三十沸）二两 当归

(酒浸) 槟榔各二两 骨碎补四两(去皮毛, 炒净三五次) 月宝砂五两(醋煮干) 白蒺藜(炒赤, 去尖刺用) 三两 木瓜(生用) 紫金皮(去骨, 生用) 各三两 淮乌三个(起一两者, 炒赤二两) 白胶香二两(净水煮十数沸, 冷水中讫)

【用法】上为末, 炼蜜为丸, 如弹子大。嚼生姜一块, 空心以好酒一盏送下。多以酒助药力, 服后一时久, 用外应散重蒸淋洗。

【功用】止疼痛, 除风湿。

【主治】脚气。

28787 加减当归散

【方源】《广嗣纪要》卷十一。

【组成】当归 香附(炒黑) 川芎各三两 青皮二两 吴茱萸(泡七次) 半两

【用法】上为末。每服一钱, 温酒调下, 不拘时候。

【主治】妊妇素有冷气, 心痛如刀刺, 及腹痛者。

28788 加减当归散

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】当归(酒洗) 吴茱萸(炒) 官桂(去皮) 川芎 干姜(炮) 木香 小茴香(炒) 各等分 甘草(炙)

【用法】上为末。每服五分至一钱, 盐汤调下。

【主治】受寒湿之气, 小腹绞痛, 外肾红肿, 并内钓腹痛、啼哭多。

【备考】方中甘草用量原缺。

28789 加减当归散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】川芎 当归 陈皮 吴茱萸 木香 香附 乌药 甘草 前胡 葱白 砂仁 紫苏

【用法】上锉一剂。加生姜五片, 水煎服。

【主治】妊娠中恶, 忽然心腹刺痛, 闷绝欲死。

28790 加减回阳汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】潞参一两 附子片五钱 干姜三钱 白术五钱(土炒) 上元桂一钱半(去皮, 研) 当归三钱(土炒) 扁豆五钱(炒) 半夏三钱 薏米五分(研) 茯神三钱 伏龙肝三钱

【用法】水煎服。

【主治】霍乱, 上吐下泻, 转筋阴寒, 眼胞塌陷, 汗出如水, 肢冷如冰。

28791 加减全虫方

【方源】方出《赵炳南临床经验集》, 名见《千家妙方》卷下。

【组成】全虫三钱 干生地五钱 当归四钱 赤芍三钱 白鲜皮五钱 蛇床子三钱 浮萍二钱 厚朴三钱 陈皮二钱 炙甘草三钱

【功用】活血散风止痒。

【主治】泛发性神经性皮炎。

【临证举例】泛发性神经性皮炎 关某, 女, 35岁。患者于一年多前开始于颈部、两下肢皮肤瘙痒逐渐发展至全身, 皮肤变粗变厚, 晚间瘙痒加重, 致使不能入睡, 饮食、二便尚可。曾多次治疗而不效。经检查颈部及双下肢伸侧面和躯干部有散发铜元大之皮损, 肥厚角化, 边缘不整齐, 皮纹变深, 颜色较平常皮肤稍黯, 表面有菲薄落屑, 皮损周围可见散在抓痕、血痂。脉沉弦, 舌苔薄白。诊后即投以“加减全虫方”。外用止痒药膏等配合。服药9剂后痒已止, 皮损变薄。

28792 加减全虫汤

【方源】《外伤科学》。

【组成】淡全蝎二钱 皂角刺四钱 苦参三钱 白鲜皮五钱 刺蒺藜五钱 枳壳三钱 威灵仙五钱 防风一钱五分 黄柏三钱

【用法】水煎服。

【功用】祛风除湿。

【主治】顽固性湿疹, 神经性皮炎, 银屑病等。

28793 加减冲和汤

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】柴胡五分 升麻三分 黄耆五分 半夏二分 黄芩 陈皮 人参 芍药 甘草 各二分半 当归 黄柏(酒浸)各三分

【用法】上锉，如麻豆大，作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，稍热服。

【功用】宣外阳，补脾胃，泻风木，实表里，养荣卫。

【主治】风邪中府之病。

【加减】如有自汗多者，加黄耆半钱；嗽者，加五味子二十粒。

28794 加减冲和汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】羌活冲和汤去苍术，加白术。

【主治】感冒风寒，发热恶寒，头疼骨节烦疼，脉厚紧，表证有汗者。

【加减】汗甚不止，加黄耆、桂枝、芍药；热多，加柴胡，去细辛。

28795 加减冲和汤

《东医宝鉴·杂病篇》卷三。为原书同卷“防风冲和汤”之异名。见该条。

28796 加减冲和汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】防风 羌活 黄芩 石膏 广皮 甘草

【主治】太阳病，项背强几几，汗出，反恶风者。

28797 加减守效丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【异名】加减守病丸(《幼幼集成》卷四)。

【组成】苍术(泔浸，盐炒) 南星(炮) 白芷 山楂肉各一两 川芎 橘核(炒) 半夏(洗) 神曲(炒) 各半两 海藻(洗垢) 吴萸(炒) 三钱半

【用法】上为细末，酒糊为丸，如麻子大。每服二十至五十丸，茴香汤送下。

【主治】小儿木肾，卵肿不痛者。

28798 加减守病丸

《幼幼集成》卷四。为《育婴秘诀》卷四“加减守效丸”之异名。见该条。

28799 加减安肾丸

【方源】《一盘珠》卷六。

【组成】枣仁二钱 山药二钱 熟地(瓦炙干)四钱 杜仲(盐水炒)二钱 续断二钱 当归二钱 石斛一钱 白术 阿胶各二钱 故纸(盐水炒) 白芍(酒炒)各一钱

【功用】滋阴安胎。

【主治】妊娠胎动不安，服养血安胎药皆不应者。

28800 加减安荣散

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 当归(酒洗)各二钱 麦冬二钱或三钱(去心) 白术一钱(土炒) 通草 茯苓皮各八分 生草五分

【用法】加灯心五分，水煎服。

【主治】孕妇小便短涩，或成淋漓。

【加减】如有痰，或怒动肝火，加酒炒枯黄芩七分，以清肺金。

【方论选录】此方人参补气，当归调血，麦冬清肺以滋肾源，通草、灯心利便通郁滞。

28801 加减安胃汤

【方源】《观聚方要补》卷三引《统旨》。

【组成】藿香 吴茱萸各一钱半 人参 苍术各二钱 陈皮三钱

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】脾胃虚寒，呕吐酸水。

28802 加减安胃汤

【方源】《风劳臌膈》。

【组成】人参 藿香 丁香 吴萸 白术 半夏 砂仁 陈皮 炮姜

【主治】脾气虚寒，饮食不能输化，浊气不能下降而作酸者。

28803 加减安胎饮

【方源】《得效》卷十四。

【组成】条参(去芦) 嫩黄耆(去芦) 扬芍药 大川芎 熟地黄(酒洗，切，炒) 川续断(去芦) 侧柏叶(炒) 阿胶(麸炒) 粉草 当归(去尾)各等分

【用法】上锉散。每服四钱，用水一盏半，加生姜三片，金、银器各一件煎之，去滓服。

【主治】妇人昼眠不起，倦于梳饰，恶心择食，怕闻饭气，但喜咸酸，止经候，气血弱者；兼治胎动不安，腹痛漏下，或胎奔上刺心，短气。

【加减】漏下不止，加熟艾一握；如胎动，口噤唇青，下利不止，亦用熟艾一两，酒三盏煮至二盏，去滓灌之。

28804 加减安胎饮

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】黄耆 甘草 人参 白术 艾叶 当归 川芎 熟地 续断 茯苓 白芍 香附 陈皮 杜仲

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】妊娠气血不足，数坠胎者。

28805 加减安胎饮

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】知母 杜仲 木香 续断 香附 陈皮 乌药 紫苏 白芍 川芎 当归 白术 酒芩

【主治】妊娠日月未足，因劳役怒气，调养不节，或房室所伤，或负重闪肭，或因宿有冷气，而痛如欲产者。

【加减】见血，加地榆、牡蛎、艾叶。

28806 加减安胎饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】人参 白术 麦冬 当归 熟地 天麻各二钱 防风 荆芥各一钱 陈皮 甘草各五分 生姜三片。

【用法】水煎服。

【主治】凡妊娠因吐血、衄血，或被伤失血，暮患口噤，项背强直，类中风症。

【加减】或加川贝一钱，天竺黄一钱。

28807 加减安胎饮

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参一钱五分 熟地 白术（土炒） 当归身（酒洗）各二钱 川芎八分 紫苏 陈皮 炙草各四分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】孕妇血虚气陷，腹中作痛，小腹重

坠者。

【加减】寒，加吴茱萸一钱，砂仁、干姜各五分。

28808 加减安神丸

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】黄耆（炙） 人参 归身 川芎 麦门冬（去心） 石菖蒲 木通 炙甘草 远志（去心，姜汁浸、焙干）各一钱 寒水石一钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，用苏叶三片，煎汤送下。每日取猪心连肺管处，割一半，煎汤饮之，以助药力。

【主治】小儿病搐，痰入心肺窍中，以致搐后失音者。

28809 加减安神丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】生地一两 黄连五钱 犀角三钱 甘草一钱

【用法】加朱砂末一钱，冲服。

【主治】癫证火盛者。

28810 加减异功散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】人参 白术 白茯苓 京芍药 黄耆 当归 桔梗 厚朴 紫草 粉草（炙）各三钱

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】小儿痘疹。

【加减】初加南木香二钱（煨），肉豆蔻（煨）；再加附子（炮）。随轻重加之。

28811 加减异功散

【方源】《广嗣纪要》卷十一。

【组成】人参 白术 白茯苓 炙甘草 陈皮 当归 黄芩 柴胡各等分

【用法】上为末。每服一钱，米饮送下，日三服。得汗而解。或加九肋鳖甲作丸，服之尤妙。

【主治】妊娠痰症日久者。

28812 加减异功散

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】人参 白术 甘草（炙）各一钱

陈皮 青皮 枳实(炒) 厚朴(炒) 半夏曲 黄连(姜汁炒) 一钱五分 木香 丁香 藿香叶

【用法】上为末，神曲糊丸，如麻子大。炒陈米汤送下。

【主治】小儿脾胃久伤，脘腹虚胀，按之则濡，扣之有声者。

【备考】方中陈皮、青皮、枳实、厚朴、半夏曲、木香、丁香、藿香叶用量原缺。

28813 加减导气丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】黄连二两(内一生姜汁拌炒，一用朴消水浸) 白芍药二两(一生一炒) 黄芩(炒) 木香 大黄 青皮 枳壳(面炒) 各二两

【用法】上为末，炼蜜少入姜汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，白汤送下。

【主治】泄痢。

28814 加减导气汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】白芍药二钱 大黄三钱(煎熟入) 黄连 厚朴(姜炒) 枳壳(面炒) 各一钱半 黄芩(炒) 木香各一钱 槟榔一钱 青皮七钱

【用法】上锉。加生姜三片，水二钟，煎七分，食前热服。

【主治】痢疾。

【加减】二贴后不愈，去槟榔、厚朴、枳壳、大黄，加白术一钱半，白茯苓、陈皮各一钱；血虚，加当归一钱，砂仁七分，黄连减五分；进数服食减，加炒神曲五分。

28815 加减导赤散

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】淮木通 车前子 瞿麦穗 白滑石 赤茯苓 黑梔仁 淡竹叶

【用法】灯心为引，水煎，热服。

【主治】小儿痘后余热，郁积膀胱，小便赤涩。

28816 加减导痰汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】南星 半夏(二药用牙皂，白矾，生姜煎汤浸透、炒干) 白茯苓(去皮) 陈皮(去白) 瓜蒌仁(去壳) 枳实(麸炒) 桔梗(去芦) 黄连(姜汁炒) 黄芩(去朽) 白术(去芦) 各一钱 人参(去芦) 当归(酒洗) 木香各五分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，临服入竹沥，姜汁同服。

【主治】中风痰涎壅盛，不能言语，牙关紧急有热者。

28817 加减导痰汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】南星(姜制) 半夏 陈皮(去白) 白茯苓(去皮) 瓜蒌仁 枳实(麸炒) 桔梗 山梔子 黄芩各一钱 黄连(姜炒) 一钱 甘草 木香五分(另研) 辰砂五分(为末)

【用法】上锉一剂。加生姜煎，入竹沥，姜汁，磨木香末，调辰砂同服。

【主治】痢证，痰涎壅盛者。

【备考】方中甘草用量原缺。

28818 加减导痰汤

【方源】《济阴纲目》卷二十二。

【组成】半夏 南星 橘红 茯苓 苍术 白术各一钱 甘草五分

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【主治】痰泻。

28819 加减阴疽汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】人参二钱 软柴胡一钱 白芍(酒炒) 八分 炙甘草八分 干姜一钱 法夏一钱 西党参(姜汁炒) 三钱

【主治】产后疽症，汗黄、眼黄，便黄如金汁者。

【宜忌】忌茵陈清寒等药。

【加减】阳亏者，加桂、附；阴虚者，加归身、熟地；微热者，加丹皮。

28820 加减防风汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】防风 荆芥 桔梗 甘草 薄荷 天花粉 半夏 连翘 山梔 黄芩 瓜蒌仁

【主治】外感风热痰壅。身热神昏，声如胸膈，喘急不宁，语言不便，脉浮数。

28821 加减防风汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】防风 荆芥 羌活 独活 白芍药 甘草 生姜 大枣

【主治】南方冬令，发热有汗，脉浮缓，或内有积热者。

【加减】症兼阳明，加干葛；兼少阳，加柴胡；口渴消水，加石膏、知母；里有积热，加梔、连；胸前饱满，加枳壳，广皮。

28822 加减防风汤

【来源】《伤寒大白》卷一。

【组成】防风 荆芥 羌活 独活 川芎 甘草 生姜 芍药 大枣

【主治】三时太阳经身痛、头痛、风湿等症。

28823 加减观音散

【方源】《医方大成》卷十引汤氏方。

【组成】白术（炒） 白扁豆（蒸） 人参（去芦） 白茯苓 干山药 甘草 黄耆（蜜水炙） 神曲（炒） 麦芽（炒） 香附子（炒去毛）各等分

【用法】上为末。每服一钱，空心米汤调下。

【功用】调理脾胃。

【主治】《普济方》：小儿食泻。

28824 加减观音散

【方源】《准绳·幼科》卷七。

【组成】黄耆 人参各二钱五分 木香 甘草（炙） 石莲（去心） 扁豆（炒） 茯苓 白术 全蝎 羌活各一钱 防风 天麻各二钱

【用法】上锉散。加生姜、大枣，水煎服。

【功用】止吐泻，截虚风。

28825 加减红绛散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】天麻 麻黄 全蝎 荆芥 蝉退

紫草 薄荷各等分

【用法】加葱，水煎，温服。

【主治】小儿痘感风寒，发热惊搐。

28826 加减寿星汤

【方源】《古今医鉴》卷七引吴都堂方。

【组成】南星四两（胆制） 半夏二两 防风一两 荆芥七钱 天麻一两 皂荚一两 香附一两 青皮一两 猪苓一两 泽泻一两 赤茯苓一两 白茯苓一两 白术一两 细辛七钱 麦门冬一两

【用法】上锉。每剂一两，加生姜，水煎服。

【主治】痫症。

28827 加减寿脾煎

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】党参四钱 白术三钱 当归 山药 干姜（炮） 莲肉 苍术 白芷各二钱 焦艾三钱

【用法】水煎服。

【功用】健脾升阳，温化寒湿。

【主治】脾阳不运，寒湿下注，带下色黑质薄，月经后期，色淡质清，所下经带有清冷感，面色萎黄无华，或四肢浮肿，气短神疲，手足不温，纳少便溏，舌淡苔白腻，脉沉迟。

28828 加减运痰汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参二钱 茯苓一两 益智仁一钱 菖蒲一钱 泽泻五钱 肉桂五分

【用法】水煎服。

【主治】痰症。由于火郁于心，终日吐痰，少用茶水则心下坚筑，短气恶水者。

28829 加减攻毒散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】羌活 独活 前胡 柴胡 当归 川芎 桔梗 茯苓 人参 甘草 薄荷叶 防风 荆芥 苍术 芍药 生地

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】小儿皮肤瘾疹，发而多痒，或不红者。

28830 加减苇茎汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】水芦根 冬瓜仁 杏仁 佩兰 连翘 银花 橘白

【主治】妊娠湿温之候，恶寒蕴热，头目昏重，肢节痠痛，胸膈痞闷，湿在阳明，已化热者。

28831 加减芩芍汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】白芍三钱 黄芩二钱 黄连一钱五分 厚朴二钱 木香一钱（煨） 广皮二钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次温服。

【主治】滞下已成，腹胀痛者。

【加减】肛坠者，加槟榔二钱；腹痛甚欲便，便后痛减，再痛再便者，白滞加附子一钱五分，酒炒大黄三钱；红滞加肉桂一钱五分，酒炒大黄三钱；红积加归尾一钱五分，红花一钱，桃仁二钱；舌浊脉实，有食积者，加查肉一钱五分，神曲二钱，枳壳一钱五分；湿重者，目黄、舌白、不渴，加茵陈三钱，白通草一钱，滑石一钱。

【宜忌】忌油腻生冷。

28832 加减苍莎饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】茅术二钱 云苓 香附各三钱 台乌二钱 炮姜一钱 红泽兰四钱 秦归 川芎 白木通各二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】温寒行滞，调气活血。

【主治】血寒气滞，月经后期，经色晦暗，量不太多，少腹痛，腹胀，微恶寒，苔白脉迟者。

28833 加减芦荟丸

【方源】《景岳全书》卷六十二。

【组成】芦荟（真者）五钱 宣黄连（去须） 胡黄连 枳实 青皮各二钱半 青黛 木香 山楂肉各二钱 麦芽（炒）三钱 麝一分 干虾蟆一只（酥炙）

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服七八分，量儿大小与之。

【主治】小儿肝脾疳积，腹胀，发热体瘦，热渴，大便不调，或瘰癧结核，耳内生疮，牙龈蚀烂，目生云翳。

28834 加减两地汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】生地五钱 玄参 白芍 地骨皮 各三钱 阿胶（化冲）二钱 焦艾 益母草 各三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】养阴清热。

【主治】阴虚夹热，月经过多，或过期数日不净，色红无块，舌红，苔黄或无苔，脉弦数。

【加减】腹痛色黑有块，去阿胶，加延胡炭二钱，蒲黄炭三钱；如经期持续过久，量不太多，原方加乌贼骨一两、茜草根（炒炭）二钱。

28835 加减连翘饮

【方源】《医钞类编》卷十八。

【组成】连翘 瞿麦 滑石 牛子 车前子 木通 防风 炒梔仁 黄芩（炒） 荆芥 当归 北柴胡 赤芍 蝉退 炙草

【用法】加竹叶、灯心，水煎服。

【功用】清热解毒。

【主治】小儿胎毒。

28836 加减利惊丸

【方源】《医部全录》卷四三二。

【组成】牵牛末一两 花青五钱 巴霜二钱半

【用法】面糊为丸，如豆大。每服二三丸，白汤送下。

【功用】下痰。

【主治】急惊痰甚。

28837 加减辛夷散

【方源】《得效》卷十。

【组成】茶调散加辛夷仁 藁本 苍耳子 木通各一两

【用法】上为末。淡茶清调下。

【主治】风热上壅，鼻流浊涕，或腥臭头昏，眉棱骨痛。

28838 加减羌活汤

【方源】《洁古家珍》。

【组成】羌活 川芎 防风 附子(炒) 熟地黄各一两 白芷一两半 石膏二两半 细辛二钱 当归五钱 甘草五钱(炒) 苍术(去粗皮)一两半

【用法】上为粗末。每次一两，水煎服，不拘时候。

【主治】产后血虚气弱头痛。或痰厥头痛。

【加减】如有汗者，是气弱头痛也，前方中加芍药三两，桂一两半，生姜煎；如痰癖头痛，加半夏三两，茯苓一两半，生姜煎；如热头痛，复加白芷三两，石膏三两，知母一两半；如寒厥头痛，加天麻三两，附子一两半，生姜煎。

28839 加减羌活汤

《普济方》卷三五一。为《保命集》卷下“加减四物汤”之异名。见该条。

28840 加减羌活汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】羌活 独活 防风 荆芥 柴胡 干葛 广皮 甘草

【主治】南方冬月，太阳经恶寒发热，头痛、脉浮，无汗者。

【加减】里有热或火令，加黄芩、石膏、知母；胸前饱闷，加枳壳、厚朴、桔梗；胁肋刺痛，加青皮、山梔、木通、苏梗；呕吐，加半夏；食滞，加山楂、麦芽、莱菔子；头痛，加川芎。

28841 加减羌活汤

【方源】《会约》卷三。

【组成】羌活一钱 防风一钱二分 苍术 川芎 白芷 甘草各一钱 陈皮八分 北细辛二三分 生姜一钱 葱白五寸

【用法】水煎，热服。取微汗。

【主治】伤风寒，头痛、身痛、憎寒、壮热、脉浮紧、无汗，及四时不正之气。

【加减】如自汗者，去苍术，加白术，或加黄耆；胸满，加枳壳、桔梗；呕逆，加半夏；

喘促，加杏仁。

28842 加减完带汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】泡参四钱 白芍 苍术各二钱 茵陈三钱 甘草 荆芥各一钱 柴胡八分 梔子 黄柏各二钱 黄连一钱

【用法】水煎，温服。

【功用】清热渗湿。

【主治】带下色青，质粘稠，且有臭气，面色苍黄，头胀眩重，精神疲惫，胸闷胁痛，不思饮食，舌淡红，苔黄腻，脉象弦数。

【加减】阴道痒者，加蛇床子、银花各二钱。

28843 加减补中汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】人参 黄耆 甘草 白术 砂仁 肉豆蔻 陈皮各等分

【用法】水煎服。

【主治】脾冷而食不磨者。

28844 加减补中汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】生地 人参 茯苓各三钱 白术 当归各五钱 甘草 半夏各一钱 黄耆一两 川芎一钱 柴胡一钱

【用法】水煎服。

【主治】终日高谈，连宵聚语，气血内伤，口干舌渴，精神倦怠，而感冒风寒，头痛鼻塞，气急作喘。

28845 加减补心丹

【方源】《顾松园医镜》卷十二。

【组成】生地 白芍 丹皮 枣仁 麦冬 茯神 远志 石斛

【用法】加竹叶、桂圆肉，调服朱砂末。

【功用】养血清心安神。

【主治】心虚有热而致的不寐。

【加减】有痰，加竹沥；心火甚者，加犀角、黄连；虚者，加人参。

28846 加减补心汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】白茯苓 归身 远志(去心) 黄柏 知母 生地黄 陈皮 酸枣仁(去皮)

麦门冬各五钱 人参 石菖蒲 白术 甘草各三钱 白芍药五钱(炒)

【用法】上锉。水二钟，煎八分，三六九日服，暑月尤宜。

【主治】①《扶寿精方》：诸虚健忘。②《寿世保元》：惊悸怔忡。

28847 加减补阴丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】熟地八两 菟丝子四两(盐酒浸一宿) 当归三两(酒浸) 白芍三两(炒) 锁阳三两(酥炙) 杜仲二两(炒) 牛膝四两(酒浸) 破故纸 枸杞各一两半 虎骨二两(酥炙) 龟板一两(酥炙) 黄柏二两(炒) 山药 人参 黄耆各二两 冬加干姜一两

【用法】上为末，猪骨髓入蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心盐汤送下。

【功用】《东医宝鉴·杂病篇》：补阴扶阳。

【主治】《东医宝鉴·杂病篇》：阴虚。

【备考】方中破故纸用量原缺，据《东医宝鉴·杂病篇》补。

28848 加减补益汤

【方源】《胎产秘书》。

【组成】黄耆一钱五分 人参一钱五分 归身一钱 炙甘草五分 焦术一钱 陈皮五分 升麻三分 川椒二十粒 乌梅二个 吴萸 川连各三分(均炒)

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】产后阴门发痒。

28849 加减补筋丸

【方源】《金鉴》卷八十九。

【组成】当归一两 熟地黄 白芍药各二两 红花 乳香 白云苓 骨碎补各一两 广陈皮二两 没药三钱 丁香五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每丸重三钱。用好无灰酒送下。

【主治】髌骨跌伤，手屈向后，骨缝裂开，不能抬举，时肿如椎者。

28850 加减阿胶汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】阿胶(炙令燥) 远志(去心)各二两 干姜(炮) 人参各一两 麻子仁(研) 三两 附子(炮裂，去皮脐)一枚 甘草(炙)一两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盞，煎至七分，去滓，空腹温服。

【主治】劳伤，小便利数。

28851 加减阿胶汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】炒栀子二钱 黄芩 侧柏叶各三钱 阿胶二钱 生地三钱 白芍一钱半

【用法】水煎，温服。

【功用】清热止血。

【主治】血热，胎漏下血，面红唇赤，手心发烧，咽干口渴，小便短黄，舌红苔黄而干，脉数而滑。

【加减】烦躁发热，漏血过久，加旱莲草三钱，黄连一钱。

28852 加减阿胶散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归 川芎 白芍 阿胶 黄芩 黄连 香薷 陈皮 枳壳 甘草 白茯苓 泽泻

【主治】妊娠下痢赤白。

【加减】如血痢，加地榆；白痢，加艾叶、木香；痢久虚人，加参、米、黄耆。

28853 加减鸡苏散

【方源】《产科发蒙》卷一。

【组成】薄荷 阿胶 地黄 柴胡 羚羊角 黄耆 甘草 茜根 黄芩 麦门冬 当归 伏龙肝

【用法】每服四钱，水一盞，加生姜三片，竹茹半鸡子大，煎至六分，温服。

【主治】妇人吐血，心烦昏闷。

28854 加减青娥丸

【方源】《景岳全书》卷五十三引《良方》。

【组成】破故(炒) 小茴(盐水炒) 胡芦巴(炒)各四两 杜仲三两(姜汁炒) 胡

桃肉二十五个 莲心一两 青盐(煨)五钱
穿山甲(酥炙)三钱五分

【用法】上为末，将胡桃肉捣烂，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】补诸虚不足，滋益阴阳，美容颜，健腰膝，止腰痛。

28855 加减青蒿丸

《普济方》卷二二六。为《圣济总录》卷九十三“青蒿丸”之异名。见该条。

28856 加减茅根汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】白茅根一两 瞿麦 车前 冬葵子 通草各一钱 鲤鱼齿一百个(为末)

【用法】水煎，入鱼齿末，空心温服。

【主治】产后淋，小便痛及血淋。

28857 加减抱龙丸

《普济方》卷三八七。为《小儿药证直诀》卷下“抱龙丸”之异名。见该条。

28858 加减拨云散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医林》。

【组成】羌活二两二钱半 甘菊一两九钱 木贼 白蒺藜各一两一钱半 防风 柴胡 苍术 枳壳 川芎 甘草各一两一钱 荆芥 薄荷各一两 蝉壳七钱半 石决明(煨制) 密蒙花各四钱。

【用法】上为末。每服二钱，食后薄荷汤调下。

【主治】诸般眼病。

28859 加减拨云散

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】防风六分 荆芥六分 蝉蜕八分 车前子一钱 木贼八分 柴胡六分 黄芩八分 青箱子八分 赤芍一钱 决明八分 甘草四分

【用法】老生姜一薄片为引。

【主治】眼睛黑珠有白点及成块，轻者为云，厚者为膜。

28860 加减拨云散

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】防风六分 蝉蜕六分 荆芥六分 车前子八分 木贼八分 归尾八分 黄芩八分 青箱子一钱 赤芍八分 菊花八分 生地一钱半(切片)。

【用法】生姜一薄片为引。

【主治】眼睛黑珠有云翳，眼角红及有赤丝者。

【加减】痛甚流泪生眵，眼胞下坠，或加川黄连八分(酒炒)。

28861 加减拨云散

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】木贼 荆芥 赤芍 蝉蜕 生地 木通 防风 连翘 甘草 车前子

【主治】小儿痘后，毒攻眼，生黑翳者。

【加减】如红肿者，加川黄连五分(酒炒)；不红不肿者，用兔屎丸。

28862 加减虎骨散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】虎胫骨三两 没药五钱。

【用法】上为末。每次二钱，温酒调服。

【主治】白虎历节诸风，骨节疼痛，昼夜不可忍者。

28863 加减肾气丸

【方源】《济生》卷一。

【组成】山茱萸(取肉) 白茯苓(去皮) 牡丹皮(去木) 熟地黄(酒蒸) 五味子 泽泻 鹿角(镑)、山药(锉，炒)各一两 沉香(不见火) 官桂(不见火)各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，盐汤、米饮任下。

【主治】①《济生》：劳伤肾经，肾水不足，心火自炎，口舌焦干，多渴而利，精神恍惚，面赤心烦，腰痛脚弱，肢体羸瘦，不能起止。

②《证治要诀类方》：三消。

【加减】弱甚者，加附子一两，兼进黄耆汤。

【备考】①本方方名，《证治要诀类方》引作“肾气丸”。②方中鹿角，《冯氏锦囊·杂症》作鹿茸。

28864 加减肾气汤

【方源】《凌临灵方》。

【组成】大熟地(缩砂仁四分拌) 丹皮 怀牛膝 怀山药 带皮苓 车前子 陈萸肉 泽泻 地枯髅

【用法】水煎服。另用上瑤桂,熟附片各五分,二味研末,饭丸分吞。

【主治】寒水侮脾,水肿胀满,以分利不应,且又见喘,脉形濡缓者。

28865 加减肾气汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】熟地 山萸 山药 茯苓 丹皮 泽泻 肉桂 熟附片 杜仲 破故纸 胡桃肉

【用法】水煎服。

【主治】肾阳衰微,腰部绵绵作痛。

28866 加减肾沥汤

【方源】《外台》卷十七引《小品》。

【组成】肾一具(猪羊并可用) 远志二两(去心) 麦门冬一升(去心) 人参一两 大枣四十枚 芎藭二两 五味子二两 当归二两 泽泻二两 桂心四两 干姜二两 干地黄三两 黄连二两 桑螵蛸三十枚 龙骨二两 甘草三两(炙)

【用法】上切。以水一斗五升,如常法煎取三升,去滓,分三服。

【主治】大虚内不足,小便数,嘘噓,焦燥饮水浆,膀胱引急。

【宜忌】忌海藻 菘菜,生葱,猪肉,茺萸等物。

28867 加减败毒散

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】防风一钱五分 荆芥二钱 羌活二钱 独活二钱 前胡二钱 升麻五分 干葛一钱 赤芍二钱 桔梗八分 川芎一钱五分 白芷二钱 薄荷八分 牛蒡子三钱 甘草八分 柴胡八分

【用法】上锉。加生姜、葱,水煎,热服出汗。

【主治】天行时疫,头面肿大,咽喉不利,

舌干口渴,憎寒壮热。四时瘟疫,皆可通用。

28868 加减固本丸

《医学入门》卷七。为《保命集》卷中“二丹丸”之异名。见该条。

28869 加减固本丸

【方源】《类证治裁》卷四。

【组成】熟地 天冬各一两半 麦冬 炙草 茯苓各一两 人参 菖蒲 远志 朱砂各五钱

【用法】蜜为丸服。

【主治】年老神衰健忘。

28870 加减和胃汤

【方源】《女科旨要》卷三。

【组成】厚朴五钱 陈皮 猪苓 泽泻 归尾 黄连 白芍 黄芩各三钱 地榆 豆蔻各二钱 升麻五分 甘草二钱

【用法】分五帖。水煎服。

【主治】产后因食热毒太过,后食生冷之物,冷热不和,而为痢疾,里急后重者。

28871 加减知母汤

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】知母二钱 黄耆(去芦) 白术 羌活 防风 明天麻 甘菊花 山茱萸肉 蔓荆子 藁本 川芎 当归各一钱 细辛 甘草各五分

【用法】水二钟,煎至一钟,分二次温服,一日三次。

【主治】游风证。

【加减】头面肿,加牛蒡子(炒,研)二钱。

28872 加减肥儿丸

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】黄耆(炙) 人参 白术 白茯苓 炙甘草 陈皮 青皮 当归 川芎 白芍 鳖甲(九肋,醋炙) 使君子肉 黄连 干糖(烧存性) 木香各等分

【用法】另取山药煮糊为丸,如黍米大。量儿加减,米汤送下。

【主治】瘦冷疳。

28873 加减肥气丸

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】柴胡 厚朴 人参 干姜各半两 川乌 巴豆霜各三钱 肉桂二钱 黄连一两 川椒 甘草各五分

【用法】上除巴豆霜外，同为细末，旋入巴霜研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服二丸，一日加一丸，二日加二丸，渐加至大便微溏，再从二丸加服，空心淡醋汤送下。

【主治】肝之积在左肋下，如覆杯，有头足，久不愈，令人咳逆，痞症连年不已，其脉弦而细。

【加减】秋冬，干生姜半钱，加厚朴一倍，减黄连一半。

28874 加减泻心汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】川连 黄芩 干姜 银花 查炭 白芍 木香汁

【主治】噤口痢。左脉细数，右手脉弦，干呕，腹痛，里急后重，积下不爽。

28875 加减泻白汤

《杏苑》卷五。为《卫生宝鉴》卷十二“加减泻白散”之异名。见该条。

28876 加减泻白汤

《济阳纲目》卷一〇五。为《卫生宝鉴》卷十一“加减泻白散”之异名。见该条。

28877 加减泻白散

【方源】《医学发明》卷四。

【组成】桑白皮一两 地骨皮七钱 甘草 陈皮 青皮（去白） 五味子 人参（去芦）各半两 白茯苓三钱

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盂半，入梗米十粒，同煎至一盂，去滓，食后大温服。

【主治】阴气在下，阳气在上，咳嗽呕吐喘促。

28878 加减泻白散

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【异名】泻白散（《赤水玄珠》卷三）、加减泻白汤（《济阳纲目》卷一〇五）。

【组成】桑白皮三钱 桔梗二钱 地骨皮 甘草（炙）各一钱半 知母七分 麦门冬 黄芩各五分 五味子二十个

【用法】上㕮咀。作一服，水二盂，煎至一盂，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】因膏粱而饮，劳心过度，肺气有伤，以致气出腥臭，唾涕稠粘，口舌干燥者。

【宜忌】忌酒、面、辛热之物。

【方论选录】因洪饮大热之气所伤，滋滋心火，刑于肺金，故以桑白皮、地骨皮苦微寒降肺中伏火而补气，用以为君；黄芩、知母苦寒，治气息腥臭，清利肺气，用以为臣；肺欲收，急食酸以收之，五味子之酸温以收肺气，麦门冬甘苦寒，治涕唾稠粘，口舌干燥，用以为佐；桔梗体轻辛温，治痰逆、利咽喉，为使也。

28879 加减泻白散

【方源】《卫生宝鉴》卷十二。

【异名】加减泻白汤（《杏苑》卷五）。

【组成】知母 陈皮（去白）各五钱 桑白皮一两 桔梗 地骨皮各五钱 青皮（去白） 甘草 黄芩各三钱

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二盂，煎至一盂，去滓，食后温服。

【主治】胸膈不利，烦热口干，时时咳嗽。

28880 加减泻白散

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】桑皮 知母 橘红 黄芩 贝母 桔梗 甘草 瓜蒌 地骨皮 苏子

【用法】水煎服。

【主治】烦热胸膈不利，上气喘促，口燥或咳者。

28881 加减泻白散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】桑白皮 地骨皮 甘草

【主治】痰结上焦。

【加减】风，加防风、荆芥；寒，加麻黄、桂枝。

28882 加减泻白散

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】桑白皮（蜜炒） 地骨皮 炒甘草

人参 白茯苓 肥知母 枯黄芩

【用法】梗米一撮为引。

【主治】肺炎喘嗽。

28883 加减泻肝汤

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】胆草三分 栀子一钱 黄芩一钱 泽泻一钱 柴胡七分 车前二钱 木通六分 生地一钱二分 甘草六分

【主治】缠腰火丹，累累如珠，色赤形如云片，上起风粟作痒，发热，属肝心二经风火者。

28884 加减泻青丸

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】防风 龙胆草 山栀 大黄 黄芩 川牛膝

【用法】水煎服。

【主治】高血压头痛，气实便秘，脉三部弦硬而大者。

28885 加减泻黄散

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【异名】泻黄散、加减黄连散（《普济方》卷三八六）。

【组成】黄连 茵陈各五分 黄柏 黄芩各四分 茯苓 栀子各三分 泽泻二分

【用法】上咬咀。都作一眼，水一大盏，煎至六分，去滓，稍热服。后一服减半，待五日再服。

【功用】退脾土，复肾水，降心火。

【主治】小儿季夏身热痿黄。身体蒸热，胸膈烦满，皮肤如溃橘之黄，眼中白睛亦黄，筋骨痿弱，不能行立。

【方论选录】《内经》云：土位之主，其泻以苦。又云：脾苦湿，急食苦以燥之，故用黄连、茵陈之苦寒，除湿热为君；肾欲坚，急食苦以坚之，故以黄柏之苦辛寒强筋骨为臣；湿热成烦，以苦泻之，故以黄芩、栀子之苦寒止烦除满为佐；湿淫于内，以淡泄之，故以茯苓、泽泻之甘淡利小便，导湿热为使也。

28886 加减泻黄散

【方源】《赤水玄珠》卷二十五。

【组成】山栀子一两 防风一两 藿香七钱 石膏五钱 连翘 甘草七钱半 升麻三钱

【用法】上药蜜酒微炒，水煎服。

【主治】心脾热甚口疮。

【加减】小便短涩，加滑石、木通。

【备考】方中连翘用量原缺。

28887 加减定命丹

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】蟾酥（酒浸一宿） 牛黄（别研） 朱砂（别研） 甘草（炙黄） 胡黄连 麝香（别研） 使君子肉 犀角屑 当归（洗焙） 天麻 细松烟墨（烧灰烟尽，地上出火毒） 羌活（去芦头）各一字 全蝎二枚（去毒，微炒） 棘刚子五枚（去壳取虫，微炒） 半夏（汤浸洗七遍） 天南星（牛胆制者） 附子（炮，去皮脐） 虎骨（蘸酒醋炙） 乌蛇（酒浸一宿，取肉炙干） 干姜（炮） 丁香 沉香 肉桂（去粗皮） 人参（去芦头） 白茯苓（去皮） 肉豆蔻（面裹煨熟） 白术各一钱

【用法】上为细末，煮粟米粥为丸，如黍米大，青黛为衣。每服十丸，荆芥汤送下，不拘时候。

【主治】小儿慢惊，痾痢，目睛斜视，身体强硬，昏塞如醉；及治胎风成痫，发歇不定，荏苒经时。

28888 加减定喘汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】白果仁七个 栗壳四钱 麻黄三钱 桑白皮四钱 龙骨三钱（煨） 海浮石三钱 紫蔻仁一钱 黄芩四钱 甘草二钱

【用法】元酒一钟，水二钟，煎服。

【主治】哮喘。脾胃不健，气血亏虚，气不相接而喘，血亏孤阳偏盛，遍体发热恶寒，午后更甚者。

【方论选录】此方以桑白皮为君，通行正气；佐以蔻仁、甘草调和胃气，麻黄发散滞气，黄芩清散燥气，用白果、栗壳、龙骨收

而敛之，使其壅滞之痰涎，皆从海浮石助麻黄从胸部而出。其痰既散，而喘亦自止矣。

28889 加减小喘汤

【方源】《医学碎金录》引《药理学讲义》。

【组成】麻黄三钱 紫菀三钱 款冬三钱 白果肉十个 川朴三钱 杏仁三钱 苏子三钱 半夏三钱 甘草二钱

【功用】定喘，镇咳，去痰。

【主治】痰饮属寒症者。

28890 加减小泻汤

【方源】《育婴秘诀》(湖北科技本)卷二。

【组成】人参 柴胡 黄芩 杏仁(去尖) 麻黄(不去根、芦)一分 甘草 川芎 葛根 升麻 羌活 当归 防风 石膏

【用法】上为细末。钩藤汤调服。

【功用】泻肝散风。

【主治】肝风角弓反张，似天钩，似痉者。

【备考】①本方方名，汉阳忠信堂本作“加减小活汤”。②方中除麻黄外，余药用量原缺。

28891 加减小建中汤

【方源】《普济方》卷二三一引《卫生家宝》。

【组成】黄耆二两或三两 白芍药六两 桂二两 甘草二两 加半夏五两

【用法】上为粗末。水一盂半，药末四钱，加生姜五片，大枣二枚，同煎至七分，去滓，入饴少许，再煎汤溶，食前温服。

【主治】虚劳咳嗽，痰盛，渐成劳疾。

【加减】腹胀者，去枣，加茯苓三两；心悸者，加柏子仁三两；潮热者，加柴胡三两；喘者，加五味子三两；自汗，加小麦同煎服。

28892 加减小建中汤

【方源】《医方大成》引汤氏方(见《医方类聚》卷二六三)。

【组成】熟地黄半两 白芍药三两 甘草一两半(炙) 黄耆一两 人参半两

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盂半，煎服。

【主治】伤寒，发热自汗，虚烦。

28893 加减小建中汤

【方源】《医统》卷三十九。

【组成】人参三两 炙甘草 官桂 白茯苓二两 当归四两 附子(炮) 厚朴(姜制) 各半两 龙骨一两 黄耆 麦门冬(去心)各三两 白芍药 生地黄各四两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盂半，加生姜五片，大枣二枚，饴少许，煎八分，温服。

【主治】肾虚，津液不能荣筋脉而瘵痼。

【备考】方中炙甘草、官桂用量原缺。

28894 加减小建中汤

【方源】《保命歌括》卷十九。

【组成】小建中汤一剂，加柴胡 木瓜各等分

【用法】水煎服。

【主治】吐利转筋，肋下痛，脉弦者。

28895 加减小参麦汤

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 知母 麦冬(去心) 梔子(炒)各一钱 瓜蒌根 犀角(磨)各八分 条芩 炙甘草各五分 大枣一枚

【用法】水煎服。

【主治】孕妇心神烦躁，壅热口干。

【加减】夏，加竹沥八分，姜汁少许。

28896 加减小参苏饮

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】前胡 白芷 桔梗 枳壳 甘草 防风 人参 紫苏叶 葛根 陈皮 羌活

【用法】竹叶为引，水煎服。

【主治】痘疹应出不出，外感风寒，头疼身痛，发热无汗，喜盖覆偎倚怀中。

28897 加减小参苏饮

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】陈皮 半夏 甘草 茯苓 紫苏 葛根 前胡 桔梗

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】风寒壮热，痰嗽，身痛，头疼。

28898 加减小参苏饮

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】苏叶六分 人参 陈皮 川芎

羌活 防风 荆芥各四分 桔梗 白芷 甘草各三分

【用法】加生姜三片，同煎带热服。但不可出汗。

【主治】痘为风寒束蔽而出不快者。

【加减】如在冬月，可加麻黄五分。

28899 加减参苏饮

【方源】《景岳全书》卷六十三。

【组成】苏叶一钱 干葛钱半 前胡八分 陈皮七分 枳壳六分 桔梗 甘草各四分

【用法】水一钟半，加生姜三片，水煎服。

【主治】痘疹初热见点，表邪未达，而元气强壮，或痘后感冒风寒者。

28900 加减参苏饮

【方源】《医林绳墨大全》卷四。

【组成】人参五分(虚甚者，加至一钱) 苏叶 干葛各一钱 去白陈皮 制半夏各五分 白茯苓六分 甘草三分 香附 白芷 小川芎各五分 防风五分

【用法】加生姜三片，同煎，热服取汗。

【主治】内伤挟外感，初起一二日，寒邪尚在表而体弱者。

28901 加减参苏饮

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】苏叶 杏仁 橘红各一钱 枳壳(炒)七分 前胡八分 木香三分 桔梗 干葛各七分 桑皮七分 甘草四分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠子嗽，因外感风寒者。

【加减】喘，加杏仁二钱。

28902 加减参苏饮

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】紫苏叶 前胡 粉葛 茯苓 枳壳 桔梗 甘草 生姜

【用法】葱白为引，水煎服。

【功用】发散解表，清胃火。

【主治】麻疹初出。

28903 加减参苏饮

【方源】《医钞类编》卷七引洪玉友方。

【组成】苏叶 陈皮 桔梗 前胡 木香

(另研) 茯苓三钱

【用法】童便为引，水煎服二剂。

【主治】吐血初起，兼外感者。

28904 加减参苏饮

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参 紫苏 陈皮 茯苓 甘草 枳壳 桔梗 前胡 黄芩各一钱 生姜六分 薄荷叶三分

【用法】水煎，热服。得微汗而解。

【主治】妊妇外冒风寒，咳嗽，发热恶寒，鼻塞流涕。

28905 加减参附汤

《校注妇人良方》卷八。为《妇人良方》卷八“加味参附汤”之异名。见该条。

28906 加减参紫饮

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】人参 紫苏 陈皮 白茯苓 甘草 枳壳 桔梗 前胡 黄芩各一钱

【用法】生姜为引，薄荷叶少许，水煎，食后服。得微汗而解。

【主治】妊娠咳嗽，初得之恶风寒，发热鼻塞，或流清涕者。

28907 加减驻景丸

【方源】《医方类聚》卷六十七引《简易方》。

【组成】车前子(略炒)三两 熟地黄(洗) 当归(去尾)各五两 楮实子(无翳膜则勿用) 川椒(炒，出火毒)各一两 五味子 枸杞子各二两 菟丝子(酒煮软漉壮，焙九分干)半斤

【用法】上末，蜜糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒、盐汤任下。

【主治】肝肾气虚，视物眵眵，血少气多，两目渐暗。

28908 加减枳术汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】白术 枳实 人参 广皮 甘草 熟砂仁 白茯苓

【主治】脾虚心腹时胀，饮食难消者。

28909 加减栀子汤

《云岐子脉诀》。为《伤寒论》“栀子豉汤”之异名。见该条。

28910 加减茱萸汤

【方源】《三因》卷十七。

【异名】加减吴茱萸汤（《局方》卷九续添诸局经验秘方）。

【组成】吴茱萸（汤洗七次，炒）一两半 桔梗 干姜（炮）炙甘草 麦门冬（去心）半夏（汤洗七次） 防风 细辛 当归（酒浸炒） 茯苓 牡丹皮 桂心各半两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盞半，煎七分，去滓，食前热服。

【主治】妇人脏气本虚，宿挟风冷，胸膈满痛，腹肋绞刺，呕吐恶心，饮食减少，身面虚浮，恶寒战栗，或泄痢不止，少气羸困，及因生产，脏气暴虚，邪冷内胜，宿疾转甚等。

28911 加减茱萸汤

【方源】《普济方》卷三四九。

【组成】吴茱萸一两半 枳壳 干姜 甘草 防风 细辛 麦门冬 当归（酒浸，焙） 茯苓 桂心 牡丹皮各半两 半夏（汤浸七次）各半两

【用法】上为末。每服四钱，水煎，食前热服。

【主治】产后肿证，脏气暴虚，外感内伤，血气留滞，或腹痛呕利。

28912 加减茯苓丸

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】陈皮（盐水炒）二两 半夏二两（用白矾、牙皂、生姜各一两煎汤，浸七日）白茯苓（去皮）一两五钱 风化消一两三钱 海桐皮（酒洗）一两 片子姜黄一两 木瓜一两 薄桂（去皮）五钱 甘草（炙）四钱 白芍（酒炒）二两 黄耆（盐水炒）二两

【用法】上为细末，姜汁、竹沥为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心白汤送下。

【主治】湿痰壅滞，经络不通，两臂作痛，不能梳洗，及治手足疼痛麻痹，行步艰难。

28913 加减茯苓汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】赤茯苓 橘红 泽泻 桑白皮 赤芍药 半夏（姜制） 石膏各一钱 白术一钱半 人参八分

【用法】上咬咀。加生姜五片，水煎熟，食前温服。

【主治】消渴，食已如饥，胃热消谷，阳明脉盛，心火上行，面黄肌瘦，胸满胁胀，小便赤涩。

【加减】如病甚，加大黄、朴消，须看人虚实加入。

28914 加减茯神汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】白茯神 当归 远志 麦冬 知母 羚羊角 犀角

【功用】活血安神。

【主治】内伤中风初起，脉细神清者。

【加减】心火旺，加黄连；肺火旺，加山梔；肝火旺，加丹皮、山梔；尺脉数，加黄柏；元气虚，加人参。

28915 加减茯苓汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】茯苓五钱 黄耆四钱 五味子二钱 菟丝饼八钱 人参三钱 焦术四钱 熟地五钱

【用法】水煎，温服。

【主治】阳强，即下消症。

【宜忌】宜戒色节欲，平心静养。

【方论选录】此方以人参大补元气，焦术大补脾胃，黄耆大补气血，茯苓渗湿益胃，五味子涩精生水，菟丝子强阴益阳，熟地补虚滋阴，服之气体足壮，自不下消矣。

28916 加减茹苓汤

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】猪苓七分 赤茯苓（去皮）一钱 泽泻七分 白术（去芦）五分 黄连五分 竹茹一钱 干葛七分 天花粉二钱 甘草五分

【用法】上锉，加生姜，水煎服。

【主治】小儿夏秋之月，霍乱吐泻，身热口

渴。

【加减】如热极，加石膏、知母；泻极，加升麻；腹痛，加炒白芍一钱，肉桂三分，寒痛亦加。

28917 加减胃风汤

【方源】《万氏家抄》卷六。

【组成】黄连（炒） 当归 川芎 白芍（炒） 苍术（炒） 薄荷 黄芩（炙） 防风 荆芥 连翘 地榆 乌梅 槐花 滑石

【用法】水煎服。

【主治】瘡后余毒未尽。

28918 加减胃风汤

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】人参 白术 茯苓 当归 川芎 白芍各等分 升麻 秦艽

【用法】上锉。入粟米一撮，同煎，温服。

【主治】风冷乘虚客于肠胃，水谷不化，泄泻注下，腹胁虚满，肠鸣疼痛，及肠胃湿毒，下如豆汁，或下瘀血。

【备考】方中升麻、秦艽用量原缺。

28919 加减胃苓汤

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】猪苓 泽泻 赤茯苓 白术 官桂 五加皮 苍术 陈皮 厚朴 甘草 木通 大腹皮 防风 生姜皮

【用法】灯心、生姜为引，取顺流水煎服。

【主治】症后汗出受风，遍身浮肿者。

28920 加减胃苓汤

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】猪苓 泽泻 白术 赤茯苓 官桂 五加皮 厚朴 陈皮 甘草 桑白皮 防风 藁本 羌活 人参

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】痘疮收靨已后，犯有风寒雨湿洗浴，以致四肢头面浮肿者。

28921 加减胃苓汤

【方源】《便览》卷二。

【组成】厚朴 苍术 泽泻 茯苓 猪苓 各八分 陈皮 甘草 白术 黄连各一钱

木香三分 槟榔五分

【用法】用水二钟，煎服。

【主治】暴痢赤白相杂，腹痛里急后重。

28922 加减胃苓汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】苍术（米泔制）一钱半 陈皮（去白）一钱 厚朴（姜制）八分 猪苓（去皮） 赤茯苓（去皮） 泽泻 白术（去芦）各一钱 大腹皮六分 神曲（炒）八分 甘草（炙）三分 山楂（去核）七分 香附（姜炒）六分 木瓜一钱 槟榔八分 砂仁七分

【用法】上锉一剂。水二钟，加生姜三片，灯心一团，煎至一钟，食远温服，滓再煎服。

【主治】水肿。

28923 加减胃苓汤

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】苍术（米泔制）一钱半 陈皮（去白）一钱 厚朴（姜炒）八分 甘草（炙）三分 猪苓八分 泽泻一钱 白术（去芦）一钱 赤茯苓（去皮）一钱 神曲（炒）八分 山楂（去核）七分 砂仁（炒）七分 香附（姜汁炒）六分 槟榔八分 木瓜一钱 大腹皮六分 藿香 半夏 萝卜子 三棱 莪术 青皮各七分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】黄胖，饮食无味，四肢无力，行步倦怠，脉涩而濡。

28924 加减胃苓汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】苍术一钱五分 陈皮一钱五分 厚朴（姜炒）八分 猪苓 泽泻各二钱 白术一钱五分 白茯苓三钱 藿香三钱 半夏（姜炒）二钱 大腹皮三钱 山楂二钱 萝卜子三钱 三棱一钱 莪术一钱 青皮一钱 甘草八分

【用法】上锉。加生姜三片，枣二枚，水煎，温服。

【主治】黄胖。饮食无味，四肢无力，行步

倦怠，脉涩而迟，或腹有积块胀满。

28925 加减胃苓汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】厚朴 陈皮 猪苓 泽泻 归尾 川连 白术 黄芩 白芍 肉豆蔻 地榆 升麻 甘草（一方加粟壳）

【用法】水煎服。

【主治】产后饮食冷热不调，而为痢疾，里急后重。

28926 加减胃苓汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】茅术二钱 砂仁一钱 扁豆壳四钱 防己 腹皮 生姜皮各二钱

【用法】水煎服。

【功用】温胃燥湿利水。

【主治】妇人子肿，湿滞兼胃寒，肢体肿胀，大便溏泻，小便不利，胸闷不欲食，时呕清水，口淡无味，苔白腻，脉沉。

28927 加减思食丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】神曲二两（炒黄） 大麦蘖二两（炒黄） 乌梅四两 干木瓜半两（切） 白茯苓（去皮） 拣甘草（细锉，炒）各二钱半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，细嚼，白汤送下，不拘时候。如渴时噙化一丸。

【功用】生津液，进饮食。

【主治】脾胃俱虚，不能消化水谷，胸膈痞闷，腹胁时胀，连年累月，食减嗜卧，口苦无味，虚羸少气；又治胸中有寒，饮食不下，反胃翻心，霍乱呕吐，及病后新虚不胜谷气，或因病气衰，食不复常。

28928 加减复脉汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引叶氏方。

【组成】北沙参 龙牙燕 陈阿胶 吉林参 麦冬 大生地 生白芍 清炙草 白毛石斛 鲜茅根

【功效】滋养阴液。

【主治】伏暑伤寒，在阴分精室，余热未清者。

28929 加减复脉汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【异名】复脉汤。

【组成】炙甘草六钱 干地黄六钱 生白芍六钱 麦冬五钱（不去心） 阿胶三钱 麻仁三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。剧者，加甘草至一两，地黄、白芍八钱，麦冬七钱。日三，夜一服。

【主治】温病邪在阳明久羁，或已下，或未下，身热面赤，口干舌燥，甚则齿黑唇烈，脉虚大，手足心热甚于手足背者；或温病已汗而不得汗，已下而热不退，六七日以外，脉尚躁盛者；或温病误用升散，脉结代，甚者脉两至者；或汗下后，口燥咽干，神倦欲眠，舌赤苔老者。

【方论选录】在仲景当日，立炙甘草汤（即复脉汤）治伤于寒者之结代，自有取于参、桂、姜、枣，复脉中之阳。今治伤于温者之阳亢阴竭，不得再补其阳也。乃于该方去参、桂、姜、枣之补阳，加白芍收三阴之阴，故云加减复脉汤。此用古法而不拘于古方，医者之化裁也。

28930 加减香苏饮

【方源】《普济方》卷一五一引《卫生家宝》。

【组成】香附子一两（炒，去毛） 陈皮半两（浸，去瓢） 甘草三分（炙） 紫苏一两（去梗） 麻黄一两（去节） 苍术半两（清水泔浸三宿，去皮） 桔梗一分（去芦头）

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气瘟疫，四时伤寒，头痛壮热，恶风无汗。

28931 加减香苏散

【方源】《医方大成》卷一引徐同知方。

【组成】香附子一两 紫苏梗二两 陈皮一两 甘草半两

【用法】上为锉散。每服四钱，水一盏半，煎至一盏，加生姜三片，连根葱白二茎，同煎，热服。

【主治】伤寒。

【加减】头痛，加川芎、白芷；头痛如斧劈，加石膏、连须葱头；偏正头风，加细辛、石膏、薄荷；太阳穴痛，加荆芥穗、石膏；伤风自汗，加桂枝；伤风无汗，加麻黄（去节），并干姜；伤风恶寒，加苍术；伤风发热不退，加柴胡、黄芩；伤风咳嗽不止，加半夏、杏仁；伤风胸膈痞塞，加制枳壳；伤风鼻塞声重，咽膈不和，加苦梗、旋覆花；伤风痰涎壅盛，加白附子、天南星；伤寒鼻内出血，加茅花；伤寒气促不安，加大腹皮、桑白皮；伤风鼻塞不通，头昏，加羌活、荆芥；伤风不解，吐血不时，加生地黄；伤风不解，耳内出脓疼痛，加羌活、荆芥；伤风不解，咽喉肿痛，加苦梗；伤风中脘寒，不思饮食，加去白青皮、枳壳；伤风呕吐，恶心不止，加丁香、半夏；伤风头晕眼花，头倒支持不住，加熟附子；伤风时作寒慄，加桂枝；伤风痰壅，呕恶不止，加白附子、旋覆花、半夏；伤风后时时作虚热不退，加人参；伤风饮食不能消化，加缩砂仁、青皮；伤风一向不解，作潮热，白日至日中不退，日日如是，加地骨皮、柴胡、人参、菴蒿；初感风寒，头痛作热，鼻塞声重，加羌活、川芎；感风腰痛，不能伸屈，加官桂、桃仁；感风浑身痛不止，加赤芍药、紫荆皮；感风头项强急，不能转动，加羌活、官桂；腹肚疼痛，加木香；腹肚疼痛刺不可忍，加姜黄、吴茱萸七粒；小腹疼痛无时，不可忍，加木香、姜、枣；妇人忽然大便痛肿，不能下地，加木香、木瓜、吴茱萸；妇人被性所苦，胸膈痞疼，肋肋刺痛，小便利急，加木香、枳壳；妇人被气疼所苦，加木香、缩砂仁；脾胃不和，中脘不快，加谷芽、神曲；伤食吐呃，泄泻腹痛，加干姜、木

香；心卒痛者，加延胡索，酒一盏；饮酒太过，忽遍身发痘，或两目昏黄，加山茵陈、山梔子；中酒吐恶，加乌梅、丁香；妇人经水将行，先作寒热，加苏木、红花；妇人产后作虚热不退，烦渴，加人参、地黄；产后发热不退，加人参、黄耆；产后腰疼不止，加当归、官桂；冷嗽不已，加干姜、五味子、杏仁；脾寒，加良姜、青皮、草果；脚气，加木香、木瓜、牛膝、紫荆皮、茺萸、川楝子；感风寒发热头痛，加不换金正气散；感寒头痛，壮热恶寒，身痛不能转动，加生料五积散；饮食不下，欲吐不吐，加丁香与萝卜子；感寒头痛，发热身疼，分阴阳，加败毒、石膏；妇人产后风，手脚疼痛，生料五积散、人参败毒散，加木瓜，不换金正气散，加生地黄、川芎同煎。

28932 加减香连汤

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】木香（不见火） 沉香（不见火） 檀香（不见火） 乳香（别研） 鸡舌香（别研） 藿香（去土） 赤芍药 连翘 桑寄生 当归（去芦） 升麻 蜜炙黄耆 大黄各等分

【用法】上为细末。酒、水合和，同煎服。

【主治】诸般痢症发背，已破未溃者。

【加减】视病轻重，加减小黄。

28933 加减香苓散

【方源】《回春》卷五。

【组成】枳壳 陈皮 香附 苍术 麻黄 香薷 猪苓 泽泻 木通 滑石 车前子 三棱 莪术 川楝子 玄胡索 甘草

【用法】上锉一剂。加生姜、葱白，水煎，热服。

【主治】偏坠气初起，憎寒壮热者。

28934 加减香棱丸

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】木香 丁香 三棱 枳壳 青皮 川楝肉各二钱 茴香一钱 台乌 香附 莪

术各三钱。

【用法】水煎，空腹时温服。

【功用】理气行滞，和血散瘀。

【主治】肝肾气郁，少腹两侧疼痛，拒按，有块不坚，推之可移，胸胁胀痛，痞满不思食，有时少腹中部亦痛，但不拒按，月经后期，舌淡苔白，脉弦滑。

【加减】月经后期量少，加当归、川芎各二钱；少腹两侧痛甚，按之有块，去丁香，加荔枝核、橘核各二钱；包块疼痛拒按，去丁香、木香、茴香、川楝，加桃仁、丹皮各二钱，姜黄三钱，乳香、没药、檀香各二钱；腰痠腹痛，加杜仲五钱，续断三钱。

【备考】本方方名，据剂型，当作加减香棱汤。

28935 加减香薷饮

【方源】《诚书》卷八。

【组成】葛根 茯苓 麦冬(去心) 香薷 橘红 花粉 厚朴(姜制) 木瓜 薄荷 藿香

【用法】水煎，冷服。

【主治】中暑。

【加减】渴极者，加滑石；窍血者，加酒炒黄连。

28936 加减香薷饮

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】香薷四钱 姜厚朴三钱 毛苍术五钱 陈皮四钱 广缩砂三钱 云茯苓四钱 人参二钱 生姜六钱(切片) 甘草二钱

【用法】水煎，温服。若呕吐，并宜用锋针刺尺泽紫脉出血。

【主治】伤暑脉象虚大，身热自汗，因倦懒言者。

【加减】若身热太甚，加葛根八钱；若呕吐，加伏龙肝六钱；若泄泻，加木通三钱，车前子四钱(炒)。

28937 加减保阴煎

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】生地二钱 黄芩一钱 白芍(酒

炒)一钱五分 柴胡一钱五分 丹皮 甘草各一钱 或加地骨皮二钱

【功用】凉血。

【主治】因伤寒劳役，怒气而发热，适遇经行，以致热入血室，或血不止，或血不行，令人昼则明了安静，夜则谵语如见鬼神。

28938 加减保和丸

【方源】《丹溪心法附余》卷三。

【组成】山楂 神曲(炒) 半夏(汤炮七次) 茯苓(去皮)各三两 陈皮(洗) 连翘 萝卜子各二两 白术五两 枳实(去皮)各一两 苍术(米泔浸，去粗皮) 香附(去皮，酒浸) 厚朴(姜汁制)三两 黄芩(去腐，酒浸，炒) 黄连(去须，酒浸，炒)各一两

【用法】上为细末，姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至七八十丸，食后茶汤饮下。

【功用】消痰利气，扶脾胃，进饮食。

28939 加减保和丸

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】麦芽 楂肉 枳实 苍术 厚朴 莱菔子 陈皮

【主治】食积泄泻。

【加减】脾虚，加白术；热积，加黄连；寒积，加炮姜；气滞，加木香。

28940 加减顺气散

【方源】《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。

【组成】天台乌药五两 桔梗(去芦) 川白芷 川芎 甘草(炙) 陈皮(去白) 白术各二两半 麻黄(去根节) 枳壳(去瓢，麸炒)各一两半 人参 木香各半两

【用法】上哎咀。每服七钱重，水二盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓，不拘时服。

【主治】男子中风瘫痪，手脚拳挛，口眼喎斜，半身不遂，头目眩晕，痰涎壅盛，语言蹇涩，行步艰辛。

28941 加减顺气散

【方源】《胎产良方》。

【组成】天麻一钱 僵蚕一钱 前胡一钱 川芎八分 苏子(炒)八分 桔梗七分 乌药六分 秦艽六分 枳壳五分 黄连六分 陈皮四分 甘草五分

【用法】生姜、竹沥为引，水煎服。

【主治】妊娠中风，手足麻木，口眼喎斜，半身不遂，或突然昏倒，痰涎壅盛，不省人事。

28942 加减追症饮

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生首乌四钱 当归二钱 生白芍三钱 清炙草五分 青蒿脑钱半 生鳖甲五钱 银胡钱半 地骨皮六钱 醋炒青皮八分。

【用法】井水、河水合煎服。

【主治】肝阴虚症。症发间日，日暮时寒轻热重，发于申酉时者，每至寅卯时微汗而热退，身体枯瘦，头目晕眩，肢节痠痛，筋脉拘挛，腰痛溺涩，少腹胀满，舌紫而赤，甚或红如胭脂者。

28943 加减胜湿丸

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】苍术 白芍 滑石 椿根皮 枳壳 甘草 茯苓 陈皮 党参 葛花 莲须

【主治】带下。因嗜酒好茶，湿热素盛，气虚脾弱，白带时下者。

28944 加减洗心散

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】黄连3克 炒栀子6克 黄芩9克 酒大黄 桔梗各6克 知母9克 元参6克 赤芍9克 归尾6克 荆芥1.5克

【功用】清心泻火，宣肺活瘀。

【主治】心中郁火乘肺，上攻气轮，而为火疳，初起颗粒从白睛深层向外隆起，形圆如榴子，或椭圆如扁豆，色暗红或呈紫红，按之则痛。继则颗粒渐大，色赤而痛，羞明流泪，视物不清。若病变侵及风轮，就会引起青睛疾患，重者波及水轮，导致视物昏蒙，甚

至失眠。

【加减】若颗粒增大，色赤而痛者，可加牡丹皮9克凉血活瘀退赤，加夏枯草9克清火散结止痛；若病变侵及风轮，引起风轮生翳者，可加秦皮3克，蜜蒙花6克以清肝退翳；若兼瞳神细小，神光昏暗，视物昏蒙者，可加青箱子3克，酒生地12克，滋阴清肝。青箱子且有扩大瞳神之功。

【方论选录】方中黄连、炒栀子清心泻火；黄芩、知母清泻肺火，且有知母之润，以免火邪伤阴；酒大黄清泻大肠，实为脏病腑取，意在泻肺；桔梗宣肺散结，使邪火得以疏散；元参滋肾养阴，以免火邪伤及神水；赤芍、归尾活瘀通络，引血下行；荆芥一则助桔梗宣肺散结，二则助赤芍、归尾活瘀通络。

【临证举例】火疳 袁某，女，34岁。1971年3月5日初诊：左目赤痛3月余，曾在当地医院诊断为巩膜炎，经用青链霉素肌肉注射，局部滴用可的松，药后症减，停药即发，自觉羞明、流泪、胀痛、视物不清。检查，左眼白睛内侧有一暗红色隆起，风轮内侧边缘有云翳一片。此为火疳合并青睛生翳。给加洗心散加秦皮3克，密蒙花9克，增元参3克，服药15剂。复诊：白睛颗粒见小，风轮云翳减退，但仍胀痛，以前方加夏枯草9克，又服21剂，左目白睛内侧颗粒全消，色呈灰白，风轮边缘仍留有薄翳。嘱其停药，观察18个月未再复发。

28945 加减活命饮

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】西当归一钱五分 炒白芍一钱五分 续断一钱五分 云苓二钱 元参一钱 金银花一钱五分 蒲公英三分 香附一钱 甲珠一片 皂刺七分 信前胡一钱 生甘草七分

【主治】半阴半阳毒初起。

28946 加减济心丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参 炒枣仁各五钱 熟地 玄

参 麦冬 丹皮各一两 莲子心 茯苓各三钱

【用法】水煎服。

【主治】心肾受劳火动，阳举不倒，胸中烦躁，口中作渴，两目红肿，饮之以水不解者。

28947 加减养心丸

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】当归身五钱（生） 醋白芍三钱 大生地五钱 大乌梅五个（用肉） 干麦冬五钱（去心） 酸枣仁五钱（炒） 辰砂五分（为衣）

【用法】上为细末，乌梅四物汤熬膏为丸，如芥子大。每服二钱，开水送下。

【主治】便血。

28948 加减养心汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】大熟地五钱 潞党参三钱 干麦冬三钱（去心） 熟枣仁三钱（研） 五味子一钱（研） 大乌梅三个（囔囔） 黑地榆三钱 炙甘草三钱 炙口耆三钱 莲房三个 大枣二枚

【主治】便血日久，心嘈食减者。

28949 加减养心汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】丹参 生地 归身 枣仁（炒） 远志 柏子仁 麦冬 紫菀（炙） 川贝 茯神 橘红 莲子

【主治】劳心操志，耗液亏阴，咳嗽白痰坚滑，滑不粘手。

28950 加减养荣汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】当归二钱 川芎二钱 茯神一钱 人参一钱 枣仁一钱（炒） 麦冬一钱 远志一钱 白术一钱 黄耆一钱（炙） 元肉八枚 陈皮四分 炙草四分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】怔忡，惊悸。

【加减】虚烦，加竹沥、姜汁，去川芎、麦冬，再加竹茹一团。

28951 加减养荣汤

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】当归 黄耆（蜜炒） 白术（土炒） 白芍（酒炒） 熟地黄 白苓 志肉（甘草水浸） 玉竹 石斛 橘红 五味 甘草 人参 何首乌

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】吐血初起，兼外感者，经用加减参苏饮、加减地黄汤与加减清肺汤后，宜用本方。

28952 加减养胃汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷上。

【组成】炙草四分 白茯苓一钱 半夏八分（制） 川芎一钱 陈皮四分 当归二钱 苍术一钱 藿香四分 人参一钱

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】产后寒热往来，头痛无汗类症者。

【加减】有痰，加竹沥、姜汁、半夏、神曲，弱人兼服河车丸；凡久症不愈，兼服参术膏，以助药力。

28953 加减养胃汤

【方源】《胎产要诀》卷下。

【组成】川芎 当归 藿香 甘草 茯苓 苍术 人参 半夏

【主治】产后寒热，头痛。

28954 加减养脏汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】木香 黄连 厚朴 甘草 归尾 赤芍 川芎 艾叶 蒲黄

【主治】产后下痢赤白，里急后重。

【加减】七日后，去蒲黄、归梢，加茯苓、归身、枳壳；如久痢脱肛，加肉豆蔻、地榆、人参、阿胶、白术；噤口不食，加山药、石莲肉、陈仓米；胃寒呕哕，腹痛甚者，去黄连，加干姜。

28955 加减养脏汤

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】白术（米泔水浸，土炒） 茯苓 广皮 炙甘 木香 楂肉 白芍（酒浸，煨，晒，切，炒） 神曲 山药 枳壳 川连（酒

炒) 扁豆

【用法】加莲肉, 水煎服。

【主治】痢疾。

【加减】如虚弱倦怠者, 加人参。

28956 加减姜黄丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】干姜(炮) 黄连(去须, 炒) 各等分

【用法】上药各为末, 各用水煮面糊为丸, 如梧桐子大, 阴干, 两处收贮。白痢冷泻, 每服干姜三十丸, 黄连十五丸, 同用温米饮送下; 赤痢泻血, 黄连三十丸, 干姜十五丸, 亦用米饮送下; 赤白相杂者, 黄连、干姜各二十丸共服, 同用米饮送下, 空心食前服。未愈加丸数, 取愈为度。

【主治】冷热赤白痢, 泻血。

28957 加减神功丸

【方源】《御药院方》卷七。

【组成】诃黎勒四两 人参二两(去芦头) 牵牛四两(微炒) 大麻仁(别捣如膏) 四两

【用法】上为细末, 入麻仁捣研匀, 炼蜜为丸, 如梧桐子大。每服四十九, 食后、临卧温水送下; 温酒、米饮皆可服。如大便不通, 可倍丸数, 以利为度。

【主治】三焦气滞, 心腹痞闷, 六腑风热, 大便不通, 腰腿疼痛, 肩背重疼, 头昏面热, 口苦咽干, 心胸烦躁, 睡卧不安, 及脚气并素有风人, 大便结燥。

28958 加减神术散

【方源】《经验医库》。

【组成】苍术 藁本 防风 甘草 白术 川芎 陈皮 半夏 细辛 白芷 茯苓 生姜

【用法】水煎服。

【主治】太阴风湿头痛, 腹满不饮食, 口渴咽干不饮水, 或呕吐痰涎, 体重节痛, 面色暗黄无泽, 脉浮缓。

28959 加减退赤散

【方源】《张皆春眼科证治》

【组成】酒黄芩 12 克 秦皮 3 克 赤芍 牡丹皮 生地各 9 克 木通 3 克 炒栀子 6 克 青黛 0.3 克

【功用】清心凉肝退翳, 活血祛瘀通脉。

【主治】赤膜下垂初起, 菲薄翳膜, 从白睛上部发起, 其上有赤丝牵绊, 逐渐变厚增大, 下侵风轮, 甚至掩及瞳神, 影响视力, 障边赤脉尽处常起星翳数点, 色黄或白, 肥而厚, 似凝脂之微。常伴有头痛目昏, 酸涩难睁等症。此症初起也有单发赤脉者, 自气轮下贯青睛, 然后翳膜旁丝脉而生, 互相连缀, 形成一片赤膜, 发展迅速, 若不急治, 赤膜遮蔽整个风轮, 即成血翳包睛, 难以见物, 甚至导致失明。

【加减】心火偏盛者, 可加川黄连 1.5 克, 肝火偏盛者, 可加龙胆草 3 克。

【方论选录】方中酒黄芩、秦皮、青黛清肝中郁火, 秦皮且能退翳; 生地、木通、炒栀子清心中邪热, 木通且能通脉; 赤药、牡丹皮活血凉血祛瘀以退目赤。

【临证举例】赤膜下垂 赵某, 女, 48 岁。左目沙涩不适 5、6 个月, 时轻时重, 近十几天来症状忽然加重, 目珠涩痛, 流泪羞明, 视物不清。检查, 左眼上睑睑内椒粒密集, 疙瘩不平, 赤膜从白睛上方垂下, 已近瞳神边缘, 赤脉密集, 此为赤膜下垂。投以加减退赤散加川黄连 1.5 克。外用海螵蛸棒擦法, 治疗睑内椒粒, 服药 6 剂, 摩擦 1 次。复诊: 睑内椒粒见疏, 赤膜稍退, 又行擦法 1 次, 服上药 6 剂。睑内椒粒大部已平, 留有少量疤痕, 毗帷部尚有少数椒粒, 赤膜已去大半, 已不羞明流泪, 视物较前清晰, 又服上方 21 剂而愈。

28960 加减除湿汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】人参(去芦) 八分 白术(去芦) 一钱二分 白茯苓 当归(酒洗) 各一钱 川芎 八分 赤芍一钱 陈皮(去白) 一钱 半

夏(姜制)一钱 苍术(米泔制)一钱 乌药一钱 枳壳(麸炒)一钱 白芷九分 桔梗八分 黄连(酒炒)一钱 黄芩(酒炒)一钱 羌活一钱 防风八分 甘草五分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，温服。

【主治】中风，右半身不遂，手足瘫痪及筋骨疼痛。

【加减】身痛，加姜黄；脚痛，加牛膝、防己、威灵仙。

28961 加减珠粉丸

【方源】《医学纲目》卷二十九。

【组成】蛤粉 青黛 樗皮末 滑石 黄柏 干姜(炒褐色，盐制)

【用法】上为末，炒神曲为丸服。

【主治】白浊。

28962 加减秦艽汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】黄耆一两 黄精五钱 鸡血藤一两 秦艽一两 乌梢蛇二钱 丹参一两 莲子心四钱 玉竹三钱 白人参二钱 白芍五钱 当归五钱 女贞子一两 熟地一两 川连二钱。

【功用】养阴补血，凉血解毒。

【主治】系统性红斑性狼疮。

【临证举例】系统性红斑性狼疮 王某，女，45岁，患者自1971年12月份开始不断发烧，时高时低，一直不退，一个多月后在面部发现红斑，后在某医院检查，血中找到狼疮细胞，确诊为系统性红斑性狼疮。给强的松治疗稍为控制，但药不能减量，稍减症状即加重。目前虽然每日服用强的松30毫克，仍有低烧，自觉全身乏力，手足心发热，自汗，关节酸痛，头晕。检查：体温37.5℃，面部有典型蝶形红斑，肝脾(+)，心脏(+)，白细胞计数4800/mm³，血沉24mm/小时。脉象沉细无力，舌质淡，苔白腻。此为阴血虚亏，毒热未清。治当养阴补血，凉血解毒。投

以加减秦艽汤。服药一个月后，(其间方中曾加减冬虫夏草、漏芦、枸杞子、山萸肉等药物)。关节疼痛渐止，低热渐退，自汗已止，唯自觉仍有头晕。在上方基础之上，又加用羌活三钱，钩藤九钱，川芎三钱，服药七剂，头晕亦明显减轻。于1973年1月25日检查白细胞为6500/mm³，血沉14mm/小时。又连续以上方为主加减服药三个月，强的松减量每日仅用5毫克，病情稳定，转门诊观察。患者于1974年已恢复半日工作。

28963 加减秦艽散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】秦艽 前胡 黄芩 枳壳 桔梗 山梔 柴胡 葛根 紫苏 葱白 陈皮

【主治】妊娠时疫，日久伤胎。

28964 加减桂枝汤

《得效》卷三。为《金匱》卷上“白虎加桂枝汤”之异名。见该条。

28965 加减桂枝汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】桂枝 麻黄 杏仁 半夏 生姜 甘草

【主治】外感风寒痰壅。身热神昏，声如鼾睡，喘急不宁，语言不便，脉浮紧。

28966 加减桂枝汤

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】桂枝钱半 白芍一钱(炒) 制草一钱 薏米五分(研) 扁豆一钱半(炒)

【用法】生姜一片，大枣一枚为引。

【主治】小儿感冒风寒，吐泻慢惊，鼻塞，手稍带凉。

28967 加减真武汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】白茯苓(去黑皮) 芍药 白术 五味子(炒)各三分 附子一枚(炮裂，去皮脐) 细辛(去苗、叶) 干姜(炮)各一分。

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盞半，加生姜四片，煎至八分，去滓温服。

【主治】伤寒少阴证。二三日不已，至四五

日，腹痛，小便不利，四肢沉重，自下利者，此为有水气，或呕或咳。

28968 加减真武汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】焦白术四钱 吴茱萸四钱 附子三钱(炙) 茯苓四钱 延胡索三钱 槟榔二钱 白芍二钱 炮姜三钱

【用法】水煎，温服。

【主治】年老偶感寒邪，头痛恶寒，而不发热，腹痛者。

【方论选录】此方以姜、附、吴茱萸温中，以延胡、槟榔行气，以焦术、茯苓益脾，少佐白芍敛阴和营。中宫温暖，则腹痛自止矣。

28969 加减真武汤

【方源】《实用中医儿科手册》。

【组成】熟附子 1~1.5 克 茯苓 红花 黄耆 2~3 克 白术 人参 1.5~3 克 赤芍 当归 川芎各 1~2 克 地锦草 5~9 克

【功用】温阳利水，活血化瘀。

【主治】新生儿硬肿症，属脾肾阳虚，气滞血瘀型。症见身冷皮硬，四肢少动，哭声低微，吮乳无力，尿少浮肿；严重者不哭、不吃、不动、体温不升，肢厥僵硬，肌肤紫红，甚则鼻窍出血，舌质紫红偏黯，舌苔白，指纹滞。

【宜忌】对体重太低的(如 2 公斤以下)新生儿应酌情减量。

28970 加减莪术散

【方源】《胎产新书》。

【组成】当归 莪术 延胡 熟地 枳壳 青皮 白术 黄芩各二钱 川芎 三棱 小茴 砂仁各三钱 干漆 红花各一钱 香附五钱 甘草二钱

【用法】上为末。每日服三钱，空心酒送下。

【功用】散瘀血，温调血脉。

【主治】妇人三十八九，经水断绝，腹中有块疼痛，头晕眼花，饮食不思。

28971 加减柴苓汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】柴胡八分 黄芩三钱 半夏(姜制)二钱 猪苓二钱 苍术一钱五分 青皮二钱 厚朴(姜炒)八分 槟榔一钱 草果一钱 乌梅二钱 甘草八分 泽泻二钱

【用法】上锉。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】诸症，寒热交作，阴阳不分，口干发渴，小便赤涩，或作吐泻。

28972 加减柴苓汤

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】柴胡八分 黄芩 半夏 青皮 草果各一钱 苍术 槟榔各五分 川芎三分

【用法】水一碗，酒一碗，加生姜三片，葱白二根，煎一碗温服。微汗。

【主治】疟发三四日。

28973 加减柴陈汤

【方源】《医略十三篇》卷九。

【组成】柴胡根一钱 黄芩钱半 炙甘草五分 当归身三钱 青蒿根二钱 赤茯苓三钱 制半夏钱半 陈皮一钱 生姜一片

【主治】疟症。

【加减】无汗，加羌活一钱，防风一钱，川芎一钱；汗多，加生牡蛎三钱；寒重，加桂枝八分，干姜五分，甚则加制附子，去生姜、黄芩；热重，加竹叶三十片、生石膏五钱，或玄参、知母之类；气虚，加人参一钱、黄耆二钱，冬白术钱半；阴亏，加大生地四钱，或麦冬之类；实者，加槟榔一钱，厚朴八分，草果仁五分；便秘，加大黄三钱、玄明粉二钱；洩秘，加车前子三钱，木通一钱；久疟，加鳖甲三钱、怀牛膝三钱；痰疟，加酒炒常山三钱；食疟，加麦芽二钱，神曲二钱，或谷芽、山楂之类；春，加防风一钱，苏梗一钱；夏，加香薷一钱，川黄连八分；秋，加青皮一钱；冬，加肉桂五分；三疟，加鲜首乌五分，人参一钱，鳖甲三钱，生姜三片，黑枣三枚，去黄芩；截疟，加酒炒常山三钱，乌梅三枚，或夜光丸三钱。

28974 加减柴苓汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】柴胡 半夏 茯苓 甘草 白术 泽泻 猪苓 山楂 山梔 荔枝核各等分。

【用法】加生姜，水煎服。

【功用】和肝肾，顺气消疝。

【主治】诸疝。

28975 加减柴苓汤

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 赤茯苓 猪苓 泽泻 赤芍 枳壳 厚朴

【主治】伤酒，酒热积于下焦，小便不利，腿足发热者。

28976 加减柴胡汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 当归 川芎 白芍 熟地 玄胡 木香 麦冬 杏仁

【主治】气怒之后，气逆膈中，血亦留滞。人事清白，但觉胸中刺痛，喘急不安，能坐不能卧者。

28977 加减柴胡汤

【方源】《普济方》卷一三四引《经验良方》。

【组成】柴胡（去芦）八钱 半夏（姜制）二钱半 黄芩（去心） 人参（去芦） 甘草（炙）各三钱 生熟地黄共半两

【用法】上咬咀。每服二钱，水一盞半，加生姜二片，枣一枚，煎至七分，去滓温服。大人倍加，煎服。

【主治】伤寒鼻衄。

28978 加减柴胡汤

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】柴胡一两 黄芩七钱半 半夏七钱半 枳壳一两 赤芍一两 山梔子（去壳）四两（半生半炒）

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎服。

【主治】实热凑上，心腹作痛，发热不止。

28979 加减柴胡汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】柴胡 黄芩 川芎 干葛 当归 紫苏 葱白 陈皮

【主治】妊娠伤寒，头痛壮热，腰痛体重，甚至坠胎。

28980 加减柴胡汤

【方源】《简明医彙》卷五。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 麦冬 黄连 青皮 胆草 当归 骨皮 白芍药各等分

【用法】水煎服。

【主治】口苦及口酸。

28981 加减柴胡汤

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 连翘 牛蒡 桔梗 山梔 甘草 干葛 荆芥 木通。

【主治】伤寒热不退，而发汗粟，形如芝麻，细细白泡，似乎痞状，痒痛全无，惟胸腹脘内居多者。

28982 加减柴胡汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】柴胡一钱 白芍五钱 茯神二钱 甘草一钱 梔子二钱 陈皮一钱 当归三钱 枳壳五分 大黄五分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，身热三日，腹满自利，病在少阳者。

28983 加减柴胡汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡 黄芩 知母 炙甘草各一钱 茯苓五钱 枳壳 神曲各五分 萝卜子三钱

【用法】水煎服。

【主治】伤风发潮热，大便溏，小便利，胸膈满，为春温之热留于阳明者。

28984 加减柴胡汤

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】柴胡八分 黄芩钱半 枳壳钱半（炒） 牡蛎三钱 半夏一钱半（制） 甘草五分 生姜三片 大枣三枚

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】伤寒少阳证，胁痛痞硬，脉弦数者。

【方论选录】柴胡疏少阳之邪，黄芩清在里之热，枳壳破滞气以消痞，牡蛎涤邪热以软

坚,半夏醒脾却饮,甘草和胃缓中,生姜、大枣调和营卫以退寒热也。水煎温服,使外邪解散,则里热自化,而经府清和,安有寒热胁痛痞硬之患乎?此分解之剂,为少阳伤寒胁痛之专方。

28985 加减柴葛汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 干葛 赤芍 紫苏 川芎 山梔 苍术 续断 枳壳 木瓜

【主治】风湿轻者,脉浮弦细,浑身痿软无力。

28986 加减逍遥散

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】牡丹皮 白术各一钱半 当归芍药 桃仁 贝母各一钱 山梔 黄芩各八分 桔梗七分 青皮五分 甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】痰中见血。

28987 加减逍遥散

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归(酒洗) 白芍(酒炒) 白术(土炒) 白茯苓 柴胡各一钱 甘草(炙)五分

【用法】上锉一剂。加煨姜一片,薄荷少许,水煎服。

【主治】肝脾血虚发热,或潮热,或自汗盗汗,或头痛目涩,或怔忡不宁,颊赤口干,或月经不调,或肚腹作痛,或小腹重坠,水道涩痛,或肿痛出脓,内热作渴。

【加减】如发热盛,加地骨皮、知母;如手擅掉,加防风、荆芥、薄荷;如咳嗽,加五味子、紫菀;如气恼胸膈痞闷,加枳实、青皮、香附;如吐痰,加半夏、贝母、瓜蒌仁;如饮食不消,加山楂、神曲;如发渴,加麦门冬、天花粉;如胸中作热,加黄连、梔子;如心慌心跳,加酸枣仁、远志肉;如久泻,加干姜炒黑;如遍身痛,加羌活、防风、川芎以利关节;如吐血,加生地、阿胶、牡丹皮;

如自汗,加黄耆、酸枣仁;如左腿血块,加三棱、莪术、桃仁、红花;如右腹气块,加木香、槟榔;如怒气伤肝,眼目昏花,加龙胆草、黄连、梔子、白豆蔻;如经闭不通,加桃仁、红花、苏木;如小腹痛,加玄胡索、香附米。

28988 加减逍遥散

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】当归二钱 白芍二钱 白术一钱五分 茯苓三钱 柴胡八分 甘草八分 胡黄连六分 麦门冬二钱 黄芩二钱 地骨皮三钱 秦艽三钱 木通二钱 车前子三钱 灯草十根

【用法】上锉。水煎服。

【主治】子午潮热者。

28989 加减逍遥散

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归二钱 白芍 白茯苓 丹皮各二钱 甘草 山梔各一钱

【用法】加灯心三十茎,水煎,食远服。

【主治】经前潮热。

28990 加减逍遥散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归 白术 柴胡 陈皮 白茯苓 丹皮 甘草 山梔 白芍药

【主治】厥阴症。

【加减】热多,加黄芩;寒多,加生姜;恶寒,加羌活、升麻。

28991 加减逍遥散

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】茯苓五钱 白芍(酒炒)五钱 甘草(生用)五钱 柴胡一钱 茵陈三钱 陈皮一钱 梔子三钱(炒)

【用法】水煎服。

【主治】妇人青带。带下色青,甚则如绿豆汁,稠粘不断,其气腥臭。

28992 加减逍遥散

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】柴胡二钱 白芍五钱 白术 当归 生地各三钱 甘草 炒梔子 半夏各一

钱 青皮五分

【用法】水煎服。

【主治】怒后吐痰，胸满作痛，服四物、二陈之汤，加芩、连、枳壳之类，杳无一应，更加祛风之味，反致半身不遂，筋渐挛缩，四肢痿软，日晡益甚，内热口干，形体倦怠，属郁怒未解，肝气未舒者。

28993 加减逍遥散

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】白芍 当归各一两 甘草 白茯苓 薤仁各一钱 陈皮五分 茯苓三钱 甘菊三钱 柴胡 半夏各三分

【用法】水煎服。

【主治】目痛日久，终年累岁，而红赤不除，致生怒肉攀睛，拳毛倒睫者。

28994 加减逍遥散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】白术（炒） 白茯苓 白芍（炒） 陈皮 甘草 柴胡 石斛

【用法】生姜一片，红枣二枚为引。

【主治】小儿虚喘，或出汗面青唇白，或兼泄泻。

28995 加减逍遥散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】白术（炒） 白芍（炒） 白茯苓 陈皮 甘草 柴胡 当归 神曲（炒） 熟半夏 石斛

【用法】生姜一片为引。

【主治】小儿脾虚受湿，肿胀，或作泄泻，或兼呕吐。

28996 加减逍遥散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】白芍 白术 当归 白茯苓 柴胡 陈皮 甘草 木香（少许） 使君子肉

【用法】生姜一片为引。

【主治】小儿脾弱面青，似有惊风，而解虫者。

28997 加减逍遥散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】柴胡五钱 白芍两半（酒炒） 鳖

甲三两（醋炒） 生地五两 茯苓三两 白术两半（炒） 木香一两 米仁五两（炒） 智仁三两（盐水炒） 生姜二片。

【用法】上为散。熟地、砂仁一钱煎汤，煎三钱，去滓温服。

【主治】腹胀潮热，脉弦虚数者。

【方论选录】柴胡升阳散郁以达肝木；白术壮土健脾以助运化；鳖甲滋阴散结，醋炙引以专入肝经；生地壮水涵肝，炒松兼去阴中之湿；茯苓渗湿和脾兼快小便；白芍敛营和血，用资肝阴；木香厚肠胃以调气；米仁渗湿热以健脾；益智通心益肾，能摄涎止泻；生姜温胃快膈以散痰祛浊也。为散，砂仁汤煎，使肝阴内充，则肝阳自达，而脾土健运，浊阴无不消散，何患胀满疼痛不退，潮热便溏不止乎？

28998 加减逍遥散

【方源】《证因方论集要》卷四。

【组成】当归 白芍（炒） 茯苓 柴胡 甘草（炙） 荷叶 木耳 贝母 香附 石菖蒲。

【主治】厥阴肝经风热，变为疳豆抵耳。

28999 加减逍遥散

【方源】《病科全书》。

【组成】柴胡一钱五分 炙甘草一钱 茯苓三钱 白术二钱 当归二钱 白芍三钱 丹皮一钱五分 黑山栀一钱五分 煅牡蛎一钱五分 薄荷三分 广陈皮一钱五分 半夏二钱 白芥子二钱

【主治】妇人情志不遂，忧郁内伤，阴火上炎，而致生痼凝结不消者。

29000 加减逍遥散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】柴胡一钱半 白芍 茯苓各三钱 白术二钱 甘草一钱 山栀仁 蕲艾各三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】平肝解郁以安胎。

【主治】妊娠胎动不安，或腹痛下血，兼精神抑郁，心烦善怒，肋肋胀痛，时有潮热，噎

气食少，或呕苦吐酸，脉弦而滑。

【加减】心烦躁甚者，加黄芩二钱；出血多者，加乌贼骨八钱，生地炭三钱。

29001 加减息奔丸

【方源】《东垣试效方》卷二。

【组成】川乌头一钱 干姜一钱半 人参二钱 厚朴八分 黄连一两三钱 紫菀一钱 巴豆霜四分 桂枝三钱 陈皮一钱半 青皮七分 川椒(少去汗)一钱半 红花少许 茯苓一钱半 桔梗一钱 白豆蔻一钱 京三棱一钱半 天门冬(去心)一钱半

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。初服二丸，一日加一丸，二日加二丸，加至大便微溏利为度，再从二丸加服，食前煎生姜汤送下。

【功用】益元气，泄阴火，破滞气，削其坚。

【主治】仲夏合，其积为病，寒热喘咳，气上奔，脉涩。

【宜忌】忌酒、湿面、五辛大料热物之类，及生冷硬物。

29002 加减胶艾汤

【方源】《济阴纲目》卷八。

【组成】阿胶(炒成珠) 当归 川芎 白芍药(炒) 地榆各一钱 艾叶(炒) 甘草各五分

【用法】上锉一剂。水煎，饥服。

【主治】胎动漏血。

【加减】胎漏血多，起于气恼血逆火动之故，可加炒黄芩、炒香附、炒砂仁，研细同煎；或有受孕至四五月即堕，或至六七月漏血要堕者，去艾叶、地榆，加白术、黄芩、茯苓、熟地黄、续断；气盛者，亦加香附、砂仁；气虚，加人参、黄耆之类；如伤堕多次，受孕后便宜服千金紫苏饮，及前加减法、汤丸相间，庶免再堕。

29003 加减凉膈散

【方源】《医学正传》卷一引东垣方。

【组成】连翘一钱 栀子 薄荷叶 淡竹叶 黄芩 桔梗各五分 甘草(生)一钱五分

【用法】上细切，作一服。水一盏半，煎至一盏，日三五服。热退即止。

【主治】六经热，及伤寒余热不解，胸烦等证。

29004 加减凉膈散

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】连翘 片芩 山梔仁(炒) 枳实(炒) 前胡各五分 大黄(酒炒)一钱 薄荷 甘草各二分

【用法】水一钟，煎五分，三岁以下者，分二三次服之。微利一二二次痰热自退，若已通利，则不必尽剂。

【主治】急惊风服清热镇惊汤未愈者。

29005 加减凉膈散

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】连翘 黄芩 栀子 桔梗 黄连 薄荷 当归 生地 白芍 元参 甘草 枳壳 升麻

【用法】水煎，食后服。

【主治】三焦火盛，上焦实热，口舌生疮。

29006 加减凉膈散

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】槐花(炒) 黄芩 陈皮 甘草 白芍 当归 连翘 丹皮

【用法】水煎服。

【主治】大肠有热，血裹粪而出。

29007 加减凉膈散

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】薄荷叶 生栀子 元参 连翘(去心) 生甘草 苦桔梗 麦冬(去心) 牛蒡子(炒，研) 黄芩

【用法】水煎服。

【主治】疹已发而失音者。

29008 加减凉膈散

【方源】《锦京直指》。

【组成】鲜生地六钱 黄芩一钱五分、淡竹叶一钱五分 瓜蒌皮二钱 鲜石斛三钱 炒栀子三钱 银花三钱 生甘草五分 元参心四钱 杏仁三钱 象贝二钱

【主治】肺胃火盛，咳嗽痰粘，舌黄黑燥，

脉数，口燥咽干。

【加减】便秘，可加消、黄。

29009 加减消毒饮

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】升麻 牛蒡子(炒，研) 山豆根 紫草 连翘(去心) 生地黄 赤芍 川黄连 甘草(生)

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】痘疹初出，蒸热有汗，热在里者。

29010 加减消毒饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】羌活八分 葛根二钱 防风一钱 桔梗二钱 生甘草八分 荆芥一钱 薄荷八分 牛蒡子三钱(研) 白僵蚕三钱(炒) 连翘一钱五分(去心) 马勃三分 靛根三钱

【用法】初病恶寒发烧，一服盖暖，出汗即松；第二日加蝉蜕一钱；第三日加炒柴胡八分；第四日加元参四钱，四服全愈。

【主治】大头天行，头面颊颐肿，初病恶寒发烧，大便结燥，胸口不宽。

【加减】如大便结者，加制军三钱，枳壳一钱五分，下之即去；如口干，加花粉二钱，大贝母一钱五分。

29011 加减消毒散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】蒲公英三钱 金银花二钱 元参一钱 赤芍一钱五分 连翘一钱 炒山甲一片 皂刺尖七分 前胡一钱 防风一钱 香附一钱 生甘草七分

【主治】阳毒初起。

【加减】开口去皂刺；无头痛恶寒，去前胡、防风。

【备考】《梅氏验方新编》有延胡索二钱。

29012 加减流气饮

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】木香 枳壳 蓬术 陈皮 青皮 槟榔 三棱 苍术 草果 大腹皮 砂仁

【用法】水煎服。

【主治】胸膈痞塞，气不升降，喘急不安，

积聚停滞，发热不思饮食，噎气吞酸，或闭或痢。

【加减】大便不通，加大黄；身热，加柴胡；内热，加黄连；呕吐，加藿香、半夏；胃中痛，加益智仁、草豆蔻；腹胀小便不利，加木通，苏梗；伤冷积滞，加干姜、肉桂。

29013 加减流气饮

【方源】《保命歌括》卷二十四。

【组成】陈皮 青皮 紫苏叶 厚朴(姜汁炒) 枳实 抚芎 甘草 人参 白术 茯苓 半夏(洗) 黄连 香附子(童便浸)各等分

【用法】上咬咀。加生姜三片，水煎服。

【主治】因七情之伤，心下痞者。

29014 加减流气饮

【方源】《保命歌括》卷二十六。

【组成】陈皮 青皮 紫苏(茎叶) 厚朴(制) 木通 香附子(醋制) 甘草(炙) 大腹皮 草果仁 肉桂 藿香叶 白术 木瓜 茯苓 白芷 半夏 枳壳各等分

【用法】上咬咀。加生姜三片，水煎服。

【主治】气血诸肿。

【加减】气分，加木香、槟榔、石菖蒲；血分，加当归、川芎、莪术。

29015 加减润肠丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】大黄(倍加) 黄芩 麻黄 郁李仁 杏仁(去皮) 厚朴 枳壳 陈皮(去白) 当归梢 莱菔子各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，食前滚白水送下。

【功用】润血燥热，通大便。

【主治】伤食心腹痛。

29016 加减润燥汤

【方源】《回春》卷二。

【异名】愈风润燥汤(《杂病源流犀烛》卷十二)。

【组成】当归一钱二分 川芎一钱 白芍(酒炒)二钱 生地黄(酒炒)八分 熟地黄

(姜汁炒)八分 白术(去芦)一钱 白茯苓(去皮)一钱 南星(姜汁炒)一钱 半夏(姜汁炒)一钱 陈皮(盐水洗)八分 桃仁(去皮)六分 红花(酒洗)四分 天麻一钱 羌活六分 防风六分 黄芩(酒炒)八分 酸枣仁(炒)八分 黄柏(去皮,酒炒)三分 薄桂六分 甘草(炙)四分 牛膝(去芦,酒洗)八分

【用法】上锉一剂。水煎,入竹沥、姜汁少许、温服。

【主治】中风,左半身不遂,手足瘫痪,语言费力,呵欠喷嚏,面目口眼喎斜宽弛,头目眩晕,痰火炽盛,筋骨时痛,头或痛,心悸。

【加减】手不遂,倍黄芩、薄桂;足不遂,倍黄柏、牛膝。

29017 加减益元汤

【方源】《痘疹仁端录》卷五。

【组成】甘草 当归 白芍 川芎 陈皮 升麻 桔梗

【用法】水煎服。

【主治】痘症脾期虚证。

29018 加减益气汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】黄耆五分 人参五分 白术一钱 陈皮一钱 当归七分 白芍药一钱 升麻三分 甘草(炙)三分 泽泻五分 砂仁五分 木香三分 白豆蔻三分 地榆五分 御米壳(醋炒)三分

【用法】上锉一剂。水二盏,煎至八分,滤去滓,空心温服。

【主治】痢疾日久不愈,不能起床虚弱者。

29019 加减益气汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】黄耆(蜜炒) 人参 白术(去芦) 陈皮 当归各一钱 升麻 柴胡 木香各五分 香附 青皮(去瓢) 川芎各七分 桂枝 甘草各三分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣,水煎服。

【主治】气虚麻木。

29020 加减益黄散

【方源】《御药院方》卷下。

【组成】肉豆蔻 陈皮(去白) 诃子皮各半两 丁香二钱 甘草(炙)二钱半

【用法】上为细末。每服二钱,水一盏,煎至六分,食前温服。

【主治】小儿胃虚脾弱,胀满滑泄。

29021 加减益黄散

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】陈皮 青皮(炒) 诃肉各半两 甘草 木香 肉豆蔻各二钱(煨)

【用法】上锉散。每服二钱,加生姜、大枣,水煎服。或加丁香亦可。

【主治】冷泻,胃虚腹痛。

29022 加减调中汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】白芍一钱半 茯苓 白术各八分 麦门冬四分 生地五分 陈皮三分 桔梗 乌梅 甘草各二分

【用法】水煎,温服。

【主治】冬温及春月暴暖,烦躁,眠食不安,或掀脱欲作伤风状者。

【加减】如体盛,加黄芩;有痰,加贝母。

29023 加减调中汤

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】人参 白术 黄耆 炙甘草 木香 官桂 白茯苓 陈皮 半夏 生姜

【用法】水煎服。

【主治】痘疹吐泻,而致里虚,痘出不快者。

29024 加减调中汤

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】人参 白术 黄耆 甘草(炙) 木香 桂枝 白茯苓 藿香 白芍药(酒炒) 陈皮

【用法】生姜为引,水煎服。

【主治】痘疹应出不出,而内虚者。

29025 加减调中饮

【方源】《伤寒六书》卷三。

【异名】加味平胃散(《玉案》卷二)。

【组成】苍术 厚朴 陈皮 甘草 白术 山楂 神曲 枳实 草果 黄连 干姜

【用法】水二种，加生姜一片，水煎，捶法，临服入木香，磨取汁调饮即效。

【主治】食积类伤寒，头疼，发热恶寒，气口脉紧盛，但身不痛。

【加减】腹中痛，加桃仁；痛甚大便实热，加大黄下之，去山楂、草果、神曲、干姜；心中兀兀欲吐者，与干霍乱同，吐法用滚水一碗，入盐一撮，皂荚末五分探吐。

【备考】本方方名，《医学入门》引作“平胃散”。

29026 加减通散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归身 葱白 阿胶 茴香 破故纸 杜仲 甘草 陈皮 川续断 山药 川芎 萆薢 独活 香附 橘核 白芍

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】妊娠腰腹皆痛者。

【加减】如小腹痛，加艾、木香、乌药、紫苏，去橘核、山药、茴香、续断、萆薢、独活、破故纸。

29027 加减通圣丸

《医学入门》卷八。即原书同卷“加减通圣散”半斤，加苦参半斤，改为丸剂。见该条。

29028 加减通圣散

【方源】《医学正传》卷六。

【组成】防风五钱（去芦） 连翘三钱（去蒂） 川芎五钱 白芍药二钱 当归三钱（酒浸洗） 薄荷二钱 荆芥穗五钱 麻黄三钱（去根节，汤泡） 梔子三钱（去壳） 桔梗五钱 枳壳（去瓢，面炒） 石膏各五钱 甘草三钱 滑石三钱 黄芩三钱（去朽） 柴胡五钱 黄连五钱 黄柏三钱 生地黄三钱五分（酒制） 羌活五钱 熟地黄三钱五分（酒制） 锦纹大黄六两 芒消一两 皂角刺一两（独生者，去尖）

【用法】上切细，分八服。每服用水一碗半，煎至一碗，空心服，日进二服。五六日后又

进二服，待补养完，又行二次，然后服神仙紫花丸。

【功用】泻恶毒秽积。

【主治】疟风。

29029 加减通圣散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】防风 白鲜皮 赤芍 连翘 黄芩各八分 牛蒡子一钱 金银花三分 山梔 归尾各五分 荆芥 槐花各四分 僵蚕 甘草各二分

【用法】水煎服。

【主治】杨梅。

【加减】如初起便秘，加酒大黄一钱半；便难，加皂子三分；胃弱食少，加白术一钱、陈皮、半夏各五分；头上多，加川芎八分，薄荷一分；下部多，加牛膝、黄柏各四分；遍身多，加木通、桔梗、地骨皮各六分；心火加黄连，肾火加玄参各四分；气虚加参、耆，血虚加熟地各六分；久虚便利，加硬饭五钱。

【备考】本方原书用半斤，再加苦参半斤，改为丸剂，名“加减通圣丸”。

29030 加减通圣散

【方源】《准绳·疡科》卷二。

【组成】防风 荆芥 连翘 赤芍药 当归 川芎 桔梗 黄芩 梔子 甘草 青木香 玄参 牛蒡子 大黄 芒消 紫金皮 鸡屎子 炸死子 谷藤根 芙蓉根 嫩柏根 青王义

【用法】加薄荷、生地黄，水煎服。

【主治】疔疮、瘰疬、紫游风等。

29031 加减理中丸

《圣济总录》卷二十五。为《外台》卷三引《崔氏方》“增损理中丸”之异名。见该条。

29032 加减理中丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】半夏（汤炮七次） 白术（麦麸炒） 干生姜 梓朴（锉，姜制炒） 附子（去皮脐，姜煮） 人参（去芦）各一两 草拔 丁香各半两（不见火）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十九丸，食前米饮送下。

【功用】快膈，壮脾胃，消痰饮。

29033 加减理中丸

《妇人良方》卷七。即《千金翼》卷十八“理中丸”。见该条。

29034 加减理中汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】白术 人参 甘草 干姜各一两 青皮 陈皮各半两

【用法】上为细末。每服一钱，沸汤点服，不拘时候。

【功用】生养诸气，大益脾胃。

【主治】脾胃不和，三焦壅滞，胸膈痞闷，胁肋胀痛，呕吐恶心，口淡无味，呼吸寒冷，心腹暴痛，饮酒过伤，全不思食。

【备考】本方原名“加减理中丸”，与剂型不符，据《普济方》引《十便良方》改。

29035 加减理中汤

《东医宝鉴·杂病篇》卷五。即《回春》卷三“理中汤”。见该条。

29036 加减理中汤

【方源】《痘疹一贯》卷二。

【组成】人参 白术 黄耆 甘草 木香 肉桂 茯苓 半夏 陈皮

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】小儿痘疹，吐泻里虚，不能出快。

29037 加减理中汤

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】人参 干姜 白术(土炒) 川椒

【用法】引用乌梅一个，水煎服。

【主治】胃寒虫扰作吐，唇色或红或白，胃口时痛时止，频呕清涎者。

29038 加减理阴煎

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】熟地 白芍 附子 五味 炮姜 茯苓

【主治】久痢，小便不通，厌食欲呕。

【方论选录】此由阳而伤及阴也。小便不通，阴液涸矣，厌食欲呕，脾胃两阳败矣。故

以熟地、白芍、五味收三阴之阴，附子通肾阳，炮姜理脾阳，茯苓理胃阳也。按原方通守兼施，刚柔互用，而名理阴煎者，意在偏护阴也。熟地守下焦血分，甘草守中焦气分，炮姜通中焦气分，当归通下焦血分，炮姜通中焦气分，盖气能统血，由气分之通，及血分之守，此其所以为理也。此方去甘草、当归，加白芍、五味、附子、茯苓者，为其厌食欲呕也。若久痢阳不见伤，无食少欲呕之象，但阴伤甚者，又可以去刚增柔矣，用成方总以活泼流动，对证审药为要。

29039 加减理阴煎

【方源】《锦京直指》。

【组成】熟地 当归 炮姜 制附子 白芍 炙甘草

【主治】痢久伤及肝脾肾之阴阳。自痢无度，头汗声低，脉弱或弦，舌红空薄者。

29040 加减黄土汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】土炒白术 花龙骨 地榆炭各三钱 陈阿胶二钱 黑炮姜 炙甘草 春砂仁各八分

【用法】先用伏龙肝一两，水化搅拌，澄清煎药。

【功用】温补敛肠。

【主治】小肠寒湿，粪前下血，散而紫黯，或血色淡红，胃弱便溏，素无痔漏证者。

29041 加减黄芩汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】黄芩 黄连 当归 枳壳 槟榔 青皮 泽泻 山楂 槐花 白芍 甘草

【用法】灯心为引。

【主治】麻毒未清，变成赤白痢者。

【备考】原书治上证，是以本方去白芍、楂肉、甘草，加黑地榆、连翘、牛蒡子主之。

29042 加减黄芩汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】荆芥穗三钱 薄荷三钱 黄芩五钱 车前子四钱(炒) 毛苍术四钱 盐泽

泻三钱 升麻三钱 木通三钱 粉甘草三钱

【用法】水煎，温服。

【主治】伤寒泄泻。

【方论选录】此方用黄芩清热，甘草和中，加芥穗、薄荷清扬之品，清其头部之邪，苍术燥湿，泽泻降浊，升麻升清，车前子专能分其清浊，随木通引热，从小便而出。

29043 加减黄连散

《普济方》卷三八六。为《卫生宝鉴》卷十九“加减泻黄散”之异名。见该条。

29044 加减黄耆汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】黄耆9克 党参1.5克 炒白术9克 甘草6克 陈皮1.5克 蔓荆子3克

【功用】补中益气，健脾除湿。

【主治】胞虚如球。初起不痛不痒，不热不红，胞睑浮肿如悬球状，举睑无力，稍有下垂，按之绵软，没有硬结之处，有的可兼发痒，日久渐渐发红，或觉胞睑稍有胀痛，白睛淡赤，结眵稀薄。

【加减】若兼风邪，胞睑微痒者，可加防风3克，以祛风除湿；若为虚热上浮，胞睑微红微痛者，可加茅根15克导湿热下行；若母病及子，白睛稍赤，而结眵稀薄者，当加骨皮6克，以除肺中之虚热。

【方论选录】方中黄耆、党参、炒白术、甘草培补中气，炒白术且能行于肌肉之间以除其湿，陈皮理气以助湿行，蔓荆子轻飘上浮，辛散走表，引诸药直达病所，且能祛湿。

【临证举例】目胞虚胀如球 管某，男，64岁。双眼上胞浮肿2月余，不痛不痒，有重垂感，且兼四肢乏力，食少便溏。检查，双眼上胞虚浮如球，不红不硬，按之绵软，稍有下垂，脉虚弱，舌质淡，此为胞虚如球。给加减黄耆汤加车前子、茯苓各9克，增陈皮3克，服药3剂。复诊：胞肿稍轻，饮食增加，便溏已愈。又服上方23剂，诸症皆去。

29045 加减排风汤

【方源】《古今医鉴》卷二引陈白野方。

【组成】天麻 苍术 杏仁各一钱 羌活 独活 防风 白鲜皮 川芎 当归 白芍药 白术 茯苓 黄芩 半夏各八分 麻黄七分 甘草四分

【用法】上咬咀。加生姜三片，水二盏，煎一盏，不拘时服。

【主治】中风口眼喎斜。

29046 加减排脓汤

【方源】《慈幼新书》卷五。

【组成】当归 川芎 白芍 人参 甘草 陈皮 白芷 山楂 桔梗 木通

【用法】黄豆二三十粒，笋尖五钱，五六日后易用糯米为引。

【功用】保元气，活血行滞，助痘成功。

【主治】血热痘症，药后热症悉退，内外和平，唯不易胀者。

【加减】色尚干红焦紫，加紫草、红花；不甚起发，加大力子、蝉退；皮薄塌陷，加黄耆；起发不匀，加防风；咳嗽，加麦冬、五味；泄泻，加升麻、泽泻；水泡，加白术、茯苓；作痒，加姜蚕、白芷；毒停肌肉，或风寒阻塞，不易起发者，俱加赛春雷。

29047 加减银翘散

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】连翘十分 银花八分 元参五分 犀角五分 麦冬五分（不去心） 竹叶三分

【用法】上为粗末。每服五钱，煎成去滓，点荷叶汁二三茶匙，日三服。

【主治】心疳。疳邪在肺，逆传心包，热多昏狂，谵语烦渴，舌赤中黄，脉弱而数，受邪较浅者。

29048 加减银翘散

【方源】《锦京直指》。

【组成】连翘三钱 粘子三钱 蝉蜕一钱五分 荆芥二钱 防风一钱五分 前胡一钱五分 薄荷一钱五分 象贝二钱 桔梗一钱 广郁金二钱

【功用】畅肺，导痰，透发。

【主治】冬温、春温、风温、麻疹，初时恶

寒发热，咳嗽肋痛。

【加减】麻痞，加葛根二钱，炒腹子三钱（杵包）。

29049 加减徙薪饮

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】黄芩 山梔（杵，炒黑） 白芍（酒炒） 丹皮 茯苓各一钱五分 菊花二钱 甘草六分

【主治】目赤肿痛。

29050 加减麻仁丸

【方源】《外台》卷三十一引《近效方》。

【组成】蜀大黄（锦文者）四两 人参二两 大麻仁二两 诃黎勒皮四两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服十丸至二十丸。增减以意量之，以溘利病除，亦不损人。

【主治】积年患气，不能食饮，兼食不消化，风气、冷气、热气冲上，痙癖气，并乳石气发动者。

29051 加减麻黄汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】麻黄（去节）一两 辣桂 甘草（炙）各半两 杏仁五十枚（去皮尖，微炒，别研） 陈皮 半夏（制）各半两

【用法】上细锉，拌和杏仁。每服三钱，加紫苏三叶，生姜四片，水煎服。

【主治】肺感寒邪咳嗽。

29052 加减麻黄汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】麻黄 羌活 防风 紫苏 甘草 生姜 葱白

【主治】感冒无汗。

【加减】血虚，加生地。

29053 加减麻黄汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】麻黄 桂枝 荆芥 防风 羌活 大力 沙参 川芎 赤芍 桔梗 甘草 生姜

【主治】麻疹初起，时令大寒。

29054 加减麻黄汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】麻黄三钱 桂枝二钱 苏叶三钱 黄芩三钱（酒洗） 芥穗三钱 滑石四钱 豆豉四钱 木通三钱 甘草一钱

【用法】葱头一个为引，水煎服。

【主治】伤寒初病，腿膝无力，头痛，发热恶寒，脉象浮洪而紧，亦有不紧者。

【方论选录】以麻黄为发汗之君药；佐以苏叶、芥穗清扬之品，发头部之汗，以桂枝、葱、豉温散之品，发四肢之汗；酒芩能清血中之热；滑石能清六腑之热；木通清心火通小肠，能引热从小便出，较之大黄利大肠，最为柔和；甘草能和中气，则汗出而病愈矣。

29055 加减清心饮

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】石莲肉 白茯苓各一钱 益智仁 远志 麦门冬 石菖蒲 车前子 人参 白术 泽泻各七分 甘草（炙）四分

【用法】上咬咀。用灯心二分，水煎，空心温服。

【主治】心中客热烦躁，赤浊如肥脂。

29056 加减清肌汤

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】柴胡 黄芩 生地黄 当归 地骨皮 茯苓 知母

【用法】淡竹叶七片为引，水煎服。

【主治】麻疹收后，只发热而无他症者。

29057 加减清肺汤

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】白茯苓 当归 生地 白芍 紫菀（酒炒） 玉竹（蜜炒） 百合（蜜炒） 柏叶 甘草

【用法】童便、水酒为引。

【主治】吐血起初，兼外感者。

29058 加减清肺饮

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】麦冬 桔梗各二钱 陈皮 知母 花粉各一钱 诃子 杏仁各八分 荆芥 黄芩各六分 甘草三分

【主治】痘实热，咳嗽喘急，痘色绛紫。

29059 加减清经散

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】熟地黄五钱 白芍三钱 黄芩三钱 地骨皮四钱 益母草三钱 万年灰三钱 郁金三钱 柴胡三钱 青蒿二钱

【用法】水煎服。

【主治】妇女血热，经水先期。

【方论选录】此方专以清热为主，用熟地、黄芩、白芍、地骨皮、青蒿、益母清凉滋养，以柴胡、郁金稍理其气，以古灰微涩其血，其行经不至先期矣。

29060 加减清胃汤

【方源】《风劳臌膈》。

【组成】黄连 吴萸（炒） 黄芩（姜汁炒） 陈皮 苍术 山梔 厚朴 赤苓 生姜

【主治】湿热郁胃，偶尔作酸，嘈杂便秘，食易化者。

29061 加减清胃饮

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】生石膏二钱 梔子二钱 黄芩二钱 全当归三钱（生） 生地二钱 生白芍二钱 丹皮二钱 甘草一钱 川大黄三钱或五钱（酒浸，生用）

【主治】实热牙疼。

【宜忌】愈后忌食蒜。

29062 加减清胃散

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】元参 连翘 生地黄 黄柏 麦冬 木通 白茯苓 天花粉 陈皮 桔梗 甘草

【用法】灯心为引。

【主治】麻后口疮。

29063 加减清宫汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】黑犀角二钱（磨冲） 连翘二钱 石菖蒲一钱 元参三钱 银花三钱 竹叶心二钱 莲子心五分 金汁四钱（冲）

【主治】温邪传心包，神昏耳聋，身热脉数，

口渴舌红，言蹇。

29064 加减清脾汤

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】小柴胡汤合养胃汤加生姜 桃柳枝 地骨皮

【用法】加红枣，水煎服。若寒多热少多用养胃汤，热多寒少多用柴胡汤，寒热均者剔平。

【主治】疟疾。

29065 加减清脾饮

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】柴胡 黄芩 半夏（姜制） 甘草（炙） 厚朴（姜制） 青皮（醋炒） 槟榔 茯苓 草果 人参 白术（土炒） 橘红 南苍术（炒）

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】小儿疟疾，兼有痰饮，呕逆，面黄目肿，胸膈膨胀。

29066 加减清脾饮

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】白术 茯苓 半夏 柴胡各一钱 知母 青皮 陈皮 黄芩各七分 厚朴 草果各四分 甘草

【用法】生姜三片为引。

【主治】疟疾先寒后热者。

【加减】凡治瘧症用此方去厚朴，加石膏一钱五分。

【备考】方中甘草用量原缺。

29067 加减清脾饮

【方源】《锦京直指》。

【组成】柴胡一钱五分 川朴一钱 秦艽一钱五分 青蒿六分 姜夏二钱 草果仁一钱五分 灵仙一钱五分 青皮一钱 赤苓三钱 通草一钱 老姜二片

【主治】夏秋感受风湿而为暑疟，午后微寒而热，或一日轻而一日重，其寒热界限模糊者。

29068 加减渗湿汤

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】嫩苍术三钱（炒） 白术三钱 赤

茯苓四钱 丁香 缩砂仁 木瓜 神曲 绵姜 陈皮 草果 厚朴(制炒)各三钱 甘草二钱半

【用法】上咬咀。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】喘疾。医用下痰疏导之药，引客邪入肾经，而两足并外肾发肿者。

【备考】先用灵砂合来复丹服，若单服灵砂则秘，合服则通，次用本方。

29069 加减断下汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】党参 熟地 艾叶各一两 乌贼骨二两 干姜五钱 阿胶七钱五分 附子三钱

【用法】上为粗末。每次五钱，水煎服。

【功用】温经补血。

【主治】气血虚寒，崩中漏下，黑多红少，脐下冷痛，饮食渐减，四肢无力，舌质淡苔薄，脉迟无力。

29070 加减续命汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】秦艽 当归 川芎 续断 丹皮 钩藤 陈风 黄耆 人参 阿胶 麻黄根节(有汗用之)

【主治】产后中风。症如痫状，目反上视，唇口喎斜，齿噤不语，背强项直，手足筋挛。

【方论选录】肝藏血，产后下血过多，此脏一虚故内风生，而外风易中也。若不大补气，则内生之风何由得减，不加一二治风之药，则外感之风何由可去。是方参、耆以补元阳，使卫行脉外以固表，用佛手散加续、丹、阿胶以补血养血，使营行脉中以生新，钩、秦、防风以祛风，麻黄根节以止汗。

29071 加减续命汤

【方源】《得效》卷十三。

【组成】麻黄(去根) 人参 黄芩 白芍药 川芎 甘草 杏仁(去皮，麸炒) 防己 桂各二两 防风一两半 附子(炮，去皮脐，有热者用白附子)

【用法】上锉散。每服四钱，水一盂半，加

生姜三片，大枣二枚，水煎服，不拘时候，温服取汗。随人虚实与所中轻重也。

【主治】中风不省人事，渐觉半身不遂，口眼喎斜，手足颤掉，语言蹇涩，肢体痿痹，神情昏乱，头目眩重，筋脉拘挛，不能屈伸，骨节烦疼，不得转侧；亦治脚气缓弱，久服之愈。有病风人常服，以防痞哑。

【加减】筋急拘挛，语迟，脉弦，加薏苡仁；筋急，加人参、黄芩、芍药以避中寒，服后稍轻，再加当归全愈；脚气痹弱，不能转侧，心神恍惚，加茯神、远志；骨节烦疼，有热者，去附子，倍加秦艽；烦躁，大便涩，去附子，倍芍药，加竹沥，脏寒大便自利，去黄芩，加白术、附子；骨肉冷痛者，加肉桂、附子；烦躁多惊者，加犀角；呕逆腹胀，加人参、半夏；自汗，去麻黄；语言蹇涩，手足颤掉，加石菖蒲、竹沥；大便秘，胸中不快，加枳壳、大黄；气塞不通，加沉香；有痰，加南星数片；发渴，加麦门冬、干葛、瓜蒌根；身疼，加秦艽；上气浮肿喘急，加防风、桑白皮，以上所加各一两；小儿慢惊，煎取药汁一盂，入生姜汁再煎一二沸，日三服，夜二服；夏间又有热者，减桂一半，春加麻黄一两，夏加黄芩一两，秋加当归四两，冬加附子半两；风虚，加川芎一两。一方加木香、缩砂、独活各一两，川乌炮三分亦效。牙关紧，用南星末半钱，龙脑一字，频擦牙上令热，即自开。

29072 加减续命汤

【方源】《医学纲目》卷十六。

【组成】麻黄三两 人参 桂枝 白术各二两 当归 防己 黄芩 甘草 白芍药 芍药 杏仁各一两

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盂半，加大枣二枚，煎七分，去滓服，不拘时候。

【主治】中风占语，或歌哭，或笑语，无所不至。

29073 加减续命汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】防风 芍药 白术 川芎 防己 桂枝 甘草 麻黄 苍术 羌活

【用法】水二钟，加生姜一片，大枣二个，灯心二十茎，水煎，捶法，临服入姜汁调服。

【主治】脚气类伤寒，头疼，身热恶寒，支节痛，便秘呕逆，脚软屈弱，不能转动者。

【加减】暑中三阳，所患必热，脉来数，去附子、桂枝、麻黄，加黄柏、黄芩、柴胡；寒中三阴，所患必冷，脉来迟，加附子；起于湿者，脉来弱，加牛膝、木瓜；起于风者，脉来浮，加独活；元气虚，加人参少许；大便实者，加大黄。

【宜忌】禁用补剂及淋洗。

29074 加减续命汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】杏仁 官桂 胆星 橘红各八分 川芎 防风 人参 黄芩 附子各一钱 甘草五分

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】产后中风，不省人事，口眼歪斜，半身不遂，语言蹇涩，手足颤摇。

29075 加减续命汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】麻黄 防风 细辛 桂心 附子 芍药 防己 党参 川芎 甘草

【用法】水煎服。

【主治】寒痹作痛。

【方论选录】本方用麻黄、细辛、防风以发表风寒，桂心、附子以温里除寒，川芎、芍药以活血缓痛，防己利湿缓痛，党参、甘草以补气血扶正气，故为用于寒痹作痛之温寒定痛利痹之剂也。若用于慢性肌肉风湿之症，有发汗活血镇痛之作用。

29076 加减葳蕤汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生葳蕤二钱至三钱 生葱白二枚至三枚 桔梗一钱至钱半 东白薇五分至一钱 淡豆豉三钱至四钱 苏薄荷一钱至钱半 炙草五分 红枣两枚

【功用】滋阴发汗。

【主治】阴虚之体，感冒风温，及冬温咳嗽，咽喉痰结者。

【方论选录】何秀山按：方以生玉竹滋阴润燥为君；臣以葱、豉、薄、桔疏风散热；佐以白薇苦咸降泄；使以甘草、红枣甘润增液，以助玉竹之滋阴润燥。为阴虚体感冒风温，及冬温咳嗽，咽干痰结之良剂。

29077 加减葛花汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】葛花二钱 鸡棋子三钱 花粉二钱 石斛三钱 沙参四钱 麦冬一钱半 茯苓二钱 苡仁四钱 橘红一钱 陈贝母二钱 杏仁三钱 橄榄二枚（打碎者亦可用）

【主治】嗜饮太过，伤肺而咳者。

29078 加减葛根汤

【方源】《疫痧草》。

【组成】葛根 牛子 香豉 桔梗 枳壳 薄荷 马勃 蝉衣 荆芥 防风 连翘 栀子 赤芍 甘草

【主治】烂喉疫痧，邪尚在表，火不内炽，无汗痧隐，舌白脉郁，喉烂不甚者。

29079 加减葛根汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】葛根 荆芥 防风 羌活 柴胡 前胡 大力 沙参 白芍 桔梗 甘草

【主治】麻疹初起，时令时暖时寒。

29080 加减葛根汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】葛根一两 桂枝三钱 淡豆豉四钱 黄芩四钱（酒洗） 麻黄三钱 连翘三钱 滑石四钱 木通三钱 黄柏三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】伤寒自汗。

【方论选录】此方用葛根为君。夫葛根乃清扬平淡之品，即再加三钱二钱，亦无妨碍。惟葛根能清肌肉之热，虽其表虚，可以自汗，必须连翘、豆豉、麻黄、桂枝四味走表之药，辅

佐葛根，方可将肌肉之邪，合盘托出，达于皮毛，此所出者，乃正汗也。其肌肉即然瘀热，五内未有不热者，故用黄芩清其血中之热，滑石清其六腑之热，黄柏清其下焦之热，木通引热由小便出，甘草和诸药而利胃腑。一剂汗出，自汗止矣。

29081 加减葶苈丸

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】大黄(煨) 天冬(去心) 杏仁(去皮尖，另研) 百合 桑白皮(炒) 木通 甜葶苈(炒)

【用法】炼蜜为丸。滚白水送下。

【主治】龟胸。肺热，其胸高肿，状如龟样。

29082 加减紫金丹

【方源】《金鉴》卷八十九。

【组成】白茯苓 苍术(米泔浸，炒)各二两 当归 熟地黄 白芍药(炒) 陈皮各四两 肉苁蓉(酒洗，去鳞甲)一两 丁香一钱 红花五钱 瓜儿血竭三钱 乳香(去油)三钱 没药(去油)三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。用黄酒送下。

【功用】消热化痰，理气健脾，润肌定喘。

【主治】胸骨外伤日久，胸骨高起，肌肉削瘦，内有邪热瘀血，痞气膨闷，睛蓝体倦，痰喘咳嗽者。

29083 加减紫菀汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】贝母 前胡 紫菀 白术 桑皮 甘草 黄芩 紫苏 陈皮 五味子 知母 杏仁 赤苓 当归 麻黄

【功用】止嗽安胎。

【主治】妊娠咳嗽，因感风寒伤肺而成，谓之子嗽。

29084 加减黑神散

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】生地 赤芍 桂心 归梢 蒲黄 鹿角屑 红花 白芷 朴消 黑豆 附米 益母草

【主治】妊娠热病六七日后，脏腑极热 熏蒸其胎，致胎死腹中，胎冷不能自出者。

29085 加减黑神散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】归尾 赤芍各二钱 蒲黄 桂心 炮姜 甘草各一钱 炒黑豆五钱 川芎二钱

【用法】水煎服。

【功用】祛瘀行瘀。

【主治】产后恶露不下，腹痛呕吐，四肢微冷，时恶寒而不发热，唇淡口和，苔白底淡，脉沉迟无力。

29086 加减黑膏汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五钱 淡豉一钱半 连翘三钱 荆芥一钱半 甘草五分 葱白三枚

【用法】水煎，去滓温服。取微汗。

【主治】怀妊感冒发热，脉浮数者。

29087 加减黑膏汤

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】淡豆豉三钱 薄荷叶八分 连翘壳三钱 炙僵蚕三钱 鲜生地四钱 熟石膏四钱 京赤芍二钱 净蝉衣八分 鲜石斛四钱 生甘草六分 象贝母三钱 浮萍草三钱 鲜竹叶三十张 茅芦根(去心，节)各一两

【主治】疫邪不达，消烁阴液，痧麻布而不透，发热无汗，咽喉红肿燥痛白腐，口渴烦躁，舌红绛起刺，或舌黑糙无津之重症。

29088 加减集圣丸

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】黄连 干蟾(烧存性)各二钱 莪术(煨) 青皮 木香 砂仁 当归 使君子肉 夜明砂 五灵脂 神曲(炒) 山楂肉各一钱半

【用法】上为末，粟米糊为丸，如黍米大。量儿大小加减，米饮送下。

【主治】伤食之后，疳病初起，属肥热疳者。

29089 加减痞气丸

【方源】《东垣试效方》卷二。

【组成】黄芩(酒制)三分 黄连(酒制)三分 厚朴一钱 半夏半钱 益智三分 吴

茱萸二分 红花半分 青皮二分 当归尾二分 茯苓二分 泽泻二分 神曲(炒)二分 广茂二分 昆布二分 橘皮(去白)二分 熟地黄二分 人参二分 附子二分 葛根二分 甘草(炙)二分 巴豆霜二分

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。初服二丸，一日加一丸，二日加二丸，渐加至大便溏，再从二丸加服，食前煎淡甘草汤送下。

【主治】脾积痞气。

29090 加减惺惺散

【方源】《玉机微义》卷五十引《全要方》。

【组成】苍术 川芎 细辛 羌活 防风 白芷 天花粉 甘草 赤芍 桔梗 麻黄 荆芥 当归 薄荷各等分。

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】小儿伤风风热，及伤寒鼻塞，发热惊悸，头痛咳嗽，时行风热。

29091 加减惺惺散

【方源】《普济方》卷三六八。

【异名】清神散，惺惺散。

【组成】苍术(茅山者) 川芎 细辛 羌活 防风 白芷 桔梗根 甘草 赤芍药 桔梗 麻黄(去节) 荆芥 当归各等分

【用法】上为末，每服半钱，沸汤调下；或作饮子，水煎亦可。

【主治】小儿伤寒无汗，头疼发热恶寒，或咳嗽身热，无时潮热，鼻中塞；并天行热气，生豌豆疮，不快，烦躁昏愤，或出疮痘，身疼体热者。

29092 加减惺惺散

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】人参 白术 白茯苓各一钱 炙甘草七分 防风 川芎 藿香各三钱半 细辛二钱

【功用】补脾胃，发散风邪。

【主治】小儿风泄，其症口中气热，呵欠顿闷，乍凉乍热，睡多气粗，大便黄白色，呕吐乳食不消，时作咳嗽。

29093 加减温经汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】当归 川芎 桂心 芍药 莪术(醋炒) 党参各三钱 牛膝二钱 甘草(炙)二钱

【用法】水煎服。

【功用】温经行血。

【主治】积冷脏寒所致的经闭，少腹冷痛拒按，喜热熨，脉沉紧者。

29094 加减温胆汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】茯神(去皮木)一钱 半夏(姜汁制)一钱 陈皮一钱 枳实(麸炒)一钱 当归八分 酸枣仁(炒)八分 山栀(炒)一钱 竹茹八分 人参六分 白术(去芦)一钱 麦门冬 辰砂五分(为末，临服调入) 黄连(姜汁炒)一钱 竹沥半盏(临服加入) 甘草三分

【用法】上锉。加生姜、大枣、乌梅，水煎，调辰砂末温服。

【主治】痰躁(痰火作热烦躁)、痰话(痰火作热惊惕不安、错语失神)，惊惕失志、神不守舍。

【备考】方中麦冬用量原缺。

29095 加减瑞莲丸

【方源】《医部全录》卷三三一引《医贯》。

【组成】苍术一斤(酒浸四两，酢浸四两，米泔水浸四两，生用四两) 枸杞子 破故纸 五味子各二两(去梗) 莲肉一斤(去心，酒浸软，入键猪肚内，煮极烂，取出焙干，为末，猪肚汁仍留为丸) 熟地黄三两(酒浸蒸)

【用法】上为细末，用煮猪肚膏和酒糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，空心温酒送下。

【功用】定心，暖肾，生血，化痰，益气。

29096 加减塌气汤

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】草拨 砂仁 青皮 陈皮 丁香

全蝎(炒) 莱菔子(炒)各等分

【用法】上为末，神曲糊为丸，如麻子大。厚朴汤送下。

【主治】小儿腹胀。

29097 加减槐花散

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】条芩一钱 黄连八分 槐花(炒)七分 枳壳五分 升麻一钱二分 赤芍药一钱 生地黄八分 苍术一钱五分 甘草二分 当归五分

【用法】用水一钟半，煎至七分，食前服。

【主治】痔漏。

29098 加减愈风汤

【方源】《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。

【组成】通圣散一两 四物汤五钱 黄连解毒汤五钱。

【用法】上为末。每服五钱，水一大盏，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】风湿肿痛。

29099 加减解毒丸

《准绳·疡医》卷五。为《丹溪心法附余》卷二十四“太乙神丹”之异名。见该条。

29100 加减解毒汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】黄连一钱五分 梔子一钱五分 黄芩一钱五分 柴胡二钱 知母二钱 葛根三钱 羌活二钱 防风一钱 连翘一钱 人参一钱五分 当归一钱 生地黄一钱 甘草一钱

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】伤寒曾经汗下后，而热不退，头疼不清，脉数实，心尚烦躁，渴不止者。

29101 加减槟榔汤

【方源】《济生》卷三。

【组成】槟榔 陈皮(去白) 紫苏叶各一两 甘草(炙)半两

【用法】上咬咀。每服半两，水一盞半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】一切脚气。

【加减】如脚痛不已者，加宣木瓜、五加皮煎；妇人脚痛，加当归煎；室女脚痛，多是肝血盈实，宜加赤芍药煎。师尼寡妇，亦宜服之。中满不食者，加枳实煎；痰逆成呕者，加半夏煎；小便不利，加木通煎；转筋者，加吴茱萸煎；脚痛大便不通者，用此汤下青木香丸；如更不通，加大黄煎；脚肿而痛者，加大腹皮、木瓜煎；足痛而热者，加地骨皮煎。

29102 加减槟榔汤

【方源】《普济方》卷二四〇引《医方集成》。

【组成】槟榔 香附子(去毛) 陈皮(去白) 紫苏叶 木瓜(去瓤) 五加皮 甘草(炙)各一两(一方无香附子)

【用法】上咬咀。每服四钱，水一盞半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服。

【功用】顺气防壅。

【主治】一切脚气脚痛。

【加减】足痛而热者，加地骨皮煎；妇人脚气，多由血虚，加当归半两；室女脚痛，多由血实，加赤芍药一两半；如或大便秘结，虚弱者，加枳实，壮盛者加大黄；如脚痛不已加转筋者，加吴茱萸；痰逆或呕者，加半夏；小便不通，加木通；脚痛大便不通者，用此汤送下青木香丸亦可。

29103 加减磁石散

【方源】《古今医鉴》卷十二引崑山郑氏秘方。

【组成】磁石 归尾 白芷 蛇床子 赤芍药 丹皮 发灰 荆芥穗 川芎 生地 陈皮 甘草。

【用法】水煎，空心服。

【主治】产后用力过度，子宫不收者。

【加减】七日后，去白芷、赤芍、归梢，加熟地、当归、白芍、人参、黄耆。

29104 加减镇心丹

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷一引《北窗》。

【组成】天门冬 黄耆(蜜炙) 当归身

(酒焙) 熟地黄各一两半 麦门冬 生干地黄 山药 白茯苓各一两 五味子 远志(姜汁制) 人参各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服五七十丸，温酒或米饮送下。

【主治】气血不足，心神虚损。

29105 加减镇阴煎

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】熟地三钱 淮膝一钱 泽泻一钱 云苓二钱 白七厘三钱 牛子一钱 银花一钱 甘草五分

【主治】耳痛。肾经虚火上炎，耳内疼痛，耳外红肿者。

【备考】本方用治上证，原书并配合外用虎耳草汁调枯矾少许点之。

29106 加减镇阴煎

【方源】《喉科种福》卷五。

【组成】附片六钱 牛膝一钱半 黑铅五钱 洋参一钱 炙草一钱半 熟地三四钱。

【主治】虚阳上浮而致喉中形如松子鱼鳞，喉内不阻塞者。

29107 加减藜苓汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】猪苓二钱 泽泻二钱 香薷一钱 干葛二钱 赤茯苓三钱

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】夏中热暑，霍乱身热口渴。

【加减】如热极，加石膏二钱，知母二钱；泄极，加升麻五分，滑石三钱；腹痛，加炒芍药二钱，桂三分，寒痛亦如此。

29108 加血竭大红膏

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】当归(锉) 木鳖子(锉碎) 天台乌药(锉) 赤芍药(锉)各一两 小油四两(已上四味，用小油浸七日七夜，滤去滓) 乳香(研)二两 沥青(滤，持拨)十六两 黄丹(罗过)十两 加血竭(另研)半两 没药(另研)一两 琥珀(杵碎，研)一两

【用法】上件乳香、沥青，铁锅内以慢火熬令消尽为度，时月看硬软，旋旋入前项浸药油加减用之，候硬软停当，以棉滤在水盆内，持拨白色，旋入黄丹，再持拨颜色匀，于瓷盒子内存放。每用铁铤子摊在厚软纸上，贴患处。

【主治】折伤。

29109 加诃子四柱散

【方源】《百一》卷六。

【组成】人参(去芦) 白茯苓(去皮) 附子(炮，去皮脐)各一两 木香(纸包煨过) 诃子半两(湿纸包炮，取皮用)

【用法】上为细末。每服二钱，加大枣一个，生姜二片，煎至六分服。

【主治】脏腑虚怯，本气衰弱，脾胃不快，不进饮食，时加泄利，昼夜不息。

29110 加味大建中汤

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】白芍药 官桂 黄耆(蜜炙) 附子(炮) 五味子 干姜(炮) 人参 鹿茸(酒蒸) 白茯苓(去皮) 川芎 半夏 当归(酒浸) 陈皮各一两 甘草半两

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盂半，加生姜七片，大枣一枚，煎六分，去滓，空心服。

【功用】补诸虚。

29111 加味大承气汤

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】大黄 枳壳各二钱 芒消 甘草 陈皮 红花 当归 苏木 木通各一钱 厚朴五分

【用法】上哎咀。作二服。每服水盂半，煎五七沸，温服，不拘时候。

【功用】通下瘀血。

【主治】伤重在內，瘀血不散，腹胀，二便不通，心腹闷乱欲死者。

【宜忌】服此药俟大小便通，方服损药。小儿孕妇勿服。

29112 加味大承气汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】川大黄六钱 厚朴四钱 枳实四钱 芒消四钱 黄芩四钱 滑石三钱 梔子三钱 黄柏三钱

【用法】水煎，温服。

【主治】伤寒热毒传里，觉内热过盛，中宫痞塞不通，其外形并不恶寒，惟见目赤舌苔，脉洪盛有力，素无中寒，身体强壮者。

【方论选录】此方以大黄为君，芒消为佐，枳、朴又佐之，能行气分，惟大黄可多加，芒消宜少用，加滑石清六腑之热，黄芩清血中之热，梔子清上焦之热，黄柏清下焦之热，使其上中下积滞之热，皆随大黄推荡而去。

29113 加味大醒脾散

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】人参 白术（去芦，炒） 白茯苓（去皮） 橘红 丁香 南星（炮） 全蝎（去毒，炒） 天麻（煨） 白附子（煨） 山药（炒） 木香 石莲肉（去壳） 石菖蒲 肉豆蔻 砂仁 甘草

【主治】小儿慢脾风，内虚，昏迷不醒。

29114 加味小青龙汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】干姜（炒黑） 细辛 麻黄 桂枝 甘草各五分 白芍药 五味子各一钱 半夏（姜制）一钱五分 枳壳 桔梗各五分 白茯苓 陈皮各八分

【用法】加生姜三片，水煎，食少时稍热服。

【主治】春初寒邪，伤肺咳嗽。

29115 加味小建中汤

【方源】《三因》卷九。

【组成】桂心三分 甘草（炙）半两 白芍药一两半 远志（去心）半两

【用法】上为细散。每服四大钱，水一盞半，加生姜五片，大枣一枚，煎七分，去滓，入饴糖一块如皂荚子大，煎令溶，食前温服。

【主治】心腹切痛不可忍，按轻却痛，按重则愈，皆虚寒证，服热药并针灸不愈者。

29116 加味小柴胡汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】柴胡 黄芩 甘草各七钱 人参 生地 熟地 枳壳各五钱

【用法】水二钟，加生姜五片，大枣三枚，水煎，食远服。

【主治】产后潮热往来。

29117 加味小柴胡汤

【方源】《普济方》卷一九七引《德生堂方》。

【组成】小柴胡五钱加官桂 草果 槟榔各一钱

【用法】上咬咀。每服水二盞，加生姜三片，大枣一枚同煎，去滓，午后温服；滓再煎，不拘时候。

【主治】表里不分，发为疟疾。

【加减】夏月，加香薷一钱。

29118 加味小柴胡汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】柴胡 人参 黄芩 半夏 甘草 黄连 升麻 芍药 元参

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】发斑，往来寒热，或潮热，口苦咽干而渴，耳聋胁痛，胸满心烦而呕，喘嗽等。

【加减】口干，去半夏，加天花粉；咽痛，加桔梗、荆芥；若呕，加陈皮、干姜，去甘草；斑毒，加犀角、大青；胸中满闷不利，加瓜蒌、枳壳；痰火上喘，加知母、瓜蒌、桑皮；喘渴脉数大，加石膏；胸胁满痛，加枳壳、桔梗；心下痞硬，加枳实、黄连。

29119 加味小柴胡汤

【方源】《奇效良方》卷二十八。

【组成】柴胡 黄芩各二钱 人参 半夏各一钱半 牡蛎粉 枳壳（麸炒） 甘草各一钱

【用法】上作一服。水二钟，加生姜三片，红枣二枚，煎一钟，食远服。

【主治】①《奇效良方》：伤寒胁痛。②《景岳全书》：少阳、厥阴热症。

29120 加味小柴胡汤

【方源】《外科发挥》卷二。

【组成】柴胡二钱五分 黄芩 人参 生地黄 甘草各一钱 半夏六分

【用法】上作一剂。水一钟半，加生姜三片，煎八分，食远服。

【主治】①《外科发挥》：妇女热入血室，致寒热如疟，昼则安静，夜则发热妄语。②《内科摘要》：血虚大劳大怒，火动热入血室，或妇女经行，感冒发热，寒热如疟，夜间热甚或谵语。

29121 加味小柴胡汤

【方源】《外科经验方》。

【组成】柴胡 人参 黄芩(炒) 川芎 白术 黄耆(盐水浸炒) 当归(酒炒) 甘草 黄柏(酒拌炒) 知母(酒拌炒) 各一钱 半夏五分

【用法】上作一剂。水二钟，煎八分，食前服。

【主治】囊痈腐烂，或饮食少思，日晡发热。

【加减】痛甚，加黄连；小便不利，加木通。

29122 加味小柴胡汤

【方源】《保婴撮要》卷十三。

【异名】柴胡栀子散(《景岳全书》卷五十六)。

【组成】柴胡一钱五分 人参五分 黄芩七分 半夏五分 甘草(炒)三分 山栀 牡丹皮

【用法】上作二三服。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】肝胆风热，发为疮疡，耳前后肿，或结核痈痛，发热恶寒，或寒热往来，或潮热晡热，口苦耳聋，或胸胁作痛，或月经不调。

①《保婴撮要》：肝胆经部分一切疮疡，发热潮热，或饮食少思，或身热恶寒，颈项强直，胸胁作痛。②《校注妇人良方》：肝胆风热，耳前后肿痛，或结核痈痛，或寒热晡热，或经候不调。③《济阴纲目》：肝经下部肿胀，小便不利，或寒热往来，或晡热，或胸胁作

痛。

29123 加味小柴胡汤

【方源】《诚书》卷十五。

【组成】柴胡二钱 黄芩(炒)一钱 人参 半夏各七分 甘草(炙)五分 山栀(炒) 甘草各三分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】肝胆风热，耳边肿痛，结核寒热。

29124 加味小柴胡汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】柴胡 黄芩(炒)各二钱 人参 半夏 胆草 栀子 当归 白芍各钱二分 甘草六分

【用法】加生姜三片，水二钟，煎八分，食远温服。

【主治】肝胆二经部位，热毒瘰癧，及一切疮疡，发热潮热，并小腹胁股结核，囊痈便毒，或耳内耳下生疮。

29125 加味小柴胡汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】柴胡一钱 白芍一两 茯神五钱 麦冬三钱 甘草一钱 陈皮五分

【用法】水煎服。

【主治】恐惧内伤，心胆虚弱，感冒风邪，畏寒作颤。

【方论选录】此方用柴胡以和解胆中之邪实，佐白芍、茯神、麦冬补胆气之弱，而即补心气之虚也。二经得补而气旺，恐惧且不畏，又何惧于外邪哉。

29126 加味小柴胡汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】小柴胡汤加生地 山栀 枳壳

【主治】产后寒热往来。

29127 加味小柴胡汤

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】小柴胡汤加当归 生地 丹皮

【主治】妇人中风，邪热未尽，适值经来，邪热乘虚入于血室，经水断而续来寒热，发作有时，如疟状者。

【方论选录】血室肝主之，肝与胆为表里，

胆因肝受邪而病寒热,故用小柴胡汤主之也。加当归、生地、丹皮者,所以清血分之热也。

29128 加味小柴胡汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】小柴胡汤加竹茹二钱 生姜重用三钱

【用法】水煎服。

【主治】少阳证,耳聋胁痛,干呕,潮热。

29129 加味小柴胡汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 当归 升麻 陈皮 泽泻

【用法】水煎服。

【主治】疹后疟疾。

【加减】无汗恶寒,加苍术、独活;发热过期不退,加葛根;胸腹饱满,加枳壳、桔梗;停食,加厚朴、山楂;烦躁谵语,大便闭结,加知母、石膏;汗多身冷,加芍药、桂枝;三月久疟,加人参、杏仁,又加生姜一片、大枣一枚,再加桃枝七条,未发时温服。

29130 加味小柴胡汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】柴胡三钱 黄芩三钱 知母三钱 潞参三钱 鳖甲三钱(醋炙) 清半夏二钱 常山一钱半(酒炒) 草果一钱 甘草一钱 酒曲三钱 生姜三钱 大枣两枚(擘开)

【主治】久疟不愈,脉象弦而无力。

【加减】疟初起者,减潞参、鳖甲;热甚者,加生石膏五六钱或至一两;寒甚者,再加草果五分或至一钱。

【方论选录】疟邪不专在少阳,而实以少阳为主,故其六脉恒露弦象。其先寒者,少阳之邪外与太阳并也;其后热者,少阳之邪内与阳明并也。故方中用柴胡以升少阳之邪,草果、生姜以祛太阳之寒,黄芩、知母以清阳明之热。又疟之成也,多挟痰挟食,故用半夏、常山以豁痰,酒曲以消食也。用人参,因其疟久气虚,扶其正即所以逐邪外出。用鳖甲者,因疟久则胁下结有痞积,消其痞积,然

后能断疟根株。用甘草、大枣者,所以化常山之猛烈而服之不至眩眩也。

29131 加味小柴胡汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】半夏 条芩 茯苓 甘草 木香 川连 白芍 生姜 大枣

【主治】产后疟疾兼作,因胎前湿热未化,致产后下陷脾经,寒热滞下不已者。

29132 加味小调经散

【方源】《金鉴》卷四十九。

【组成】小调经散加红花 丹皮 牛膝

【主治】妇人血分血瘀,四肢浮肿。

【备考】本方中的小调经散,即《产育保庆》之“调经散”。

29133 加味小续命汤

【方源】《医统》卷十二。

【组成】小续命汤去生姜,加草薢、川楝子、独活、干木瓜。

【用法】水煎,碗底洗,放麝香少许,将药冲入和匀服。数十帖后,加五积散同煎服愈。

【主治】鹤膝风,行履不得者。

29134 加味小蓟饮子

【方源】《方症会要》卷三。

【组成】生地 小蓟 滑石 通草 淡竹叶 蒲黄(炒) 藕节 当归 山栀 甘草(炙) 车前 麦冬 陈皮 牛膝

【主治】小便出血。

29135 加味天仙藤散

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】天仙藤(洗,略炒)六分 木瓜一钱 香附六分 紫苏 陈皮各四分 乌药七分 甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠子满,腿漆浮肿,脚面足趾水出,气促胸闷者。

【加减】虚甚,加人参一钱,当归、白术各二钱。

29136 加味六君子汤

【方源】《医统》卷五十三引丹溪方

【组成】人参 白术 茯苓各一钱 甘草

五分 陈皮 半夏各钱半 荆芥穗五分

【用法】以水二盏，加生姜三片，大枣二枚，煎一盏，去滓，入竹沥二匙温服。

【主治】气虚痰盛，风邪眩运不休者。

29137 加味六君子汤

【方源】《普济方》卷二〇七引《德生堂方》。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 黄耆 山药 砂仁各一两 厚朴七钱半 肉豆蔻（面炒研）七钱半

【用法】上为末。每服二钱，饮水调服，不拘时候；如热，煎麦门冬水调服。

【主治】一切脾胃虚热泄泻之症；伤寒病后，米谷不化，肠中虚滑，发渴微痛，久不愈者；及小儿脾疳、泄痢。

29138 加味六君子汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】陈皮 半夏 苍术（米汁水浸）人参各一钱 白术一钱五分 白茯苓一钱二分 炙草七分 升麻 柴胡各五分

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】①《万氏女科》：白带，年久不止者。②《会约》：白带属湿痰而兼虚者。

【备考】原书治上证，兼服苍莎导痰丸。

29139 加味六君子汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】六君子汤加枳实（炒） 神曲（炒） 砂仁（炒）各五分

【用法】生姜为引，水煎，食后服。

【主治】孕妇伤食，腹满吞酸，恶心不喜食者。

29140 加味六君子汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】六君子汤加枳实（麸炒）五分 山楂五分 姜黄三分

【用法】生姜三片为引，水煎服。

【主治】产后伤食，呕吐腹胀。

29141 加味六君子汤

【方源】《医医大全》卷三十六引《集验方》。

【组成】人参 白术 白茯苓 半夏各一钱五分 天麻（火煨） 陈皮各一钱 僵蚕（酒炒，去丝） 当归各二钱 附子（滚汤泡去皮脐）六分 川芎八分 甘草三分

【用法】加灯心四十根，生姜三片，水煎服。

【主治】下颏脱落。

29142 加味六君子汤

【方源】《医便》卷四。

【组成】半夏（汤泡七次，晒干切片，再以生姜自然汁拌） 白茯苓（去皮）各一钱五分 陈皮一钱 人参八分 白术（炒） 砂仁（炒）各六分 甘草二分

【用法】加生姜三片，水煎，食远温服。

【主治】妊娠二三月，时作呕吐恶心。

29143 加味六君子汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《回春》。

【组成】香附子一钱半 白术 白茯苓 陈皮 半夏各一钱 人参七分 木香 缩砂各五分 甘草三分

【用法】上锉，作一贴。加生姜三片，大枣二个，紫苏叶七片，同煎服。

【主治】食厥。饮食过度，或作气恼，卒然晕倒，口噤不能言，目不识人，四肢不举。

29144 加味六君子汤

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】六君子汤加炮干姜 白豆蔻 黄连制吴茱萸

【主治】脾胃大虚，以致膈噎不食。

29145 加味六君子汤

【方源】《准绳·杂病》卷二。

【组成】白术三钱 人参 黄耆各一钱半 白茯苓二钱 陈皮 半夏曲 芍药 木瓜各一钱 炙甘草 大腹皮各五分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】病后脾虚浮肿。

29146 加味六君子汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】人参一钱 白术（去芦）一钱五分 陈皮八分 白茯苓（去皮）一钱 半夏（姜

制) 八分 干葛七分 山楂肉一钱 甘草(炙) 五分 砂仁五分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】中气虚而胃弱，不爱食，及食不生肉，不长力，或常微热怯冷，神疲倦怠，或带痰嗽。

29147 加味六君子汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】人参 白术(去芦) 白茯苓(去皮) 黄耆各一钱 怀山药二钱 砂仁(研) 一钱 甘草五分

【用法】上锉一剂。加大枣三枚，水煎，空心服。

【主治】脾痞、泄泻、痢疾，属气虚者。

【加减】如腹痛，加炒黑干姜、木香各五分，乌梅一个。

29148 加味六君子汤

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】人参 白术 茯苓 半夏 陈皮 甘草 川芎 当归 黄耆

【主治】肾疽因脾虚不能消散，不溃不敛。

29149 加味六君子汤

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】人参 白术 茯苓 陈皮(去白) 半夏(汤泡七次) 厚朴(姜制) 各一钱 甘草(炙) 减半

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】饮食停滞于脾，以致腹胀呕吐。

29150 加味六君子汤

【方源】《法律》卷三。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 陈橘皮 半夏各一钱 竹沥半小盏 麦冬三钱

【用法】用水二盏，加生姜三片，大枣二枚，煎六分，温服。

【主治】四肢不举，属于脾土虚衰者。

【加减】口渴，去半夏，加蒺藜、石膏；虚甚不热者，加附子。

29151 加味六君子汤

【方源】《济阳纲目》卷十四。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 半夏

陈皮 沉香 厚朴 紫苏子 吴茱萸

【用法】上锉。水煎服。

【主治】胃有浊气，膈有宿痰，不因饮食时常虚暖。

29152 加味六君子汤

【方源】《济阳纲目》卷三十六。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 陈皮 半夏 干姜 白豆蔻 黄连(姜汁炒) 吴茱萸(制)

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【主治】翻胃，气虚有寒。

29153 加味六君子汤

【方源】《济阳纲目》卷三十九。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 陈皮 半夏 苏子 大腹皮 木香 草果 厚朴 枳实

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】因怒伤肝乘肺，传大肠者，腹鸣，气走有声，二便或闭或溏。

29154 加味六君子汤

【方源】《济阳纲目》卷九十一。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 陈皮 半夏 黄柏 知母 滑石 石苇 琥珀

【用法】上锉。水煎服。

【主治】苦病淋而茎中痛甚，不可忍者。

29155 加味六君子汤

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】人参 白术 炮姜 陈皮 半夏(制) 茯苓 炙甘草 升麻(蜜炙) 柴胡(醋炒) 肉桂

【用法】水煎服。

【主治】小儿阳气不营四末，致成五硬，仰头取气，难以动摇，气壅疼痛，连胸膈间，手心、足心冰凉而硬，见有肝木乘脾，食少气弱者。

29156 加味六君子汤

【方源】《医彻》卷四。

【组成】人参一钱 白术一钱(土炒) 肉桂一钱 牛膝一钱半 茯苓一钱 炙甘草三分 半夏一钱 广皮一钱 益母草二钱

【用法】加砂仁末七分,生姜一片,水煎服。

【主治】产后中气大虚,恶露不下。

29157 加味六君子汤

【方源】《性病》。

【组成】炙党参 甘草 半夏 阿胶珠(蛤粉炒) 制白术 茯苓 陈皮 黑姜 蕲艾叶各二钱

【用法】水煎,温服。

【主治】经多色淡。

29158 加味六君子汤

【方源】《增订胎产心法》卷二。

【组成】人参随宜 白术一钱或一钱五分(土炒) 茯苓一钱 陈皮八分 制半夏一钱 炙草五分

【用法】生姜为引,水煎服。

【主治】妊娠脾虚内伤泄泻。

【加减】米食所伤,加谷芽;面食所伤,加麦芽;肉食所伤,加山楂;如肝木侮土,兼食热作呕,加柴胡、生姜;若兼呕吐腹痛,手足逆冷,乃寒水侮土,加姜、桂;若泄泻黄色,加木香、煨肉果;若作呕不食,腹痛恶寒,乃脾土虚寒,加术、香、姜、桂;命门火衰,加益智仁。

29159 加味六君子汤

【方源】《增订胎产心法》卷五。

【组成】人参 茯苓 半夏(制)各一钱 白术二钱(土炒) 陈皮 炙草各八分 肉果一枚(面煨熟去面) 木香三四分(一方有炙干姜四分)

【用法】水煎服。

【主治】产后泻久,胃气虚弱,完谷不化。

29160 加味玉屏风散

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】石膏 茵陈 黄耆 白术 防风

【主治】黄汗,汗出染衣者。

29161 加味玉屏风散

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】黄耆 白术 防风 当归 苡仁 茯苓 牛膝 卑代 桂心 甘草

【主治】膝眼风,寒湿偏胜者。

29162 加味玉屏风散

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生箭耆一两 白术八钱 当归六钱 桂枝尖一钱半 防风一钱半 黄蜡三钱 生白矾一钱

【用法】水煎服。

【主治】破伤后,预防中风,或已中风而痲痹,或因伤后房事不戒以致中风。

【加减】若已中风抽掣者,宜加全蜈蚣两条;若更因房事不戒以致中风抽风者,宜再加真鹿角胶三钱(另煎兑服)、独活一钱半;若脉象有热者,用此汤时,知母、天冬皆可酌加。

【方论选录】此方原为预防中风之药,故用黄耆以固皮毛,白术以实肌肉,黄蜡、白矾以护膜原。犹恐破伤时微有感冒,故又用当归、防风、桂枝以活血散风。其防风、桂枝之分量特轻者,诚以此方原为预防中风而设,故不欲重用发汗之药以开腠理也。

29163 加味玉屏风散

【方源】《千家妙方》下册引黄文东方。

【组成】生黄耆 15 克 生白术 12 克 防风 6 克 生地 9 克 玉竹 12 克 地肤子 9 克 豨莶草 9 克 连翘壳 12 克 银花 9 克 红枣 5 枚

【用法】水煎服,每日一剂。

【功用】益气固表,滋阴清热,佐以化湿。

【主治】荨麻疹,属血虚生风,表卫不固者。

29164 加味归术芎散

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】当归 白术 生地各一两 川芎 五钱 升麻一钱

【主治】妇人行经之前一日大便出血者。

29165 加味四君子丸

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】潞党参(去芦,炒)一两 白术(炒)八钱 川椒(去合口者)一钱五分 丝饼七钱 肉苁蓉(酒洗淡)五钱 茯苓四钱 炙草二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三钱，白菊花汤送下。

【主治】虚寒目疾。

29166 加味四君子汤

【方源】《三因》卷十五。

【异名】加味四君汤（《景岳全书》卷五十三）。

【组成】人参 茯苓 白术 甘草（炙） 黄耆 白扁豆（蒸）各等分

【用法】上为末。每服二钱匕，汤点服。

【主治】①《三因》：五痔下血，面色萎黄，心忪，耳鸣，脚弱，气乏，口淡，食不知味。②《外科发挥》：中气虚，不能摄血，致使血不禁。

29167 加味四君子汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】白术 白茯苓 人参 甘草 柴胡 薄荷叶 黄芩各等分

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，加生姜三片，大枣一枚，煎至一盏，去滓服，不拘时候。

【主治】久疟，热多寒少。

29168 加味四君子汤

【方源】方出《直指》卷十六，名见《奇效良方》卷三十七。

【组成】人参一两 白茯苓一两 白术一两 甘草（炙）半两 黄耆（炙） 白芍药 白扁豆（制）各一两

【用法】上锉细。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，水煎服。

【主治】①《直指》：色疸。②《医宗必读》：湿疸及久疸不愈。

29169 加味四君子汤

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】人参 白茯苓 白术 甘草 桔梗各等分

【用法】上为细末。白汤调下。

【主治】消渴。

29170 加味四君子汤

【方源】《医学纲目》卷三十九引海藏方。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草 杏仁 桑白皮各等分 半夏曲减半

【用法】水煎服。

【主治】涎嗽。

29171 加味四君子汤

【方源】《准绳·幼科》卷五引海藏方。

【组成】人参 白术 黄耆 白茯苓 甘草 瓜蒌根 桔梗各等分

【用法】水煎服。

【主治】疮疹已出未出，大便秘涩，或时发渴者；及因禀受不足，或因吐泻之后，或因汗多，或利小便，元气既虚，津液干涸，不得润滑而致大便秘涩者。

29172 加味四君子汤

【方源】《得效》卷六。

【组成】人参 白术 白茯苓 川芎 黄耆 甘草 罂粟壳（去蒂萼穰，切，蜜炒）各等分

【用法】上锉散。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，枣子一枚，乌梅一个，水煎，温服。

【主治】久患痢疾，服药已多，而疾不愈者。

29173 加味四君子汤

【方源】《东医宝鉴·内景篇》卷四引《得效》。

【组成】四君子汤加肉豆蔻（煨） 诃子（炮）各一钱

【用法】上锉，作一帖。加生姜三片，大枣二枚，水煎，空心服。

【主治】气虚泄泻。

29174 加味四君子汤

《普济方》卷三七二。为《直指小儿》卷二“生附四君子汤”之异名。见该条。

29175 加味四君子汤

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【组成】人参 白术 茯苓各二钱 甘草（炙）一钱 川芎 当归

【用法】加生姜，大枣，水煎服。

【主治】气血俱虚之症。

【备考】方中川芎、当归用量原缺。

29176 加味四君子汤

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】人参 白术 茯苓 炙草 归尾 川芎 枳壳 香附 肉桂各一钱

【用法】水煎服，用槟榔、木香磨浓汁各五七匙入内同服。

【主治】难产过二三日，中气不足，不能运动其胎，人事困顿，饮食少者。

29177 加味四君子汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】人参 白术 白茯苓 炙草 麦冬 车前子各一钱 桂心五分

【用法】加生姜三片，水煎，食前服。

【主治】产后气虚，不能运化流通津液，致使小便不通，或虽通而亦短少。

29178 加味四君子汤

【方源】《医统》卷八十二。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 秦艽 黄蜡各等分

【用法】上咬咀。每服半两，水煎服。

【主治】劳嗽。

【宜忌】服药后，止可食淡者。猪蹄肉仍须先煮去元汁，再以白汤熟煮。忌房劳及一切生冷鱼腥咸毒腌藏等物。

29179 加味四君子汤

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】人参一钱二分 炙草五分 白术一钱五分 茯苓 白蔻 厚朴各八分 陈皮一钱 砂仁一钱

【用法】加生姜三片，大枣二个（去核），水煎服。

【主治】呕吐胸闷。

29180 加味四君子汤

【方源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】人参 白术 茯苓各二钱 甘草（炙） 芍药 良姜各一钱

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水煎服。

【主治】霍乱转筋吐泻，腹中痛，体重，脉沉而细。

29181 加味四君子汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷五引《回春》。

【组成】人参 白术各一钱三分 甘草一钱 当归八分 赤茯苓 陈皮 厚朴 缩砂 苏子 桑白皮各六分 沉香 木香各五分（并水磨取汁）

【用法】上锉，作一帖。加生姜三片，大枣二个，水煎，和二香汁调服。

【主治】气喘。

29182 加味四君子汤

【方源】《准绳·女科》卷五。

【组成】人参 茯苓 白术 甘草 陈皮 藿香 缩砂仁 黄耆各等分

【用法】上锉散。每服四钱，加生姜三片，大枣一枚，水煎，温服。

【功用】调脾胃，进饮食。

【备考】新产之后，虽无疾，故宜将息，调理脾胃，美进饮食，食则脏腑易平复，气血自然和调，百疾不生。

29183 加味四君子汤

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】人参 白术 茯苓 砂仁 橘红各一钱 甘草五分

【用法】水一钟，煎六分，食前温服。

【功用】和中。

29184 加味四君子汤

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】人参三分 白茯苓三分 苍术三分 炮干姜四分 白术（炒）六分 制附子一分 羌活一分 炙甘草四分

【用法】上锉。加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】慢脾风，涎痰壅滞。

29185 加味四君子汤

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草（炙） 半夏 陈皮 藿香 砂仁各等分

【用法】上锉。每服四钱，加生姜三片，大枣一枚，水煎，温服。

【主治】产后呕逆不已。

29186 加味四君子汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草(炙) 黄耆各一钱 罂粟壳(炙,去蒂)五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】产后赤白痢。

29187 加味四君子汤

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草(炙) 芍药(炒) 升麻各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】虚泻,饮食入胃不住,完谷不化。

29188 加味四君子汤

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】四君子汤加陈皮 厚朴 麦门冬 竹茹

【用法】水煎服。

【主治】下痢虚呕,食少。

29189 加味四君子汤

【方源】《济阳纲目》卷八十九。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 川芎 当归 山梔子 连翘。

【用法】上锉。水煎服。

【主治】汤火伤,患处肉未死而作痛者。

【备考】若患处肉死已溃而不收敛者,用四君子加芎、归、黄耆。

29190 加味四君子汤

【方源】《济阳纲目》卷九十二。

【组成】黄耆 升麻 人参 白术 茯苓 甘草(炙)各□钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】气虚及胃弱,不能通调水道,下输膀胱,致小便不通。

29191 加味四君子汤

【方源】《济阳纲目》卷一〇八。

【组成】人参 白茯苓 白术各一钱 甘草(炙)五分 熟地黄一钱(砂仁炒)

【用法】上咬咀。水煎服。

【主治】发脱落及脐下痛。

29192 加味四君子汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白茯苓 白术 人参各一钱二分 甘草 陈皮 厚朴 莲子各一钱

【用法】水煎,温服。

【功用】调理脾胃,进饮食。

29193 加味四君子汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参 白术各二两 肉桂三钱 北五味子三钱 茯苓一两 甘草三钱

【用法】水煎服。

【主治】湿热作痢,数日之后,腹不疼痛,如脓如血,阵阵自下,手足厥冷,元气欲脱者。

29194 加味四君子汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参三钱 白术五钱 茯苓三钱 甘草一分 柴胡一钱 枳壳五分

【用法】水煎服。

【主治】忍饥受饿,腹中空虚,时遇天气不正,时寒时热,遂至胸膈闷塞,宛如结胸者。

29195 加味四君子汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】四君子汤加蜜炙黄耆 归身 熟地 砂仁 制首乌

【主治】恶露净后,用本方调理。

29196 加味四君子汤

【方源】《洞天奥旨》卷七。

【组成】人参五钱 茯苓一两 生甘草二钱 金银花一两 牛膝五钱 炒白术一两

【用法】水煎服。

【主治】多骨痠骨消后,疮口肌肉难生者。

29197 加味四君子汤

《种痘新书》卷十二。为《丹溪心法附余》卷二十三引杨氏方“小异功散”之异名。见该条。

29198 加味四君子汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】茯苓 白术(土炒) 人参 陈皮 木香(煨) 甘草(炙) 黄连(姜炙) 黄

芩

【用法】水煎服。

【主治】痘疮未愈而患白痢者。

29199 加味四君子汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】人参 漂白术 白云苓 当归身 杭白芍 炙甘草各一钱

【用法】加生姜三片，大枣三枚。水煎，温服。

【主治】小儿先痢而变泻者。

29200 加味四君子汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】人参 漂白术 白云苓各一钱 粉甘草八分 芽桔梗一钱 大麦冬二钱、黑 梔仁一钱 片黄芩一钱五分

【用法】加灯心十茎、竹叶七片，水煎，热服。

【主治】脾热传肺，虚火上炎，血从鼻出。

29201 加味四君子汤

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】人参 漂白术 黑炮姜 西砂仁 白豆蔻各一钱 白云苓一钱五分 上青桂八分 公丁香三分 炙甘草五分

【用法】加大枣三枚，水煎，半饥温服。以愈为度。

【主治】小儿气虚、脾败胃伤，浑身浮肿，四肢冷，不渴，小便清长，大便滑泄，不思饮食。

29202 加味四君子汤

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】人参 白术 云苓 甘草 归身 川芎 黄耆 上桂 查肉

【主治】小儿气血两虚，完谷不化，痘疮顶陷，色白不起者。

29203 加味四君子汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】人参随宜 白术二钱 茯苓一钱五分 甘草(炙)一钱 陈皮一钱 扁豆(炒)二钱 干姜(炮)钱半 山药(炒)一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】痢疾呕恶，或恶闻食气，胃虚有寒者。

【加减】若服之平安，而不大效者，加附子一二钱，但须冷服。

29204 加味四君子汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参随便 白术二钱半 茯苓一钱半 甘草(炙)一钱 山药(炒) 当归 扁豆(炒)各二钱 芡实(炒，研末，调药服)三钱

【用法】生姜、大枣为引。或以此方加倍，研细末，加白糖，每日中夜用米饮调服三钱，即睡一刻，更妙。

【功用】补脾固胎。

【主治】妇人脾虚气弱，易于堕胎。

【加减】或加杜仲、续断各钱半。

29205 加味四君子汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参(少者，用山药四钱炒黄代之) 白术二钱 茯苓钱半 炙草一钱 白芍一钱

【主治】妊妇泄泻。

【加减】如脉实而热者，必烦躁、舌黄，加黄芩一钱；如脉虚尿清，或腹痛喜按，谷食不甚化者，加炒干姜五七分，乌梅一个，或加肉豆蔻一钱；如小便短少，口渴，属湿热者，加草薢四钱、煨广香三分，至于扁豆、藿香、诃子之类，俱可加用。

29206 加味四君子汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】人参(少者，或以山药三钱炒黄代之) 白术二钱 茯苓钱半 炙草一钱 白芍钱半 乌梅二个 罂粟壳七分

【用法】水煎，温服。

【主治】产后久痢，积垢去而不止，脾虚肠滑者。

29207 加味四君子汤

【方源】《会约》卷十九。

【组成】人参 白术各二钱 茯苓钱半 炙草一钱 干姜(炮) 白芍(酒炒)各钱半 当归二钱(泄者不用)

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿体弱泄泻，不食昏倦，虚热不止者。

【加减】如气倦，加蜜耆钱半；如气胀，加木香三分；如中寒腹痛滑泻，加吴茱萸、肉豆蔻、白豆蔻、补骨脂之属；如胃寒呕逆，加半夏、生姜，或加附子；如虚热甚生风者，加肉桂、钩藤钩(拣尽钩钱半，宜后入，过煎无力)，或少人参，用山药四钱炒黄之。

29208 加味四君子汤

【方源】《医钞类编》卷八。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 常山 槟榔 乌梅

【用法】加生姜、大枣，水煎，发日晨起服。

【主治】夜疟已出阳分。

29209 加味四君子汤

【方源】《医钞类编》卷八。

【组成】四君子汤加川连 苍术

【主治】湿热伤气，发为白痢，或如脓者。

29210 加味四君子汤

【方源】《验方新编》卷九。

【组成】台党 当归各三钱 黄耆 白术各二钱 茯苓一钱 半夏八分 陈皮 炙甘草各五分

【用法】水煎，空心服。

【主治】产后风瘫初起，手足痿弱，痰忡目眩，俗名产瘫。

29211 加味四君子汤

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】党参(去芦，米炒) 茯苓 羌活 独活各一钱五分 白术(净)二钱 牛膝(盐水炒) 当归各一钱 炙草七分

【用法】加生姜三片，水煎服。病久而虚者，服十全大补汤。

【主治】鹤膝风阳虚症。

【加减】如有寒，加干姜七八分或一钱。

29212 加味四君子汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】泡参五钱 白术 茯苓各三钱 甘草 秦归 酒芍各二钱

【用法】水煎，空腹温服。

【主治】妇人气虚不能摄血，月经先期，经量不多，神倦短气，头晕目眩。

【加减】经量过多，加黄耆三钱，乌贼骨八钱。

29213 加味仙遗粮散

【方源】《扶寿精方》。

【组成】冷饭团二斤 荆芥 防风 五加皮 白鲜皮 木瓜 威灵仙各两半 当归(酒洗) 生地黄(酒洗) 白芍药(炒) 川芎 白茯苓 牛膝 杜仲(炒，去丝) 地骨皮 白芷 青藤 槐花 黄连各一两

【用法】上锉片，作十贴。水钟半，白酒一钟，煎至一钟，疮在上食后服，在下食前服。渣再煎，每日一贴，煎两次合一处，庶浓淡得宜，作两次温服。第三次勿煎，逐日晒干至三贴，统煎汤俟温，洗浴，初服五贴之内，疮势觉盛，乃毒气攻外勿惧，轻者至十贴，重者至二十贴，方见奇功。

【主治】远年杨梅风，漏筋骨疼痛。

【宜忌】忌房事、茶、生冷、煎煨、母鸡、鹅、羊、猪头、蹄、虾、鱼等动风之物。

29214 加味生铁落饮

【方源】《医学碎金录》。

【组成】代赭石五钱 丹参三钱 玄参四钱 远志 菖蒲各二钱 茯神五钱 川贝三钱 胆星二钱 橘红一钱半 麦冬 钩藤各三钱

【用法】水煎二次，分二次服，每次约一茶杯。

【功用】清心、安神、涤痰。

【主治】失眠梦多，属虚火者最宜。

【备考】本方名加味生铁落饮，但方中无生铁落，疑脱。

29215 加味白头翁汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】白头翁三钱 生川柏五分 青子芩二钱 鲜贯众五钱 小川连八分(醋炒) 北秦皮八分(醋炒) 生白芍三钱 鲜茉莉花十朵(冲)

【功用】清肝坚肠，泄热止痢。

【主治】厥阴热痢。

【方论选录】何秀山按：厥阴热痢，赤痢居多，虽属小肠，而内关肝脏，故以仲景白头翁汤，疏肝达郁，纯苦坚肠为君；臣以芩、芍酸苦泄肝；佐以鲜贯众洗涤肠中垢腻，使从大便而泄，乃痢者利也之意；使以茉莉清芬疏气，助白头翁轻清升达之力。此为清肝坚肠，泄热止痢之良方。

29216 加味白头翁汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】白头翁三钱 秦皮二钱 黄连二钱 黄柏二钱 白芍二钱 黄芩三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。

【主治】内虚下陷，热利下重腹痛，脉左小右大者。

29217 加味白头翁汤

【方源】《锦京直指》。

【组成】白头翁三钱 生白芍四钱 川黄连一钱 川黄柏一钱五分 北秦皮三钱 黄芩一钱五分

【主治】湿热陷入下焦血分，赤痢兼血，右尺脉大者。

29218 加味地骨皮饮

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】生地 当归 白芍各二钱 川芎八分 牡丹皮 地骨皮各三钱 胡连一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇女经来内热。

29219 加味地骨皮散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】地骨皮(鲜者)三钱 桑白皮(鲜者)二钱 麦门冬二钱 银柴胡 赤芍药 干葛各一钱 甘草 生犀屑各五分

【用法】水煎，调大小无比散五七分服。

【主治】疹出发热不退，饮食不进；亦治喘急不止。

29220 加味当归饮子

【方源】《普济方》卷二七二。

【异名】加味当归饮(《疡科选粹》卷二)。

【组成】当归 生地黄 升麻各五钱 防风二钱半 荆芥穗 何首乌各二钱 白芍药 柴胡 川芎 羌活 黄耆各三钱 红花 苏木 甘草各一钱

【用法】上咬咀。每服五钱，水二盏，加生姜三片，同煎至八分，去滓，食后、临卧温口服。沐浴取微汗效速，使气血通和，服之应效。

【主治】诸疮痛痒。

29221 加味麦门冬汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】干寸冬(带心)五钱 野台参四钱 清半夏三钱 生山药四钱(以代粳米) 生杭芍三钱 丹参三钱 甘草二钱 生桃仁二钱(带皮尖，捣) 大枣三枚(擘开)

【主治】妇女倒经。

29222 加味吴茱萸汤

【方源】《准绳·女科》卷一。

【组成】半夏二钱 吴茱萸 当归各一钱半 麦门冬(去心) 干姜 白茯苓 苦梗 南木香 防风 牡丹皮 甘草各一钱 官桂 北细辛各半钱

【用法】上作一服。水二钟，加生姜三片，红枣一枚，煎至一钟，食前服。

【主治】冲任虚弱，月候愆期，或前或后，或崩漏不止，赤白带下，小腹急痛，每至经脉行时，头眩，饮食减少，气满心怯，肌肉不泽。

29223 加味青木香丸

【方源】《得效》卷四。

【组成】青木香丸三百粒 白丁香十粒 小酒曲二钱

【用法】上为末，入巴豆三粒，更研和令匀，

蒸饼为丸，如绿豆大。每服二十丸，渐加至三十丸，生姜、橘皮汤送下。宿滞既去，其疾自安。又用小酒曲、木香二件为末，盐汤调服，口有酒香是效。

【主治】糕糕伤脾，噫醋不食，心腹作痛。

29224 加味青州白丸

【方源】《普济方》卷九十四引《经验良方》。

【组成】白附子 天南星 半夏 川姜各二（一）两 白僵蚕 天麻 干蝎各一（二）两 川乌头（去皮尖）半两

【用法】上并生为细末，白面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，生姜汤送下，不拘时候。如瘫风，温酒送下；小儿惊风，薄荷汤吞下五丸。一方以前八味一料为末，加真料苏合香丸二两，姜汁糊丸，如梧桐子大，薄荷汤送下；小儿偶患惊风，生姜、薄荷汤磨下三五丸，灌之立定。

【功用】常服去风痰，利壅隔、安神定志。

【主治】中风，半身不遂，口眼喎斜，痰涎闭塞，咳嗽咯血，胸膈满闷，小儿惊风，妇人血风；大人洗头风，并宜服之。

【宜忌】孕妇忌服。

29225 加味金沸草散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】旋覆花（去梗） 麻黄（去节，水煮去沫晒干） 前胡（去芦）各七钱 荆芥穗一两 甘草（炙） 半夏（汤泡七次，姜汁拌炒） 赤芍药各五钱 鼠粘子（炒） 浮萍各七钱

【用法】上为末。每服三钱，加生姜二片，薄荷叶三五片，水煎服。

【主治】麻疹初起，咳嗽喷嚏，鼻流清涕，眼胞肿，其泪汪汪，面浮腮赤，或呕恶，或泻利，或手掐眉、目、鼻面等较重者。

29226 加味金铃子片

【方源】《中医外科学》。

【组成】延胡索 金铃子 香附 广玉金 檀香 木香 丁香 小茴香 乌药 吴茱萸

各等分

【用法】共研细粉，过100目筛，轧片，每片含生药0.3克。成人每日二至三次，每次5~10片，儿童减半，饭前温开水吞服。

【功用】利气止痛。

29227 加味金铃子散

【方源】《马培之外科医案》。

【组成】川楝子 延胡 青皮 赤芍 甘草 黑栀 枳壳 通草 橘红

【主治】①《马培之外科医案》：肝病。②《重订通俗伤寒论》：怒动肝火，胁肋作痛，呼吸不利，手不可按。

【备考】《重订通俗伤寒论》本方用金铃子三钱，蜜炙延胡、赤芍、焦山栀各钱半，生甘草五分，余药各一钱。

29228 加味胡黄连

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】胡黄连 芦荟 川黄连 肉果 桂心 人参 辰砂 使君子 木香 钩藤 龙齿 茯苓各等分 麝香少许

【用法】上为末，用猪胆汁二个，取汁和药令匀，却装入胆袋内，以绳扎之，更入蓖蓉子二钱（微炒）、黄丹一钱，二味研末，入前药和匀为丸，如绿豆大。每服五七丸，米饮吞下。

【主治】疟疾，一切虚痢。

29229 加味香肥皂方

【方源】《慈禧光绪医方选义》

【组成】檀香 木香 丁香 花瓣 排草香 广零陵香 皂角 甘松 白莲蕊 山柰 白僵蚕 麝香 冰片。

【用法】上研极细面，红糖水合，每锭重二钱。洗沐用。

【功用】涤垢辟秽，嫩面玉肤。

29230 加味消毒饮子

《普济方》卷二七八。为《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医林》“加味消毒饮”之异名。见该条。

29231 加味羚羊角散

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】羚羊角 当归 防风 独活 茯苓 枣仁 五加皮各一钱 米仁五分 杏仁八分 甘草 木香各三分 葱白五寸 生姜五片

【用法】水煎服。

【主治】妊娠子痫。口噤项强，手足挛搐，言语蹇涩，痰涎壅盛，不省人事。

【加减】虚，加人参；痰，加竹沥、姜汁；脾虚，加炒白术；风痰涌甚，加天竹黄一钱，川贝一钱。

29232 加味羚羊角散

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】羚羊角 独活 归身 川芎 茯神 枣仁 米仁 防风 炙甘草 钩藤 桑寄生 人参

【主治】妊娠血虚受风，痰涎上潮，致卒倒无知，目吊口噤，角弓反张，昏厥而为子痫者。

【加减】或加淡竹沥、生姜汁、川贝母、白姜蚕。

29233 加味鼠粘子汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】桔梗 牛蒡子(炒) 射干 防风 甘草(炙) 荆芥 陈皮(去白) 连翘 山豆根

【用法】上咬咀。水煎服，细分呷之。

【主治】痘疹，喉中有疮作痛闭塞，饮食时哽塞而呕。

29234 加味鼠粘子散

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】桔梗 射干 山豆根 防风 干葛 陈皮 荆芥 连翘

【用法】水煎，细细呷之。

【主治】小儿咽中有疮作呕。

29235 加脑子收阳粉

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】麻黄根 藁本 白芷 牡蛎(烧) 龙骨各半两 米粉二两 脑子半钱

【用法】上为细末，研匀。以沙帛包药于汗

处扑傅之。汗止为度。

【主治】一切虚汗、盗汗、自汗及漏风等诸证，汗泄不禁，服诸药不能止者。

29236 加料五加皮散

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】五加皮饮加泽泻 生姜 大枣

【用法】水煎，先服三服。次用大戟、甘遂等分为末，面糊为丸，如弹子大。用樟柳、桑白皮，绿豆浓煎汤，细嚼、空心送下。

【主治】水肿。

29237 加减八味丸汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地一两 山茱萸五钱 丹皮五钱 泽泻二钱 茯苓三钱 山药五钱 麦冬五钱 北五味一钱 肉桂二钱

【用法】水煎服。

【主治】男子肾火虚弱，一交接妇女，则耳中作痛，或痒发不已，或流臭水，以凉物投入则快者。

29238 加减三五七散

【方源】《局方》卷一(绍兴续添方)。

【异名】大三五七散(原书同卷)、三五七散《丹溪心法》卷四。

【组成】山茱萸 干姜(炮) 茯苓(去皮)各三斤 附子(炮，去皮脐)三十五个 细辛一斤八两 防风(去芦)四斤

【用法】上为细末。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】八风五痹，痿痹痹曳，口眼喎斜，眉角牵引，项背拘强，牙关紧急，心中愤闷，神色如醉，遍身发热，骨节烦痛，肌肉麻木，腰膝不仁，皮肤颤动或如虫行；又治阳虚头痛，风寒入脑，目旋运转，有似舟船之上，耳内蝉鸣，或如风雨之声。应风寒湿痹，脚气缓弱等疾。

29239 加减小补元煎

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】党参三钱 口耆三钱(炙) 当归身五钱(炒) 熟地五钱 桂心一钱(冲) 附

片一钱(制) 羌活二钱 山萸肉三钱(炒) 乌梅肉三个 杜仲二钱(炒) 枸杞二钱(炒)。

【用法】水煎服。或以煨姜五钱易桂、附亦可。

【主治】虚寒腰痛，身痛。

【方论选录】治此证者，惟在补气补血暖寒而已。补气之品，莫良于参、耆；补血之品，莫良于归身、熟地。至于附片、桂心，能除沉寒痼冷，且能流通气血，可以为佐；羌活虽非虚证所宜，然能利周身百节之痛，可以为使；山萸肉、杜仲、枸杞，皆肾经药品，可为向导。此方从大补元煎加减，诚补虚暖寒之主剂也。

29240 加减大青龙汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】麻黄三钱 桂枝三钱 荆芥穗三钱 山甲片二钱(炙) 连翘三钱 煅石膏四钱 淡豆豉四钱 葛根六钱 皂刺三钱 黄芩四钱 木通三钱 甘草二钱。

【用法】元酒一钟，水二钟，煎服。

【主治】外感寒邪，或四五日，或五六日，依然头痛身热恶寒，其脉象人迎与气口相等，俱浮洪而数，数极或七至八至者。

【方论选录】此方以麻黄为君，佐芥穗发头部之汗，佐桂枝、连翘、豆豉发周身四肢之汗，佐葛根发肌肉之汗；用山甲、皂刺为诸处引路之兵；石膏甘寒，清内热解肌表；黄芩清血中之热；木通能引热从小便出；甘草调和诸药。察其脉象，如有根蒂，宜先以此方投之。

29241 加减大青龙汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】麻黄三钱 桂枝三钱 荆芥穗三钱 山甲片二钱(炙) 连翘三钱 薄荷三钱 淡豆豉四钱 葛根六钱 皂刺三钱 黄芩四钱 木通三钱 甘草二钱。

【用法】水煎服。

【主治】伤寒发狂，睡去谵语，醒时心虽明

白而狂言乱语，或欲登高而歌，或欲弃衣而走，率意詈骂，目不识人，脉象洪数而稍浮，汗未发透者。

29242 加减大青龙汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】麻黄三钱 桂枝三钱 荆芥穗三钱 山甲片二钱(炙) 煅石膏四钱 淡豆豉四钱 葛根六钱 皂刺三钱 黄芩四钱 木通三钱 甘草二钱 连翘三钱 厚朴五钱。

【用法】水煎服。

【主治】伤寒劳复，发热恶寒，脉象洪数有力者。

29243 加减大建中汤

【方源】《施圆端效方》引《局方》(见《医方类聚》卷一五三)。

【组成】黄耆 芍药各四钱 人参 当归(切，焙) 甘草(炙)各二钱 桂六钱 半夏(洗七次)半两 熟附子一钱(老衰久冷，加至二钱半)。

【用法】上咬咀。每服四钱，水二盏，加生姜二钱三字，大枣半枚，慢火同煎至一盏，去滓。食前温服，每日二三次。

【功用】补中益气血。

【主治】内虚极冷，手足厥逆，小腹挛痛，不堪劳苦，食减喘乏，梦寐精泄。

29244 加减大建中汤

【方源】《普济方》卷三二三。

【组成】芍药二两 当归 川芎 黄耆 桂各一两 甘草(炙) 白术各三分。

【用法】上为末。每二钱半，水一盏半，加生姜、大枣，同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】妇人胎前产后，一切虚损，月水不调，脐腹疼痛，往来寒热，自汗口渴。

29245 加减大建中汤

《医学从众录》卷一。即《临证指南医案》卷一“大建中汤”。见该条。

29246 加减大承气汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】大黄八钱 煅石膏四钱 犀牛角

二钱 芒消二钱 枳实三钱 杭白芍二钱
黄连二钱 栀子三钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】伤寒发狂，睡去谵语，醒时心虽明白而狂言乱语，或登高而歌，或欲弃衣而走，率意詈骂，目不识人，脉象沉洪不浮，内热太盛者。

【方论选录】此方以大黄为君，推盪中宫之邪热；佐用芒消、枳实，以助大黄推盪之力；石膏清其胃热；黄连、犀角、栀子，清其上焦之热；以白芍敛之；以甘草和之。一剂将其内热攻去，其狂自止。

29247 加减小承气汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生川军 风化消 枳实各五钱 煨礞石 皂荚各二钱。

【用法】上药煎成，冲入猪胆汁、米醋、各两小匙，调服西牛黄二分。

【主治】狂证由于醇酒厚味，积热蒸痰，或乘天气极热，盛怒不释，而为狂妄骂詈歌笑，甚则踰垣上屋，面色浊闷，二便结涩者。

29248 加减小承气汤

【方源】《实用正骨学》。

【组成】芒消 枳实 大黄 厚朴 桃仁 红花 乳香 没药 乌药 枳壳分量随症酌用。

【用法】水煎服。

【主治】骨折后，瘀血聚积，大便不通。

29249 加减小柴胡汤

【方源】《云岐子脉诀》卷四。

【组成】赤芍药 柴胡各一两 枳实 大黄 黄芩各半两 甘草三钱

【用法】上咬咀。每服一两，水二盏，加生姜七片，煎至一盏，去滓温服。以利为度，未利再服。

【主治】小便赤涩，大便难。

29250 加减小柴胡汤

【方源】《诚书》卷十三。

【组成】黄芩 白芍药 枳实 厚朴 槟

榔 柴胡 川芎各五分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】寒热往来，两胁及胃口痛。

29251 加减小紫草散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】紫草 人参 茯苓 黄耆 白术 芍药 川芎 当归 甘草 糯米各等分

【用法】上为粗散。每服四五钱，水煎服。

【主治】白痘。

29252 加减小白虎汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】煨石膏四钱 知母三钱 麦门冬三钱 滑石三钱 青黛二钱 甘草三钱

【用法】水煎，温服。外敷冷香散。

【主治】唇肿破裂，内热甚，脉象洪盛者。

【宜忌】素有中寒者忌用。

【方论选录】此方用石膏为君，佐以知母、麦冬清咽散热，青黛清肝腑之热，滑石清六腑之热，用甘草调和，以缓石膏之性。内热清而唇自如初矣。

29253 加减小青龙汤

【方源】《女科指南》。

【组成】香薷七分 半夏一钱二分 苏子一钱 广皮一钱 细辛三分 桔梗四分 白芷八分 干姜六分 杏仁十粒 马兜铃四分或加前胡、薄荷

【用法】加葱一枝(带须白)，生姜二片，荷筒三段，每段二寸，水煎服。

【主治】远年冷哮、喘咳。

【宜忌】忌酸物。

29254 加减小青龙汤

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】麻黄6克 桂枝9克 干姜6克 细辛3克 半夏9克 白芍9克 黄芩9克 栀子9克 甘草6克

【功用】温中化痰，宣肺利湿。

【主治】银屑病，荨麻疹，异位性皮炎等。兼有慢性气管炎的病人疗效更好。

29255 加减小建中汤

【方源】方出《临证指南医案》卷一。名见

《医学从众录》卷一。

【组成】人参 归身(米拌炒) 桂枝木 白芍(炒焦) 南枣

【主治】胃阳虚弱,卫气不护,背微寒,肢微冷,痰多微呕,食减不甘,时作微寒微热,小便短赤,大便微溏,脉左小右虚。

29256 加减小承气汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】枳实四钱 延胡索三钱 五灵脂三钱 木香三钱 竹叶二钱 厚朴四钱 犀牛角二钱 通草一钱

【用法】水煎,温服。

【主治】伤寒热毒传里,觉内热过甚,中宫痞塞不通,其外形并不恶寒,惟见目赤舌苔,脉象洪大,不甚有力,其人素有中寒者。

【方论选录】此方以枳实为君;佐以木香、厚朴、元胡、灵脂,能行血中气滞,气中血滞,其痞塞可以顿开;素有中寒者,加犀角清其上焦之热,绝不碍其中寒;竹叶、通草能引热下行。伤寒痞满有中寒者宜服。

29257 加减小柴胡汤

【方源】方出《伤寒论》,名见《玉机微义》卷三十二。

【组成】小柴胡汤去黄芩,加芍药。

【主治】小柴胡汤证见腹中痛者。

29258 加减小柴胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】柴胡(去苗)二两 黄芩(去黑心) 半夏(汤洗去滑) 甘草(炙)各三分 五味子(炒)一合 干姜(炮)半两

【用法】上锉,如麻豆。每服五钱匕,水一盞半,加生姜四片,煎至八分,去滓温服。

【主治】伤寒五六日,往来寒热,或微热咳嗽。

29259 加减小柴胡汤

【方源】《云岐子脉诀》卷三。

【组成】柴胡(去苗) 黄芩各一两 地骨皮 人参 知母 半夏(制) 茯苓各半两 炙甘草三钱 白芍药八钱

【用法】上咬咀。每服一两,加生姜,水煎服。

【主治】心中恍惚、多悸惊、血虚烦热。

29260 加减小柴胡汤

【方源】《医方类聚》卷五十六引《管见大全良方》。

【组成】人参(去芦) 北柴胡(去芦) 四两 黄芩(去心) 甘草(炙)各一两半 半夏(泡七次,切)一两一分

【用法】上咬咀。每服五钱匕,水一盞半,加生姜四片,大枣三枚,煮取八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒三四日,传少阳胆经,胸胁痛,耳聋,口苦,舌干,往来寒热而呕者。

【加减】咳嗽者,去人参、大枣、生姜,加北五味子二两,干姜半两;若胁下满痛者,去枣,每服加煨过牡蛎半钱;若腹痛者,去黄芩,加芍药一两半;妇人经脉适行,或适断,寒热如疟,昼日明了,暮则谵语,如见鬼状,此为热入血室,每服加生干地黄一两;若心下悸,小便不利者,去黄芩加赤茯苓二两;若不渴,外有微热者,去人参,加桂枝一两半;若胸中烦而不呕者,去半夏、人参,加栝楼实一枚,用四分之一;若渴者,去半夏,更加人参三分,栝楼根二两。

29261 加减小柴胡汤

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】净柴胡一两(去芦) 人参三钱(去芦) 半夏(汤洗七次切作片子) 甘草(炙)各二钱半 防风(去芦)三钱

【用法】上咬咀。每服五钱。水一盞,加生姜五片,大枣一枚,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿伤风伤寒,疮疹阴阳不和,寒热往来,口苦舌干,及气喘咳嗽。

【加减】热甚大便秘涩,加大黄。

29262 加减小柴胡汤

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】人参 柴胡 甘草 麦冬 生地

木通 陈皮各等分

【用法】淡竹叶为引，水煎，食后服。

【主治】小儿变蒸过，如蒸不除者，调其乳母。

29263 加减小柴胡汤

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】柴胡 黄芩 甘草 青蒿 丹皮 熟半夏

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿潮热。

29264 加减小柴胡汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】柴胡一钱五分 茯苓三钱 黄芩一钱 甘草一钱 陈皮五分 天花粉一钱

【用法】水煎服。

【主治】春月伤风，发寒发热，口苦，两胁胀满，或吞酸吐酸。

29265 加减小柴胡汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鳖血柴胡一钱 光桃仁三钱 归尾一钱半 粉丹皮二钱 酒炒黄芩一钱 杜红花一钱 生地二钱 益元散三钱（包煎）

【主治】妇人中风七八日，经水适断，热入血室，寒热如疟，发作有时者。

【方论选录】此方君以柴、芩和解寒热，臣以归尾、桃仁破其血结，佐以生地、丹皮凉血泄热，以清解血中之伏火，使以益元滑窍导瘀，从前阴而出。此为和解寒热，热结血室之良方。

29266 加减小柴胡汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】柴胡 秦艽 赤芍各一钱 甘草五分 陈皮一钱五分 生姜一片 桑枝二钱

【用法】水煎服。

【主治】疟疾。

【加减】热多者，加黄芩一钱；寒多者，加黑姜五分；口渴甚者，加知母一钱，贝母一钱五分；呕恶，加半夏、茯苓各一钱，砂仁七分；生姜二片；汗少者，加荆芥一钱，川

芎五分；汗多者，去秦艽，减柴胡一半，加人参一钱，白术一钱五分；饮食停滞，胸膈饱闷，加麦芽、神曲、山楂、厚朴各一钱；如欲止之，加白蔻仁八分、鳖甲（醋炙）二钱，更另用止疟丹一二丸截之；若体虚气弱，加人参、黄耆、白术各二钱，当归，茯苓各一钱；久病成疟母，加白术一钱，木香、枳实各五分，鳖甲二钱。

29267 加减小柴胡汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】柴胡钱半 半夏 人参（弱者用之） 甘草 白芍各一钱 当归 黄芩各钱半

【用法】水煎，另用百草霜（松柴烧者不用）、血余（即头发，烧灰存性）、蒲黄（炒黑）各三分，研细末，以上汤药调服。或加阿胶。

【主治】伤寒邪热乘肝鼻衄。

29268 加减小柴胡汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】柴胡三钱 黄芩二钱 人参一钱 丹皮一钱 白芍二钱（炒） 当归一钱五分（土炒） 谷芽一钱五分 山楂一钱五分（炒）

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次温服。

【主治】疟邪热气内陷变痢，久延时日，脾胃气衰，面浮腹膨，里急后重者。

【方论选录】本方以柴胡由下而上，入深出浅，合黄芩两和阴阳之邪；以人参合谷芽，宣补胃阳；丹皮、归、芍，内护三阴；谷芽推气分之滞，山楂推血分之滞；谷芽升气分，故推谷滞；山楂降血分，故推肉滞也。

29269 加减小柴胡汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】柴胡一钱 半夏二钱 当归八钱 秦艽一钱五分 青皮一钱五分 草薢仁一钱（研） 独活一钱五分 炒枳壳一钱五分 甘草五分 煨姜三钱 大枣三个

【主治】劳倦受寒停滞而为劳疟，初病恶寒

甚热亦甚，周身骨节痠痛。

【加减】如恶心呕吐，加藿香三钱；胸口饱胀，加槟榔一钱五分，炒山楂三钱；口干，加花粉二钱；热重不退，加炒黄芩一钱五分，赤苓二钱。

29270 加减小柴胡汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】柴胡四钱 人参三钱 竹茹三钱 伏龙肝六钱 黄芩四钱 生姜一两（切片） 陈皮三钱 甘草五钱

【用法】水煎，温服。

【主治】伤寒二三日，胃腑为寒热所困，饮食入口，少顷即吐者。

【方论选录】本方以柴胡为君，柴胡乃清扬之品，能升阳益胃；竹茹、黄芩乃清凉之品，能泄热保胃；陈皮、甘草乃温和之品，能温寒开胃；人参能扶正养胃；生姜能解郁助胃；伏龙肝能补脾调胃，胃气和则呕止矣。

29271 加减小续命汤

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】麻黄（去根节） 防己 人参（去芦） 黄芩 桂心 甘草 白芍药 川芎 杏仁各一两 附子（炮）半两 防风一两半

【用法】上咬咀。每服五钱，水一盞半，加生姜七片，大枣两个，煎至七分，去滓，不拘时候服。取汗，随人虚实与所中轻重。有人脚弱，服此六七剂得愈。

【主治】卒暴中风，不省人事，渐觉半身不遂，口眼喎斜，手足战掉，语言蹇涩，肢体麻痹，神情昏乱，头目眩重，痰涎并多，筋脉拘挛，不能屈伸，骨节烦疼，不得转侧，及诸风，脚气缓弱。久病人风，每遇天色阴晦，节候变更，宜预服之，以防暗哑。

【加减】精神恍惚，加茯神、远志；骨节烦痛有热者，去附子，倍芍药；心烦多惊者，加犀角半两；骨节冷痛者，倍用桂、附；呕逆腹胀者，倍人参，加半夏一两；躁闷、大便涩者，去附子，倍芍药，入竹沥一合煎服；脏寒下利者，去防己、黄芩，倍附子一两，加

白术一两；便利、产后失血并老人、小儿，用麻黄、桂心、甘草各二两；脚弱，加牛膝、石斛各一两；身疼痛，加秦艽一两；腰疼，加桃仁、杜仲各半两；失音，加杏仁一两；春，加麻黄一两；夏，加黄芩三分；秋，加当归四两；冬，加附子半两。

29272 加减小续命汤

【方源】《普济方》卷二四〇。

【组成】何首乌四两 川牛膝一两 草乌（去皮尖，炒黄）半两

【用法】上为细末，先用木瓜二个，好酒二升，小锅煮十分烂，去皮穰，研和前药，如硬燥，用煮木瓜酒添搜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，酒下，常服除根。

【主治】男子妇人脚气。

29273 加减小续命汤

【方源】《外科理例·附方》。

【组成】麻黄（去节） 人参 黄芩 芍药 杏仁（去皮尖，麸炒） 甘草 防己 肉桂 各一两半 附子（炮，去皮脐）五钱

【用法】每服一两，加生姜，水煎服。

【主治】风湿流注，手臂结核如栗，延至颈项，状似瘰癧。

29274 加减小续命汤

【方源】《实用正骨学》。

【组成】桂枝 白附子 川芎 麻黄 党参 芍药 杏仁 防风 黄芩 防己 甘草 藁本 薄荷分量随证酌用

【用法】水煎服。

【主治】风寒侵入下颌关节，张口动作有响声。

29275 加减小防己汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】防己六钱 桂枝三钱 石膏六钱 杏仁四钱 滑石四钱 白通草二钱 薏仁三钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次温服。见小效不即退者，加重服，日三夜一。

【主治】暑湿痹证。

【加减】风胜则引，引者加桂枝、桑叶；湿胜则肿，肿者加滑石、萆薢、苍术；寒胜则痛，痛者加防己、桂枝、姜黄、海桐皮；面赤口涎自出者，重加石膏、知母；绝无汗者，加羌活、苍术；汗多者，加黄耆、炙甘草；兼痰饮者，加半夏、厚朴、广皮。

29276 加减木香煎散

【方源】《得效》卷六。

【组成】木香 甘草 当归 肉豆蔻 人参 官桂 枳壳药 诃子 乌梅(去核) 阿胶(蚌粉炒) 白茯苓各五钱 罂粟壳一两半(去蒂萼穰，切，蜜炒)

【用法】上锉散。每服四钱，水一盂半，加生姜三片，红枣二枚，同煎去滓，空腹服。

【主治】一切痢。

29277 加减六君子汤

【方源】《保命歌括》卷八。

【组成】四君子、二陈汤相合，加当归、白芍、黄连。

【主治】痰涎杂血。

29278 加减六君子汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参三钱 白术 茯苓各五钱 甘草 山楂 麦芽 厚朴各一钱 陈皮 枳壳各五分 神曲一钱

【用法】水煎服。

【主治】气虚下陷，饮食停住于脾胃之间而成块者，久则其形渐大，悠悠忽忽，似痛不痛，似动不动，然其形虽大而内软，按之如空虚之状者。

29279 加减六君子汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】人参 白术(炒) 白茯苓 白芍(炒) 陈皮 甘草 扁豆(炒) 薏仁 柴胡

【用法】生姜一片，大枣一个为引。

【主治】元气亏损，真气有伤，肚腹虚胀。

29280 加减六君子汤

【方源】《医部全录》卷四九一。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草(炙)

黄耆(炙) 陈皮 山楂 神曲(炒) 木香 升麻 砂仁

【用法】大枣为引，水煎服。

【主治】出痘泄泻能食者。

29281 加减玉竹饮子

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生玉竹 川贝母各三钱 西洋参 浙苓 紫菀各二钱 蜜炙橘红 桔梗 炙草各八分

【功用】气液双补，兼理余痰。

【主治】秋燥状暑，津气两伤，液郁为痰，经治痰少咳减者。

29282 加减四君子汤

【方源】《医方类聚》卷二四三引《局方》。

【组成】白茯苓(去皮) 人参(去芦) 白术各一两 甘草(炙)半两

【用法】上为末。每服一钱，盐汤调服；或咬咀，加生姜、大枣水煎尤妙，常服。

【功用】和胃调心，怡神养气。

【主治】小儿诸疾。

【加减】调气，加山药；吐泻腹痛烦渴，加黄耆、白扁豆、藿香、干葛；和气，加生姜；心神不定，加辰砂、枣子；心忪心烦，心神不定，加茯神；惊啼，手足痠痲，睡卧不安，加全蝎、钩藤、白附子；脾虚胃弱，生风多困，加半夏曲、没食子、冬瓜仁；发渴，加干葛、木瓜、枇杷叶(去毛)；烦渴，加黄耆；胃冷，呕吐涎沫，加丁香；呕逆，加藿香；脾胃不和，倍加白术、姜、枣；脾困，加人参、木香、缩砂仁；脾弱腹胀，不思饮食，加扁豆、粟米；伤食，加炒神曲；胸满喘急，加白豆蔻；涎嗽，加杏仁、桑白皮、半夏曲；风壅邪热，加生姜、荆芥；经络蕴热，头面生疮，加瓜根、桔梗；有寒及遇天寒发热，去瓜蒌根、桔梗；疮疹已出未出，大便闭涩，发渴，加瓜、桔；劳热往来，加川芎；盗汗，加陈浮麦；虚汗多，夜喘，加犀角、麦门冬；小腑赤涩，加麦门冬；大腑闭，去白术，加陈皮；温中和气止泻，加陈皮、枣子；吐逆、四

厥逆，脑门低陷，加藿香、丁香；吐利过多，脾胃虚乏，欲生风候，加白附子；泄泻，加陈皮、制朴、姜、枣；大腑泻痢，加炒罌粟；赤痢，加赤芍药、当归、粟米；白痢，加炮姜、粟米；脏腑滑泄，加煨诃子肉。

29283 加减四君子汤

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】人参（去芦） 白术（炒） 茯苓（白者去皮）各一两 枳壳半两（去瓢，麸炒黄）

【用法】上为细末。每服二钱，水一盞，加生姜三片，枣子一个，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】宽胸膈，消食。

29284 加减四君子汤

【方源】《医方类聚》卷二四四引《澹寮方》。

【组成】白茯苓（去皮） 人参 白术各一两 白扁豆（蒸熟，焙干） 甘草（炙） 黄耆（去芦） 藿香叶各半两

【用法】上为细末。每服一钱，盐汤点服；或用水七分盞，煎至五分，温服亦可。

【功用】调脾胃，进乳食。

【主治】小儿吐泻不止。

29285 加减四君子汤

【方源】《医部全录》卷四九四。

【组成】人参 白茯苓 肉豆蔻 黄耆各半两 甘草（炙）二钱

【用法】上㕮咀。每服一钱，水半盞，加生姜五片，大枣一个，煎三分，乳母倍服。大便不固，痘渐黑陷，小儿乳母同服。

【主治】疮疹不渴，脏寒下利。

【加减】若大泻，手足厥冷，加附子。

29286 加减四味饮子

【方源】《圣惠》卷八十八。

【异名】清凉饮子（《局方》卷十）、四顺散（《活人书》卷二十）、当归汤（《圣济总录》卷一四三）、四顺饮子（《鸡峰》卷十三）、四顺清凉饮子（《卫生总微》卷三）、四

顺饮（《易简》）、清凉饮（《直指》卷二十三）、四顺清凉饮（《得效》卷八）、清凉散（《普济方》卷二九五）、四味大黄饮子（《普济方》卷四〇五）、四配清中饮（《疡医大全》卷三十三）。

【组成】当归（孩子体骨多热多惊，则倍于分数用之） 川大黄（先蒸二炊饭久，薄切焙干，或孩子小便赤少，大便多热则倍用） 赤芍药（细锉炒，孩子四肢多热，多惊，大便多泻青黄色，直倍用之） 甘草（孩子热即生用，孩子寒多泻多即炙倍用）

【用法】上件药，平常用即等分，各细锉和匀。每服一分，以水一中盞，煎至五分，去滓，温服半合，每日三四次。

【主治】脏腑实热，或风热毒气与血脉壅滞，心烦口渴，睡卧不宁，惊痫抽掣，及目赤咽痛，口舌生疮，头面疮疖，皮肤疹毒，癰痈结核，痔疮肿痛，大便秘结等。

①《局方》：小儿血脉壅实，腑脏生热，颊赤多渴，五心烦躁，睡卧不宁，四肢惊掣；及因乳哺不时，寒温失度，令儿血气不理，肠胃不调，或温壮连滞，欲成伏热，或壮热不歇，欲发惊痫；又治风热结核，头面疮疖，目赤咽痛，疮疹余毒，一切壅滞。②《圣济总录》：痔瘻。③《鸡峰》：大便不通，面目身热，口舌生疮，上焦冒闷，时欲得冷，三阳气壅，热并大肠，其脉洪大。④《直指》：诸痔热证，大便秘结。⑤《普济方》：风热毒气与血相搏，结成核，生于腋下颈上，遇风寒所折，不消，结成癰痈，久而溃脓成疮。⑥《痘疹会通》：实热便闭腹胀。

29287 加减生四物汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】当归身五钱（生） 生地黄五钱 生白芍三钱 乌梅肉三个（去骨） 知母肉三钱 怀牛膝三钱

【主治】淋浊，阴虚水亏，虚烦不寐，热势较盛者。

29288 加减生地黄汤

【方源】《病科全书》。

【组成】生地五钱 川牛膝二钱 粉丹皮一钱五分 麦冬三钱 煅牡蛎一钱 煅龙骨一钱 黑山栀一钱五分 丹参三钱 元参三钱 白芍三钱 真郁金一钱五分 三七一钱五分 荷叶二钱

【主治】因热症吐血而患瘰癧者。

29289 加减地骨皮饮

《医钞类编》卷八。即《医学纲目》卷二十一引钱氏方“加减地骨皮散”。见该条。

29290 加减地骨皮散

【方源】《医学纲目》卷二十一引钱氏方。

【组成】知母 柴胡 甘草(炙) 半夏地骨皮 赤茯苓 白芍药 黄耆 石膏 黄芩 桔梗

【用法】上为细末。每服三钱，加生姜五片，水煎，食远温服。

【主治】上消。

【备考】本方方名，《医钞类编》引作“加减地骨皮饮”。

29291 加减当归饮子

【方源】《袖珍》卷二引《圣惠》。

【组成】防风 当归 柴胡各一两半 芍药一两 生地黄一两半 黄芩 人参各一两 黄连五钱 甘草一两二钱 滑石六两 大黄一两半

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食后通口服。

【主治】肩忽疼痛。

29292 加减吴茱萸汤

【方源】《妇人良方》卷一引张氏方。

【组成】吴茱萸半两 麦门冬 干姜 白茯苓 牡丹皮 南木香 苦梗各三钱 甘草三钱半 当归半两 北细辛一钱半 防风 官桂各一分 半夏七钱

【用法】上㕮咀。每服四大钱，水一盏半，加生姜五片，枣子一个，煎至七分，去滓，空心温服。

【主治】冲任衰弱，月候愆期，或前或后，

或崩漏不止，赤白带下，小腹急痛。每至经脉行时头眩，饮食减少，气满心忪，肌肤不泽。

29293 加减吴茱萸汤

《局方》卷九(续添诸局经验秘方)。为《三因》卷十七“加减茱萸汤”之异名。见该条。

29294 加减何首乌散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】何首乌 蔓荆子 石菖蒲 荆芥穗 甘菊花 枸杞子 威灵仙 苦参各半两

【用法】上为末。每服三钱，蜜茶调下，不拘时候。

【主治】紫白癜风，筋骨疼痛，四肢少力，眼断白人，鼻梁崩塌，皮肤疮疥及手足皴裂，睡卧不稳，步履艰辛。

【备考】本方方名，《准绳·疡医》引作“何首乌散”。

29295 加减青木香丸

【方源】《近效方》引吴昇方(见《外台》卷十八)。

【组成】崑崙青木香六分 大腹槟榔七分 桂心四分 芍药六分 枳实七分(炙) 大黄十分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，以酒送下，一日二次，稍稍加，至大便微微通软为度。

【主治】一切脚气，发则上冲秘闷，有所不快，亦疗猝心痛，腰肾间冷。

29296 加减固胎饮子

【方源】《宋氏女科》。

【组成】白艾 熟地 川芎 条芩 白芍 阿胶各一钱 白当归 白术各一钱五分 甘草三分

【主治】怀孕血漏者。

【加减】如果气虚，不能固守者，加人参一钱；如觉有痰下坠者，加升麻三分，制半夏八分；如觉有风者，加荆芥穗一钱；如觉心手热甚者，加黄芩八分，生地一钱。

29297 加减桑螵蛸散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】桑螵蛸三十枚(酥炙) 鹿茸一双(酥炙) 黄耆三两(蜜、酒炙) 麦门冬(去心)二两半 五味子半两 补骨脂(盐酒炒) 人参 厚杜仲(盐酒炒)各三两

【用法】上为散。每服三钱，空心羊肾煎汤调服，并用红酒细嚼羊肾；或羊肾汤泛为丸，每服三钱，空心以酒送下。

【主治】阳气虚弱，小便频数，或遗溺。

【备考】《医略六书》有附子，无桑螵蛸。

29298 加减桑螵蛸散

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】桑螵蛸三钱 人参二钱 龙骨三钱 五味子一钱 白果七个 覆盆子三钱 人中白三钱 龟版四钱 黄柏四钱

【用法】水煎，温服。

【主治】膀胱结热，小便频数。

【方论选录】此方以人参、螵蛸补虚，以五味、龟版益肾，以黄柏、人中白清热，以龙骨、白果、覆盆子收涩。其热既减，便自无数矣。

29299 加减羚羊角散

【方源】《医钞类编》卷十五。

【组成】羚羊角 防风 麦冬(去心) 元参 知母(酒炒) 黄芩 牛蒡子 甘草节 银花

【用法】加淡竹叶十余片，水煎服。

【主治】小儿葡萄疫。

【加减】此方羌活、僵蚕、生地皆可酌入。

29300 加减羚羊角散

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】羚羊角 天麻 钩藤 龙胆草 桑寄生 川牛膝 鸡血藤 僵蚕 蜈蚣(焙研) 全蝎(焙研)

【用法】水煎，后入羚羊水磨液、蜈蚣末、全蝎末调服。

【功用】柔肝祛风，养血通络。

【主治】类中风，卒中回苏后，血压未降，

口眼喎斜，舌瘖失语，半身不遂，脉象弦长有力者。

【方论选录】本方系《本事方》羚羊散及活络丹中悟出。以羚羊角、天麻、钩藤、龙胆草等柔肝泻火为主；僵蚕、蜈蚣、全蝎祛风为辅；桑寄生、鸡血藤、牛膝养血活血通络利痹为佐，共奏柔肝祛风养血通络之功。用于高血压脑出血卒中后遗之偏瘫、失语症有良效。

29301 加减羚羊角散

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】羚羊角 酸枣仁 茯神 薏苡仁 五加皮 当归 川芎 葛根 木香 钩藤 白术 泽泻

【功用】健脾利湿，平肝潜阳。

【主治】脾虚肝旺而见子痫先兆者。

【加减】若病情未及时控制，发生抽搐，昏迷而为子痫者，去葛根、川芎，另加苏合香丸，每日二次，每次一丸，鼻饲。

29302 加减黑逍遥散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地五两 柴胡五钱(盐水炒) 白芍一两半(醋炒) 丹皮一两半(炒黑) 山药三两(炒) 茯苓一两半(入乳拌蒸) 阿胶三两(蒲灰炒) 荆芥灰一两半 地榆三两(炒炭)

【用法】上为散。每服三钱，童便调下。

【主治】小便溺血，脉弦数濡涩者。

【方论选录】热郁伤阴，冲任不摄，而血不能藏，故渗入膀胱溺出纯血焉。地黄滋阴壮水，生用最能止血；柴胡解热升清，盐炒引之达下；阿胶补阴益血，蒲灰炒珠更能散血定血；白芍敛阴益血，醋炒炒黄，引入肝脾敛血；茯苓渗利溺窍，乳拌不耗阴血；山药补益脾阴，炒黄兼能摄血；丹皮凉血止血；荆芥和血理血；地榆凉血涩血以止溺血也。为散童便调下，使小便清利，则热从溺泄而冲任完复，血室宁静，血无不归，岂有溺血之患乎。

29303 加减鼠粘子汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】鼠粘子 天花粉 知母 荆芥 山梔各六分 甘草三分

【用法】水二钟，加淡竹叶、灯心各二十件，水煎服。

【主治】痘疔。

【加减】身热，加柴胡、黄芩；有痰，加麦冬、贝母；咽哑，加玄参、桔梗；咬牙，加薄荷、石膏；便秘，加蜂蜜、玄明粉；昏愤，加黄连、朱砂；痈枯，加当归、生地；恋疤，加蝉蜕、川芎。

29304 加减薄荷煎丸

【方源】《御药院方》卷一。

【异名】龙脑川芎丸。

【组成】薄荷叶八两 川芎一两 桔梗二两 防风一两 甘草半两 缩砂仁半两 脑子半两 白豆蔻仁一两

【用法】上为细末，炼蜜和，每两分作二十丸，每服一九，噙化服。

【功用】除风热，消疮疹，通利七窍，爽气清神。

【主治】头目昏眩，口舌生疮，痰涎壅塞，咽喉肿痛。

29305 加减藤黄饮子

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】金银花 黄耆 防风 川芎 羌活 大黄 赤芍药 薄荷 连翘 麻黄 当归 石膏 黄芩 桔梗 白术 白茯苓各八分 荆芥三分 甘草三分 山梔子一分二厘半 人参二分 滑石一分七厘半 芒消二厘半

【用法】用水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】一切痈疽疮肿。

29306 加味二陈和中汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】陈皮（去白）八分 半夏二钱 茯苓三钱 甘草一钱 苍术一钱三分（气不宜

者勿用） 厚朴（姜炒）一钱 砂仁（炒研）七分 竹茹一钱 生姜三钱

【用法】水煎服。

【主治】一切呕吐。

【加减】如喜热恶寒，肢冷脉迟，此伤于寒也，加丁香一钱，去竹茹，甚则加附子，或用理中汤加附子，并宜冷服，盖冷遇冷相须而入，自不吐出；如热呕，喜冷恶热，烦躁引饮，脉数而洪，加黄连（姜水炒）一钱，梔子（炒黑）八分，枇杷叶、干葛各钱半，入芦根汁合服；其闻食气而呕，药下亦呕，关脉洪者，并用芦根汁以治其热。

29307 加味十全大补汤

【方源】《外科经验方》。

【组成】人参 黄耆（盐水拌炒） 白术（炒） 茯苓 熟地黄（酒拌，中满减半） 当归（酒拌） 川芎 芍药（炒）各一钱 肉桂 麦门冬（去心） 五味子（捣，炒） 甘草（炒）各五分

【用法】上作一剂。用水二钟，煎一钟，食前服。

【主治】悬痈溃而不敛，或发热，饮食少思。

【加减】茎肿，加青皮；热，加黄芩、柴胡；日晒热，加柴胡、地骨皮；小便赤，加酒制知母、黄柏；小便涩，加车前子、山梔子，俱妙。

29308 加味十全大补汤

【方源】《外科理例·附方》。

【组成】人参 肉桂 地黄 川芎 白芍药 茯苓 白术 黄耆 甘草 当归 乌药 香附各等分

【用法】每剂一两，加生姜、大枣，水煎，空心温服。

【主治】妇人气血俱虚，久患瘰癧不消，经大补溃后，坚核去而疮口不敛者。

29309 加味十全大补汤

【方源】《丹溪心法附余》卷十九。

【组成】十全大补汤加柴胡 黄连

【用法】水煎服。

【主治】①《丹溪心法附余》：发热渐成劳瘵者。②《东医宝鉴·杂病篇》：虚劳气血俱损，渐成劳瘵。

【加减】如热在骨髓，更加青蒿、鳖甲。

【备考】《东医宝鉴·杂病篇》引本方用十全大补汤加柴胡一钱，黄连五分。上锉作一帖，加生姜三片，大枣两个，水煎服。

29310 加味十全大补汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】黄耆(蜜水炒) 人参(去芦) 白术(去油芦，炒) 白茯苓(去皮) 甘草(炙)各五分 当归(酒洗) 川芎 白芍(酒炒) 熟地黄各八分 大附子(面裹煨，去皮脐) 沉香 木香各三分 乌药 牛膝(去芦，酒炒) 杜仲(去皮，酒炒) 木瓜 防风(去芦) 羌活 独活 薏苡仁各五分 肉桂三分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】左瘫右痪，年久不愈。

29311 加味十全大补汤

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】人参二钱 当归三钱 白术三钱 茯苓二钱 生甘草二钱 黄耆三钱 肉桂三分 川芎一钱 熟地五钱 柴胡五分 土茯苓五钱

【用法】水煎服十剂。虚甚者多服为妙。

【主治】杨梅圈疮。杨梅疮发已久，将欲结痂而复犯房事，以致作痛生圈者。

29312 加味十全大补汤

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】熟地一两 川芎二钱 当归五钱 生黄耆一两 白术五钱 茯苓二钱 甘草一钱 肉桂一钱 白芍二钱 人参二钱 金银花一两

【用法】水煎服。

【主治】伤守疮。生疮不守禁忌，犯色欲，疮口黑陷，痛如刀割，腐烂深者。

29313 加味十全大补汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】生黄耆五钱 人参一钱 白术三钱 炙甘草一钱 归身三钱 川芎一钱五分 白芍一钱(炒) 熟地六钱 茯苓二钱 远志二钱 白芷一钱 肉桂一钱 净银花二钱 防风一钱

【用法】加葱白三个，水煎，入绍酒一杯服。

【主治】产后血衰血阻，营卫不调，经络不行，瘀而为毒，发为内外肠痈。

【加减】肠痈，去白芷、防风，加荆芥、毛慈姑各二钱；如毒已成，将成脓，加皂刺一钱，芦荟一钱，瓜蒌壳一个。

29314 加味十全大补汤

【方源】《不居集》(下集)卷一。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 当归 熟地 川芎 白芍 黄耆 肉桂 柴胡 鳖甲 青蒿 胡连

【主治】体虚挟外感发热，渐成痼瘵。

29315 加味十全大补汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】十全大补汤加阿胶 升麻 续断 枣仁 山萸 炮姜炭

【功用】升补脱陷。

【主治】产后血崩，血脱气陷。

29316 加味十全大补汤

【方源】《会约》卷六。

【组成】人参(无者，山药三钱代之) 白术钱半 茯苓 炙草 当归 白芍 川芎各一钱二分 熟地 黄耆(蜜炙)各二钱 肉桂一钱 升麻(盐炒) 柴胡(酒炒)各三分 天麻钱半 白附子(如竹节者真)八分

【用法】水煎，温服。

【主治】头上冷而畏风，或痛或不痛，属后天气血之不足者。

29317 加味十全大补汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】党参 黄耆各五钱 肉桂一钱 白术 茯神各三钱 当归二钱 川芎一钱 白芍三钱 熟地(砂仁炒)四钱 阿胶三钱(化冲) 蕲艾 炙甘草各二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】血寒气虚，月经后期，经来色淡，量少质薄，腰腹或有胀痛，精神不振，平时大便溏薄，脉迟而虚。

【加减】下血过多，去川芎，加乌贼骨五钱。

29318 加味七粒紫金丹

【方源】《外科十三方考》。

【组成】信石末一钱 枯矾末一钱 淡豆豉一两 射干五两 麝香四分

【用法】先将豆豉蒸软，然后同药末捣和成丸，如绿豆大。每服七丸，冷茶送下。小儿酌服一二丸，以服至不喘为度。

【主治】冷痰哮喘，天雨便发，坐卧不得，饮食不进；兼治寒痰疯狂。

【宜忌】服药后一小时内，当忌热食，以免引起恶心呕吐。

29319 加味八珍猪蹄汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】炙耆 党参（去芦，米炒） 陈皮 白芍（酒炒） 当归 熟地 白术（净） 茯苓各一钱 川芎六分 木通一钱五分 炙草七分

【用法】以王不留行一钱，同煎去滓，用猪蹄一只洗切，加水同煮，约二碗，任服。须用木梳，在乳上顺梳下。

【主治】虚弱人，产后气血不足，乳汁不下。

29320 加味人参白虎汤

【方源】《金鉴》卷五十三。

【组成】人参 石膏（生） 知母（生） 梗米 甘草 苍术

【用法】水煎服。

【主治】中暑，身热汗出，头痛大渴，烦躁不安，甚则气乏神倦，足冷恶寒。

29321 加味人参白虎汤

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】人参 知母 熟石膏 葛根 天花粉 麦冬 淡竹叶 甘草

【用法】糯米一撮为引，水煎，以米熟为度。

【功用】生津解毒。

【主治】麻症心火内亢，肺焦胃枯，津液干涸者。

【备考】原书治疗上症，是以本方去人参、甘草、糯米，加连翘、牛蒡子、元参主之。

29322 加味人参麦冬汤

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】人参 麦冬 生地 栝楼根 炙甘草各二钱

【用法】先取淡竹叶十片，梗米一合，煎汤一盞，去米叶，加生姜三片，大枣二枚，煎七分，温服。

【主治】产后去血甚多，津液内耗，胃气暴虚，顿生内热，口燥咽干而渴者。

29323 加味人参养荣汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】人参 白术 茯苓 甘草 川芎 芍药 五味子 当归 生地 麦冬 肉桂 黄耆

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】汗下过多，血气两虚，肉瞤筋惕者。

【加减】阴虚火动，加黄柏、知母；若阳虚内寒、脉微足冷者，加干姜、熟附子。

【备考】按：《准绳·伤寒》本方用人参二钱半，茯苓、炙甘草、川芎各一钱，白术、麦门冬、当归身各一钱半，五味子十五粒，肉桂一钱（有热者减半），生地黄一钱半（有热者用此，无汗用熟地黄），黄耆二钱半（有自汗者用二钱），生姜三片，枣子二枚（擘）。

29324 加味人参养胃汤

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】人参 茯苓 陈皮 半夏（姜汁炒） 厚朴（姜汁炒） 苍术（米泔炒） 藿香 当归 川芎 草果（去壳）各八分 乌梅一个 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，大枣一枚，水煎，温服。

【主治】虚人患症初起者。

【加减】寒多，加官桂；热多，加柴胡；汗多，去苍术、藿香、川芎，加黄耆、白术；饱

闷，加青皮、砂仁，去人参；渴，加麦门冬、知母，去半夏；泻，加炒白术、芍药；泻不止，加肉豆蔻，去厚朴、草果；呕哕，加白术、山药（炒）、砂仁（炒），去草果、厚朴、苍术；痰多，加贝母、竹沥，去半夏、草果；内热盛，加黄芩，去半夏；长夏暑热盛，加香薷、扁豆，去半夏、藿香。

29325 加味人参养胃汤

【方源】《宁坤秘籍》卷中。

【组成】人参一钱五分 白术 当归各二钱 茯苓 半夏各八分 草果三分 甘草 青皮各四分 藿香五分 乌梅三个

【用法】水煎服。并服参术膏（人参、白术二味熬膏）。

【主治】产后疟疾。

29326 加味人参款花膏

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】人参 五味子 天冬 麦冬 款冬花 贝母 桑白皮（炒） 阿胶（炒）各一钱 黄芩 黄连 炙甘草 桔梗 当归各一钱半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，陈皮汤化下。

【功用】止咳。

【主治】咳嗽不止，气逆血亦逆，口鼻出血者。

【备考】本方方名，据剂型当作“加味人参款花丸”。

29327 加味人参紫菀散

【方源】《直指》卷九。

【组成】人参 北五味子 紫菀茸 陈皮 贝母（去心） 紫苏叶 桑白皮（炒） 白茯苓 杏仁（去皮，炒） 甘草（炙）各三分 加川芎 半夏曲各一两 阿胶（炒酥）半两

【用法】上为粗末。每服三钱，加生姜七片，大枣三枚、乌梅一个，食后煎服。

【主治】虚劳咳嗽。

【备考】本方方名，《金匱翼》引作“人参

紫菀散”。

29328 加味三才封髓丹

【方源】方出《柳选四家医案》，名见《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】天冬 生地 党参 黄柏 炙草 砂仁 龙胆草 山梔 柴胡

【主治】肝经湿热下流阴器，疏泄失常，封藏不固，以致遗精、早泄，胫痠，耳鸣，口苦，心烦，尿黄，便干，苔黄，脉浮大弦数者。

29329 加味三仁葱豉汤

【方源】方出《蒲辅周医疗经验》，名见《千家妙方》卷上。

【组成】鲜藿香二钱 杏仁二钱 苡仁四钱 白蔻一钱 厚朴二钱 法半夏二钱 白蒺藜三钱 菊花二钱 僵蚕二钱 豆豉三钱 葱白（后下）三寸 六一散（包煎）五钱 竹叶一钱半

【功用】祛风利湿，调和三焦。

【主治】风暑湿合病（乙型脑炎）。

【临证举例】乙型脑炎 陈某某，女，4岁。1964年8月15日诊。发热八天，住院五天，诊为乙脑。头痛剧烈，烦躁，昏睡，汗出时体温即降，小便少，大便干，舌淡苔黄腻，脉浮滑数。由风暑湿合病，治宜祛风利湿，调和三焦。投以上方。8月17日复诊，周身有微汗，体温正常，头痛已除，大便尚干，前方去葱白、豆豉，加神曲一钱半、槟榔一钱半，调治而愈。

29330 加味千金内托散

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】黄耆（盐水炒） 人参 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 白芷 防风 川朴（姜炒） 桔梗 官桂 瓜蒌仁（去壳） 金银花 甘草节

【用法】上锉。每服一两，水煎，入好酒半盏，去滓温服。日进二三服之后，疮口有黑血出，及有汗出，此药之功也。不问证候猛恶，未成者自散，已成者即溃矣。

【功用】发散外邪，流行气血，排脓止痛，生肌长肉。

【主治】气血凝滞，风毒壅结，致患痈疽疮疖，在五六日间，已溃未溃而作痛者。

【加减】痛甚，加乳香、没药，倍当归、芍药。

29331 加味五子明目丸

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】楮实子二两 菟丝子一两半 车前子一两 五味子一两 枸杞子一两半 决明子一两 大熟地一两 知母八钱 黄柏五钱 菊花六钱 甘草一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。一日两次，每服三钱。

【主治】神水将枯（结膜干燥）症。两眼黑白尚分，气轮有皱襞，不红不疼；风轮灰白弥漫；惟水轮略带凹陷；眼泪不能润其表面，甚者无眵泪。

29332 加味止痛没药散

【方源】《医林改错》卷上。

【组成】没药三钱 血竭三钱 大黄二钱 朴消二钱 石决明三钱（煨）

【用法】上为末，分四付。早、晚清茶调服。

【主治】初起眼疼，白珠红，后起云翳。

29333 加味内托十宣散

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】人参 黄耆 当归 牛膝 金银花 甘草 白芷 羌活 红花 木通节 川芎 皂刺 胡桃二枚

【主治】痘疮气血两虚，浆不满足，致痘后余毒，白而不红，平而不起，按之不热，愁容可掬者。

29334 加味化瘀消坚汤

【方源】方出《朱仁康临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】生地 30 克 丹皮 9 克 赤芍 9 克 公英 15 克 蚤休 9 克 夏枯草 9 克 昆布 9 克 海藻 9 克 炒三棱 9 克 炒莪术 9 克

【功用】凉血清热，消痰软坚。

【主治】囊肿性痤疮。脾胃积热，重蒸于肺，日久痰瘀积聚成疮。

【临证举例】囊肿性痤疮 刘某某，男，21 岁。1973 年 1 月 20 日。三年来脸部经常出现痤疮，开始起黑头粉刺，面部油多发亮，并起脓疱及囊肿，痒疼相兼，挤出脓后形成疤痕疙瘩，时轻时重，缠绵不断。脉弦滑，舌质红绛。诊为囊肿性痤疮。治以凉血清热，消痰软坚。投以上方二十一剂，病情逐渐减轻，囊肿较平，不起脓疱。后改成丸剂调服。

29335 加味牛膝逐瘀散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】牛膝三钱 桂心 赤芍 桃仁 当归 木香 牡丹皮各二钱 川芎一钱 焦艾三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】温经逐瘀。

【主治】月经先期，血瘀偏寒者。

29336 加味升阳除湿汤

【方源】《济阳纲目》卷七十三。

【组成】升麻 柴胡 羌活 防风 苍术 陈皮 神曲 泽泻 猪苓各五分 麦芽（炒） 甘草（炙）各三分 益智仁 半夏各五分

【用法】上咬咀。水煎，食后服。

【主治】胃寒，泄泻肠鸣。

29337 加味升阳散火汤

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】升阳散火汤加羚羊角 犀角

【主治】热痹。肌热如火者。

29338 加味升麻葛根汤

【方源】《痘疹金镜录》卷上。

【组成】升麻 葛根 芍药 甘草 防风 桔梗 紫苏 苍术 陈皮 枳壳 柴胡

【用法】加生姜，大枣，水煎服。

【主治】斑疹水痘，内有风热者。

【加减】见疹热不退，加黄芩；呕吐，加藿香；泻甚者，去苍术、枳壳；咳嗽有痰，加杏仁、半夏、桑皮；鼻衄，加茅花、生地；谵

语，加黄芩。

29339 加味升麻葛根汤

【方源】《痘疹传心录》卷十九。

【组成】白粉葛一钱 升麻三分 牛蒡子五分（拣净，炒香，研碎） 小川芎七分 苏叶六分 桔梗六分 山楂肉八分 赤芍五分 防风七分（去芦） 甘草二分（生，去皮） 生姜三片

【用法】水煎，热服。取微汗。

【主治】水痘初起，体气壮强者。

29340 加味升麻葛根汤

【方源】《宋氏女科》。

【组成】升麻 葛根 芍药 甘草各一两 瞿麦 土牛膝 瓜蒌根 豆豉（炒）各一钱

【用法】上为散，分作八服。空心服，于经行后便服，一日二服，滓合煎。每服加云苔子为妙。

【主治】产育艰难，或一岁一产，可以此药小间之。

29341 加味升麻葛根汤

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】升麻 葛根 防风 淡豆豉 赤芍 桂枝 甘草（生）

【用法】水煎服。

【主治】痘方出而身痒者。

【备考】本方方名，《医钞类编》引作“加减升麻葛根汤”。

29342 加味升麻葛根汤

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】赤芍 梔子 藿香 升麻 葛根 生甘草 防风 石膏

【用法】水煎服。

【主治】痘症热毒炽盛，初见口唇赤紫或焦裂者。

29343 加味乌药顺气散

【方源】《普济方》卷一一六。

【组成】白芷 桔梗 陈皮 天台乌药 枳壳 茴香 缩砂 天南星 川芎 当归 半夏 南木香 牛膝 木瓜 槟榔 香附子 甘草 萆薢各等分

【用法】上为粗末。每服二三钱，水一大盏，加生姜三片，大枣二枚，煎至七分，去滓，看病上下服。如妇人患，用好当归服。

【主治】男子、妇人三十六种风，七十二般气，左癱右瘓，半身不遂，口眼歪斜，腰脚疼痛，及治妇人胎前产后血虚血晕，血气不调，四肢麻痹，忽然手脚不能动之瘫痪，一切血气风，又治男子寒疝，风湿脚气下痢等疾。

29344 加味乌梅四物汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】白芍三钱（生） 生地三钱 全当归三钱 乌梅肉五个（去壳） 怀牛膝三钱

【功用】滋阴扶正，导滞除虫。

【主治】虫积腹痛，日久肌肤消瘦。

29345 加味六一顺气汤

【方源】《寒温条辨》卷四。

【异名】六一顺气汤（《医方简义》卷二）。

【组成】白僵蚕（酒炒）三钱 蝉蜕十个 大黄（酒浸）四钱 芒消二钱五分 柴胡二钱 黄连 黄芩 白芍 甘草（生）各一钱 厚朴一钱五分 枳实二钱

【用法】水煎去滓，冲芒消，入蜜酒和匀，冷服。

【主治】①《寒温条辨》：少阴、厥阴病，口燥咽干，怕热消渴，谵语神昏，大便秘实，胸腹满硬，或热结旁流，绕脐疼痛，厥逆脉沉者。②《医方简义》：温病发疹者。

29346 加味六味地黄丸

【方源】《广笔记》。

【组成】怀生地（如法制）八两 怀山药四两 白茯苓（坚白者）四两（人乳拌，晒干又拌，多多更妙） 山茱萸（去核）四两 牡丹皮三两 麦门冬（去心）六两 泽泻三两（目病减半） 甘菊花（苦者不用）六两 真甘枸杞（去蒂）六两 北五味（去枯者）六两 又方加白茯苓（炒去刺）五两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧子大。每服四钱，空心淡盐汤送下。

【功用】滋阴固精明目，久服延年。

【主治】身体虚弱，患目疾久不愈者。

29347 加味六味地黄丸

【方源】《广笔记》。

【组成】地黄半斤 天门冬 麦门冬 牛膝 鳖甲 黄柏 青蒿 五味子 橘红 枇杷叶 怀山药 山茱萸肉各四两 泽泻 牡丹皮 白茯苓各二两

【主治】吐血。

29348 加味六味地黄丸

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】熟地黄一两 山茱萸肉一两 怀山药(炒) 茯苓各八钱 泽泻 牡丹皮各五钱 鹿茸(炙)三钱 五加皮五钱 麝香五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。大儿每服二钱，小儿一钱五分，盐汤送下。

【主治】小儿五迟证，多因父母气血虚弱，先天有亏，致儿生下筋骨软弱，行步艰难，齿不速长，坐不能稳，皆肾气不足之故。

29349 加味六味地黄汤

【方源】《疡医大全》卷二十一。

【组成】熟地二两 山药 山茱萸各八钱 牡丹皮六钱 泽泻一钱 白茯苓三钱 人参 麦冬各一两 黄耆五钱

【用法】水煎服。

【主治】肠痈，小腹痛甚，淋漓不已，精神衰少，饮食无味，面色萎黄，四肢无力，自汗盗汗，夜不得卧，因水衰而不能润肠之故。

【方论选录】六味补肾水，加参、耆、麦冬补脾胃之土，土旺而肺自旺，肺与大肠相表里，又为肾之母，母子相需，表里相顾，故奏功如神也。

29350 加味六神通解散

【方源】《赤水玄珠》卷十八。

【组成】麻黄 甘草 石膏 黄芩 滑石 苍术 川芎 羌活 细辛

【用法】水二钟，加生姜三片，捶法，入豆豉一撮，葱白二茎，水煎，热服。取汗，中

病即止。先用冲和汤，不愈，后服此汤。

【主治】时行三月后，谓之晚发，头痛身热恶寒，脉洪数。

29351 加味平补枳术丸

【方源】《便览》卷二。

【组成】白术(炒)四两 白芍一两 陈皮一两五 枳实(炒)二两 黄连(姜炒)一两 人参五钱 木香五钱 神曲(炒)一两 麦芽曲(炒)一两 梔子(炒)五钱 半夏曲一两

【用法】上为末，煮荷叶浓汁，煮糯米糊为丸，如梧桐子大。每服七八十九，米汤、温水任下；有痰，用生姜汤送下。

【功用】调中补气，消痞清热、化食。

【主治】脾胃病。

29352 加味甘麦大枣汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】炙甘草 麦门冬各9克 人参3克 小麦30克 大枣5枚 白芍9克

【主治】气血不足，阴阳失调，眼睛赤痛，发止不定，发时白睛淡红，疼痛不重，寒热交作，或有头痛，心烦意乱，脉细数无力，舌淡苔白，舌心粉红；止时不药而愈，状若常人，反复发作，一年数次。

【方论选录】方中人参、小麦、大枣、炙甘草甘温补中有助生化之源，使气血充裕，阴平阳秘，寒热无由生；白芍既有养血之功，合甘草又有敛阴和营，缓急止痛之能；更兼麦门冬清心润肺，白睛赤痛自然消除。

【临证举例】白睛赤痛如祟 赵某某，女，35岁。1971年3月12日初诊。二目赤痛3月余，时发时止，越发越频，虽痛不重，但心中烦乱，时寒时热，其状如祟。患者消瘦面黄，疲倦少神，白睛淡赤，脉细无力。服加味甘麦大枣汤5剂，发少痛轻，继服15剂而愈。

29353 加味甘草泻心汤

【方源】方出《赵锡武医疗经验》，名见《古今名方》卷二。

【组成】生甘草30克 党参18克 生姜

6 克 干姜 3 克 半夏 12 克 黄连 6 克
黄芩 9 克 大枣 7 枚

【用法】水煎服。另配生甘草 12 克，苦参 12 克，四剂煎水，外洗阴部。

【主治】狐惑病（口、眼、生殖器综合症）。

29354 加味龙胆泻肝丸

【方源】《慈禧太后医方选议》。

【组成】当归三钱 杭芍五钱（生） 生地五钱 炒梔三钱 胆草三钱（酒） 醋柴三钱 香附四钱（炙） 姜黄三钱（片） 木通一钱五分 泽泻一钱五分 车前二钱 桔梗三钱 桑枝三钱 甘草一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服一钱五分，白开水送下。

【主治】肝病。

29355 加味龙胆泻肝汤

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】柴胡一钱 黄芩七分 生甘草 人参 黄连 天门冬 胆草 山梔各五分 五味子七枚 麦冬 知母各五分

【用法】水煎服。

【主治】胆痹口苦。

【禁忌】忌辛热物。

29356 加味龙胆泻肝汤

《景岳全书》卷五十七。即《外科发挥》卷七“加减龙胆泻肝汤”。见该条。

29357 加味龙胆泻肝汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】龙胆草 当归各二钱 生地三钱 泽泻二钱 木通 苡仁各三钱 柴胡一钱 黄芩 梔子各三钱 莲须 赤芍各二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】平肝清热解郁。

【主治】带下浅红色，似血非血，胁胀或痛，口苦尿黄，舌红苔黄，脉弦数。

【加减】阴道有热感，去当归、柴胡，加贯仲三钱，阴道红肿，小便困难，去当归、柴胡、莲须，加黄连一钱、琥珀一钱；湿甚，舌

苔厚腻，去生地。

29358 加味龙麝紫金饼

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】生地 玄参 琥珀 犀角（生，镑） 羚羊角（镑） 薄荷 桔梗 升麻 凝水石（煨） 连翘 人参 牙消（另研） 赤茯苓各五钱 川芎 朱砂（水飞）各一两 诃子（去核） 牛黄 冰片 青黛各四钱 石膏三钱 麝香少许 金箔百张（为衣）

【用法】上为末，蜜同甘草膏为丸，如芡实大。每服一九，不拘时含化。

【主治】上焦风热，咽喉肿痛，口舌生疮，肺经不清，声音不利，痰涎壅盛。

【备考】本方方名，据剂型，当作“加味龙麝紫金丸。”

29359 加味归身生地汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】归身五钱（生） 生地五钱 知母一钱（生） 黄芩三钱（生） 柴胡二钱 羌活二钱 葛根一钱 浮萍钱半 川大黄二钱（酒浸，生用）

【用法】痘证发热，第二日服此。

【主治】痘证发热。

29360 加味四圣解毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【组成】紫草 木通 枳壳 黄耆 桂枝 大黄（酒炒）

【用法】水煎服。

【主治】痘疮发热，及养浆时作痒，能食而大便秘。邪气内实，正气外虚者。

29361 加味四物二陈汤

【方源】《济阳纲目》卷三十一。

【组成】当归 川芎 生地（酒炒） 白芍药 陈皮 半夏 茯苓 甘草 知母 黄柏 枳壳 黄芩

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【功用】降心火，补真阴。

【主治】阴虚，自小腹下火起，冲上而喘者。

29362 加味四物六君汤

【方源】《寿世保元》卷七。

【异名】加味四物六君子汤(《郑氏家传女科万金方》)。

【组成】厚朴(姜汁炒)五分 桔梗 白术(去芦)各四分 砂仁 红花各三分 黄连三分 玄胡三分 陈皮四分 甘草二分 当归(酒洗) 香附各五分 枳实(麸炒) 白茯苓(去皮) 川芎 赤芍 苏叶 槟榔 半夏(姜汁炒)各四分

【用法】上锉散。加生姜三片,水煎,空心热服。

【主治】《郑氏家传女科万金方》:妇人三十三岁,经后潮热,误食生冷,心腹胀满,气凌上膈,不思饮食,腹内结块如覆盆。

【备考】方中玄胡,《郑氏家传女科万金方》作“前胡”。

29363 加味四物安神汤

【方源】《证治宝鉴》卷三。

【组成】生地 熟地 当归 白芍 人参 白术 茯苓 竹茹 枣仁 辰砂 乌梅 梔子 麦冬 黄连 石菖蒲 远志肉

【用法】加炒粳米、大枣,水煎服。

【主治】久思所忧,虚耗心血,遂成怔忡;及心血素少之人,思虑即心跳者。

29364 加味四制香附丸

【方源】《医学正印》卷下。

【组成】香附米一斤(作四分,一分酒浸,一分盐汤浸,一分童便浸,一分醋浸,各三日,滤干炒) 当归(酒浸) 川芎 熟地(姜汁炒) 白芍(酒浸,炒)各三两 白术 陈皮 泽兰叶各二两 黄柏(酒炒) 甘草各一两

【用法】上为末,酒糊为丸。每服七十九,空心白汤下。

【功用】调经养血,顺气健脾,信服有孕。

29365 加味四制黄柏丸

【方源】《扶寿精方》。

【组成】黄柏(去皮)一斤(内四两盐酒浸,四两米泔水浸,四两重便浸,四两初生男乳浸,日晒夜露,取日精月华之气,合阴阳造

化之功) 知母(去毛皮,盐酒浸,晒干)一两 人参五钱 白茯苓(去皮) 白术各一两 甘草三钱 当归(酒浸) 川芎各一两 白芍药 熟地黄(酒拌蒸)各二两五钱 山茱萸(酒浸肉)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心酒送下。

【主治】诸虚。

29366 加味史国公药酒

【方源】《活人方》卷六。

【组成】虎骨 乌梢枕 白花蛇 晚蚕沙 白僵蚕 全蝎 清风藤 海风藤 油松节 白茄根 防风 汉防己 羌活 独活 桂枝 麻黄 川草薢 明天麻 天南星 制半夏 威灵仙 广橘红 枳壳 制何首乌 枸杞子 生地黄 熟地黄 川芎 当归 牛膝 牡丹皮 五茄皮 杜仲各等分 黄耆 白术二味加倍

【用法】上锉,贮绢囊,以滚酒冲入坛,泥固,外加厚纸密封,放窖处,过黄梅后开用。每酒一茶杯,调入桑枝膏五七匙,不拘时温服。若早、晚、空心各吞四妙丹一服,余时不必。

【主治】肥人素有湿痰风痰,气虚不能导引,以致淫溢流注于经络关节之处,为疼痛,为酸麻,手足举动不利,行步痿蹇难前,口眼喎斜,涕唾纵横,言语謇涩,舌音不清,筋骨拘挛难于运转。

29367 加味生化安神汤

【方源】《宁坤秘籍》卷中。

【异名】加味安神生化汤(《女科秘要》卷七)。

【组成】川芎二钱 当归四钱 茯苓一钱 甘草四分 干姜四分 枣仁一钱 桃仁十粒 大枣三枚

【用法】水二钟,煎六分,食远服。

【主治】产后三日内,血块未除,患妄言妄见。

29368 加味生化理中汤

【方源】《宁坤秘籍》卷中。

【组成】川芎一钱 当归三钱 干姜五分(炙) 甘草五分(炙) 人参三钱 黄耆一钱

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】产后阴阳两虚，手足冷发厥。

【加减】服参、耆而厥回，痛块未除，暂减参、耆，以除痛块；痛块除，仍加参、耆、桃仁十五粒；渴，加参麦散。

29369 加味生姜理中汤

【方源】《丹溪心法附余》卷九。

【组成】人参 白术 生姜 甘草(炙) 半夏 陈皮各等分

【用法】水煎服。

【主治】恶心。

29370 加味生料五积散

【方源】《普济方》卷一八五引《德生堂方》。

【组成】局方五积散五钱加全蝎(炒过)十一个 穿山甲(要看患左右手足，或臂肋疼痛处，于穿山甲身上取)七片(炮碎) 麻黄一钱半 麝香一字

【用法】水二大盏，加生姜五片，葱三根，同煎至一大盏，无灰酒一小匙，稍热服。于热炕上睡，以衣被厚盖，出汗愈，须要有病处得汗为佳。如不出汗，再煎滓服之出汗。

【主治】风湿冷痹。因起居阴湿之地，或在水乡船上，以致浑身上下，手足四肢强直不能屈伸，其痛不可忍者。

29371 加味白术芍药汤

【方源】《保命歌括》卷二十二。

【组成】白术(炒) 白芍药(炒) 白茯苓各一钱 陈皮七分 甘草(炙)五分

【用法】上咬咀。水二盏，煎一盏，去滓温服。

【主治】痢后更衣不止者。

29372 加味半夏茯苓汤

【方源】《直指》卷八。

【组成】半夏(制)二钱半 茯苓一两半 陈皮 五味子各一两 人参 细辛 甘草

(炙)各半两

【用法】上锉散。每服四钱，加生姜七片，煎服。

【主治】咳嗽痰多。

29373 加味半夏茯苓汤

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】半夏曲二两 茯苓一两半 陈皮 五味子各一两 人参 北细辛 羌活 桔梗(去芦) 葶苈(炒)各一两

【用法】上锉。加生姜、桑白皮，水煎服。

【主治】痰嗽。

29374 加味托里消毒散

【方源】《保婴撮要》卷十五。

【组成】人参 黄耆(炒) 当归(酒拌)各一钱 川芎 芍药 白芷 茯苓各五分 金银花 甘草 连翘 乳香 没药各三分

【用法】上作三剂。水煎服。

【主治】溃瘍余毒，发热作痛。

29375 加味当归六黄汤

【方源】《医林绳墨大全》卷四。

【组成】当归六黄汤加枣仁 牡蛎 门冬各七分 五味子九粒 枣二枚

【用法】水煎，温服。

【主治】盗汗。

29376 加味当归补血汤

【方源】《证治宝鉴》卷一。

【组成】当归 黄耆 羌活 甘草 荆芥 防风

【主治】一切去血过多，筋无所养，致肢挛口噤如痉者。

29377 加味当归补血汤

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】黄耆五钱 当归三钱 炙草钱半 防风钱半(盐水炒) 羌活钱半(砂糖炒) 竹沥一杯(冲) 姜汁一杯(冲)

【用法】水煎去滓，冲二汁温服。

【主治】产后去血过多，筋无血养，挛急发痉，脉浮软者。

【方论选录】产后血虚，不能荣养经络，而邪乘虚袭，故筋脉挛急而发痉焉，谓之虚痉。

黄耆补虚生血，当归养血荣经，防风率领黄耆以益卫气，羌活统运炙甘草益胃气，以振运行之力，竹沥、姜汁活络行经，以除虚痉也。俾气能生血，则血液内充，而虚风自散，筋脉挛急自舒，何患虚痉之不退哉！此补气以统运营血之剂，为产后虚风发痉之专方。

29378 加味当归补血汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】炙耆一两 党参（去芦，米炒）四钱 当归三钱 干姜（炒）二钱 附子（制）三钱

【主治】胞衣下后，血脱而晕，眼闭口开，手足厥冷者。

29379 加味当归补血汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】当归身五钱（炒） 炙耆五钱 党参五钱 乌梅五个（去核）

【主治】产后大汗。

29380 加味当归建中汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】当归二钱 蜜耆钱半 桂枝 炙草 生姜各钱半 白芍三钱 胶饴两半 人参

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】内生之风，肝虚掉眩，血海干者。

【备考】方中人参用量原缺。

29381 加味当归活血汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归八钱 川芎四钱 赤芍三钱 桃仁四钱 红花三钱 防风三钱 菊花四钱 羌蔚子四钱 薄荷二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】抱轮红症。两眼气轮赤丝纵横，风轮周围充血，痰涎流泪，视物昏花。

29382 加味朱砂安神丸

【方源】《便览》卷三。

【组成】朱砂五钱（飞，另研） 黄连（酒洗）六钱 甘草（炙）二钱半 生地一钱半 当归二钱半

【用法】上为末，蒸饼为丸，如黍米大，朱

砂为衣。每五十丸，垂津送下。

【主治】血虚，心烦忪忪，惊悸怔忡，胸中气乱。

29383 加味行血助浆汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】黄耆 防风 当归 丹皮 僵蚕 桔梗 连翘 牛蒡子

【用法】加糯米二钱，水煎服。

【主治】痘疮险症，在六七八九朝，毒气盛而颜色干红者。

29384 加味安神生化汤

《女科秘要》卷七。为《宁坤秘籍》卷中“加味生化安神汤”之异名。见该条。

29385 加味阴痛四物汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地五钱 柴胡五分（梢） 白芍钱半（炒） 川芎一钱 当归三钱 龙胆草钱半（酒炒） 山梔钱半（炒） 丹皮钱半

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】阴肿痛，脉数涩弦者。

【方论选录】血亏木旺，湿热滞于厥阴，故前阴漫肿，疼痛不已。生地滋阴壮水，以涵肝木；白芍敛阴和血，以除阴痛；川芎行血中之气；当归养痛伤之血；柴胡升阳散滞；龙胆泻热导湿；丹皮凉血平相火之热；山梔清热降屈曲之火。如厥阴血滞，当易赤芍以利之，水煎温服，使湿热解散，则血旺木平，而经脉清和，无不肿痛退矣。

29386 加味防己黄耆汤

【方源】《观聚方》卷一。

【组成】防己一两 甘草半两 白术七钱半 黄耆一两一分 加木瓜 苍术 薏苡仁 独活

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】风湿相搏，客于皮肤，四肢少力，关节烦痛。

29387 加味防风通圣散

【方源】《济阳纲目》卷八十三。

【组成】防风通圣散加苦参 天麻 蝉蜕 各等分

【用法】上锉。水煎，早、晚各一服。

【主治】大风、毛脱落、肌肤拆裂。

【宜忌】忌房事、盐、酱、荤腥、生冷油腻之物。

29388 加味丽泽通气散

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】羌活 独活 苍术 防风 升麻 荆芥穗 葛根 甘草(炙) 细辛 麻黄 白芷 川芎 木通

【用法】加生姜三片，大枣二枚，葱二寸，水煎，食后服。

【主治】肺受风寒，久而不散，则肺气壅闭而鼻塞，脓涕结聚而不开，使不闻香臭，则成鼻鼾。

29389 加味芩连四物汤

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】四物汤加黄芩(酒炒黑) 黄连(酒炒黑) 地榆 阿胶 荆芥穗(微炒) 升麻(蜜制) 棕榈皮灰

【主治】产后大便出血。

29390 加味连芩升麻汤

《医部全录》卷四九〇。即《痘疹全书》卷上“加味连翘升麻汤”。见该条。

29391 加味连翘升麻汤

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】连翘(去心，酒洗) 升麻(切，酒洗) 葛根(切) 桔梗(泔浸) 赤芍 草梢 酒芩 酒栀子 木通(酒洗) 牛蒡(酒淘，炒，研) 白滑石(暑用) 麦冬(去心)

【用法】上锉。水一钟，加淡竹叶、灯心为引，水煎服，不拘时候。

【主治】痘疮热太甚者，毒未发尽。

【备考】本方方名，《医部全录》引作“加味连芩升麻汤”。

29392 加味羌活胜湿汤

【方源】《济阳纲目》卷一〇〇。

【组成】羌活 独活各一钱 防风 藁本 蔓荆子 川芎 黄芩 桔梗 甘草各五分

【用法】上锉。水煎，食后服。

【主治】咽痛，颊肿，面赤，脉洪大者。

29393 加味补中安胎饮

【方源】《胎产心法》卷一。

【组成】人参一钱 白术(土炒) 当归(酒洗) 各二钱 川芎 黄芩各八分 紫苏 陈皮 砂仁(碎) 炙草各四分

【用法】加生姜一片，水煎服。滓再煎。

【主治】孕妇虚羸，下血不止，或按月去血点滴，名曰胎漏。

29394 加味补中益气汤

【方源】《直指附遗》卷九。

【组成】人参一钱 黄耆七分 甘草四分 白术一钱 当归(酒洗) 一钱二分 陈皮(去白) 一钱 柴胡(去芦) 五分 升麻三分 麦冬七分(制，去心) 天花粉五分 黄柏七分(酒盐炒) 黄芩五分(酒浸)

【用法】上咬咀。用水二钟，煎至一钟，去滓温服。

【主治】动作劳倦。

29395 加味补中益气汤

【方源】《万氏家抄》卷二。

【组成】黄芩 黄耆 柴胡各一钱 半夏 芍药 人参 白术 当归各八分 甘草五分 升麻三分 陈皮六分

【用法】上作一服。水二钟，加生姜三片，煎八分，空心服。

【主治】平素不足，兼以劳役内伤，挟感寒暑，致患疟疾，寒热交作，肢体倦软，乏力少气。

【加减】有汗及寒重，加桂枝五分，倍黄耆；热盛，倍柴胡、黄芩；渴，加麦门冬、天花粉。

29396 加味补中益气汤

【方源】《医统》卷五十五。

【组成】人参 黄耆 当归 白术各一钱 陈皮 甘草 升麻 柴胡 防风 白芷 川芎各五分

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】中气不足，卫气不舒，致患搔痒。

29397 加味补中益气汤

【方源】《便览》卷二。

【组成】人参 黄耆(蜜炙) 白术(炒) 杜仲(炒) 牛膝 白芍(炒) 各一钱 甘草(炒) 六分 当归(酒浸) 八分 升麻三分 陈皮七分 柴胡五分 五味子九粒 黄柏(炒) 一钱 枸杞子一钱

【用法】水煎，空心服。

【主治】一切中气不足，脾胃弱，下元虚，腰膝软弱，夜有房劳。

【加减】如梦遗，加知母、牡蛎各一钱；腹胀，加半夏、厚朴；咳嗽，加知母、麦冬各八分；泄泻，加肉豆蔻、干姜各七分；呕逆恶心，加藿香、半夏。

29398 加味补中益气汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】黄耆(炒) 二钱 人参一钱 白术(去芦，炒) 二钱 白茯苓二钱 陈皮八分 柴胡四分 升麻三分 白芍(酒炒) 一钱五分 当归(酒炒) 三钱 萝卜子(炒) 三钱 厚朴(姜炒) 一钱 甘草(炙) 八分 枳实(麸炒) 八分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】脾胃虚弱，治失其宜，元气虚惫，脾胃伤损，肿胀尤甚。

29399 加味补中益气汤

【方源】《济阴纲目》卷二。

【组成】黄耆 人参 甘草(炙) 白术 当归 陈皮各一钱 升麻 柴胡各三分 生地 黄 天花粉各八分

【用法】上锉，作一服。水煎服。

【主治】饮食劳倦，损伤脾胃，气弱体倦，发热作渴，饮食减少，而不生血者。

29400 加味补中益气汤

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】黄耆 人参 白术 甘草(炙) 各一钱 当归 陈皮各七分 升麻 柴胡各三分 肉豆蔻 补骨脂各五分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】脾肾虚寒，大便不禁。

29401 加味补中益气汤

【方源】《济阳纲目》卷四十五。

【组成】黄耆 人参 白术 甘草(炙) 当归 陈皮 柴胡 升麻 钩藤钩

【用法】上锉。水煎服。

【主治】胃气虚弱颤振。

29402 加味补中益气汤

【方源】《济阳纲目》卷七十三。

【组成】人参 黄耆(蜜炙) 白术 白芍药(酒炒) 甘草(炙) 陈皮 当归各一钱 升麻 柴胡 砂仁各五分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】劳倦饮食损伤元气，或过服寒凉消导之药，致清气下陷，肚腹大痛。

29403 加味补中益气汤

【方源】《济阳纲目》卷七十四。

【组成】人参 黄耆 白术 甘草 当归 陈皮 升麻 柴胡 白芍药 龙胆草 青皮 枳壳 香附子 川芎

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】元气虚极，胁或刺痛。

29404 加味补中益气汤

【方源】《济阳纲目》卷八十二。

【组成】黄耆(蜜炙) 人参 白术 陈皮 当归各一钱 升麻 柴胡 木香各五分 香附 青皮(去瓢) 川芎各八分 甘草三分 桂枝少许

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】浑身麻，属气虚者。

29405 加味补中益气汤

【方源】《医宗必读》卷八。

【组成】人参一钱 白术一钱(炒黄) 黄耆一钱二分 甘草三分 当归五分 陈皮六分 升麻三分 柴胡一分 茯苓二钱 车前子一钱

【用法】水二钟，加煨姜三片，大枣二枚，水煎八分服。

【主治】脾肺虚，小便黄赤。

29406 加味补中益气汤

【方源】《证治宝鉴》卷七。

【组成】补中益气汤加白芍 熟地 知母

黄柏 茯苓 牡蛎 地骨皮

【用法】煎汤下六味地黄丸加五味子。

【主治】劳役太过，脾肺气虚，色白倦怠，气口脉大无力。

【加减】有热加黄柏、生地。

29407 加味补中益气汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】黄耆二钱 人参 白术 当归各一钱五分 粉草一钱(炙) 陈皮七分 柴胡 升麻各五分 苍术一钱 防风 元参各八分 黄连 黄芩 黄柏各五分

【用法】水二钟，加生姜三片，红枣二枚，煎八分，食远温服。

【主治】脓疮而无完肤者。

29408 加味补中益气汤

【方源】《医林绳墨大全》卷四。

【组成】人参 黄耆 当归身 白术 升麻 柴胡 橘红 甘草 麻黄根 浮小麦 白芍 桂皮 酸枣仁

【用法】加大枣二枚，水煎，温服。

【主治】阳虚自汗。

【加减】虚极者，加附子二片。

29409 加味补中益气汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】人参一钱 白术二钱 当归三钱 黄耆一钱(炙) 白芍一钱 广陈四分 甘草四分

【用法】加生姜、大枣，水煎，送下三消丸。

【主治】产后伤冷，恶露凝块，日久不散，虚证百出；或身热骨蒸，食少羸瘦；或五心烦热，月水不行，其块在两胁，动则雷鸣，嘈杂晕眩，发热似疟，时作时止。

29410 加味补中益气汤

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】人参三钱 黄耆五钱 白术一钱 当归三钱 柴胡八分 升麻四分 生草一钱 陈皮一钱 金银花一两

【用法】水煎服。

【主治】脐漏疮。

【加减】纵色者，加熟地一两、山萸肉四钱；动怒者，加白芍药一两、当归二钱、丹皮三钱、熟地五钱。

29411 加味补中益气汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参(淮山药炒黄三五钱代之亦可) 黄耆(蜜炒)二钱 白术 当归 熟地各一钱五分 白芍(酒炒) 陈皮各一钱 甘草(炙)八分 升麻(蜜炒) 柴胡(酒炒)各三分

【用法】生姜、大枣为引。中时夜间服，早服固下丸。

【主治】元气虚损，不时漏血，历年不止者。

【备考】方中人参用量原缺。

29412 加味补中益气汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参(随便) 黄耆(蜜炒)二钱 白术 当归各钱半 炙草 陈皮各八分 柴胡(酒炒) 升麻(蜜炒)各三分 杜仲 续断 淮山药(炒)各钱半 百合二钱 五味子十五粒

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】堕胎。

【加减】如肺虚有热，或口渴溺赤，或咳嗽喉燥，加麦冬一二钱；如脾寒泄泻，加炮干姜一钱；如气滞而胀，加腹皮八分，或加枳壳七分。

【备考】胎至七月，肺经养之，前此或堕，肺经受伤，后孕宜预于六月调补之，必须大剂，不可间断，保过七月，则无虞也。

29413 加味补中益气汤

【方源】《医钞类编》卷十。

【组成】炙耆 人参 白术(土炒) 当归(土炒) 升麻(酒炒) 陈皮 诃子 肉蔻(煨去油) 北五味 乌梅(去核) 炙草 糯米(炒)

【用法】水煎服。

【主治】泄泻，元阳虚陷，大孔不收。

29414 加味补中益气汤

【方源】《外科十三方考》卷下。

【组成】补中益气汤加地榆一两 光连二钱

【用法】水煎服。

【主治】内痔下血不收。

29415 加味补中益气汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】黄耆 白术各六钱 广皮 升麻 柴胡各二钱 泡参二钱 秦归二钱 乌贼骨二两 茜草根(炒炭)四钱

【用法】水煎服。

【功用】补气摄血。

【主治】崩中或漏下不止，色淡红，精神疲惫，气短自汗。

29416 加味补中益气汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】人参三钱 当归身三钱 柴胡二钱 黄耆八钱 升麻一钱半 熟地五钱 玉竹三钱 枸杞四钱 白术三钱 云苓三钱 石斛三钱 甘草一钱 大枣三个 生姜一片

【用法】水煎服。

【主治】高风障症。二目不赤，不疼，不肿，常觉眩晕，每至日落星出，而无所见。

29417 加味补养心肾方

【方源】方出《刘惠民医案》，名见《千家妙方》卷上。

【组成】酸枣仁(生熟各半，捣)24克 炒柏子仁9克 茯神9克 钩藤9克 生龙齿9克 天竺黄9克 菟丝子12克 胆南星3克 白术9克 白豆蔻6克 橘络9克 人参6克 淡豆豉9克 生鸡内金12克 山栀4.5克 灯心1.5克

【用法】水煎两遍，混合后分两次温服。服药三天，停服一日。

【功用】补养心肾，清热豁痰，健脾益气。

【主治】心肾不足，痰热内阻所致的夜游症。

29418 加味补益败毒散

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】生耆二钱 人参二钱 焦术一钱 炙甘草八分 陈皮一钱 归身二钱 升麻二分 荆芥一钱 净银花二钱 肉桂五分 防风一钱 乳香(去油)一钱

【用法】水煎服。

【主治】湿热下陷，阴门生疮。

29419 加味补益养血汤

【方源】方出《刘惠民医案》，名见《千家妙方》卷上。

【组成】生黄耆15克 党参15克 山药31克 白术15克 茯苓12克 砂仁12克 远志12克 柏子仁15克 炒酸枣仁25克 狗脊(去毛)15克 枸杞子12克 菟丝子25克 当归15克 丹参18克

【用法】水煎两次，混合，分两次温服。

【功用】健脾益气，养血和血，补肾。

【主治】白细胞减少证。

【临证举例】白细胞减少症 尹某，女，42岁。于1975年1月28日初诊。患者一年前感到头昏，疲惫，两腿沉重，乏力、腰痠，食欲不振，半年前发现白血球减少，为3000/mm³，最低时仅为1000/mm³，服用各种升白细胞药无效，伴肢体麻木，失眠多梦，面色暗黄乏泽，舌淡红，苔薄白，脉沉细无力，投以加味补益养血汤，服药10余剂后，症状逐渐减轻，白细胞已升至6500~7500/mm³。稳定在5000/mm³以上，恢复工作。

29420 加味附子理中汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】党参(去芦，米炒)二钱 白术(净炒) 当归各一钱五分 干姜(炒) 附子(制) 木通各一钱 吴萸(泡)六分 肉桂(去皮，另炖)四分 炙草七分

【主治】寒痛绵绵不休，手足俱冷者。

29421 加味附子理中汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】人参二钱 干姜一钱 白术一钱 细辛五分 甘草一钱 葱白一寸 大枣一枚

【用法】水煎服。另用牙皂、镜砂、明矾各

等分，为末，随前药水冲服。

【主治】瞑目症。二目不疼不肿，紧闭难睁，头晕神昏。

29422 加味附桂地黄汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】熟地四钱 淮药(炒)二钱 萸肉 川楝子 丹皮 茯苓 小茴各一钱五分 制附子 泽泻(盐水炒)各一钱 肉桂(去皮，另炖)三分

【主治】阴虚血症。

29423 加味附桂地黄汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】熟地三钱 淮药(炒) 茯苓各二钱 丝饼四钱 萸肉 车前各一钱五分 泽泻(盐水炒) 丹皮各一钱 附子(制)八分 肉桂(去皮，另炖)四分

【主治】命门火衰，以致败精为浊。

29424 加味青州白丸子

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷二。

【组成】白附子 天南星 半夏 白姜各二两 天麻 全蝎 白僵蚕各一两 川乌五钱

【用法】上并生用，为细末，姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，生姜汤吞下，不拘时候。

【主治】中风壅塞，喎斜瘫痪。

29425 加味松肌透表汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】连翘 牛蒡子 山楂肉 羌活 干葛 紫草 升麻少许 黄芩 桔梗 陈皮 甘草

【用法】萆薢为引。

【主治】痘疮险症，发热，或一二日即见点者，外热盛而兼作烦。

29426 加味苓桂术甘丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生于术(米泔浸) 浙茯苓 鹿脊骨(用麻黄四钱煎汤炙)各三两 桂枝木八钱 竹沥半夏二两 杏仁霜两半 北细辛三钱 炙甘草六钱

【用法】水泛为丸。每服钱半至二钱，淡盐汤送下。

【主治】哮喘时止时发，上气郁闷，咳痰不出，勉强咳出一二口，痰中稍杂以血点。盖因伏饮之踞，始则阳衰浊泛，继则阴亦渐损，此哮喘属于虚寒，而阳伤略及阴分也。

29427 加味苓桂术甘汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】于术三钱 桂枝尖二钱 茯苓片二钱 甘草一钱 干姜三钱 人参三钱 乌附子二钱 威灵仙一钱五分

【用法】上药煎服数剂后，小便微利，其脉沉迟如故者，用此汤送服生硫黄末四五厘。若不觉温暖，体验渐渐加多，以服后移时觉温暖为度。

【主治】水肿，小便不利，其脉沉迟无力，自觉寒凉者。

【方论选录】方用苓桂术甘汤，以助上焦之阳；用甘草协同人参、干姜以助中焦之阳；又用人参、附子(参附汤)协同桂枝更能助下焦之阳。三焦阳气宣通，水饮亦随之宣通，而不复停滞为患也。至人参灵仙并用，治气虚小便不利甚效，而灵仙通利之性，又能运化术、草之补力，俾胀满者服之，毫无滞碍，故加之以佐使也。

29428 加味明目地黄丸

【方源】《眼科阐微》卷二。

【组成】熟地八两 山药六两(饭上蒸过) 山萸六两(去核，净蒸) 泽泻三两(面煨) 茯苓三两(去皮) 全当归六两(酒洗) 菊花二两(用白的) 丹皮三两 枸杞六两(去蒂净，酒洗，炒)

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七钱，空心盐汤送下。自二钱起，渐加至四钱。

【主治】老年眼症，外而翳膜遮睛，内而瞳神昏暗者。

29429 加味明目地黄丸

【方源】《外科证治全书》卷一。

【组成】生地黄一斤(酒炒) 人参四两

五味子三两 牛膝二两 麦冬六两(去心)
归身五两 甘枸杞五两 甘菊八两

【用法】上为细末，炼蜜为丸服。

【功用】专补肾水，兼补其气。

【主治】血少神劳，肝肾亏损所致的内障，
外无肿痛翳膜，惟睛昏黑无光，若有所障。

29430 加味明目流气饮

【方源】《便览》卷一。

【组成】大黄(炮) 牛蒡子(炒) 川芎
菊花 白蒺藜(炒) 细辛 防风 元参 山
梔 黄芩 甘草(炙) 蔓荆子 荆芥 木
贼各五分 草决明七分半 苍术一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝经不足，内受风热，上攻眼目，
视物不明，常见黑花，当风多泪，癰涩难开，
或生障翳，妇人血风时行，暴赤，一切眼疾
并皆治之。

【加减】如久服，去大黄，加桑白皮、知母、
黄柏。

29431 加味固阳散火汤

【方源】《医钞类编》卷十九。

【组成】炙耆 人参 白术 云苓 归尾
防风 升麻 木通 荆芥 炙甘草

【用法】加大枣，水煎服。

【主治】痘出皮嫩浇薄，毒在气分，宜防痒
塌。

29432 加味和中益气汤

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】人参 白术 陈皮 柴胡 黄芩
各钱半 半夏一钱 升麻五分 当归一钱
川芎一钱 黄耆一钱 枳实一钱 甘草五分

【用法】水二钟，加生姜三片，煎至八分，
食远服。

【主治】泄泻，少进饮食。

29433 加味和胃止痉汤

【方源】《千家妙方》卷上引关幼波方。

【组成】生瓦楞 30 克 刀豆子 30 克 赤
芍 30 克 白芍 30 克 当归 12 克 木瓜 12
克 藕节 12 克 旋覆花 10 克(包煎) 代

赭石 10 克(包煎) 杏仁 10 克 橘红 10 克
红花 10 克 香附 10 克 玫瑰花 10 克 砂
仁 4.5 克 生姜 4.5 克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】平肝和胃，活血化痰。

【主治】气滞血瘀，痰血凝结，肝胃不和所
引起的脘痛呛噎，嗳气泛酸，恶心呕吐(贲
门痉挛)。

【临证举例】贲门痉挛 李某，女，24
岁。于1964年9月24日初诊。患者四年前
发现胃脘闷痛，纳食呛而作堵，某院诊为贲
门痉挛。其进食则堵呛，胃脘不舒，进干食
噎重，稀食尚可，嗳气、泛酸、恶心、呕吐、
并有阵发性剧痛、片刻自行缓解，钡餐显示
贲门狭窄，边缘粗糙，苔薄白，脉沉弦。投
以加味和胃止痉汤，服药8剂，诸症减轻，又
服10剂告愈。

29434 加味知柏地黄汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】知母三钱 川柏五分 萸肉一钱
山药 浙苓各三钱 丹皮 泽泻各钱半 犀
角汁 童便各一杯(冲)

【用法】先用熟地八钱，切丝泡汤，代水煎
药。

【功用】泻火存阴。

【主治】阴分伏热，热入精室，欲火与伏火
交蒸，发为夹阴温病。

29435 加味知柏地黄汤

【方源】《会约》卷十二。

【组成】熟地四、五钱 枣皮 山药 茯苓
当归 白芍(酒炒)各钱半 丹皮 麦冬 知
母 黄柏各一钱 泽泻八分 五味三分

【用法】水三碗，煎二碗，空心顿服。

【主治】阴虚火动，煎熬汗出。

29436 加味金匱肾气汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】大熟地六钱 淮山药三钱(杵)
丹皮钱半(醋炒) 淡附片钱半 山萸肉三
钱 浙茯苓三钱 泽泻钱半 紫瑤桂五分

(炼丸吞) 北五味一钱(杵) 莹白童便一杯(分冲)

【主治】伤寒夹阴，误服升散，及温热多服清凉剋伐，以致肾中虚阳上冒，而口鼻失血，气短息促，其足必冷，小便必白，大便或溏或泻者。

【方论选录】以六味地黄为君，壮水之主，以镇阳光；臣以桂、附益火之源，以消阴翳；佐以五味酸收咸降，引真阳归纳命门；使以童便速降阴火，以清敛血溢。此为滋补真阴，以收纳元阳之良方。

29437 加味育阴止血汤

【方源】《千家妙方》卷上引王渭川方。

【组成】沙参9克 炒川楝子9克 生牡蛎9克 钩藤9克 地榆9克 槐花9克 细生地12克 生白芍12克 海浮石15克 青龙齿15克 白及15克 女贞子24克 仙鹤草60克 川贝6克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】育阴柔肝，清心肃肺。

【主治】阴虚阳亢，心火偏旺所致的咯血。

【临证举例】咯血 李某，男，30岁。平素体弱，患有咳嗽，内痔，大便燥结，因事过劳，而致突然咯血下血，咯血量较多，色鲜红，伴头晕心烦心悸，脉细数，舌红苔少。证系阴虚阳亢，心火偏盛。治宜育阴潜阳，清心肃肺。投以加味育阴止血汤，服药一周，咯血停止，余症亦有好转。

29438 加味育阴润燥饮

【方源】《千家妙方》卷下引王渭川方。

【组成】鲜生地60克 旱莲草24克 女贞子24克 红藤24克 蒲公英24克 板蓝根24克 黄甘菊9克 川贝9克 大青叶9克 枸杞12克 石斛12克 琥珀末6克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】育阴、清火、润燥。

【主治】暑湿伏火，伤阴化燥而致舌体干裂。

【临证举例】舌体干裂症 徐某，女，60岁。患者中气素虚，常见齿龈干燥出血。因夏季受暑，至秋燥来临，即口苦咽干，舌面干裂，吞咽困难，神志不宁，左脉虚涩，右脉弦数，舌质深红，光亮无苔。证系暑湿伏火，伤阴化燥。治以育阴、清火、润燥。投以加味育阴润燥饮，同时配用青黛6克、黄柏6克，两牛黄0.3克，琥珀末1.5克，共为细粉，香油调和，涂搽舌体。服药4剂后，舌质转淡，裂痕渐浅，能进稀粥。仍觉咽干喉痛，原方加减，又进4剂而愈。

29439 加味参苓附姜汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参五钱 白术五钱 肉豆蔻一枚 附子三分 干姜一钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，至十日，太阴脾土受邪，恶寒呕吐。

29440 加味参苓苓附汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参一钱 白术三钱 茯苓三钱 附子二分 神曲一钱 麦芽一钱 白芥子三钱

【用法】水煎服。

【主治】寒气入胃，结成寒痰，日日呕吐。

29441 加味参苓桂汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参 茯苓 麦冬 山药各五钱 白术一两 破故纸一钱 苏子 肉桂各一钱

【用法】水煎服。

【主治】胃气上逆，咳逆倚息短气，其形如肿，吐痰不已，胸膈饱闷。

29442 加味参归鹿茸汤

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】上党参三钱 西当归二钱 鹿茸顶二钱 云茯苓二钱 金银花一钱五分 黑元参一钱 藁本五分 生甘草五分

【用法】水煎服。未溃外用乌龙膏敷，溃后用丹线提清脓毒，线宜横上，不可直插。若

溃后浮烂流水者，用鸡蛋白调药末加枯矾少许敷数日，自溃脓稠，再用浮海散盖膏。

【主治】百会疽，发于巅顶正中督脉百会穴，多高大如道士冠，自侧面观之，正对耳尖者。由肾水枯涸，阳火上逆所致。

【加减】溃后脓水清稀，气血大虚，宜加黄耆三钱。

29443 加味参附正气散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】人参 木香 白豆蔻各二钱半 川芎 干姜 甘草 藿香 茯苓 黄耆 当归（去尾） 丁香 桂心 陈皮 白芷 缩砂仁 青皮（去白）各半两 白术 附子（炮） 半夏曲各七钱 加炮附子 枸杞子（去梗，炒，拣） 菊花蕊

【用法】加生姜、红枣，水煎，食前空心服。

【主治】男子妇人目生内障，脑中有风，致视物昏暗，不生眵翳，瞳仁开阔，鼻流清涕。此因肾经虚损，元气虚急使然。

【备考】原书用本方治上证，与锦鸡、青盐，山药、八味等丸对和服，及四柱散，十全大补去熟地，加附子、枸杞子、菊花蕊、藿香正气散并用。

29444 加味参苓生化汤

【方源】《女科秘要》卷六。

【组成】川芎一钱 当归二钱 干姜 甘草各五分 茯苓一钱五分 山药一钱 肉果一个（煨） 诃子皮一钱（去油） 莲子七粒 人参二钱 糯米一大撮

【主治】产后泄泻。

【加减】虚甚，多加人参。

29445 加味参苓白术散

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】人参 炙耆 白术 归身（酒）各一钱 炙草 青皮各八分 陈皮七分 柴胡 夜明砂 木香 厚桂（去皮） 泽泻各五分 鳖甲（九肋，醋炙，去爪）二钱 使君子肉 白芍（酒炒）各一钱 山药一两

【用法】煮糊为丸，如粟米大。每服三十五

丸，已、戌时各一服，炒米汤下。乳母服加味四物汤。

【功用】补脾。

【主治】疟疾。

【备考】本方方名，据剂型，当作“加味参苓白术丸”。

29446 加味参苓白术散

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参（随用） 白术二两 茯苓一两半 山药一两五钱 陈皮一两 莲肉二两 当归二两 炙草一两 砂仁八钱 石菖蒲五钱 川芎七钱

【功用】平补脾胃。

【主治】月经后期。

29447 加味参苓白术散

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】人参二钱 白术一钱五分（炒焦） 茯苓一钱五分 扁豆二钱（炒） 薏仁一钱五分 桔梗一钱 砂仁七分（炒） 炮姜一钱 肉豆蔻一钱 炙甘草五分

【用法】上为细末。每服一钱五分，香梗米汤调服，一日二次。

【主治】噤口痢，呕恶不饥，积少痛缓，形衰脉弦，舌白不渴。

【方论选录】参苓白术散兼治脾胃，而以胃为主，其功但止土虚无邪之泄泻而已。此方则通宣三焦，提上焦，涩下焦，而以醒中焦为要者也。方中以四君两补脾胃；加扁豆、薏仁以补脾胃之体；炮姜以补脾胃之用，桔梗从上焦开提清气；砂仁、肉蔻从下焦固涩浊气，二物皆芳香，能涩滑脱，而又能通下焦之郁滞，兼醒脾胃；引以梗米芳香悦土，以胃所喜为补也。

29448 加味参耆术附汤

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】人参三钱 黄耆二钱五 白术二钱 附子 木香各五分 当归一钱五分 川芎 陈皮（炒） 甘草（炙）各一钱 豆蔻（煨）一个 茯苓 干葛各一钱半 诃子二个

芍药一钱五分 糯米三百粒

【用法】每服二钱，加生姜，水煎服。

【主治】痘疮表里俱虚，吐泻作渴，手足厥冷。

【宜忌】非犯里虚，寒战咬牙、吐泻，头温足冷者，不可服。

29449 加味枳马二仙丹

【方源】《外科十三方考》。

【组成】马钱子一两（瓷瓦刮去粗皮，童便泡四十九日） 枳壳六钱（童便泡二十四日，暑天则十余日，泡后去瓢）（上二味用麻布袋盛，置流水中冲洗一日，取起用瓦片焙干） 自然铜六钱（制） 苏土鳖六钱 古铜钱二十枚（火煨醋淬七次） 碎蛇三钱 三七一两 血竭六钱 乳香五钱（制） 没药五钱（制） 虎骨六钱 冰片四钱 麝香一钱

【用法】上为细末，严密贮存备用。每服五分至一钱，用熟黄酒送服。量病人体质强弱及伤势轻重加减，有时可用到一钱五分至三钱极量。

【主治】骨断骨折。

【宜忌】服药时必须避风，以免引起严重痉挛。

29450 加味枳壳半夏汤

【方源】《医统》卷四十四。

【组成】枳壳 半夏 桔梗 茯苓 苦苧蒴（微炒） 防己 薄荷 紫苏 马兜铃 桑白皮（炒）各一钱 甘草（炙）五分

【用法】上作二服。水盏半，加生姜三片，煎八分，食远服。

【主治】上焦有热，咳嗽黄痰，痞满气喘。

29451 加味枳桔二陈汤

【方源】《会约》卷七。

【组成】陈皮（去白）一钱 半夏钱半 茯苓一钱三分 麻黄（去节）五分 桂枝八分 北细辛八分 杏仁（去皮尖）十五粒、甘草一钱 桔梗一钱 枳壳一钱

【用法】生姜、葱为引。

【主治】感冒风寒，头痛声暗，无汗恶寒，痰凝气滞，脉息浮紧。

29452 加味荆防败毒散

【方源】《医钞类编》卷九。

【组成】荆芥 防风 连翘 枳壳 升麻 薄荷 羌活 独活 葛根 木通 黄芩 川芎 梔仁 炙草 银花

【用法】水煎服。

【主治】疮疡毒气内陷，肚腹作胀。

【加减】上身肿，加葱三茎；下身肿，加灯心十茎。

29453 加味荆防败毒散

【方源】《医钞类编》卷十五。

【组成】羌活 独活 前胡 柴胡 人参 甘草 枳壳 桔梗 茯苓 川芎 薄荷 荆芥 防风

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫，头脑项下并耳后赤肿。

29454 加味荆防败毒散

【方源】《治疗汇要》卷下。

【组成】荆芥 防风 牛蒡子 连翘 胆星 独活 前胡 枳壳 苏子 瓜蒌 杏仁 生地黄 黄芩 黄柏 黑山梔 元参 灯心二十茎（需原枝）

【用法】长流水煎，和保命丹同服。

【主治】一切喉证，脉洪大，六七至者。

【加减】如大便不行，去荆芥、防风，加枳实、青皮、大黄。

29455 加味荆防葛根汤

【方源】《卫生鸿宝》卷四。

【组成】葛根钱半（虚者一钱） 荆芥 桔梗 象贝 防风各钱半 蝉退 枳壳（炒）各一钱 生甘草四分 牛蒡子 白杏仁 枇杷叶 浮萍各三钱

【用法】水煎服。

【主治】①《卫生鸿宝》：厉邪痧症。形寒壮热，咽喉肿痛，头痛体痛，咳嗽胸闷，鼻塞呕恶，两目汪汪，手足指冷，脉来濡数，或浮数。②《痧喉阐解》：风塞外束，皮肤闭塞，

痧发不出。

29456 加味荆芥止崩汤

【方源】《女科秘书》。

【组成】当归 甘草 陈皮 枸杞子 熟地 白术 荆芥穗(烧炭) 人参 白芍药

【用法】水煎服。

【主治】血崩日久不止。

29457 加味茱萸肉消丸

【方源】《保命歌括》卷十六。

【组成】吴茱萸(半酒半醋浸一宿, 焙干) 舶上茴香(盐炒) 山茱萸(去核) 马兰花(醋洗, 焙) 川楝子(取肉) 官桂 玄胡索(略炒) 黑牵牛(炒, 取头末) 橘红 青皮 海藻(洗去咸盐) 各一两 桃仁(浸, 去皮尖) 白蒺藜(炒, 去粗) 木香 各半两

【用法】上为末, 酒面稀糊为丸, 如梧桐子大。每服四十九, 食前温酒、盐汤下。

【主治】肾虚为邪所侵, 留伏作痛, 阴癰偏大, 或生湿疮, 出脓水。

29458 加味茯苓半夏汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】陈皮(去白)一钱 半夏二钱(姜炒, 则不动胎, 为健脾化痰主药) 茯苓三钱 甘草(炙)一钱 砂仁(炒研)八分 白术钱半

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】妊妇恶阻。

【加减】若瘦人兼热, 加麦冬、竹茹; 或脉滑数之甚, 加黄芩。

29459 加味胃苓半夏汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】陈皮八分 白术 半夏 茯苓各一钱 酒芩 羌活各八分 苍术一钱 甘草四分

【用法】加生姜三片, 水煎服。

【主治】诸湿。

【加减】湿在上, 倍苍术; 湿在下, 加升麻八分; 内湿, 加猪苓、泽泻各一钱, 桂少许;

中焦湿与痛, 有实热者, 加黄连、木通各一钱; 肥白人因湿沉困怠惰, 是气虚, 加人参、黄耆各一钱、倍白术; 黑瘦人沉困怠惰, 是湿热, 加黄芩、酒炒白芍药各一钱。

29460 加味种子四物汤

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地五钱 当归三钱 白术钱半 川芎一钱 白芍钱半(炒) 茯苓钱半 阿胶三钱(面炒) 香附二钱(酒炒) 续断三钱(酒炒) 炙草五分

【用法】水煎去滓, 冲炒黄砂仁末五分, 温服。

【主治】冲任两虚, 不孕, 脉虚涩者。

【方论选录】冲任两虚, 不能交媾水火, 是胞中血少气涩, 故无以孕精而娠焉。熟地补阴滋血, 当归养血荣经, 川芎活冲脉之血, 白芍敛任脉之阴, 白术健脾生血, 阿胶补血益阴, 香附调气解郁, 炙草缓中益胃, 茯苓渗湿以清子室, 续断续筋以雄经脉也。水煎温服, 稍佐砂仁调胃醒脾, 使脾胃调和, 则血室充足, 而气无滞涩之患, 何有冲任不调, 媾精不孕哉。

29461 加味复元通气散

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】当归身 川芎 小茴(炒) 故纸(炒热) 玄胡 牛膝 桂心各一钱 丹皮一钱

【用法】水煎, 用木香五分磨水和之, 更调乳香、没药末五分服。

【主治】产后败血流入肾经, 带脉阻塞, 有腰痛者。其证胀痛如刺, 时作时止, 手不可近。有因产时起起伏挫闪肾气及带脉者, 亦或腰痛。

29462 加味香砂六君汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】党参(去芦, 米砂)二钱 白术(净) 陈皮 制半夏 归身 茯苓各一钱五分 炙草七分 木香末(冲药服)七分

【用法】加生姜二片, 水煎服。

【主治】虚弱人积聚。

29463 加味香砂生化汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】当归二钱 川芎 白术(土炒)各一钱 制半夏八分 陈皮三分 前胡 砂仁 藿香 炮姜各四分 炙甘草五分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】产后块痛已除，呕逆不止。

29464 加味香砂枳术丸

【方源】《医便》卷二。

【组成】白术(土炒)二两 黑枳实(麸炒)一两 半夏曲(真者)一两五钱 陈皮(去白)一两 砂仁(炒)七钱半 香附(醋浸，晒干，炒)一两 麦芽面(炒)一两 木香(不见火)五钱 黄连(姜汁炒)五钱，夏一两 神曲(炒)一两

【用法】上为末，薄荷煎汤，打老米糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食远白汤送下。

【功用】理脾胃，去余滞。

【主治】饮食所伤，脾胃不和，欲作泻痢，并七情所伤，痞闷呕吐，不思饮食，泻痢后脾胃不健者。

【加减】有痰，加竹沥半碗，生姜汁二盏。

29465 加味顺气化痰汤

【方源】《扶寿精方》。

【组成】人参 白术各一钱 白芍药 白茯苓 半夏 陈皮 枳实 柴胡 苏叶 黄柏 甘草(炙)各三分

【用法】上锉。水二钟，加生姜三片，煎至七分，食后温服，滓再煎。

【主治】痰病。

29466 加味独活寄生汤

【方源】《普济方》卷二四二引《济生》。

【组成】独活三两 桑寄生(无真者，续断代) 杜仲(制炒去丝) 细辛(去苗) 牛膝(去苗，酒浸) 秦艽(去心) 茯苓(去皮) 白芍药 桂心(不见火) 芍药 防风(去芦) 甘草(炙) 人参 熟地黄(洗蒸) 当归(去芦)各二两

【用法】上锉散。每服四钱，水二盏，煎七分，空心服。

【主治】肾经虚弱，坐卧当风着湿，所得腰痛，若不速治，流入脚膝，乃为偏枯冷痹，缓弱痿肿，或腰挛痛，脚重痹痒。

【加减】气虚下痢，或脘中不快者，除地黄，倍加生姜。

29467 加味活血消癥汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】夏枯草三钱 紫草三钱 丹皮三钱 草红花三钱 桃仁三钱 赤白芍各四钱 泽兰叶三钱 木通二钱 三棱三钱 莪术三钱 小茴香二钱

【功用】解毒软坚，活血消癥。

【主治】湿热下注，气血壅滞所致的化脓性睾丸炎。

【临证举例】化脓性睾丸炎 辛某，男，48岁。于1963年11月15日初诊。二十多天前，左侧睾丸肿硬，阵阵抽痛，阴囊逐渐肿大漫于两侧，伴有全身不适感，诊为急性化脓性睾丸炎。身无寒热，口干不思饮，阴囊坠痛连及少腹，腰膝痠软无力，行路困难，大便干燥。查阴囊肿大如拳，向左偏坠，皮肤微红，扣之灼热，两侧腹股沟淋巴结肿大，明显压痛，白细胞 $17000/\text{mm}^3$ 、中性81%，淋巴19%，脉沉细数，舌质淡，苔薄白。证系湿热下注，气血壅滞，发为子痛。治以解毒软坚，活血消癥，投以加味活血消癥汤，外用紫色消肿软膏。服药三天，睾丸肿痛减轻，原方加减又服十剂，左侧阴囊溃破，流出稀脓水，改服犀黄丸收功。

29468 加味济坤大造丸

【方源】《女科秘要》卷八。

【组成】紫河车一具(须壮妇人头产男胎连带者，洗净，用砂罐内隔竹片三五根，剪蒲包一块，架住，放河车于蒲包上，下用白酒，不可令胞粘着，取酒气蒸极熟) 人参一两 五钱 当归 生地(酒洗蒸熟)各二两 山

药 天冬(去心) 牛膝(酒浸)各一两 黄柏(炒) 杜仲(姜汁、酒炒断丝)各八钱 麦冬(去心)一两五钱 五味子五钱

【用法】上为末，捣河车于内，使极匀。空心每服六七十丸。

【主治】妇人气虚血弱，宫寒不孕。

【加减】如虚弱多汗，潮热，加黄耆，地骨皮、知母各一两；脾胃虚弱久泻，加白术、莲肉各一两，血虚惊悸少睡，加枣仁(炒)一两，元眼肉二两。

29469 加味养血生发汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】生地五钱 熟地五钱 鸡血藤五钱 首乌藤五钱 生黄耆一两 川芎三钱 白芍五钱 明天麻二钱 冬虫夏草二钱 旱连草三钱 桑椹五钱 木瓜二钱

【功用】滋补肝肾，养血生发。

【主治】肝肾不足，血虚脱发。

29470 加味养血凉血汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】全当归五钱 赤白芍各三钱 干生地五钱 川芎钱半 黄柏五钱 鸡血藤四钱 丝瓜络三钱 橘络二钱 木瓜二钱 川牛膝三钱

【功用】养血凉血，活血化斑。

【主治】血虚有热，热伤血络所引起的紫癜性色素性苔癣样皮炎。

29471 加味举轻古拜散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】荆芥一两(炒黑) 生地五两 黄芩一两 当归二两 白芍一两(炒) 丹皮一两 茜草二两 枳壳六钱(炒黑) 甘草六钱

【用法】上为散。每服三钱，茅根汤送下。

【主治】鼻衄，脉浮数者。

【方论选录】风热伤于营分，致蕴热内迫，而血动于经，故衄血而身热不解，天癸不调

焉。黑荆芥疏风理血，生地壮水凉血，黄芩清热止血，白芍敛阴和血，当归养血益营，丹皮平相火凉血，枳壳泻滞气以降下，茜草化滞血以止衄，生草泻火以缓其中，茅根以凉之，俾风热外解，则经气清和，而营血自固，鼻衄无不止，身热无不解，何天癸不渐调哉。

29472 加味祛邪补气散

【方源】《痘疹会通》卷三。

【组成】诃子 豆蔻 浙贝 花粉 硼砂 麦冬 乌梅 白芷 首乌 僵蚕 丁香 芡实 紫河车 莲肉(为引)

【主治】阴寒不和，脾气不收，吐泻并作。

29473 加味桂枝代粥汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】桂枝尖三钱 生杭芍三钱 甘草钱半 生姜三钱 大枣三枚(掰开) 生黄耆三钱 知母三钱 防风二钱

【用法】煎汤一茶钟，温服。覆被一时许，遍身蒸蒸微似有汗者益佳。

【主治】伤寒有汗。

【宜忌】药后覆被取汗，不可如水流漓，病必不除。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪及臭恶等物。

【方论选录】桂枝汤为治伤风有汗之方。凡桂枝汤证，皆因大气虚损，其汗先有外越之机，而外邪之来，又乘卫气之虚，直透营分，扰其营中津液，外泄而为汗也。服桂枝汤后，即吸热粥，助胸中大气以胜邪，本方加黄耆升补大气，以代粥补益之力；防风宣通营卫，以代粥发表之力。又恐黄耆服后温补生热，故又加知母以预防之。

29474 加味桂苓甘露饮

【方源】《伤暑全书》卷下。

【组成】桂苓甘露饮加人参 香薷 甘草

【用法】水煎服。

【主治】伏暑渴饮，腹胀霍乱。

29475 加味桃仁承气汤

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】桃仁(去皮尖) 大黄 芒消 甘

草 桂枝 当归 白芍 苏术 红花

【用法】水煎服。

【主治】劳伤吐血。

29476 加味香桂五物汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】黄耆 桂枝 白芍 归尾 桃仁
牛膝 生姜 大枣

【用法】水煎服。

【主治】真中风后遗偏瘫，血压正常者。

【方论选录】本方为温通血络之剂，用仲景香桂五物以温补活血通络，加归尾、桃仁、牛膝，以活血化瘀，故适用于真中风后遗偏瘫。

29477 加味柴胡桂枝汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 人参 甘草
桂枝 枳实 黄连 加桔梗 瓜蒌仁

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】发热微恶寒，肢节疼痛，微呕，心下支满闷者。

29478 加味钱氏白术散

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草(炙)
枳壳(炒)各半钱 藿香一钱 干葛二钱 木香 五味 柴胡各三分

【用法】上作一剂。水煎服。

【主治】①《丹溪心法》：消渴，不能食。②《准绳·类方》：消中，消谷善饥。

29479 加味钱氏异功散

【方源】《保命歌括》卷三十一。

【组成】异功散加川苍术 香附子 白芷

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】气虚之人腹痛，不可下者。

29480 加味健步虎潜丸

【方源】《金鉴》卷八十九。

【组成】龟胶(蛤粉炒成珠) 鹿角胶(蛤粉炒成珠) 虎胥骨(酥油炙) 何首乌(黑豆拌，蒸晒各九次) 川牛膝(酒洗晒干) 杜仲(姜汁炒断丝) 锁阳 当归(酒洗炒干)各二两 威灵仙(酒洗) 黄柏(酒洗晒干，小盐少许酒炒) 人参(去芦)

羌活 干姜 白芍药(微炒) 云白术(土炒)各一两 熟地黄三两 大川附子(童便、盐水各一碗，生姜二两，切片同煮一日，令极熟，水干再添，盐水煮毕取出，剥皮切薄片，又换净水，入川黄连五钱，甘草五钱，同煮长香三炷，取出晒干，如琥珀明亮色方用)一两五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心淡盐汤送下，冬日淡黄酒送下。

【功用】舒筋止痛，活血补气，健旺精神。

【主治】跌打损伤，气血虚衰，腰膝腿腿疼痛，痿软无力，步履艰难。

29481 加味胶艾四物汤

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】当归 熟地 阿胶 白芍各二钱 杜仲一钱五分 川芎 蕲艾各八分

【用法】加葱白三寸，大豆淋酒煎服。

【主治】妊娠腰痛。

29482 加味凉血利湿汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】金银花一两 公英八钱 地丁一两 赤芍三钱 生地五钱 大青叶一两 黄柏三钱 牛膝三钱 生石膏一两

【功用】凉血解毒，利湿清热。

【主治】湿热下注所致的足背丹毒。

29483 加味凉血退斑汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】鲜生地一两 鲜芦根一两 大青叶一两 板兰根三钱 金银花五钱 连翘四钱 桑叶三钱 白鲜皮五钱 赤芍三钱 黄芩三钱 生栀子二钱 滑石三钱 甘草一钱

【功用】清热凉血，解毒利湿。

【主治】湿热结毒，灼煎营血，冲于皮肤所引起中毒性红斑。

29484 加味消毒犀角饮

【方源】《袖珍小儿》卷八。

【组成】牛蒡子三两 荆芥穗五钱 甘草一两 防风(去芦) 川升麻各七钱半 犀角三钱 麦门冬(去心) 桔梗各五钱

【用法】上锉散。每服二钱，水煎，温服，时时令呷含下。

【主治】毒气壅遏，壮热心烦，疮疹出未匀透，口生疮不能吮乳。

29485 加味调中健脾汤

【方源】《济阳纲目》卷十二。

【组成】白术 苍术 厚朴 陈皮 茯苓各一钱 半夏 枳实各八分 人参七分 甘草五分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎，食远温服。

【功用】调养脾胃。

【加减】如头目眩痛，加川芎、白芷各一钱；如左胁气滞，加青皮、柴胡各一钱；如右胁痛，加枳壳一钱；如饮食肉物所伤，加神曲、麦芽、山楂各八分；如恶心呕哕，加藿香、砂仁各八分；如肺经有热，加黄芩七分；如小便涩，加梔子(炒)八分；如相火动，加黄柏、知母(炒)各八分；如大便涩，加黄芩、当归各一钱；如脾热，加芍药一钱。

29486 加味调中益气汤

【方源】《医学正传》卷四引东垣方。

【组成】陈皮 黄柏(酒炒)各三分 升麻(去粗皮) 柴胡(去芦)各四分 人参 甘草(炙) 苍术各六分(米泔浸) 黄耆一钱 川芎六分 蔓荆子三分(杵去皮) 细辛二分(一方有木香二分，无黄柏)

【用法】上细切，作一服。水二盏，去滓温服。

【主治】气血俱虚头痛。

【加减】如大便虚坐不得，或了而不了，腹中逼迫，此血虚血涩也，加当归身五分。

29487 加味调中益气汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】人参钱半 黄耆三钱(蜜炙) 白术钱半(炒) 炙草钱半 当归三钱 生地

三钱 花粉三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】劳倦伤脾，心火独旺，发热食少，经闭不行，脉软数者。

【方论选录】劳倦伤脾，胃气不化，心火不降，而独旺于中，乘阳则发热，食少新血不生，故月事衰少不来焉。参、耆补益中气，善退虚热；归、术调补肝脾，能助运化；生地、花粉泻热凉血以滋干；炙甘草缓中盖胃以调气也。水煎温服，使脾胃气壮，则经脉滋荣，而新血自生，何有经闭发热之患哉。

29488 加味调胃承气汤

【方源】《秋症指南》卷一。

【组成】大黄三钱 玄明粉二钱 羚羊一钱 条芩四钱 麦冬二钱 生甘六分

【用法】水二碗，煎至一碗，空心服。

【主治】寒热往来，服蠲暑饮不解，遂致蒸蒸发热，或日晡潮热，或微烦溺数，腹满便结，俱皆阳明胃实所致。

29489 加味通元二八丹

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】宣黄连八两 当归身 赤芍药 生地黄 南川芎各五钱 槐花 荆芥穗 乌梅肉各一两

【用法】上药各为细末，用雄猪肚一枚，以刀刮尽，仍用酒洗净，将前药末装入，线缝严密，用韭菜铺底盖顶，以桑柴火蒸一日，捣千余下为丸，如桐子大。每服七八十丸，温水送下；肠风及便毒下血，用浆水汤送下；脏毒痔漏，每清晨服一百丸，清茶送下。此药霜降后合方妙。

【主治】痢疾，休息痢十数年不愈者。

29490 加味理中地黄汤

【方源】《福幼篇》。

【组成】熟地五钱 当归三钱 萸肉一钱 枸杞二钱 白术三钱 炮姜一钱 党参二钱 炙草一钱 枣仁二钱(炒，研) 肉桂一钱 破故纸二钱 炙耆二钱

【用法】生姜三片、红枣三枚、胡桃二个为

引,用灶心土二两煮水煎药,取浓汁一茶杯,另加附子五分或二三分,煎水掺入,量儿大小,分数次灌之。

【功用】助气补血,却病回阳。

【主治】小儿精神已亏,气血大坏,形状狼狽,瘦弱至极者。

【加减】咳嗽不止者,加粟壳一钱,金樱子二钱;如大热不退,加白芍一钱;泄泻不止,加丁香五分,只服一剂,即去附子,只用丁香七粒,隔二三日,再用附子一二分。

29491 加味理中地黄汤

【方源】《吉人集验方》。

【组成】大熟地五钱 当归三钱(如三四剂后,泄泻未止者,去当归) 黄肉一钱六分 炙甘草一钱 枸杞三钱 炒枣仁二钱 肉桂一钱 五味子一钱 破故纸二钱 生姜三片 红枣三枚 胡桃一个(打碎为引)

【用法】用灶心土一两煮水,澄清煎药,取浓汁大半茶杯,另用附子三分,另煎水而入,量儿大小,分数次灌之。

【功用】助气补血。

【主治】小儿精神亏,气血坏,狼狽瘦弱。

【加减】如有咳嗽,加粟壳一钱、金樱子一钱;如大热不退,加白芍一钱;泄泻不止,加丁香六分,只服一剂,即去附子,止用丁香七粒,隔二三日,再用附子一二分。

29492 加味黄芩芍药汤

【方源】《女科秘书》。

【组成】当归 条芩 芍药 黄连(姜汁炒) 砂仁 枳壳 槟榔 木香

【用法】水煎服。痢止即止药。

【主治】怀妊下痢,此是暑热寒温相搏而然。

29493 加味黄连香薷饮

【方源】《治痢南针》。

【组成】黄连一钱 香薷三钱半 厚朴二钱 扁豆二钱 甘草一钱 芍药三钱 生姜三片

【主治】痢疾发于夏月暑时,有表症。

29494 加味黄连香薷饮

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】香薷 黄连 扁豆 厚朴 陈皮 法夏 茯苓 甘草

【用法】水煎服。

【主治】暑热泄泻。

【方论选录】本方为清暑化湿和中之剂。用香薷、黄连清暑退热,扁豆、茯苓利湿止泻为主,佐二陈、厚朴以燥湿和中调气,故为治暑热泄泻之良方。若用于夏季急性肠炎,形寒发热,腹痛下利之症,有消炎解热健胃作用。如多汗,易香薷为藿香,则尤为适宜。

29495 加味黄连解毒汤

【方源】《羊毛温证论》。

【组成】黄连一钱 黄芩二钱 黄柏二钱 山栀子一钱 桔梗二钱 甘草一钱 金银花一钱 车前子一钱 木通一钱 六神曲(炒)二钱 蝉蜕十枚 白僵蚕三钱

【用法】水煎去滓,加生大黄末五分,黄蜜三钱,和匀温服。

【主治】羊毛邪毒,发热心烦,身软神疲,舌有紫点,胸闷食少,小水黄赤,脉象沉数而大。

29496 加味黄连解毒汤

【方源】《治疗汇要》卷下。

【组成】黄连 条芩 黄柏 栀子 连翘 甘草 牛蒡子(炒研)各等分

【用法】加葱白、或大黄,水煎服。

【主治】疔毒入心,渴热便秘,烦闷脉实。

【宜忌】若非实火,不可轻服。

29497 加味黄连解毒汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】黄连一钱 黄柏二钱 栀子三钱 黄芩二钱 犀角一钱(磨汁冲服)

【用法】水煎服。

【功用】泻热清心。

【主治】内热子痢,兼有口苦溺赤,烦躁或占语。

【加减】抽搐甚者,加石决明、草决明各五

钱。

29498 加味黄耆五物汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生箭耆一两 于术五钱 当归五钱 桂枝尖三钱 秦艽三钱 广陈皮三钱 生杭芍五钱 生姜五片

【主治】历节风证，周身关节皆痛，或但四肢作疼，足不能行步，手不能持物。

【加减】热者，加知母；凉者，加附子；脉滑有痰者，加半夏。

【方论选录】《金匱》黄耆五物汤治风痹；加白术健脾补气，即以逐痹；当归以生其血，血活自能散风；秦艽为散风之润药，性甚和平，祛风而不伤血；陈皮为黄耆之佐使，引肌肉经络之风达于皮肤而外出。

29499 加味黄耆建中汤

【方源】《准绳·伤寒》卷七。

【组成】黄耆 白芍药各二钱 当归一钱半 人参 白术 麻黄根 牡蛎粉各一钱 官桂五分 饴糖一匙 大枣二枚

【用法】上作一服。水二钟，煎至八分，食远温服。

【主治】阳虚无热恶寒，盗汗，无力，下虚者。

29500 加味银花甘草汤

【方源】《寿世新编》。

【组成】金银花六两 生甘草一两 皂角刺五钱

【用法】水煎，和酒服。

【主治】阳毒焮赤肿硬，疼痛异常，一切疮疡。

29501 加味麻杏石甘汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】蜜炙麻黄四分 光杏仁二钱 生石膏四钱 生甘草四分 瓜蒌仁四钱 竹沥半夏钱半 广皮红 小枳实各一钱

【主治】伤寒热盛痰壅。

29502 加味清地退火汤

【方源】《痘疹会通》卷三。

【组成】羌活 石膏 知母 元参 豆根

紫草 红花 归尾 丹皮 犀角 大黄 蚯蚓

【用法】水煎服。

【主治】痘疮见点，热毒俱盛者。

29503 加味清肝开窍汤

【方源】《千家妙方》卷上引关幼波方。

【组成】生耆 15 克 当归 10 克 赤芍 15 克 白芍 15 克 何首乌藤 30 克 茵陈 15 克 藿香 10 克 佩兰 10 克 杏仁 10 克 橘红 10 克 郁金 10 克 远志 10 克 菖蒲 10 克 川连 4.5 克 琥珀粉 1.2 克（冲服）羚羊粉 0.6 克（冲服）

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】调补气血，芳化痰湿，清肝开窍。

【主治】气血两虚，肝胆余热未清，湿痰蒙窍引起的慢性肝昏迷。

【临证举例】慢性肝昏迷 刘某，男，37 岁。于 1975 年 5 月 30 日初诊。患者因肝硬化于 1972 年行脾切除术，术后逐渐失眠，甚至通宵不寐，渐至夜间发作性舌謇，上唇麻木，两臂不能抬高，有时出现无意识动作，说胡话，白天头晕头痛，记忆力极差，缺乏思考能力，急躁易怒，鼻衄，视物不清，大便干硬难解，曾经中西医多方治疗未效。来诊时，血液检查：谷丙转氨酶 180 单位，血氨 0.18 毫克%，舌苔黄，脉沉弦，投以加味清肝开窍汤，加枣仁 15 克，百合 12 克，合欢皮 12 克，服药百剂左右，睡眠日渐好转，头痛头晕，急躁易怒等症状基本消失，视物清楚，记忆力和思考力有所恢复，舌苔薄白，脉转沉滑、谷丙转氨酶正常、血氨降至 0.1 毫克%，随访半年未再发作。

29504 加味清肺降火汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】陈皮 枯黄芩 麦冬 桑白皮 生地黄 贝母 梔仁 瓜蒌仁 天花粉 石膏 葶苈子 地骨皮 苏子（炒）

【用法】灯心二十根为引，水煎服。

【主治】麻出喘急。

29505 加味清毒化斑汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】犀角三钱(研细末冲) 薄荷二钱 石膏四钱(生) 知母三钱 大青叶三钱 甘草二钱(生) 生地三钱 丹皮三钱 金银花三钱 连翘三钱 粳米三钱

【用法】水煎大半杯，温服。小儿减半。

【主治】温斑发重，色紫神气不清，毒火太盛者。

29506 加味清咽利膈汤

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】连翘一钱 川连一钱 元参一钱 金银花一钱 黄芩一钱 桔梗一钱 甘草一钱 青防风一钱 牛蒡一钱 荆芥一钱 朴消二钱 薄荷头一钱 山梔一钱 大黄一钱

【用法】水煎服。

【主治】喉痹。

29507 加味清热消痈汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】金银花一两 连翘四钱 野菊花三钱 赤芍药三钱 黄芩三钱 公英一两 白芷三钱 天花粉三钱 木通二钱 陈皮二钱 生甘草一钱 炒山甲二钱 炒皂刺二钱

【功用】清热解毒，活血消痈。

【主治】热毒壅遏，气血阻隔致患颈部痈。

【临证举例】后颈部脓肿 吴某，女，37岁。于1963年1月21日初诊。九天前颈部生一疙瘩，肿痛日渐加重，夜不成眠，头不能抬起或转动，发热怕冷，周身无力，口干欲饮，食欲不振，大便两日未解，小便色黄，体温38.7℃，后颈部正中偏左有疮口数个，脓栓堵塞，状如蜂窝，凸起红肿，四周漫肿而硬，周围灼热，明显压痛，脉弦数，苔白厚腻根微黄。证系毒热壅遏，气血阻隔。治以清热解毒，活血消痈。投以加味清热消痈汤，外用化毒药膏和提毒药捻。三日后，恶寒发热均减，体温降至37.5℃，疮口渐大，排出黄白色稠脓，漫肿渐消，舌苔白厚略腻，脉

弦稍数。用上方加减治疗年余，创面愈合，瘢痕柔软，未留下后遗症。

29508 加味清热渗湿汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】苍术 白术 黄柏 黄芩 黄连 竹叶 赤茯苓 甘草 砂仁 泽泻

【主治】妊娠湿温，湿在太阴，已化热者，证见恶寒蕴热，头目昏重，肢节痠痛，胸膈痞闷。

29509 加味清暑益气汤

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】黄耆 升麻 人参 白术 神曲 陈皮 泽泻 黄柏 当归 青皮 麦冬 葛根 甘草 五味 丹皮 生地

【用法】加生姜，大枣，水煎服。

【主治】伤暑吐衄，脉虚而大。

29510 加味渗湿消痰饮

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】白术 苍术 半夏 橘红 白茯苓 白芷 香附 甘草 干姜 附子

【主治】过食生冷，痰湿内瘀，少腹寒痛，带下者。

29511 加味葛花解酲汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】党参(去芦) 白术(净) 茯苓 砂仁(杵) 白蔻(净仁杵) 葛花各一钱 青皮 陈皮 猪苓 泽泻(盐水炒)各七分 神曲 木香各五分 黄连四分 丹皮七分

【主治】饮酒过多而吐血。

29512 加味葛根苓连汤

【方源】《赵锡武医疗经验》。

【组成】生石膏18克 葛根12克 甘草9克 金银花12克 杭白芍12克 川黄连4.5克 黄芩9克 全蝎3克 蜈蚣3克

【用法】加水600毫升，先煮石膏15分钟，再入其余诸药煎至120~150毫升，分3次温服。

【主治】小儿麻痹症，急性期。

29513 加味葵子茯苓汤

《医略六书》卷二十五。为《张氏医通》卷

十四“加味葵子茯苓散”之异名。见该条。

29514 加味葵子茯苓散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【异名】加味葵子茯苓汤(《医略六书》卷二十五)、加味葵子散(《类证治裁》卷七)。

【组成】葵子三两 茯苓 滑石各一两 芒消半两 甘草(生) 肉桂各二钱半

【用法】上为散。饮服方寸匕,一日三次。

【主治】石淋,水道涩痛。

29515 加味紫苏和胎饮

【方源】《会约》卷十四。

【组成】紫苏叶(红者真) 条芩 甘草各一钱 白术钱半 陈皮 藿香(须梗连叶者真)各八分 砂仁五分

【用法】水煎,热服。

【主治】妊娠霍乱,寒热之盛,邪正交争,心腹绞痛,或吐或利,气血俱伤,子母不安者。

29516 加味黑虎保安丹

【方源】《扶寿精方》。

【组成】川芎 苍术 草乌(炮) 何首乌 白芷 荆芥 防风 麻黄 细辛 石斛 甘草各一两 川乌 全蝎各五钱 樟脑一钱 两头尖 豨莶草 威灵仙各一两 白花蛇一条

【用法】上为末,炼蜜和杵为丸,如樱桃大。病在上食后服,病在下食前服,随引嚼服。左瘫右痪,急闷或四肢顽麻,并热酒送下;初病劳瘵,吐血腥或小便不通,并好酒送下;眉须脱落,大麻风,口眼喎斜,心热风,腰足疼,偏正头痛,夹脑风,或腰痛耳聋,肾脏风,并茶清送下;狂言心邪,防风煎酒,入飞朱砂在内送下;紫白癜风,并鼻赤,肺脏风,并防风汤送下;耳作蝉鸣,骨气风,川乌酒送下;小儿吃泥土,或饮食无味,缠脏风,并皂角子汤送下;心气胀闷,噎食喷嚏,咳嗽,女人赤白带下,并生姜汤送下;手心退皮,天麻或益智仁汤送下;迎风冷泪,米汤送下;筋骨疼痛,乳香汤送下,膀胱肿痛,

醋汤送下;指头破裂,烧梨汤送下;诸淋沥或发鬓退落,并炒盐汤送下。

【主治】治一切风气。

【宜忌】忌过饮,及热物欲事,避风。

29517 加味温阳风心汤

【方源】《千家妙方》卷上引王渭川方。

【组成】熟附片30克(先煎) 云苓30克 桂枝9克 白芍9克 白术9克 山萸肉9克 炮干姜9克 威灵仙9克 全蝎9克 乌梢蛇9克 生黄耆60克 北五味子12克 薤白12克 巴戟天12克 蜈蚣2条 桑枝24克 夏枯花15克 甘草3克

【用法】水煎服,每日一剂。

【功用】温阳行水,祛风活络。

【主治】风湿性心脏病。

【临证举例】风湿性心脏病 李某,女,27岁。病人素患关节肿痛,心悸,面色苍白,气紧形寒,尿少,食差,浮肿,腹胀,腹痛,耳鸣,精力疲乏。突又发生胸间剧痛,牵及后背,手足冰冷,大汗出,口唇紫绀,脉沉细迟,舌淡红边蓝,苔薄白。某医院诊断为风湿性心脏病,治疗未效。投以加味温阳风心汤,连进12剂,胸痛止,心悸缓,腹胀浮肿及关节痛显著减轻。

29518 加味温补通阳方

【方源】方出《刘惠民医案》,名见《千家妙方》卷上。

【组成】山药30克 熟地15克 麻黄4.5克 炮姜9克 鹿角胶(烊化,可用阿胶代)12克 桂枝9克 补骨脂12克,白术15克(土炒) 炒陈曲9克 醋香附12克,当归12克 熟附子9克 山茱萸12克 木香9克 生黄耆12克 骨碎补12克 鸡血藤12克

【用法】每日一剂,水煎两次,混合后分早、晚温服。

【功用】温肾健脾,补气养血,温经通阳。

【主治】《千家妙方》:脾肾不足,气血两虚,风寒内袭,阻闭经络。

【临证举例】脊髓空洞症 高某，女，45岁，1970年5月30日初诊，患者于5年前春开始，发现左手感觉减退、麻木，继则发现左侧头面部、胸背部及上肢不出汗，局部发凉，肢体麻木、感觉异常，逐渐加重，常不自觉被烫伤，左手握力差，不能持物，多年来伴腹泻，面黄精神不振，舌质淡红，舌苔薄白，脉沉细弱，某医院诊为脊髓空洞症。是脾肾不足，气血两虚，风寒内袭，经络阻塞所致。投以加味温补通阳方，服药6剂，感觉舒适，食欲较佳，上方加减间断服药半年余，病情明显好转。左半身麻木逐渐减轻，温痛觉逐渐恢复，功能渐趋正常，追访五年，情况良好。

29519 加味滋阴大补丸

【方源】《医便》卷五。

【组成】枸杞子（去枝蒂，酒拌，蒸）四两 沙苑蒺藜（酒洗，蜜酒拌蒸）三两 当归身（酒洗）二两 人参（去芦）一两 黄耆（蜜炙）二两 山药（人乳拌晒三次）二两 山茱萸（水洗，去核，童便拌晒）二两 白茯苓（去皮，漂去筋膜，人乳拌晒三次）二两 牡丹皮（酒洗，去心）二两 怀生地黄（酒洗）二两 怀熟地黄（酒洗）二两 天门冬（水洗，去心）二两 麦门冬（水洗，去心）二两 黄柏（川秋石入酒炒褐色）一两五钱 知母（川秋石入酒炒褐色）一两五钱 龟版（酒洗，酥炙）二两 杜仲（去粗皮，姜汁炒断丝）二两 牛膝（去芦，酒洗，同黑豆蒸二时去豆）二两 补骨脂（酒浸，蒸）二两 鹿角胶四两 菟丝子（水淘去沙，酒浸蒸，捣成饼，焙干）二两 肉苁蓉（酒洗，酥炙）一两五钱 锁阳（酒浸，酥炙）一两二钱 虎胫骨（酒浸，酥炙）二两

【用法】上药各为细末，先以鹿角胶用无灰好酒溶开，和炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空腹用淡盐汤送下；温酒亦可。

【功用】养气血，滋肾水，固元阳，添精髓，壮腰膝，润肤体，育心神；久服驻颜延年。

29520 加味滋阴润燥方

【方源】《千家妙方》卷上引黄文东方。

【组成】生首乌15克 玉竹9克 大腹皮12克 青陈皮各6克 生枳壳9克 乌药9克 青橘叶9克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】调气畅中，和胃润肠。

【主治】肠燥便秘，气滞腹胀。

29521 加味普济消毒饮

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】黄芩三钱（酒炒） 黄连一钱半 陈皮五分 玄参二钱 连翘二钱 板兰根二钱 马勃二钱 薄荷一钱 牛蒡子二钱（炒） 升麻一钱 柴胡一钱 大贝母二钱 银花二钱 僵蚕一钱（炒） 桔梗二钱 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】痘后两眼赤胀，热泪常流，怕日羞明，风轮周围起点点白膜，头不疼。

29522 加味犀角地黄汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】犀角 牡丹皮 生地 大黄 赤芍

【用法】水煎，温服。

【主治】阳证将解，衄血不尽，或阳热已深，吐血不尽，留在上焦，为瘀血结胸，手不可近，但漱水不欲咽，喜忘如狂，大便黑，小便自利。

【加减】如血未下，加桃仁、红花、枳实。

29523 加味犀角地黄汤

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】犀角（磨，无以升麻代） 生地黄一钱五分 芍药 桔梗 当归 陈皮各六分 甘草 红花各三分 牡丹皮（去骨）八分

【用法】水二钟，加生姜三片，水煎，临卧随法入生藕节，捣汁三匙，温服。

【主治】伤寒烦躁，漱水不下咽，属上焦有瘀血者。

【备考】方中犀角用量原缺。

29524 加味犀角地黄汤

【方源】《医便》卷三。

【组成】犀角(镑) 生地黄 芍药 牡丹皮 麦门冬 黑山桅仁(炒黑, 韭菜根自然汁沅透)各等分

【用法】每服五钱, 水一钟半, 煎七分, 温服。

【主治】火载血上, 错经妄行, 吐血、呕血、衄血。

29525 加味犀角地黄汤

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】犀角 生地 赤芍 丹皮 蒲黄

【用法】加灯心三十寸, 荷叶一大张, 煎汤代水。

【主治】虚劳内热, 痰中夹血。

29526 加味犀角地黄汤

【方源】《痘疹仁端录》卷九。

【组成】犀角 牛子 荆芥 甘草 防风 升麻 桔梗 麦冬 生地 黄连

【主治】壮热, 口疳。

29527 加味犀角地黄汤

【方源】《治疹全书》卷中。

【组成】生地 丹皮 白芍 连翘 丹参 防风 川连 柴胡 牛蒡

【用法】上药先煎去滓, 再以水磨犀角汁入药煎一沸, 温服。

【主治】疹毒热甚, 口鼻出血, 目赤翳障, 呕吐蛔虫, 烦躁口渴, 口疮牙疳, 狂乱谵语, 大便秘结, 便血粪黑者。

29528 加味犀角地黄汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】犀牛角二钱 生地黄五钱 丹皮二钱 白芍三钱 滑石四钱 酒黄芩五钱 炒栀子四钱 竹叶一钱 木通三钱

【用法】水煎, 温服, 再以复元散调之。

【主治】鼻衄。

【方论选录】犀角地黄汤已是寒凉之品, 又加栀子清上焦之热, 酒芩清血中之热, 滑石清六腑之热, 木通、竹叶引诸热从小便出, 热去血不妄行, 而鼻衄自止矣。

29529 加味犀角地黄汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】犀角 生地 白芍 丹皮 枳壳 黄芩 桔梗 陈皮 百草霜 香附 甘草

【主治】血热伤络, 乱其常度, 逆行而吐, 或鼻衄常出, 形成倒经。

29530 加味犀角消毒饮

《东医宝鉴·杂病篇》卷十一引《丹心》。即《得效》卷十一“加味犀角饮”。见该条。

29531 加味犀角白虎汤

【方源】《感证辑要》卷四。

【组成】白犀角一钱 羚羊片一钱半 生石膏八钱 知母四钱 生甘草八分 陈仓米三钱(荷叶包) 白颈蚯蚓三支 陈金汁一两(冲) 甘萝根汁一瓢(冲)

【功用】清热。

29532 加味疏风祛疹汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】赤白芍各四钱 当归三钱 茜草根三钱 白茅根一两 蝉衣二钱 浮萍一钱 白鲜皮一两 刺蒺藜五钱 金银花五钱 生枳壳三钱 生甘草三钱

【功用】凉血疏风, 清热解毒。

【主治】血分有热, 外受风毒引起的玫瑰糠疹。

29533 加味疏风凉血饮

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】生地四钱 丹皮三钱 紫草四钱 黄芩四钱 防风三钱 秦艽三钱 白鲜皮五钱 白术四钱 云苓四钱

【功用】健脾祛湿, 疏风凉血。

【主治】脾肺湿化热, 发于肌肤, 形成多型性红斑。

29534 加味解毒内托饮

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】金银花五钱 公英五钱 连翘四钱 赤芍三钱 白芷三钱 青陈皮四钱 炒

山甲三钱 炒皂刺三钱

【功用】清热解毒，活血内托

【主治】毒热壅滞，发为臀痈。

29535 加味解毒生脉散

【方源】《千家妙方》卷上引关幼波方。

【组成】西洋参15克（另煎兑服） 五味子10克 元参15克 生地15克 丹皮15克 天花粉15克 知母10克 黄柏10克 银花30克 麦冬30克 赤芍15克 远志12克 鲜茅根60克 川贝12克 犀角1.5克（兑服） 羚羊粉1.5克（兑服）

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】强心护阴，清营解毒。

【主治】毒热入营，热深厥深，气阴两伤者。

29536 加味解毒散结汤

【方源】《千家妙方》卷下引关幼波方。

【组成】板兰根30克 马勃4.5克 薄荷10克 蒲公英30克 瓜蒌15克 元参15克 苦桔梗10克 生地12克 赤芍12克 草河车12克 郁金10克 蜂房3克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】清热解毒，活血消肿。

【主治】湿热隐于血分，瘀阻血络，结聚成块，形成淋巴肉芽肿。

29537 加味橘皮竹茹汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】赤茯苓 橘皮 枇杷叶 麦门冬 竹茹 半夏各一钱 人参 甘草各五分

【用法】加生姜，水煎，温服。

【主治】胃热多渴，呕哕不食。

29538 加味藿香正气散

【方源】《得效》卷五。

【组成】藿香正气散加丁香 缩砂 良姜 南木香各半钱

【用法】加生姜三片，红枣二枚，水煎服。

【主治】饮食中忧怒伤脾，腹内膨满，泄泻频并，或作晨泄。

29539 加味藿香正气散

【方源】《卫生鸿宝》卷四。

【组成】苏叶 陈皮 茅术（炒） 葛根

（煨） 蝉退各一钱 藿香梗 厚朴（炒） 半夏曲（炒）各钱半 牛蒡子（炒，研） 赤苓各三钱 焦神曲二钱 甘草四分

【用法】水煎服。

【主治】烂喉痧，形寒发热，面若赭朱，痧不出肌，上吐下泻，腹痛如绞，甚至发厥口噤，目闭神昏，乃内挟宿滞痧秽，外感戾毒暴寒，折伏表里为病。

【宜忌】吐泻之后，津液大伤，必然发渴，切勿与蔗梨一切寒凉之物。

29540 加味藿香正气散

【方源】《寿世新编》卷上。

【组成】藿香叶二两 紫苏叶一两六钱 粉甘草二两 漂茅术二两 山查肉一两六钱 云茯苓二两 嫩桂尖六钱四分 广陈皮二两大腹皮二两（洗浸） 宣木瓜二两 建神曲一两六钱 白芍一两 陈香薷一两六钱 煨枳壳二两 芽桔梗二两 法半夏一两六钱（姜汁制） 大麦芽一两六（炒） 炒扁豆二两 粉甘草八钱 建泽泻二两（淡盐水炒） 猪苓块二两

【用法】上为细末，外用生姜捣汁一盞，和白水为丸，或将腹皮、生姜二两，煎水搓丸，如梧桐子大。每服二三钱，小儿量减。

【主治】寒热杂感，吐泻胸满腹胀，头痛或口渴，霍乱转筋，小便赤热者。

29541 加味蠲饮六神汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】胆南星三钱 天竺黄一钱半 半夏曲 茯神各三钱 旋覆花二钱 竹沥十滴 钩藤三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【功用】豁痰开窍。

【主治】产后神昏，角弓反张，或口噤不语，胸脘痞闷，痰鸣气逆，发热，大便秘结，舌苔黄腻，脉弦滑而数。

【加减】痰涎壅盛，口噤不语，加天麻三钱，炒远志、炒蚕沙各二钱，竹沥三十滴，生姜汁十滴。

29542 加参生化万安汤

《女科秘要》卷六。为《宁坤秘籍》卷中，“加味生化汤”之异名。见该条。

29543 加参生化止崩汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】人参二三钱 当归身四钱 川芎二钱 干姜(炒黑) 炙草各四分 白芷 荆芥穗(炒黑)各五分 桃仁十粒(去皮尖)

【用法】加大枣二个，水煎服。

【主治】产后血块痛，鲜血崩，形色脱，或汗多，或气促。

29544 加参生化理中汤

【方源】《女科秘要》卷六。

【组成】川芎一钱 当归 人参各三钱 姜炭 炙甘草各五分 黄耆一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后阴气、阳气俱虚，手足冷厥者。

【加减】服上方厥回，痛块未除，暂减参、耆，俟块痛已除，仍用参、耆，加桃仁十五粒，姜水煎服；如渴，加人参一钱，麦冬一钱，五味子十粒；手足微冷，加熟附子五分；痰，加橘红五分；竹沥半杯，姜汁二匙；汗多，加黄耆一钱；血块痛，加肉桂五分；虚甚，加人参一二钱；大便不通，加麻仁一钱五分，再服五仁丸。

29545 加参安肺生化汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】川芎一钱 人参一钱 知母一钱 桑白皮一钱 当归二钱 杏仁十粒(去皮尖) 甘草四分 桔梗四分 半夏七分 橘红三分

【主治】产后虚弱，旬日内外感风寒，咳嗽声重有痰，或身热头痛及汗多者。

【加减】虚人多痰，加竹沥一杯，姜汁半匙。

29546 加料神异透骨膏

【方源】《医方类聚》卷一九四引《经验良方》。

【组成】露蜂房(细剪，事治极净) 杏仁(去皮尖)各五钱 清油十两 川山甲四钱 当归一两 木鳖子八个(去皮) 白胶香

(明者)四钱 虢丹四两(净) 蛇蜕皮五钱(盐少许，入水洗净) 葱(连须叶)十茎 乳香 没药各二钱 男子乱发(洗净，擗却鸡子大，用童男童女者佳) 加玄参半两 黄耆四钱

【用法】用瓷器或铜铁铫盛油，浸药一宿，慢火煎熬诸药黑色，用生绢帛滤出滓，留下一两重药油，复将所滤油于慢火上再熬，却将黄丹入油内，用长槐柳条不住手搅，候有微烟起，即提起药铫，就柳条点药油，滴在水面上，凝结成珠不散，方成膏也。如油散不成珠，再熬直待成膏，提起药铫，搅无烟出，却入乳香，没药搅匀，倾出瓷器内，将原留下油洗药铫，一并收拾器内，用新汲水一日一换，将药器坐放水内三日出毒，方可用。如药膏硬，约量加黄蜡、清油入膏内，搅匀得所。

【功用】消肿定痛，生肌。

【主治】远年近日，一切恶毒注疮。

29547 加料羚珀明目丸

【方源】《全国中药成药处方集》

【组成】黄连 川芎 木贼 枳壳 五味各六钱 杏仁 人参 甘草 青葙 青盐 黄柏 蒙花 寸冬 菊花 蒺藜 山药 当归 杜仲各一两八钱 生地 天冬各二两七钱 全蝎 防风 荆芥各四钱五分 蔓荆子 茯苓 枸杞 石斛 草决明 菟丝子 沙苑 蝉蜕各一两四钱 知母一两八钱 羚羊二两 琥珀二两 冰片四钱 薄荷冰二钱

【用法】上为细末，炼蜜为大丸，重二钱半，金衣，蜡皮封固。

【主治】目疾。

29548 加减二母宁嗽汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】川贝母二钱 天门冬三钱 广砂二钱 知母三钱 薏仁三钱 云茯苓四钱 麦门冬三钱 粟壳三钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】咳嗽，脉象洪数者。

【方论选录】此方以川贝为君，川贝为清凉之品，为止嗽之圣药；佐以知母、天冬、麦冬、萎仁、粟壳，俱能清热化痰；茯苓、甘草其性和平，能扶脾助胃；唯广砂微温，能清痰化滞，开胃益脾，脾能健运，则痰无积滞，而嗽止矣。

29549 加减十全大补汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】人参 白术 当归 生地 黄耆 各二钱 茯苓 川芎各八分 甘草五分 远志一钱 银花三钱

【用法】水煎服。

【主治】产后乳疽乳瘤，脓已出而虚弱日甚者。

【加减】泻，加莲子十四粒，肉果一枚；渴，加麦冬、五味；久不收口，加参末膏药贴之。

29550 加减十全大补汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参（少者，以山药炒黄四钱代之） 白术二钱 茯苓一钱五分 当归一钱八分 炙草一钱 川芎一钱 白芍（酒炒）一钱二分 陈皮一钱 半夏一钱五分 干姜（炒）八分

【用法】生姜、大枣为引。

【主治】虚弱之人，带久不止。

【备考】方中人参用量原缺。

29551 加减十全大补汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】党参二两 白术五钱 茯苓三钱 炙甘草三钱 当归身一两 黄耆二两 大熟地一两 乌梅三钱（去内壳） 醋白芍三钱 制附片三钱

【用法】熟地蒸捣，入炼蜜少许为丸，如芥子大。朝夕每服三钱，开水送下。

【主治】头痛。

29552 加减十全大补汤

【方源】《青囊秘决》卷上。

【组成】人参一两 白术一两 当归一两 熟地一两 麦冬一两 甘草三钱 五味子三

钱 锦地罗三钱 茯苓五钱 黄耆二两

【用法】水煎服。

【主治】背生痈疽，溃烂之后，或发热，或恶寒，或作痛，或脓多，或流清水，自汗盗汗，脓成而不溃，口烂而不收，因五脏亏损，气血太虚所致。

29553 加减十全大补汤

【方源】《实用正骨学》。

【组成】地黄 芍药 当归 川芎 人参 白术 茯苓 甘草 黄耆 木瓜 牛膝 升麻 桂枝

【用法】水煎服。

【主治】骨伤愈后，上下肢浮肿疼痛者。

【方论选录】地黄、芍药、当归、川芎补血；人参、白术、茯苓、甘草、黄耆强心固气；木瓜、牛膝舒筋活血；桂枝畅旺血液循环；升麻解毒消肿，故合成强壮消肿定痛之剂。

29554 加减十全大补汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】泡参一两 白术三钱 白茯苓四钱 黄耆六钱 当归二钱 熟地三钱 肉桂一钱 炙草一钱 龙骨五钱 乌贼一两

【用法】水煎，不拘时频服。

【功用】气血双补。

【主治】产后数日，忽然血崩，大量出血，色红，间有乌红色小块，腹无痛苦，面色淡，舌质淡嫩，脉浮虚无力，属气虚而兼血虚者。

29555 加减十味香薷汤

【方源】《普济方》卷一一七引《经验良方》。

【组成】香薷穗四两 白扁豆（炒）厚朴（姜制） 茯神（去皮木） 紫苏叶 甘草 陈皮（去白）各二两 檀香一两 干木瓜二两 丁香半两

【用法】上为细末。百沸汤调服。

【功用】夏月常服清头目，去暑湿，顺气清神，理脾。

29556 加减七味白术散

【方源】《医钞类编》卷八。

【组成】黄耆 人参 白术 藿香 茯苓 木香 葛根 乌梅 生姜

【用法】大枣为引。

【主治】虚泄口干。

29557 加减八味地黄丸

《准绳·疡医》卷二。为《集验背疽方》“加减八味丸”之异名。见该条。

29558 加减八味地黄汤

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十二。

【组成】怀熟地八钱至一两余 丹皮一钱 山茱肉二钱 茯苓二钱五分 山药二钱四分 泽泻(盐水炒)一钱 牛膝一钱 麦冬三钱 五味子六分 肉桂(盐煎,刮去粗皮)一钱

【用法】水三大碗,煎一碗,食前温服,日一剂,不煎渣,服后随进饮食压之。数剂后,热退嗽减,六脉洪缓无力,身体倦怠,照前方冲参汤服。愈后,每早淡盐汤吞服八味丸四五钱。

【主治】凡咳嗽不止,痰唾稠枯,身热骨痛,头眩目胀,或时畏寒,六脉弦数,肌肉日瘦,夜不能寐,甚有两颊之间肿硬者。

【加减】如尺脉无神者,加熟附子一钱。

29559 加减八物柴胡汤

【方源】《女科秘要》卷四。

【组成】人参三钱 茯苓 白芍 地黄 知母 麦冬 柴胡各一钱 炙甘草五分

【用法】食远服。

【主治】①《女科秘要》:经闭不行。②《医钞类编》:血闭不行,骨蒸潮热,脉虚者。

【加减】如有汗,加丹皮、淡竹叶;如热甚,加炒黑干姜一钱。

【备考】《医钞类编》有归身、淡竹叶。

29560 加减八珍化毒丹

【方源】《费伯雄医案》。

【组成】大濂珠二钱 真牛黄二钱 真琥珀二钱 大梅片二钱 飞朱砂一钱 真川贝三钱 人中白(研极细末)二钱

【用法】上为末,加白飞面四钱,水糊为丸。

【主治】梅毒,湿火炽盛。

29561 加减人参泻心汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】人参二钱 黄连一钱五分 枳实一钱 干姜一钱五分 生姜二钱 牡蛎二钱

【用法】水五杯,煮取二杯。分二次温服。

【主治】疟伤胃阳,气逆不降,热劫胃液,不饥不饱,不食不便,渴不欲饮,味变酸浊。

29562 加减人参养营汤

【方源】《一盘珠》卷三。

【组成】当归 熟地 白芍 白苓各一钱 人参 甘草各七分 麦冬(去心) 五味九粒 陈皮 半夏 枣仁 志肉(去骨,甘草水炒)各一钱 肉桂 附子 制南星 天麻(煨)各八分

【主治】虚痰、虚火、心虚、眩晕等症。

【备考】方中麦冬用量原缺。

29563 加减人参养营汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】潞参 白术 黄耆各三钱 秦归二钱 熟地三钱 甘草一钱 香附 焦艾各三钱 益母草五钱 阿胶珠二钱

【用法】水煎,温服。

【功用】补气摄血。

【主治】气虚而滞引起月经过多,经色淡红无块,面色淡黄,饮食减少,腰腹胀痛,按之则减,舌淡苔白,脉浮虚。

【加减】气虚下陷,少腹空坠者,加升麻二钱;腰痛甚,加杜仲四钱、续断四钱。

29564 加减人参黄耆汤

【方源】方出《医统》卷八十三,名见《医部全录》卷三九八。

【组成】人参黄耆汤加芍药(醋炒) 牡蛎粉 禹余粮

【主治】①《医统》:妇女赤白带下。②《医部全录》:带下虚滑之证。

29565 加减三花五子丸

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】菊花 蜜蒙花 旋覆花 荆芥 夏枯草 升麻 木贼各七钱 枸杞子 菟丝子(酒煮) 青箱子 归须(酒洗) 黄芩

连翘 白茯苓(去皮) 石斛草 羌活 藁本
黄柏 知母(盐水炒) 防风 白芷各一两
草决明(炒) 石决明(煨) 蔓荆子 地
肤子各八钱 甘草六钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。
每服四十丸，盐汤或酒送下。

【主治】五脏风热上攻，肝虚头痛，眼见飞
花或生翳障。

29566 加减三黄二香散

【方源】《疫喉浅论》。

【组成】锦纹大黄五钱 生蒲黄四钱 川
黄柏三钱(共生研细末) 再入原麝香三分
上梅片三分

【用法】上和匀为末。用茶清调敷；或用白
蜜融化敷之亦可。如红肿热甚，用大青叶汁
或芭蕉根汁调敷均可。

【功用】消散。

【主治】疫喉初起，项外漫肿。

29567 加减三黄石膏汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】黄芩 黄连 黄柏 山梔 石膏
知母 升麻 白芍 玄参 甘草 粳米二撮

【主治】热症发斑紫赤，烦渴，脉洪数者。

【加减】甚者，加犀角；斑毒盛，加大青。

29568 加减大造苦参丸

【方源】《丹溪心法附余》卷四。

【组成】苦参一斤 防风 荆芥 苍耳子
胡麻子(半生熟) 皂角刺各十两 蔓荆子
牛蒡子 黄荆子 枸杞子 何首乌 禹余粮
蛇床子各三两 香白芷一两半

【用法】上为细末，用皂角捣烂，熬膏，入
前药匀为丸，如梧桐子大。每服五十丸，茶、
酒任下。

【主治】大风疮及诸风、赤白癫风。

【备考】《直指附遗》有薄荷、生地各一两。

29569 加减大黄当归散

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】大黄 当归 甘草 人参 白茯
黄耆 麦冬 知母 桔梗 黄芩 连翘

【用法】水煎，食后服。

【主治】小眦赤脉附睛外障。

29570 加减大橘皮煎丸

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】鹿茸(煨去毛，酥炙) 茯神(去
木) 菟丝子(淘净，酒浸，研成饼) 大
附子(炮，去皮脐)各二两 山茱萸(去枝
核) 沉香(不见火) 巴戟(去心) 丁
香(不见火) 人参(去芦) 当归(去芦，
酒浸) 阳起石(别研)半两 橘红三两 川
厚朴一两半(去皮，姜制炙) 干姜(炮，
洗) 肉苁蓉(酒浸，去皴皮) 肉桂(去
粗皮，不见火) 肉豆蔻(面裹煨) 牛膝
(去芦，酒浸) 川杜仲(锉，姜汁浸，炒去
丝) 茴香(淘去沙，炒) 补骨脂各一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐
子大。每服五十丸，食前盐酒、盐汤或米饮
送下。饮食减少，用丁香、附子煎汤送下；胸
膈不快，丁香、茯苓、干姜、白术、甘草煎
汤送下；大便作泻，豆蔻、附子煎汤送下，心
气不足，睡卧不寐；茯苓、附子煎汤送下；受
寒邪，姜附煎汤送下；小便多，茴香、盐附
煎汤送下；虚冷腹疼，茱萸、附子煎汤送下；
大便泻血，缩砂、附子煎汤送下；口吐涎沫，
津液稠粘，痰饮恶心，川乌、附子、南星煎
汤送下。

【功用】固壮脾经，补益下元，健美饮食，
安神定志，兼能升降心肾，既济水火。久服
无病，行履如飞，不僭不躁。

【备考】本方自山茱萸以下至当归六味用
量原缺。

29571 加减千金固胎饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】人参一钱 生于术三钱 云苓二
钱 炙甘草五分 酒炒黄芩一钱 枳壳一钱
五分(炒) 青皮一钱五分 柴胡五分

【用法】用煨姜三钱，大枣三个，荷叶蒂三
个为引，河井水煎。头煎在疟前服，二煎接
服之。

【主治】孕妇人虚，疟疾寒热不止。

【宜忌】愈后饮食宜清淡，调理四五日，庶症不复。

【加减】如恶心，加灶心土五钱、乌梅二个；如腹胀，加砂仁三钱，如热多，加青蒿三钱；如腰痛，加续断三钱；如痰多，加川贝母一钱五分、橘红八分；如大便结，加鲜首乌五钱、当归五钱；如作泻，加鹿角霜三钱；如腹痛，加煨广木香一钱五分；如泻热，加酒炒川连三分；如胎气下坠，加黄耆五钱（炙）、菟丝子二钱；如子气上逆，加砂仁三钱、葡萄干三钱。

29572 加减千金思食丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】乌梅肉 干生姜各一两 小麦麴神曲各二两（并炒） 缩砂仁 甘草（炙） 橘红各半斤

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一二丸，米饮嚼下，不拘时候。

【主治】脾胃病。

29573 加减广茂溃坚汤

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】厚朴四分 黄芩五分 益智 草薢仁 升麻 红花 甘草各二分 当归 黄连各五分 广茂 陈皮 柴胡 泽泻 神曲各三分 白术 茯苓各一钱 半夏七分 吴茱萸一分 青皮三分 姜三片

【主治】中满腹有积块，坚硬如石，坐卧不宁，二便涩赤，上气喘促，通身虚肿。

29574 加减天王补心丹

【方源】《医钞类编》卷八。

【组成】熟地 人参 茯苓 远志 菖蒲 元参 柏子仁 桔梗 天冬 丹参 枣仁 炙草 麦冬 百部 杜仲 茯神 当归 五味各等分

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】心血虚，烦热口干。

29575 加减开郁二陈汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】苍术 香附（童便制） 川芎各一钱 青皮 枳壳（麸炒） 槟榔各七分 木香五分

【用法】生姜为引。

【主治】妇人形肥，痰滞经闭。

29576 加减木香流气饮

【方源】《保命歌括》卷十六。

【组成】木香 青皮（不去瓢） 香附（醋浸） 白芷 甘草（减半） 陈皮 莪术（煨） 三棱（煨） 川楝肉 茴香（炒） 枳实（炒） 山楂肉 半夏 茯苓 苏叶 槟榔 白术 肉桂 木通 厚朴（炒） 川芎 当归 石菖蒲 大腹皮各等分

【用法】上为细末。每服一二钱，食前温酒调服，一日三次。

【主治】气疝不消。

29577 加减牙药麝香散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】绿矾（枯）一两 石胆（炒）二钱 五倍子一两二钱 诃子皮 何首乌 龙骨 藿香叶 甘松各四钱 白茯苓（去皮）一两 缩砂仁八钱 零陵香六钱 百药煎一两二钱 细辛二钱 生干地黄 青黛（研） 龙脑（研） 麝香（研）各半两

【用法】上为细末，入研药和匀。每日早晨用牙刷蘸药少许，刷牙齿上，合口少时后，用温水漱口吐之。

【主治】肾气虚弱，牙齿病而不坚固者。

29578 加减太乙金锁丹

【方源】《普济方》卷二二二引《瑞竹堂方》。

【组成】莲花蕊四两（未开者，阴干，秤） 五色龙骨五两（细研） 覆盆子五两 鼓子花三两（五月五日采） 鸡头子一百颗（生，取肉作饼子，晒干）

【用法】上为细末，取金樱子二百枚，去毛，木臼内捣烂，水七升，煎取浓汁一升，去渣和药，再入臼内，杵一千杵，为丸如梧桐子大。每服三十丸，空心盐酒送下。

【功用】秘精，益髓。

【主治】梦遗不禁，小便白浊，日渐羸瘦。

【宜忌】忌葵菜。

29579 加减止痒全虫方

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】全虫（打）二钱 皂刺四钱 猪牙皂角二钱 刺蒺藜五钱 炒槐花五钱 炒枳壳三钱 苦参二钱 荆芥二钱 蝉蜕二钱 威灵仙四钱 白鲜皮一两 紫草根三钱

【功用】除湿解毒，熄风止痒。

【主治】风湿内侵结为湿毒，皮肤痒疹。

29580 加减仓公下气汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】白芍 陈皮 茯苓 大腹皮 川芎 当归 香附 紫苏梗 前胡 厚朴 乌药 木香

【用法】上锉一剂。水煎，空心服。

【主治】妊娠心腹胀满者。

29581 加减牛黄清心丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十二。

【组成】人参 茯神 麦冬 山药 胆星 白术 雄黄 甘草 犀角 朱砂 牛黄 冰片 麝香 金箔 羚羊角

【用法】枣肉加炼蜜为丸服。

【主治】中风。由于痰气逆冲，心主被障，神气昏瞢，不知人事，属中脏闭症者。

【备考】本方原名“加减牛黄清肺心汤”与剂型及治证不符，据《中国医学大辞典》改。

29582 加减升麻葛根汤

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】桔梗 干葛 升麻 川芎 赤芍 归尾 羌活 柴胡 甘草各等分

【用法】井水煎服。

【主治】小儿惊丹，先搐而后发丹瘤者。

29583 加减升麻葛根汤

《医钞类编》卷十九。即《金鉴》卷五十八“加味升麻葛根汤”。见该条。

29584 加减升麻葛根汤

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】川升麻五分 生甘草五分 连翘壳二钱 炙僵蚕三钱 粉葛根一钱半 苦桔梗一钱 金银花三钱 干荷叶一角 薄荷叶八分 京赤芍二钱 净蝉衣八分 陈莱菔三钱

【主治】痧麻虽布，而头面鼻独无，身热泄泻，咽痛不腐之症。

29585 加减升麻葛根汤

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】升麻 10 克 葛根 30 克 杭芍 10 克 荆芥 10 克 防风 10 克 甘草 6 克 浮萍 15 克

【功用】解表透疹，清阳明里热。

【主治】阳明风热证，怕冷，口干，大便溏稀，全身有瘙痒性风团，丘疹，水疱皮损，脉滑，少力，舌薄黄白苔。

【方论选录】升麻解表透疹，解毒清热；葛根清阳明之热，透肌表之邪；杭芍酸敛肝气，养阴清热；荆、防辛温解表透疹；浮萍辛凉解表透疹；甘草和胃以助胃气，调和营卫。故该方是表里和解之剂。

29586 加减升麻解毒汤

【方源】《痘疹一贯》卷二。

【组成】升麻 干葛 羌活 人参 柴胡 前胡 甘草 桔梗 防风 荆芥 牛子 赤芍 连翘 木通

【用法】水煎服。

【主治】麻疹初热，时暖时寒。

【加减】如口渴，加麦冬、花粉、干葛（多加）；腹痛，加枳实、木通、山楂；腰膝脚痛，加苍术、黄柏、羌活、独活、木通；头痛，加藁本、白芷；呕吐，加白术、二陈汤；惊搐，加木通、薄荷、灯心、竹沥；发狂乱语，加梔子、辰砂、菖蒲、木通；泄泻，加白术、茯苓、诃子、肉蔻；肢冷，加人参、黄芪、干姜、肉桂；衄血，加茅根、黄芩、梔子、元参；咽痛，加甘草、桔梗、牛子、射干；咳嗽，加苏叶、陈皮、前胡、枳实；大便闭，加归尾、大黄、紫草、红花；叫哭，加梔仁、黄

连、木通、麦冬；吐舌弄舌，加黄连、梔子、防风。

29587 加减乌药顺气丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十三。

【组成】乌药 麻黄 陈皮各二钱 僵蚕五分 川芎 枳壳 白芷 甘草 桔梗各五钱 生姜 大枣

【主治】诸痹风盛者。

29588 加减乌药顺气饮

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷八。

【组成】乌药 防风 枳壳 陈皮 僵蚕 白芷 麻黄(去节) 羌活 半夏 白姜(炮) 甘草 南星

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】中风，风痰壅盛。

29589 加减丹栀逍遥散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】白芍三钱 柴胡二钱 茯苓 白术各三钱 丹皮二钱 山栀三钱 甘草一钱 焦艾三钱 益母草四钱

【用法】水煎服。

【功用】行气解郁。

【主治】崩漏由于肝气郁结，暴崩下血，或淋漓不止，色紫兼有血块，少腹胀痛，兼见精神抑郁，胸胁胀满，脉弦数。

【加减】血色深红，量多如泉涌者，加泡参、乌贼骨各一两；出血有热感心烦躁者，加生地五钱。

29590 加减丹溪安胎饮

【方源】《增订胎产心法》卷二。

【组成】白术(土炒) 当归 熟地各二钱 川芎 条芩各八分 制半夏七分 人参一钱 藿香五分 草果 青皮各三分 紫苏 广皮 炙草各四分 乌梅二枚

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】孕妇疟疾。

29591 加减六味地黄丸

【方源】《病科全书》。

【组成】茯苓一两五钱 熟地四两 泽泻八钱 炙甘草五钱 枸杞一两五钱(盐水

炒) 萸肉一两五钱 青皮五钱(盐水炒) 半夏八钱 粉丹皮八钱 煅龙骨一两 煅牡蛎一两 杜仲一两(炒黑) 白芥子一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，切勿火焙。每服三钱，早、晚饭后淡盐汤送下。加减作汤剂亦可。

【功用】温补肝肾固脾。

【主治】寒痰凝结所致的阴火病，颈际夹起，大如卵形，坚硬异常，或一边，或两边，或带小核数粒，体质羸弱或后天亏损者。

【加减】若唇舌常白，面色萎黄，脉沉迟无力，须兼用附、桂。

29592 加减六味地黄丸

【方源】《医学碎金录》引《家庭常识》第七集。

【组成】熟地六两 山药四两 茯苓 丹皮各二两 莲须一两 龙骨三两(生研，水飞) 芡实二两 萸肉 鱼鳔胶(蛤粉炒成珠)各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸。早、晚各服三钱。

【主治】遗精，体虚不甚者。

【方论选录】此方系六味地黄丸去泽泻，加龙骨、芡实、莲须、鱼鳔胶组成。方中熟地、萸肉、山药、鱼鳔、芡实为强壮药；龙骨、茯苓、丹皮为镇静药；莲须、芡实、龙骨为制泌药，合而为强壮镇静制泌之复方。

29593 加减六味地黄丸

【方源】方出《朱仁康临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】生地 15 克 丹皮 9 克 茯苓 9 克 泽泻 9 克 山药 9 克 当归 9 克 丹参 9 克 茜草 9 克 红花 9 克 生甘草 6 克

【功用】滋阴清热，活血软坚。

【主治】面部播散性粟粒性狼疮。

29594 加减平疔养脾丸

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】黄耆(炙) 人参各一钱 白术 当归 白茯苓 半夏曲 黄芩 陈皮 常山

鳖甲(九肋者,醋炙) 使君子肉各一分 柴胡 草果仁 厚朴(姜汁炒) 神曲(炒)各七分 肉桂五分 青皮六分 炙甘草五分

【用法】上为细末,神曲糊丸。陈米汤送下。

【功用】补脾平肝。

【主治】久疟发搐,病在肝脾者。

29595 加减古方五汁饮

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】蜜柑二个(去皮子) 鲜藕四两(去皮节) 荸荠二十个(去皮) 青果二十个(去核) 生姜一薄片(去皮)

【用法】共捣如泥,用布挤汁,随时饮之。

【主治】咽肿目赤,烦渴咳嗽,纳呆欲呕。

29596 加减甘露消毒丹

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】茵陈 山栀 黄芩 石菖蒲 藿香 白蔻 薄荷 滑石 木通 枳壳

【用法】水煎服。

【主治】湿热发黄,身热倦怠,胸闷懒食,小便短黄。

【方论选录】本方乃叶氏甘露消毒丹增减,为燥湿清热消黄之剂。用茵陈、山栀、黄芩之清热消黄;菖蒲、藿香、白蔻、薄荷之芳香化浊醒脾;滑石、木通清利小便;枳壳宽中和胃。故于湿热发黄有清利消黄之功;用治传染性肝炎黄疸期,有消炎健胃利胆之作用。

29597 加减龙胆泻肝汤

【方源】《外科发挥》卷七。

【异名】加味龙胆汤(《外科枢要》卷四)、龙胆泻肝汤(《校注妇人良方》卷二十四)。

【组成】龙胆草(酒拌炒黄) 泽泻各一钱 车前子(炒) 木通 生地黄(酒拌) 当归尾(酒拌) 山栀(炒) 黄芩 甘草各五分

【用法】上作一剂。水二钟,煎八分,食前服。

【主治】肝经湿热,阴部生疮,阴囊肿痛,小便赤涩,便毒悬痈,妇人阴挺。

①《外科发挥》:肝经湿热,玉茎患疮,或便毒悬痈肿痛,小便赤涩,或溃烂不愈;又治阴囊肿痛,或溃烂作痛,小便涩滞,或辜丸悬挂。②《校注妇人良方》:肝经湿热,两拗肿痛,或小便涩滞。③《女科撮要》:肝经湿热,下部肿焮作痛,小便涩滞,阴挺如菌,或出物如虫。④《医统》:气郁热痰气,及腋下多汗。

【方论选录】《济阴纲目》:泻肝而兼导赤,泻其子也;泻肝而用利水,肝主疏泄也。龙胆、山栀,假以降火;当归、生地,以滋肝阴;生甘草缓肝之急;炒黄芩助肝之气。

【备考】本方方名,《景岳全书》引作“加味龙胆泻肝汤”。

29598 加减龙胆泻肝汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】胆草 黄芩 栀子各二钱 白芍三钱 红泽兰五钱 丹皮 鳖甲各三钱 牛膝二钱 茅根五钱

【用法】水煎服。

【功用】清肝泻火。

【主治】因肝热所致倒经。经期提前量少,甚或停闭不行,经前或经期常吐血,头晕耳鸣,时发潮热,心烦口燥,唇红苔黄,脉弦数。

【加减】有潮热,加青蒿三钱。

29599 加减龙胆泻肝汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】龙胆草二钱 黄芩 栀子各一钱半 泽泻一钱 木通二钱 车前仁一钱半 当归一钱

【用法】水煎,食前服。

【功用】清肝泻火渗湿。

【主治】肝郁气滞兼有湿热,以致妊娠腹痛,头目昏眩,胁痛耳聋(或耳鸣),口苦咽干,心烦易怒,少腹作痛有热感,小便短黄,阴道流浊带,并感疼痛者。

29600 加减龙胆泻肝汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】龙胆草三钱 青连翘五钱 干生地五钱 车前子四钱 淡黄芩三钱 生栀子三钱 粉丹皮三钱 泽泻二钱 苦木通三钱 生甘草三钱

【功用】泄肝胆火，清利湿热。

【主治】急性湿疹，带状疱疹（缠腰火丹），亚急性湿疹，传染性湿疹样皮炎，接触性皮炎，脂溢性皮炎等。

【加减】若热盛，伴有高烧者，加生玳瑁二至四钱，或加羚羊、犀角一至二分，或用生石膏二至三两煎水煮药；皮肤潮红明显者，加大黄一至三钱；痒明显者，加白鲜皮一两；若内有湿滞、食滞者，加枳壳二钱。

【方论选录】方中胆草、黄芩泻肝胆火；连翘、栀子清热解毒；生地、丹皮凉血解毒；泽泻、木通、车前子、生甘草清热通利除湿。

29601 加减归芍地黄汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地五钱 萸肉三钱 山药三钱（炒）茯苓一钱半 当归三钱 丹皮一钱半 白芍一钱半（炒） 麦冬三钱（去心） 五味一钱半

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】交接出血，脉虚数者。

【方论选录】阴虚阳浮，经气不固，而经血易动，故交接出血。生地滋阴壮水，萸肉秘气涩精，山药补脾阴，茯苓和脾气，当归养血以资血室，白芍敛阴以固冲任，丹皮平相火以凉血，麦冬润心肺以交肾，五味敛津液以固经脉也。水煎温服，使阴平阳秘，则经气完固，而经血无妄泄之患，何致交接出血而成阴蚀哉。

29602 加减四味升麻汤

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】升麻 葛根 芍药 甘草 防风 桔梗 紫苏 苍术 陈皮 枳壳 柴胡

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】水痘赤痘。

【宜忌】一二服即止，多则过表。

【加减】疹热不退，加黄芩；呕吐，加藿香；泻甚者，去苍术、枳壳，加诃子、肉果；咳嗽有痰，加半夏、桑皮、杏仁、五味；泻痢后内虚，加茯苓、白术；腹痛，加苍术；鼻衄，加茅花、生地；占语，加黄芩。

29603 加减四物天香汤

【方源】《广嗣纪要》卷八。

【组成】当归 川芎 香附 陈皮 苏叶

【主治】因喜怒忧思，恐惧失节，触动胎气不安。

【加减】因于怒者，加黄芩、甘草、人参；因于忧者，加枳壳、大腹皮；因于喜者，加黄芩、黄连、麦门冬；因于恐者，加茯神、益智。

29604 加减生熟二地汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】生地 熟地各一两 白芍 麦冬各五钱 山萸三钱 北五味一钱 炒栀子二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝血不足，肝气抑郁而不舒，遂致易怒，两胁满闷，头痛而热，胸膈胀痛。

29605 加减半夏茯苓汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】法夏二钱 云苓三钱 广皮二钱 砂仁五分 朴花二钱 木香一钱半 炒藜艾二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】顺气降逆。

【主治】妊娠胎气上逆，遂致恶阻，呕吐清水或酸水，头胀眩晕，心胸愤闷，起坐不安，时暖气，饮食不进，怠惰踟卧，口淡，舌苔白腻，脉濡或缓。

29606 加减芎芷香苏散

【方源】《普济方》卷二四二引《经验良方》。

【组成】川芎 甘草 香附子 白芷 缩砂仁 陈皮 紫苏叶 藁薤 川独活 荆芥穗 干木瓜 槟榔各等分

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盞半，加生姜三片，大枣二枚并煎，一日服三四次。

【功用】发散。

【主治】初患脚气，其病有筋一条自脚胫骨至臀及腰，因感受风湿所致。

29607 加减托里消毒散

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】托里消毒散去白芷、连翘、金银花，加人参、白术、藿香。

【主治】疮疡。胃气虚弱，欲呕作呕，或外搽内服寒凉，或痛甚，或感受寒邪、秽气而呕者。

29608 加减托里消毒散

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】托里消毒散去白芷、连翘、银花，加炮姜、木香。

【主治】疮疡。由于脾气虚寒，饮食少思，肠鸣腹痛，腹冷泄泻。

【加减】手足逆冷，加附子煎送四神丸。

29609 加减托里消毒散

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】托里消毒散去白芷、连翘、银花，加肉桂、附子。

【用法】佐以八味丸。

【主治】疮疡，肾气虚寒，四肢逆冷。

29610 加减当归六黄汤

【方源】《济阴纲目》卷九。

【组成】当归身 黄耆(炙) 生地黄 黄芩 白芷 阿胶珠 炙甘草各等分

【用法】上用浮小麦一撮，煎汤去麦，下药五钱，煎至七分，温服。

【主治】妊娠伤寒发汗后，汗漏不止，胎气受损者。

29611 加减当归六黄汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五两 黄耆三钱(蜜炙) 白芍半钱(炒) 白芷三钱(盐水炒黑) 炙甘草一钱半(黑) 当归三钱 阿胶三钱(麸炒) 黄芩一钱半，浮麦三钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】孕妇伤寒发汗后，汗漏脉浮数者。

【方论选录】妊娠伤寒发汗后，余热内陷，卫气无所止息，以热主疏泄，故漏汗不止，胎孕不安焉。生地滋阴壮水以安胎，黄耆补气实卫以固表，当归养血以荣心，白芍敛阴以收汗，阿胶补阴以滋冲任，黄芩清热以安胎元，白芷行气于元府，炒黑亦能祛湿除汗，甘草调气于脾胃，炙灰亦令燥湿缓中，更以浮麦凉心以止漏汗也。水煎温服，使气阴内充，则余热退藏，而营卫调和，汗漏自止，胎孕无不自安矣。

29612 加减当归龙荟丸

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】归身 人参 炙甘草 柴胡 川芎各一钱 青皮 芦荟 木香各七分 胆草(酒洗) 梔仁各五分 半夏(大者)三个(一本有黄芩、陈皮)

【用法】上为末，神曲糊丸，如黍米大。每服二十五丸，寅、卯时竹叶汤送下。

【功用】平疳止搐。

【主治】小儿疳疾发搐，随又成疳，汗出便泄，心下跳，腹中鸣，面色皤白，凶陷发疏，体渐羸瘦者。

29613 加减当归龙荟丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】当归 川芎 龙胆草 龙荟 黄耆 黄连 半夏曲 青皮 柴胡 人参 白茯苓 木香 甘草(炙) 梔子仁各等分

【用法】上为细末，神曲作糊为丸。竹叶汤送下。

【主治】疳热发搐，及惊疳。

29614 加减当归龙荟丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】当归(酒洗，晒干)一钱 人参 川芎各一钱 胆草(酒浸) 山梔仁各五分 青皮 芦荟各七分 甘草 柴胡各一钱 半夏(大者)三个(泡七次，切，生姜自然汁浸一时，又以白矾水洗之)

【用法】上为末，水煮神曲糊丸，如粟米大。

每服二十五丸，寅、卯时淡竹叶汤送下。

【功用】平肝补脾。

【主治】小儿暑症惊痫。

29615 加减当归龙荟丸

【方源】《济阳纲目》卷一〇三。

【组成】当归（酒洗） 龙胆草（酒洗）
栀子仁（炒） 黄芩 青皮各一两 大黄
（酒蒸） 芦荟 柴胡各五钱 木香二钱半
牛胆南星三钱 麝香五分

【用法】上为细末，神曲煮糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，生姜汤送下，一日三次。一七后用针砂酒以通其气。方用针砂一两，穿山甲一钱拌针砂，养一昼夜，去山甲，将针砂用酒一碗浸三四日，含酒口内，外用磁石一块，绵裹塞耳中即通。

【功用】聪耳泻火。

【主治】耳病。

【宜忌】戒暴怒、色欲。

29616 加减当归地榆散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《施圆端效方》。

【组成】御米壳（蜜炒）二两 当归（焙）一两 地榆 黄连（拣净） 芍药 甘草（炒）各半两

【用法】上咬咀。每服三钱，水一盞半，煎至七分，去滓，食前温服，一日二次。

【主治】冷热不调，气毒恶毒，湿热肠垢，毒痢休息，膏痢腥秽，干呕不食，肌热，小便涩。

【加减】气毒痢，加黄连、当归一倍。

29617 加减当归补血汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】当归一两（酒洗） 黄耆一两（生用） 三七根末三钱 桑叶十四片

【用法】水煎服。

【主治】年老血崩。

【宜忌】宜断色欲。

【加减】孀妇年老血崩，系气冲血室，加杭芍炭三钱、贯众炭三钱。

【方论选录】补血汤乃气血两补之神剂，三七根为止血之圣药，加桑叶，既可滋肾之阴，又有收敛之妙。

【备考】老妇阴精既亏，用此方以止暂时之漏，实有奇功，而不可责其永远之续者，以补精之味尚少也。服此四剂后，再增入白术五钱、熟地一两、山药四钱、麦冬三钱、北五味一钱，服百剂，则崩漏之根可除。

29618 加减当归菊连汤

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归 白芷 赤茯苓 黄芩 赤芍 知母 桑螵蛸 生地黄 木通 连翘 麦门冬 菊花 防风 川芎 石膏 覆盆子 茺蔚 甘草

【用法】水煎，食后服。

【主治】眼膜下垂。

29619 加减回阳救急汤

【方源】《寿世新编》卷下。

【组成】北丽参五钱 漂于术（土炒黄，勿焦）五钱 葫芦巴（炒、研）二钱 淡苁蓉（漂净，晒干）五钱，北枣杞三钱（盐水炒）破故纸二钱（盐水炒） 黑熟附片五钱 上安桂（去粗皮）八分或一钱 淡吴萸一钱 抱茯神三钱 炮干姜八分 炙甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】一切阴寒危症。

【宜忌】若非手足厥逆，冷汗腹痛者，未可乱投。

29620 加减竹叶石膏汤

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】青竹叶三十张 桑叶皮各一钱五分 金银花三钱 鲜苇茎（去节）一两 熟石膏三钱 光杏仁三钱 连翘壳三钱 白菜蕻一两 生甘草六分 象贝母三钱 冬瓜子四钱

【主治】痧麻之后，有汗身热不退，口干欲饮，或咽痛蒂坠，咳嗽痰多等。

29621 加减导赤泻白散

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】生地 9 克 木通 瞿麦各 6 克
桑皮 9 克 桔梗 6 克 酒黄芩 赤芍各 9 克
归尾 6 克 蝉蜕 3 克

【主治】心肺火盛，脔肉攀睛。脔肉肥厚，色赤，头嫩白而尖厚，壅塞刺痛，结眵粘稠者。

【加减】若脔肉黄厚者，加薏苡仁 9 克以除脾经湿热；若脔肉赤紫者，加郁金 6 克以解心中郁火。

【方论选录】方中生地、木通、瞿麦清心泻火，木通且能导湿热下行兼通血脉，瞿麦又能利小肠，导湿热更兼破瘀退翳；桑皮泻肺利水，能除白睛之赤肿；桔梗宣肺散结，能祛肺中之滞气；酒黄芩除上、中二焦之湿热；赤芍活血凉血以退赤；归尾活血通络以引血下行；蝉蜕轻浮宣散以退翳。

29622 加减防风通圣散

《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。为原书同卷“冲和汤”之异名。见该条。

29623 加减防风通圣散

【方源】《丹溪心法附余》卷一。

【组成】防风 川芎 当归 芍药 薄荷 麻黄 连翘各半两 黄芩 桔梗各二两 甘草二两 荆芥 白术各二钱半 乌药 羌活 天麻 僵蚕

【用法】每服六钱，水一盞半，加生姜三片，水煎服。

【功用】预防风疾。

【加减】体虚气弱者，加木香；痰涎壅盛者，加南星、半夏、枳实。

【备考】方中乌药以下四味用量原缺。

29624 加减丽泽通气汤

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】辛夷 羌活 独活 升麻 防风 麻黄 葛根 炙草 木通 苍耳子 荆芥 细辛 川芎

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】外感风寒，鼻不闻香臭，涕出不通。

29625 加减苏子降气汤

【方源】《医方类聚》卷九十八引《经验秘方》。

【组成】前胡（去芦，洗净）二两 厚朴（去皮，姜制）二两 甘草二两（炙） 当归（去芦，洗净）二两 肉桂（去粗皮）三两 陈皮（去白）三两 半夏（汤泡七次）五两 真苏子五两（生用） 苍术（泔浸，去皮）三两 木香一两半 木瓜（去瓢子）三两 川楝子二两（皮） 茴香（炒，去沙净）二两 破故纸一两半

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜五片，大枣一枚，煎至七分，空心服。加沉香一两半尤妙。

【主治】脚气。

29626 加减苏子降气汤

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】真苏子 半夏曲 炙甘草 前胡 陈皮 厚朴（姜汁炒） 肉桂（去皮） 大腹皮 桑白皮各等分

【用法】水煎服。

【主治】咳嗽气盛，兼治面部浮肿。

29627 加减苏子杏仁汤

【方源】《金鉴》卷八十八。

【组成】苏子三钱 苏木（末）一钱 红花一钱 桃仁（炒） 麦冬 橘红各三钱 赤芍 竹茹 当归（酒洗）各二钱

【用法】水三钟，煎一钟，滓二钟，煎八分。温服。

【主治】瘀血内聚，心经瘀热，大肠干燥者。

29628 加减扶元和中膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参一两五钱 于术一两（土炒） 茯苓一两（研） 砂仁四钱 归身一两（土炒） 续断一两（酒炒） 香附六钱（炙） 生香一两 谷芽一两（炒） 鸡内金一两（焙） 半夏八钱（姜炙） 佩兰草四钱 生姜八钱 大熟地六钱（炒） 红枣肉二十枚

【用法】共以水熬透，去滓，再熬浓，兑冰糖为膏。每服三钱，白水冲服。

【功用】补脾肾。

【主治】久病脾虚，胸闷干哕，倒饱嘈杂，食少不消，并有肾虚者。

29629 加减扶元益阴膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参二两 于术一两(炒) 茯苓一两(研) 山药一两 归身一两(土炒) 女贞子一两 白芍八钱(醋炒) 丹皮六钱 砂仁四钱(研) 鹿角胶五钱(溶化) 香附六钱(炙研) 银柴三钱

【用法】上以水熬透，去滓，再熬浓，加鹿角胶溶化，兑炼蜜为膏。每服四钱，白水冲服。

【功用】健脾益肾。

29630 加减辛芎导痰汤

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】辛芎导痰汤去细辛、川芎，加天麻、钩藤、蔓荆。

【用法】水煎服。

【主治】风痰，头目眩晕。

29631 加减羌活五积散

【方源】《会约》卷三。

【组成】当归一钱半 白芍一钱 陈皮八分 半夏一钱半 茯苓一钱三分 甘草一钱 桔梗 枳壳 川芎 白芷 防风各一钱 羌活八分 桂枝一钱 紫苏叶五分 北细辛三分

【用法】加生姜三片，葱白五寸，水煎，热服。取微汗。

【主治】四时感冒，发热恶寒，头痛身疼，咳嗽声重，脉浮紧，无汗者。

【加减】冬春寒甚，加麻黄五六分；夏秋，加苍术一钱半。

29632 加减羌活胜湿汤

【方源】《医学六要》卷五。

【组成】二术 二活 二防 木通 木瓜 南星 半夏 泽泻

【主治】体厚湿郁，自觉遍身沉重，难于转侧，两膝时肿痛，不红不硬，六脉濡弱，天

阴更甚者。

29633 加减羌活桂枝汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】羌活八分 桂枝一钱五分 紫苏一钱五分 厚朴一钱五分 柴胡八分 草薢仁一钱(研) 青皮一钱五分 甘草五分

【用法】煨姜二钱，大枣五个为引。

【主治】寒症。因暑月贪凉洗浴，感寒而得，阴邪所伏，无汗恶寒，周身身痛，面惨色寒，先寒后热者。

【加减】如周身痛，加独活一钱五分；如恶心，加广藿香三钱；如腹胀饱闷，加槟榔一钱五分、炒枳壳一钱五分。

29634 加减补天大造丸

【方源】《医学碎金录》。

【组成】鹿茸一两半 枸杞子四两 潞党参二两 紫河车一个(甘草水洗，焙) 远志一两 炒枣仁二两 茯神三两(人乳蒸) 熟地六两 萸肉 山药 杜仲各三两 五味子一两 龙骨二两

【用法】上药各为末，以龟版胶二两，化水为丸。每服二钱，一日三次。

【功用】滋补强壮。

【主治】五脏虚损，阳萎，滑精。

29635 加减补中和疟疾

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】人参一钱 甜于术五钱 黄耆三钱(蜜炙) 当归三钱 炙甘草五分 柴胡八分(炒) 青皮一钱五分 草薢仁一钱(研) 干姜一钱(蜜炙) 益母草三钱

【用法】加大枣三枚，河、井水各半煎，露一宿，疟前二时温服，二煎接服更妙。

【主治】产后疟证，寒多热少。

【加减】如热多，加青蒿三钱；如恶心，加灶心土五钱；如腹痛作泻，加煨广木香一钱五分、酒炒元胡索二钱；如胸口不宽，加炒枳壳一钱五分。

29636 加减补中益气汤

【方源】《程松崖眼科》。

【组成】黄芩二钱 柴胡三分 陈皮八分 茯苓二钱 升麻三分 枸杞一钱 川芎八分 炙甘草五分 白术一钱 归身一钱

【主治】气虚，眼胞下坠，视物不明，目无红肿疼痛者。

29637 加减补中益气汤

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】黄耆(炙) 人参 白术(炒) 陈皮 枳实 青皮 木香 麦芽(炒) 神曲(炒) 黄连(炒) 甘草

【用法】水煎服。

【主治】伤食而热。

29638 加减补中益气汤

【方源】《万氏女科》卷一。

【组成】人参 白术各二钱 黄耆(炙) 柴胡各七分 炙草五分 归身 白芍 川芎 陈皮各一钱 神曲(炒) 麦芽(炒) 各五分

【用法】生姜、大枣为引。更宜服前参术大补丸、乌鸡丸。以经行为度。

【主治】固脾胃损伤，血枯经闭不行者。

29639 加减补中益气汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】人参一钱半(去芦) 黄耆一钱半(蜜炙) 白术一钱 当归一钱(酒洗) 甘草(炙)七分 陈皮八分 升麻五分 柴胡五分 加半夏一钱二分 黄柏八分 茯神 枣仁 贝母 甘枸杞各一钱二分

【用法】加生姜三片，大枣一枚，水二钟，煎八分，食远服。或加黄柏五分。如身大热，只一服，气和微汗而愈。

【主治】饮食劳力，读书刻苦，勤政伤神，饥饱失时，症类疟疾，发热头疼恶寒，身强体痛，苦劳极复感风寒，则头疼如破，全似外感伤寒之症，误伤正者。

【加减】夏月神短，加麦门冬、五味子；口干，加葛根；身刺痛乃少血，加当归；头痛，加川芎、蔓荆子，头顶痛，加藁本、细辛，诸头痛并用此四味；有痰加半夏、生姜；咳嗽，

春加川芎、佛耳草，夏加黄芩、麦门冬、五味子，秋加黄芩、麻黄、金佛草，冬加款冬花、马兜铃；久嗽，乃肺中伏火，去参、耆；饮食不下，乃胃中有寒，或气滞，春加青皮、陈皮、木香，冬加益智仁、草豆蔻仁，夏加芩、连，秋加槟榔、砂仁；心下痞，加枳实、黄连、白芍药；腹胀，加枳实、木香、砂仁、厚朴，天寒，加姜、桂；腹痛，加白芍药、炙甘草，有寒，加桂心，夏月加黄芩、甘草、芍药，冬加半夏、益智仁、草豆蔻；胁痛，加砂仁、柴胡、甘草、白芍药；如脐下痛，加熟地黄，不止乃是寒，加官桂；脚软，加黄柏、防己。

29640 加减补中益气汤

【方源】《保命歌括》卷五。

【组成】白术一钱 黄耆 人参各五分 甘草 白芍 黄连 桑白皮各二分

【主治】四肢发热烦躁，口苦咽干，喘嗽有痰。

【加减】痰喘，去参，加半夏、生姜。

29641 加减补中益气汤

【方源】《保命歌括》卷二十二。

【组成】白术 白芍各一钱 黄耆 人参各五分 当归七分 栗壳(醋炒) 甘草(炙) 木香 白豆蔻 升麻各三分 陈皮一钱 地榆 缩砂 泽泻各五分

【用法】上咬咀。水一盏半，煎一盏，去滓温服。

【主治】下痢已久，不能起床，不食，瘦弱之甚者。

29642 加减补中益气汤

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】补中益气汤加木香 大附子 麦门冬 防风 羌活 乌药

【主治】气虚手足麻木。

29643 加减补中益气汤

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】黄耆二钱(炒) 人参四钱 白术三钱(土炒) 当归一钱 白芍一钱(酒

炒) 陈皮七分 柴胡五分 升麻三分 黄芩(酒炒)三分 黄连(姜炒)五分 木香三分 砂仁四分 茯苓五分 甘草五分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,大枣一枚,水二钟,煎至一钟,温服。人参四钱,服三剂后,每剂只用三钱,又服五剂后,只用二钱;黄耆服至三十剂后,浑身不痒去之;升麻服至二十剂后去之。

【功用】补元气,健脾胃、养心血,平肝火,清湿热,消膨胀。

29644 加减补中益气汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】补中益气汤加柴胡八分 升麻一钱(蜜炒) 白芍二钱(酒炒) 桂枝八分 酸枣仁二钱(炒) 熟附 麻黄根各八分 浮小麦三钱 倍加黄耆

【主治】伤寒误投攻击发表之药过多,发得表虚,上气喘急,口干不食,肢体昏沉,冷汗大出,以致亡阳。

29645 加减补中益气汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】补中益气汤去柴胡,加白芍(炒)、泽泻、木香、砂仁、白豆蔻、地榆、御米壳(醋炒)三分。

【主治】下痢赤白,脓血相杂,腹痛里急后重,昼夜无度,日久不愈,不能起床,不思饮食,疲劳之甚,或服寒凉峻利太过者。

29646 加减补中益气汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】黄耆(蜜水炒)一钱半 人参一钱 白术(去芦,炒)一钱半 白茯苓(去皮)一钱 陈皮七分 柴胡五分 当归(酒炒)一钱 半夏(泡,姜汁炒)七分 山楂肉五分 枳实(麸炒)五分 厚朴(姜汁炒)七分 甘草(炙)四分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,大枣一枚,水煎,温服。

【主治】癥瘕积聚,诸医攻击太过,以致面黄肌瘦,四肢困倦,不思饮食。

29647 加减补中益气汤

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】黄耆(蜜炒)一钱 人参一钱 白术(去油芦,炒)一钱五分 当归(酒洗)一钱 白茯苓(去皮)一钱 陈皮六分 白芍(酒炒)一钱 莲肉一钱 怀山药一钱 甘草(炙)三分半

【用法】上锉。加生姜、大枣,水煎服。

【主治】虚劳发热,口干咳嗽,吐痰喘急,自汗,四肢困倦无力,不思饮食,大便泄泻,肚腹膨胀而肿,六脉浮数无力。

【加减】痰盛,加姜制半夏;嗽甚,加五味子;口渴,加麦门冬,腹胀,加厚朴(姜炒);胸痞,加枳实(麸炒);泄泻,加炒黑干姜,呕吐,加姜炒半夏;肿满,加猪苓、泽泻、木通;憎寒发热,加柴胡;元气下陷,加升麻;元气虚惫,加熟附子、肉桂。

29648 加减补中益气汤

【方源】《济阳纲目》卷三。

【组成】黄耆 人参 白术 甘草(炙) 陈皮 当归 芍药 黄柏 麦门冬(去心) 五味子

【用法】上锉。水煎,空心温服。

【主治】注夏属阴虚,元气不足,夏初春末头痛脚软,饮食少,体热者。

【加减】挟痰,加半夏、姜汁。

29649 加减补中益气汤

【方源】《济阳纲目》卷三十七。

【组成】黄耆 人参 甘草 陈皮 当归 白术 升麻 柴胡 黄连 枳实 芍药

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】内伤劳疫,浊气上泛,清气下陷,虚痞者。

【加减】如便秘,加大黄;呕吐,加黄连、生姜、陈皮,冬月加黄连、丁香。

29650 加减补中益气汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】人参 黄耆 当归 生地 川芎 柴胡 陈皮 甘草 细辛 羌活 防风 白

术

【用法】加生姜、大枣、葱，水煎，温服。

【主治】劳力伤寒，头痛发热恶寒，但微渴自汗，身腿痿软无力，此内伤气血，外感风寒故也。

【加减】如元气不足，加升麻少许；咳嗽，加杏仁；汗不止，去细辛，加芍药；胸中烦热，加山梔、竹茹；干呕，加姜汁炒半夏；胸中饱闷，去生地、甘草、黄耆、白术，加枳壳、桔梗；痰盛，去防风、细辛、加瓜蒌仁、贝母；腹痛，去耆、术，加芍药、干姜。

29651 加减补中益气汤

【方源】《易氏医案》。

【组成】人参一钱 黄耆八分 归身八分 陈皮六分 白术八分 甘草五分 泽泻六分 黄柏五分 牡丹皮六分

【用法】水煎服。

【主治】潮热病。每日申酉二时身发寒热，初以微寒，即作大热而躁，躁甚如狂，过此二时，平复无恙，惟小便赤黄而涩。往时一有心事，夜即梦遗，左尺脉浮中沉取之皆洪数有力，余部皆平。

29652 加减补中益气汤

【方源】《医林绳墨大全》卷四。

【组成】人参二钱 黄耆（蜜炙） 当归身 麦冬各一钱五分 陈皮（去白） 炙甘草 柴胡各五分 白术（去芦，去皮）六分 北五味子（大颗者，研碎）九粒

【用法】加生姜一片，好胶枣一枚，洗净同煎。

【主治】内伤挟外感，发汗后体虚甚者。

29653 加减补中益气汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参五钱 黄耆三钱（生用） 柴胡一钱 甘草一分 当归三钱（酒洗） 白术五钱（土炒） 茯苓一两 升麻三分 陈皮三分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠五月，脾肺气虚，肢体倦怠，

饮食无味，先两足肿，渐至头面遍身俱肿。

【方论选录】补中益气汤原为升提脾肺之气，血非气不生，补气即所以生血。今湿气乘脾肺之虚而相犯，未便大补其血，恐阴太盛而招阴也。只补气而助以利湿之品，则气升而水尤易散，血亦随之而生矣。重用茯苓一两为君，于补气之中，虽曰渗湿，而仍是健脾清肺之意。且凡利水之品，多是耗气之药，而茯苓与参术合用，实补多于利，所以重用之以分湿邪，即以补气血耳。

29654 加减补中益气汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】补中益气汤去升麻，加葛根、制半夏、茯苓、麸炒枳壳。

【用法】生姜为引。

【主治】产后右胁痛。

29655 加减补中益气汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】人参一钱半 黄耆三钱（蜜炙） 白术三钱（制） 升麻五分 当归三钱 柴胡五分 白芍一钱半（炒） 龙骨三钱（煨） 牡蛎三钱（煨） 熟地五钱

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】阴中挺出，脉软者。

【方论选录】气血大虚，元气不能收摄于下，故阴中挺出。熟地滋阴补血，人参补气扶元，黄耆补中益气，白术培土益脾，当归养血脉以荣经，白芍敛肝阴以和血，升麻升阳明清气，柴胡升少阳清气，龙骨涩精秘气，牡蛎涩精固阴。水煎温服，使气阴内充，则清阳不复下陷，而阴挺自收也。

29656 加减补中益气汤

【方源】《叶氏女科》。

【组成】人参三钱 黄耆（蜜炙） 白术（蜜炙） 白芍（酒炒） 当归身（酒洗） 川芎 陈皮各一钱 柴胡 白芷 茯苓 黄柏（酒炒） 知母（酒炒） 生地黄各七分 炙甘草五分

【用法】加生姜三片，大枣二枚，水二钟，

煎七分，食前服。

【主治】崩漏经乱，经用四物汤、十灰丸、地黄汤，崩漏既止，里热已除，宜补气血者。

29657 加减补中益气汤

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】人参 黄耆 白术 当归 升麻 陈皮 青皮 乌梅 柴胡 甘草

【用法】加生姜二片，大枣二枚，水煎服。

【主治】久症，间一日二日三日一发，人虚不可用截法者。

29658 加减补中益气汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】人参二钱 黄耆二钱 广皮一钱 炙甘草一钱 归身二钱 炒白芍三钱 防风五分 升麻三分

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次温服。

【功用】升补。

【主治】下痢由于气虚下陷，门户不藏，邪少虚多者。

29659 加减补中益气汤

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】党参三钱 口耆三钱(炙) 炙升麻一钱 炙甘草一钱 归身三钱(炒) 熟地三钱 乌梅三个(去骨) 醋白芍三钱

【用法】生姜三片，大枣二枚为引。

【主治】噤口痢由于阴亏血少，肝燥克脾，痢而兼呕，饮食不能入腹，服独梅汤后，呕止而痢不止者。

29660 加减补中益气汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】党参五钱 白术一钱(炒) 黄耆三钱(炙) 炙甘草一钱 当归身五钱(炒) 升麻一钱(炙) 生地五钱 乌梅肉三个

【主治】痔证已成，随肛脱出，累累然如珠贯穿，不能收复，血水常洗，痛如火炙，虚热相兼者。

29661 加减补中益气汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】潞党参五钱 炙口耆三钱 炙甘

草二钱 炙升麻一钱 当归身三钱(炒) 熟地黄三钱 醋白芍二钱 乌梅肉三个(去核)

【主治】年老虚弱之人，气虚不能收摄，小便烦数，滴沥不止。

29662 加减补中益气汤

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】党参三钱 白术一钱 黄耆二钱(蜜炙) 炙甘草一钱 当归身二钱(微炒) 升麻五分(蜜炙) 熟地三钱 乌梅肉三个(去壳) 山萸肉二钱(炒)

【用法】生姜三片，大枣二枚为引。

【主治】疝气，小腹胀痛牵连睾丸。

29663 加减补中益气汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】党参五钱 炙耆五钱 炙草一钱 归身五钱(炒) 升麻一钱(蜜炙) 乌梅五个(去核)

【功用】补气，敛肝。

【主治】产后血崩，新血暴注，血脱气陷者。

29664 加减补中益气汤

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】党参三钱 炙耆三钱 炙草一钱 归身三钱(炒) 熟地三钱 白芍三钱(醋炒) 乌梅三个 炙升麻一钱

【用法】生姜三片为引。

【主治】小儿阳虚泻痢，久而气脱者。

29665 加减补中益气汤

【方源】《实用正骨学》。

【组成】黄耆 白术 陈皮 升麻 柴胡 人参 甘草 当归身 茯苓 熟地 破故纸 牛膝 杜仲(分量随症酌用)

【用法】水煎服。

【主治】骨伤后，身体虚弱，中气不足，腰膝疼痛。

29666 加减补中益气汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】黄耆 党参各三钱 白术 陈皮 各二钱 升麻 柴胡各一钱 阿胶(冲化) 焦艾各二钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】补气安胎。

【主治】平素体质不强，妊娠四五月，忽然腰痠腹胀，或有下坠感，精神疲乏，胎动不安，阴道有少许出血，脉滑无力，属气虚下陷者。

【加减】大便溏薄，胃纳不佳，加砂仁二钱，扁豆四钱。

29667 加减补阴益气汤

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地五钱 人参一钱半 黄耆三钱（蜜炙） 柴胡五分（盐醋炒黑） 白芍一钱半（醋炒） 升麻三分（盐醋炒） 阿胶三钱（蒲黄灰炒） 山药三钱（炒） 血余三钱（炒灰） 赤石脂三钱（醋炒）

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】交接出血，脉软数者。

【方论选录】阴不藏精，虚阳不能固密，而经气漏泄，经血易动，故交接出血。生地滋阴壮水以资血室，人参补气扶元以固虚阳，山药补脾益阴，黄耆补中固气，阿胶补阴益血以填任脉，白芍敛血益阴以固冲脉，升麻升阳明清气，柴胡升少阳清气，血余灰去瘀生新，最能止血，赤石脂涩血镇怯善固经气。水煎温服，使气阴内充，则虚阳自敛，而经气完固，经血自无漏泄之虞。

29668 加减补肝祛瘀汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】赤色鲜首乌一两（打碎） 酒炒白芍一两 当归一两 柴胡一钱 青皮一钱五分 草蔻仁一钱（研） 半夏二钱 炙甘草五分

【用法】煨姜三钱、大枣三枚为引。

【主治】足厥阴肝经之症，初病令人腰痛，少腹胀满，小便不利如癃状，小便数，心气恐惧，气不足，腹中怛怛，先寒颤，后变热，面色苍白，善太息，甚者欲如死状，或头痛而渴，此症由少阳胆经而传入厥阴肝经，两胁必胀。

【加减】如寒甚，加肉桂八分（或桂枝一钱五分）；如热甚，加青蒿三钱；如小便不利，加车前子三钱、赤苓三钱；恶心，加灶心土三钱；如饱闷，加槟榔一钱五分。

29669 加减补肾安胎饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】泡参四钱 白术二钱 茯神三钱 杜仲 续断 菟丝子各三钱 阿胶二钱 蕲艾三钱 乌贼骨 桑寄生各五钱

【用法】水煎，温服。

【功用】补肾，止血，安胎。

【主治】体质较弱，胎气不固，复因房室触动，遂致胎漏下血，腰痠腿软，神疲乏力，尺脉沉滑无力。

29670 加减局方五苓散

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】赤苓三钱 赤芍二钱 子芩一钱 甘草梢一钱半 琥珀（刮末冲）五分 灯心三十茎

【用法】水煎服。

【功用】泻热行滞通淋。

【主治】妊娠热郁血滞，而为子淋，小便黄赤，艰涩不利，解时疼痛，频数而短，面色微红，口苦而干，烦躁不安，大便燥结，带下色黄，舌红，苔厚黄而燥，脉滑数有力者。

29671 加减陈氏木香散

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】人参 肉桂 茯苓 半夏（姜制） 白术（土炒） 丁香 肉豆蔻（面裹煨） 甘草（炙） 诃子肉（面裹煨） 木香（煨）

【用法】引用生姜，水煎服。

【主治】痘中厥逆，因气血虚寒而发，爪甲色白，小便清利，痘色灰陷，泄泻不食等。

29672 加减附子理中汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】白术三钱 附子二钱 干姜半钱 茯苓三钱 厚朴二钱

【用法】水五杯，煮水二杯，分二次温服。

【功用】温脏。

【主治】自利腹满，小便清长，脉濡而小，病在太阴。

29673 加减附子理中汤

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】淡附子二钱 元党参三钱 炮姜八分 制香附二钱 泽泻三钱 白芍一钱五分 天仙藤（即青木香藤）一钱半 川椒三分

【用法】加通草八钱，煎汤代水煎药。

【功用】温以和气。

【主治】胀症将起，胸腹微满，食物不运，身重足肿，不耐走动，早间肿消，午后肿甚，属气虚不行于脾者；亦治木乘土而作胀。

【宜忌】忌食生冷水果等物。

29674 加减附子理中汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】炙附子三钱 炮姜三钱 木香三钱 焦槟榔三钱 吴茱萸五钱 枳实三钱 广陈皮三钱 厚朴四钱 丁香三钱 桂心三钱

【用法】竹叶一捻为引，水煎服。

【主治】陈寒结气，合脾湿凝聚而成绕脐腹痛，大便顺利，脉沉紧者。

【方论选录】其病因寒凝气滞，用附子、炮姜、吴萸、厚朴、桂心祛寒；木香、槟榔、丁香、广皮、枳实破气，少佐竹叶引药下行，其凝滞一开，疼痛自止矣。

29675 加减青州白丸子

【方源】《百一》卷五。

【组成】白附子 天南星 半夏 川姜各二两 天麻 白僵蚕 干蝎各一两 川乌头（去皮尖）半两

【用法】上药并生用为细末，白面糊丸，如梧桐子大。每服三五十丸，生姜汤送下，不拘时候。如瘫风，温酒送下；小儿惊风，薄荷汤送下五七丸。

【功用】常服安神定志，去风痰。

【主治】卒中风邪，半身不遂，口眼喎斜，痰涎闭塞，喘嗽咯血，胸膈满闷；小儿惊风，

妇人血风，大人洗头风，并宜服之。

【宜忌】有孕妇人不可服。

29676 加减青州白丸子

【方源】《医方类聚》卷二十三，引《必用全书》。

【组成】齐州半夏 南星（去浮皮） 川乌（去皮脐）三只 天麻 全蝎（去毒）各二两。

【用法】上药将前三味水浸软，切作片子，用生绢袋盛，水盆浸之，春六、夏三、秋七、冬十，每日一换水，日晒夜露，晒干，同天麻、全蝎为末，用糯米粥清为丸，如梧桐子大。每服五七丸，或十丸、十五丸，生姜汤送下，食后、临卧服。

【主治】痰嗽、诸风。

【备考】方中半夏、南星用量原缺。

29677 加减青蒿鳖甲汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】青蒿梗 鳖甲 生地各三钱 丹皮二钱 地骨皮 芍药 麦冬各三钱 茯神四钱

【用法】水煎服。

【功用】养阴清热。

【主治】产后阴虚血燥，发热数日，午后更甚，肤热颧红，手心发烧，心烦不安，舌质淡，苔薄微黄而干，脉细数。

29678 加减肾气大补汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】熟地八钱 萸肉四钱 怀山四钱 茯苓三钱 丹皮二钱 泽泻二钱 制附四钱 肉桂二钱 牛膝二钱 黄耆四钱 归身四钱 梔子四钱 丝饼四钱

【用法】水煎服。

【主治】产后气血虚弱，督脉不通于脑，髓海空虚，风寒乘入，以致头痛畏风，久则鼻流黄涕，稠粘腥臭，脑痛如破者。

【加减】巅痛，加川芎一钱五分，藁本一钱五分，北细辛七分；两太阳痛，加荆芥、防风、淫羊藿各一钱；牵引两目疼痛，加炒僵蚕一钱，灵仙一钱五分，蝉蜕一钱；面上起

块如饼，加全蝎梢八分，海桐皮一钱五分，煨石决明二钱，干蟾蜍一只；面上红肿如游风，加白头翁、牛茅子各二钱，独活、羌活各一钱，钩丁二钱；眼目红沿出泪，加谷精一钱，冬桑叶十片，干蟾蜍一只（香油炙酥），研末，药汁送下。

29679 加减金豆解毒汤

【方源】《古今名方》引蒲辅周经验方。

【组成】金银花9克 绿豆衣 甘草 明矾各6克 陈皮 蝉蜕 僵蚕各3克

【功用】清热解毒，避疫驱邪。

【主治】瘟疫流行时，未病预防，或已感染者。

29680 加减金匱肾气丸

【方源】《明医杂著》卷六。

【异名】加减济生肾气丸（《内科摘要》卷下）。

【组成】白茯苓三两 附子五钱 川牛膝 桂 泽泻 车前子 山茱萸 山药 牡丹皮各一两 熟地黄四两（拍碎，酒拌杵膏）

【用法】上为末，和地黄、炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心米饮送下。

【主治】脾肾虚，腰重脚肿，小便不利；或肚腹肿胀，四肢浮肿；或喘急痰盛，已成虚症。

29681 加减金匱肾气丸

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】炒熟地四钱 粉丹皮四钱 泽泻三钱 茯苓三钱 山药二钱 淡附片二钱 安桂八分 山萸肉炭八分 车前二钱 牛膝炭三钱 加蒺藜子八分（生）

【主治】产后肿胀腹满，服益气化瘀不效者。

29682 加减金匱肾气汤

《医门八法》卷三。即《济生》卷四“加味肾气丸”改为汤剂。见该条。

29683 加减金锁固精汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】紫菀二钱 金樱子三钱 海金沙三钱 焦术四钱 龙骨三钱 牡蛎三钱 罂

粟壳四钱 五倍子二钱 竹叶一钱

【用法】水煎，温服。

【主治】遗精，脉象微细而数。

【方论选录】此方只用金锁固精汤中龙骨、牡蛎二味，其余皆系固肾涩精之品，用紫菀、焦术健脾助胃，用竹叶下行，稍缓其收敛之力，服之而精固矣。

29684 加减参苓白术丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草（炙） 黄耆 白芍 官桂 陈皮 山药 莲肉 使君子肉 鳖甲 神曲 夜明砂 龙胆草 天南星各等分

【用法】荷叶浸水煮糊丸，如黍米大。米饮送下。

【主治】症久成痞，谓之痞症，又名劳痞。兼治脾虚生风发搐者。

29685 加减参苓白术散

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】人参 砂仁 莲肉（去心）各半两 白茯苓（去皮）八钱 土白术一两 甘草（炙）七钱 肉果（炮）四钱 诃子（炮，去皮） 干姜（炒）各二钱

【用法】上为细末。每服三分，清米饮汤调下。

【主治】小儿吐泻。

29686 加减参苓白术散

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】白术三钱 茯苓三钱 山药一两 甘草一钱 薏苡仁二两 白扁豆七钱 陈皮七钱 麦门冬八钱（去心）（一方加菖蒲）

【用法】上为末。每服二匙，食前白汤调下。

【功用】补脾胃，进饮食。

29687 加减参苓白术散

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】人参 茯苓各一钱 山药一钱半 白术一钱 陈皮一钱半 莲肉九粒 当归 防风 白扁豆 薏苡仁 枳实各一钱

【用法】上锉为散。随宜加减。

【主治】小儿疳积。

29688 加减参苓白术散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】泡参三钱 茯神二钱 白术三钱 甘草 木香各二钱 砂仁一钱 淮药 扁豆各四钱

【用法】水煎，温服。

【功用】健脾和胃。

【主治】妇女脾虚，经行无定期，色淡红，量少质薄，时夹粘液，腰腹无胀痛，舌淡苔白润，脉濡。

【加减】腹痛，加焦艾三钱；腰痛，加杜仲四钱，续断三钱。

29689 加减参苓白术散

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】泡参三钱 扁豆四钱 焦术 茯苓各三钱 茅苍术一钱半 砂仁 炙升麻各一钱 广皮二钱

【用法】水煎服。

【功用】补气升阳。

【主治】妊娠数月，因脾虚气弱，消化不良，食少腹胀，大便不实，下肢肿胀，气短神疲，面色萎黄，舌淡口和，苔白滑，脉濡而虚者。

29690 加减枳术二陈汤

【方源】《保命歌括》卷二十八。

【组成】枳实（炒） 白术（炒） 陈皮（去白）各五分 半夏（洗） 茯苓各一钱 甘草三分

【主治】噎膈。

【加减】清痰，加竹沥、姜汁各五匙；泻火，加姜汁炒黄连五分；开郁，加香附（米炒）、神曲（炒）、橘叶、青皮各五分；呕吐，加藿香叶、砂仁各三分；润气，加杏仁泥、麻子仁各五分；津少血虚，加当归、生地黄各五分（酒洗）。

29691 加减栀子五物汤

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】葛根 柴胡 香薷 石膏 栀子 前胡 黄芩 葱白 麦冬 陈皮 知母 甘

草

【功用】安胎清热。

【主治】妊娠热病损胎者。

29692 加减胃苓五皮汤

【方源】《保命歌括》卷二十六。

【组成】胃苓汤加桑白皮 大腹皮 茯苓皮 生姜皮 五加皮

【用法】上咬咀。加生姜三片，水煎服。

【主治】诸肿及喘。

29693 加减香砂养胃汤

【方源】《医林绳墨大全》卷三。

【组成】木香（磨，不见火）三分 砂仁五分（打碎） 厚朴（姜汁炒）四分 陈皮一钱 茯苓五分 炒黑姜二分 草果三分 木瓜五分 麦芽一钱（炒） 神曲一钱半 半夏（姜汁制）一钱 车前子八分 泽泻七分（炒）

【用法】加生姜二片，水一钟半，煎大半钟，热服，滓再煎。

【主治】脾胃虚弱，外发浮肿。

29694 加减追疔夺命汤

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】防风 赤芍药 连翘 羌活 独活 细辛 青皮 僵蚕 蝉蜕 青木香 甘草节 金银花 紫河车 独脚莲

【用法】上加生姜、泽兰、生地黄，水煎服。

【主治】疔疮，及痈疽、发背、恶疮，焮赤肿痛，或紫游风，赤游风。

【加减】病势退减，加大黄，取利下三五行，去大黄。

29695 加减独活寄生汤

【方源】《实用正骨学》。

【组成】秦艽 防风 川芎 当归 独活 桑寄生 熟地黄 白芍 桂心 茯苓 杜仲 牛膝 人参 甘草 木瓜（分量随证酌用）

【用法】水煎服。

【主治】风寒侵袭，下肢不能动作，疼痛难忍。

29696 加减活血止痛散

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】当归 山甲 木瓜 牛膝各三钱 乳香 没药各二钱 独活 羌活 枳壳各一钱五分 小茴 甘草 淮乌 川芎 白芷 人参 大茴 血竭各一钱 肉桂八分 麝香一分 生姜五片

【用法】水煎，酒冲服。

【主治】骨折肿痛。

29697 加减济生肾气丸

《内科摘要》卷下。为《明医杂著》卷六“加减金匱肾气丸”之异名。见该条。

29698 加减神仙既济丸

【方源】《寿世保元》卷四引刘春岡方。

【组成】拣参（去芦）二两 嫩鹿茸（酥炙）二两 肉苁蓉（酒洗）三两 枸杞子（酒洗）二两 茱萸（酒蒸，去核取肉）二两，怀山药二两 辽五味子二两 石菖蒲（去毛）二两 嫩黄耆（蜜炒）二两 川巴戟（水泡，去心）二两 川黄柏（酒炒）二两 知母（去毛）二两 柏子仁二两 怀熟地黄（酒蒸）二两 菟丝子（酒蒸、捣饼、晒干）二两 天门冬（去心）二两 当归（酒洗）二两 麦门冬（去心）二两 远志（甘草水泡，去心）二两 小茴香（盐酒炒）二两 白茯苓（去皮木）二两，怀生地黄（酒洗）二两 川杜仲（去皮，酒炒）二两 川牛膝（去芦，酒洗）二两

【用法】上为细末，炼蜜和熟枣为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心盐汤送下，或酒任下。

【功用】滋肾水，降心火，补脾土，添精补髓，益气和血，壮筋骨，润肌肤，聪明耳目，开心定智，强阴壮阳，延年益寿。

【主治】诸虚百损，五劳七伤。

29699 加减神效活络丹

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】胆星二钱 防风一钱五分 前胡一钱五分 羌活一钱五分 川芎一钱五分 全蝎一钱五分 橘红二钱 苍术一钱五分（炒） 川郁金一钱五分 白附子一钱五分

当归一钱五分 乌药一钱五分 香附一钱五分（炙） 茯神二钱 石菖蒲一钱五分 麻黄二钱 牛黄八分 川附子八分 钩藤三钱 苏合油一钱 天麻一钱 麝香四分 冰片四分 白芷一钱五分 僵蚕三钱（炒） 生地三钱 杭芍三钱（炒） 羚羊二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重一钱，蜡皮封固。

【主治】面风，口眼抽动，筋惕肉瞤。

29700 加减除湿胃苓汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】苍术二钱 厚朴二钱 陈皮三钱 滑石块四钱 炒白术四钱 猪苓四钱 炒黄柏四钱 炒枳壳三钱 泽泻三钱 赤苓四钱 炙甘草三钱

【功用】健脾燥湿，和中利水。

【主治】带状疱疹（湿盛型缠腰火丹），湿疹（湿疡），牛皮癣（湿寒性白疔）。

【加减】痒感明显者，加白鲜皮；若湿滞、食滞重者，加焦槟榔或伏龙肝。

【方论选录】方中厚朴、陈皮、苍术、甘草燥湿和中；泽泻、猪苓、茯苓、白术健脾利水；赤苓、黄柏、滑石清热利湿；枳壳行气以助水湿之运化。临床治疗湿盛型湿疹，如有湿盛无热的特征，即可应用。

29701 加减桂麻各半汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】麻黄三钱 桂枝尖三钱 防风三钱 荆芥穗三钱 皂角刺三钱 淡豆豉四钱 独活三钱 草乌三钱 连翘三钱 酒黄芩四钱 木通四钱 粉甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】风寒两感头痛，身热恶寒，四肢骨节尽痛，或腰脊骨强痛，六脉浮洪而数者。

29702 加减桃仁承气汤

【方源】《云岐子脉诀》卷三。

【组成】桃仁半两 大黄一两 甘草二钱半 桂三钱

【用法】上咬咀。每服一两，水二盏，加生

姜七片，煎至一半，去滓，入芒消三钱，化开食后服。以利为度，未利再服。

【主治】血瘀下焦，脉沉芤者。

29703 加减桃仁承气汤

【方源】《证治宝鉴》卷一。

【组成】桃仁 桂枝 芒消 川军 郁金 生地 芍药

【主治】薄厥，大怒吐血。

29704 加减桃仁承气汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】大黄三钱（制） 桃仁三钱（炒） 细生地六钱 丹皮四钱 泽兰二钱 人中白二钱

【用法】水八杯，煮取三杯，先服一杯。候六时，得下黑血，下后神清渴减，止后服。不知，渐进。

【主治】热病经水适至，十数日不解，舌痿饮冷，心烦热，神气忽清忽乱，脉右长左沉，瘀热在里者。

29705 加减真人活命饮

《寿世保元》卷九。为《古今医鉴》卷十五“千金内消散”之异名。见该条。

29706 加减柴胡二陈汤

【方源】《保命歌括》卷二十三。

【组成】小柴胡汤、二陈汤二方相合。

【主治】疟疾通用。

【加减】春，加川芎、白术、葛根；夏，加黄连、香薷、厚朴；秋，加知母、桂枝；冬，加炒干姜。不能食者，加白术、厚朴、青皮、草果、神曲（炒）；胸中痞满，加枳壳、桔梗；腹中胀，加厚朴、大腹皮、槟榔。

29707 加减柴胡桂姜汤

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】柴胡 茅术 川芎各七分 黄芩 牡蛎各六分 花粉五分 甘草 桂枝 干姜各三分

【用法】加生姜三片，大枣二枚。

【主治】疟疾，先热后寒，寒多热少，或独寒不热者。

29708 加减钱氏白术散

【方源】《便览》卷二。

【组成】人参 白术 白茯苓 甘草（炙） 枳壳（炒）各半钱 藿香一钱 干葛二钱 木香 五味子 柴胡各三分

【用法】上作一服。水煎服。

【主治】消渴不能食。

29709 加减健脾胃和膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参二两 于术一两五钱（炒） 茯苓二两（研） 枇杷叶二两（制，去毛） 陈皮一两五钱 厚朴一两五钱（姜制） 木香一两（研） 草豆蔻一两五钱（研） 三仙四两（炒黄） 桔梗一两五钱 苍术一两五钱（炒） 紫苏叶一两五钱

【用法】上以水煮透，去滓，再熬浓，加炼蜜为膏。每用四钱，白水冲服。

【功用】健脾化湿。

29710 加减射干鼠粘汤

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】射干 山豆根 白僵蚕各一钱一分 鼠粘子 紫草茸 紫菀各一钱二分 桔梗 石膏 诃子 木通各一钱 升麻 蝉蜕各八分 甘草五分

【用法】上为粗散。每服四五钱，水煎，食远服。

【主治】痘症，热毒上冲，咽喉肿痛。

29711 加减消风百解散

【方源】《医便》卷三。

【组成】川芎 白芷 陈皮各一钱 苍术一钱半 紫苏一钱一分 麻黄（去根）一钱半 桂枝八分 甘草五分

【用法】加生姜三片，葱白二根，乌豆一撮，水一钟半，煎一钟，温服。以汗为度，无汗再服。

【主治】冬月外感风寒，头痛项强，壮热恶寒，身体烦痛，四肢倦怠，痰壅喘嗽，涕唾稠粘，自汗恶风。

29712 加减调中益气汤

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】补中益气汤去白术，加藁本、苍术、川芎、蔓荆、细辛、黄柏。

【主治】瘦人头痛，血气两虚，左右俱痛者。

29713 加减调中益气汤

【方源】《医部全录》卷二九〇。

【组成】人参 白术 白茯苓 陈皮 槟榔 山楂 青皮 柴胡 苍术 黄芩 升麻 半夏

【主治】疟疾经消导后仍不止，体倦脉弱，或脉虚大者。

【加减】久疟在阴分者，加芎、归。

29714 加减调胃承气汤

【方源】《济阳纲目》卷一〇七。

【组成】大黄 黄连 甘草各等分

【用法】上锉。水调服。

【主治】内伤湿热膏粱，口臭，牙齿动摇欲落，或血出不止。

29715 加减黄芩知母汤

【方源】《病科全书》。

【组成】黄芩二钱 知母二钱 桑白皮三钱 天花粉三钱 杏仁二钱（去皮尖） 焦山梔二钱 川贝（另包，冲服） 桔梗二钱 生甘草一钱 煅牡蛎二钱 元参三钱 郁金一钱五分

【主治】伤肺病，因咳嗽日久所致。

【加减】如挟初感风寒，酌加荆芥、防风。

29716 加减黄连阿胶汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】黄连三钱 阿胶三钱 黄芩二钱 炒生地四钱 生白芍五钱 炙甘草一钱五分

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次温服。

【主治】春温内陷下痢，易致厥脱者。

29717 加减黄连解毒丸

【方源】《普济方》卷一六五引《海上居士秘方》。

【组成】黄连半两 当归二钱半 芍药二钱 大黄一两 黄芩一两 滑石二两 黑牵牛一两（头末，微炒）

【用法】上为细末，水泛丸，如小豆大。每服四十丸，百沸汤送下，食远临卧服。

【主治】气痰壅热，胸膈不利，食饮不欲，胫痠腿困，行步艰难，膈痛咽干，便溺赤黄，阴痿，足膝困倦。

【宜忌】忌酒、干姜、胡椒等物。

29718 加减黄连解毒汤

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】元参三钱 生地黄四钱 黄芩三钱 山梔子三钱 黄连二钱 煅石膏四钱 川大黄六钱 芒消二钱 木通三钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】结热触动相火，客于咽喉，咽喉肿痛，日复一日，水浆不能下咽，初起经刺少商出血及服药而肿仍不消、脉洪而数者。

【方论选录】此方用黄连、黄芩清其上焦之热，梔子、石膏清其中焦之热，木通清其下焦之热，元参、生地清热养阴，甘草和药调中，大黄、芒硝将其结热推盪而去，釜底抽薪。

【备考】原书治上症，并以锋针刺尺泽出血，泄其上焦之热。

29719 加减黄耆建中汤

【方源】《得效》卷九。

【组成】白术 白茯苓 桔梗各三钱 人参三钱半 秦艽 北柴胡（去芦） 防风 白芍药 甘草 当归（去尾） 泽泻 生干地黄 熟地黄 地骨皮 肉豆蔻（煨） 槟榔 缩砂仁各五钱 猪苓四钱 黄耆一两

【用法】上为散。每服三钱，水一盞半煎，温服，不拘时候。老人更加黄耆一两，或为末，蜜汤调服，临期斟酌。

【主治】男子妇人，五劳骨蒸者。

29720 加减黄耆建中汤

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】黄耆一两二钱 秦艽 防风 柴胡 归身 白芍药 熟地黄 地骨皮 肉豆蔻（煨） 炙甘草 砂仁 槟榔各五钱 猪苓四钱 桔梗 白茯苓 白术各三钱 人参一钱五分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一钟，煎七分，不拘时服。老人黄耆加重一两。

【主治】男妇五劳七伤，骨蒸。

29721 加减黄耆建中汤

【方源】《医林绳墨大全》卷四。

【组成】黄耆一钱 官桂 甘草 白芍各五分 人参 当归各一钱

【用法】加大枣二枚，水煎，温服。

【主治】气虚自汗。

29722 加减麻杏石甘汤

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】净麻黄四分 熟石膏四钱 象贝母三钱 鲜竹叶三十张 光杏仁三钱 射干八分 炙僵蚕三钱 白菜服汁一两 生甘草六分 连翘壳二钱 薄荷叶一钱 京元参一钱五分

【主治】痧麻不透，憎寒发热，咽喉肿痛，或内关白腐，或咳嗽气逆之重症。

29723 加减清心莲子汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】石莲肉 西洋参 麦冬 地骨皮 黄芩 焦山栀 生甘草 车前子。

【主治】带下。因心火不静，热传于脾，脾中湿热，蒸郁化火而为赤带者。

29724 加减清心莲子饮

【方源】《一盘珠》卷四。

【组成】川连(酒炒)三分 生地 当归各二钱 志肉 茯神 枣仁 石莲肉各一钱 黄柏 麦冬 甘草各八分

【用法】灯心为引。

【主治】遗精，白浊，小便痛。

29725 加减消毒拔脓汤

【方源】《痘疹定论》卷四。

【组成】生地一钱五分 甘菊七分 归尾八分 川芎六分 柴胡八分 红花五分 草决明一钱(研) 木贼五分 白蒺藜一钱(炒、研) 黄芩七分(酒炒) 牛蒡子七分(炒、研) 连翘七分(去心) 生甘草二分(去皮)

【主治】疹后患生目翳，眼赤红肿，眼皮烂

者。

29726 加减消毒活血汤

【方源】《会约》卷二十。

【组成】紫草 当归各二钱 前胡 牛蒡子各六分 生地 白芍 连翘 桔梗各五分 黄芩 黄连(各酒炒)各七分 甘草四分 山楂肉八分 怀牛膝二钱

【用法】煎就，入生蜜半酒杯服之。

【主治】痘起胀灌脓时，或六七日不大便而闷塞作乱者。

【宜忌】不可用芒消、生大黄下之。

【加减】如大便不通，加酒炒大黄三钱微利之。如仍不通，用猪胆汁灌入谷道中，即通。

29727 加减清热导滞汤

【方源】《痘疹定论》卷三。

【组成】当归七分(不用尾) 白芍五分(生) 槟榔五分 厚朴五分(姜汁炒) 陈皮八分 枳壳五分(麸炒) 连翘三分(去心) 黄芩二分(酒炒) 黄连一分(酒炒) 山楂肉七分 广木香二分(研末) 牛蒡子三分(炒、研) 甘草二分(生，去皮) 可加熟大黄七分

【用法】生姜三片为引。

【主治】痘后痢疾。

【加减】赤痢或红白相杂，可加炒红花三分，炒桃仁五分，地榆五分；白痢，再加陈皮二分，芩、连俱不用。

29728 加减清热除湿膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】连翘六钱 胆草四钱 焦三仙一两 赤苓六钱 防风五钱 桑皮四钱(生) 赤小豆五钱 菊花五钱 茵陈六钱 条芩四钱 僵蚕四钱(炒) 甘草二钱(生)

【用法】上共以水煎透，去滓，加炼蜜为膏。每服二钱，白开水冲服。

【功用】清肝热，化脾湿。

29729 加减清膈化痰丸

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】陈皮(去白) 贝母(去心) 半

夏曲 天南星(汤泡,姜汁浸,炒) 白茯苓 天花粉各一两 片芩(去芦,酒炒) 香附子(童便浸,醋炒) 枳实(麸炒) 苍术(米泔浸,去皮,炒) 海石(另研)各八钱 桔梗六钱

【用法】上为细末,烧竹沥,加生姜汁为丸,如绿豆大。每服九十丸,食远及临卧时滚白水送下。

【主治】痰饮。

29730 加减散花去癰汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生白芍一两 当归 麦冬各五钱 焦栀 元参 辰茯神 杜牛膝各三钱 川柴胡二钱 生甘草 白芥子 鲜石菖蒲各一钱 当门子五厘(冲)

【主治】情欲狂。妇女思慕男子不得,忽然发狂,见男子抱住不放,以为情人,罔识羞耻,甚至裸体奔走,脉必弦出寸口,此名花癰,俗称发花呆。

29731 加减散肿溃坚汤

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】知母四钱 黄柏三钱 皂角刺三钱 金银花四钱 天花粉五钱 马齿苋四钱 黄芩三钱 黄连二钱 升麻三钱 山甲二钱 连翘三钱 桔梗二钱

【用法】元酒煎服。

【主治】项疮(即对口)初起,紫红板硬,结成一片,并无头可寻,脉洪数者。

【方论选录】此方用知、柏、芩、连散其诸经之火;连翘、升麻解毒升阳;花粉、桔梗排脓利膈;双花、马苋散肿消毒;山甲、皂刺引药软坚。痈疡初起服之最宜。

29732 加减葛根麻黄汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】葛根 麻黄 生姜各一两 防风芍药 白术 人参 芍药 黄芩 防己 桂枝 甘草各半两 附子一枚

【用法】上咬咀。用水六升,先煮麻黄、葛根数沸,去上沫,纳诸药,煮取二升,去滓,

饮服一盞,食顷再服,日四五次,夜二三次。

【主治】刚柔痙。

【加减】柔痙自汗者,去麻黄,加葛根成一两半。

29733 加减葱白香豉汤

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】葱白香豉汤葱白减半,加萎蕤二钱,白薇、青木香、桔梗各一钱,甘草、薄荷各三分,白蜜三匕。

【主治】三时风热,咳嗽咽喉肿痛,难用萎蕤汤者。

29734 加减普济消毒饮

【方源】《医门八法》卷三。

【组成】生当归五钱 生地黄五钱 生黄芩三钱 马兜勃一钱 板兰根三钱 南薄荷三钱 生栀子三钱 川大黄五钱 天花粉三钱 怀牛膝三钱(孕妇勿用) 元明粉三钱(冲服,孕妇勿用)

【主治】咽喉肿痛,其肿在咽喉两旁,色多红紫,伴见烦躁发渴,大便秘结,舌生黄苔等实热症。

29735 加减普济消毒饮

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】荆芥穗三钱 酒黄芩四钱 马勃三钱 苍术四钱 山栀子三钱 升麻二钱 鼠粘子三钱 桔梗二钱 薄荷三钱 连翘三钱 紫花地丁三钱 独活四钱 甘草二钱

【用法】水煎,温服。

【主治】山岚瘴气,客于经络,初病头痛,恶寒身热,脉浮洪而数,随后头项浮肿而痛,甚者面目亦肿而痛,或耳下肿出,而为炸腮,症属大头天行者。

【方论选录】此方以苍术为君,解其山岚瘴气;以地丁、独活、鼠粘、马勃为佐;以芥穗、薄荷、连翘、升麻引药上行头项,以桔梗为舟楫,载药上升,使之散毒而消肿;以黄芩、栀子清其内热,以甘草和药调中,则毒散肿消人可安矣。

29736 加减普济消毒饮

【方源】《重订广温热论》卷二。

【组成】青连翘钱半 苏薄荷一钱 炒牛蒡一钱半 马勃四分 荆芥穗一钱 白僵蚕一钱 大青叶一钱半 玄参一钱 新银花一钱半 苦桔梗一钱 生甘草八分

【用法】用活水芦根二两煎汤代水，煎服。

【主治】温毒疔腮及发颐。初起咽痛喉肿，耳前后肿，颊肿，面正赤；或喉不痛，但外肿；甚则耳聋，口噤难开。

29737 加减温脾祛瘀汤

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】甜白术一两 云苓五钱 肉桂一钱（去皮） 甘草八分 白薏仁二钱（研） 制半夏二钱 青皮一钱五分 炒枳壳一钱五分

【用法】煨姜三钱，大枣三枚为引。

【主治】邪盛脾经，痰食难化，而得风邪，致成脾疔。初病令人不乐，好太息，不嗜食，多寒热，汗出，病至善呕，呕已乃衰，先寒后热，寒从腹起者。

【加减】如口苦耳鸣，症邪将入少阳，加炒柴胡八分；如热多，加青蒿三钱；如恶心，加灶心土五钱；如手足冷，指甲青，加桂枝二钱；如胸腹胀饱，加槟榔一钱五分；如腹痛作泻，加煨木香一钱五分，鹿角霜三钱。

29738 加减滋阴清肺汤

【方源】《喉痧症治概要》。

【组成】鲜生地六钱 细木通八分 薄荷叶八分 金银花三钱 京玄参三钱 川雅连五分 冬桑叶三钱 连翘壳三钱 鲜石斛四钱 甘中黄八分 大贝母三钱 鲜竹叶三十张 活芦根一两（去节）

【主治】疫喉白喉，内外腐烂，身热苔黄，或舌质红绛，不可发表之症。

【加减】如便秘，加生川军三钱，开水泡，绞汁冲服。

29739 加减犀角地黄汤

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】犀角 生地黄 当归 黄连 苦

参 枳壳 桔梗 赤芍药 红花

【用法】加生姜一片，水煎，临服入藕汁二匙，如无，韭汁亦可。

【主治】瘀血在上焦，邪热入里。烦躁，渴欲饮水，水入不下者。

29740 加减犀角地黄汤

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】犀角 木通 生地黄 芍药 红花 紫草 茯苓 车前草（鲜者） 地骨皮（鲜者） 甘草

【用法】水煎服。犀角须用井水磨浓，俟药煎如度，投下服之，不可和内煎也。若身热惊厥，加纹银一块同煎。

【主治】痘出三两朝，身中热烙焦紫，无红活色，泉炎猛烈之甚也。或眼红脸赤，或小便涩结。

29741 加减疏风清上散

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】防风 荆芥 川芎 白芷 柴胡 黄芩 山栀 甘草

【用法】水煎服。

【主治】时行感冒头痛，恶风发热，烦渴有汗者。

【方论选录】本方系辛凉解表之剂，用川芎、白芷以除风痛，防风、荆芥、柴胡以解表。黄芩、山栀以清热，甘草以为调和，俾风热之邪分从表里两解，热解则头痛自亦解除。

29742 加减解毒活血汤

【方源】《鼠疫约编》。

【组成】连翘三钱 柴胡二钱 葛根二钱 生地五钱 当归钱半 赤芍三钱 桃仁八钱（去皮尖，杵碎之） 红花五钱 川朴一钱 甘草二钱

【用法】水一碗半，先用大罐煎合沸数，一二三日病在上焦，药味取其轻清，煎宜六七沸，四五六日病在中焦，药味取其稍重，煎宜十沸，七日以后病在下焦，药味取其浓重，煎十余沸倾入小罐，后入水大罐，再煎再倾，

煎回大半碗服。

【主治】鼠疫。

29743 加减藿朴夏苓汤

【方源】《顾氏医径》卷四。

【组成】藿香 川朴花 半夏 茯苓 杏仁 米仁 大豆卷 泽泻 红花

【主治】产后湿温。因胎前湿伏中焦，致产后缠绵不已，状若阴虚发热者。

【加减】热重，去豆卷，加葛根、黄芩。

29744 加减藿香正气丸

【方源】《易简方便》卷一。

【组成】藿香十斤 大厚朴(老姜汁八碗拌炒)八斤 荆芥穗六斤 茅苍术(米泔水浸，切片，炒)八斤 香薷六斤 槟榔(先切薄片)六斤 羌活五斤 青防风六斤 建神曲(杵碎，炒)八斤 独活五斤 香白芷五斤 枳壳(炒)六斤 陈皮六斤 泽泻(盐水炒)六斤 猪苓八斤 滑石(捣粉，水飞)十二斤 宣木瓜(炒)六斤 甘草五斤 苏梗八斤 法半夏八斤 葛根六斤 香附(炒)八斤 白术(切片，东壁土拌炒)八斤 青皮(炒)四斤 蔓荆子八斤

【用法】上药各为细末，用橘皮三斤煎汤泛丸，每丸(带湿称)重三钱。春月感冒，淡姜汤送下；夏秋感冒风寒，橘红汤送下；霍乱吐泻，淡盐汤送下；疟疾一二日一作，姜、枣汤送下；红痢，红扁豆花汤送下；白痢，赤砂糖汤送下；胸腹切痛，砂仁汤送下；头痛鼻塞，畏风无汗，桂枝六分煎汤送下；咳嗽初起，疾多气逆，用生姜汤送下；畏寒肢冷，骨节痠痛，葱白汤送下。

【主治】四时感冒风寒暑湿，一切不正之气，及疫病时行，沿门传染，并饮食过大，脾胃受伤者。

29745 加减藿香正气散

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】藿香 厚朴 陈皮 甘草 半夏 白术 茯苓 苏叶 干姜

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】中寒呕吐，胸腹满闷，或鼻塞头痛，发热憎寒者。

【加减】头痛，加川芎、白芷、细辛；腹痛，加炒芍药、木香、砂仁；口干，加干葛；胸腹满，加枳壳、桔梗；心下满，加枳实、青皮；宿食不消，加草果、山楂、香附；酒食不化，加砂仁；呕吐不止，加姜汁；表有热，加柴胡、干葛；表有寒，加桂枝。

29746 加减藿香正气散

【方源】《医便》卷二。

【组成】藿香一钱五分 白芷 川芎 紫苏叶 半夏 苍术各一钱半 白术 白茯苓 陈皮 厚朴(姜制)各八分 甘草三分

【用法】上用生姜三片，大枣一枚，水二钟，煎一钟，食远热服。

【主治】非时伤寒，头疼憎寒壮热，痞闷呕吐，时行疫病，山岚瘴症，不服水土等症。

29747 加味不换金正气散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】苍术(麸炒) 橘红 半夏曲 藿香叶 厚朴(制)各一两 甘草(炙)七钱半 白茯苓 川芎各半两 木香二钱半

【用法】上为末。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，水煎服。

【功用】发出风毒。

【主治】痢症，寒热往来，或内挟风邪，或内气虚馁。

【加减】若疮陷不发，多加辣桂、当归。

29748 加味四物六君子汤

《郑氏家传女科万金方》卷二。为《寿世保元》卷七“加味四物六君汤”之异名。见该条。

29749 加味香砂六君子汤

【方源】《中医妇科学治疗学》。

【组成】泡参 云苓 白术各三钱 木香二钱 砂仁一钱 秦归二钱 川芎一钱半 陈皮一钱 半夏三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】扶脾祛痰。

【主治】因脾虚挟痰所致的月经量少,色淡而粘,平日白带多,口淡,苔白腻,脉缓滑。

【加减】平日白带多者,加莲米三钱、芡实三钱。

29750 加味越婢加半夏汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】麻黄二钱 石膏(煨捣)三钱 生山药五钱 寸麦冬(带心)四钱 清半夏三钱 牛蒡子(炒,捣)三钱 元参三钱 甘草一钱五分 大枣三枚(擘开) 生姜三片

【主治】素患劳嗽,因外感袭肺,而劳嗽益甚,或兼喘逆,痰涎壅滞者。

29751 加减二陈合四物汤

【方源】《保命歌括》卷三十二。

【组成】二陈汤、四物汤二方相合,去地黄,加南星、青皮、香附、真青黛。

【用法】入姜汁服。

【主治】咳嗽引胁下痛。

29752 加减千金牡丹皮饮

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】丹皮一两 米仁一两五钱 瓜蒌仁一两 银花二两 草河车(即蚤休)二两

【用法】上为末。每服五钱,水煎服。

【主治】妊娠一切内痛。

【宜忌】乳痈不宜。

【加减】胃痛,加川连五钱。

29753 加减不换金正气散

【方源】《保命歌括》卷十九。

【组成】藿香 苍术 厚朴 陈皮 砂仁 白芷 半夏 茯苓 甘草(炙,减半) 人参 神曲(炒)各等分

【用法】上咬咀。加生姜、大枣,水煎服。

【主治】霍乱吐泻。

【加减】寒加干姜,寒甚加熟附子。

29754 加减不换金正气散

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】苍术(米泔浸)一钱半 陈皮(去白)二钱 厚朴(姜汁炒)八分 藿香三钱 半夏(姜汁炒)二钱 枳实(麸炒)二钱 白术(去芦)一钱五分 白茯苓(去皮)三钱

白豆蔻(去壳)八分 甘草八分 黄连(土炒)六分

【用法】上锉。加生姜三片,水煎服。

【主治】噎食转食。

29755 加减代赭旋覆花汤

【方源】《镐京直指》。

【组成】旋覆花三钱(包) 代赭石四钱 浮海石三钱 姜半夏二钱 白茯苓三钱 炒苏子一钱五 炙甘草五分 炙白前二钱 化橘红一钱 老姜三片(去皮)

【主治】伏饮内停,年有喘吼者。

29756 加减定血黑逍遥散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地八两(捣汁) 柴胡五两(鳖血炒) 白芍一两半(炒) 当归三两 白术一两半 山梔二两(炒) 茯神一两半(去木) 丹皮一两半 麦冬三两(去心)

【用法】上为散。水煎五钱,去滓,冲地黄汁服。

【主治】孕妇吐血唾血,脉弦虚数者。

【方论选录】妊娠郁怒伤肝,肝血虚而肝火旺,以致虚阳上逆,营血妄行,故吐血衄血,潮热不止。生地滋阴壮水,以凉血室,捣汁力能散血生血;柴胡解郁升阳以疏肝胆,鳖血炒以引入血分;白芍敛阴收血溢;当归养血归经脉;白术健脾生血;茯神定志安神;山梔清三焦之火以定血;丹皮平相火之逆以止血;麦冬清心润肺以滋水之上源也。为散水煎,使肝血内充,则肝火自降,而郁解怒伸,血无妄行之患。

29757 加减星附六君子汤

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】制南星一钱 竹节白附子(酒炒)七分 人参一钱五分 白术二钱 茯苓三钱 炙甘草五分 姜半夏一钱五分 广皮一钱

【用法】水煎服。牛痫,加牛黄五厘冲入;马痫,加马勃五分;羊痫,加羊胆(生)一枚,药送吞下;猪痫,加猪心血一匙冲;鸡痫,加鸡胆一枚,药水送吞。

【主治】癫痫气虚有痰者。

【加减】阴虚加生地四钱、当归三钱、川芎、白芍各一钱。

29758 加减香砂六君子汤

【方源】《医学探骊集》卷三。

【组成】焦白术三钱 人参三钱 葛根四钱 淡豆豉三钱 广缩砂二钱 陈皮三钱 姜厚朴二钱 木香二钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】伤寒食复。

【方论选录】此方以焦术、人参、甘草健脾胃；以广砂、木香、陈皮开脾胃；以厚朴温中宫；以豆豉、葛根解肌表。使食积去，脾胃复，肌表解，寒热退。

29759 加味小柴胡合四物汤

【方源】《保命歌括》卷三十二。

【组成】小柴胡汤四物汤二方相合，加桃仁、红花、乳香、没药。

【用法】水煎服。

【主治】瘀血所致胁痛。

29760 加味乌须固齿补肾方

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】当归(酒洗) 川芎 熟地黄 川牛膝 枸杞子 香附子 旱莲草 胡桐律 牙皂角 荆芥穗 细辛各三两 青盐六两

【用法】上为细末，用粳米一升半煮饭，将药末拌匀，分作七团，阴干，用桑柴火烧存性，为细末，铤合盛之。早、晚擦牙，药与水咽下。

【功用】固齿却痛。

【主治】老年肾虚，牙齿动摇疼痛。

29761 加味平肝解毒退翳丸

【方源】《眼科阐微》卷四。

【组成】拣白芍(酒炒)一两 兔粪(细研) 夜明砂(水淘净) 白扁豆(炒)各二两 谷精草(净涩) 山药各一两 蝉蜕(净)六钱 粉草(蜜水拌炒)五钱 草决明(盐酒炒)一两 黄连(酒炒)五钱 生地 芡实 麦冬 蜜蒙花(蜜水拌炒) 人参 白

豆蔻各一两 木贼(蜜水拌炒)三钱 青箱子(炒)六钱 白茯苓(乳制)一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大，重一钱。每服一九，早、晚用滚水化下。

【主治】痘后余毒不散，目生翳障。

【宜忌】忌白萝卜、韭、蒜、胡椒、虾米、鲜虾、牛、羊、猪首、鹅、驴、公鸡、一切海味、煎炒炙博之物。

29762 加味四味紫苏和胎饮

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】紫苏 黄芩 白术(土炒)各一钱五分 炙草(以上四味和胎饮本方) 藿香叶 陈皮各一钱 砂仁五分(炒)

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】心腹绞痛，上吐下泻。

29763 加味生化补中益气汤

【方源】《女科秘要》卷六。

【组成】川芎一钱 当归三钱 干姜四分 炙草五分 人参三钱 桃仁十二粒 茯苓一钱

【用法】新罐煎服。

【主治】产后气短似喘。

【加减】如汗多，不用茯苓，加黄耆一钱，五味子十粒。

【备考】若日久食少，闻药即吐，及误用寒药、食寒物，以致呕不纳谷者，急用人参二三钱，姜三片，仓米一大撮煎服。

29764 加味连翘升麻葛根汤

【方源】《片玉痘疹》卷五。

【组成】连翘(去心、酒洗) 升麻(酒洗) 葛根 赤芍 桔梗(泔浸) 甘草梢 酒芩 酒梔子 木通(酒洗) 麦冬(去心) 牛蒡子(酒淘、砂研) 白滑石

【用法】上铤。水一钟，淡竹叶、灯心为引，煎服，不拘时候。兼服牛黄丸亦可。

【功用】解毒，兼利小便。

【主治】痘疹热太甚，毒未发尽者。

29765 加味活血透肌解毒汤

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】玄参 黄芩 川芎 红花 连翘 山楂肉 花粉 石膏 归尾 桔梗 牛蒡子 陈皮 甘草

【用法】荸荠为引。

【主治】痘疹险症，见点三朝，出齐之日，色红口干者。

29766 加味益气养血救脱汤

【方源】方出《刘惠民医案》，名见《千家妙方》卷上。

【组成】酸枣仁(炒)36克 制何首乌9克 玉竹9克 熟附子12克 生菟丝子24克 炙黄耆12克 炒白术15克 归身9克 丹参12克 柏子仁12克 砂仁9克 益智仁9克 覆盆子12克 鸡血藤9克 竹茹9克 红花6克

【用法】水煎两次，得药液约250毫升。分两次温服。另用人参2克，琥珀0.9克，共为极细末，分两次冲服。服药三付，休药一天，有效再服。

【功用】益气养血，温肾助归。

【主治】营养不良性干瘦病，属脾气久亏，气血虚极，元阳欲脱者。

29767 加味救肺饮加郁金汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】加味救肺饮加郁金末。

【主治】劳伤吐血、嗽血。

29768 加味清热凉血驱敏汤

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】鲜茅根二两 大青叶五钱 青黛四钱 龙胆草五钱 黄芩三钱 黄柏三钱 川军五钱 白鲜皮一两 黄连三钱 干生地一两 丹皮三钱 赤芍五钱

【功用】清热凉血，除湿止痒。

【主治】湿热蕴久，化毒入营，外感毒邪引起的自家敏感性皮炎。

29769 加参宁肺止嗽生化汤

【方源】《女科秘要》卷七。

【组成】川芎 知母 诃子皮 瓜蒌仁

生地各一钱 当归三钱 兜铃 桔梗 甘草各四分 款冬花六分

【用法】水煎服。

【主治】产后虚弱，百日内患风寒咳嗽，声重有痰，或身热、头痛、无汗。

29770 加减二十四味流气饮

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】陈皮 半夏 升麻 干葛 甘草 泽泻 茯苓 苍术 厚朴 木香 羌活 独活 防风 荆芥 薄荷 黄芩 川芎 当归 生地 白芍 黄耆 青皮 木通 白芷

【用法】水二钟，加生姜五片，葱白三根，煎热服。以衣覆患上，出汗为妙，止可一服。

【主治】散走流注发。

【加减】冬天加紫苏、柴胡。

29771 加减统旨木香顺气散

【方源】《杂病证治新义》。

【组成】木香 香附 苍术 厚朴 陈皮 甘草 砂仁 枳壳

【用法】水煎服。

【主治】气滞腹痛。

29772 加减益胃升阳渗湿汤

【方源】《观聚方》卷一引《赤水医案》。

【组成】人参三钱 白术五钱 黄耆三钱 茯苓 益智仁 苍术 泽泻各一钱 附子 炮姜 炙甘草 升麻 防风各五分

【用法】水煎服。

【主治】脾虚不运，脉沉微，脾泄不止，日夜十二三行，面色黄白带青，两颐浮肿，四肢亦浮，小水不能独利，利必与大便并行，肠鸣四肢冷，口不渴，饮食大减，口唇龈内皆白者。

29773 加减理脾清热除湿膏

【方源】《慈禧光绪 医方选议》。

【组成】党参二钱 于术三钱(炒) 茯苓三钱 砂仁一钱 陈皮一钱五分 建曲三钱(炒) 石斛三钱 扁豆三钱 白芍一钱五分(炒) 灶心土三钱 薏苡仁三钱(炒) 益元散二钱

【用法】上以水煮透，去滓，再熬浓汁，少加老蜜成膏。每服二钱，白开水冲服。

【功用】补气健脾，淡渗利湿。

29774 加减滋阴益肾暖精丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】原生地一两(干) 山萸肉四钱 淮山药六钱(炒) 盐杜仲六钱 沙苑蒺藜六钱 白茯苓五钱 骨碎补四钱 远志肉二钱 当归身六钱 炒杭芍四钱 金毛狗四钱(去毛炙) 益智子三钱 怀牛膝四钱 石莲蕊五钱 广橘红二钱 稽豆皮六钱

【用法】上为细末，枣泥糊为丸，如小绿豆粒大。每早、晚各服二钱，淡盐汤送下。

【功用】滋阴益肾。

29775 加减犀角地黄茅花汤

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】犀角(磨汁) 生地黄 茅花 丹皮 枳壳 黄芩 梔仁 连翘 黄连 麦冬 当归尾 甘草

【用法】灯心三十根为引。

【主治】小儿麻疹已出，衄血、失血。

29776 加脑子白豆蔻薄荷煎丸

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】薄荷叶八两 川芎一两半 桔梗二两半 甘草二两 防风一两半 缩砂仁二钱半 加脑子半两 白豆蔻仁一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作二十丸。每服一丸，含化服之。

【功用】祛风。

29777 加减小柴胡合龙胆泻肝汤

【方源】《方症会要》卷三。

【组成】柴胡一钱 人参 青皮 车前各五分 龙胆草 梔子各四分 半夏 黄芩各七分 甘草三分 白芍一钱 归梢六分

【用法】加生姜一片，水煎服。仍服芦荟丸三次。

【主治】肝火盛，胁痛。

对

29778 对丹

《外科十三方考》。为原书“新法枯痔散”之异名。见该条。

29779 对金丸

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】牙消 礞石各一两(共入罐内，煨一日取起，如金色者佳) 大黄 枯芩各八两 鲜南星一斤

【用法】上三味，各另酒浸一宿，次日取出，一层南星，一层大黄，一层黄芩，用柳木甑蒸之，九蒸九晒，为末，入牙消、礞石、沉香末，姜汁、竹沥打糊为丸。每服一丸，三分重，生姜汤化下。

【主治】痰火。

29780 对金丸

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】苍术一斤(茅山者，米泔水浸) 厚朴十二两 粉草六两 白茯苓三两 陈皮十二两 半夏三两(姜汁浸) 枳壳二两(麸炒) 小红枣一百二十枚(去核) 生姜四两(切片)

【用法】上共和一处，用罐一个，内用水十五碗，慢火煮干，取出捣成饼，晒干为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，白汤送下。

【主治】一切肚腹饱胀积食。

29781 对金饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】黄连 槐花 苍术各一钱二分 甘草 白术 厚朴 枳壳 陈皮 藿香 当归各一钱 升麻八分

【用法】水煎，食前服。

【主治】大肠下血。

29782 对金饮

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】陈皮 甘草各五分 苍术八分

【用法】生姜为引。

【主治】吐泻伤食。

29783 对金散

【方源】《普济方》卷二一〇引《如宜方》。

【组成】陈皮八两 苍术 厚朴各二两

【用法】上为末，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】脾泄。

【加减】加肉豆蔻更良。

29784 对金散

【方源】《医灯续焰》卷八。

【组成】大黄 黄芩各等分

【用法】上为极细末。每服四分，临睡用好酒调下。仍饮酒尽量一醉，散发露顶卧，令人扇头数百扇，盖暖，睡至明日病失矣。不愈，再一服如前法，须大醉扇透。

【主治】偏正头风。

29785 对姜丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】半夏 天南星各半斤 干姜一斤

【用法】上为细末，生姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】膈有寒痰，呕逆眩运。

29786 对口仙方

【方源】《惠直堂方》卷三。

【异名】对口背痈仙方（《疡医大全》卷二十二）。

【组成】鲫鱼一个（去鳞、肠）

【用法】捣烂，入头垢五六钱，再捣极匀，加蜂蜜半盏搅匀，从外围入里面，留一孔出气。涂二次全消，即时止痛。如已成形有头将出脓，及已出脓者，内服三香定痛饮，或千金内托散，则能起死回生矣。

【主治】对口。

29787 对金饮子

【方源】《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）。

【异名】节金饮子（《普济方》卷一九七）。

【组成】厚朴（去皮、姜汁炙） 苍术（米泔浸一宿） 甘草（炙）各二两 陈皮（去白，炒令黄色）半斤

【用法】上为细末。每服三钱，以水一盏，生姜二片，如茶法煎取八分，空心服；余滓重煎两度服食。

【功用】固元阳，益气，健脾进食，和胃祛

痰，常服调三焦，壮筋骨，祛冷气，快胸膈。

【主治】①《局方》，四时伤寒，及五劳七伤，耳鸣眼昏，梦泄盗汗，四肢沉重，腿膝酸疼，妇人宫脏久冷，月水不调。②《袖珍》：寒热疟疾，愈后调理脾胃。

【加减】瘟疫时气，二毒伤寒，头痛壮热，加连须葱白五枚，豉三十粒同煎，服数剂汗出得安。如未得汗，以稀粥投之，厚盖衣服，取汗立愈；五劳七伤，脚手心热，烦躁不安，肢节酸疼，加柴胡（去芦头）同煎；痰嗽发疟，加姜制半夏煎；本脏气痛，加茴香煎；水气肿满，加桑白皮煎；妇人赤白带下，加黄耆煎；酒伤，加丁香；食伤，加高良姜；四时泄泻，加肉豆蔻；风疾，加荆芥穗；腿膝冷疼，加牛膝；浑身拘急及虚壅，加地骨皮；腿痹，加菟丝子；白痢，加吴茱萸；赤痢，加黄连；头风，加藁本；转筋霍乱，加楠木皮。

【备考】《袖珍》本方用法：加大枣一个，同煎。

29788 对金饮子

【方源】《准绳·类方》卷三引张子和方。

【组成】净陈皮八两（焙制） 苍术四两（焙） 人参一两 厚朴四两（姜炒） 甘草（炙）三两 黄芩二两半（去皮心，黑灰） 黄耆一两

【用法】上哎咀。每服半两，水一盏半，加生姜五片，大枣二枚，同煎至七分，去滓热服。

【主治】反胃。

【备考】先服承气汤、夜服四生丸。如已效，进食不格拒，方用对金饮子。然初病作，且于呕吐胃热类内选用清利之药，审其虚实轻重，方用前药更佳。

29789 对金饮子

【方源】《卫生宝鉴》卷十六。

【组成】平胃散五钱 五苓散二钱半 草豆蔻（面裹煨）五钱

【用法】上相合，作四服。水一盏半，加生姜三片，大枣两个，煎一盏，去滓，食前温

服。

【主治】濡泄。

29790 对金饮子

【方源】《玉机微义》卷十二。

【组成】平胃散一两 桑白皮(炒)一两

【用法】上为末。每服二三钱，加生姜，水煎服。

【主治】脾胃受湿，腹胀，米谷不化，饮食不进，身体沉重，肢节酸疼，皮肤微肿。

29791 对金饮子

《医学纲目》卷二十三。为《增补内经拾遗》卷三引《局方》“胃苓汤”之异名。见该条。

29792 对金饮子

《医学入门》卷八。为《医方类聚》卷一〇〇引《医方大成》“草果平胃散”之异名。见该条。

29793 对星香散

《明医指掌》卷二。为《易简方》“星香散”之异名。见该条。

29794 对口背痈仙方

《疡医大全》卷二十二。为《惠直堂方》卷三“对口仙方”之异名。见该条。

弘

29795 弘济膏

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】雄黑豆(炒)

【用法】上药炒爆研破，入酒瓶内，与血余相间铺之七八分满，以铁丝罩口，或槐、柳枝塞之，次将方砖一个，中凿一孔，以瓶口倒合于砖，口内泥封密，再次挖地一井，井内安碗一个，将砖盖井上，以瓶口对碗为要，砖四围封密，勿令通风，次以干马粪堆砖上，以埋过瓶底为度，尖上燃火焚之，过宿俟灰冷，取出碗内油。以鹅翎蘸扫患处。

【主治】下部浸注疮疥，及上部头面痲蚀等疮。

奶

29796 奶豆膏

【方源】《幼幼新书》卷十六引《茅先生方》。

【组成】瓜蒌瓢 蜜各半盏 人参 铅白霜各半两 陈槐花一分 瓜蒌子百二十粒

【用法】上将瓜蒌瓢及蜜炼成膏，入诸药末，同为膏。每服一大黄豆大，用杏仁煎汤调服。

【主治】小儿咳嗽。

幼

29797 幼婴延龄解毒丹

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】胞衣余带(近胞者，不拘长短剪下，炭火上焙干，为末)一钱 甘草一钱 净黄连五分 朱砂(飞)三分

【用法】上为细末，用生蜜和匀，分作七服，豆大许。每日取一服纳儿口中，以乳送下。

【功用】解胎毒，预防脐风。

馭

29798 馭中汤

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】黄耆 人参 白术各五钱 茯苓 当归各三钱 炙甘草一钱 陈皮一钱 薏仁一两 肉桂一钱 生姜三钱 大枣十二枚

【用法】作一服。

【主治】产后浮肿。

台

29799 台苗羹

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】羊肉一脚子(卸成事件) 草果五个 良姜二钱

【用法】上件熬成汤，滤净，用羊肝下酱，取清汁，豆粉五斤，作粉，乳饼一个，山药一斤，胡萝卜十个，羊尾子一个，羊肉等，各

切细，入台子菜、韭菜、胡椒一两，盐、醋调和。

【功用】补中益气。

圣

29800 圣丸

《元和纪用经》。为原书“麝香丸”之异名。见该条。

29801 圣汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】鼠尾草二两 豉一升 生姜 梔子仁各六两 桃皮一握

【用法】上哎咀。以水七升，煮取二升半，分三服。一本单用桃皮，以酒煮服之。

【主治】赤白下痢，大孔虫生。

【方论选录】《千金方衍义》：鼠尾草专主寒热下痢脓血而散结滞；梔子仁除五内邪气而散湿热；桃根白皮和血杀虫；生姜通神明去臭气也。

29802 圣酒

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【异名】紫酒（《普济方》卷三三八）。

【组成】大豆半两

【用法】用清酒一斛，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《卫生宝鉴》：妊娠腰疼如折。②《普济方》：亦治常人腰痛。

【备考】《普济方》本方用法：大黑豆二合，炒令香熟，以酒一大盏，煮取七分，去豆，空心顿服。

29803 圣散

《普济方》卷三六五。为原书同卷“牛黄散”之异名。见该条。

29804 圣力丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】葶苈十二分（炒青，别研） 郁李仁五分 杏仁三分 汉防己 陈橘皮各四两 茯苓五分 紫苏五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，一日二次，食后煎生姜、橘皮

汤送下。

【主治】肺间有水，喘嗽，小便不利，面目浮肿。

29805 圣力丹

《卫生总微》卷五。为原书同卷“软金丹”之异名。见该条。

29806 圣力散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】草乌头 白及 白薇 木鳖子（去皮） 地龙 金毛狗脊各二钱半 麝香三钱 黄丹少许

【用法】上为细末。用针针到生肉痛者用药。黄水出为度。

【主治】诸疔疮肿。

29807 圣力散

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】半两字古文钱（不以多少，火烧，醋淬四十九次）

【用法】上为细末。每服三钱，温酒调下。

【主治】伤折疼痛甚者。

29808 圣丸子

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《水鉴》。

【异名】白矾丸（《圣惠》卷九十三）。

【组成】寒水石 白矾（枯） 水蓼 雄黄 光明砂 黄丹（熬） 砒霜 鸡子皮灰各二分 大黄（生）四分

【用法】上为末，蟾酥为丸，如麻子大。一月儿二丸，更量，石榴皮汤、生姜汤任下。

【主治】小儿疳痢，经年不定时，似白胶。

【备考】《圣惠》本方用法：为末，用蟾酥半分，及面糊和丸，如粟米大，每服三丸，以新汲水送下。

29809 圣丸子

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】槭藤子三枚（重一两者，酥炙） 猪牙皂角二两（酥炙） 白蜡皮一枚（全者，不拘大小，烧灰留性，别研） 没药一两（别研） 皂角刺二两（只取木干上者烧灰；枝上者不用，仍不要尖长者） 槐角半两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，空心、食前温酒或麝香汤送下。如病甚者，日三服，翻花脱肛，磨五七丸涂之。

【主治】肠风痔漏，翻花脱肛，历年不愈者。

29810 圣化丹

【方源】《外科百效》卷四。

【组成】防风 荆芥 羌活 独活各一两 胡麻(炒) 金毛狗(去毛) 苦参(去皮) 牙皂(去皮核) 当归各二两半 蝉退 姜蚕(炒) 全蝎(去头足尾) 白芷 何首乌(去皮毛，炒)各一两一钱 苍耳草(烧)各五钱

【用法】上为细末，大枫子二两去壳，捣烂如泥，同药和匀，将陈米饭打糊为丸，如梧桐子大。每服四十至五十丸。如病人身上骨肿，眉上痒不止，或是风气拔睛，手足拘挛，先服此药一料，将青茶送下，日进四服。或妇人四肢麻痹，手若刺痛，腿膝生疮，先服夺命一料，后服此圣化丹。服药后十日，瓦锋面上放血，次于膊上放血，后于腿脚上放血，而遇天气清明，五六日放一次。量病轻重，不可乱放血，若妇人多破血无妨。

【主治】痲疯症，眉毛脱落，鼻梁倒塌，遍身生癩者。

29811 圣功丸

《圣济总录》卷一四二。为原书卷九十七“鸡冠丸”之异名。见该条。

29812 圣功丸

【方源】《元戎》卷十二。

【组成】膩粉三钱匕 定粉三钱匕(一法加蛤粉)

【用法】上为末。水浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五七丸或十丸，艾汤送下。

【主治】血痢。

29813 圣功丸

【方源】《简明医彙》卷八。

【组成】血竭二钱 蟾酥(真者)一钱 雄黄 朱砂 冰片 乳香 没药各五分 轻粉三分 真麝香二分

【用法】上为末，用人乳研化蟾酥为丸，如黄豆大。每服一丸，嚼化，好酒咽下。

【主治】一切痈疽、疔毒、发背初起，小儿痘疮黑陷、喉闭、蛊毒、破伤风等。

29814 圣功丹

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】硼砂五分 蒲黄一分 人中白二分 马勃一分 儿茶一分 甘草节八厘 僵蚕五厘 冰片五厘 麝香四厘

【用法】上为细末，收固。水漱口净，吹之。数次即愈。

【主治】一切牙疳。

【加减】若疳重，加青黛、黄柏等分。

29815 圣功丹

【方源】《玉钥续编》。

【组成】青果炭一钱 凤凰衣一钱 儿茶一钱 川贝母(去心)一钱 黄柏八分 薄荷叶八分 冰片五厘

【用法】上药各为细末，绢罗筛过，再为和匀，加入冰片同研收固，勿使泄气。每吹少许。

【主治】咽痛白腐糜烂，口舌白疮，口糜，唇疮，舌烂，舌根白疮。

【加减】腐烂重者，加人中白二钱。

29816 圣功散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】蜀葵子(陈者)不拘多少

【用法】上为散。每服三钱匕，温酒调下。如口噤，斡开灌之。

【主治】难产，横生倒产，困顿不省人事。

29817 圣功散

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】干姜(炮) 五倍子各一两 诃黎勒(煨，去核) 甘草(炙，锉)各半两

【用法】上为细散。每服二钱匕，食前米饮调下。

【主治】冷热不和，下痢赤白，脐腹作痛，里急后重。

29818 圣功散

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】苦楝根皮(生子东引者,米泔浸一宿) 鹤虱各等分

【用法】上为末,拌匀。每服半钱,熟水调下,连进二服,不拘时候。

【主治】五疳。

29819 圣功散

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】五积散一两 真麝香(细研)二钱

【用法】上药同煎服。

【主治】中湿瘫痪。

29820 圣功散

【方源】《传信适用方》卷三。

【异名】圣效方(《医统》卷七十八)。

【组成】南木香 槟榔各等分

【用法】上为细末。浓米饮调三钱许,黎明空心,先熟嚼炙猪肉之属,只咽汁,吐去滓,便服药。辰巳间虫下,其疾永除。

【主治】寸白虫,不拘久近。

29821 圣功散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】防风 苍术(米泔浸) 荆芥穗 陈皮(去白) 甘草(炙) 川芎 厚朴(姜制) 牛蒡子(炒) 人参(去芦) 川白芷 缩砂仁 柴胡(去芦) 紫草 黄芩 黄耆(盐水炙) 赤芍药 当归(酒浸) 蝉蜕 枳壳(煨) 木通 赤茯苓(去皮) 桔梗各等分 肉桂(去皮) 木香各等分

【用法】上除制外,余药不见火,晒为细末。先用米泔水 温调一服,次淡煮猪猪肉,或鲢鱼、田螺、泥鳅捣药与患者,空心食之。无热者,酒调肉捣;有热者,米泔汁调药捣肉食之;如痘不起胀,用常酒饼药与药末等分,酒调,肉捣食之;疮起胀,便去酒药,如前捣食;如大热,大便秘结,加四顺饮捣食;微利,即去四顺饮,如前捣食,空心捣食圣功散,仍食后服神功散,以解热毒。

【功用】解热消毒,匀气活血,调脾敛疮。

【主治】痘疮已出未收。

29822 圣术丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】白术一斤

【用法】上为末,米糊作丸,如梧桐子大。每服三钱,开水送下。

【主治】中虚食减,牙长出口。

29823 圣术煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】白术(用冬术味甘佳者,炒)五六七八钱或一二两 干姜(炒) 肉桂各一二钱 陈皮(酌用或不用)

【用法】水一钟半,煎七分,温热服。若痛胀觉甚者,即以此煎送神香散。

【主治】饮食偶伤,或吐或泻,胸膈痞闷,或胁肋疼痛,或过用克伐等药,致伤脏气,有同前证,而脉息无力,气怯神倦者。亦治寒湿泻痢呕吐。

【加减】若治虚寒泻痢、呕吐等证任意加用人参、炙甘草之类。若治中虚感寒,任意加用麻黄、柴胡。

【备考】《会约》有甘草。

29824 圣石丹

【方源】《卫生总微》卷十引《经验方》。

【组成】礞石四两(炭火烧一伏时) 不灰石二两(炭火烧一伏时) 母丁香一两 木香一两 人参(去芦)一两 白茯苓一两 半夏半两(汤洗七次,焙干) 真阳起石半两(先同上为末) 阿魏(汤化,去砂石,以面和成饼,焙干) 一钱 巴豆 杏仁各十四个(并连皮,灯上烧作炭,略存性)

【用法】上为细末。汤泡蒸饼为丸,如荔枝子大。每服一粒,水一大盏,入姜皂子大。擘破同煎,至五分放温,时时服之。煎药须用银石器。

【主治】小儿胃虚伤冷吐逆。

【备考】本方原名圣石散,与剂型不符,据《普济方》改。

29825 圣石散

【方源】《普济方》卷六十一。

【组成】络石草二两

【用法】上药用水一升半，煎取一盞，去滓。细细吃，须臾即通。

【主治】喉痹咽喉痛，喘息不通，须臾欲绝者。

29826 圣白丸

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】半夏半两（汤洗十次，竹刀切作片子，焙令干） 丁香半两

【用法】上为末，生姜自然汁为丸，如麻子大。每服十至十五丸，温汤送下，不拘时候。

【主治】小儿吐逆。

29827 圣白散

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】附子一枚（大者，炮裂，去皮脐）白附子（生） 天南星（炮） 半夏（洗去滑，为末，生姜汁和作饼，焙干） 麻黄（去根节）各半两 石膏（碎研）一两 麝香（研）半钱 白芷一分

【用法】上为末，入石膏、麝香末，同研令匀。每服半钱匕，热葱茶调下，甚者连进三服。

【功用】化痰发汗。

【主治】伤寒头疼壮热。

29828 圣灰散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】地龙粪（韭菜地中者）

【用法】上药用炭火烧令通赤，放冷地上，用碗覆之，候冷取出，研细。以猪脂调敷。

【主治】小儿月蚀疮，耳后耳下或鼻内生疮。

29829 圣灰散

【方源】方出《回春》卷三，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷五。

【组成】初出窑石灰矿

【用法】用初出窑石灰矿投入锅中滚水内化开去渣，止用清水煮干，炒黄色为度，黄色难得，赤色即可。用罐收贮，黄腊封口，勿令泄气，过一二年的无用。凡人四十内外，身体壮健者用四分；如年老体弱者，止用二分

或二分半、三分为止，以好烧酒一二钟，能饮者三四钟调服。治回食病，哽咽年深，或吐虫，或下虫，其病即愈。如不吐不下，遇发再服，不发不必服，自愈。

【主治】噎食病及回食病。

29830 圣后丹

《外科精要》卷中。为《百一》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

29831 圣红丸

【方源】《医方类聚》卷一一三引《施圆端效方》。

【组成】巴豆二十五个（和皮生用） 杏仁七十五个（生用） 铅丹一两半 白面四两

【用法】上药先以前二味研烂，次下丹、面，研匀，滴水为丸，如大豆大。每服三四丸，食后以新水送下。

【主治】酒食过伤，心腹痛疼，痞闷不消。

29832 圣红散

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】天南星一个（重一两者，先炮裂，用好酒浸，每日换酒，浸四日后，用大蝎七枚同蒸阴干，去蝎，用天南星） 丹砂半两（细研，与天南星同研令匀）

【用法】上为散。每服一字匕，薄荷汤放冷调下。

【主治】小儿急惊，搐搦不定。

29833 圣麦散

《普济方》卷三五六。为《圣济总录》卷一五九“泽泻汤”之异名。见该条。

29834 圣应膏

【方源】《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》。

【组成】槐枝一茎 巴豆仁二个 木鳖子仁二个 当归一钱

【用法】上药用好油三两半，下桃内煮十沸，去滓不用，却下黄丹一两半，慢火上炼，以铁冷试之，硬软合宜，盛磁器内，旋摊。

【主治】诸肿、恶疮、疽、肿毒，疼闷。

29835 圣灵丸

【方源】《医方类聚》卷一二九引《吴氏集

验方)。

【组成】木猪苓(去乌皮) 京三棱(去皮) 青皮(去瓢) 白茯苓(去皮) 白术 麦藁各一两 川白姜三钱 黑牵牛半两(炒黄色) 泽泻一两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。如早晨面上并眼胞上有气，巳时四肢皆肿，煎桑白皮汤，临卧送下十五丸；如头面脚手不肿，只腹肿，当分二气证候，腹带黑色，名脾胃气虚，若腹黄色，肚上青筋见，名蛊气，煎用木通汤，食后送下二十九。

【功用】消水气。

【主治】水肿。

【宜忌】忌盐、酱、面、糯米、虾蟹、无鳞鱼、花鸡、鸭、牛、羊、猪。

29836 圣灵丹

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】乳香三钱(另研) 乌梅五个(去核，细切焙干，为末) 白蒺藜二两八钱(炒黄，捣为末) 白米一捻(另研细末)

【用法】上药再入乳钵内，研数百下，炼蜜为丸，如粟米大。细嚼，热汤送下，病在上食后服，在下食前服。

【主治】打扑胸损，痛不可忍者。

29837 圣灵丹

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】川乌(生，去皮脐，切片) 草乌(去皮尖，切片，盐炒香熟，去盐)各半两 麻黄(去根节，微炒去汗) 生地黄(洗，去苗，锉碎，酒浸一宿，焙酥黄色) 自然铜(醋淬七次，研)各一两 五灵脂(拣去砂石，微炒不得过) 虎胥骨(醋浸，炙酥黄色) 广木香二钱半 乳香(另研) 没药(炙研)各钱半 干酸木瓜(生者)八两 甜瓜子(炒黄色)一两 沉香五钱(镑) 败龟版(卜卦者，醋炙黄酥)七钱半

【用法】上为细末，炼白沙蜜冷定，和药成剂，每一两分为一十二丸。每服二丸，隔夜以生姜自然汁入磁盏同浸，至天明化开，空

心温酒调服，再饮半盏热酒送下，日进二服。唇吻微麻无妨。

【主治】男子妇人，风湿相搏，气痹传于手足，麻肿疼痛，久则偏枯，及脚气不能行履，风湿痿痹。

29838 圣灵丹

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】人参(去芦) 木香 汉防己 茯苓(寒食面煨) 槟榔 木通各二钱(炒) 苦苧苳半两(炒)

【用法】上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前煎桑白皮汤送下。

【主治】脾肺有湿，喘满肿盛，小便赤涩。

29839 圣灵丹

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】珍珠 犀黄 冰片各一钱 的乳石二钱 琥珀四钱 劈砂三钱(研粹) 飞面四两

【用法】上药各为极细末，和匀。每服五分，土茯苓汤调合，再以汤送下。

【主治】杨梅、结毒、广疮。

29840 圣灵丹

【方源】《重订通俗伤寒论》引叶天士方。

【组成】炒苦苧苳四两 炒防己 广木香 茯苓 木通 人参各二钱五分

【用法】上为末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，桑皮汤送下。

【主治】湿伤筋络，脚跟骨脱落，动之则痛，艰于行步。

29841 圣灵丹

【方源】《活人方》卷一。

【组成】苦苧苳四两 人参二钱五分 白术二钱五分 茯苓二钱五分 汉防己二钱五分 槟榔二钱五分 木通二钱五分

【用法】枣肉为丸，如绿豆大。每服三十丸，食远桑皮汤吞下。

【功用】导水渗湿，宽胀利喘。

【主治】脾肺肾三焦之元气为湿邪所蔽，上不能输运气道则喘嗽胀闷，下不能通调水道，

则二便不调。

29842 圣灵丹

《青囊全集》卷上。为原书同卷“圣灵接骨丹”之异名。见该条。

29843 圣灵散

【方源】《普济方》卷三四八引危氏方。

【组成】泽兰叶 石膏(研)各二两 白茯苓(去皮) 卷柏(去根) 柏子仁(炒) 防风(去芦) 厚朴(去粗皮, 姜汁炙) 细辛(去苗) 人参(去苗) 藁本(去苗) 干姜(炮) 五味子 白芷 川椒(去目及闭口者, 炒出汗) 白术各三分 当归(去芦) 羌活(炒) 甘草(炙) 川芎各一两三分 生干地黄一两半 官桂(去皮) 一两一分 黄耆(去芦) 三分 芍药一两三分 白薇半两 桔梗一两 川乌三分 阿胶半两 丹参三分 吴茱萸(汤洗七次, 焙炒) 一两

【用法】上为末。每服二钱, 空心热酒调下, 日三服。若急有患, 不拘时候。气息即绝, 宜斡开口, 此药灌之。

【主治】产后血虚, 腠理不密, 因汗多而遇风, 口噤不开, 背强而直, 如发痫状, 摇头为鸣, 身反折, 须臾十发。

【加减】汗出两手拭不及, 不可治, 宜加大川乌、细辛、防风、嫩黄耆。

29844 圣妙散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】甘遂一分 白牵牛一分(一半生, 一半熟) 白槟榔一个(半个生, 半个裹煨)

【用法】上为细末, 每服一字至半钱, 陈粟米汤调下。

【功用】利大小肠。

【主治】鼓气, 并治胸膈气滞之疾。

【宜忌】如服补气药, 不得服犯甘草, 有盐气药; 每日只得吃淡粥及温热之物, 一月后食得盐。

29845 圣枣丸

【方源】《幼幼新书》卷十引丁时发方。

【组成】木香 丁香 硃砂 粉霜 轻粉 干漆 芫花 青橘皮 朱砂 巴豆霜各二钱

【用法】上为末, 枣肉为丸, 如豌豆大。每服三丸, 用枣汤吞下。

【主治】小儿惊风, 痢疾。

【备考】《永乐大典》引本方用法: 枣肉为丸, 薄荷汤下。

29846 圣枣子

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】木香一分 乳香一钱(别研) 没药一钱(别研) 肉豆蔻二枚(面裹煨)

【用法】上为细末。每服一钱, 用大干枣一枚去核, 先入半钱药末在枣肉, 次入水浸巴豆半枚, 又入药末半钱合定, 油饼面裹一指厚, 火煨面熟为度, 去面并巴豆不用, 只细嚼枣药, 食前米饮送下。

【主治】一切恶痢。

29847 圣枣子

【方源】《普济方》卷一五七引《卫生家宝》。

【组成】佛耳草 天南星 半夏 甘草 款冬花 钟乳粉各二两 桂半两(去粗皮) 井泉石半两(研极细如粉)

【用法】上为末, 内用天南星、半夏, 生姜汁制成饼子, 炙黄, 次入六味, 用好皂角去黑皮, 炙, 捶碎, 用薑汁浸一宿, 掇取汁, 煎成膏子和药, 捻枣核子大。如服时, 用好枣一枚去核, 入药在内, 湿纸裹, 文武火煨香为度, 临卧时糯米饮嚼下。

【主治】老人、小儿诸般嗽疾。

29848 圣枣散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】大枣四十九枚(烧灰留性)

【用法】不拘痢大小, 尽用枣灰及粪堆下土, 细研三四钱和匀, 以新汲水调敷。

【主治】乳痈。

29849 圣明散

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】羌活(去芦头) 青盐(研)各半

两 蜀椒(去目及闭口,炒出汗) 恶实(炒) 苍术(米泔浸一宿,切焙) 蔓荆实 木贼各一分

【用法】上为散。每服二钱匕,茶、酒任下,一日三次,不拘时候。

【主治】肝肾不足,眼目昏暗。

29850 圣和丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷一。

【组成】广皮 青皮 三棱 蓬术 干姜 高良姜 香附 查肉 神曲

【用法】上为丸,砂仁汤送下。

【主治】胃气不调,饮食减少而经停者。

29851 圣制汤

【方源】《元和纪用经》。

【组成】黑附子(炮,去皮脐,锉细)七钱半 生姜五钱(细切)

【用法】以水八合,煮减半,下生地黄汁二合,再煮七沸,和滓蜜收磁器中,经宿,平明滤清汁,空腹温服,作一服,良久,以两三匙饭压之,每日一剂,三四日效。一法无地黄。

【主治】下焦风冷,两脚无力;亦疗剑南卑湿脚弱。

29852 圣金丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】半夏(用生姜自然汁浸两宿,取出切作片子,新瓦上焙干) 威灵仙(净洗去根土,焙干,秤)各三两

【用法】上为细末,用不蛭皂角五七钱,河水一碗、井水一碗,揉皂角为汁,滤去滓,用银、石器内熬成膏,和上件药为丸,如绿豆大。每服七丸,加至十九,生姜汤送下,空心、日午、临卧各一服,服至一月,饮食增进为验。

【主治】停痰宿饮,上喘咳嗽,呕逆头疼,全不入食。

【宜忌】忌茶。

29853 圣金丸

《得效》卷七。即《杨氏家藏方》卷十三

“百药散”改为丸剂。见该条。

29854 圣金丹

【方源】《普济方》卷三七四引《医方妙选》。

【组成】白僵蚕一两 半夏一两(汤洗七次,焙干) 乌蛇头一枚(酥炙令黄,以上捣罗为细末,另研入) 青黛一分 蟾酥三片(如柳叶大,铁器上焙干)

【用法】上为末,酒糊为丸,如黍米大。每服十粒,点龙脑汤送下。

【主治】小儿痰实潮搐者。

29855 圣金丹

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《经验普济加減方》。

【组成】蔓菁子四两 蛇退皮 蝉壳 羌活 川芎 木贼 甘草(炙) 石决明 密蒙花 青箱子 石膏 青皮 枸杞子 白蒺藜 防风各一两 苍术(泔浸,切焙)二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,细嚼,茶、酒送下,一日三服。

【主治】眼中翳膜,昏晕黑花,发赤肿痛。

【宜忌】忌房事、热物。

29856 圣金散

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】黄药子一两 青黛一分

【用法】上为细散。每服一钱匕,食后新汲水调下,一日二次。

【主治】舌上忽然血出不止。

29857 圣金散

【方源】《医方类聚》卷二一八引《医林》。

【组成】御米壳半两(蜜炒) 凤眼草三钱 甘草二钱(炒) 陈皮二钱(去白) 缩砂三钱

【用法】上为细末。每服三钱,水一中盏,乳香同煎至八分,和滓温服。

【主治】妇人一切心胁肋疼痛不可忍者;血虚痛,诸药无效者。

29858 圣金散

【方源】《普济方》卷四〇七。

【组成】石膏一两 黄芩一两

【用法】上为细末。每用不以多少，干掺在疮上，复以绛玉散掺。

【主治】癬疮。

29859 圣金散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】淡秋石三钱 淡黄芩一钱半 川雅连五分 滴乳香一钱 真西黄一分 灯心炭五厘 薄荷头三分 大梅片三分

【用法】上为细末。吹之。

【主治】咽喉红肿痛，微碎，痰涎喉痹。

29860 圣金散

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】荷叶二钱 百草霜一钱 冰片一钱二分 灯心灰一钱五分 西黄二钱 人中白二钱 玄明粉一钱 甘草一钱五分 硼砂二钱 蒲黄一钱五分

【用法】上为极细末。吹患处。

【主治】喉症并口疳。

【加减】如欲引痰，加牙皂末一钱，姜蚕炭一钱，和吹之。

29861 圣泽汤

《鸡峰》卷五。为《苏沈良方》卷三“圣散子”之异名。见该条。

29862 圣治丸

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】真仙居野术二两（烘燥，勿令焦黑） 真川厚朴二两 白檀香一两 真降香一两 新会皮二两（盐水炒）

【用法】上为极细末，以广藿香六两煎浓汁泛为丸，如黄豆大。每服二三丸，细嚼，和津咽下。

【主治】霍乱转筋，腹痛吐泻，四肢厥冷，秽邪痞闷，一切四时不正之气。

29863 圣柳散

【方源】《洪氏集验方》卷二。

【组成】苍术四两（米泔水浸一宿，焙） 连翘一两（焙） 甘草一两（炙） 大黄半两（切） 人参半两（切） 赤茯苓半两（切） 黄芩二钱半（煨，存性） 桔梗半两 白术一分 枳壳一两（麸炒，去白） 南木香一

两（切） 益智一两（去皮，切） 白芷半两（焙） 苦参一两（切）

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，柳枝七寸，同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肿毒发背，一切痈疽，烦渴不已，疾势转增者。

【宜忌】忌鸡肉、湿面，疾愈半年方可食。

【加减】如渴时，加牙消半两，别研入。

29864 圣草散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】覆盆子叶不以多少

【用法】上洗净，研自然汁，以皂帛蒙在眼上，以笔蘸药汁于上下眼眶。当有细虫出于纱上，或研细著药于纱上便睡亦可。若治青盲眼暗，可捣取自然汁澄，阴干，入饮男子乳化开，点入目中，即仰卧，更入少许脑子尤好，三四日间视物如年少。

【主治】烂弦风，虫痒，及青盲眼暗不见物，冷泪浸淫不止。

29865 圣药丸

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】川芎一两 当归一两 瓜蒌根六钱（生用） 蝉壳五钱 川椒七钱（去子） 蛇蜕皮三钱 甘草（浸洗） 蔓荆子二两 楮实子五钱 密蒙花一两 枸杞子一两 木贼二两（去节，用童便浸一宿） 地骨皮一两 薄荷叶五钱 羌活一两 白蒺藜一两半（炒） 干菊花一两 川黄连三两 荆芥穗一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，一两分作十丸。每服一丸，细嚼，食后服之，日进二服。有翳者，清米泔水送下；睛暗者，当归汤送下；气昏瘵者，木香汤送下；如妇人血昏者，当归、薄荷汤送下。

【主治】远年近日诸般内障，风暗气血，一切眼疾。

【备考】方中甘草用量原缺。

29866 圣星丹

【方源】《幼幼新书》卷八引张涣方。

【组成】天南星(一般大)四十九个 活蝎四十九个(与上药瓦器盛,盐泥固济,吊于静室中,至腊日将蝎蜇南星酒浸一宿,焙研细末) 牛黄 麝香 龙脑各一钱 辰砂(飞)一分

【用法】前药末再与牛黄等四味研匀,姜汁为丸,如梧桐子大。每服一粒至二粒,人参、薄荷汤化下。

【主治】诸痫。

29867 圣饼子

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】木贼草 甘草 菊花 川芎 川椒 连翘各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,食后细嚼茶清送下。

【主治】眼昏花。

29868 圣饼子

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】丹砂 铁粉各一分 牛黄 甜消 麝香 龙脑 蓬砂(七味并研) 天麻 白芷 犀角(镑) 白僵蚕(炒) 芎蒭 雌黄(别用水银、石脑油各一钱同研如泥) 天雄 乌头 附子 天南星各一钱(四味同锉) 狐肝一具(以甘草水洗三遍细切,与天雄、附子、乌头、天南星四味锉了拌匀,入罐子内黄泥固济,勿令透气,候干,以炭火五斤,烧存性,放冷取出细研)

【用法】上为末,炼蜜为剂,分作六十饼。每服一饼,薄荷酒化下。小儿惊痫,一饼分作五服,薄荷汤化下。

【主治】卒中风,涎潮昏塞,口眼喎斜,手足麻痹,言语謇涩;大治风痫。

29869 圣饼子

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】甘遂 大戟(去皮)各半两 黑牵牛(生用)一两半 轻粉一钱匕 粉霜一钱 巴豆(去皮,醋煮黄)十四个 水银一钱(入锡一钱结砂子)

【用法】上药先将前三味为末,入白面五钱,水和作饼子,文武火煨焦黄,再为末,入后四味拌匀,水为丸,如绿豆大,捏作饼子。每服三饼,茶清送下。

【主治】伤寒结胸。

29870 圣饼子

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】川芎四两 香附子三两 藁本茸 甘草(炙) 小椒(出汗)各二两(去目) 苍术一斤(米泔浸,切,炒干末) 薄荷叶四钱 蝉壳一两 蛇退皮一两

【用法】上为散,炼蜜和匀,杵一千下,丸如弹子,捻作饼。每服一饼,芝麻一捻,同细嚼,茶、酒送下,一日三服。一月必效。

【主治】肝肾久虚,积热风毒,攻注两眼内,恶翳遮睛,脸赤痒痛,风泪隐涩难开。

29871 圣饼子

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】黄芩(去黑心) 苍术各一两 菊花 木贼 旋覆花 蝉壳 防风(去叉) 草决明 青箱子 甘草(炙,锉) 蔓荆实 恶实(炒) 羌活(去芦头) 桑叶 子芎蒭 真珠(研)各半两 蛇蛻皮半两(盐泥固济瓶子烧之,有翳即用)

【用法】上为末,炼蜜和就,杵约三五百下,丸如小弹子大,捏作饼子。每服一饼,食后温水嚼下;沙糖水送下亦得。

【主治】目昏暗,视物不明。

29872 圣饼子

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】石燕子(末)二钱 粉霜三钱 腻粉 硃粉(研)各二钱 延胡索一分(为末) 鹰屎白(研)一钱 白面四钱 丹砂(研)一钱

【用法】上药用鸡子清为丸,如鸡头子大。作饼子,煨灰火内微烧过。每服半饼子,米饮化下。

【主治】小儿虚中挟积,乳癖。

29873 圣饼子

【方源】《中藏经·附录》。

【异名】青饼子（《妇人良方》卷七）、肾饼子（《医统》卷四十二）。

【组成】青黛一钱 杏仁四十粒（去皮尖，以黄明蜡煎黄色，取出研细）

【用法】上为细末，以所煎蜡少许溶开和之，捏作钱大饼子。每服用干柿一个，中破开，入药一饼，令定，以湿纸裹，慢火煨熟，取出。以糯米粥嚼下。

【主治】咯血。

29874 圣饼子

【方源】《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》。

【组成】天南星（去皮生用） 白附子 五灵脂 全蝎（并生）各半两 蝉退（生） 青黛各一钱 麝香半钱

【用法】上为末，用好醋一大盏煮煎成膏，入药末拌和为丸，如梧桐子大，捏成饼子。如未满月一饼，二岁以下二饼，看大小加减，煎金钱薄荷汤化下。被盖，鼻上汗出方效。

【主治】小儿发惊。

29875 圣饼子

【方源】《准绳·幼科》卷八引《聚宝方》。

【组成】轻粉 粉霜各四钱 石燕子（大者）二个（先为细末） 延胡索二十八个（大者，为末）

【用法】上为末，滴水为丸，如大棋子大，仍放候阴干。每服一饼，先用熟水浸软，临卧更深冷浆水调下，服后急漱口。小儿一饼作四服。

【功用】下风涎，取积滞。

【主治】一切积滞及虚中挟积。

【加减】若下惊积，则每料更入朱砂、生龙脑各一钱。

29876 圣饼子

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】川乌头 天南星 干姜各一两 甘草（以上并生） 川芎各二两 防风一分 天麻半两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如芡实

大，荫一夕，来日晒干。每服三两饼子，先嚼三两荆芥穗，方嚼药，茶清送下，不拘时候。

【主治】偏正头痛。

29877 圣饼子

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】粉霜一钱 硃砂一钱 膩粉五个 石燕子一个（火煨） 玄胡索三个（去皮） 巴豆霜一钱

【用法】上为细末，入生面一大钱拌匀，滴水为剂，分十二处，捻作饼子，用刀上煨熟。每服一饼，煎皂子汤送下。

【主治】小儿乳癖瘕瘦。

29878 圣饼子

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】大戟子半两 甘遂末一分 牵牛末一两

【用法】上共拌匀，每用半钱，以白面半钱，水和作饼子，如钱大，煮令熟。放冷细嚼，食前姜汤送下，小者一饼，大者二饼。

【主治】小儿气肿。

29879 圣饼子

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】大黄三两 黑牵牛头末一两 硃砂三钱 山梔子半两 轻粉二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，捻作饼子，如小钱大样厚。每服三饼子，细嚼，食后温酒送下。临卧如行，粥补之，虚实加减。

【主治】一切沉积气胀，两胁气满，无问久新者。

29880 圣饼子

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】黄丹（水飞过，研）一钱 砒（研细）一字 寒水石（研细）二钱

【用法】上为末，用末入油糰饼，剂如樱桃大二十块，搜药令匀，却分作二十饼子。用炭火烧茶盏，炼麻油滚熟。每服一饼，临卧细嚼，冷茶清送下。如隔日发，即于不发日临卧服，或次日再发一次，即愈。

【主治】一切疟疾。

【宜忌】服药后忌热物一时辰。

29881 圣饼子

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】黄连末半两 巴豆半两(去壳,不去油)

【用法】上药同捣为膏,捻作饼子,大小厚薄如钱。先以葱汁拌盐,滴在脐内,次以饼子盖之,上用大艾炷于饼上,炙二七壮,再换饼子重炙。以利为度。

【主治】小便不通。

29882 圣饼子

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】天南星(汤泡七次) 半夏(汤泡七次) 防风(去芦) 干姜(泡洗) 甘草(炙) 细辛 白附子(生) 朴消(别研) 太阴石(别研) 川芎 白僵蚕(直者,炒去丝) 陈皮(去白) 川乌头(生,去皮脐) 薄荷叶各一两

【用法】上为细末,生姜自然汁拌和,打成饼子,如钱大。每服一饼,食后细嚼,茶汤送下。

【主治】头风。

29883 圣饼子

【方源】《普济方》卷四十六引《余居士选奇方》。

【组成】川芎 防风 白芷 甘草各一两 半夏半两(面略炒) 天南星(炮) 川乌头半两(炮,去皮脐) 天麻一两 干生姜半两

【用法】上为细末,汤泡蒸饼为丸,如梧桐子大,捏作饼子。每服五七饼,茶清、荆芥汤任下,不拘时候。

【功用】清头目。

【主治】风痰,头风。

29884 圣饼子

【方源】《普济方》卷七十八引《余居士选奇方》。

【组成】石决明(先捣碎,水飞细) 川椒

(去子) 车前子 楮实子 羌活 牛蒡子(新瓦上炒) 青箱子 木通 苍术(米泔浸一宿) 木贼(去节) 独活 白蒺藜(去尖刺) 蛇退皮(洗,煨过令黄) 地肤子各一两 太阴玄精石 滑石 寒水石 云母石 磁石(盐泡过挤干,以上五件入瓷瓶子内,用泥固济,入土坑子内,以慢火煨之令出火毒,以水飞令细,晒干) 草决明 荆芥 甘草 甘菊花 旋覆花各二两 蝉退一两(水洗净) 密蒙花三两五钱

【用法】上为细末,入五石在内拌匀,炼蜜为丸,每一两药剂,分作十饼子。每服一饼子,腊茶嚼下,一日三次,不拘时候。

【主治】内外障眼昏暗,久患风毒气眼。

29885 圣饼子

【方源】《脾胃论》卷下。

【组成】黄丹二钱 定粉 舶上硫黄 陀僧各三钱 轻粉少许

【用法】上锉细为末,入白面四钱匕,滴水如和指尖大,捻作饼子,阴干。食前温浆水磨服之。大便黑色为效。

【主治】泻痢赤白,脐腹撮痛,久不愈者。

29886 圣饼子

【方源】《走马急疳真方》。

【组成】抱灵居士(即香附去毛) 痰宫霹雳(即半夏)各等分

【用法】上为末,以鸡子清调和成饼。男左女右贴于足心,干则易之。

【功用】拔毒。

【主治】走马急疳。

29887 圣饼子

【方源】《准绳·幼科》卷七引张氏方。

【组成】神曲一两 臙粉一钱匕。

【用法】上药拌合令匀后,以鸡子清调拌,稀稠得所,捏作饼子,如钱大小,于火上炙令黄熟。每服一饼,于早晨、空心同油饼吃之,后进饮少许。

【主治】小儿久痢,腹痛,脱肛下血。

29888 圣济汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】茯苓三钱 防风 麦冬 黄芩各二钱

【用法】加竹叶，水煎服。

【主治】子烦。

29889 圣神汤

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】人参一两 生黄耆一两 当归一两 金银花二两 白芥子三钱 肉桂一钱 白术(炒)一两

【用法】水煎服。

【主治】阴症对口，或生于偏旁，无数小疮，先痒后痛，随至溃烂，肿不甚高突，色必黑暗，身体沉重，困倦欲卧，呻吟无力。

29890 圣神散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】淮乌(即草乌) 白芷 赤芍 白及 秋叶 枇杷叶 韭菜根各一两

【用法】上为末。蜜调敷。

【主治】跌打损伤，一切血瘀疼痛。

29891 圣神散

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】淮乌 白芷 赤芍 白及 枇杷叶 芙蓉叶各三钱 韭根 韭菜各一两

【用法】用姜汁、韭汁、老酒同调敷。

【主治】足趾折断。

29892 圣蚕丸

【方源】《永乐大典》卷九七五引《小儿保生要方》。

【组成】白僵蚕(直者微炒) 天南星(浆水煮五七沸) 防风(去芦) 半夏(先洗净，用浆水煮五七沸) 白附子(浆水煮五七沸) 人参各一两 藿香半两(去尘土)

【用法】上为极细末，寒食面打薄糊为丸，如麻子大。周岁儿每服五七丸至十丸，用生姜、薄荷汤送下，不拘时候；两三岁儿，可服十五丸，余当以意加減。

【主治】小儿诸般生风，壮热，精神恍惚，痰涎壅塞，目睛上视，睡卧不安，头痛颊赤，

多惊恐，肢体倦，不喜乳食。

29893 圣核子

【方源】《卫生宝鉴》卷二十。

【组成】雄黄三钱 信一钱 皂角子四十九个 巴豆四十九个 耳塞少许 麝香少许

【用法】上为末，入在合子内封之。用时针挑出，上病处。

【主治】蛇咬蝎螫。

29894 圣效丹

【方源】《幼幼新书》卷二十二引张涣方。

【组成】当归(洗，焙干) 木香 好朱砂(细研，飞) 桂心各一两 甘遂(慢火煨令黄) 京三棱(炮，乘热锉) 鳖甲(酥炙) 各半两(以上捣罗为细末) 麝香 麝仁(汤浸，去皮，别研) 各一分 巴豆三七个(去皮心膜，绢袋盛，酒煮一宿，取出别研)

【用法】上为细末。黄蜡六两慢火熔，同诸药搅成膏为丸，如黍米大。未周晬小儿每服一粒，二三岁二粒，四五岁三粒；六七岁五粒，十岁以上七粒，乳食后温米饮送下。

【主治】癖结诸病久不愈。

29895 圣效方

《医统》卷七十八。为《传信适用方》卷三“圣功散”之异名。见该条。

29896 圣效散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】马棘叶三斤

【用法】上为细末，夏月取马棘青叶，与干末同捣，捏作饼子，晒干再为细末。每用三两，水十五碗煎取沸，滤入大盆，淋洗遍身，及偏洗肉损烂处，一日三次。不过半月，肌体复完。

【主治】大风癩疾。

29897 圣效散

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【组成】赤石脂(烧赤) 白龙骨 阿胶(炙) 各一两 诃梨勒皮 木香 干姜(炮) 黄连 甘草(炙) 各半两

【用法】上为细末。每服半钱，食前煎粟米

饮调下。

【主治】血痢久不愈。

29898 圣效散

《杨氏家藏方》卷十二。为《三因》卷十四“槟连散”之异名。见该条。

29899 圣效散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】炉甘石一两(火煨) 黄连半两 海螵蛸四两(水浸七日,每日换水) 青盐(别研) 白矾(枯) 虢丹(水飞) 轻粉各一两

【用法】上为极细末。每用一字,汤泡洗眼;点亦得。

【主治】目赤,目翳。

29900 圣效散

【方源】《外科精要》卷中。

【组成】黄柏(炒黑) 川山甲(炒黄)一两 槟榔 木香 鸡内金二个

【用法】上为末。每用少许,搽疮口内,日五七次。

【功用】《赤水玄珠》:收敛疮口。

【主治】溃瘍。

【备考】方中黄柏、槟榔、木香用量原缺。《普济方》用黄柏三两,槟榔、木香各半两,鸡内金七个生用。为细末,候大脓出净,方可干掺疮上。

29901 圣效散

【方源】《得效》卷十六。

【组成】黄芩 北细辛 甘草 熟地黄 大黄 山梔子 赤芍药 当归尾(极细者) 牛蒡子 桑白皮各二两(有翳膜加一两用) 菊花五两(去梗)

【用法】上锉散。每服四钱,水一盏半,煎八分,去滓,临卧温冷服;两滓再煎,早食、午食、晚食、临卧各一服。

【主治】诸般风热,风痒热毒;大人小儿生翳、生膜、生血筋,属外障热眼者。

【宜忌】内障是虚,不宜服。每日只白煮精猪肉咽饭,或山药、萝卜菜,更可吃枣子、柿

子、银杏、土瓜、榧子、生葛。忌鸡、鱼、酒、面、糯米、咸、酸、热油诸般毒物。

29902 圣效散

【方源】《医方类聚》卷八十二引《经验良方》。

【组成】石膏 荆芥穗各等分

【用法】上为细末。用茶清调下。

【主治】诸般头痛。

29903 圣烟筒

【方源】《医学正传》卷五。

【组成】蓖麻子

【用法】上取肉捶碎,纸卷作筒。烧烟吸之。

【主治】喉痹。

29904 圣烟筒

【方源】《理渝》。

【组成】巴豆

【用法】巴豆肉烧烟熏鼻;或巴豆压油于纸上,卷皂角末烧熏鼻;或用热烟刺入喉内,吐恶涎及血即醒;或巴豆仁捣烂,棉裹塞鼻;或巴豆、明矾熬,去豆取矾吹鼻,并点喉蛾。

【主治】一切风痰喉痹。

29905 圣涂散

【方源】《幼幼新书》卷三十五引郑愈方。

【组成】凌霄花 万州黄各一分 根(切)半两

【用法】上一处烂研,酒、蜜调服少许,涂于丹上。

【主治】大孕丹并诸般毒。

29906 圣粉散

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】黄柏(蜜炙) 密陀僧 黄丹 孩儿茶 乳香各三钱 轻粉一钱半 麝香少许

【用法】上为末。用葱汤洗疮后,次贴此药。

【主治】下注疳疮,蚀臭腐烂,疼痛不可忍者;兼治小儿疳疮。

29907 圣授丹

《普济方》卷二八三。为《百一》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

29908 圣散子

【方源】《经效产宝·续编》引《济急方论》。

【组成】泽兰九分 石膏八分(如粉) 芎藭 当归 羌黄 芍药 甘草各七分 干姜 桂心各五分 细辛 卷柏(去土) 柏子仁 茱萸 防风(去芦头) 南椒(出汗) 厚朴(姜汁炙) 茯苓各四分 白芷 白术 人参 丹参 藁本 五味子 黄耆各三分 乌头(炮) 白薇各二分

【用法】上为散,以新瓦器密封,无令失气。每服二钱匕,以热酒调下。

【主治】产后诸疾。

29909 圣散子

《苏沈良方》卷二。为原书同卷“四生散”之异名。见该条。

29910 圣散子

【方源】《苏沈良方》卷三。

【异名】圣泽汤(《鸡峰》卷五)。

【组成】草豆蔻(去皮,面裹,炮)十个 木猪苓(去皮) 石菖蒲 高良姜 独活(去芦头) 附子(炮裂,去皮脐) 麻黄(去根) 厚朴(去皮,姜汁炙) 藁本(去瓢,土炒) 芍药 枳壳(去瓢,麸炒) 柴胡 泽泻 白术 细辛 防风(去芦头) 藿香 半夏(姜汁制)各半两 甘草一两(炙) 茯苓半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一钟半,煮取八分,去滓热服;余滓两服合为一服,重煎,空心服。

【主治】①《苏沈良方》:一切不问阴阳二感,或男子女人相易,状至危笃,及时疾流行。②《局方》:伤寒、时行疫疠,风湿、湿温,一切不问阴阳两感,表里未辨,或外热内寒,或内热外寒,头项腰脊拘急疼痛,发热恶寒,肢节疼痛,呕逆喘咳,鼻塞声重,及食饮生冷,伤在胃脘,胸膈满闷,腹胁胀痛,心下结痞,手足逆冷,肠鸣泄泻,水谷不消,时自汗出,小便不利,并宜服之。

【备考】《局方》有苍术、吴茱萸;《景岳全

书》有白芷、川芎、升麻、吴茱萸。

29911 圣散子

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】附子(炮裂,去皮脐,取中心者用) 伏龙肝 牡蛎(烧)各等分

【用法】上为散。用三岁乌鸡冠血调半钱匕,如口喎向左边,即涂药在右口角;若喎向右边,即涂药在左口角,才见口正,当即急洗去药,迟洗即牵过口角,慎之。

【主治】中风口喎。

29912 圣散子

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【异名】催生圣散子(《普济方》卷三五六)。

【组成】黄蜀葵子二七个 赤小豆七个(生用)

【用法】上为细末,以童便三分调,顿服。

【功用】催产。

29913 圣散子

【方源】《幼幼新书》卷二十五引丁左藏方。

【组成】胆矾 龙胆草各一两

【用法】上药同于瓦瓶中煨烟尽,略存性,贴疮上。

【主治】小儿走马疳。

29914 圣散子

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】硃砂 川大黄各八钱 麦麩六两 干漆三两(炒烟尽) 扁蓄 茴香(炒) 槟榔 瞿麦各一两

【用法】上为末。每服五钱,临睡温酒调下,仰卧。小儿用一钱,十五以上五钱或七钱,空心服之更效。

【主治】远年积块,及妇人干血气。

【加减】妇人干血气,加穿山甲二两(炮)。

29915 圣散子

【方源】《普济方》卷九十四引《经验方》。

【组成】草乌头(皮小皱有芦头者可用,削去皮尖,凡无芦头者不可用)四两 川芎 当归 藁本 防风 桂(不见火) 天南星(生) 雄黄(研入)各半两 白芷 干姜

(生) 各一两

【用法】上为末。每服一字，空腹、食前用煨葱白、麝香、酒调下；病甚者可服半钱。逾时方可进饮食。

【主治】偏风，半身不遂，一切风麻痹疼痛，及破伤急风等。

29916 圣散子

【方源】《普济方》卷二〇九。

【组成】御米壳五两(捣碎，醋炙黄色) 甘草(炙黄) 赤石脂 乌鱼骨(去皮) 肉豆蔻(面包煨去面) 拣丁香 诃子皮 干姜(炮) 各二两

【用法】上为末。每服先用水一盏，入乳香少许，煎七分，调药末二钱，食前和滓热服。

【功用】固养脾胃，温中止腹痛。

【主治】男妇脾胃受湿，中脘停寒，吃物频伤，心胸满闷，肋肋膨胀，肠鸣虚痞，小腹坚痛，脐下强急；或大便不调，水谷迟化，里急后重，下痢脓血，或五色，或便如鱼脑，或如豆汁，或有鲜血，或如烂肉，日夜无度，久不愈，嗜卧怠惰，虚瘦，肢体沉重，寒热时作。

29917 圣散子

《普济方》卷三七四。为《幼幼新书》卷十引郑愈方“回命散”之异名。见该条。

29918 圣散子

【方源】《解围元藪》卷三。

【组成】闹羊花根(老酒拌，九蒸晒) 缸岸(即坑堑，要多年露天者，醋煨三四次) 各一两 人牙(炙黄) 雄黄(水飞) 各八钱 牛黄一钱二分 蟾酥三钱 朱砂五钱 麝香一钱

【用法】上为末。每服四分，沙糖调，温酒送下。

【主治】诸风痿困挛曲，臭恶危烂者。

29919 圣散子

《医部全录》卷二六二。为《局方》卷六“痢圣散子”之异名。见该条。

29920 圣惠丸

【方源】《直指》卷二十五。

【组成】朱砂(研) 雄黄(研细) 各七钱半 藜芦(去芦头) 莽草(微炙) 鬼臼(去须) 各半两 肥巴豆肉十五个(去油) 麝香一钱 青色大虾蟆一个(烧存性) 斑蝥(去翅足，糯米炒黄) 三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小豆大。每服五丸，空心温酒送下。少刻，更吃粥饮一盏，利出虫蛇恶物。若不吐利，更服二丸。

【主治】蛊毒，心腹坚痛，羸瘠骨立，面目黄瘦。

29921 圣惠散

【方源】《金匱翼》卷二。

【组成】人中白一团(鸡子大) 绵五两(烧研)

【用法】每服二钱，温水服。

【主治】大蛆久蛆，及诸窍出血不止。

29922 圣脾散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】香附子(炒去皮毛) 一合 小黑豆一合(炒) 甘草半分

【用法】上为细末。每服半钱，饭饮调下。不拘时候。

【主治】慢脾风。

29923 圣愈汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生地黄 熟地黄 川芎 人参各三分 当归身 黄耆各五分

【用法】上咬咀，如麻豆大。都作一服，水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热服，不拘时候。

【功用】《东医宝鉴·杂病篇》：托里，补气血。

【主治】①《兰室秘藏》：诸恶疮，血出多而心烦不安，不得睡眠。②《准绳·类方》：一切失血；或血虚烦渴、躁热，睡卧不宁；或疮证脓水出多，五心烦热，作渴等。

29924 圣愈汤

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】四物汤加参、耆

【用法】水煎服。

【主治】①《脉因证治》：出血太多。②《删补名医方论》：一切失血过多，阴亏气弱，烦热作渴，睡卧不宁。

【方论选录】《删补名医方论》引柯琴：此方取参、耆配四物，以治阴虚血脱等证。盖阴阳互为其根，阴虚则阳无所附，所以烦热燥渴；气血相为表里，血脱则气无所归，所以睡卧不宁。然阴虚无骤补之法，计在培阴以藏阳，血脱有生血之机，必先补气，此阳生阴长，血随气行之理也。

29925 圣愈汤

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】四物汤加柴胡 人参 黄耆

【用法】水煎服。

【主治】疮疡溃后血虚内热，心烦气少者。

29926 圣愈汤

【方源】《一见知医》卷四。

【组成】人参 黄芪

【主治】恶露不下，面色黄白，不胀疼。

29927 圣箬皮

【方源】《普济方》卷二七五引《仁存方》。

【组成】新箬皮二十四片（剪如梨柿大）乳香二钱 当归三钱 白盐五钱 好醋一盏

【用法】上用小瓷瓶，入好醋同煎，慢火熬干尽，取箬皮贴疮，随大小剪贴之，用绢帛缚之。

【主治】诸般恶疮、臃疮。

29928 圣僧丸

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《眼科诀髓》。

【组成】羌活 川芎 防风 木贼 甘草 苍术 青皮 菊花 石膏 蒺藜各一两 枸杞子 蛇退 石决明各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服半丸，食后冷水送下。

【功用】退翳明目。

【宜忌】忌毒物。

29929 圣僧散

【方源】《普济方》卷一四七引《卫生家

宝》。

【组成】香白芷一斤（生锉） 甘草半两（生锉）

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，枣子二枚，生姜三片，葱白三寸，同煎至六分，热服。用衣被盖覆，如人行五六里更进一服，汗出即愈。

【主治】时行瘟疫，一切伤寒，不问阴阳，不拘轻重。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作“神白散”，且有豉五十粒。

29930 圣僧散

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】青盐三钱 铜青二钱 真胆矾三钱 黄丹三钱 南硼砂三钱 硼砂二钱半（以上六味纸衬略见火） 麝香一钱 片脑轻粉一钱 白矾 蕤仁半两（净去壳，研细七次去油） 炉甘石二两（净，煨七次，每一次童便内淬，七次了，然后捻极细，并花水飞过，取净末，令干，不见火，方入众药）

【用法】上十二味，于内坚硬者，各研细了，然后合和一处，研极细，用三重花纸罗过，收入砂合内，勿令透气。每用少许，于温汤内绵滤过，仰卧就，以绵沾药汁滴于眼中，勿令漏出药汁，然后起身。

【主治】眼目病。

29931 圣蟾散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】蟾酥（热汤少许化开）

【用法】上用新绵少许，蘸药米大，塞痛处。

【主治】风虫牙疼。

29932 圣化仙丹

《普济方》卷六十四。为原书同卷“神仙化铁丹”之异名。见该条。

29933 圣方痔药

【方源】《续本事》卷七。

【组成】白矾 血俞(即蛭螭) 石竹(即瞿麦)各半两 胡椒二十粒

【用法】上用瓦灌盛,泥固济,猛火煨通红,取出泥用,细研为末。五更时不用语津调敷痔头上。不过三服。

【主治】痔疾。

29934 圣功川芎汤

《卫生家宝·产科备要》卷七。为《张文仲方》引徐王方(见《外台》卷三十三)“神验胎动方”之异名。见该条。

29935 圣佛催生散

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】川芎二钱 当归三钱 益母草三钱 制香附二钱 陈皮二钱 冬葵子七十粒(炒研细,以酒调泥,俟药熟冲入)

【用法】水煎去滓,冲冬葵子泥,温服。

【主治】妇人浆尽胎干,产难急痛者。

29936 圣灵接骨丹

【方源】《青囊全集》卷上。

【异名】圣灵丹。

【组成】生半夏八钱 生南星五钱 生川草乌各三钱 白细辛二钱 胡椒二钱 蟾酥一钱(酒化)

【用法】先敷此药半日,去药,行刀挪接。敷过半日再挪接,接后用毒油膏加味敷。

【功用】取老伤铅码。

29937 圣灵解毒丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】犀黄一钱 珍珠 滴乳石各五钱 琥珀 川连各一两 雄黄四两 银花 木通 胆草 滑石 杏仁各六两 甘草 僵蚕 甲片各三两

【用法】上为末,土茯苓二十斤煎胶,面粉六两为丸。

【主治】广疮、杨梅结毒,横痃,下疳,沿途抗毒,一切无名肿毒,日久内陷,以致遍身斑点,或如脓窠、癰、癬,头面破溃,不堪形状。

29938 圣灵解毒丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】犀角一两 生大黄三两 黄连一两 黄芩二两 黄柏二两 银花四两 生甘草三两 连翘三两 天花粉三两 生地四两 鲜土茯苓五斤 归尾二两 赤芍三两 飞雄黄一两 全蝎二两

【用法】上药除鲜土茯苓外,其余共研细末,犀角另研和入;将鲜土茯苓煎浓汁二次,去滓滤清,加白蜜一斤,炼熟收膏,与上药末打和为丸,分做七百六十粒,每粒约干重五分。每用一九至二九,开水化服。

【功用】清热解毒。

【主治】血中蕴毒,广疮横痃。

29939 圣妙寸金散

【方源】《证类本草》卷十七引《胜金方》。

【异名】胜妙寸金散(《圣济总录》卷一五九)、寸金散(《妇人良方》卷十七)。

【组成】败笔头一枚(烧灰,为末)

【用法】以生藕汁一盞调下。若产母虚弱及素有冷疾者,恐藕冷动气,即于银器内重汤暖过后服。

【功用】催生。

【主治】难产。

29940 圣效透肌散

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】桑皮 荆芥各三钱 雄黄(研) 粉霜(研)各二钱半 蒺藜 当归 硃砂(研) 豆蔻 穿山甲(炮)各二钱 轻粉一字半(研) 海金沙一字

【用法】上除研药外,余拣净为末,入研药和匀。另将独棵蒜去皮,研如泥,入头醋和如稀糊,调药如膏,约癣积大小,摊在纸上贴病处,用新绵一叶覆之,以三指紧系。待一二时辰,觉疼痛无妨,只待口鼻内蒜香为度。

【主治】小儿奶癖、食癖,时发寒热,咳嗽,肋下坚硬结块。

29941 圣验黑神丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】防风(去芦,锉,焙) 川乌

(炮) 好墨(锉, 焙) 川附子(炮) 檀香各半两 麦(去心, 焙) 藿香叶(去土, 焙) 白茅 何首乌(锉, 用生姜汁同泡了甘草二钱浸二宿, 焙, 再浸, 焙) 各七钱 干姜七钱 白僵蚕(油炒, 去丝) 全蝎(姜汁浸一宿, 焙) 天南星(炮裂熟, 切片, 以姜汁小半盏同泡了甘草三钱, 锉, 浸二宿, 焙, 再焙, 姜汁尽为度) 白附子(炮十分裂熟, 以姜汁同泡了甘草三钱, 浸二宿, 焙, 再浸焙) 阿胶(水浸蒸, 同糯米糊作丸) 各七钱半 细辛(去叶及土, 锉, 焙) 白芷(锉, 焙) 香附子(炒, 去毛, 拍碎, 以生姜汁同泡了甘草二钱, 浸二宿, 焙, 余汁再浸) 川芎(锉, 焙) 各八钱 皂角灰(烧烟, 煅) 甘松(去土, 锉, 焙, 川者尤妙) 半夏(汤洗十次, 炒沙令热, 炮, 切片, 用生姜汁半盏泡了甘草三钱, 浸二宿, 焙, 再浸再焙) 半两 草豆蔻(拍碎去皮膜, 生姜汁浸一二日, 焙, 再浸焙) 六钱 白术(锉, 焙) 一两二钱 缩砂仁(去膜皮, 轻焙) 一两 麝香(别细研, 同药末滚) 龙脑(同麝研, 滚药末) 各一钱 白甘草(炮熟, 锉, 焙) 一两七钱

【用法】上为细末, 大钵中滚拌两日, 极令匀, 合糯米粉二两, 添水煮糊, 同阿胶膏和药为丸, 如鸡头大, 焙令十分干, 瓷瓶收置暖处。若修锉生料, 众药同片切, 生姜半斤或七两, 甘草三两, 于瓷罐内, 用水一斗五升上下, 文武火煮水干为度, 仍除出甘松、白茅、檀香、缩砂仁、藿香叶勿煮, 止令项焙。捣为末, 庶香气全, 所有煮者众药亦令作一处, 焙捣为细末就了, 却令研脑、麝同香松、茅数件, 大钵内滚三二日, 令药味和合, 方和捣为丸。煮药下水之诀, 以水高众药一寸余许, 文武火煮。一切风疾, 炒乌豆淬酒送下; 卒中僵倒, 或醉酒不醒, 生姜汤研三五粒灌下; 小儿惊风天吊, 五种痢疾, 入京腻粉少许, 煎金银、薄荷茶送下; 沉寒痼冷, 生姜汤送下; 一切气疾, 茴香汤送下; 头风暗

风, 荆芥汤送下; 咳嗽痰涎, 半夏汤送下; 肺气攻卫, 杏仁汤送下; 疟疾, 乌梅汤送下; 水泻, 干姜汤送下; 痢疾, 甘草汤送下; 脚疾湿气, 木瓜汤送下; 酒伤食积, 胃气不和, 陈皮姜汤送下; 肠风, 胡桃酒送下; 伤寒次霎, 葱豉汤送下; 时行疫疾, 山岚瘴气, 不伏水土, 藁本汤送下; 中毒, 甘草水研灌下; 牙痛, 夜卧含化; 牙宣, 填窍中; 妇人血风、血气, 当归酒送下; 血脏虚冷, 赤白带下, 血淋血晕, 烧棕榈灰研细调酒送下; 腰背疼痛, 浑身劳倦, 温酒送下。常服, 食后茶送下。

【主治】①《朱氏集验方》风疾。②《普济方》: 妇人血疼。

【宜忌】孕妇休服。

【备考】《普济方》有官桂、芍药。

29942 圣授夺命丹

【方源】《普济方》卷二七四。

【组成】五倍子(捶碎, 洗净)三两 山慈姑(即红金橙花根。去皮, 焙干)二两 川墨(烧存性)一两 续随子(一名千金子。去壳, 不去油)一两 五灵脂(洗净)一两 板蓝根(即大靛子。洗净, 焙干)一两 红牙大戟(去芦, 洗净)一两

【用法】上用续随子加麝香四钱、二味另研; 外六味另为细末, 却用公鸭血为丸, 无鸭血, 糯米粥亦可, 分作四十九丸, 阴干, 勿令见日。量病人虚实, 或半丸, 或一丸, 生姜、薄荷、井花熟水磨化, 细细服之。三五行为度, 温粥补之。治疗、痢、中毒、瘟疫、喉风、黄肿、汤火伤、虫蛇伤, 用东流水磨化涂之, 并化服半丸, 良久觉痒, 立效。打扑损伤, 炒松节加酒磨化, 服半粒, 仍以东流水磨化涂之。男妇颠邪, 妇人鬼胎, 用热酒磨化一丸, 作二服, 有毒吐下。自缢溺水, 打折伤死, 但心头微热未隔宿, 用生姜蜜水磨化灌之。

【主治】无名疔肿, 肺痈, 肚痛, 菌草菰子, 金石砒毒, 疫死牛马羊肉, 河豚鱼毒, 时行瘟疫, 山岚瘴气, 急喉闭, 缠喉风, 脾病黄

肿，冲冒寒暑，热毒上攻，痈疽发背未破，鱼脐疮，汤火所伤，百虫疯犬，鼠咬蛇伤，打扑跌伤，男子妇人颠邪鬼气鬼胎，自缢溺水，打折伤死，但心头微热未隔宿者。

29943 圣僧慈救膏

《玉机微义》卷十五引郭氏方。为原书同卷“万灵夺命丹”之异名。见该条。

丝

29944 丝一

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“丁香阿魏丸”之异名。见该条。

29945 丝二

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“三香散”之异名。见该条。

29946 丝七

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“红花汤”之异名。见该条。

29947 丝八

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“陈皮厚朴汤”之异名。见该条。

29948 丝三

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“藜藜散”之异名。见该条。

29949 丝五

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“救苦丹”之异名。见该条。

29950 丝六

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“独活红花汤”之异名。见该条。

29951 丝四

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下“圆红散”之异名。见该条。

29952 丝瓜汤

【方源】《直指小儿》卷五。

【异名】丝瓜散（《准绳·幼科》卷四）。

【组成】丝瓜（连皮）

【用法】烧炭存性，百沸汤调下。

【功用】发疮疹最妙。

【备考】《准绳·幼科》本方用法：或以紫

草、甘草煎汤调服尤佳；米汤亦可。

29953 丝瓜汤

【方源】方出《丹溪心法》卷五，名见《景岳全书》卷六十三。

【组成】丝瓜 升麻 酒芍药 生甘草 黑豆 山楂 赤小豆 犀角

【用法】水煎服。

【功用】解痘疮毒。

【备考】《景岳全书》本方用各等分，为粗散，每服三钱，水一大盏，煎至六分，不拘时，徐徐温服，量大小加減。

29954 丝瓜汤

【方源】《明医杂著》卷六。

【异名】丝瓜化毒汤（《痘疹仁端录》卷十四）。

【组成】丝瓜 升麻 芍药（酒浸） 甘草 黑豆 赤小豆 犀角（镑）

【用法】水煎服。

【主治】痘疮毒。

29955 丝瓜汤

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】丝瓜小小蔓延藤丝（阴干）二两半

【用法】上药五六月间取，至正月初一日煎汤待温，洗儿全身头面上下。

【功用】去胎毒，防治痘疹。

29956 丝瓜汤

【方源】《名家方选》。

【组成】丝瓜（阴干）三分 升麻 芍药 桔梗 甘草各二分

【用法】水煎，温服。

【主治】无辨痘不痘，但婴儿身热，呵欠烦闷，睡中惊悸，喷嚏眼涩鼻涕，出气粗，手足酸软。

29957 丝瓜酒

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】丝瓜根五六根

【用法】捣烂，水一碗，煎八分，黄酒冲服。

【主治】黄疸，眼与周身黄如金色者。

29958 丝瓜散

【方源】方出《古今医鉴》卷八引《海上

方》，名见《东医宝鉴·外形篇》卷四。

【组成】丝瓜根（经霜一二次，收采洗净，夜露十余宿，悬当风处，阴干）三五钱

【用法】上锉散，水煎去滓，滴香油如钱大，每日一次，空心温服。

【主治】肠风下血，痔漏脱肛。

【宜忌】忌鸡、烧酒。

29959 丝瓜散

【方源】《医方类聚》卷一四〇引《吴氏集验方》。

【组成】干丝瓜一枚（连皮烧作灰，存性）

【用法】上为末。每服二钱，空心，煮酒调服。

【主治】酒痢，便血腹痛，或如鱼脑五色腥秽者。

29960 丝瓜散

【方源】《普济方》卷三十八。

【组成】丝瓜一个（一名天萝，烧灰存性）槐花各等分（如气弱减分）

【用法】上为末。每服二钱，饭饮调服。

【主治】下血甚，不可救者。

29961 丝瓜散

《准绳·幼科》卷四。为《直指小儿》卷五“丝瓜汤”之异名。见该条。

29962 丝瓜散

【方源】《仙拈集》卷三。

【异名】丝朱散（《大生要旨》）、丝瓜稀痘方（《梅氏验方新编》卷三）。

【组成】丝瓜（近蒂者三寸，烧灰存性为末）朱砂（水飞，一岁以上用一钱，以下用五六分）各等分

【用法】沙糖水调下。

【主治】痘症初起发热。

【备考】《大生要旨》：痘未见点服之，痘出亦稀。《梅氏验方新编》：丝瓜近蒂者炙存性，为细末，每一钱配水飞朱砂三分，每服五分，用黑沙糖调服。

29963 丝瓜散

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】茺萸 蛇床子 硫黄 潮脑 枯

矾 川椒各等分

【用法】上为细末，用鲜丝瓜（刮去皮）一段，将药末厚涂丝瓜上，推入阴户之内。

【主治】阴匿。

29964 丝瓜散

【方源】《妇科玉尺》。

【组成】干丝瓜（烧存性）。

【用法】上为末。酒送下。

【主治】血气不行。

29965 丝朱散

《大生要旨》。为《仙拈集》卷三“丝瓜散”之异名。见该条。

29966 丝瓜叶膏

【方源】《疡医大全》卷十九。

【组成】丝瓜叶 韭菜叶 连须葱各等分

【用法】上药同入石臼内研如泥，以热酒冲和，去滓服。以滓，病在左手敷左腋，病在右手敷右腋，胁下亦敷。病在左足敷左胯，病在右足敷右胯，病在中敷心脐，并用布缚，候红丝皆白为安。如有潮热，亦用此法，令人抱住，不可放手，恐毒气颠倒难救，病人发颤跌倒，亦难救。

【主治】脉骨疔。

29967 丝瓜化毒汤

《痘疹仁端录》卷十四。为《明医杂著》卷六“丝瓜汤”之异名。见该条。

29968 丝瓜化毒汤

【方源】《种痘新书》卷六。

【组成】丝瓜干（取近蒂五寸，以此为君）赤芍 红花 当归 紫草 川芎 牛子 连翘 升麻 甘草 黑豆 赤小豆各等分

【用法】水煎，磨犀角调服。

【主治】痘疮紫陷。

【加减】气弱者，加人参。用此不起，即用小灵丹。

29969 丝瓜白梅方

【方源】《医学从众录》卷六。

【组成】丝瓜叶一片 白霜梅一枚（并核中仁）

【用法】上同研极烂，新汲水调服。

【主治】中暑霍乱。

【宜忌】切不可饮热汤。

29970 丝瓜稀痘方

《梅氏验方新编》卷三。为《仙拈集》卷三“丝瓜散”之异名。见该条。

皮

29971 皮矾散

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】地骨皮五钱 白矾三钱

【用法】煎汤洗之。至软后，用蜡羊油一两熬熟，入轻粉一钱，研为末，调匀搽之。

【主治】皴裂疮。

29972 皮金膏

【方源】《验方新编》卷十七。

【组成】广东羊皮金纸。

【用法】以金面贴伤处。三日必愈。

【主治】①《验方新编》：跌扑擦伤；或鞋靴底垫伤脚板；或刀伤破烂红肿，光皮潮湿；或疮疖将愈，新肉易破；或冻疮肿烂。②《青囊秘传》：痢久后阴部擦痛。

29973 皮炎膏

【方源】《外伤科学》。

【组成】炉甘石 5 克 黄连末 5 克 冰片 1.5 克

【用法】用凡士林 88.5 克，调上药末，冰片最后调入，密贮备用。直接外涂皮损处，每日 2~3 次。

【功用】消炎、止痒、润肤。

【主治】亚急性皮炎，湿疹。

29974 皮枯膏

【方源】《中医外科学》。

【组成】青黛 6 克 黄柏 6 克 煅石膏 60 克 烟膏 60 克（即土法烟熏烘消牛皮后烟汁结存的残留物质） 枯矾粉 110 克

【用法】上为细末，和匀，以药末 60 克，加凡士林 240 克，调匀成膏。涂搽患处。

【功用】清热杀虫止痒。

【主治】湿疹、肛门瘙痒。

29975 皮脂散

【方源】《中国医学大辞典》引马氏方。

【组成】青黛（飞） 黄柏各二钱 熟石膏二两 烟膏二两四钱

【用法】上为细末。麻油调敷。

【主治】浸淫疮，黄水湿毒，蔓延成片，久而不愈。

29976 皮脂膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】青黛 6 克 黄柏末 6 克 煅石膏 60 克 烟胶 60 克

【用法】上为细末，加凡士林 500 克调成油膏。

【功用】收湿止痒。

【主治】慢性湿疹。

29977 皮癣水

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】土槿皮 620 克 紫荆皮 310 克 苦参 310 克 苦楝根皮 150 克 生地榆 150 克 千金子 50 粒 斑蝥 100 只（布包） 蜈蚣 30 条 樟脑 310 克

【用法】将前五味药打碎成粗粒，装大瓶内，加入 75% 酒精 5 升，并将斑蝥（布包）、千金子等加入密封浸泡 1~2 周，滤去药滓，再加入樟脑溶化，备用。用毛笔刷涂于皮损上。

【功用】灭菌止痒。

【主治】银屑病，体癣，神经性皮炎。

29978 皮癣汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】生地 30 克 当归 9 克 赤芍 9 克 黄芩 9 克 苦参 9 克 苍耳子 9 克 白藓皮 9 克 地肤子 9 克 生甘草 6 克

【功用】凉血润燥，祛风止痒。

【主治】泛发性神经性皮炎，皮肤瘙痒症，丘疹性湿疹。

【方论选录】生地、当归、赤芍凉血润燥；黄芩、甘草清热解暑；苍耳子、苦参、白鲜皮、地肤子祛风除湿，清热止痒。此方适用于血热风燥之证，起红色丘疹，瘙痒极甚，舌

质红，苔薄白或薄黄等。

29979 皮癣膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】黄柏 白芷 轻粉各25克 煅石膏 蛤粉 五倍子各30克 硫黄 雄黄 铜绿 章丹各15克 枯矾 胆矾各6克

【用法】上药各取净末，研和极匀，加凡士林500克调和成膏。外擦患处，每日一、二次。

【功用】润肌止痒。

【主治】神经性皮炎、脂溢性皮炎。

29980 皮湿一号膏

《朱仁康临床经验集》。为《中医皮肤病学简编》“皮湿一号膏”之异名。见该条。

29981 皮湿二号膏

《朱仁康临床经验集》。为《中医皮肤病学简编》“皮湿二号膏”之异名。见该条。

29982 皮湿一号膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【异名】皮湿一膏(《朱仁康临床经验集》)。

【组成】地榆粉93克 煅石膏93克 枯矾3克 凡士林31克

【用法】调膏。外用。

【主治】慢性湿疹。

29983 皮湿二号膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【异名】皮湿二膏(《朱仁康临床经验集》)。

【组成】地榆粉46克 密陀僧(研匀)62克 凡士林125克

【用法】调膏。外用。

【主治】慢性湿疹。

29984 皮鞋轻粉散

【方源】《普济方》卷三六一引《经验良方》。

【组成】旧皮鞋面

【用法】烧存性，为末。加轻粉少许，湿疮干敷，干疮油敷。

【主治】小儿胎风疮。

发

29985 发火汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】柴胡一钱 甘草一钱 茯神三钱 炒枣仁三钱 当归三钱 陈皮三分 神曲 炒栀子各一钱 白芥子二钱 白术二钱 广木香末五分 远志一钱

【用法】水煎服。

【主治】火郁为病，其人少气，胁、腹、胸、背、面目、四肢填塞愤懑，时而呕逆，咽喉肿痛，口干舌苦，胃脘上下，忽时作痛，或腹中暴痛，目赤头晕，心热烦闷，懊侬善暴死，汗濡皮毛，痰多稠浊，两颧红赤，身生痈疮。

29986 发机汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参一钱 黄耆三钱 当归一钱 白芍三钱 茯苓三钱 薏仁五钱 白术五钱 半夏一钱 陈皮五分 肉桂三分

【用法】水煎服。

【主治】湿气浸之，双脚麻木，不能履地，两手不能持物者。

29987 发灰丸

【方源】《医学正传》卷五。

【组成】小儿胎发(如无，以壮年无病人头发，剪下者为上，自落者次之。烧灰)

【用法】上为末，别用新取侧柏叶捣汁，调糯米粉，打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤送下；或煎四物汤送下尤妙。

【主治】小便溺血。

29988 发灰汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】乱发(烧灰) 车前子 大黄(锉，炒) 桂(去粗皮) 当归(切，焙) 滑石各一两 冬瓜子五合 木通(锉)一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盞，煎七分，去滓温服，日二夜一。

【主治】产后小便不通。

29989 发灰饮

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【组成】头发(烧灰存性)

【用法】饮调服之。

【主治】斑疮豌豆。

29990 发灰酒

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】妇人油头发(烧灰)

【用法】每服二钱，温酒调下。

【主治】胃气小腹痛，服热药无效者。

29991 发灰散

【方源】《普济方》卷三十九引《肘后方》。

【组成】乱发一两(洗净，烧灰)

【用法】上为细末。每服三钱，食前温水调服，一日三次。以通利为度。

【主治】大小便不通，及便血，五淋，小儿惊痛；吹鼻治鼻衄。

29992 发灰散

【方源】方出《圣惠》卷七十一，名见《圣济总录》卷一二八。

【组成】蔓荆子一两 乱发灰半两 蛇蜕皮半两(微炒)

【用法】上为细散。每服一钱，食后温酒调下。

【主治】妇人乳中结塞，肿硬如石，成痈者。

29993 发灰散

【方源】《普济方》卷三二一引《圣惠》。

【组成】乱发灰

【用法】上用二钱，以米醋二合，汤少许调服；并花水调服亦可。疮疖之毒，以空心温酒调服。鼻衄，吹鼻内。

【主治】妇人小便尿血，或先尿而后血，或先血而后尿；饮食忍小便，或走马房劳，致胞转脐下，急痛不通；肺疽、心衄、内崩，吐血一两口，或舌出血如针孔；久痢不安，下血成片；鼻衄。

29994 发灰散

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】乱发一团(如碗大，烧成灰) 麝香(研)半钱匕

【用法】上药共为极细末。每服一钱匕，新汲水调下。又取少许吹鼻中。

【主治】①《圣济总录》：伤寒鼻衄不止。②《得效》：血淋，单小便出血如尿，此为茎衄。

【备考】《得效》本方用法：乱发不以多少，烧为灰，入麝香少许，每服用米醋泡汤调下。治淋以葵子末等分，用米饮调下。最治妇人胞转不尿。

29995 发灰散

【方源】方出《卫生总微》卷十八，名见《医部全录》卷四一五。

【组成】乱发(烧灰) 故絮灰 黄连(去须土) 干姜各等分

【用法】上为末。每用少许敷上。

【主治】小儿口傍疮，久不软。

29996 发灰散

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】乱发不以多少(烧灰)

【用法】入麝香少许，每服用米醋泡汤调下。

【主治】血淋；小便出血。

29997 发灰散

【方源】《活幼至宝》卷终。

【组成】乱发(取少壮无病人者)不拘多少

【用法】乱发以肥皂水洗净油垢气，又用温汤洗净肥皂气，焙干。量发多少，用新瓦罐一个，将发填入令满，净瓦片盖口，盐泥封之，又全封瓦罐，晒干，用木炭火围罐一半，煨一炷香，取出候冷，其灰成块，研令极细。每用二钱，童便七分，酒三分，调服立止。轻者只用发灰吹鼻亦止。

【主治】痘疮衄血，及诸血症。

29998 发灰散

【方源】《金鉴》卷五十五。

【组成】头发(取壮实人者)

【用法】将头发放在阴阳瓦上煨成灰，放在地上，去火性，为细末。吹入鼻中。

【主治】衄血。

29999 发灰散

【方源】《金匱翼》卷二。

【组成】发灰一钱 人中白(炙,研)五分
麝香(研)一分

【用法】取少许吹鼻中。

【主治】鼻衄。

30006 发灰煎

【方源】《普济方》卷二一五引《十便良方》。

【组成】菟丝子四两 鹿茸 山药各一两
发灰一分

【用法】上为细末,酒浸煮面为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心白汤送下。

【主治】五劳七伤,溺血淋漓,胸腹撑闷。

30001 发动汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参一钱 茯苓三钱 黄耆五钱
防风一钱 半夏一钱 羌活一钱

【用法】水煎服。

【主治】手足麻木。

30002 发汗散

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】芍药 黄芩 葛根各六分

【用法】上切。以水三升,煮取一升,分四次服。一岁儿分三次服。

【功用】发汗解肌。

【主治】少小伤寒。

30003 发汗散

《增补内经拾遗》卷三。为原书同卷引《医家必用》“诸葛解甲风”之异名。见该条。

30004 发汗散

【方源】《串雅内编》卷一。

【组成】绿豆粉 麻黄(去根节) 甘草各等分

【用法】上为极细末。每服一钱,用无根水半茶杯调服。即时汗出自愈。

【主治】感冒风寒。

30005 发汗散

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】雄黄(水飞)四分 辰砂(水飞)二钱 火消四分 麝香一分 金箔五张

【用法】上为极细末,瓷瓶收贮。男左女右,

点大眼角内。盖被,登时出汗而愈。

【主治】一切瘟疫伤寒,身热口渴,头疼身痛。

30006 发声汤

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】枇杷叶五片 贝母二钱 茯苓五钱 百部一钱 苏叶一钱 麦冬三钱 甘草一钱 玄参五钱 桑白皮三钱

【用法】水煎服。

【主治】口渴之极,快饮凉水,肺气闭实,突然痞哑,不能出声。

30007 发声散

【方源】《赤水玄珠》卷三引《三因》。

【组成】瓜蒌一枚 白僵蚕(微炒)五分 桔梗七钱半 甘草(炒)三钱

【用法】上为细末。少许干掺。

【主治】咽痛烦闷,咽物即痛,不宜寒凉药过泄之者。

【加减】咽喉肿痛,左右有红,或只一边红紫,长大,水米难下,用此一钱,朴消一钱,和匀掺喉中,咽津;如喉中生赤肿,或有小白头疮,用前散一钱匕,白矾(细研)五分,干掺。

30008 发声散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】瓜蒌皮(细锉,慢火炒赤黄) 白僵蚕(去头,微炒黄) 甘草(锉,炒黄色)各等分。

【用法】上为极细末。每服一二钱,用温酒调下,或浓生姜汤调服。更用半钱绵裹,含化咽津亦得。不拘时候,每日两三次。

【主治】咽喉语音不出。

30009 发声散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】升麻 桔梗 川芎 桑白皮各一两 甘草 羌活 马兜铃各半两

【用法】上为细末。每服一钱,水一盏,入竹茹、薄荷同煎至六分,去滓,食后温服。

【主治】语音不出,胸满短气,涎嗽喘闷,

咽喉噎塞。

30010 发补丹

【方源】《痘科金镜赋集解》卷六。

【组成】紫河车(酒洗, 净, 炙)二钱 乳香(去油)九分 山甲(土炒)一钱 人参三钱 生附子(去皮尖)三钱 蚬皮(炙用)一钱(即青蛙、田鸡之干也) 晕死鸡(煨成灰)五分 元米(和参附一处炒黄)一钱

【用法】上为细末, 浸蒸饼为丸。山楂、笋兜煎汤, 量儿大小、痘多少, 浆清厚, 将药五七分调服。

【主治】痘疮紫黑, 或停浆倒靥, 疮中犹凝浆汁血迹者。

【方论选录】此方专能发胖, 灌浆如神。发者, 发其脓, 恐浆清而毒复入于内也; 补者, 补其虚, 使内气充满, 不受毒之返入也。故用山甲、蚬皮、晕死鸡以发其脓; 河车、人参以补其虚, 元米以养其胃气, 乳香以行其药力, 附子以暖其气血, 使脓作臭气以复灌, 佐以山楂疏其毒, 笋兜发其毒, 真神方也。

30011 发际散

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】五倍子末 310 克 雄黄末 30 克 枯矾末 30 克

【用法】先将雄黄及枯矾研细, 后加五倍子末研和。毛囊炎用香油或醋调敷疮上, 脓疱疮或湿疹感染时与湿疹粉用香油调搽。

【功用】灭菌止痒, 收湿化毒。

【主治】毛囊炎, 脓疱疮或湿疹感染者。

30012 发表丸

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】甘草 麻黄 升麻 葛根各四两 苍术二两

【用法】上为细末, 炼蜜为丸, 如皂子大。每服一丸, 生绿豆汤送下。如过三日外, 加黄酒一钟, 再加一丸。

【主治】伤寒无汗, 头疼发热, 身痛口干。

30013 发表汤

【方源】《伤寒微旨论》卷上。

【组成】麻黄(去节)一两半 苍术三分 人参 当归各半两(去芦) 舶上丁香皮 甘草各三分

【用法】上为末。每服三钱, 水一盞, 加生姜一块如枣大, 劈破, 枣三个, 同煎至七分, 去滓热服。

【主治】芒种后至立秋前, 患自汗出, 恶风, 两手脉浮数, 或紧或缓, 寸脉短及力小于关尺脉者。此为邪气在表, 阴气有余所致。

30014 发表汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】穿甲三片 钩藤 川椒 桂枝 地肤子 秦艽各二钱 寸香三分 肉桂一钱 五分 附子一钱 虎骨一钱 柑树叶四两

【用法】水煎服。取汗禁风。

【主治】酒伤经络, 瘫痪不遂, 周身不仁。

30015 发表汤

【方源】《点点经》卷三。

【组成】川羌 干葛 猪苓 白术 麻黄(夏秋不用) 白茯苓 泽泻 桂心 苏叶 苍术

【用法】葱白为引。

【主治】酒伤发黄, 浮肿, 四肢倦怠, 饮食减少。

30016 发表散

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】葛根二钱 西芎一钱五分 黄芩二钱 甘草八分

【用法】上锉一剂。加生姜三片, 葱白三根, 水煎。热服出汗。

【主治】伤寒伤风, 头疼发热, 口干鼻涕, 四时瘟疫流行。

30017 发郁汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】丹皮 柴胡 羌活 葛根 远志 菖蒲 葱白 细辛

【主治】火郁。

30018 发泡膏

【方源】《经验良方》。

【组成】越没里膏四十八钱 芫菁(末)八钱

【用法】先将膏上火文煨化，加芫菁而炼和。贴跖跖或项窝。

【主治】神经热，腐败热，精力罢弊沉垂者。

30019 发毒散

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】地龙(去土) 防风(去叉)各等分

【用法】上为细散。每服一字匕，用酒、水各少许调下，不拘时候。

【主治】小儿疮疹出迟。

【备考】《普济方》有甘草一两。

30020 发背膏

【方源】《本草纲目》卷四十引《普济方》。

【组成】青娘子 红娘子 斑蝥各二个(去头足，面炒黄色) 蓬砂一钱 蕤仁(去油)五个

【用法】上为末。每点少许，一日五六次，同春雪膏点之。

【主治】目中顽翳。

30021 发背膏

《青囊秘传》。即《串雅内编》卷二“发背膏药”。见该条。

30022 发背膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】白蜜

【用法】上用乌金纸摊贴。

【主治】发背。

30023 发疮膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】羊髓一两 甘草二两 胡粉五分 大黄一两 猪脂二升

【用法】上切，合脂髓煎二物令烺，纳甘草、大黄三上下，去滓，纳胡粉搅令极调。敷疮上，日四五次。

【主治】痈疽始作便败坏。

30024 发疱膏

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】葛上亭长(或斑蝥)

【用法】上为末，将严醋和匀如泥，摊绵絮。贴百会、耳后、眉棱等，用硬膏封上面，则一夜而发水疱。

【主治】黑障、青盲、疫眼、打扑眼、痘疹入目等。

30025 发散汤

《仙拈集》卷一。为《奇方类编》卷下“感冒发散汤”之异名。见该条。

30026 发散煎

【方源】《嵩崖尊生》卷十五。

【组成】羌活 防风 前胡各五分 柴胡干葛各八分 紫苏六分 半夏一钱 陈皮八分 枳实七分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】小儿疟疾初起，类似感冒者。

30027 发越汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】葛根三钱 茯苓五钱 甘草五分 麦冬三钱 玄参一两 生地三钱 柴胡五分

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，热在阳明，欲出而未出，至八日而潮热未已者。

30028 发痘散

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】生黄耆二钱 甘草五分 当归一钱 桔梗一钱 荆芥一钱 防风二分

【用法】水煎服。

【主治】痘疮初出，因气虚而不能透发于外，隐于肌肉之间，不见点粒者。

30029 发痛汤

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】三棱 蓬术 青皮 陈皮 藿香 川芎 白芷 甘草各等分

【用法】上为散。每服二钱，加生姜二片，大枣一个，水煎，食前渐渐与服。

【主治】小儿乳食不匀，不能消化，脘胀腹痛。

30030 发朦丸

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】黄连 神曲各五钱 阿魏 胡黄

连各三钱 鸡肝十具 芦荟二钱半

【用法】上蒸熟为丸，如梧桐子大。每服三分。

【主治】小儿疳眼盲瞎者。

30031 发汗灵方

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】苍术(米泔浸) 羌活 白矾各等分

【用法】上为末，用生姜捣自然汁为丸，如弹子大。每用一丸，男左女右手紧擦丸对阴处。吃葱姜汤，被盖取汗。

【主治】一切伤风、伤寒。

30032 发汗鼓粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】鼓一合 荆芥一握 麻黄三分(去根节) 葛根一两(锉) 栀子仁三分 石膏三两(捣碎，绵裹) 葱白七茎(切) 生姜半两(切) 粳米二合

【用法】以水三大盏，都煎至二盏，去滓，纳米煮作稀粥。服之汗出为数。如未汗，再合服之。

【主治】中风、伤寒，初得二三日，壮热头痛者。

30033 发背熏药

【方源】《冯氏锦囊·外科》卷十九。

【组成】雄黄 朱砂 血竭 没药各一钱 麝香二分

【用法】上为细末。用锦纸为燃，每燃药三分，麻油润灼，离疮半寸许，四围徐徐照之。初用三条，加至六七条，疮热渐消，又渐减之，熏罢随用敷药。

【主治】发背。

30034 发背膏药

【方源】《串雅内编》卷二。

【组成】滴乳香四两(箬包烧红，用砖压出油) 净没药四两(照前式去油) 鲜油血竭四两 白色儿茶四两 上好银朱四两 杭州定粉四两 上好黄丹四两 上铜绿三钱

【用法】上药各另碾至无声为度，筛极细

末，拌匀。临时照所患大小，用夹连洒油纸一块，以针多刺小孔，每张用药末五钱，用真麻油调摊纸上，再用油纸盖上，周围用线缝好，贴患处，用软绢扎紧。过三日将膏揭开，浓煎葱汤将患处洗净，软绢拭干，再将膏药翻过，照前法贴之。

【功用】止痛，化腐生新。

【主治】发背。

【宜忌】此方破溃后用之最效，未溃未出大脓非所宜也。

【备考】本方方名，《青囊秘传》引作“发背膏”。

30035 发汗桂心散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】桂心半两 柴胡一两(去苗) 甘草一分(炙微赤，锉) 葛根一两(锉) 赤茯苓半两 泽泻半两 赤芍药半两 麻黄一两(去根节)

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一中盏，加薄荷二七叶 煎至六分，去滓。稍热服，不计时候。衣盖取汗，未汗再服。

【主治】热病三日，表犹未解，壮热，头目四肢不利。

30036 发汗麻黄汤

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【组成】麻黄五两(去节) 葛根四两 栀子二十枚(擘) 葱(切)一升 香豉一升(绵裹)

【用法】上㕮咀。以水八升，先煮麻黄、葛根三两沸，去沫，纳诸药，煎取二升五合，绞去滓，分为三服。服别相去如人行五六里，更进一服。不利，复取汗，后以粉粉身。

【主治】天行壮热烦闷。

【宜忌】忌风及诸热食。

30037 发阳通阴汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】人参二钱 茯苓三钱 白术二钱 黄耆三钱 肉桂五分 熟地五钱 当归二钱 白芍三钱 柴胡一钱 甘草五分 白芥子二

钱 荆芥(炒黑)一钱

【用法】水煎服。

【主治】阳虚气闭耳鸣。耳痛虽愈，耳鸣如故，用祛风散火药，耳鸣更甚，以手按耳，则耳鸣稍息者。

30038 发表攻里散

【方源】《解围元藪》卷四。

【组成】老人牙(灰)四个 牛虱三十个(焙) 桑虫四条(焙) 川山甲 虎骨(酥炙) 鹿角(灰)各一两 蜈蚣二十条(炙) 败龟版(炙) 蜂房(炙) 官桂各一两 麝香五分 牛黄三分 蜈蚣四条 血余(灰) 鸡鹅卵壳(煨)各一两

【用法】上为末。每服三钱，酒送下。

【主治】大麻风。

30039 发表附子散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】附子一两(炮裂，去皮脐) 桂心一两 麻黄一两(去根节) 白术一两 吴茱萸半两(汤浸七遍，焙干，微炒)

【用法】上为散。每服二钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓热服，不拘时候，宜频服，令有汗出。即瘥。

【主治】伤寒二日，头疼壮热。

【备考】本方方名，《普济方》引作“附子汤”。

30040 发表消毒汤

【方源】《治疹全书》卷中。

【组成】防风 荆芥 羌活 独活 连翘 花粉 牛蒡 甘草

【用法】水煎服。

【主治】疹出后见风早没，未清爽者。

【加减】身不热而喘急，加麻黄、杏仁；身热烦渴而胸中热，加薄荷、葛根。

30041 发表清里汤

【方源】《锦京直指》卷二。

【组成】连翘三钱 银花三钱 鲜生地六钱 鲜石斛四钱 粘子三钱 蝉蜕一钱五 广郁金三钱 薄荷一钱五 天花粉三钱 川

连一钱 水芦根筍五钱

【主治】温邪传里，发热口渴，舌黄或红，脉浮洪数，溲短而赤。

30042 发表渗湿汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】苍术 秦艽 槟榔 桂枝 茯苓 车前 怀膝 川膝各一钱半 川羌 独活 天雄各一钱 干葛 防己各二钱 甘草三分 生姜引

【主治】酒伤经络，周身麻木，瘫痪不遂。

30043 发表雄黄散

【方源】《保命集》卷中。

【组成】雄黄一钱 防风二钱 草乌一钱

【用法】上为细末。每服一字，温酒调下。

【主治】破伤风。

【宜忌】里和至愈可服，里和不可服。

【备考】本方方名，《普济方》引作“雄黄散”。

30044 发背对口膏

【方源】《疡医大全》卷七引杨廷陞方。

【异名】五全膏。

【组成】番木鳖(水浸，刮去毛) 土木鳖(去壳) 蓖麻仁(去壳)各一两四钱

【用法】用清油一斤浸，春三日，夏五日，秋七日，冬十日。文武火熬焦色滤清，复入锅内，熬至滴水成珠，用蜜陀僧，龙牙有金星起者六两，研细，取膏，再加金箔四十九张，剔入膏内，用柳枝搅匀，稍待用瓷器置水，将膏倾入水内。如用时，盛锅内化开摊贴。愈陈愈妙。

【主治】发背对口，初起自消，已成即溃。

30045 发背神验方

【方源】《外台》卷三十七。

【组成】狗白粪半两

【用法】上一味，以暖水一升，绞取汁，分二次服。以滓敷肿上，每日二次。以愈为止。

【主治】发背初起，觉欲作肿者。

30046 发脑内消散

【方源】《普济方》卷二八八。

【组成】消石(研)二两 木通(锉) 紫

檀香 甜葶苈(隔纸炒) 白敛 莽草各一两 大黄三两

【用法】上为末。每用浆水旋调得所，涂于肿上，干即易之。

【主治】发脑始结，疼痛妨闷，欲成痈疽者。

30047 发疹紫草散

【方源】《医方类聚》卷二六四引亢拱辰方。

【异名】发斑紫草散(《普济方》卷四〇四)、紫草散(《明医杂著》卷六)、紫草化毒散(《景岳全书》卷六十三)。

【组成】紫草 甘草 糯米 黄耆

【用法】上为末。水煎服。

【主治】①《医方类聚》引《小儿药证直诀》：麻疹，痘疮黑陷。②《明医杂著》：痘疹黑陷，气血虚弱，疮疹不起。

【备考】《普济方》本方用量，等分；《明医杂著》用各一钱半。

30048 发斑紫草散

《普济方》卷四〇四。为《医方类聚》卷二六四引亢拱辰方“发疹紫草散”之异名。见该条。

30049 发散醒醒散

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】人参 白术 白茯苓 炙甘草 桔梗 天花粉各等分 细辛减半(一方加防风、川芎各等分)

【用法】水煎，薄荷叶为引。微汗妙。

【主治】小儿惊风，睡而不醒，醒而喜睡者。

30050 发表解表升麻汤

《兰室秘藏》(济生拔粹本)。即原书(人卫本)“解表升麻汤”。见该条。

30051 发毒攻里五香连翘饮

【方源】《疡科选粹》卷二。

【组成】沉香 木香 麝香 丁香各一钱 乳香二钱 连翘 射干 升麻 桑寄生 独活 甘草各一钱 大黄一两五钱 木通二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】诸疮肿，初觉一二日，便厥逆咽塞，发寒热。

司

30052 司肾丸

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】鹿茸 菟丝子 胡芦巴 杜仲 肉桂 知母 黄柏 熟地黄 地骨皮 赤石脂 山药 龙骨

【用法】上为细末，以醋打糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心以升麻煎汤送下。

【功用】滋阴补肾，退热止滑。

【主治】肾虚生热，以致小便不禁。

30053 司命丸

《外台》卷十三引《古今录验》。为原书同卷“五疰丸”之异名。见该条。

30054 司马灵通膏

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】当归(洗) 赤芍药 地骨各半两 木香 白芷 蜂房 佗僧(研)各三钱 木鳖子十四个(掟) 杏仁十九个 黄丹二两 巴豆十四个 血竭二钱 轻粉 乳香 没药各一钱半 血余(鸡子大)一块 沥青 白胶香各半斤 香油半斤

【用法】取东南槐柳枝条，如筷子长，各四十九根，同当归、木香等十味，同香油在沙锅内熬黑色，去滓；次入沥青、胶香熔尽，去滓，上火再熬，入佗僧、黄丹，用柳枝条不住手搅，滴水中不散为度。稍冷，入乳香、没药、血竭、轻粉搅匀，瓷器内盛，湿土埋，出火毒。冬雪埋，腊月熬尤妙。

【主治】一切疮疡并痔漏。

30055 司马温公解毒膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】乳香三钱 木鳖子二十四个(去皮) 杏仁四十八个 蓖麻子三十四个 巴豆十四个 槐枝四两(长四指) 柳枝二两 桃枝三两 黄丹春秋三两半夏四两冬三两三

【用法】上用青油一斤，下诸药熬黑，滴水内不散成也，用好绵滤过。用时于水内浴贴之。

【主治】诸疮及杖疮。

辽

30056 辽东都尉所上丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】恒山 大黄 巴豆各一分 天雄二枚 苦参 白薇 干姜 人参 细辛 狼牙 龙胆 沙参 元参 丹参各三分 芍药 附子 牛膝 茯苓各五分 牡蛎四分 藟芦六分（一方二两三分）

【用法】上为末，炼蜜为丸。宿勿食，每服五丸，一日三次。

【主治】脐下坚癖。

【备考】本方方名，《普济方》引作“恒山丸”。

边

30057 边臣十八味

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】归尾（酒洗）一钱二分 乌药 枳实（炒） 苏木 丹皮 石斛 秦艽 赤芍 银花各一钱 桃仁（去皮尖）十五个 红花（酒拌、焙）六分 紫草七分 猴姜八分 大黄一钱五分 乳香（去油） 没药（去油）各五分 甘草五分

【用法】酒、水各二钟，煎一钟半，热服。

【功用】舒筋活血。

【主治】跌打损伤。

【加减】头项伤，加川芎；腿脚伤、加牛膝；胳膊手指伤，加桂枝；胁肋伤，加青皮。

30058 边城十二味饮

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】归尾 蒲黄 红花 苏木 桃仁 丹皮 乳香 没药 紫苏各一钱 生地 黄赤芍 酒大黄各二钱

【用法】酒、水各半煎服。

【主治】杖伤。

母

30059 母鸡汤

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】人参 黄耆 白术 白茯苓 麻黄根 牡蛎（煅）各三钱

【用法】上用母鸡一只，去毛杂净，水六七碗，同药煮至三碗。任意服之。

【主治】产后褥劳，虚汗不止。

30060 母鸡汤

【方源】《类证治裁》卷八。

【组成】黄雌鸡一只 当归 熟地 黄耆 白术 桂心各三钱

【用法】先以水七钟煮鸡汁至三钟，每用汁一钟煮药。每服四钱，一日三次。

【主治】妇人产后褥劳，寒热咳嗽，肌羸色悴。

30061 母鸡散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】肥母鸡一只

【用法】用绳将鸡吊死，去毛净，用竹刀剖开，取肠尿，不可入水，用阴阳瓦焙干，以烟尽为度，可重六七钱，为末。分为三服，黄酒调下。

【主治】五劳七伤，诸虚百损。

30062 母姜酒

【方源】《千金》卷六。

【异名】生姜膏（《圣惠》三十五）。

【组成】母姜汁二升 酥 牛髓 油各一升 桂心 秦椒各一两 防风二两半 芎劳 独活各一两六铢

【用法】上药桂心以下为末，纳姜汁中煎，取相淹濡，下髓酥油等令调，微火，三上三下煎之。平旦温清酒一升，下膏二合，即细细吞之，日三夜一。

【主治】①《千金》：咽门者，肝胆之候，若脏热，咽门则闭而气塞；若腑寒，咽门则破而声嘶。②《圣惠》：咽喉肿痛，声嘶不出。

30063 母蛎散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】母蛎粉

【用法】上为极细末，先以津唾涂肿处，次

以母蛎粉掺敷。

【主治】小儿外肾肿大，茎物通明。

30064 母丁香丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】母丁香七个 丁香 吴茱萸各半两 硫黄一分 石胆一钱 麝香一分

【用法】上为细末，生姜自然汁糊为丸，如梧桐子大。每服五七丸，生姜汤送下。呕逆，盐醋少许化一丸，于箸头上服之。

【主治】呕吐不已。

30065 母丁香膏

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】五灵脂一两 丁香十四个 母丁香七个

【用法】上为细末，用犬胆和为丸，如豌豆大，捏扁阴干。每服一饼子，倒流水送下。

【主治】吐逆不止。

【备考】本方方名，据剂型，当作“母丁香饼”。

30066 母猪蹄汤

【方源】《三因》卷十八。

【组成】母猪蹄一只（制如食法） 通草四两。

【用法】以水一斗浸，煮熟，得四五升。取汁饮，不下更作。

【主治】乳妇气少血衰，脉涩不行，乳汁绝少。